



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E ARSIMIT
DHE SPORTIT
QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE
DREJTORIA E PROVIMEVE TË SHTETIT

PROVIMI I SHTETIT
FONDI I PYETJEVE PËR PROFESIONIN E
RREGULLUAR TË MAMISË

1. Pjesa e Përgjithshme Paraklinike

1. Cila nga brinjët e mëposhtme është atipike?

- A) E parë
- B) E dytë
- C) E tretë
- D) E dymbëdhjetë

2. Mbledhja e muskujve quhet:

- A) Adduksion
- B) Abduksion
- C) Flexion
- D) Extension

3. Pelvisi formohet nga kockat e mëposhtme me përjashtim të:

- A) Oss coxae
- B) Oss sacrum
- C) Oss coccygeum
- D) Vertebra lumbare e pestë

4. Skapula nuk ka Fose:

- A) glenoidale
- B) subskapulare
- C) supraspinata
- D) infraspinate

5. Humerusi nuk ka Fose:

- A) olekrani
- B) kapitis
- C) radiale
- D) koroide

6. Nuk i takon kafkës elemeti:

- A) Calvaria
- B) Promontorium

- C) Glabella
- D) Clivus

7. Procesi zigomatik mungon tek:

- A) Kocka frontale
- B) Kocka zigomatike
- C) Kocka temporal
- D) Maxilla

8. Atlasi nuk ka:

- A) procese artikulare
- B) Foramen transversal
- C) Fovea dentis
- D) dy tuberkulume

9. Procesi i skeletit torakal është:

- A) stiloideus
- B) xipfoideus
- C) mamillaris
- D) zygomatikus

10. Tek sacrum nuk gjejmë:

- A) Facies articularis
- B) Linea transversal
- C) Cornua sacralia
- D) Spina sacralis

11. Cili nga muskujt e mëposhtëm nuk fillon me dy koka?

- A) Rectus femoris
- B) Digastrikus
- C) Pronator teres
- D) Gastrocnemius

12. Artikulacioni temporomandibular është i tipit:

- A) Cilindrik
- B) Sferik
- C) Elipsoid
- D) Enarthrosis

13. Muskujt pektoralë i takojnë:

- A) Abdomenit
- B) Pelvisit
- C) Shpinës
- D) Toraksit

14. Muskujt e mimikës:

- A) Lëvizin manibulën
- B) Inervohen nga n. Facial
- C) Kanë inervime të ndryshme nga njëra-tjetra
- D) Kanë dy pika fiksime në kocka

15. M.deltoideus fiksohet në:

- A) Oss scapula
- B) Oss Clavikula
- C) Oss humerusi
- D) Vertebren e tretë

16. Artikulacioni genu realizohet ndërmjet:

- A) Femurit, tibies, fibules
- B) Femurit, tibies, patelles
- C) Femurit dhe tibies
- D) Femurit fibula dhe patella

17. Në lidhjet e kafkës mbizotërojnë:

- A) Artikulacionet
- B) Suturat
- C) Ligamentet
- D) Sinkondrozat

18. Në cilin prej proceseve, qelizat shpenzojnë rreth 40% të energjisë së tyre ditore?

- A) Ne transportin aktiv
- B) Ne endocitozë
- C) Ne exocytosë
- D) Ne difuzion të lehtësuar

19. Me cilin lloj procesi transportohet glukoza prej proteinës mbartëse nga një zonë me përqendrim më të lartë drejt një zone me përqendrim më të ulët?

- A) Me transportin aktiv
- B) Endocitozën
- C) Difuzionin e lehtësuar
- D) Difuzionin e thjeshtë

20. Pjesa e sistemit nervor që konsiderohet e pavullnetshme është:

- A) SN somatic
- B) SN autonom
- C) SN sensor
- D) SN motor

21. Invaginimet e sarkolemës që formojnë zgjatime në formë gishtërinjsh, që depërtojnë në brendësi të fibrës muskulare quhen:

- A) retikulum sarkoplazmik
- B) retikulum endoplazmatik
- C) tubujt T
- D) filamentet e aktines

22. Segmenti i miofibrilit i quajtur sarkomer, gjendet midis:

- A) dy linjave Z
- B) dy bandave A
- C) dy zonave H
- D) dy aktinave

23. Në një sinaps neuro-muskular, neuroni e çliron neurotransmetuesin në:
- A) pllakën motore
 - B) citoplazmën e qelizës muskulare
 - C) cisternat terminale
 - D) hapësirën sinaptike
24. Një njësi motore përbëhet nga:
- A) të gjitha fibrat muskulare brenda një muskuli të caktuar
 - B) nga një neuron motor dhe fibrat muskulare që ai kontrakton
 - C) të gjitha neuronet që inervojnë një pjesë të caktuar të trupit
 - D) një muskul dhe një nerv
25. Të gjitha më poshtë janë shenja të inflamacionit përveç:
- A) dhimbjes
 - B) skuqjes
 - C) temperatures
 - D) hipertensionit arterial
26. Një nga molekulat e mëposhtme bën të mundur që muskuli të sigurojë energjinë e nevojshme për kontraksion duke gjeneruar ATP prej ADP. Cila është ajo?
- A) Creatinë fosfati
 - B) Fosfokinaza
 - C) Acetilkinesteraza
 - D) Katalaza
27. Cila nga qelizat e mëposhtme prodhon antikorpe?
- A) Limfocitet T
 - B) Limfocitet B
 - C) Monocitet
 - D) Fagocitet
28. Si quhen degëzimet nervore të cilat përcjellin impulsin drejt trupit të neuronit?
- A) Aksone
 - B) Dendrite
 - C) Trupa Nissl
 - D) Neurofibrile
29. Sistemi nervor autonom inervon të gjitha më poshtë përveç:
- A) muskulit kardiak
 - B) gjendrave egzokrine
 - C) muskulit skeletik
 - D) traktit tretës
30. Neurotransmetuesit të cilët rrisin permeabilitetin e membranës post sinaptike për jonet Na, dhe potencojnë impulsin nervor quhen neurotransmetues:
- A) inhibitorë
 - B) eksitues
 - C) aktive
 - D) neutral

31. Pjesa fillestare e harkut reflektor është:

- A) interneuroni
- B) fijet efektore
- C) receptorët ndijësor
- D) neuroni motor

32. Energjia dhe efektet direkte mbi shendetin:

- A) Jo rrezik te rendesishem profesional
- B) Jo stres psikologjik
- C) Ndryshime ekologjike
- D) Jo permiresim te vaditjes

33. Cili është rajoni i retinës që përgjigjet për mprehtësinë e pamjes?

- A) Sclera
- B) Lëngu qelqor
- C) Fovea centralis
- D) Disku optic

34. Shkopinjte janë qeliza fotoreceptore që përgjigjen për:

- A) informacionin në errësirë
- B) për ngjyrën dhe detajet e objekteve
- C) informacionin në dritë të bollshme
- D) variantet b dhe c janë të sakta

35. Hormonet e mëposhtme çlirohen nga adenohipofiza, përveç:

- A) FSH
- B) TSH
- C) ACTH
- D) HAD

36. Hormoni i prodhuar në kortexin e gjendrës mbiveshkore që vepron në veshkë duke mbajtur Na e duke eliminuar K, dhe që indirekt ndikon në ruajtjen e presionit arterial është:

- A) Aldosteroni
- B) Epinefrina
- C) Kortizoli
- D) Adrenalina

37. Rritja e nivelit të hormoneve të tiroides në gjak jep efektet e mëposhtme, përveç:

- A) rënie në peshë
- B) rritje të metabolizmit bazal
- C) rritje të debitit kardiak
- D) rënie të metabolizmit të karbohidrateve

38. Cila pjesë (element) i eritrocitit mund të riciklohet në palcën e kockave për prodhimin e eritrociteve të reja?

- A) Globina
- B) I gjithë eritrociti
- C) Biliverdina
- D) Hekuri

39. Cili nga përbërësit ushqimor është më i rëndësishëm për prodhimin e eritrociteve?

- A) Ca
- B) Na
- C) proteinat
- D) vitamina B12 dhe acid Folik

40. Një person që ka bërë infarkt të muskulit të zemrës, probablisht ka një bllokim të:

- A) A. pulmonare
- B) V. cava
- C) Vv. coronare
- D) A. coronare

41. Valvulat atrio ventrikulare (A-V) mbyllen gjatë ciklit kardiak kur:

- A) pace-makeri dërgon një impuls
- B) presioni brenda atriumeve është më i madh se presioni brenda ventrikujve
- C) ventrikujt kontraktohen
- D) presioni në aortë është më i madh se VM

42. Kompleksi QRS në ECG tregon:

- A) depolarizim të atriumeve
- B) depolarizim të ventrikujve para kontraksionit
- C) repolarizim të ventrikujve
- D) zemren në qetësi

43. Mëlçia në digjestion prodhon:

- A) enzima digjестive
- B) lëndë alkaline për të neutralizuar aciditetin e stomakut
- C) bilë për të emulguar yndyrnat në zorrën e hollë
- D) substanca që ndihmojnë zorrën e trashë në absorbimin e ujit

44. Çfarë e inicion reflexin e gëlltitjes?

- A) Frika nga gëlltitja
- B) Gjuha që vërtitet në gojë
- C) Receptorët sensorë që ndiejnë ushqimin në farings
- D) Receptorët e shijes

45. Receptorët e dëgjimit vendosen në:

- A) kanalet semicirkulare
- B) koklea
- C) sakula
- D) vestibule

46. Cilat qeliza të stomakut sekretojnë faktorin intrinsek?

- A) Te mukozës
- B) Parietale
- C) Peptike
- D) G

47. Cila nga të mëposhtmet nuk është përbërje e lëngut pankreatik?

- A) Kimotripsina
- B) Amilaza
- C) Bikarbonatet
- D) Acidi klorhidrik

48. Lipoproteina që ul tensionin sipërfaqësor të alveolave dhe i bën ato të mos kolabohen quhet:

- A) Fosfolipid
- B) Lipoproteinë alveolare
- C) Surfactant
- D) Tensinogjen

49. Sasia maksimale e ajrit që një person mund të expirojë pas frymëmarrjes më të thellë të mundshme është:

- A) kapaciteti pulmonar total
- B) vëllimi expirator rezervë
- C) vëllimi residual
- D) vëllimi rezervë inspirator

50. Imuniteti qelizor sigurohet nga:

- A) A .makrofagët
- B) Bazofilet
- C) Qelizat T
- D) Qelizat B

51. Oksigjeni transportohet në gjak kryesisht si:

- A) O₂ i tretur në plazëm
- B) deoksihemoglobinë
- C) oksihemoglobinë
- D) karbaminëhemoglobinë

52. Cili nga të mëposhtmit nuk është funksion i veshkave?

- A) Zbërthen lëndët ushqimore të ardhura me gjakun
- B) Ndihmon në kontrollin e prodhimit të eritrociteve
- C) Ndihmon në rregullimin e p. arterial
- D) Rregullon përberjen, vëllimin, pH e lëngjeve të organizmit

53. Shendeti sipas teorisë Bio-Mjekesore është:

- A) Mireqenie Shpirtërore
- B) Mireqenie Fizike
- C) Mungese e sëmundjes
- D) Mireqenie mendore

54. Shendeti sipas OBSH është:

- A) Gjendja e mireqenies së plote
- B) Mireqenie fizike dhe shpirtërore
- C) Mireqenie mendore dhe shoqërore
- D) Mireqenie fizike, mendore dhe shoqërore

55. Epidemiologjia studion:

- A) Statistike
- B) Higjene
- C) Shpeshtesine e semundjeve
- D) Metoda

56. Faktoret demografike kane te bejne me:

- A) Nivelin e enzimave
- B) Aktivitetin fizik
- C) Grupet etnike
- D) Grupin e gjakut

57. Për ribozomet nuk është e vërtetë që:

- A) Në to kryhet sinteza e proteinave
- B) Përmbajnë arn
- C) Përbëhen nga subuniteti i madh dhe i vogël
- D) S' përmbajnë proteina strukturore

58. Nuk është e vërtetë që bërthama:

- A) ka përmasa të ndryshme në qeliza të ndryshme
- B) ka forma të ndryshme në qeliza të ndryshme
- C) përmban material gjenetik në trajtën e ADN
- D) vendoset gjithmonë në qendër të qelizës

59. Indi epitelial ka:

- A) pozicion kufitar
- B) në gjaku
- C) veti rigjeneruese
- D) polaritet të theksuar në disa lloje qelizash

60. ADN:

- A) Gjendet vetëm në bërthamë
- B) Shoqërohen nga proteinat histone
- C) Organizohet në kromozome
- D) Organizohet në kromatinë

61. Formimi i njëkohshëm i eritrocitit, trombocitit dhe granulociteve realizohet në:

- A) Nyjen limfatike
- B) Lien
- C) Palcën e kuqe të kockave
- D) Hepar

62. Për neuronin është e gabuar që:

- A) është njësi morfologjike dhe funksionale e indit nervor
- B) nuk kanë aftësi të shumohen
- C) aksonet e tij përmbajnë lende tigroide
- D) dendritet janë më të shkurtër se aksoni

63. Në veshkë sintetizohen substancat e mëposhtme, përveç:

- A) Reninës

- B) Eritropoetinës
- C) Aldosteronit
- D) Angiotensinogjenit

64. Epiteli i kavititetit oral është:

- A) më i keratinizuari i trupit të njeriut
- B) pseudo-shumështresor prizmatik
- C) i mbuluar në sipërfaqe nga indi muskolor
- D) shumështresor i sheshtë

65. Cili është pohim i gabuar për kompleksin Golxhi?

- A) Vendoset përballë bërthamës
- B) Është më i shprehur në qelizat sekretore
- C) Në to kryhet trafiku më i madh i makromolekulave
- D) Ndërmjet tij dhe rep-it ka komunikim direkt

66. Gjenerimi i pohimit të gabuar në lidhje me bërthamën:

- A) Madhësia e saj është e ndryshme në qeliza të ndryshme
- B) Qelizat kanë gjithmonë vetëm një bërthamë
- C) Ajo mund të gjendet në dy gjendje fizike
- D) Kromatina është përbërja kryesore e bërthamës

67. Cila nga qelizat e mëposhtme nuk është autoktone në indin lidhor?

- A) Fibroblastet
- B) Eozinofilet
- C) Qelizat mezenkimale
- D) Mastocitet

68. Për eritrocitet është e gabuar që:

- A) kanë bërthamë
- B) përmbajnë proteinën hemoglobinë
- C) kanë formën e diskut bikonkav
- D) kanë funksion transportin e oksigjenit dhe dioksidit të karbonit

69. Për eozinofilet nuk është e vërtetë që:

- A) bëjnë pjesë në seritë granulocitare
- B) kanë granula specifike me nuancë portokalli
- C) kanë bërthamë të rrumbullakët
- D) rritja e numrit të tyre quhet eozinofili

70. Cili funksion nuk i përket neuroglisë?

- A) Mbështetës
- B) Ushqyes
- C) Përcjellës
- D) Kufizues

71. Cilat qeliza nuk përbëjnë mukozën e kavititetit nazal?

- A) Olfaktore
- B) Parietale
- C) Mbështetëse

D) Kaliciforme

72. Në lëkurën e hollë mungon shtresa:

- A) bazale
- B) e shndritshme
- C) kokrrizore
- D) e brirëzuar

73. Gjени pohimin e gabuar mbi uterusin:

- A) Përbëhet nga tre shtresa
- B) Eshtë vendi i implantimit të vezës së fekonduar
- C) Epiteli i tij përbëhet nga dy shtresa
- D) Shtresa muskulore është më e holla

74. Fibrocitet kanë tipar karakteristike:

- A) Praninë e zgjatimeve të shumta citoplazmatike
- B) Organelet citoplazmatike të zhvilluara
- C) Formën boshtore të bërthamës
- D) Bërthamën eukromatinike

75. Eritrocitet kanë tipar karakteristike:

- A) gjatësinë 60-80 milimetër
- B) ngjyrën blu të bërthamës
- C) diametrin 7-8 mikrometër
- D) formën bikonvekse

76. Bazofilia:

- A) Është mungesa e qelizave bazale
- B) Nuk ekziston sepse bazofilet përbëjnë më pak se 1% të leukociteve
- C) Është ulja e sasise së bazofileve
- D) Është rritje e numrit të bazofileve

77. Palca e kockave nuk ka funksion:

- A) Hematoklazik
- B) Lokomotor
- C) Retikulo-endotelial
- D) Hemopoetik

78. Fijet muskulare të skeletit në prerje tërthore janë:

- A) me formë poligonale
- B) me pamje të vijëzuar
- C) pa bërthamë
- D) me bërthamë në qendër të qelizës

79. Qelizat e mikroglisë në sistemin nervor qendror janë:

- A) me funksion përcjellës
- B) me origjinë nga indi muskolor
- C) me funksion fagocitar
- D) përbërëse të mielinës

80. Mukoza olfaktore në kavitetin nazal mbulon:

- A) gjithë sipërfaqen
- B) pjesën superiore
- C) pjesën më të madhe
- D) pjesën inferiore

81. Gjendrat sublinguale:

- A) prodhojnë sekrecion të përzier
- B) prodhojnë sekrecion vetëm seroz
- C) nuk kanë gjysmehënëza të xhianucit
- D) kanë qeliza centroacinare

82. Në përbërje të acinusit pankreatik marrin pjesë edhe:

- A) ishujt e Langerhansit
- B) qelizat Sertoli
- C) qelizat Centroacinare
- D) qelizat Beta

83. Në glomerula:

- A) Përqëndrohet urina
- B) Ka qeliza mezangiale
- C) Nuk ka podocite
- D) Sintetizohet eritropoetina dhe renina

84. Në terrenet qelizore nuk nevojiten:

- A) Kushtet aseptike
- B) Antinflatimtorët
- C) Bujonet organike
- D) Antibiotikët

85. Eutanazia pasive:

- A) Eshtë e pranueshme në stadin terminal të një sëmundje të pashërueshme
- B) Kërkon dhënien e një sërë medikamentesh që përshpejtojnë vdekjen
- C) Zgjat vuajtjen e pacientit
- D) Zbatimi i saj është në kundërshtim me konceptin e së drejtës për të vdekur

86. Ekzaminimi objektiv nga pikëpamja etike:

- A) merr për bazë edhe faktorët psikologjikë, shumë të rëndësishëm për pacientin
- B) është më i rëndësishëm se egzaminimi subjektiv
- C) mund të jetë i barasvlefshëm me egzaminimin subjektiv
- D) duhet të jetë gjithmonë i barasvlefshëm me egzaminimin subjektiv

87. Në gjendjen vegjetative ndërprerja e ushqyerjes nazogastrike është e pranueshme sipas:

- A) parimit të totalitetit
- B) konceptit të cilësisë së jetës
- C) konceptit të shenjtërimit të jetës
- D) parimit të konfidencialitetit

88. Kujdesi mjekësor paliativ:
- A) konsiston në zgjatjen e jetës së pacientit
 - B) vepron mbi shkakun e një sëmundjeje
 - C) përdoret në stadin terminal të një sëmundjeje të pashërueshme
 - D) përfshin vetëm terapinë psikologjike të pacientit
89. Eutanazia pasive:
- A) zgjat jetën e pacientit
 - B) kërkon përdorimin e terapisë intensive
 - C) zbatohet në sëmundje të pashërueshme, pavarësisht stadi të sëmundjes
 - D) refuzon teprimin terapeutik
90. Konsenti është shprehje e parimit:
- A) utilitarist
 - B) të pavarësisë dhe paprekshmërisë së personit
 - C) të totalitetit
 - D) konfidencialitetit
91. Cila nga simptomat e mëposhtme është shenja kryesore e jatrogjenive?
- A) Pagjumësia
 - B) Djersitja e shtuar
 - C) Dobësi e përgjithshme
 - D) Frika (fobia) nga vdekja ose nga ndonjë sëmundje e pashërueshme
92. Cila nga shprehjet e mëposhtme mbi Moralin është e gabuar?
- A) Ka të bëjë drejtpërdrejt me veprimet që pasqyrojnë sjelljet e njerëzve
 - B) Normat janë të dhëna
 - C) Ka një domethenie më të gjerë dhe me të thellë sesa Etika
 - D) Në themel të cdo veprimi moral qëndron fjala "duhet"
93. Mjekimi paliativ:
- A) përdoret te një sëmundje e pakurueshme pavarësisht stadi të sëmundjes
 - B) përfshin vetëm mjekimin me barna të pacientit
 - C) ruan dinjitetin dhe pavarësinë e pacientit
 - D) përdoret tek pacientët që vuajnë nga sëmundje kronike
94. Koncepti i cilësisë së jetës, në rrethanat kur jeta e pacientit mbahet në kushte artificiale:
- A) ve theksin tek ekzistenca biologjike e jetës , pavarësisht cilësisë së saj
 - B) mbështet konceptin e karakterit të shenjtë të jetës
 - C) thekson se jeta e njeriut nuk duhet të zgjatet
 - D) mbështet zgjatjen e jetës së pacientit
95. Plotësimi i detyrës së parandalimit të sëmundjeve ka çuar në konflikt me parimin e:
- A) universalitetit
 - B) mirëbërësisë
 - C) konfidencialitetit
 - D) barazisë
96. Parimi i pavarësisë së pacientit për të refuzuar mjekimin hyn në konflikt me parimin:
- A) utilitarist

- B) barazisë
- C) drejtësisë dhe paanshmërisë
- D) mirëbërësisë

97. Simptoma e hospitalitetit është karakteristike për ata pacientë, te cilët:

- A) nuk e durojnë dot varësinë nga të tjerët
- B) e kanë të vështirë të zbatojnë regjimin e këshilluar
- C) fillojnë të preokupohen për vetveten që të rifillojnë punën sa më parë
- D) e pelqejnë shumë regresionin dhe duan që ta zgjasin atë pambarim

98. Në cilin rast nuk duhet të respektohet sekretin mjekësor:

- A) Sëmundje të trashëguara
- B) Somnambulizmi
- C) Disa sëmundje të rënda infektive
- D) Enuresis nokturna

99. Cili nga pohimet mbi Fatkeqësinë mjekësore është i gabuar?

- A) Eshtë e lidhur me sëmundje të rënda të pacientit
- B) Vjen si pasojë e veçorive individuale të organizmit
- C) Vjen si pasojë e një gabimi apo pakujdesie të njeriut të shëndetësisë
- D) Eshtë pasojë e ndërlikimeve gjatë procedurave të ndryshme mjekësore

100. Jatrogjenitet mund të njihen ndryshe dhe si:

- A) gabime diagnostike
- B) fatkeqësi mjekësore
- C) sëmundje sugjestionuese në mjekësi
- D) gabime terapeutike

101. Lëvizja "Hospike" iu ofron ndihmë:

- A) të sëmurëve kronikë
- B) pacientëve me nivel të ulët ekonomik
- C) të sëmurëve të pashpresë për jetën
- D) të sëmurëve handikapatë

102. Tek pacientet e moshuar ka:

- A) shtim të perceptimit të dhimbjes
- B) ulje të pragut të dhimbjes
- C) dhimbje atipike
- D) rigjenerim të neuroneve në palcën shpinore

103. Testamenti i jetës:

- A) i paraprin përdorimit të eutanazisë aktive
- B) shkruhet nga pacienti në momentet e fundit të jetës së tij
- C) hyn në fuqi pas vdekjes së pacientit
- D) mbështetet në zbatimin e konsentit

104. Pranimi zyrtar i Eutanazisë aktive do të rritë mundësitë për:

- A) kërkime në fushën e mjekësisë paliative
- B) zbulimin e ndonjë medikamenti të ri për shpëtimin e pacientit
- C) abuzime të ndryshme me pacientët

D) përjashtimin e ndonjë diagnoze të gabuar në lidhje me pacientin

105. Gabimet mjekësore të shkaktuara nga vetë njerëzit e shëndetësisë quhen:

- A) gabime diagnostike
- B) jatrogjeni
- C) gabime tekniko- kuruese
- D) gabime taktiko- kuruese

106. Cila nga shprehjet e mëposhtme në lidhje me dashjen kriminale është e gabuar?

- A) Bën pjesë ne Shkeljet e Kodit Penal
- B) Quhet krim mjekësor
- C) Bën pjesë ne shkeljet e Kodit Deontologjik
- D) Kryhet me qëllim nga njeriu i shëndetësisë

107. Në dhimbjen akute pacienti:

- A) flet për dhimbjen vetëm po të pyetet
- B) është i përqendruar në dhimbje
- C) interesohet më tepër për probleme të tjera sesa për dhimbjen
- D) ka shprehje normale të fytyrës

108. Në dhimbjen kronike pacienti:

- A) shfaq grimasa në fytyrë
- B) flet shumicën e kohës për dhimbjen
- C) qan dhe rënkon gjithë kohën nga dhimbja
- D) ka shenja depresioni

109. Komisionet disiplinore:

- A) jane organe keshillimi prane drejtorive,
- B) merren me shqyrtimin e e shkeljeve te etikes nga ana e infermierit,
- C) marrin vendime per anetaresimin e infermiereve ne Urdhrin e Infermierit,
- D) asnjera nga alternativat e mesiperme.

110. Ligji i nje shteti vepron:

- A) ne te gjithe territorin e atij shteti,
- B) ne ate shtet dhe ne shtete afer tij,
- C) vetem ne siperfaqen tokesore te shtetit,
- D) vetem ne hapesiren ajrore.

111. Sigurimet shoqerore jane:

- A) pagese personale
- B) detyrim administrativ
- C) i paguajne vetem pensionistet
- D) asnje nga alternativat me siper

112. Tabletat janë:

- A) ekstrakte alkalike
- B) pluhura te komprimuara ne makineri te posaçme
- C) forma farmaceutike të buta që përdoren për lyerjen e lëkurës
- D) tretësira ujore që përdoren me anë të aparateve të posaçme

113. Rrugë natyrale e marrjes se barit është:

- A) Subkutane
- B) Intramuskulare
- C) Intravenoze
- D) Inhalatore

114. Gjate administrimit te barit me rrugë intravenoze:

- A) efekti i barit është i ngadaltë
- B) efekti i barit është i kontrollueshem
- C) nuk mund te japim sasi te madhe bari
- D) reaksionet anafilaktike jane me te lehta

115. Gjate administrimit te barit me rrugë intramuskulare vendi me I shpeshte I aplikimit të injeksionit ne femijet e vegjel eshte muskuli:

- A) deltoid
- B) ventrogluteal
- C) dorsogluteal
- D) vastus lateralis

116. Takifilaksia është:

- A) intolerance e lindur e organizmit ndaj nje bari te caktuar
- B) fenomeni I mbarimit te shpejte te efektit te nje bari ndonese administrimi I tij vazhdon
- C) forme e veçante e ambientimit
- D) ndjeshmeria e rritur e fituar e organizmit nga marrja e perseritur e barnave

117. Adrenomimetiket shkaktrojne:

- A) Mioze
- B) Ngushtim te bronkeve
- C) Rritje te levizshmerine se zorreve
- D) Nxitje te sistemit nervor qendror

118. Adrenomimetiket nuk duhen dhene ne te semuret:

- A) Astmatike
- B) Bradikardike
- C) Me arrest kardiak
- D) Hipertonike

119. Adrenalina nuk duhet kombinuar me:

- A) Betablokuesit
- B) Analgjeziket opioide
- C) Benzodiazepinat
- D) Barbiturate

120. Alfa-adrenoblokuesit perdoren per mjekimin e:

- A) Hipotensionit
- B) Takikardise
- C) Isufiencens kardiake
- D) Depresionit

121. Efekti anesor kryesor i alfa-adrenoblokuesve eshte:

- A) Hypotensioni I theksuar postural
- B) Retensioni urinar
- C) Diareja
- D) Dhimbje artikulare

122. Beta-blokuesit perdoren per mjekimin e:

- A) Podagres
- B) Diabetit
- C) Takiaritmive
- D) Bronkitit kronik

123. Beta-blokuesit kunderindikohen ne:

- A) Insuficiencen kardiake
- B) Hypertension
- C) Takikardi
- D) Ne semundjen migrenoze

124. Kolinomimetiket shkaktojnë:

- A) Midriaze
- B) Ulin djersitjen
- C) Bradikardi
- D) Bronkodilatacion

125. Kolinomimetiket perdoren per mjekimin e:

- A) Glaukomes
- B) Astmes bronkiale
- C) Bradikardive
- D) Diareve acute

126. Kolinomimetiket kunderindikohen ne:

- A) Bradikardi
- B) Retensionin urinar
- C) Hipertireoze
- D) Artritin rheumatoid

127. M-kolinoblokuesit shkaktojne:

- A) Mioze
- B) Shtim te sekrecioneve bronkiale
- C) Bronkodilatacion
- D) Bradikardi

128. M-kolinoblokuesit perdoren per mjekimin e:

- A) Kolikes renale
- B) Glaukomes
- C) Hipertrofise se prostates
- D) Hipertermise

129. M-kolinoblokuesit kunderindikohen ne:

- A) Ulceren peptike

- B) Parkinson
- C) Bradikardi
- D) Atonite intenstinale

130. Efekti anesor kryesor qe vihet re gjate perdorimit te miorelaksanteve është:

- A) Apnea
- B) Hipertensioni
- C) Hipernatremia
- D) Hipotermia

131. Morfina shkakton:

- A) Midriaze
- B) Frenim te qendres se frymemarrjes
- C) Shton oreksin
- D) Diare

132. Aspirina perdoret per mjekimin e:

- A) Ethes reumatizmale
- B) Per uljen e temperatures ne moshat pediatrike
- C) Insuficiences renale
- D) Parkinsonit

133. Aspirina kunderindikohet ne:

- A) Hipertension
- B) Uljen e temperatures
- C) Dhimbjet e kokes
- D) Ulceren gastro-duodenale

134. Bari i zgjedhur per mjekimin e atakut gutoz është:

- A) Allopurinoli
- B) Probenicidi
- C) Sulfipirazoni
- D) Kolkicina

135. Cili nga keto barna anestezik jep rritje te tensionit arterial?

- A) Tiopentali
- B) Midazolami
- C) Ketamina
- D) Fentanyli

136. Benzodiazepinat shfaqin efekt:

- A) Eksitues
- B) Hipertensiv
- C) Myorelaksant
- D) Anksioz

137. Barbiturate kunderindikohen ne:

- A) Epilepsi
- B) Porfiri
- C) Hypertension

D) Takikardi

138. Bari i zgjedhur per mjekimin e statusit epileptic është:

- A) Acidi Valproik
- B) Karbamazepina
- C) Diazepami
- D) Trimetadioni

139. Antipsikotiket kunderindikohen ne:

- A) Parkinson
- B) Alzheimer
- C) Skizofreni
- D) Ne pacientet me te vjella

140. Kriperat e litiumit perdoren per mjekimin e:

- A) Epilepsise
- B) Parkinsonit
- C) Gjendjes maniakale
- D) Miastenise grave

141. Kofeina perdoret per mjekimin e:

- A) Insuficiences acute cirkulatore
- B) Hipertensionit
- C) Takikardise
- D) Hipertireoze

142. Glukozidet kardiake perdoren per mjekimin e:

- A) Hipertensionit
- B) Insuficiences kardiake
- C) Fibrilacionit ventricular
- D) Perikarditit adeziv

143. Glukozidet kardiake kunderindikohen ne:

- A) Flaterin atrial
- B) Fibrilacionin atrial
- C) Infarktin e miokardit
- D) Takikardine paroksizmale supraventrikulare

144. Bari qe preferohet ne aritmitet e shkaktuara nga helmimi me digitalike është:

- A) Verapamili
- B) Amidaroni
- C) Difenidani
- D) Lidokaina

145. Cili nga barnat kalçiblokues mund te perdoret edhe si antiaritmik?

- A) Nifedipina
- B) Verapamili
- C) Amlodipina
- D) Nikardipina

146. Diuretiket tiazidike kunderindikohen ne:

- A) Hipertoni
- B) Insuficiencen renale
- C) Edemen kardiake
- D) Edemen hepatike

147. Kufizimi i proteinave rekomandohet ne:

- A) shtatzeni
- B) semundjet e veshkave
- C) diabet mellitus
- D) semundjet e tiroides

148. Kufizimi i yndyrnave rekomandohet ne:

- A) steatozen hepatike
- B) diabetin mellitus
- C) cirrozen hepatike
- D) nenpeshe

149. Proteinat duhet te zene ne kalorazhin ditor:

- A) 30%
- B) 50%
- C) 20%
- D) 40%

150. Konstitucioni android karakterizohet nga:

- A) A.perimetri abdominal = perimetri gluteal
- B) perimetri abdominal > perimetri gluteal
- C) perimetri torakal > perimetri gluteal
- D) perimetri gluteal > perimetri abdominal

151. Obeziteti eshte pjese e:

- A) Sindromit metabolik
- B) Sindromit nefrotik
- C) Sindromit koronar akut
- D) Sindromit radikular

152. Veza permban me teper:

- A) Yndyrna
- B) Fibra
- C) Proteina
- D) Karbohidrate

153. Kalorazhi ditor per nje peshe ideale tek meshkujt varion:

- A) 2000-2500 kal/dite
- B) 1500-2000 kal/dite
- C) 2500-3000 kal/dite
- D) 2000-3000 kal/dite

154. Lipidet duhet te zene ne kalorazhin ditor:

- A) 70%

- B) 20%
- C) 30%
- D) 10%

155. Magneziumi gjendet me shumice tek:

- A) peshku
- B) bulmeti
- C) dritherat
- D) perimet

156. BMI = 23 shpreh:

- A) mbipeshe
- B) obezitet
- C) peshe ideale
- D) nenpeshe

157. Jodi gjendet me pak tek:

- A) portokalli
- B) veza
- C) geshtenja
- D) lakra

158. Obeziteti morbid i korrespondon:

- A) BMI = 30
- B) BMI = 25
- C) BMI > 40
- D) BMI > 35

159. Konstipacioni tregon deficit ne:

- A) proteina
- B) yndyrna
- C) vitamina
- D) fibra

160. Obeziteti eshte i shpeshte ne:

- A) diabetin mellitus tip 2
- B) bulimi
- C) HTA
- D) depression

161. Pacientet me kalkuloze renale duhet te kufizojne me teper:

- A) lengjet
- B) proteinat
- C) bulmetin
- D) frutat

162. Grate shtatzana nenpeshe duhet te respektojne kalorazhin ditor:

- A) te njejte me shtatzanat me peshe normale
- B) dyfishin e kalorazhit normal
- C) ne varesi te BMI

D) ne varesi te gjatesise trupore

163. Acidi folik eshte i domosdoshem ne:

- A) menopauze
- B) pubertet
- C) shtatzani
- D) periudhen pas lindjes

164. Karbohidratet duhet te zene ne kalorazhin ditor:

- A) 50%
- B) 30%
- C) 20%
- D) 10%

165. Vegjetarianet preken me shpesh nga:

- A) semundjet kardio-vaskulare
- B) anemia
- C) obeziteti
- D) diabeti mellitus

166. Kalorazhi ditor per nje peshe ideale tek femrat varion:

- A) 2000-2500 kal/dite
- B) 1500-2000 kal/dite
- C) 2500-3000 kal/dite
- D) 2000-3000 kal/dite

167. Cili frut u rekomandohet me teper personave me mbipeshe:

- A) molla jeshile
- B) manaferrat
- C) banane
- D) kivi

168. Konstitucioni genoid karakterizohet nga:

- A) perimetri abdominal<perimetri gluteal
- B) perimetri abdominal=perimetri gluteal
- C) perimetri torakal>perimetri gluteal
- D) perimetri gluteal<perimetri abdominal

169. Nje person me BMI 35 duhet t`i nenshtrohet nje diete:

- A) hypokalorike me 2400 kalori
- B) hypokalorike me 1400 kalori
- C) hypokalorike me 1000 kalori
- D) hypokalorike me 3000 kalori

170. Personat me hypertension arterial duhet te kufizojne:

- A) proteinat
- B) perimet
- C) mishin
- D) kripten ne ushqim

171. Ngrenia e tepert e karbohidrateve mund te shkaktoje:

- A) diabet te sheqerit
- B) mbipeshe
- C) te vjella
- D) diarre

172. Kalorazh me te madh per njesi grami kane:

- A) yndyrnat
- B) kriperat minerale
- C) karbohidratet
- D) proteinat

173. Yndyrnat bimore jane te pasura me:

- A) acide yndyrore te pangopura
- B) kolesterol
- C) trigliceride
- D) acide yndyrore te ngopura

174. BMI = 17 shpreh:

- A) mbipeshe
- B) obezitet
- C) peshe ideale
- D) nenpeshe

175. Cili frut u rekomandohet me teper diabetikeve?

- A) rrushi
- B) molla
- C) fiku
- D) portokalli

176. Kalorazhi ditor i grave shtatzana eshte:

- A) i njejte me grate normale
- B) me i vogel se grate normale
- C) me i madh se grate normale
- D) varet nga BMI e gruas ne fillim te shtatzanise

177. Rritja e yndyrnave ne gjak shkaktohet nga konsumimi me teper i:

- A) mishit te vicit
- B) mishit te pules
- C) mishit te qingjit
- D) peshkut te liqenit

178. Konsumimi i tepert i bulmetit mund te shkaktoje:

- A) osteoporozë
- B) rakitizem
- C) gure ne rruget urinare
- D) obezitet

179. Marrja e proteinave zakonisht rekomandohet ne:

- A) semundjet e gjakut

- B) pubertet
- C) semundjet e kockave
- D) semundjet e mushkerive

180. Konsumimi i peshkut kufizohet gjate:

- A) shtatzanise
- B) pubertetit
- C) menopauzes
- D) laktacionit

181. Vitamina E rekomandohet ne:

- A) dhimbjet e kokes
- B) renien e flokeve
- C) anemi
- D) osteoporozet

182. Regjimi ushqimor per nje peshe ideale duhet te permbaje:

- A) 3 vakte/dite
- B) 4 vakte/dite
- C) 5-6 vakte te vogla/dite
- D) 3 vakte te medha dhe 3 vakte te vogla/dite

183. Karbohidratet e keqia permbahen me me shumice tek:

- A) buka
- B) perimet
- C) dritherat
- D) frutat

184. Studimi deskriptive:

- A) Ben vetem pershkrimin e gjerave,
- B) Nuk perdoret per studimin e ekspozimeve,
- C) Nuk perdoret per studimin e efekteve,
- D) Perdoret vetem per ekspozimet,

185. Studimet ekologjike:

- A) Njesia e analizet eshte individi,
- B) Jane te dobishme per gjenerimin e hipotezave,
- C) Vleresohen te plota per percaktimin e shkakesise,
- D) Jane te kushtueshme,

186. Kontrolli i ekspozimit ndaj Faktoreve Demtues ne nivel personi:

- A) Duhet menduar si zgjidhja kryesore,
- B) Lidhet me numrin e personave te ekspozuar,
- C) Nuk ka te beje me rregullimin e kohes se ekspozimit,
- D) Nuk ka te beje me nderrimin e detyrave,

187. Indikatorret per monitorimin e riskut:

- A) Nuk ka vlere besueshmeria,
- B) Nuk eshte e rendesishme lehtesia e matjes,
- C) Nuk duhet te jene te lidhur ngushte me risqet,

D) Duhet te shfaqen shpejt pas ekspozimit

188. Kalimi i lendeve toksike ne gjak:

- A) Nuk lidhet me perqendrimin,
- B) Varet nga kohezgjatja e ekspozimit,
- C) Nuk lidhet me tretshmerine e l. toksike ne inde,
- D) Nuk varet nga sasia e ajerit te thither,

189. SO₂ si lende ndotese ne ajer:

- A) Efekti kryesor-demtimi i trurit,
- B) Nuk ka lidhje me rreshjet acid,
- C) Ndotesi kryesor me permbajtje sqfuri,
- D) Eshte bere problem vetem dekadat e fundit,

190. Fluoruret:

- A) Futen ne organizem kryesisht me ane te ushqimeve,
- B) Merren ma ane te ujit te pishem,
- C) Mungesa e tyre ne uje ul incidencene kariesit,
- D) Flurore me pakice-shfaqeje e flurozes,

191. Pamjaftueshmeria e hekurit:

- A) Risku i anemise nuk eshte madh per grate,
- B) Nuk ndikohet nga parazitozat,
- C) Ndikohet nga dieta,
- D) Haset me shume ne vendet e zhvilluara

192. Efektet shendetesore te pesticideve:

- A) Nuk prekin sistemin imun te organizmit,
- B) Nuk prekin organet e riprodhimit,
- C) Nuk demtojne lekuren,
- D) Kane efekte teratogjenike,

193. Strehimi dhe shendeti:

- A) Strehimi nuk ndikon mbi incidencat semundjeve ngjitese,
- B) Risku per Ca pulm nuk lidhet me strehimin,
- C) Shendeti psikosocial ndikohet nga dendesia e banimit,
- D) Strehimi nuk ka te beje me aksidentet,

194. Efektet ekstraauditive te zhurmave:

- A) Nuk lidhen me presionin arterial,
- B) Nuk ka crregullime te gjumit,
- C) Ndikon mbi sistemin imun,
- D) Rritja e irritabilitetit SNQ,

195. Programi i nje qyteti te shendetshem:

- A) Zgjedhjet jane multisektoriale,
- B) Rritje e pjesemarrjes ne vendimmarrje,
- C) Roli i publikut i paperfillshem,
- D) Nje akt dhe jo process ne vazhdimesi,

196. Lendet djegese te biomases:

- A) Nuk permbajne pjeseza te respirueshme,
- B) Permbajne (SO)_x,
- C) Problem ne vendet e varfera,
- D) Nuk permbajne HPA,

197. Shendeti mjedisor:

- A) Nuk lidhet me kualitetin e jetes,
- B) Nuk ndikohet nga faktoret sociale,
- C) Ka lidhje me agjentet biologjike,
- D) Jo lidhje me shendetin e gjeneratave pasardhese,

198. Ekspozimi:

- A) Nuk merr ne konsiderate llojin e ndotesit,
- B) Ndikohet nga elementi kohe,
- C) Nuk ka lidhje me sasine e ndotesit,
- D) Nuk merr parasysh futjen e ndotesit,

199. Tranzicioni demografik:

- A) Lidhet me numrin e vdekjeve,
- B) Nuk ndikohet nga numri i lindjeve,
- C) Ndikon mbi numrin e popullates,
- D) Nuk ka lidhje me shendetin,

200. Problemet e shendetit mjedisor:

- A) Lidhen me migrimin, lindjet, etj,
- B) Nuk ndikohen nga varferia,
- C) Nuk lidhen me konsumin,
- D) Nuk ndikohen nga politikat makroekonomike,

201. Vleresimi i ekspozimit human:

- A) Doza matet me lehtesi,
- B) Me mire matja e perqendrimit,
- C) Doza e marre nuk varet nga vecorite e individit,
- D) Doza eshte ne funksion te kohes se ekspozimit,

202. Varferia:

- A) Nuk ka lidhje me jetegjatesine
- B) Nuk lidhet me vdekshmerine foshnjore
- C) Nuk ndikon mbi incidencen e semundjeve ngjitese
- D) Ndikon mbi incidencen e paaftesise

203. Fusha elektromanjetike:

- A) Eshte nje rezatim i llojit jonizues
- B) Nuk haste rreth linjave elektrike
- C) Shkakton kataraktin e syrit
- D) Mund te shkaktoje kancerin

204. Zhiva (Merkuri):

- A) Nxirret ne mjedis nga automjetet

- B) Perdoret si antiseptic/antifungal
- C) Nuk haset ne prodhimin e pasqyrave
- D) Nuk haset ne punimet e veshjes me ar

205. Indikatoret e shendetit mjedisor:

- A) ESH e perdourr duhet te shfaqet pas nje kohe te gjate
- B) Te jene te lidhur me risqet & ekspozimin
- C) Nuk ka rendesi lehtesia e matjes
- D) Nuk ka vlere besueshmeria

206. Perfitim i drejtperdrejte nga manaxhimi i nje ESHM:

- A) Nuk lidhen me jetet e fituara
- B) Nuk kane te bejne me vitet e fituara te jetes
- C) Nuk lidhen me vdekshmerine
- D) Lidhen me kursimet ne sistemin shendetesor

207. Akumulimi i lendeve ndotese ne ajer:

- A) Nuk lidhet me relievin e tokes
- B) Nuk lidhet me levizjet e ajrit
- C) Lidhet me rezatimin diellor
- D) Nuk lidhet me inversionet temperaturore

208. Semundjet qe perhapen me ane te ajrit:

- A) Malarja
- B) Ethet Dengue
- C) Schistosomiaza
- D) Tifoja

209. Efektet toksike te pesticideve:

- A) Nuk lidhet me substancat mbajttese
- B) Lidhen me rrugen e ekspozimit
- C) Nuk lidhen perberes qe permiresojne absorbimin
- D) Nuk lidhet me dozen

210. Vendbanimet humane si ekosisteme:

- A) Nuk lidhen me furnizimin me uje
- B) Nuk ndikohen nga ujerat e hapura
- C) Nuk lidhen me kushtet per jeten e eger
- D) Lidhen me qeverisjen lokale

211. Tranzicioni demografik:

- A) Nr. i vdekjeve eshte i ulet
- B) Nr. i lindjeve eshte i ulet
- C) Perben nje periudhe
- D) Perben nje moment

212. Rreziqet fizike jane ato:

- A) nga mjetet motorrike
- B) nga sportet
- C) nga rezatimet

D) demtimet ne vendin e punes

213. Studimet e toksicitetit akut:

- A) Perdoren per matjen toksicikt te lendeve
- B) Jane mjaftueshem per karakterizuara nga toksicitet, kimikat
- C) Perdoren per kancerogenet
- D) Nuk perfshijne DL50 dhe PL 50

214. Treguesi i viteve potenciale te humbura te jetes:

- A) Tenton te gjykoje humbjen e jetes humane
- B) Nuk lidhet me nr e viteve produktive te jetes qe humbasin
- C) Perdoret per te pershkruar humbjen e kontributeve
- D) Demtimet shpjegojne nje vogel te VPHJ

215. Indikatoret ne shendetin mjedisor:

- A) Jane te domosdoshem ne monitorimin e riskut
- B) Nuk lidhen me jetegjatesine e pritshme
- C) Nuk perfshijne peshen ne lindje
- D) Nuk perfshijne vdekjet e parakohshme

216. Zgjedhja e ushqimeve:

- A) Nuk lidhet me ndikimet kulturore
- B) Nuk varet nga mundesia e sigurimit te ushqimeve
- C) Nuk varet nga shija,era, paraqitja
- D) Varet nga kostoja dhe pershtatshmeria

217. Encefalopatia spongiforme:

- A) Shkaktohet nga nje bakter
- B) Shkaktohet nga nje ameba
- C) Ka si vektor kepushat
- D) Perhapet me ushqimin e gjedhit

2. Pjesa e Përgjithshme Klinike

1. Nuk është e vertete ne obezitet:

- A) Haset shpesh;
- B) Gjendet me shume ne meshkujt;
- C) Faktore predispozues mund te jete rritja e estrogjineve ne gjak;
- D) Lidhet me nenushqyerjen;

2. Perben urgjence kirurgjikale:

- A) Kalkuloza e kolecistes;
- B) Akalazia e ezofagut;
- C) Hernia strangulative;
- D) Noduli i ftohte i tiroides;

3. Kanceri i gjirit prek me shpesh kuadratin:

- A) medial te siperm;

- B) medial te poshtem;
- C) lateral te poshtem;
- D) lateral te siperm;

4. Ileusi akut i zorres se holle nuk ka origjine nga:

- A) Herniet interne
- B) Briljet
- C) Tumoret rektale beninje
- D) Ileusi biliar

5. Nuk është okluzion nga shtrengimi ai i shkaktuar nga:

- A) Brilja
- B) Volvusi
- C) Invaginacioni
- D) Ileusi biliar

6. Kolecistiti akut kalkuloz nuk është urgjence absolute kirurgjikale:

- A) Ne perionitin biliar,
- B) Piokolecistit;
- C) Kolecistopankreatit,
- D) Gangrene te kolecistes

7. Kolecistiti akut nuk konsiderohet rast i "keq" kirurgjikal ne:

- A) Pacientet geriartrik
- B) Insuficience renale,
- C) Ne obezitet,
- D) Ne lehoni,

8. Hemorragjia nga barra ekstrauterine është:

- A) Hemorragji digjестive e larte,
- B) Hemorragji digjестive e poshtme,
- C) Hemorragji retroperitoneale
- D) Hemoperitoneum

9. Salla operatore është vendi ku:

- A) Trajtohen kirurgjikalisht te semuret;
- B) Ku shtrohen per trajtim pacientet;
- C) Ku shtrohen per trajtim pacientet kirurgjikal;
- D) Ku trajtohen intensivisht te semuret kirurgjikal;

10. Nuk është karakterisitke ne ileusin mekanik:

- A) Stop i feceve dhe gazrave;
- B) Nauze e te vjella;
- C) Dhimbja abdominale;
- D) Mungesa e hidroniveleve ne ro-grafi;

11. Agjenti me i vlefshem i perdorur si sterilizues te autoklavi është:

- A) Ajri uxor nenpresion;
- B) Forma e autoklavit;
- C) Koha;

D) Nxehtesia;

12. Nuk është karakteristike e fazes akute te infeksionit:

- A) Dhimbja;
- B) Temperatura;
- C) Leukopenia;
- D) Hiperemia;

13. Është inflamacion i gjendrave limfatike:

- A) Adeniti;
- B) Celuliti;
- C) Furunkuli;
- D) Limfangoidi;

14. Nuk është parameter kryesor ne vleresimin e gjendjes se te ushqyerit:

- A) Klinik;
- B) Immunologjik;
- C) Dietetik;
- D) Bioumoral;

15. Nuk është e vertete per ushqimin parenteral:

- A) Është ushqim artificial i pacientit kirurgjikal;
- B) Merret me rruge venoze;
- C) Merret me rruge arteriale;
- D) Merret kur ushqimi oral ose enteral jane te pamundura;

16. Portagia është instrument kirurgjikal qe perdoret per:

- A) Te suturuar;
- B) Per te diveriguar;
- C) Per te mbajtur agen
- D) Per te mbajtur lamen;

17. Nuk është urgjence kirurgjikale:

- A) Hemorragjia digjестive;
- B) Ulcer bulbi duodeni e perforuar;
- C) Kalkuloza eolecistes;
- D) Apendiciti akut;

18. Fibrogastroskopia mund te jete mjet trajtimi per:

- A) Hemorragjine digjестive;
- B) Perforacionin e ulcers duodenale;
- C) Stenozen pylorike;
- D) Peritonitin post ulcers se perforuar;

19. Nuk ndodh ne hemorragjine gastro intestinale:

- A) Melene;
- B) Hemoptizi;
- C) Hematemeza;
- D) Anemia;

20. Nuk është komplikacion i nderhryjeve venoze qendrore:
A) Pneumotoraksi;
B) Nenushqyerjai;
C) Limforrea;
D) Embolia;
21. Është inflamacion i gjendrave te djerses:
A) Adeniti;
B) Celuliti;
C) Hidroadeniti;
D) Furunkuli;
22. Nuk është parameter kryesor ne vleresimin e gjendjes se te ushqyerit:
A) Klinik;
B) Imunologjik;
C) Dietetik;
D) Bioumoral;
23. Është urgjenca me e shpeshtë kirurgjikale:
A) Hemorragjia digjестive;
B) Ulcer bulbi duodeni e perforuar;
C) Apendiciti akut;
D) Kalkuloza eolecistes;
24. Neuronet e kanë origjinën në:
A) Epitelin e tubit neural
B) Kavitetin e tubit neural
C) Ektoderme
D) Endodermë
25. Rrjeta dendritike e një neuroni është:
A) Pjesa dalëse e informacioneve;
B) Pjesa receptive e neuronit;
C) Pjesa ku kryhen proceset metabolike të nevojshme për mbijetesën e neuronit;
D) Pjesa e përpunimit të informacionit të ardhur në neuron.
26. Neuronet më të mëdha të SNQ janë:
A) Neuronet e korteksit cerebellar;
B) Neuronet e mesencefalorit;
C) Neuronet e medullës oblongata;
D) Neuronet motore të zonës primare motore.
27. Degjenerimi i korteksit apo sistemeve të tjera neuronale, nënkupton:
A) Atrofi graduale neuronale që çon në humbje neuronale;
B) Humbje të qelizave gliale;
C) Humbje dhe pakësim të zgjatimeve aksonale;
D) Humbje të mbështjellës mielinike.
28. Edema cerebrale vazogjenike shkaktohet nga:
A) Dalja e gjakut nga vazat cerebrale në hapësirat përreth tyre;

- B) Humbja e lëngut në hapësirën intersticiale për shkak të prishjes së integritetit të barrierës endoteliale;
- C) Dalja e gjakut në hapësirat qarkulluese të likuorit cerebrospinal;
- D) Dalja e gjakut në hapësirën subaraknoidale.

29. Encefalopatia bilirubinike është:

- A) Encefalopati metabolike e fituar e periudhës neonatale;
- B) Encefalopati metabolike e të rriturit;
- C) Encefalopati hypoksike-iskemike;
- D) Encefalopati metabolike e trashëguar.

30. Severiteti i semundjeve të depozitimit lizozomal varet nga:

- A) Mosha e shfaqjes;
- B) Mënyra e trashëgimisë;
- C) Sëmundjet shoqëruese;
- D) Aktiviteti residual I enzimës lizozomale.

31. Shenjat klinike të Leukodistrofisë metakromatike shfaqen në fëmijët:

- A) E porsalindur;
- B) 0 - 1 vjec;
- C) 1 - 2 vjec;
- D) > 2 vjec.

32. Infeksionet perinatale dhe kongenitale të SNQ kanë shkaktarët më të shpeshtë:

- A) Infeksionet bakteriale;
- B) Infeksionet mykotike
- C) Infeksionet virale, parazitare dhe spiroketale;
- D) Infeksionet tuberkulare.

33. Shënjat dhe simptomat e tumoreve cerebrale përcaktohen nga:

- A) Mosha e pacientit.
- B) Lloji I qelizave përbërëse të masës tumorale;
- C) Faktorët sistemikë të individit;
- D) Lokalizimi I rritjes së tumorit dhe efekti sekondar e edemës vazogjenike.

34. Anencefalia është:

- A) Mungesë e septum pellucidum;
- B) Mungesë e korpusit callos;
- C) Mungesë e cerebellumit;
- D) Mungesë e plotë e hemisferave cerebrale apo reduktim i shprehur i përmasave të tyre.

35. Hemisferat cerebrale janë:

- A) Identike me njëra-tjetrën;
- B) Thuajse identike me njëra-tjetrën
- C) Plotësisht të ndryshme nga njëra-tjetra
- D) Të pakrahasueshme

36. Hemisferat dallojnë nga njëra-tjetra nga:

- A) Përmasat e lobit frontal;

- B) Përmasat e lobit temporal;
- C) Lokalizimi i zonës së të folurës;
- D) Përmasat e lobit oksipital

37. Ndarja e hemisferave për arsye didaktike bëhet në:

- A) 2 lobe;
- B) 3 lobe;
- C) 4 lobe;
- D) 5 lobe.

38. Korteksi cerebral përbëhet nga:

- A) Kryesisht trupa qelizash nervore;
- B) Kryesisht zgjatimet e qelizave nervore;
- C) Kryesisht qeliza mbështetëse (jo neurone);
- D) Trupa qelizore dhe zgjatime të qelizave nervore në sasi thuajse të barabarta.

39. Vlerësimi i funksioneve të larta konjitive është i rëndësishëm, për:

- A) Kontributin semiologjik në lokalizimin e një lezioni;
- B) Vlerësimin e koeficientit të inteligjencës;
- C) Vlerësimin e funksionit cerebellar të pacientit
- D) Vlerësimin e aftësive motorike të pacientit.

40. Cila nga shenjat e mëposhtme ka të bëjë me çrregullim të vëmendjes?

- A) Afazia;
- B) Apraksia;
- C) Aleksia;
- D) Shpërqëndrimi

41. Afazia, është çrregullim:

- A) i vëmendjes,
- B) i të folurit,
- C) i nuhatjes
- D) i shikimit;

42. Çrregullimet e leximit quhen:

- A) Disleksi;
- B) Afazi;
- C) Anosmi;
- D) Agnozi

43. Apraksia është paaftësi për të:

- A) kryer lëvizje të vullnetshme në mungesë të defiçiteve motore;
- B) folur;
- C) nuhatur;
- D) shkruar.

44. Çrregullimet e memories quhen:

- A) Afazi;
- B) Agrafi;
- C) Amnezi;

D) Disfagi

45. Nervi cranial tek i cili mund të ndodhë dëmtim central apo periferik është:

- A) Nervi II;
- B) Nervi V;
- C) Nervi IX
- D) Nervi VII

46. Anosmia është shenjë e dëmtimit të:

- A) Nervave olfaktorë;
- B) Nervave facial;
- C) Nervave glosofaringealë;
- D) Nervave trigeminalë

47. Ptoza palpebrale haset në dëmtimet e:

- A) Nervit olfaktor;
- B) Nervit okulomotor;
- C) Nervit trigeminal;
- D) Nervit hypogloss.

48. Shenja e "Bell", haset në:

- A) Neuraljinë trigeminale
- B) Paralizën faciale centrale
- C) Paralizën faciale periferike;
- D) Neuraljinë glosso-faringeale.

49. Në dëmtimet e nervit glosso-faringeal kemi humbjen e shijes në:

- A) 1/3 e përparme të gjuhës;
- B) 1/3 e mesme të gjuhës;
- C) 1/3 e pasme të gjuhës;
- D) Gjithë gjuhën.

50. Nervi hypogloss është:

- A) Nerv sensitiv;
- B) Nerv motor;
- C) Nerv miks (sensitivo-motor);
- D) Nerv me funksion parasimpatik.

51. Shenja "Babinski", haset në:

- A) Dëmtime të rrugëve ekstrapiramidale;
- B) Dëmtime të nervave kraniale;
- C) Dëmtime cerebellare
- D) Dëmtime të rrugëve piramidale

52. Tremori cerebellar është tremor:

- A) Intencional, vecanërisht në fund të lëvizjes;
- B) Tremor qetësie;
- C) Me përqëndrim distal;
- D) Shoqëruar me crrëgullime të të folurit.

53. Hypotonia muskulare është:

- A) Pakësim i rezistencës ndaj lëvizjes passive të anësive;
- B) Shtim i rezistencës ndaj lëvizjes passive të anësive
- C) Rezistencë e pandryshuar ndaj lëvizjes passive të anësive
- D) Mungesë e rezistencës ndaj lëvizjes passive të anësive.

54. Skleroza multiple është patologji:

- A) Dismielinizante hereditare;
- B) Dismielinizante e fituar;
- C) Demielinizante;
- D) Metabolike.

55. M. Alzheimer është sëmundje:

- A) Demielinizante;
- B) Degjenerative progressive;
- C) Traumatike;
- D) Metabolike.

56. Në morbus Alzheimer, ndodh:

- A) Humbje progressive neuronale në korteksin e lobeve parietale e temporal;
- B) Humbje progressive neuronale në korteksin e lobeve oksipitale e frontale;
- C) Humbje progressive neuronale në korteksin e lobeve frontale e parietale;
- D) Humbje progressive neuronale në korteksin e lobeve oksipitale e parietale.

57. Termi adenopati i referohet:

- A) Ënjtjes (zmadhimit) të nyjave limfatike
- B) Ënjtjes së zorrëve të mëdha
- C) Ënjtjes së fshikëzës së tëmthit
- D) Ënjtjes së stomakut

58. Defekimi me feçe të gjakosura njihet si:

- A) Gingivitis
- B) Fissurë anale
- C) Hematokezia
- D) Hemorroide

59. Vjellja e gjakut është i njohur si:

- A) Hemorroide
- B) Hemostasis
- C) Hematemesis
- D) Melena

60. Inflamacioni i mëlcisë njihet si:

- A) Cirrozë
- B) Hepatit
- C) Bulimi
- D) Fistul

61. Ndjesia e djegies retrosternale njihet si:

- A) Cardiosis

- B) Pyrosis
- C) Mostretje
- D) Meteorizëm

62. Të vjellat e shtuara njihen si:

- A) Hyperpepsia
- B) Hyperemesis
- C) Hyperamnesia
- D) Hyperfagia

63. Defekimi me feçe në ngjyrë të zezë quhet:

- A) Diarre
- B) Karcinozë
- C) Konstipacion
- D) Melena

64. Inspektimi instrumental i pjesës fundore të zorrës së trashë është i njohur si:

- A) Colostomi
- B) Trakeostomi
- C) Sigmoidoskopi
- D) Tonsilektomi

65. Cila nga të mëposhtmet nuk është patologji e pankreasit?

- A) Pancreatiti akut
- B) Kolecititi akut
- C) Fibroza cistike
- D) Kanceri pankreatik

66. Disfagia është:

- A) Vështirësi në gëlltitje
- B) Vështirësi në tretje
- C) Pamundësi për të përtypur
- D) Vështirësi në defekim

67. Stenoza e lindur e pilorit:

- A) Zakonisht paraqitet që në ditët e para të jetës
- B) Ndodh më shpesh në meshkuj se femra
- C) Paraqitet me të vjella me gjak
- D) Trajtohet me FPP

68. Cirroza është:

- A) Sëmundje kronike degjenerative e mëlçisë
- B) Tumor i gojës
- C) Tumor i stomakut
- D) Prania e gurëve në fshikëzën e tëmthit

69. Një pacient diagnostikuar me hbs Ag (+), propabikish ka:

- A) Një Hepatit B
- B) Koledokolitiazë
- C) Cirrozë biliare primare

D) Kolangit sklerotizant primar

70. Cili ekzaminim gjaku do të ishte më i dobishem për të konfirmuar diagnozën e Cirrhozës biliare primare?

- A) Antitrupa Antigliadinë
- B) Antitrupa Antimitokondrial (AMA)
- C) Antitrupa Antinuclear
- D) Niveli i amilazes ne gjak

71. Për cilin nga viruset e hepatitit ekziston vaksina?

- A) Për virusin A
- B) Për virusin B
- C) Për virusin C
- D) Për virusin D

72. Per ulceren peptike jane te verteta pohimet e meposhtme pervec:

- A) Etiopatogjeneza e se ciles ka lidhje me prishjen e ekuilibrit ndermjet faktoreve agresive dhe atyre mbrojtjes te mukozes
- B) Ne etiopatogjeneze ka rol helicobacter pilori
- C) Prek vetem doudenin
- D) Preparatet AIJS kane rol te rendesishem ne shkaktimin e ulcers

73. Lupusi Eritematoz Sistemik është te gjitha pervec:

- A) Semundje me etiologji te njohur
- B) Karakterizohet nga depozitimi i antikorpeve dhe komplekseve imune ne indet dhe qelizat e demtuara prej tyre
- C) Patogjeneza lidhet me faktore gjenetike, ambientale, hormone seksuale
- D) Kemi hiperaktivitet te Lim T dhe B

74. Lupusi Eritematoz Sistemik prek:

- A) Me teper femrat me moshen e riprodhimit
- B) Prek me teper meshkujt
- C) Prek me teper grate ne menopauze
- D) Prek me teper meshkujt ne pubertet

75. Lupusi Eritematoz Sistemik prek me teper:

- A) Femrat e bardha
- B) Femrat me ngjyre
- C) Meshkujt e bardhe
- D) Meshkujt me ngjyre

76. Per Lupusin Eritematoz Sistemik jane te gjitha te verteta pervec:

- A) Semundja mund te preki cdo organ apo sistem
- B) Fillon me shenja te pergjithshme : dobesi, temperature subfebrile, lodhje
- C) Semundja ka shfaqje ne lekure
- D) Nuk shoqerohet me alterime hematologjike

77. Antikorpet antinuklear:

- A) Perbejne nje shenje laboratorike kryesore ndonese jo specifike per LES

- B) Nuk jane positive ne patologji te tjera
- C) Shkohen ne mikroskop te zakonshem
- D) Nuk perbehet nga nentipa antikorpesh

78. Per mjekimin e LES perdoren te gjitha preparatet e meposhtme pervec:

- A) Preparate AIJS
- B) Antimalarike te sintezes
- C) Preparate citotoksike
- D) Levotiroksine

79. Artriti Reumatoid është një sëmundje për të cilën janë të vërteta të gjitha përveç:

- A) Prek afërsisht 0.8% të popullatës
- B) Femrat preken më shumë se meshkujt
- C) Sëmundja është më shpërndarë në dekadën e parë dhe të dytë të jetës
- D) Karakterizohet nga prania e sinoviteve inflamatorë persistentë

80. Artralgjia në Artritin Reumatoid është:

- A) Jo simetrike
- B) Pa rritje të ndjeshmërisë gjatë palpimit dhe enjtje të artikulacioneve të prekura
- C) Preken më shumë artikulacionet e vogla të gishtave
- D) Infiamacioni për kohë të gjatë nuk shkakton deformim artikulacionesh

81. Shfaqet ekstrartikulare të AR përfshijnë të gjitha përveç:

- A) Prekjen pulmonare
- B) Çrregullimet hematologjike
- C) Çrregullimet okulare
- D) Praninë e hiperkeratozës dhe atrofisë së lekures

82. Mjekimi farmakologjik i HTA përfshin të gjitha përveç:

- A) Metotreksat
- B) Betablockues
- C) Ace inhibitorë
- D) Antagonistë të kalciumit

83. Faktore ambientale që favorizojnë krijimin e HTA janë të gjitha përveç:

- A) Alkoli
- B) Obeziteti
- C) Dieta e pasur me kalcium
- D) Aktiviteti fizik

84. Mjekimi i HTA përfshin të gjitha përveç:

- A) Aktivitetin fizik
- B) Shtimi i në peshe
- C) Kufizimi i kripes
- D) Lenia e alkolit

85. Sklerodermia:

- A) Patogjeneza e sëmundjes është e sqaruar plotësisht
- B) Nuk është e lidhur me faktore ndërvetëprues gjenetik dhe mjedisor
- C) Karakteristike për sëmundjen është prania e fibrozës së lekures

D) Semundja prek me teper meshkujt se femrat

86. Dermatomioziti dhe polimioziti:

- A) Nuk jane semundje autoimune
- B) Te semuret nuk ankohen per dobesi dhe dhimbje muskujsh
- C) Keta te semure kane alterime te cpk, sgot, sgpt, cpk
- D) Keta te semure nuk kane autoantikorp

87. Rashi ngjyre lejla rreth syve është tipik per:

- A) Dermatomiozitin
- B) Polimiozitin
- C) Sindromin sjogren
- D) Sklerodermine

88. Te semuret me miopati kane:

- A) Dobesi te muskujve distale
- B) Dobesi te muskujve proksimale
- C) Dobesi te qafes
- D) Nuk kane shqetesime te lokalizuara

89. Ne polimiozit jane te pranishme antikorp:

- A) ANA
- B) Anti-dsadm
- C) FR
- D) Jo-1

90. Klasifikimi i vaskuliteve paresore bazohet ne:

- A) Agresivitetin e semundjes
- B) Permasat e vazave te prekura
- C) Ekzistojne dy klasa vaskulitesh
- D) Nuk ka ndryshuar gjate viteve

91. Granulomatoza Wegener është:

- A) Vaskulit i vazave te medha
- B) Është vaskulit granulomatoz i aparatit respirator i shoqeruar dhe me glomerulonefrit
- C) Te semuret nuk kane demtime otojatrike
- D) Eshe vaskulit i vazave mesatare

92. Spondiliti ankilozant është semundje:

- A) e femrave ne dhjetevjecarin e katert te peste te jetes
- B) e meshkujve ne dhjetevjecarin e dyte dhe te trete te jetes
- C) e grave ne menopauze
- D) infektive

93. Ne spondilitin ankilozant FR dhe ANA:

- A) Ne spondilitin ankilozant FR dhe ANA jane negative
- B) Ne spondilitin ankilozant FR është negative ANA është pozitive
- C) Ne spondilitin ankilozant FR dhe ANA jane pozitive
- D) Ne spondilitin ankilozant FR është pozitive ANA është negative

94. Ankesat e te semurit me spondilit ankilozant:
- A) Rendohen nga aktiviteti fizik
 - B) Nuk ndikohen nga aktiviteti fizik
 - C) Ngurtesimi mengjezor zgjat 15 min
 - D) Ankesat e te semurit rendohen ne mengjes dhe permiresohen gjate aktivitetit fizik
95. Spondiliti ankilozant mjekohet:
- A) Me terapi medikamentoze dhe terapi fizike
 - B) Vetem me terapi medikamentoze
 - C) Vetem me terapi fizike
 - D) Nuk ka nevojte per mjekim shume te gjate pothuajse gjithe jeten
96. Podagra fillon zakonisht ne:
- A) Artikulacionin e gjurit
 - B) Artikulacionet e gishtave te duarve
 - C) Artikulacionin e qafes
 - D) Gishtin e madh te kembes
97. Panusi është strukture histologjike qe vihet re tek te semuret me:
- A) Lupus Eritematoz Sistemik
 - B) Sklerodermi difuze
 - C) Artrit Reumatoid
 - D) Dermatomiozit
98. Shfaqet ekstrartikulare me te rralla qe vihen re ne Artritit Reumatoid jane:
- A) Nderlikimet kardiake
 - B) Demtimet ne veshka
 - C) Vaskuliti reumatoid
 - D) Demtime te syve
99. Manifestimi me i zakonshem dhe nga me te hershmit qe vihet re ne Morbus Bekteriev është:
- A) Rashi malar ne forme fluture
 - B) Artriti simetrik i artikulacioneve te vogla te duarve
 - C) Sakroileiti
 - D) Polifagi dhe polidipsi
100. Glukokortikosteroidet e injektueshem ne artikulacione indikohen te perdoren ne patologjite muskuloskeletike:
- A) Inflatore
 - B) Mekanike
 - C) Ne prani te osteoporozes
 - D) Ne prani te frakturave
101. Pneumonia atipike karakterizohet nga keto shenja pervec:
- A) Dobesi trupure
 - B) Dhimbje koke
 - C) Koll e thate
 - D) Melena

102. Hipotiroidizmi shfaqet me simptomat e meposhtme pervec:

- A) Krampe muskulare
- B) Tolerance ndaj te ftohtit
- C) Konstipacion
- D) Gjendje te pergjumur

103. Cili nga medikamentet konsiderohet si linja e pare e mjekimit ne depresionin madhor dhe crregullimin obsesiv kompulsiv?

- A) Inhibitorët selektive te rikapjes se serotoninës
- B) Antidepresantët triciklike
- C) Stabilizuesit e humorit
- D) Benzodiasepinat

104. Sindroma Kushing:

- A) Është semundje qe vjen si pasoje e zvogelimit te prodhimit te kortizolit nga gjendra mbiveshkore
- B) Është semundje qe vjen si pasoje e shtimit te prodhimit te kortizolit nga gjendra mbiveshkore
- C) Është semundje qe karakterizohet nga dhimbja e mesit dhe ngurtesimi mengjezor
- D) Ne kete semundje mungojne Shënjat e virilizmit si depozitimi i dhjavit ne regjionet ndermje shpatullave

105. Te gjitha sa me poshte jane te verteta per IRA prostrenale pervec:

- A) Është mjaft e shpështë ndermjet te semureve ambulatorë
- B) Prek me shume burrat sesa grate
- C) Ne shumicen e rasteve i detyrohet bllokimit uretral ose uretral
- D) Shkaktohet nga medikamente qe reduktojnë filtrimin glomerular

106. Terapia e spondilitit ankilozant perfshin:

- A) Vetem terapi medikamentoze
- B) Terapi medikamentoze dhe fizike
- C) Levotiroskine dhe deksametazon
- D) Desmopresine dhe indometacine

107. Karakteristike per sindromen Kushing është prania e te gjithave pervec:

- A) Hiperkalemise
- B) Alkalozia metabolike
- C) Prodhimi ektopik i ACRH
- D) Artriti simetrik i artikulacioneve interfalangeal proksimal

108. Te semuret me poliarterit nodoz kutan kane:

- A) Renie ne peshe
- B) Temperature
- C) Demtime ne organe
- D) Noduse subkutane

109. Faktore risku per krijimin e infeksioneve te rrugev urinare jane te gjitha pervec:

- A) Shtatezania
- B) Diabeti
- C) Aktiviteti seksual
- D) Prania e osteoartritit bashkeshoqerues.

110. Cila prej semundjeve te meposhtme muskulo-skeletike karakterizohet nga prania e nyjeve te Heberdenit?

- A) Lupusi eritematoz sistemik
- B) Artriti reumatoid
- C) Sclerodermia
- D) Osteoporoza

111. Pamja radiologjike e shkopit te bambuse është tipike per cilen patologji:

- A) LES
- B) AR
- C) Polimiozit
- D) Morbus Bekteriev

112. Sakroileiti është shenje fillestare e ciles prej ketyre patologjive:

- A) Sklerodermi
- B) Artrit reumatoid
- C) Osteoartrit
- D) Morbus Bekteriev

113. Aspirina nuk ka efekt:

- A) Efekt analgjezik
- B) Efekt antinflamator
- C) Efekt analgjezik
- D) Efekt sedativ

114. Guret ne veshka:

- A) Nuk shkaktohen nga hiperkalciuria apo hiperoksaluria
- B) Levizja e gurit ne sistemin ekskretor nuk shkakton dhimbje
- C) Guret e pelvisit renal mund te jene asimptomatike apo te shkaktojne vetem hematuri
- D) Shume pak prej gureve perbehen nga oksalatet e kalciumit

115. Nje pacient 53 vjecar i cili mjekohet me ibuprofen 400mg dy here ne dite per te kuruar dhimbjen kronike te mesit krijon edeme e ekstremiteteve te poshtme. Infermierja qe kujdeset per te mendon se edema është rezultat i:

- A) Uljes te funksionit renal
- B) Uljes se nivelit te kreatinines
- C) Rritje te filtrimit glomerular
- D) Rritje te nivelit te proteinave plazmatike

116. Ne sklerodermine e lokalizuar ka demtime:

- A) Vetem te miokardit
- B) Vetem renale
- C) Vetem gastrointestinale
- D) Vetem te anesive

117. Arteriti Takayasu është inflamacion granulomatoz i arterieve:

- A) Te vogla
- B) Te medha
- C) Te mesme

D) Nuk është inflamacion granulomatoz

118. Etiopatogjeneza e bronkitit kronik mendohet të lidhet me shkaktaret e mëposhtem përveç:

- A) Me tymin e duhanit
- B) Ekspozimi ndaj pluhurave profesionale
- C) Infeksione të shkaktuara nga mykoplazma pneumonie
- D) Ndotja atmosferike

119. Në mjekimin e pneumonisë përdoren më shpesh preparatet e mëposhtme përveç:

- A) Ampicilina
- B) Cefprozidina
- C) Eritromicina
- D) Metotreksati

120. Rol të rëndësishëm në vendosjen e diagnozës së pneumonisë ka:

- A) Radiografia pulmonare
- B) Torakocenteza dhe biopsia e pleurës
- C) Shintigrafia
- D) Testet kutane

121. Mjekimi i cirrozës alkoolike përfshin të gjitha përveç:

- A) Dieta
- B) Nderprerje të marrjes së alkoolit
- C) Vitamin terapi
- D) Voltaren në doza të larta

122. Hipertensionin pragu konsiderohet:

- A) Me shume se 180 mmhg dhe ose me shume se 105
- B) Sistolike 140-180 mmhg dhe ose diastolike 90-105
- C) Sistolike 140-180 mmhg dhe ose diastolike 90-95
- D) Sistolike me i vogël se 140 mmhg dhe diastolike me i vogël se 90 mmhg

123. Faktor madhor rrisi për SAK janë të tërë përveç:

- A) Dislipidemia
- B) Niveli i lartë i kolesterolit
- C) Inaktiviteti fizik
- D) Anamneza familjare

124. A është e verëte se:

- A) Me rritjen e moshës rritet rrisi për SAK
- B) Me rritjen e moshës ulët rrisi për SAK
- C) Nuk ka asnjë lidhje të SAK me moshën
- D) Moshë është faktor rrisi madhor për SAK

125. Oliguria përcaktohet si sekretimi i:

- A) më pak se 400 ml/ urine në ditë
- B) më pak se 200 ml/ urine në ditë
- C) më shumë se 3 l/ urine në ditë
- D) më pak se 100 ml/urine në ditë

126. Anuria percaktohet si sekretimi i:

- A) me pak se 300 ml/ urine ne dite
- B) me pak se 400 ml/ urine ne dite
- C) me shume se 2 l/ urine ne dite
- D) me pak se 100 ml/urine ne dite

127. Ne crregullimet e ritmit bejne pjese:

- A) Takikardia sinusale
- B) Bradikardia sinusale
- C) Flateri atrial
- D) Infarkti i miokardit

128. Osteoporoza mjekohet me:

- A) Bifosfonate
- B) Kripa te arit
- C) D- penicilamine
- D) Azatioprine

129. Crregullimet e ritmit sinusal perfshijne te gjitha pervec:

- A) Takikardia sinusal
- B) Bradikardia sinusale
- C) Fibrilacioni atrial
- D) Aritmia sinusale dhe disfunksioni i nyjes sinusale.

130. Polakiuria është:

- A) Urinim naten
- B) Urinim me djegje
- C) Urinim i shpështë
- D) Urinim i dhimbshem

131. Enuresis nocturna është:

- A) Urinim i dhimbshem
- B) Urinim me djegje
- C) Urinim i shtuar
- D) Urinim naten

132. Lupusi eritematoz sistemik është semundje qe prek:

- A) meshkujt me shpesh se femrat
- B) femrat e bardha me shpesh se ato me ngjyre
- C) me shpesh femrat dhe ka incidence me te madhe ne grate me ngjyre
- D) njelloj si meshkujt dhe femrat

133. Tiroidja normale:

- A) Është e palpueshme
- B) Nuk është e palpueshme
- C) Është e palpueshme vetem tek meshkujt
- D) Është e palpueshme vetem tek femrat

134. Steoartriti është semundje:

- A) inflamatore muskuloskeletike

- B) degjenerative muskuloskeletike
- C) endokrine
- D) gjenetike

135. Per mjekimin e morbus Graves perdoren te gjitha pervec:

- A) Karbimazoli
- B) Metimazoli
- C) Indometacina
- D) Propiltiuracili

136. Shkaktare te hipertiroidizmit jane te gjitha pervec:

- A) Semundjet autoimune
- B) Patologji tumorale
- C) Patologji inflamatore
- D) Atireoza

137. Morbus Bazedov:

- A) Prek me shpesh femrat e moshes 30 deri ne 50 vjec
- B) Mungon ekzoftalmia
- C) Funkzioni kardiak eshte normal
- D) Mungon osteoporoza

138. Rreziqet e hipotiroidizmit jane te gjitha pervec:

- A) Koma miksedematoze
- B) Aksidentet kardiake
- C) Prania e astenise
- D) Nervoziteti

139. Eshte i pranishem diabeti kur:

- A) Glicemia esell ne dy dozime eshte me e larte se 1.40 g/l
- B) Glicemia esell ne dy dozime eshte me e larte se 2.40 g/l
- C) Glicemia esell ne dy dozime eshte me e larte se 0.20 g/l
- D) Glicemia esell ne dy dozime eshte me e larte se 0.10 g/l

140. Ne komplikacionet metabolike akute te diabetit hyjen te gjitha pervec:

- A) Acidoketoza
- B) Koma hiperosmolare
- C) Mikroangiopatia diabetike
- D) Hipoglicemite

141. Diabeti i tipit te pare mjekohet me:

- A) Daonil
- B) Metformine
- C) Insuline
- D) Diete hiperkalorike

142. Diabeti i tipit te dyte mjekohet me:

- A) Daonil, metformine
- B) Insuline
- C) Diete hiperkalorike

D) Kufizim i aktivitetit fizik

143. Tension arterial normal konsiderohen vlerat e mëposhtme:

- A) Sistoliku me i vogël se 140 mmhg dhe diastoliku me i vogël se 90 mmhg
- B) Sistoliku me i madh se 140 mmhg dhe diastolike me i madhe se 90 mmhg
- C) Sistoliku ndërmjet 160-180 mmhg dhe diastolike 90-120 mmhg
- D) Sistoliku me i madh se 190 mmhg dhe diastoliku me i madh se 100 mmhg

144. Pavioni kirurgjikal është vendi ku:

- A) Trajtohen të sëmurët
- B) Trajtohen të sëmuret kirurgjikal
- C) Shtrohen për trajtim të sëmurët kirurgjikal
- D) Asnjëra

145. Shtrimi në pavionin kirurgjikal tek adultët bazohet:

- A) Në bazë të seksit
- B) Në bazë të parimeve të asepsisë
- C) Në bazë të moshës
- D) Asnjëra

146. Plaga nuk quhet:

- A) E pastër
- B) E kontaminuar
- C) E infektuar
- D) Asnjëra

147. Kateteri është për përdorim:

- A) Venoz
- B) Urinar
- C) Nazo-gastrik
- D) Të gjitha

148. Ka kapsul piogjene:

- A) Abscesi
- B) Flegmona
- C) Celuliti
- D) Asnjëra

149. Nuk është e vërtetë në obezitet:

- A) Haset shpesh
- B) Gjendet më shumë në meshkujt
- C) Faktor predispozues mund të jetë rritja e estrogjeneve në gjak
- D) Lidhet me nënshqyerjen

150. Nuk është sëmundje kirurgjikale:

- A) Ulcera e perforuar
- B) Kanceri i stomakut
- C) Ulcera stenozaante grada IV
- D) Asnjëra

151. Përbën urgjencë kirurgjikale:

- A) Kalkuloza e kolecistës
- B) Akalazia e ezofagut
- C) Hernia strangulative
- D) Noduli i ftohtë i tiroides

152. Kanceri i gjirit prek më shpesh:

- A) Kuadratin medial të sipërm
- B) Kuadratin medial të poshtëm
- C) Kuadratin lateral të poshtëm
- D) Kuadratin lateral të sipërm

153. Përdorimi i garzave hyn në:

- A) Antiseptiken fizike
- B) Antiseptiken kimike
- C) Antiseptiken mekanike
- D) Të gjitha

154. Në pozicionimin e pacientit në tavolinën e operacionit duhet pasur parasysh:

- A) Të evitohet komprimimi abdominal i tejzgjatur
- B) Të përdoren metodat që parandalojnë dekubituset
- C) Të evitohet aplikimi për kohë të gjatë në gjymtyrë i lakut hemostatik
- D) Të gjitha

155. Operacioni ku nuk përdoret antibioprofilaksia, është në:

- A) Ezofag
- B) Kalkulozet e kolecistës
- C) Tumor tekolonit
- D) Të gjitha

156. Nuk është urgjencë ekstreme kirurgjikale:

- A) Ruptura e lienit
- B) Ruptura kataklizmike e barrës ekstrauterine
- C) Hembolia arteriale mezenteriale
- D) Asnjëra

157. Një hemorragji konsiderohet e rëndë po qe se:

- A) Aspirimi gastrik sjell pa ndërprerje gjak të kuq
- B) Melena e ujshme përsëritet në intervale të shkurtra kohe
- C) Për të mbajtur presionin venoz dhe arterial afër shifrave normale janë të nevojshme transfuzione të shumta
- D) Të gjitha

158. Nuk është origjinë e hemorragjisë digjестive te cirrotiket:

- A) Ruptura e variceve të ezofagut
- B) Turbullimet e hemostazës
- C) Turbullimet trofike të mukozës + staza venoze nga hipertensioni portal
- D) Asnjëra

159. Shkaqet më të shpeshta të alterimeve të ventilimit në gjendjet e emergjencës janë:

- A) Pneumotoraksi valvular
- B) Hemotoraksi masiv
- C) Frakturat multiple të brinjëve ("flail chest")
- D) Të gjitha

160. Rektosigmoidoskopia në një hemorragji të poshtme tregon praninë e një:

- A) Hemorroide të gjakosur
- B) Tumori
- C) Procesi inflamator
- D) Të gjitha

161. Ileusi akut i zorrës së hollë nuk ka origjinë nga:

- A) Herniet interne
- B) Briljet
- C) Tumoret rektale beninje
- D) Ileusi biliar

162. Nuk është okluzion nga shtrëngimi ai i shkaktuar nga:

- A) Brilja
- B) Volvusi
- C) Invaginacioni
- D) Ileusi biliar

163. Është okluzion nga obstruksioni ai i shkaktuar nga:

- A) Tumoret beninje të zorrës
- B) Tumoret malinje të zorrës
- C) Ileuset biliar
- D) Të gjitha

164. Kolecistiti akut kalkuloz nuk është urgjencë absolute kirurgjikale:

- A) Në peritonitin biliar
- B) Piokolecistitin
- C) Kolecisto pankreatitin
- D) Gangrenën e kolecistës

165. Infeksioni i rrugëve limfatike quhet:

- A) Mastit
- B) Limfadenit
- C) Limfangoid
- D) Asnjëra

166. Kolecistiti akut nuk konsiderohet rast i "keq" kirurgjikal në:

- A) Pacientët geriartrik
- B) Insuficiencën renale
- C) Në obezitet
- D) Në lehon

167. Hemorragjia nga barra ekstrauterine është:

- A) Hemorragji digjестive e lartë

- B) Hemorragji digjестive e poshtme
- C) Hemorragji retroperitoneale
- D) Hemoperitoneum

168. Defibrilatori nuk është:

- A) Një pajisje me anë të të cilit i jep pacientit një shkarkim elektrik të kontrolluar për të ndërprerë një aritmi
- B) Një pajisje me anë të të cilit i jep pacientit një shkarkim elektrik të pakontrolluar për të ndërprerë një aritmi
- C) Një pajisje që ushqehet me bateri të karikueshme ose rrjet të vazhdueshëm tensioni
- D) Asnjëra

169. Salla operatore është vendi ku:

- A) Trajtohen kirurgjikalisht të sëmurët
- B) Shtrohen për trajtim pacientët
- C) Shtrohen për trajtim pacientët kirurgjikal
- D) Trajtohen intensivisht të sëmurët kirurgjikal

170. Është parimi më i rëndësishëm në ndarjen në dhoma të të sëmurëve kirurgjikal:

- A) Mosha
- B) Seksi
- C) Asepsia
- D) Asnjëra

171. Nuk është karakteristike në ileusin mekanik:

- A) Ndalimi i feçeve dhe gazrave
- B) Nauze e të vjella
- C) Dhimbja abdominale
- D) Mungesa e hidroniveleve në ro-grafi

172. Agjenti më i vlefshëm i përdorur si sterilizues te autoklavi është:

- A) Ajri ujqor nën presion
- B) Forma e autoklavit
- C) Koha
- D) Nxehtësia

173. Është komplikacion i ndërhyrjeve venoze qëndrore:

- A) Pneumotoraksi
- B) Hemotoraksi
- C) Limforrea
- D) Të gjitha

174. Ulcerat e lëkurës mund të jenë me origjinë:

- A) Vaskulare
- B) Traumatike
- C) Neoplazike
- D) Të gjitha

175. Nuk është karakteristike e fazës akute të infeksionit:

- A) Dhimbja

- B) Temperatura
- C) Leukopenia
- D) Hiperemia

176. Është inflamacion i gjendrave limfatike:

- A) Adeniti
- B) Celuliti
- C) Furunkuli
- D) Limfangoidi

177. Nuk është parametër kryesor në vlerësimin e gjendjes së të ushqyerit:

- A) Klinik
- B) Imunologjik
- C) Dietetik
- D) Biomoral

178. Nuk është e vërtetë për ushqimin parenteral:

- A) Është ushqim artificial i pacientit kirurgjikal
- B) Merret me rrugë venoze
- C) Merret me rrugë arteriale
- D) Merret kur ushqimi oral ose enteral janë të pamundur

179. Cila nga këto plagë është plagë e pastër:

- A) Plaga traumatike e bërë brenda 8 orëve të para
- B) Plaga nga djegiet
- C) Plaga operatore
- D) Të gjitha

180. Materialin qepës (suturat) nuk e ndajmë në bazë të origjinës së materialit përberës në:

- A) Natyral
- B) Artificial
- C) Sintetik
- D) Asnjëra

181. Portagia është instrument kirurgjikal që përdoret për:

- A) Të suturuar
- B) Të diveriguar
- C) Të mbajtur agen
- D) Të mbajtur lamën

182. Kirurgji mini invazive quhet:

- A) Lapartomia
- B) Torakotomia
- C) Laparoskopia
- D) Asnjëra

183. Nuk është urgjencë kirurgjikale:

- A) Hemorragjia digjестive
- B) Ulcer bulbi duodeni e perforuar
- C) Kalkuloza e kolecistës

D) Apendiciti akut

184. Antiseptiken nuk e ndajmë në:

- A) Fizike
- B) Kimike
- C) Biologjike
- D) Asnjëra

185. Është urgjenca më e shpeshtë kirurgjikale:

- A) Hemorragjia digjестive
- B) Ulcer bulbi duodeni e perforuar
- C) Apendiciti akut
- D) Kalkuloza eolecistës

186. Fluktuacioni është karakteristike për:

- A) Flegmonen
- B) Limfangoidin
- C) Abscesin
- D) Asnjëra

187. Fibrogastroskopia mund të jetë mjet trajtimi për:

- A) Hemorragjinë digjестive
- B) Perforacionin e ulçerës duodenale
- C) Stenozën pylorike
- D) Peritonitin post ulçerës së perforuar

188. Nuk ndodh në hemorragjinë gastro intestinale:

- A) Melene
- B) Hemoptizi
- C) Hematemeza
- D) Anemia

189. Është karakteristike në ileusin mekanik:

- A) Ndalimi i feceve dhe gazrave
- B) Nauze e të vjella
- C) Prania e hidroniveleve në ro-grafi
- D) Të gjitha

190. Nuk është komplikacion i ndërhyrjeve venoze qendrore:

- A) Pneumotoraksi
- B) Nënushqyerja
- C) Limforrea
- D) Embolia

191. Është karakteristike e fazës akute të infeksionit:

- A) Dhimbja
- B) Temperatura
- C) Leukocitoza
- D) Të gjitha

192. Nuk është e vërtetë për abscesin:

- A) Prania e kapsulës piogjene
- B) Prania e fluktuacionit
- C) Mund të jetë i nxehtë / i ftohtë
- D) Të gjitha

193. Është inflamacion i gjendrave të djersës:

- A) Adeniti
- B) Celuliti
- C) Hidroadeniti
- D) Furunkuli

194. Nuk është parametër kryesor në vlerësimin e gjendjes së të ushqyerit:

- A) Klinik
- B) Imunologjik
- C) Dietetik
- D) Biomoral

195. Nuk është e vërtetë për ushqimin enteral:

- A) Është ushqim artificial i pacientit kirurgjikal
- B) Merret me rrugë venoze
- C) Merret me rrugë arteriale
- D) Të gjitha

3. Bazat e Infermieristikës, Kirurgji, Anestezi e Infektiv

1. Ajo degë e filozofisë që merret me standartet e sjellje dhe të gjykimit moral quhet:

- A) Deontologji
- B) Vlerë
- C) Detyrë
- D) Etikë

2. Nëse një infermiere përdor uniformen e saj jashtë mjediseve spitalore quhet fajtorë pasi ka thyer:

- A) Të drejtat e pacientit
- B) Kodin etik
- C) Ligjin
- D) Parimet

3. Cili nga këta elementë bën pjesë në konceptet e teorisë infermiere?

- A) Besnikëria
- B) Bamirësia
- C) Autonomia
- D) Infermieristika

4. Cili nga këta elementë bën pjesë në specialitetet infermiere?

- A) Infermieri anestezi
- B) Infermieri si avokat
- C) Infermieri si vendimarrës

D) Infermieri si edukues

5. Homeostaza psikologjike nënkupton një ekulibër të sistemit:

- A) Respirator
- B) Urinar
- C) Gastro-intestinal
- D) Mendor

6. Në nevojat fiziologjike të pacientit bën pjesë ajo për:

- A) siguri
- B) dashuri
- C) ujë
- D) mbrojtje

7. Një person mund të qëndroj pa oksigjen jo më shumë se:

- A) 1-2 min
- B) 2-3 min
- C) 3-4 min
- D) 4-5 min

8. Cila nga këto nevoja fiziologjike është më e rëndësishme ndër të tjerat?

- A) Nevoja për oksigjen
- B) Nevoja për ujë
- C) Nevoja për ushqim
- D) Nevoja për gjumë

9. Aftësia për të influencuar tek të tjerët, për tu perpjekur për një vision, qëllim ose për të ndryshuar qubet:

- A) Menaxhim
- B) Organizim
- C) Planifikim
- D) Lidership

10. Lidershipi drejtues është:

- A) Demokratik
- B) Autoritar
- C) Planifikues
- D) Organizues

11. Sa kohë harxhojnë menaxherët duke komunikuar me persona të ndryshëm, gjate procesit te menaxhimit:

- A) 30-40% të kohës
- B) 40-50% të kohës
- C) 50-70% të kohës
- D) 75-90% te kohës

12. Cili nga këto element bën pjesë në parimet e ruajtjes së shëndetit?

- A) Gjëndja emocionale
- B) Parandalimi i drogës & duhanit
- C) Biografia kulturore

D) Faktorët social

13. Cfarë perjeton pacienti në stadin e 5 të sëmundjes?

- A) Përjeton simptomat
- B) Pranon rolin si i sëmurë
- C) Kontakton me kujdesin shëndetësor
- D) Perjeton shërimin dhe rehabilitimin

14. Në një poliklinikë nuk bën pjesë një nga këto specialitete të mëposhtme:

- A) Mikrosalla
- B) Laboratori
- C) Konsultat e fëmijeve
- D) Salla operacionit

15. Kur një pacient ndodhet në ambulancën e pranimit mund të drejtohet në një prej strukturave të mëposhtme për trajtimin e tij. Cila prej tyre nuk është struktura e saktë?

- A) Në terapinë intensive
- B) Në sallën e operacionit
- C) Në pavion
- D) Në dhomën e injeksioneve

16. Një pacient pasi del nga salla e operacionit transportohet në:

- A) Dhomë injeksionesh
- B) Në terapinë intensive
- C) Laborator
- D) Mikrokirurgji

17. Sëmundjet kronike janë sëmundje të cilat kanë një kohëzgjatje:

- A) 1 muaj
- B) 2 muaj
- C) 3 muaj
- D) Mbi 3 muaj

18. Sa nivele të kujdesit parandalues ndaj sëmundjes kemi?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

19. Cila nga këto kujdesje bën pjesë në parandalimin tretësor?

- A) Edukimi shëndetësor
- B) Diagnostimi i sëmundjes
- C) Trajtimi i sëmundjes
- D) Parandalimi i komplikacioneve

20. Temperatura e dhomës në mjediset spitalore tek fëmijet dhe tek të moshuarit duhet të mbahet:

- A) 26-27°C
- B) 24-26°C
- C) 22-24°C

D) 20-22°C

21. Cila është ngjyra që përdoret për të lyer muret në sallat e operacionit?

- A) E bardhë
- B) E kuqe
- C) E verdhë
- D) Jeshile

22. Lagështia e pranueshme e ajrit në mjediset spitalore duhet të jetë:

- A) 60-65%
- B) 50-60%
- C) 30-50%
- D) 20-30%

23. Sa etapa ka procesi i kujdesit infermieror?

- A) 1
- B) 3
- C) 5
- D) 7

24. Mledhja e të dhënave nga komunikimi me familjarët dhe klientin është etapa:

- A) E parë e kujdesit infermieror
- B) E dytë e kujdesit infermieror
- C) E tretë e kujdesit infermieror
- D) E katërt e kujdesit infermieror

25. Në mbledhjen e të dhënave për përcaktimin e diagnozës infermiore nuk bën pjesë një nga elementët e mëposhtëm:

- A) Observimi
- B) Kartela e mjekut
- C) Biseda me klientin
- D) Planifikimi

26. Hemoragjia nga hundet quhet:

- A) Epistaksis
- B) Petekje
- C) Eritema
- D) Hipoksi

27. Ekzaminimi i një regjoni me anë të goditjes quhet:

- A) Palpacion
- B) Perkusion
- C) Askultacion
- D) Vibracion

28. Të dhënat subjektive janë të dhëna që sigurohen nga:

- A) Testet diagnostikuese
- B) Testet laboratorike
- C) Pacienti dhe familjarët
- D) Observimi

29. Komunikimi intrapersonal është komunikimi që ndodh brënda:

- A) Një individ
- B) Dy individëve
- C) Një grup individësh
- D) Publik

30. Në procesin e komunikimit dërguesi është personi i cili:

- A) Motivon një person për të komunikuar
- B) Mjedisi ku realizohet komunikimi
- C) Merr mesazhin
- D) Inicion komunikimin

31. Cila nga këto përgjigje nuk është e saktë. Mesazhet dërgohen me anë të një kanali komunikimi që janë të tipit:

- A) Auditiv
- B) Viziv
- C) Perceptues
- D) Prekës

32. Termometri për matjen e temperaturës trupore, mat temperaturën në intervalet:

- A) 37-45 °C
- B) 34-42.2 °C
- C) 30-41.2 °C
- D) 26-40 °C

33. Rritja e temperaturës trupore mbi normalen quhet:

- A) Hipotension
- B) Hypertension
- C) Hipotermi
- D) Hipertermi

34. Gjatë një hipotermie ndodh:

- A) Shtim i frekuencës urinare
- B) Shtim i frekuencës respiratore
- C) Ulje e frekuencës respiratore
- D) Konvulsione

35. Matja e pulsit apikalo-radial realizohet nga:

- A) 1 infermiere
- B) 2 infermiere
- C) 3 infermiere
- D) Vet pacienti

36. Administrimi topik i medikamenteve realizohet në rrugë:

- A) Orale
- B) Parenterale
- C) Nëpërmjet traktit respirator
- D) Nëpërmjet lëkurës dhe mukozave

37. Cila nga mënyrat e mëposhtëme të administrimit të medikamenteve nuk bën pjesë në administrimin parenteral?

- A) Intra/muskular
- B) Intra/venoz
- C) Sub/kutan
- D) Transdermal

38. Gjatë periudhës së ovulacionit femrat kanë një temperaturë më të lartë se normalja. Gjeni cila është përgjigja e saktë:

- A) 2 °C
- B) 1.5 °C
- C) 1 °C
- D) 0.6 °C

39. Kur një medikament duhet të qëndroj në stomak për efekt lokal pacienti pozicionohet?

- A) Djathtas
- B) Majtas
- C) Fowler
- D) Semi-fowler

40 Kur indi është i vogël ose kemi një agje të gjatë injeksionet sub-kutane realizohen në kënd:

- A) 75 gradë
- B) 65 gradë
- C) 55 gradë
- D) 45 gradë

41. Injeksionet intra/muskulare nuk realizohen në muskulin:

- A) Gluteal
- B) Femoral
- C) Vastus-lateral
- D) Facial

42. Teknika zikzak e injektimit të medikamenteve realizohet në injeksionet:

- A) Intra/venoze
- B) Intra/muskulare
- C) Intra/dermale
- D) Sub/kutane

43. Metoda e administrimit të oksigjeno terapisë realizohet me anë të:

- A) Sondës nazo-gastrike
- B) Kateterit urinar
- C) Vigonit
- D) Kateterit nazal

44. Niveli i lartë i lengjëve në organizëm quhet:

- A) Hiperkalemi
- B) Hipokalemi
- C) Hipovolemi
- D) Hipervolemi

45. Sa përqind të peshës së përgjithshme trupore zë sasia totale e ujit në organizëm?
A) 55-85%
B) 45-75%
C) 35-65%
D) 25-55%
46. Cili nga këta element kimik ka një rol të rëndësishëm në formimin e skeletit të trupit?
A) Na
B) K
C) Ca
D) Mg
47. Cili nga këta element kimik ka një rol të rëndësishëm në acidozën dhe alkalozën metabolike?
A) HPO_4
B) Cl
C) Mg
D) HCO_3
48. Cili nga këto element nuk bën pjesë në makroelementët ushqimor?
A) Uji
B) Karboidratet
C) Vitaminat
D) Yndyrnat
49. Ulja e oreksit ose e dëshirës për të ngrënë quhet:
A) Nauze
B) Anoreksi
C) Vomitus
D) Flatulencë
50. Gjatë periudhës së dimrit proceset metabolike:
A) Ulen
B) Rriten
C) Ndikohen nga gjinia
D) Nuk ndryshojnë
51. Hapja kirurgjikale që bëhet në stomak nëpërmjet murit abdominal dhe shërben për ushqyerjen e pacienti quhet:
A) Tonsilectomi
B) Laringostomi
C) Gastrostomi
D) Faringostomi
52. Cila nga rrugët e mëposhtme nuk është një rrugë ushqyerje për pacientin?
A) Parenterale
B) Kateteri nazal
C) Sonda nazo-gastrike
D) Orale

53. Procesi i zbrazjes së vezikës urinare quhet:

- A) Meatus
- B) Uretër
- C) Miksion
- D) Sfinkter

54. Zbrazja e vezikës urinare tek adultët ndodh kur në veshkë janë grumbulluar:

- A) 50-150 ml/urinë
- B) 100-200 ml/urinë
- C) 150-250 ml/urinë
- D) 200-300 ml/urinë

55. Sasia e urinës që mbetet në vezikë pas urinimit quhet:

- A) Poliuri
- B) Anuri
- C) Oliguri
- D) Urinë reziduale

56. Prania e pusit në urinë quhet:

- A) Glukozuri
- B) Piuri
- C) Hematuri
- D) Dizuri

57. Urinimi i shpeshtë gjatë natës, vecanërisht kur nuk janë marre sasi të mëdha lëngjesh quhet:

- A) Inkontinencë urinare
- B) Polakiuri
- C) Nikturi
- D) Piuri

58. Sa është sasia e solucionit që shërben për të fryrë balonin e kateterit foley gjatë procesit të kateterizimit urinar?

- A) 5 ml
- B) 10 ml
- C) 15 ml
- D) 20 ml

59. Cili nga medikamentet e mëposhtëm nuk është një anticoagulant?

- A) Heparina
- B) Acenocumaroli
- C) Varfarina
- D) Ampicilina

60. Hemokultura është një analizë gjaku:

- A) Biokimike
- B) Klinike
- C) Bakterologjike
- D) Parazitologjike

61. Prova që shërben për të matur sasinë e urinës gjatë 24 orëve quhet:

- A) Adissi
- B) Ziminski
- C) Urokulturë
- D) Glukozuri

62. Ekzaminimi bakterologjik i feçeve quhet:

- A) Hemokulturë
- B) Koprokulturë
- C) Urokulturë
- D) Parazitologjike

63. Në qëndrimin shtrirë në planin horizontal të pacientit, nuk bën pjesë:

- A) Dekubitus dorsal
- B) Dekubitus ventral
- C) Dekubitus lateral
- D) Pozicioni ortopne

64. Gjatë vendosjes së pacientit në pozicion semi-fowler shpina formon me shtratin një kënd:

- A) 90 gradë
- B) 60 gradë
- C) 45 gradë
- D) 25 gradë

65. Plagët që krijohen nga qëndrimi në shtrat për një kohë të gjatë ose nga presioni quhen:

- A) Ulçera sipërfaqësore
- B) Ulçera të thella
- C) Dekubitus
- D) Imobilitet

66. Cili ndër këta faktor ka më tepër ndikim në formimin e dekubitusëve?

- A) Anemia
- B) Lageshtia
- C) Vit. C
- D) Temperatura

67. Sa stade ka gjumi me lëvizje të shpeshta të syve GJ.L.SH.S?

- A) 0
- B) 2
- C) 4
- D) 6

68. Sa stade ka gjumi me lëvizje të ngadalta të syve GJ.L.N.S?

- A) 0
- B) 2
- C) 4
- D) 6

69. Paftësia për të bërë një gjumë cilësor quhet:

- A) Narkolepsi
- B) Insomnia
- C) Apnea e gjumit
- D) Somnabulizëm

70. Një valë e papritur mbingarkese gjumi që ndodh gjatë ditës quhet:

- A) Hipersomni
- B) Eneurezis
- C) Narkolepsi
- D) Somnabulizem

71. Paftësia e zotërimit të defekimit të feçeve dhe gazrave nga anusi quhet:

- A) Diarre
- B) Koprolite
- C) Konstipacion
- D) Inkontinencë fekale

72. Egzaminimi i një organi ose i një regjoni me anë të prekjes quhet:

- A) Askultacion
- B) Perkusion
- C) Palpacion
- D) Vibracion

73. Të dhënat objektive janë të dhëna që infermieri i merr nga:

- A) Pacienti
- B) Observimi
- C) Ekzaminimet diagnostikuese
- D) Testet laboratorike

74. Komunikimi intrapersonal ndodh:

- A) Brënda një individi
- B) Metakomunikimit
- C) Midis 2 individëve
- D) Publik

75. Në elementët e komunikimit verbal bën pjesë:

- A) Xhestet
- B) Zhurmat
- C) Humori
- D) Ecja

76. Matja e temperaturës orale nuk është e sigurtë:

- A) Te pacientët me diarre
- B) Te pacientët e djersitur
- C) Te pacientët me atake epileptike
- D) Te pacientët me konstipacion

77. Rritja e shpejtësisë së pulsit mbi 100 rrah/min quhet:

- A) Takipne

- B) Takikardi
- C) Bradipne
- D) Bradikardi

78. "Na" është një anion i cili merr pjesë në:

- A) Turrjen muskulare
- B) Metabolizmin e karbohidrateve
- C) Ruajtjen e ekulibrit acido-bazik
- D) Balancën hidrike

79. Në parimet e kujdesit shëndetësor bën pjesë:

- A) Autonomia
- B) Vërtetësia
- C) Besnikëria
- D) Besueshmëria

80. Sa përqind të peshës së përgjithshme trupore zë lengu brëndaqelizor?

- A) 5%
- B) 30%
- C) 50%
- D) 60%

81. Cila është sasia e oksigjenit që jepet me anë të kanjullës nazale?

- A) 1l/min
- B) 2-4l/min
- C) 5-7 l/min
- D) 6-8 l/min

82. Nga mëngjesi në darkë temperatura e trupit luan me?

- A) 0.1 °C
- B) 0.2 °C
- C) 0.3 °C
- D) 0.4 °C

83. Ulja e shpejtësisë së pulsit nën 60 rrah/min quhet:

- A) Takipne
- B) Takikardi
- C) Bradipne
- D) Bradikardi

84. Cili nga këta muskuj është më i përdorshmi për bërjen e injeksioneve i/m?

- A) Ventro gluteal
- B) Vastus lateral
- C) Deltoid
- D) Femoral

85. Në rregullat e kujdesit shëndetësor bën pjesë:

- A) Drejtësia
- B) Vërtetësia
- C) Jokeqdashje

D) Bamirësia

86. Lidershipi drejtues:

- A) Nuk përfshin ndjekësit e tij në zgjidhjen e problemeve
- B) Është lider demokratik
- C) Përfshin ndjekësit e tij në dhënien e ideve
- D) Jep ide të reja

87. Në faktorët e brëndshëm që ndikojë në sëmundje bën pjesë:

- A) Shtrirja e simptomave
- B) Shoqëria
- C) Faktorët. ekonomik
- D) Niveli kulturor

88. Parandalimi dytësor konsiston:

- A) Programet e edukimit shëndetësor
- B) Imunizimin e efekteve të sëmundjes
- C) Trajtimin dhe izolimin e sëmundjes
- D) Diagnostikimin e sëmundjes

89. Cila është temperatura që duhet të ruhet në ambientet spitalore?

- A) 21-26 gradë celcius
- B) 22-27 gradë celcius
- C) 26-28 gradë celcius
- D) 20-22 gradë celcius

90. Diagnoza mjeksore është:

- A) E drejtuar nga patologjia dhe zgjat aq kohë sa zgjat sëmundja.
- B) Përkthyer në përgjigjen e personave për sëmundjen.
- C) Trajton të sëmurin
- D) Identifikon një simptom të caktuar.

91. Në elementët e komunikimit joverbal bën pjesë:

- A) Shprehjet e fytyres
- B) Ritmi
- C) Fjalori
- D) Humori

92. Zona personale është:

- A) 4 inç-18fit
- B) 4 inç-12fit
- C) 12 inç-4fit
- D) 18 inç-4fit

93. Matja e temperaturës rektale nuk është e sigurtë te:

- A) Pacientët me episode krizash.
- B) Pacientët që kanë bërë ndërhyrje në zonën rektale.
- C) Pacientët me të vjella.
- D) Pacientët me konstipacion

94. Sa përqind të peshës së përgjithshme trupore zë lengu intersticial?
A) 5 %
B) 10 %
C) 15 %
D) 20 %
95. Sa përqind të oksigjenit në gjak transporton Hg?
A) 90 %
B) 93 %
C) 97 %
D) 99 %
96. Ne qofte se një infermiere përvetëson sendet personale të një pacienti ajo ka thyer:
A) Kodin etik
B) Ligjin
C) Deontologjinë
D) Vlerat
97. Njollat e kuqe, të mëdha të ngritura mbi nivelin e lëkures që shpesh janë të dhimbshme quhen:
A) Petekje
B) Eritema
C) Epistaksis
D) Egzentema
98. Diagnoza infermierore është:
A) E njëjtë nga një person tek një tjetër.
B) Ndryshon nga një person tek një tjetër
C) Drejtohet nga patologjia
D) Zgjat atë kohë sa zgjat sëmundja.
99. Distanca që aplikohet në zonën sociale është:
A) 1-12 fit
B) 2-12 fit
C) 3-12 fit
D) 4-12 fit
100. Pasi jepen medikamentet me anë të tubit nazogastrik pacienti vendoset në pozicion:
A) Shtrirë nga e majta
B) Shtrirë nga e djathta
C) Semi-fowler
D) Fowler
101. Ca është një kation i cili merr pjesë në këte funksion:
A) Transmetimin e impulseve nervore
B) Transmetimin e impulseve elektrike
C) Nxiti aktivitetin e enzimave
D) Nxiti aktivitetin e karbohidrateve

102. Procesi i hapjes se uretres quhet:

- A) Meatus
- B) Miksion
- C) Polakiuri
- D) Poliuri

103. Paaftësia për të kontrolluar shkarkimin e urinës nga vezika urinare quhet:

- A) Oliguri
- B) Retesion urinar
- C) Inkontinencë urinare
- D) Anuri

104. Pamundësia për të qëndruar në gjumë për shkak të zgjimeve të shpeshta quhet insomni:

- A) fillestare
- B) Sekondare
- C) Terminale
- D) Intermitente

105. Neonati(i porsalinduri 0-3muaj) fle:

- A) 10-12orë në ditë
- B) 12-14orë në ditë
- C) 14-16orë në ditë
- D) 16-20orë në ditë

106. Infeksionet që ndodhin nga kateterizimi i vezikës mund të shkaktohen nga faktorët:

- A) Mosdezifektimi i mirë i zonës përreth uretrës.
- B) Mos futja siç duhet e kateterit
- C) Mos larja e duarve të pacientit
- D) Mos funksionimi siç duhet i uretrës

107. Rritja e hematokritit tregon:

- A) Anemi
- B) Infeksion
- C) Trashje të gjakut
- D) Hollim të gjakut

108. Cili nga tre qëllimet kryesore të elementëve ushqimor është i gabuar?

- A) Formojnë strukturën trupore (kockë, gjak)
- B) Sigurojnë energji e cila matet me kilokalori
- C) Formojnë pjesën muskulare të një organi.
- D) Ndhimojnë rregullimin e reaksioneve kimike

109. Gjatë stadi të IV të gjumit me lëvizje jo të shpejta të syve shpejtësia e rrahjeve të zemrës dhe të respiracioneve ulet:

- A) 10-19 %
- B) 20-30 %
- C) 31-40 %
- D) 41-50 %

110. Ecja në gjumë quhet:

- A) Insomni
- B) Hipersomni
- C) Parasomni
- D) Somnabulizëm

111. Cili është raporti antikoagulant /gjak që duhet për marrjen e një analize?

- A) 0.3ml/5ml
- B) 0.5ml/3ml
- C) 0.5-0.3ml
- D) 0.5ml/5ml

112. Metodatat për kontrollimin e tubit nazogastrik:

- A) Tubi futet me ane të gastrostomise
- B) Tubi futet me anë të një incizioni
- C) Fut me anë të shiringës pak ajër në fund të tubit
- D) Fut me anë të shiringës pak gjak në fund të tubit

113. Rritja e nivelit të troponines është tregues i:

- A) Infarkt të miokardit
- B) Hepatitit
- C) Nefropatise
- D) Otitit

114. Cila nga këto prova shërben për të matur dendësinë e urinës?

- A) CPK
- B) Adissi
- C) Ziminski
- D) CPR

115. Gastrostomia konsiston në:

- A) Observimin e organeve të sipërme digjesteve
- B) Futjen e një tubi në stomak me anë të një ndërhyrje kirurgjikale
- C) Futjen e një kateteri nga hunda deri në stomak
- D) Futjen e një kateteri nga goja deri në stomak me anë të një ndërhyrje kirurgjikale

116. Gjate gjumit metabolizmi zvogëlohet me:

- A) 4-9 %
- B) 10-15 %
- C) 16-20 %
- D) 21-25 %

117. Ulçerat që fillojnë në shtresat subkutane mbi një dalje kockore dhe më pas zgjerohen dhe në sipërfaqe quhen:

- A) Ulçera sipërfaqësore
- B) Ulçera të thella
- C) Nekrozë sipërfaqësore
- D) Nekrozë që depërton në thellësi

118. Cili nga keto pozicione përdoret më pak gjate vendosjes së pacientit në planin horizontal?

- A) Dekubitus lateral
- B) Dekubitus lateralo-dorsal
- C) Dekubitus lateralo-ventral
- D) Foëler

119. Dendësia e urinës < 1010-1030 haset në semundje të:

- A) Heparit
- B) Miokardit
- C) Veshkave
- D) Stomakut

120. Sa është niveli i protrombinës në gjak?

- A) 70-100%
- B) 70-110%
- C) 70-120%
- D) 70-130%

121. Gjak vidal është një analizë që bëhet në:

- A) Sëm. infektive
- B) Tifo abdominale
- C) Sëm.pulmonare
- D) Cerozë hepatike

122. "Ca" është një kation i cili merr pjesë në këto funksione:

- A) Transmetimin e impulseve nervore
- B) Transmetimin e impulseve elektrike
- C) Krijimin e impulseve nervore
- D) Krijimin e impulseve elektrike

123. Hipertensioni është presioni i gjakut jonormal i cili ndhohet kur presioni arterial është:

- A) Nën 140 me 90 mmHg
- B) 140 me 90 mmHg
- C) Mbi 140 me 90 mmHg
- D) Nën 140 nën 90 mmHg

124. Cili nga vëndet e matjes së temperaturës është më pak i sakti?

- A) Rektale
- B) Orale
- C) Aksilare
- D) Temporale

125. Përmirësimi i tolerancës ndaj aktiviteteve përfshin një nga elementët e mëposhtëm:

- A) Ushtrimet e frymëmarrjes
- B) Drenimi i mushkrive
- C) Riaktivizimi i aparatit kardiopulmonar
- D) Nebulizmi

126. Në administrimin e injeksioneve s/c bëhet:

- A) Tërheqje e lëkurës

- B) Mbledhje e lëkurës
- C) Shtypje e lëkurës
- D) Tendosje e lëkurës

127. Fazat e një lidhje ndihmuese të komunikimit janë:

- A) 10
- B) 11
- C) 12
- D) 13

128. Faza e takimit të parë infermier-pacient është:

- A) Faza parandërvepruese
- B) Testimi
- C) Besimi
- D) Orjentimi

129. Për të shtuar lagështirën e mjedisit në dhomën e pacientit përdoret:

- A) Ventilator
- B) Vaporizator
- C) Kondicioner
- D) Oksigjen i lagështuar

130. Manaxhimi është:

- A) Aftësia për të influencuar tek të tjerët
- B) Procesi sistematik i njëjtë me procesin infermieror
- C) Proces mësimi
- D) Proces vlerësimi

131. Sa stade ka sëmundja:

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

132. Idetë për të cilat individi ndjehet i sigurtë quhen:

- A) Vlerë
- B) Etikë
- C) Deontologji
- D) Parandjenjë

133. Sa drejtime merr i sëmuri nga ambulancat e pranimi?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

134. Injeksionet jepen në rrugë:

- A) Orale
- B) Paranterale
- C) Endogjene

D) Egzogjene

135. Deontologjia është:

- A) Një sistem i parimeve fiziologjike
- B) Teoria e obligimit moral
- C) Kodi udhëheqës
- D) Vlerë individuale

136. Metakomunikimi është:

- A) Shkëmbimi i mesazhit pa përdorur fjalët
- B) Mesazhet që kërkojnë përdorimin e teknikave efektive të komunikimit
- C) Mesazhi që transponon qëndrimin e dërguesit ndaj vetes dhe mesazhit
- D) Proçes mësimi dhe interpretimi

137. Cila nga sistemet e mëposhtme nuk ndikon në ekuilibrin homeostatik?

- A) Hipofizia
- B) Sistemi kardiovaskular
- C) Organet gjenitale
- D) Paratiroide

138. Stadi i tretë i sëmundjes është:

- A) Roli i varur i pacientit.
- B) Pranimi i rolit të sëmurë
- C) Kontakti me personelin shëndetësor.
- D) Shërimi dhe reabilitimi

139. Sistola është periudha kur ventrikujt e zemrës janë:

- A) Të relaksuar
- B) Të kontraktuar
- C) Gjysëm të kontraktuar
- D) Gjysëm të relaksuar

140. Kur krahu ndodhet mbi nivelin e zemrës TA rezulton:

- A) Gabimisht i lartë
- B) Gabimisht i ulët
- C) Nuk ndryshon
- D) Pak më i lartë

141. Hipotensioni kemi në ato raste kur:

- A) Presioni diastolik 140mmHg dhe sistolik 90mmHg
- B) Presioni sistolik 130 dhe diastolik 80mmHg
- C) Presioni sistolik 90mmHg dhe diastolik 60mmHg
- D) Presioni diastolic 100 dhe sistolik 50

142. Sasia e ujit në organizëm varet:

- A) Nga madhësia e indit lidhor.
- B) Nga madhësia e indit epithelial.
- C) Nga madhësia e indit adipos.
- D) Nga madhësia e indit sub kutan

143. Frymëmarrja e shpejtë shoqërohet me temperaturë:

- A) Më të lartë se normale
- B) Më të ulët se normale
- C) Të pandryshueshme
- D) Relativisht e barabarte

144. Bradipnea quhet:

- A) Nën 18 frymëmarrje /min
- B) Mbi 20 frymëmarrje /min
- C) Mbi 30 frymëmarrje /min
- D) Nën 12 frymëmarrje /min

145. Rezervat ushqimore që përdor organizmi të parat nëse burimet nuk janë të mjaftueshme janë:

- A) Proteinat
- B) Karbohidratet
- C) Vitaminat
- D) Yndyrnat

146. "Çfarë mjekimi keni marrë?" bën pjesë tek pyetjet e:

- A) Hapura
- B) Ngushta
- C) Primare
- D) Sekondare

147. Nëse kemi bllokim të trakesë, oksigjenimi:

- A) Mungon
- B) Është i pakët
- C) Nuk ndryshon
- D) Është i mjaftueshëm

148. Përshkrimi i volumit të pulsit është nga:

- A) 0 në 3+
- B) 1 në 4+
- C) -1 në 3
- D) -1 në 4

149. Kur indi është i madh injeksionet subkutane bëhen me kënd:

- A) 60 gradë
- B) 70 gradë
- C) 80 gradë
- D) 90 gradë

150. Sasia maksimale në mililitra, e injeksioneve intra-muskulare është:

- A) 1 ml
- B) 3 ml
- C) 5 ml
- D) 7 ml

151. Sëmundja Adison karakterizohet nga funksionimi jo i plotë i gjëndrrës:

- A) Adrenale
- B) Hipofizës
- C) Tiroides
- D) Paratiroide

152. Tek të porsalindurit pulsi është:

- A) 60-80
- B) 80-110
- C) 120-160
- D) 170-190

153. Metodatat për kontrollin e tubit nazo-gastrik janë:

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

154. Thithja e drejtpërdrejtë e medikamenteve bëhet në rrugë:

- A) Orale
- B) Venoze
- C) Subkutane
- D) Intradermale

155. Në ekuilibrin homeostatik janë më të aktivizuara:

- A) 3 gjëndrra dhe 4 sisteme
- B) 2 gjëndrra dhe 2 sisteme
- C) 4 gjëndrra dhe 3 sisteme
- D) 3 gjëndrra dhe 3 sisteme

156. Mesatarja e urinës së eleminuar në mililitra normalisht është:

- A) 1000
- B) 1200
- C) 1400
- D) 1600

157. Prania e qelizave epiteliale në urinë duhet të jetë:

- A) Negativ
- B) E rrallë
- C) E shpeshtë
- D) Mesatare

158. Gjatë retensionit urinar vezika urinare:

- A) Është e boshatisur
- B) Është gjysëm e mbushur
- C) Ka pak urinë reziduale
- D) Fryhet deri sa arrin umbelikusin

159. Dizuria është:

- A) Urinim i pakët

- B) Urinim i tepërt
- C) Vështirësi në urinim
- D) Paaftësi për të urinuar

160. pH mesatar i urinës tek individët me dietë të rregullt është:

- A) 2
- B) 4
- C) 6
- D) 8

161. Urina e mesit për analizë merret pasi janë nxjerrë x ml e para:

- A) 10
- B) 20
- C) 30
- D) 40

162. Mënyra sesi profesionistët përmbushin detyrat e tyre dhe sigurojnë kujdesin tek pacientët quhet:

- A) deontologji
- B) etikë
- C) vlerë
- D) teleologjike

163. Organizimi si një ndër etapat e menaxhimit nuk përfshin:

- A) vendosjen e qëllimeve
- B) vendosjen e marrdhënieve
- C) përcaktimi i përgjegjësive
- D) hartimi e një plani veprimi

164. Koncepti i homeostazës është përshkruar për herë të parë nga W.B.Cannon në vitin:

- A) 1920
- B) 1930
- C) 1939
- D) 1949

165. Për kujdesin e syve nuk përdoret:

- A) disa tamponë garze që mund të vihen në anë të syrit për të mbajtur solucionin
- B) përdor pamuk të njomur mirë me ujë ose fiziologjik
- C) solucioni duhet të jetë në temperaturën e trupit
- D) fshije menjëherë me tampon duke filluar nga këndi i jashtëm në këndin e brendshëm

166. Një individ mund të qëndrojë pa ujë:

- A) 2-3ditë
- B) 3-5ditë
- C) 5-7ditë
- D) 8-9ditë

167. Cilat nga rezervat trupore shpenzohen në fund?

- A) yndyrnat
- B) karbohidratet

- C) kripërat minerale
- D) proteinat

168. Faktorët e brëndshëm të shëndetit janë:

- A) praktikat familjare
- B) biografia kulturore
- C) faktorët social-ekonomik
- D) perceptimi i sëmundjes

169. Faktorët e jashtëm që influencojnë sëmundjen janë:

- A) simptoma potenciale
- B) shtrirja e simptomave
- C) natyra e sëmundjes
- D) faktorët ekonomik

170. Cili nga këta elemente bën pjesë në komunikimin verbal?

- A) shprehja e fytyrës
- B) ecja dhe qëndrimi
- C) xhestet
- D) ritmi

171. Në komunikimin joverbal bën pjesë:

- A) humori
- B) fjalori
- C) koha dhe përkatësi
- D) ecja dhe qëndrimi

172. Në karakteristikat e një lidhje ndihmuese nuk bën pjesë:

- A) besimi
- B) empatia
- C) kujdesi
- D) testimi

173. Zona sociale është:

- A) 4-8fit
- B) 4-12fit
- C) 4-16fit
- D) 4-18fit

174. Shoku është një gjendje:

- A) frikë
- B) pasigurie
- C) refuzim për të bashkëvepruar
- D) emocionale e fuqishme

175. Kur diagnoza nuk është e saktë dhe nuk është vendosur që pacienti të shtrohet ai dërgohet në:

- A) në sallën e operacionit
- B) në terapinë intensive
- C) në pavion ose në klinikë
- D) dhomën e observimit

176. Biseda indirekte me pacientin përdoret për:

- A) informacion të veçantë
- B) vlerësimin e ndryshimeve
- C) përcaktimi i problemeve
- D) zgjidhjen e problemeve

177. Një proces manaxhimi përbëhet nga:

- A) dy funksione
- B) tre funksione
- C) katër funksione
- D) pesë funksione

178. Ndikimi i sëmundjes në vetëkonceptim:

- A) është një proces përshtatje me të gjitha mekanizmat
- B) përfshin përshtatjen e vetëkonceptimit
- C) frekuenca e shfaqjes së simptomave
- D) është një imazh mendor i fortësisë dhe i dobësisë në të gjitha aspektet

179. Fëmija (1-3vjeç) fle:

- A) 8-10orë në ditë
- B) 10-12orë në ditë
- C) 12-14orë në ditë
- D) 14-16orë në ditë

180. Përkufizime të diagnozës infermierore janë dhënë që në vitin:

- A) 1940
- B) 1950
- C) 1955
- D) 1960

181. Klasifikimi i dy tipeve të gjumit (LSHS, LJSHS) u emërtua për herë të parë në vitin:

- A) 1943
- B) 1953
- C) 1960
- D) 1963

182. Qëndrimi në të ftohtë:

- A) rrit TA
- B) ulë TA
- C) nuk ndikon në shenjat jetësore
- D) është i pandryshyeshëm

183. Trajtimi i dekubitueseve bëhet me:

- A) acid folik
- B) bikarbonat natriumi
- C) të verdhë veze
- D) xhelatinë

184. Joni është:

- A) një atom që nuk mbart ngarkesë elektrike

- B) është një molekul që mbetet e pandryshuar
- C) është njësia matse që përdoret në aktivitetet kimike
- D) një atom opo molekul e cila mbart ngarkes elektrike

185. Frekuenca respiratore 14-18 e kanë:

- A) fëmijët 1-3vjeç
- B) fëmijët 3-5 vjeç
- C) adoloshendët
- D) meshkujt e rritur

186. Në matjen rektale temperatura është:

- A) 36.5 gradë C
- B) 37 gradë C
- C) 37.5 gradë C
- D) 38 gradë C

187. Në rast depresioni temperatura trupore është:

- A) më e lartë se norma
- B) në normë
- C) më e ulët se norma
- D) nuk ndryshon

188. Frymëmarrja Cheyne-Stoke:

- A) tregon afrimin e vdekjes
- B) nuk është kaq serioze
- C) ka të bëjë me respirime të zhurmshme
- D) spazma e regjionit glotesk

189. Presioni diastolik është kur ventrikuli i majtë është:

- A) i kontraktuar
- B) gjysëm i kontraktuar
- C) i relaksuar
- D) gjysëm i relaksuar

190. Pulsu i ndërprerë:

- A) ka një periudhë puls normal
- B) nuk ka një periudhë puls normal
- C) është një puls i çrregullt që ngadalësohet
- D) është një puls i çrregullt që shpejtohet

191. Tek pulsu çift rrahja e dytë nga dy të rrahurat e rregullta është:

- A) më pak e fortë se rrahja e parë
- B) më e fortë se rrahja e parë
- C) nuk ndikohet nga rrahja e parë
- D) ndikohet nga rrahja e parë

192. Urina reziduale është:

- A) 1-2ml
- B) 1-3ml
- C) 1-4ml

D) 1-5ml

193. Frymëmarrje normale tek femrat e rritura është:

A) 14-18

B) 16-20

C) 20-22

D) 20-40

194. Gjatë oksigjeno-terapisë O₂ jepet:

A) në l/min

B) në l/sek

C) në l/orë

D) nël/ditë

195. Marrja e oksigjenit nga kateteri nazal:

A) lejon pacientin të ushqehet dhe të flasë lirshëm

B) përdoret më shumë tek fëmijët e vegjël

C) përdoret shpesh tek pacientët që marrin oksigjen në shtëpi

D) mat distancën nga koanet e hundës deri tek lobi i veshit

196. Ruajtja e ekuilibrit hidrik është një pjesë e sistemit të brëndshëm hemostatik i cili nuk funksionon n.q.s:

A) nga mos balancimi i ekuilibrit elektrolitik

B) presionit osmotik

C) ngrohjes trupore

D) ekuilibri acido-bazik

197. Humbja e ujit me anë të djersës është:

A) 100-150ml

B) 200-300ml

C) 350-400ml

D) 450-500ml

198. Sa duhet të jenë marrjet ditore të lëngjeve?

A) 100-1300ml

B) 1400-1500ml

C) 1500-2000ml

D) 2000-3000ml

199. Cila nga elementët e mëposhtëm është mikroelementë?

A) uji

B) proteinat

C) yndyrnat

D) vitaminat

200. Burimet ditore të ujit me anë të oksidimit metabolik janë:

A) 150-200

B) 200-300

C) 200-400

D) 300-400

201. Frutat,xhelatinë, kafe bëjnë pjesë tek:

- A) dietë terapeutike
- B) dietë e butë ushqimore
- C) dietë e lëngshme normale
- D) dietë hidrike

202. Gjej përgjigjen e gabuar ne lidhje me pergatitjen qe duhet bere përpara futjes së lëndëve ushqyese në tubin nazogastrik:

- A) boshatis stomakun me anë të shiringës
- B) futet tubi në hundë
- C) shto pak ujë pas futjes së ushqimit
- D) vendoset pacienti shtrirë djathtas

203. Kur temperatura trupore është e lartë humbja mesatare e ujit nëpërmjet urinës është:

- A) 1000 ml
- B) 1200 ml
- C) 1400 ml
- D) 1600 ml

204. Fosfatet janë:

- A) katione
- B) anione
- C) minerale
- D) elektrolite

205. Prodhimi i pakët i urinës quhet:

- A) nikturi
- B) dizuri
- C) anuri
- D) oliguri

206. Sa % të gjakut total zë plazma?

- A) 55%
- B) 50%
- C) 40%
- D) 35%

207. Cilët janë faktorët që duhet pasur parasysh kur planifikohet kujdesi i pacientit në shtëpi?

- A) ushqimi
- B) rehabilitimi
- C) terapia
- D) edukimi i pacientit

208. Faktorët e jashtëm të mjedisit që nuk ndikojnë në shëndetin e pacientit janë:

- A) kontrolli i ndriçimit
- B) përdorimi i ngjyrave
- C) kontrolli i lagështirës
- D) nevoja për dashuri dhe ngrohtësi

209. Termi hiperemi aktive është:

- A) ngjyra e lëkurës pas djegies së saj
- B) ngjyra normale e lëkurës
- C) ngjyra e lëkurës pas mjekimit
- D) ngjyra e lëkurës pas një traume

210. Hypotermia aksidentale është një gjendje ku personi ekspozohet:

- A) në temperatura shumë të ulta
- B) në temperatura të ulta
- C) në situata aksidentale
- D) në temperatura të larta

211. Hemoragjia, quhet e ndërmjetme kur shfaqet:

- A) gjatë operacionit
- B) pak orë pas operacionit
- C) pak ditë pas operacionit
- D) pas një traume të jashtëme

212. Hemoragjia, quhet primare kur shfaqet:

- A) pak orë pas operacionit
- B) gjatë operacionit
- C) pak ditë pas operacionit
- D) pas një traume të jashtëme

213. Ndhurma e pare në raste hemoragjie është:

- A) vendosja shtrirë e pacientit
- B) vendosja e bandazhit
- C) vendosja e akullit
- D) terapi medikamentoze

214. Donatori lejohet që të japi gjak pasi të kenë kaluar të paktë:

- A) 45 ditë nga dhurimi i fundit
- B) 56 ditë nga dhurimi i fundit
- C) 65 ditë nga dhurimi i fundit
- D) 75 ditë nga dhurimi i fundit

215. Sasia e gjakut që dhurohet është të paktën:

- A) 350ml
- B) 450ml
- C) 550ml
- D) 650ml

216. Peshë minimale trupore për një donator gjaku duhet të jetë:

- A) 40 kg
- B) 50 kg
- C) 60 kg
- D) 70 kg

217. Mosha minimale për një donator gjaku duhet të jetë:

- A) 15 vjeç

- B) 17 vjeç
- C) 20 vjeç
- D) 25 vjeç

218. Mosha maksimale për një donator gjaku duhet të jetë:

- A) 45 vjeç
- B) 55 vjeç
- C) 65 vjeç
- D) 75 vjeç

219. Një person nuk lejohet të dhurojë gjak, në rast ekspozimi ndaj sëmundjeve infektive më pak se:

- A) 3 javë
- B) 6 javë
- C) 8 javë
- D) 10 javë

220. Pozicioni më i përshtatshëm për pacientët pas operacionit është:

- A) semi - Fowler
- B) Fowler
- C) tredelenburg
- D) gjinekologjik

221. Numërimi i veglave kirurgjikale para dhe pas operacionit kryhet nga:

- A) infermiera qarkulluese
- B) infermiera instrumentare
- C) mjeku kirurg
- D) mjeku anesteziat

222. Temperatura e ambientit në sallën operatore duhet të jetë:

- A) 10-15 °C
- B) 15-20 °C
- C) 20-27 °C
- D) 27-30 °C

223. Humiditeti në sallën operatore duhet të ruhet në një nivel:

- A) 30%
- B) 40%
- C) 50%
- D) 60%

224. Kthimi i refleksit gag pas operacionit tregon:

- A) mundësimin e fillimit të ushqimit normalisht
- B) vështërsi në gëlltitje të pacientit
- C) rikthim të peristaltikës
- D) vështërsi në frymëmarrje

225. Flebotomia konsiston në:

- A) venipunkturën dhe thithjen e gjakut

- B) dëmtimin e enës së gjakut
- C) venipunkturën dhe dhënien e gjakut
- D) aplikimin e infuzioneve

226. Kthimi i tonusit muskular të fshiksëz së urinës ndodh:

- A) 4-6 orë pas operacionit
- B) 6-8 orë pas operacionit
- C) 8-10 orë pas operacionit
- D) 10-12 orë pas operacionit

227. Rikthimi i peristaltikës së zorrëve ndodh mesatarisht:

- A) 12 orë pas operacionit
- B) 24 orë pas operacionit
- C) 48 orë pas operacionit
- D) 72 orë pas operacionit

228. Administrimi i opiateve para operacionit ndihmojnë:

- A) në paksimin e sekrecioneve
- B) uljen e tonusit muskular
- C) reduktimin e ankthit dhe stresit
- D) tharjen e mukozave

229. Administrimi i anticholinërgjic-ve para operacionit ndikojnë në:

- A) në paksimin e sekrecioneve
- B) reduktimin e ankthit dhe stresit
- C) uljen e tonusit muskular
- D) tharjen e mukozave

230. Asepsit kirurgjikale janë aktivitete që:

- A) minimizojnë përhapjen e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar
- B) eliminonjë nr. dhe përhapjen e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar
- C) pakësojnë numrin e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar
- D) pakësojnë përhapjen e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar

231. Asepsia është:

- A) eliminimi i të gjithë mikroorganizmave
- B) eliminimi i shumicës së mikroorganizmave
- C) pakësimi i të gjithë mikroorganizmave
- D) pakësimi i shumicës së mikroorganizmave

232. Dezifektimi është:

- A) eliminimi i shumicës së mikroorganizmave në sipërfaqe të një objekti
- B) pakësimi i shumicës së mikroorganizmave në sipërfaqe të një objekti
- C) pastrimi i sipërfaqes së një objekti
- D) dezifektimi i sipërfaqes së një objekti

233. Dekontaminimi është:

- A) pakësimi i shumicës së mikroorganizmave në sipërfaqe të një objekti
- B) eliminimi i shumicës së mikroorganizmave në sipërfaqe të një objekti
- C) pastrimi i sipërfaqes së një objekti të caktuar

D) dezinfektimi i objekteve të ndotura me materiale infektive

234. Instrumentat sterilizohen në autoklavë me një temperaturë prej:

- A) 90 °C
- B) 100 °C
- C) 110 °C
- D) 121 °C

235. Zierja për 20 minuta shkakton:

- A) pastrim
- B) sterilizim
- C) dekontaminim
- D) desifektim të nivelit të lartë

236. Përdorimi i klizmës pastruese është obligative të aplikohet para:

- A) të gjitha llojeve të operacioneve
- B) në operacionet që përfshijnë traktin gastro - intestinal
- C) në operacionet që përfshijnë traktin uro -genital
- D) nuk rekomandohet të aplikohet më para operacionit

237. Infermiera qarkulluese është pjesë e:

- A) grupit steril
- B) grupit josteril
- C) grupit vëzhgues
- D) nuk është antare e bllokut operator

238. Ruajtja e sigurisë dhe integritetit të fushës sterile gjatë procedurës kirurgjikale është detyrë e:

- A) kirurgut primar
- B) anestezistit
- C) infermieres qarkulluese
- D) infermieres instrumentare

239. Në rastin e patologjive të Ca sigmorektal mund të jetë e indikuar:

- A) ileostomia
- B) kolostomia
- C) jejunostomia
- D) gastrostomia

240. Cila nga alternativat e mëposhtme tregon për një procedurë diagnostikuese?

- A) kolostomia
- B) ileostomia
- C) kolonoskopia
- D) jejunostomia

241. Dieta e pacientëve me gastrostomi duhet të jetë:

- A) e lëngshme
- B) e fortë
- C) ushqim normal

D) nuk ka kufizim në dietë

242. Pas operacioneve gastrike pacienti këshillohet të qëndroj në pozicionin:

- A) Fowler
- B) Semi- Fowler
- C) Trendelenburg
- D) Gjinekologjik

243. Trajtimi më i suksesshëm për karcinomën gastrike të avancuar është:

- A) Kirurgjia
- B) Kimioterapia
- C) Radioterapia
- D) Kirurgjia e shoqëruar me kimio-radioterapi

244. Gastrostomia:

- A) është procedurë diagnostikuese
- B) kryhet vetëm me kirurgji
- C) është procedurë që shërben për ushqimin e pacientëve
- D) shërben për aspirimin e sekrecioneve gastrike

245. Kolonoskopia është procedurë diagnostikuese për:

- A) traktin urinar
- B) traktin hepato biliar
- C) traktin e sipërm gastrointestinal
- D) traktin e poshtëm intestinal

246. Plagët nga dekubituset janë plagë që shkaktohen:

- A) nga traumat e hapura
- B) nga armët e zjarrit
- C) nga aksidentet automobilistike
- D) nga qëndrimi në shtrat për një kohë të gjatë

247. Faktorët që ndikojnë për formimin e dekubituesëve janë të gjitha përveç:

- A) kequshqyerja
- B) higjiena e ulët
- C) gjendja emocionale
- D) qëndrimi gjatë në shtrat

248. Në një retension urinar përdoret:

- A) Kateteri Robinson
- B) Kateteri Nichols
- C) Kateteri Foley
- D) Kateteri Moby- Dick

249. Gastrostomia është procedurë që ushqen pacientin nga:

- A) ezofagu
- B) stomaku
- C) jejunum

D) kolon

250. Ndërrimi i pensamentëve të plagës operatore bëhet:

- A) 10 - 15 orë pas operacionit
- B) 16 - 24 orë pas operacionit
- C) 36 - 48 orë pas operacionit
- D) 52 - 72 orë pas operacionit

251. Trajtimi fillestar i plagës bëhet me:

- A) antibiotik
- B) kortizonik
- C) sol. fiziologjik
- D) betadinë

252. Litotripsia është thyerja e gurëve në:

- A) vezikën urinare
- B) veshka
- C) në uretër
- D) kolecist

253. Një plagë quhet e papastër kur:

- A) nuk ka rrjedhje të madhe nga organet viscerales
- B) kur ka pezmatim pa eksudat qelbëzues
- C) që nuk kanë shenja të pezmatimit
- D) nëse ka suporacion

254. Faktorët e rrezikut për infeksione spitalore të plagëve janë të gjitha përveç:

- A) përkujdesja perioperative
- B) sterilizimi i pajisjeve
- C) gjendja e të sëmurit
- D) statusi emocional i të sëmurit

255. Irrigimi i plagës nënkupton:

- A) suturimi i plagës
- B) trajtimi me antibiotik
- C) lavazhi i plagës
- D) fashimi i plagës

256. Në djegien e shkallës së dytë përfshihet:

- A) shkatërrimi i shtresave të epidermës
- B) shkatërrimi i epidermës dhe shtresave të sipërme të dermës
- C) shkatërrim të indeve nënshtresore.
- D) shkatërrim total të epidermës dhe të dermës

257. Gjatë djegies pacienti ka humbje më të theksuar të:

- A) plazmës
- B) gjakut
- C) urinës
- D) djersës

258. Ku përdoret rregulli i 9-ës:

- A) në politrauma
- B) në ngririet trupore
- C) në djegiet trupore
- D) plagët me armë zjarri

259. Ieusi adinamik zakonisht ndodh:

- A) 1 ditë pas operacionit
- B) 2 - 3 ditë pas operacionit
- C) 4 - 6 ditë pas operacionit
- D) 6 - 8 ditë pas operacionit

260. Ieusi adinamik:

- A) Ka një prognozë të varfër
- B) Në përgjithësi ka prognozë të mirë
- C) Trajtimi është gjithmonë kirurgjikal
- D) Është shkaku më i rrallë i obstruksionit intestinal

261. Për të parandaluar ulçerën stazike venoze duhet te:

- A) Ndërpritet aktiviteti fizik
- B) Ekspozohet zona e prekur në temperatura të ftohta
- C) Pozicionohen ekstremitetet më poshtë se niveli i zemrës
- D) Të kontrollohen pulset periferike dhe temperatura e ekstremiteteve.

262. Faktor që nuk ndikon në kalkulozën e aparatit urinar është:

- A) Staza urinare
- B) Infeksioni i traktit urinar
- C) Staza venoze
- D) Dehidrimi

263. Për të mbajtur bilancin elektrolitik, nuk është vlerësim specifik:

- A) Niveli i elektroliteve
- B) Marrjet dhe nxjerrjet e likideve
- C) Turgori i lëkurës
- D) Niveli i gazeve në gjak

264. Cili është qëllimi kryesor i vlerësimit infermieror preoperator?

- A) Të reduktojë morbiditetin dhe mortalitetin perioperator
- B) Të merren të dhëna për sëmundjen kirurgjikale
- C) Të hartohet një strategji menaxhimi
- D) Të hartohet një plan anestetik

265. Sa orë para duhet të ushqehen neonatët dhe fëmijët para kirurgjisë?

- A) 2 orë para kirurgjisë
- B) 30 minuta para kirurgjisë
- C) 6 orë para kirurgjisë
- D) 4 orë para kirurgjisë

266. Bronkospazma mund të shkaktojë:

- A) Qëndrueshmëri hemodinamike
- B) Hiperventilim postoperator
- C) Insuficiencë renale
- D) Hipoventilim dhe hipoksemi V.1

267. Cili është standardi bazë për të vlerësuar shkëmbimin e gazeve në pulmone?

- A) Presioni arterial i dioksidit të karbonit
- B) Presioni arterial i oksigjenit
- C) PH dhe gazet e gjakut arterial
- D) Niveli i oksihemoglobinës

268. Vlera e saktë e presionit arterial të oksigjenit është:

- A) 50-70 mmHg
- B) 90-100 mmHg
- C) 100-120 mmHg
- D) 30-40 mmHg

269. Shoku hipovolemik shkaktohet nga humbja e:

- A) 20-25% të masës qarkulluese të gjakut
- B) 5-10% të masës qarkulluese të gjakut
- C) 2-3% të masës qarkulluese të gjakut
- D) 1-5% të masës qarkulluese të gjakut

270. Në shokun hipovolemik kemi:

- A) Hipertension
- B) Lëkurë të zbehtë dhe të ftohtë
- C) Puls I ngadaltë
- D) Diurezë të shtuar

271. Interventet infermierore në rastin e shokut fillojnë me:

- A) Rivendosjen e funksionit kardiak
- B) Reduktimin e ankthit
- C) Përmirësimi i oksigjenimit
- D) Rivendosjen e bilancit elektrolitik

272. Pas ingestionit të substancave korrozive është i kundërlinduar:

- A) Shplarja me likide menjëherë pas ingestionit
- B) Lavazhi gastrik
- C) Hollimi i substancës korrozive
- D) Sigurimi i rrugëve respiratore

273. Në helmimet ingestive me helme, kur pacienti nuk është koshient së pari aplikojmë:

- A) Lavazhin me sondë orogastrike
- B) Aspirimin gastrik
- C) Vendosja e tubit endotrakeal për të mbrojtur rrugët respiratore
- D) Provokimin e të vjellave

274. Në helmimet me substanca fortësisht acide ose bazike kundraindikohen:

- A) Inserimi i sondës nazogastrike me shumë kujdes

- B) Radiografia
- C) Provokimi i të vjellave
- D) Përdorimi i qumështit në raste të veçanta

275. Veprimi i parë infermieror në rastin e reaksionit akut hemolitik është:

- A) Administrimi i kortikosteroideve
- B) Trajtimi i hipotensionit me likide dhe vazopresorë
- C) Dërgimi i një mostre gjaku në bankën e gjakut
- D) Ndërprerja e menjëhershme e transfuzionit

276. Simptomat më specifike të reaksionit anafilaktik mund të jenë:

- A) Temperaturë
- B) Urtikarje, edema, marrje mendsh, dispne
- C) Hipotension
- D) Hemoragji e pashpjegueshme

277. Dhimbja e patrajtuar shkakton:

- A) Rritjen e kërkesave për oksigjen
- B) Ulje të pulsit
- C) Ulje të presionit arterial
- D) Reduktim të ideve suicidale

278. Shoku anafilaktik nuk paraqitet me:

- A) Bronkospazëm
- B) Ulje të sekrecioneve gastrike
- C) Hipovolemi
- D) Rritje të peristaltikës intestinale

279. Vlerat e presionit venoz central janë:

- A) Shumë të ulëta në shokun hipovolemik
- B) Shumë të ulëta në shokun septik
- C) Normale në shokun kardiogjen
- D) Shumë të larta në shokun hemoragjik

280. Shoku është një sindrom i:

- A) Hipertensionit dhe perfuzionit relativisht të lartë indor
- B) Presionit arterial të lartë
- C) Hipotensionit dhe perfuzionit të ulët indor
- D) Rritjes së masës qarkulluese

281. Rastet kur nuk indikohet intubimi endotrakeal:

- A) Ventilim i papërshtatshëm
- B) Obstruksion i rrugëve respiratore
- C) Saturimi i oksigjenit është mbi 90%
- D) Insuficienca respiratore

282. Intubimi endotrakeal nuk konsiderohet i vështirë nëse:

- A) Qafa është e shkurtër dhe e trashë
- B) Nuk ka trauma në rrugët e sipërme respiratore
- C) Trakea e zhvendosur nga vija e mesit

D) Edema është prezente

283. Për të mbajtur një ventilim normal duhet të:

- A) Të aspirohet vazhdimisht në trake
- B) Mos ndryshohet pozicioni i pacientit
- C) Të hiqen drenat pas 7-8 ditësh
- D) Administrohet oksigjen jo i lagështuar

284. Obeziteti nuk favorizon komplikacione postoperatore të tilla si:

- A) Infeksion
- B) Dehishencë të suturave
- C) Obstruksion të rrugëve respiratore
- D) Psikozën postoperatore

285. Të dhënat për sistemin respirator në kujdesin intensiv, duhet të vlerësohen dhe dokumentohen:

- A) Çdo 1 orë
- B) Çdo 15 minuta
- C) Çdo 5 minuta
- D) Çdo 2 orë

286. Obstruksioni respirator nuk manifestohet me:

- A) Cianozë
- B) Apne
- C) Nivele normale të gazeve në gjakun arterial
- D) Përdorim të muskujve aksesorë

287. Në rastin e ventilimit jo të përshtatshëm kemi:

- A) Ulje të presionit të dioksidit të karbonit
- B) Ulje të PH të gjakut (acidozë respiratore)
- C) Rritje të PH sistemik
- D) Funkcion të ruajtur të miokardit

288. Stafi infermieror para interventit kirurgjikal nuk mund të përcaktojë:

- A) Diagnozën, lidhur me ankthin preoperator
- B) Diagnozën ,lidhur me nivelin e dhimbjes
- C) Llojin e anestesizës që do të aplikohet
- D) Komplikacionet potenciale në periudhën postoperatore

289. Anestezia gjenerale mund të realizohet:

- A) Vetëm duke administruar lëndë anestetike inhalatore
- B) Duke kombinuar lëndët anestetike inhalatore, I/Venoze dhe oksigjen
- C) Nëpërmjet lëndëve anestetike I/Venoze
- D) Duke administruar lëndë anestetike S/Kutane

290. Personat e infektuar dhe që janë alkoolike kanë tendencë të dobësimit funksional të:

- A) aparatit kardiak
- B) urinar
- C) lokomotor
- D) olfaktor

291. Shoku septik fillon me të gjitha shenjat e mëposhtme përveç:

- A) ethe
- B) stres
- C) temperaturë të lartë
- D) hypotension

292. Infeksioni nozokomial nuk merret me:

- A) me vendosjen e kateterit Foley
- B) kanjulave IV
- C) sondës nazogastrike
- D) komunikim të drejtëpërdrejt me pacientin

293. Organizmi shkaktar për gjendjen e sepsit të rëndë nuk mund të jetë:

- A) Escherichia coli
- B) klebsiella
- C) stafilococcus aureus
- D) virusi

294. Menaxhimi i Shoku-t Septik bëhet:

- A) me dhënien e antibiotikëve
- B) likideve
- C) oksigjenit
- D) të gjitha

295. Sa duhet të jetë diureza që të themi se funksioni renal vjen duke u përmirësuar:

- A) 20 ml/ore
- B) 25 ml/ore
- C) 30 ml/ore
- D) 40 ml/ore

296. Efektin e vetë dëmtues virusi i SIDA-s e ka mbi:

- A) limfocitet A
- B) limfocitet C
- C) limfocitet T
- D) limfocitet E

297. Cili është streptokoku më i hasur tek njerëzit:

- A) streptokoku hemolitik i grupit E
- B) streptokoku hemolitik i grupit C
- C) streptokoku hemolitik i grupit D
- D) streptokoku hemolitik i grupit A

298. Mononukleoza Infektive shkaktohet nga:

- A) neisseria gonorea
- B) clostridium botulinum
- C) virusi Epstein-Barr
- D) Plasmodium

299. Patogenët infeksioz kualifikohen si sëmundje ngjitëse për shkak të:
- A) aftësisë që sjell termi i infektueshëm
 - B) aftësisë së infektueshmërisë
 - C) transmetimit të mundshëm nga një person te tjetri
 - D) asnjë nga të mësipërmet
300. Transmetimi i sëmundjes infektive nga një vektor mekanik vjen nga:
- A) mizat
 - B) mushkonjat
 - C) karkalecat
 - D) gjinkallat
301. Transmetimi i sëmundjes infektive nga një vektor organik vjen nga:
- A) mizat
 - B) mushkonjat
 - C) karkalecat
 - D) gjinkallat
302. Në mbikqyrjen e infeksioneve spitalore të plageve deri në:
- A) 70% të infeksioneve mund të shfaqen para hospitalizimit
 - B) 70% të infeksioneve mund të shfaqen gjatë hospitalizimit
 - C) 70% të infeksioneve mund të shfaqen pas daljes nga spitali
 - D) nuk egziston ndonjë e dhënë e saktë
303. Shkalla e prevalencës është raporti:
- A) nr.total i të sëmurëve me sëmundje infektive / nr. i pacientëve në total
 - B) nr. i pacientëve në total / nr.total i të sëmurëve me sëmundje infektive
 - C) nr. i pacientëve në spital në krahasim me popullatën
 - D) nr. i pacientëve në infektiv / me nr. e pacientëve në spital
304. Incidenca e infeksionit për plagët operatore të pastra duhet të jetë:
- A) nën 5 %
 - B) nën 7 %
 - C) nën 10 %
 - D) nën 15 %
305. Incidenca e infeksionit për plagët operatore të papastra mund të jetë:
- A) deri 10 %
 - B) deri 20 %
 - C) deri 25 %
 - D) deri 30 %
306. Kateterët venoze periferik rekomandohen të ndërrohen:
- A) Pas çdo 12-24 orë pas përdorimit
 - B) Pas çdo 24 - 48 orë pas përdorimit
 - C) Pas çdo 48 - 72 orë pas përdorimit
 - D) Pas çdo 72 - 96 orë pas përdorimit
307. Shkaktari më i shpeshtë i infeksioneve spitalore është:
- A) E. Coli

- B) Candidas
- C) Spiroketa
- D) Streptokoku

308. Shenja Kernig's është karakteristikë e

- A) salmonelozes
- B) meningokokut
- C) stafilokokut
- D) botulizmit

309. Periudha e inkubacionit të mononukleozës infektive varion:

- A) 10- 20 ditë
- B) 20- 30 ditë
- C) 30- 50 ditë
- D) 40- 60 ditë

310. Triada ethe - dhimbje fyti- zmadhim i nodjve limfatik cervikal është karakteristik e:

- A) tetanozit
- B) meningokoksisë
- C) mononukleozes infektive
- D) stafilokoksisë

311. Forma më e shpeshtë e salmonelozës është:

- A) ethet tifoide
- B) forma gastrointestinale
- C) bakteremia me ose pa infeksion
- D) mbartia asimptomatike

312. Sëmundja e "papastërtisë" mund të quhet:

- A) salmoneloza
- B) amebiaza
- C) ethet tifoide
- D) shigeloza

313. Shoku septik shfaqet nga:

- A) gram pozitivet
- B) gram negativet
- C) mundet nga gram pozitivet dhe gram negativet
- D) myku

314. Infeksionet Nosokomiale ndryshe quhen:

- A) infeksionet komune
- B) infeksionet ambjentale
- C) infeksionet spitalore
- D) infeksionet shtëpiake

315. Agjenti shkaktar në një infeksion mund të jetë:

- A) virus
- B) protozoar
- C) bakter

D) apo të gjithë

316. Nuk bejnë pjesë në grupin e përhapjes së infeksionëve nga vektorët:

- A) njerëzit
- B) minjtë
- C) mizat
- D) mushkonjat

317. Faktorët e rrezikut për infeksione spitalore të plagëve janë të gjitha përveç:

- A) përkujdesja perioperative
- B) sterilizimi i pajisjeve
- C) gjendja e të sëmurit
- D) statusi emocional i të sëmurit

318. Vaksina profilaktike për hepatitin B aplikohet në:

- A) një dozë
- B) dy doza
- C) tre doza
- D) katër doza

4. Obstetrikë - Gjinekologji

1. Cili nga këto hormone nuk prodhohet nga placenta gjatë barrës?

- A) Gonadotropina korionike humane (hCG)
- B) Hormoni laktogjen placentar
- C) Prolaktina
- D) Progesteroni

2. Cili nga këto hormone përdoret për diagnozën kimike të barrës?

- A) Gonadotropina korionike humane (hCG)
- B) Prolaktina
- C) Progesteroni
- D) Estradioli

3. Cili nga hormonet e mëposhtme siguron zhvillimin dhe mbajtjen e barrës?

- A) Gonadotropina korionike humane (hCG)
- B) Prolaktina
- C) Progesteroni
- D) Estradioli

4. Cili nga hormonet e mëposhtme është tregues i mireqenies së unitetit materno-feto-placentar?

- A) Gonadotropina korionike humane (hCG)
- B) Prolaktina
- C) Progesteroni
- D) Estradioli

5. Cila është frekuenca e rrahjeve të zemres fetale RZF?

- A) 70-80/min

- B) 90-110/min
- C) 120-160/min
- D) > 160/min

6. Cila nga këto mundësi nuk është e pranishme në javën e 12-të të shtatzanisë?

- A) Amenorea
- B) Hormoni bhCG në gjak
- C) Rrahjet e zemres fetale në ekografi
- D) Levizjet fetale të ndjera nga nena

7. Kordoni umbilikal përmban:

- A) Dy vena dhe një arterie
- B) Dy arterie dhe dy vena
- C) Dy arterie dhe një venë
- D) Nje arterie dhe një venë

8. Volumi i gjakut ne barrë rritet me:

- A) 10-20 %
- B) 30-40 %
- C) 50-60 %
- D) 70-80 %

9. Diametri më i madh i kokës fetale është:

- A) Suboksipital
- B) Oksipito-mental
- C) Biparietal
- D) Oksipito-frontal

10. Në cilen javë te shtatzanisë fillojnë të dallohen gjenitalet e jashtme fetale me ekografi:

- A) Javen e 8-te
- B) Javen e 9-te
- C) Javen e 10-te
- D) Javen e 11-te

11. Nje grua që nuk ka lindur e që nuk ka ngelur ndonjeherë me barrë quhet:

- A) Nulligravida
- B) Nullipare
- C) Primi gravida
- D) Primipare

12. Si quhet pariteti korrekt i nje gruaje qe ka patur nje abort ne tremujorin e pare, nje barre ektopike dhe nje barre gemelare ne terme:

- A) Nullipare
- B) Nulligravide
- C) Primipare
- D) Multipare (pluripare)

13. Fraktura me e shpeshte kockore gjate lindjes se fetusit eshte:

- A) E femurit
- B) E kraniumit

- C) E humerusit
- D) E klavikules

14. Cila nga substancat e mëposhtme clirohet ose është përgjegjëse për prodhimin e qumështit të gjirit (laktogjenezen)?

- A) Estrogjeni
- B) Progesteroni
- C) Oksitocina
- D) Prolaktina

15. Cila nga substancat e mëposhtme clirohet ose është përgjegjëse për rrjedhjen (daljen) e qumështit të gjirit?

- A) Estrogjeni
- B) Progesteroni
- C) Oksitocina
- D) Prostaglandinat

16. Cila nga substancat e mëposhtme është përgjegjëse për involucionin uterin?

- A) Estrogjeni
- B) Progesteroni
- C) Oksitocina
- D) Prostaglandinat

17. Cila nga pohimet e mëposhtme është e saktë për kontracepsionin pas lindjes?

- A) Duhet filluar menjëherë tek gruaja që nuk ushqen bebin me gji
- B) Nuk është i rëndësishëm tek gruaja që ushqen bebin me gji
- C) Nuk është i rëndësishëm deri në shfaqjen e menstruacioneve të para
- D) Nuk është i nevojshëm për një muaj pas Sectio Cezarea

18. Cila nga këto paraqitje i referohet paraqitjes me koke të fetusit?

- A) Podalike
- B) Cefalike
- C) Oblike
- D) Transversus

19. Në cilën nga situatat e mëposhtme mund të pohohet se ka ndodhur aplikimi (fiksimi) i pjesës prezantuse?

- A) Koka fetale është në pelvis
- B) Diametri biparietal i kokës fetale ka kaluar planin e hyrjes pelvike
- C) Verteksi është në pozicion transvers
- D) Koka fetale është flektuar

20. Cila nga keto substanca do i mungojë një gruaje vegjetariane gjatë barrës?

- A) Kalciumi
- B) Acidi folik
- C) Hekuri
- D) Vitamina B12

21. Cila nga indikacionet dietetike të mëposhtme NUK është e duhura për gruan shtatzënë?

- A) Ulja e përdorimit të kripës

- B) Shtesa e kalciomit
- C) Shtesa e hekurit
- D) Shtimi i acidit folik

22. Nje grua ne shtatzanine e pare te saj pi nje pakete cigare ne dite. Ne ekzaminimin ekografik te tremujorit te trete, per se duhet te kerkojme:

- A) Vellimin e likidit amniotik
- B) Rritjen fetale
- C) Anomalite fetale
- D) Levizjet fetale

23. Cili nga ekzaminimet e mëposhtme nuk është test i zakonshem gjatë nje barre pa komplikime?

- A) Dozimi në serum i bhCG
- B) Hemoglobina
- C) Testet imunologjike
- D) Pap testi

24. Cili nga kushtet e mëposhtme NUK lidhet me një shtim të riskut të sëmundshemrisë perinatale?

- A) Kushtet e dobëta socioekonomike
- B) Mosha e nënës nën 20 vj
- C) Duhanpirja
- D) Ushtrimet fizike

25. Cili nga kushtet e mëposhtme Nuk lidhet me moshën e nënës në 20 vjetor?

- A) Peshe e ulët në lindje
- B) Vdekje fetale
- C) Diskinezi uterine
- D) Anomali gjenetike të konceptimit

26. Cili nga pohimet e mëposhtme Nuk është korrekt për faktorët e riskut në barre?

- A) Nje grua me nje barre ektopike ne anamneze ka nje risk me te shtuar per nje barre tjeter ektopike
- B) Nje pluripare e thelle ka nje risk te shtuar per hemoragji pas lindjes
- C) Risku i partusit prematur rritet me rritjen e numrit te lindjeve premature ne anamneze
- D) Nje lindje e mepareshme cezariene perben nje indikacion absolut per nje lindje tjeter cezariene

27. Në një laceracion vulvo-vaginal të gradës së tretë, cila strukturë nuk preket:

- A) Sfinkteri anal
- B) Mukoza rektale
- C) Perineumi
- D) Muskujt perinealë

28. Në një laceracion vulvo-vaginal të grades së dyte, cila strukturë nuk preket:

- A) Sfinkteri anal
- B) Perineumi
- C) Muskujt perinealë
- D) Fascia e muskujve perinealë

29. Cila nga pasojat e mëposhtme nuk lidhet me epiziotomine mediolaterale?
- A) Vështiresia e riparimit
 - B) Nganjehere vështiresi për të shëruar
 - C) Dispareuni me rate
 - D) Shpesh arrin sfinkterin anal dhe rektumin
30. Cila nga pohimet e mëposhtme nuk është karakteristike për kontraksionet uterine në fazën aktive të lindjes?
- A) Arrijnë një presion 40 mm Hg
 - B) Shkaktojnë dilatacion të qafes së mitrës
 - C) Përcaktojnë trashësinë e segmentit uterin inferior
 - D) Vijnë cdo 2-4 min
31. Barra me moshe më shumë se 42 jave quhet:
- A) preterm
 - B) premature
 - C) ne term
 - D) serotine
32. Cila nga keto situata nuk lidhet me barren serotine (post term)?
- A) Përqendrimi i pamjaftueshem i oksitocines
 - B) Ngjyrosja e likidit amniotik
 - C) Incidence e rritur e interventeve
 - D) Makrosomia fetale
33. Sindroma e postmaturit (serotinit) përfshin gjithë mundësitë e mëposhtme, përveç:
- A) Rritja e trashësisë së indit asipoz subkutan
 - B) Lëkura e rrudhosur, që deskuamohet
 - C) Gjurmë mekoniumi mbi lekure, membranë e kordon
 - D) Thonj të gjatë
34. Elementi kryesor në vlerësimin e barres përtej termit është:
- A) Ekografia
 - B) Përcaktimi real kur ka ndodhur barra
 - C) Monitorimi i rrahjeve të zemrës fetale
 - D) Matja e likidit amniotik
35. Nëse testi i glicemise pas ngarkesës me 50 gr sheqer, tek një grua shtatzane me një feto morto in utero në anamnezë, është 140, si do vazhdohet me tej:
- A) Nuk ka nevojë për ekzaminime të mëtejshme
 - B) Diete me 2000 kalori në ditë
 - C) Një test standart të tolerancës së sheqerit
 - D) Vlerësimin e glukozurisë në shtëpi
36. Dyshohet për diabet në barrë në të gjitha keto raste, përveç:
- A) Anamnezë familjare për diabet
 - B) Femijë makrosomë
 - C) Glukozuri që persiston
 - D) Aborte habituale

37. I porsalinduri nga nëna diabetike NUK rrezikohet nga:
- A) Hipoglicemia
 - B) Hiperglicemia
 - C) Hipocalcemia
 - D) Makrosomia
38. Në rastin e vendosjes së diagnoses së diabetit gestacional, cila nga rekomandimet e mëposhtme nuk është i duhuri?
- A) Dieta e pershtatshme
 - B) Monitorimi i glicemisë
 - C) Fillimi i insulinës në rast të hiperglicemisë që persiston
 - D) Ndërprerja e barrës
39. Cila nga shenjat e mëposhtme evokon një kardiopati në shtatzani?
- A) Edema e gjymtyreve të poshtme
 - B) Zhurma sistolike
 - C) Shtimi i sforcos respiratore
 - D) Aritmia
40. Cila nga situatat e mëposhtme NUK shton riskun e imunizimit Rhesus?
- A) Menyra e lindjes
 - B) Gjakosjet vaginale
 - C) Preeclampsia
 - D) Moshë e nënes
41. Në një shtatzënë me preeklampsi, cila nga anomali të mëposhtme gjendet më shpesh në urine?
- A) Proteinuria
 - B) Hematuria
 - C) Glukozuria
 - D) Ketonuria
42. Cila nga këto gjendje NUK shërben si faktor risku për hipertensionin gestacional?
- A) Barra multiple
 - B) Hipertensioni kronik
 - C) Moshë më e vogël se 20 vj
 - D) Diabeti
43. Cila nga shenjat në vazhdim NUK është shenje e hipertensionit gestacional të rreptë?
- A) Oligohidramnion
 - B) Proteinuria > 3 gr/24 ore
 - C) Trombocitopenia
 - D) Rritja e nivelit të kreatinines
44. Eklampsia karakterizohet nga:
- A) Dhimbje koke të forta dhe të qëndrueshme
 - B) Hiperrefleksibilitet
 - C) Konvulsione të tipit grand mal
 - D) Njolla para syve

45. Cili nga faktoret e meposhtem NUK kontribon ne zhvillimin e nje infeksioni akut te rrugeve urinare gjate barres, lindjes dhe puerperiumit?
- A) Shtypja e uretereve ne traktin pelvik nga rritja e vellimit uterin
 - B) Rritja e tonusit dhe peristaltikes se ureters
 - C) Bakteriuria asimptomatike
 - D) Ulja e sensibilitetit te vezikes pas anestezise epidurale
46. Cili eshte mbartesi natyral i Toksoplazmozës?
- A) Gjaku
 - B) Macja
 - C) Peshku i kontaminuar
 - D) Femijet ne moshe shkollore
47. Cili eshte shkaku me i shpeshte ne rastin e lindjes premature?
- A) Laceracioni vaginal
 - B) Polipi endocervikal
 - C) Dilatacioni cervical
 - D) Placenta previa
48. Prematur perkufizohet nje neonat i lindur para javes:
- A) 24 te barres
 - B) 34 te barres
 - C) 36 te barres
 - D) 40 te barres
49. Frenuesit e sintezes se prostaglandinave nuk perdoren pergjithesisht si tokolitike, sepse:
- A) Jane jo efektive
 - B) Jane shume te kushtueshem
 - C) Shkaktojne acidoze laktike
 - D) Shkaktojne mbylljen e parakohshme te duktusit botalli
50. Cili nga medikamentet e meposhtme NUK perdoret per nderprerjen e aktivitetit te parakohshem te lindjes:
- A) Sulfati i magneziumit
 - B) Fenobarbitali
 - C) Ritodrina
 - D) Terbutalina
51. Cili nga elementet e meposhtem nuk ben pjese ne profiling biofizik fetal?
- A) Stress test
 - B) Levizjet respiratore fetale
 - C) Tonusi fetal
 - D) Levizjet fetale
52. Ne metodat diagnostikuese joinvazive ne obstetrike NUK ben pjese:
- A) Ekografia
 - B) Stress test
 - C) Amniocenteza
 - D) Profili biofizik

53. Abort habitual quhet prania e njepasnjeshme e:
- A) Dy aborteve spontane
 - B) Tre aborteve spontane
 - C) Kater aborteve sponatene
 - D) Me shume se 5 aborte spontane
54. Placenta previa eshte vendosja e placentes ne:
- A) 1/3 e poshtme te kavitetit uterin
 - B) 1/3 e siperme te kavitetit uterin
 - C) Fundus uteri
 - D) Murin e perpareshem uterin
55. Cilat nga karakteristikat e meposhtme nuk i perket distaco placentes?
- A) Gjaku eshte i erret me koagula
 - B) Intervali mes kontraksioneve eshte me i shkurter se norma ose mungon
 - C) Placenta eshte e vndosur ne 1/3 e poshtme te kavitetit uretin
 - D) Distako ka lidhje me traumat abdominale dhe preeklampsine
56. Cili nga keto komplikacione te barres nuk eshte karakteristike per tremujorin e dyte te barres?
- A) Lindja premature
 - B) Inkompetenca cervikale
 - C) Plasja e parakoheshme e membranave
 - D) Distako placentes
57. Shkak i refluksit ezofageal eshte:
- A) Preeklampsia
 - B) Rritja e nivelit te estrogjenit
 - C) Rritja e nivelit te progesteronit
 - D) Hernia hiatale
58. Cila nga situatat e meposhtme NUK eshte pasoje e ekspozimit ndaj nje agjenti teratogjen?
- A) Vdekja
 - B) Malformimet
 - C) Vonesa e rritjes
 - D) Gemelari bizigotik
59. Cili nga organet apo lokalitetet anatomike nuk ben pjese ne organet e jashtme genitale?
- A) Vulva
 - B) Vagina
 - C) Mons pubis
 - D) Perineumi
60. Zgjatja mesatare e ciklit menstrual eshte:
- A) 22 dite
 - B) 25 dite
 - C) 28 dite
 - D) 35 dite

61. Ardhja e ciklit menstrual shkaktohet nga:
- A) Clirimi i prolaktinës
 - B) Clirimi pulsatil i GnRH (hormoni clirues i gonadotropinave)
 - C) Zgjatja e ndryshueshme e fazës folikulare
 - D) Nga sinteza e progesteronit në corpus luteum
62. Indikator me i mire qe pararend ovulacionin eshte:
- A) Piku i estrogjenit
 - B) Shtimi i sekretimit te FSH
 - C) Fillimi i stimi te sekretimit te LH
 - D) Shtimi preovulator i progesteronit
63. Cili nga metodat kontraceptive te meposhtme ka si mekanizem kryesor veprimi inhibimin (bllokimin) e ovulacionit?
- A) DIU (diapozitivi intra uterin)
 - B) Mifepristoni
 - C) Pilulat e urgjences
 - D) Agonistet e GNRH
64. Cila nga ndodhite e meposhtme NUK eshte karakteristike per fazen fertile te ciklit menstrual?
- A) Piku i estrogjenit
 - B) Prodhimi i progesteronit
 - C) Mukusi cervikal i qarte dhe i bollshem
 - D) Ovulacioni
65. Cila nga keto NUK paraqet mekanizem veprimi te spermicideve (kontraceptiveve kimike barriere)?
- A) Neutralizimi i aciditetit vaginal
 - B) Shkaterrimin e spermatozoideve
 - C) Reduktimin e levizjes se spermatozoideve
 - D) Inaktivizimin e enzimave akrozomiale
66. Cila nga pohimet e meposhtme nuk eshte e vertete per kontracensionin barriere?
- A) Mbron ndaj SST
 - B) Kerkon kontrolle mjekesore te rregullta
 - C) Pothuajse mungojne efektet anesore
 - D) Mbron nga karcinoma e qafes se mitres
67. Cila nga shenjat e mëposhtme NUK takohet në rastin e barrës ektopike (GEU)?
- A) Dhimbje në kuadrantet e poshtme të barkut
 - B) Gjakrrjedhje vaginale ose spotting
 - C) Amenorrea
 - D) Proctoragjia (hemoragji rektale)
68. Cilat nga patologjitë e mëposhteme NUK është pasojë e sëmundjes inflamatorë perlvike?
- A) Endometrioza
 - B) Barra ektopike
 - C) Aderencat pelvike
 - D) Dispareunia

69. Cila nga situatat e mëposhtme NUK shoqerohet me risk te shtuar per SIP?
- A) Fillimi i kontakteve seksuale 15 vj
 - B) Nderprerje te vullnetshme te barres
 - C) Marrja e kontraceptiveve orale
 - D) Perdorimi i DIU
70. Cila nga metodat e mëposhtme lejon konfirmimin e diagnozes së SIP (semundja inflamatore pelvike)?
- A) Numri i leucotive ne gjak
 - B) Kuldocenteza (punkcioni i Duglas-it)
 - C) Laparaskopia
 - D) Ekografia
71. Cila nga metodat e mëposhtme NUK është e vlefshme për diagnostikimin e SIP?
- A) Laparaskopia
 - B) Ekografia
 - C) Kuldoceneta (punkcioni i Duglas-it)
 - D) Histerosalpingografia
72. Cila nga theniet e mëposhtme nuk perben factor favorizues per kancerin e gjirit?
- A) Nullipariteti
 - B) Menopauza e vonshme
 - C) Kanceret e tjere te traktit gjnital
 - D) Trashegimia
73. Lokalizimi më i shpeshte i endometriozes është:
- A) Vezika
 - B) Apendiksi
 - C) Omentumi
 - D) Siperfaqja peritoneale pelvike
74. Terapia më e përshtatshme për një grua 35 vjece që i është nenshtuar interventit kirurgjikal radikal (hysterectomy totale cum adnesis) është:
- A) Danazoli
 - B) Kontracetivet orale
 - C) Antiinflamatorët jo steroidiene
 - D) Terapia estrogjenike zëvendësuese
75. Cila nga pohimet e mëposhtmet NUK shërben si teori për endometriozen?
- A) Metaplazia e epitelit celomik
 - B) Hiperplazia endometriale
 - C) Menstruacioni retrograd
 - D) Deficiti imunologjik
76. Cila nga terapitë e mëposhtme është e indikuar për trajtimin e endometriozes?
- A) Agonistët e hormonit clirues të gonadotropinave (GnRH)
 - B) Progesteroni
 - C) Kontracetivet orale
 - D) Danazoli

77. Cili nga shkaktarët e mëposhtëm të vaginitëve kërkon patjetër trajtim të të dy partnerëve?

- A) Trichomonas
- B) Candida
- C) Streptocoku i grupit B
- D) Laktobacillus

78. Vaginozat bakteriale paraqiten me karakteristikat e mëposhtme, përveç:

- A) pH 5-5,5
- B) Clue cells
- C) Arome peshku të prishur
- D) Janë pa arome

79. Nëse paraqitet një grua me infeksion kronik nga Candida, mjeku duhet të sigurohet për praninë në anamnezë të patologjive të mëposhtme, ME PERJASHTIM TE:

- A) Diabetit
- B) Barres
- C) Antibiotikoterapisë
- D) Dusheve vaginale me solucione acide (<4,5)

80. Parimet e trajtimit të gonorresë, ME PERJASHTIM TE:

- A) Doza unike
- B) Trajtimi i partnerit
- C) Trajtimi spitalor
- D) Mjekimi i sëmundjeve bashkëshoqëruese

81. Me cilat nga patologjitë e mëposhtme janë të lidhura ME SHPESH metroragjitë disfunktionale?

- A) Polipet endometriale
- B) Anovulacioni
- C) Cerviciti
- D) Cregullimet e koagulimit

82. Alterimet menstruale që vërehen në rastin e shkurtimit të fazes folikulare të ciklit janë:

- A) Menoragjia
- B) Menometroragjia
- C) Polimenorea
- D) Ciklet anovulatore

83. Cila nga patologjitë e mëposhtme janë më të lidhura me metroragjitë disfunktionale?

- A) Leukemia
- B) Trombocitopenia
- C) Mola hidatiforme
- D) Sindroma e ovarit policistik

84. Me çfarë termi (emri) përcaktohen menstruacionet me humbje gjaku 100 ml dhe me ritëm çdo 35 ditë?

- A) Menometroragjia
- B) Menoragjia
- C) Polimenorea
- D) Oligomenorea

85. Me çfarë termi (emri) percaktohen menstruacionet me humbje gjaku 40 ml dhe ritëm cdo 35 dite?

- A) Menometroragjia
- B) Menoragjia
- C) Polimenorea
- D) Oligomenorea

86. Cila nga metodat diagnostike të mëposhtme është më e sakta për diagnozën e barrës ektopike (GEU)?

- A) Biopsia endometriale
- B) Laparaskopia
- C) Dozimi I b-hCG serike
- D) Ekografia pelvike

87. Cili nga ekzaminimet laboratorike të mëposhtme karakterizon barren ektopike ose molen?

- A) Trombocitopenia
- B) Progesterone I rritur
- C) Hematokriti
- D) B hCG në nivele të rritura

88. Cila nga thëniet e mëposhtme NUK është korrekte për infeksionin nga HPV?

- A) Kondilomat gjenitale shkaktohen nga ky virus
- B) Nentipet 16 dhe 18 janë të lidhura me kancerin e qafës së mitrës
- C) Raporti seksual është e vetmja mënyrë transmetimi e mundshme
- D) Lezionet e bardha pas ngjyrosjes me acid acetik vihen re gjatë kolposkopisë

89. Cilën nga këto lezionet e listuara më poshtë është më i mundshmi për HPV tip 6 ose 11?

- A) Ulcera e bute
- B) Ulcera e dhimbshme e forte
- C) Kondiloma e sheshtë
- D) Kondiloma acuminatum (si lulelaker)

90. Cila nga këto SST kalon nëpër tre stadi të njëpasnjëshme nëse lihet pa u mjekuar:

- A) HPV
- B) Sifilizi
- C) Chlamidia tracomatis
- D) Gardnerella vaginalis

91. Miomat submukoze mund të shoqërohen me këto shenja dhe simptoma, PERVEC:

- A) Anemi
- B) Infertilitet
- C) Menometroragji
- D) Qarkullim gjaku parazitar nga organet e tjera

92. Ndryshimet e ciklit menstrual të lidhura me fibromioma uterine kanë karakteristikat e mëposhtme, PERVEC:

- A) Nje shtim gradual të hemoragjisë
- B) Menstruacione që zgjasin më shumë se norma
- C) Fluks më të shtuar gjatë të njëjtit numër ditësh zgjatjeje të menstruacioneve
- D) Cikle të cregullta me hemoragji

93. Miomat janë të lidhura me kushtet e mëposhtme klinike PERVEC se me:
- A) Aneminë
 - B) Amenorenë
 - C) Dismenorea
 - D) Pielonefritin
94. Cila nga karakteristikat e mëposhtme nuk i perket fibromiomave uterine?
- A) Jane te vetme ose multiple
 - B) Variojne 1-20 cm
 - C) Jane te pranishme ne 20-50 % te grave
 - D) Degjenerimi malinj i tyre ndodh ne 50 % te rasteve
95. Cila nga ankesat e mëposhtme nuk lidhet me kliniken e fibromiomave uterine?
- A) Te vjellat
 - B) Dhimbja
 - C) Shtypja
 - D) Problemet riprodhuese
96. Cili nga cregullimet e lidhura me barren nuk ndodh si pasoje e fibromiomave uterine?
- A) Hiperemesis gravidarum
 - B) Aborte spontane
 - C) Degjenerimi i kuq
 - D) Lindja premature
97. Fibromiomet uterine gjate barres:
- A) I zvogelojne permasat
 - B) I rrisin permasat
 - C) Pesojne transformim malinj
 - D) Nuk pesojne ndryshime
98. Cila nga metodat diagnostikuese te mëposhtme NUK është e duhura për vlerësimin e endometrit?
- A) Laparaskopia
 - B) Histeroskopia
 - C) Biopsia endometriale
 - D) Histerografia
99. Cila nga metodat diagnostike të mëposhtme është e duhura për vlerësimin e kalueshmerisë tubare?
- A) Testi post-koital
 - B) Histerosaplingografia
 - C) Laparaskopia
 - D) Spermograma
100. Cila nga metodat diagnostike të mëposhtme është e duhura për vlerësimin e malformacioneve të kavitetit uterin?
- A) Testi post-koital
 - B) Histerosaplingografia
 - C) Laparaskopia
 - D) Spermograma

101. Cila nga metodat diagnostike e mëposhtme është E DUHURA për vlerësimin e sasisë dhe cilesisë së mukusit cervikal dhe nderveprimin me spermën?

- A) Testi post-koital
- B) Histerosaplingografia
- C) Laparaskopia
- D) Spermograma

102. Cila nga situatat e mëposhtme NUK është treguese e ndodhjes së ovulacionit?

- A) Shtimi i temperaturës normale
- B) Barra
- C) Endometri i tipit sekretiv
- D) Menstruacioni

103. Cila nga situatat e mëposhtme NUK flet për sterilitet femëror?

- A) Mungesa e kalueshmërisë tubare
- B) Anovulacioni
- C) Kriptokirdia
- D) Insuficienca e progesteronit në fazën e dytë të ciklit

104. Cila nga ekzaminimet e mëposhtme NUK përdoret për identifikimin e infertilitetit mashkullor?

- A) Spermograma
- B) Testi post-coital
- C) Biopsia endometriale
- D) Antikorpët anti-spermatozoidike

105. Cila nga situatat e mëposhtme konsiderohet si një urgjencë relative për një vajzë të re me amenore?

- A) Agenezia vaginale
- B) Sindroma e Turner
- C) Malformacionet uterine
- D) Hymen imperforatus

106. Cila nga situatat e mëposhtme NUK është e lidhur me sindromën Asherman?

- A) Lindja
- B) Endometrioza
- C) Kyretimi i kavitetit endometrial
- D) Hemoragjia postpartum

107. Për fillimin dhe mbajtjen e ciklit menstrual NUK është e nevojshme:

- A) Hormoni lirues i gonatropinave (GnRH)
- B) Një endometer i ndjeshëm ndaj hormonit steroide seksuale
- C) Kalueshmëria tubare
- D) Gonadotropinat

108. Cili nga ekzaminimet hormonale është kryesor për përcaktimin e ndodhjes së menopauzës?

- A) FSH
- B) LH
- C) Prolaktina
- D) Androgjenet

109. Afshet e nxehta në menopausë krijohen nga:

- A) Rritja e FSH
- B) Rritja e LH
- C) Rënia e estrogjeneve
- D) Rënia e progesteronit

110. Trajtimi i keshilluar për osteoporozë në menopauzë i perfshin të gjitha PERVEC:

- A) Estrogjen
- B) Progesterone
- C) Ushtrime fizike
- D) Kalcium

111. Pasojat afatgjata të menopauzës janë:

- A) Anemia
- B) HTA dhe diabeti
- C) Osteoporoza dhe arterioskleroza
- D) Depresioni

112. Cili nuk perben nje faktor risku per kancerin e qafes se mitres?

- A) Raporti i pare seksual ne moshe shume te re
- B) Partnere seksuale te shumte
- C) Duhanpirja
- D) Hiperkolesterolemia

113. Cilët nga ekzaminimet e mëposhtme vlerëson infertilitetin mashkullor?

- A) Matja e temperaturës bazale
- B) Biopsia andometriale
- C) Spermograma
- D) pap-testi

114. Cili është trajtimi i duhur në pamjaftueshmëri ovariane?

- A) Qendrimi pritës
- B) Histerosalpingografia
- C) Laparaskopia
- D) Induksioni i ovulacionit

115. Gjatë laktacionit janë të lejuar kontraktivët oralë:

- A) Monofazikë të kombinuar
- B) Dyfazikë të kombinuar
- C) Trefazikë të kombinuar
- D) Vetëm me progesteron

116. Metodat kontraktive afatgjata të rikthyeshme përfshijnë:

- A) DIU
- B) Spermicidet
- C) Kondomi
- D) Diafragma

117. Cila nga shenjat ose simptomat e mëposhtme NUK takohet ne nje paciente me emboli pulmonare akute?

- A) Takikardia
- B) Takipnea
- C) Dhimbja torakale e tipit të pleuritit
- D) PaO₂ me i madh se 80 mm Hg

118. Kontracetivët orale të kombinuar janë të pershtatshëm për pacientet me:

- A) Dismenore
- B) Probleme hepatike
- C) SST
- D) Tromboemboli

119. Disavantazhet e kontracetivëve progesteronike përfshijnë:

- A) Metrorragji
- B) Amenore
- C) Nauze
- D) Humbje në peshë

120. Diagnoza e menopauzës vendoset pas:

- A) 3 muaj amenore
- B) 6 muaj amenore
- C) 12 muaj amenore
- D) 18 muaj amenore

121. Ulja e estrogjeneve gjatë menopauzës çon në prekje të katër funksioneve, me përjashtim të:

- A) Sistemit tretës
- B) Lekurës dhe indeve
- C) Sistemit vazomotor
- D) Sistemit urogenital

122. Faktorët favorizues të osteoporozës në menopauzë janë:

- A) Menopauza natyrale e parakoheshme
- B) Terapia zëvendësuese hormonale
- C) Aktiviteti i shtuar fizik
- D) Obeziteti

123. Kohëzgjatja e THZ në mënyrë që pacientja të përfitojë duhet të jetë:

- A) Të paktën 5 vj
- B) 5-10 vjet
- C) > 10 vj
- D) Gjithë jetën

124. Dispareunia është:

- A) Dhimbja gjatë menstruacioneve
- B) Dhimbja gjatë kontakteve seksuale
- C) Dhimbja në mesin e ciklit (ovulatore)
- D) Dhimbja pelvike e papërcaktuar

125. HPV është i lidhur me kancerin e:

- A) Gjirit

- B) Mitrës
- C) Vaginës
- D) Qafes se mitrës

126. Gonorhea shoqërohet më shpesh me:

- A) HIV-AIDS
- B) Trichomonas vaginalis
- C) Chlamidia tracomatis
- D) Sifilizi

127. SST favorizohen nga:

- A) Menopauza
- B) Abstenenca seksuale
- C) Perdorimi i profilaktikëve
- D) Numri i lartë i partnerëve seksualë

128. Nëntipat e HPV që përfshihen si onkoviruse me risk të lartë janë:

- A) 6 , 11
- B) 16, 18
- C) 21, 23
- D) 52, 53

129. Kush është ekzaminimi baze depistues për kancerin e qafes së mitrës?

- A) Ekografia
- B) Vizita gjinekologjike
- C) Pap-testi
- D) Kultura e sekrecioneve vaginale

130. Përcaktimi i nëntipit të HPV-së përcaktohet përmes:

- A) Pap-testit
- B) Ekografisë
- C) Tipizimit
- D) Kulturës së sekrecioneve vaginale

131. Avantazhet e kontraktivëve oralë të kombinuar janë mbrojtja kundër kancerit:

- A) vulvar
- B) të gjirit
- C) të qafes së mitrës
- D) të endometrit e të ovarit

132. Kur fillon veprimin e mbrojtjes kontraktivi vetëm me progesterone?

- A) Menjehere
- B) Pas 24 orësh
- C) Pas një jave
- D) Pas 2 javësh

133. Menopauza artificiale nukupton të gjitha opsionet e mëposhtme, përveç:

- A) Ablacioni kirurgjikal i dy ovareve
- B) Ndalimit natyral të aktivitetit folikular oovarian
- C) Kemioterapia
- D) Radioterapia

134. Mjekimi i gonorese rekomandohet te jete:

- A) Mjekim me doze unike
- B) 7-14 dite
- C) 21 dite
- D) Mjekim me cikle

135. Infeksioni vaginal i shoqeruar me leukore me ere si te peshkut te prishur shkaktohet nga:

- A) Chlamydia tracomatis
- B) Streptokoku B hemolitik
- C) Trichomonas vaginalis
- D) Gardnerela vaginalis

136. Në ciklin menstrual, duke nisur nga dita e parë e ciklit, dallohen tre faza. Tregoni cila nga alternativat e mëposhtme i paraqet në renditjen e rregullt:

- A) Luteale, ovalatore, folikulare
- B) Ovulatore, luteale, folikulare
- C) Folikulare, ovulatore, luteale
- D) Folikulare, luteale, ovulatore

137. Uterusi vaskularizohet kryesisht nga:

- A) Arteria ovarike
- B) Arteria uterine
- C) Arteria e ligamentit rotond
- D) Asnjëra

138. Ekspulsioni i anekseve fetale (placentes dhe membranave) pas lindjes normalisht ndodh brenda:

- A) 2-3 minutave
- B) 10 minutave
- C) 15-30 minutave
- D) 60-90 minutave

139. Cila nga substancat e mëposhtme është pergjgjëse për involucionin uterin:

- A) Estrogjeni
- B) Progesteroni
- C) Oksitocina
- D) Prostaglandinat
- E) Prolaktina

140. Puerperium quhet:

- A) Periudha menjëherë pas lindjes deri në 4-6 javë pas lindjes
- B) Periudha para fillimit te aktivitetit të lindjes
- C) Periudha e aktivitetit të lindjes
- D) Asnjëra

141. Cili nga këto përcaktime përshkruan në mënyrë korrekte paraqitjen podalike të plotë:

- A) Këmbët dhe kofshët e fetusit janë të flektuara
- B) Këmbët e shtrira dhe kofshët e flektuara
- C) Këmbët dhe kofshët e shtrira
- D) Asnjëra

142. Defektet e tubit neural të fetusit i detyrohen:

- A) Mungesës së acidit folik
- B) Mungesës së hekurit
- C) Mungesës së vit. A
- D) Mungesës së estrogenit

143. Në rastin e placentes previa, cili ekzaminim duhet shmangur, sepse mund të përkeqësojë gjakrrjedhjen:

- A) Eksplorimi vaginal
- B) Ekografia
- C) Monitorimi i RZF
- D) Asnjëra

144. Tubat uterine janë:

- A) Mes ligamenteve utero-ovarike
- B) Dy kanale muskulare me formë rrethore
- C) Dy kanale muskulare me formë trombe
- D) Dy segmente anatomike të uterusit

145. Cili nga këto hormone stimulon clirimin e prolaktinës:

- A) FSH
- B) LH
- C) FSH dhe LH
- D) Asnjëri

146. Cili nga këto hormone stimulon qelizat bazale ovarike:

- A) FSH
- B) LH
- C) FSH dhe LH
- D) Asnjëri

147. Trajtimi i GEU (barres ektopike) mund të bëhet me:

- A) Laparaskopi
- B) Laparatomy
- C) Methotroxate
- D) Të gjitha

148. Diagnoza e endometrioizës vendoset në bazë të:

- A) Anamnezës
- B) Ekzaminimit objektiv
- C) Anamnezës për infertilitet
- D) Dozimi i CA 125
- E) Shikimi direkt i lezionit endometrioizik dhe biopsia

149. Kur në një ovar konstatohet kist cokollate bëhet fjalë për:

- A) Barrë ekstrauterine
- B) Endometrioze
- C) Hematome e corpus luteum
- D) Asnjëra

150. Cili nga ekzaminimet laboratorike të mëposhtme karakterizon anovulacionin (mungesen e ovulacionit):

- A) Trombocitopenia
- B) Progesterone i rritur
- C) Hematokriti
- D) B hCG e rritur
- E) Asnjëra

151. Cili nga lokalizimet e mëposhtme është i saktë për vendodhjen e fibromiomave:

- A) Intramurale
- B) Submukoze
- C) Subseroze
- D) Të gjitha

152. Cila nga terapitë e mëposhtme është e duhura për trajtimin e fibromiomave uterine:

- A) Qendrimi pritës
- B) Trajtimi medikamentoz
- C) Trajtimi kirurgjikal
- D) Të gjitha

153. Hirsutizmi është:

- A) Rritja e shtimit të qimeve te një grua
- B) Mungesa e qimeve tek nje grua
- C) Mungesa e zhvillimit të gjinjve tek një grua
- D) Asnjëra

154. Avantazhet e kondomit janë:

- A) Bllokon ovulacionin
- B) Redukton riskun e transmetimit të SST
- C) Nuk lejon implantimin e barrës në endometër
- D) Asnjëra

155. Trajtimi kirurgjikal i kancerit të ovarit përfshin:

- A) Histerektominë
- B) Ovarektominë bilaterale (të dyanshme)
- C) Salpingektominë
- D) Të gjitha

156. Diagnoza e kancerit të gjirit vendoset me:

- A) Inspeksion
- B) Palapacion
- C) Imazheri
- D) Asnjëra

157. Kush përbën faktor parandalues për kancerin e gjirit:

- A) Menarka e hershme
- B) Menopauza e vonshme
- C) Nullipariteti
- D) Asnjëra

158. Faktor risku në arteriosklerozë përbën:

- A) Trashëgimia
- B) Përdorimi i tepërt i sheqernave në dietë
- C) Aktiviteti i shtuar fizik
- D) Asnjëra

159. Cila është periudha më e përshtatshme për marrjen e vileve koriale:

- A) Mes javës së 4 deri në të 6
- B) Mes javës së 6 deri në të 9
- C) Mes javës së 9 deri në të 12
- D) Mes javës së 16 deri në të 18

160. Cila është periudha më e përshtatshme për kryerjen e amniocentezës:

- A) Mes javës së 4 deri në të 6
- B) Mes javës së 6 deri në të 9
- C) Mes javës së 9 deri në të 12
- D) Mes javës së 16 deri në të 18

161. Gjatë aktivitetit të lindjes segmenti inferior:

- A) Kontraktohet
- B) Tërhiqet
- C) Zgjerohet
- D) Rrit trashësinë e tij

162. Ekspulsioni i anekseve fetale pas lindjes ndodh normalisht mes:

- A) 2-3 min
- B) 10 min
- C) 15-30 min
- D) 60-90 min

163. Në cilat zona mund të ndodhë implantimi i një barre ektopike:

- A) Tubat e fallopit
- B) Ovaret
- C) Abdomen (bark)
- D) Të gjitha

164. Cila nga shenjat e mëposhtme nuk është treguesi i një sindrome HELLP si komplikim i gravidancës:

- A) Hemoliza
- B) Ulja e calcemise
- C) Rritja e enzimave hepatike
- D) Trombopenia

165. Metroragjia është:

- A) Mungesa e fluksit menstrual
- B) Një humbje e gjakut që ndodh në periudhën intermenstruale
- C) Një fluks menstrual mjaft i bollshëm me shfaqje ciklike të rregullt
- D) Një humbje e gjakut e bollshme që fillon si menstruacion dhe vazhdon në periudhën intermenstruale

166. Cilat janë shenjat klinike që vlerësohen në të porsalindurin për të përcaktuar indeksin Apgar:

- A) Ngjyrosja e lekurës, e qara, vigorso, toni muskular
- B) Ngjyrosja e lekurës, aktiviteti kardiak, tonusi muskular, aktiviteti aspirator, ngacmueshmeria e reflekseve
- C) Ngjyrosja e lekurës, aktiviteti kardiac, aktiviteti respirator, presioni arterial
- D) Ngjyrosja e lekurës, temperatura e trupit, aktiviteti kardiak, aktiviteti respirator, tonusi muskular

167. Vulva është tërësia e:

- A) Të gjithë organeve të aparatit riprodhues të gruas
- B) Organeve gjenitale eksterne të gruas
- C) Organeve gjenitale interne të aparatit riprodhues të gruas
- D) Asnjëra

168. Tubat e fallopit janë:

- A) Tre ligamente utero-ovariene
- B) Dy kanale muskulare me formë rrethore
- C) Dy kanale muskulare me formë trombe
- D) Dy segmente anatomike të uterusit

169. Gjendrat e Bartolinit të vendosura lateralisht vestibulit vaginal prodhojnë:

- A) Mukus
- B) Enzima
- C) Hormone
- D) Asnjëra

170. Një grua e prekur nga tuberkulozi në fazën aktive mund të ushqejë me gji:

- A) Gjithmonë
- B) Vetëm në disa raste
- C) Kurrë
- D) Vetëm në dy muajt e fundit

171. Përkufizohet retroversion uterin:

- A) Devijimi nga pas i të gjithë uterusit pa modifikime në raport me trupit dhe columit uterin
- B) Përkulja nga pas e trupit uterin mbi kolum uteri në nivelin e istmusit
- C) Rënia nga pas e colum uterit dhe e fundit vaginal drejt koksigeusit
- D) Rëshqitja e uterusit drejt kanalit vaginal

172. Para se një grua t'i nënshtrohet pap testit duhet të dijë:

- A) Ekzaminimi duhet të bëhet ekzaktesisht në gjysmën e ciklit menstrual
- B) Nuk duhet të ketë raporte seksuale në 48 orët para ekzaminimit
- C) Nuk duhet të ketë raporte seksuale në 48 orët pas ekzaminimit
- D) Është e nevojshme të bëhet klizëm para ekzaminimit

173. Cila nga shenjat e mëposhtme mund të jenë të shkaktuar nga një vaginit:

- A) Temperatura
- B) Dizuria
- C) Pruriti

D) Asnjëra

174. Cila nga patologjitë e mëposhtme nuk transmetohet me mardhënie seksuale:

- A) Sifilizi
- B) Gonorea
- C) Carcinoma e vulves
- D) Infeksioni nga candida albicans

175. Cili nga hormonet e mëposhtme nuk prodhohet nga ovari:

- A) Progesteroni
- B) FSH
- C) Estrogjenet
- D) Androgjenet

176. Menstruacioni i parë percaktohet si:

- A) Pubarka
- B) Menarka
- C) telarka
- D) Asnjëra

177. Cili nga këto paraqet një rast të sterilitetit sekondar:

- A) Një çift që nuk ka rezultuar në asnjë konceptim pas të paktën dy vjetësh raportesh seksuale të pambrojtura
- B) Një çift me disa shtatzani që kanë përfunduar në aborte
- C) Një çift që ka realizuar një konceptim që ka përfundur me një lindje në terme dhe nuk arrin të konceptojë për të paktën dy vjet mardhënie të pambrojtura
- D) Asnjëra

178. Cila është diferenca mes moshës gestazionale dhe moshës konceptionale:

- A) Nuk ka asnjë ndryshim
- B) Mosha gestacionale përlogaritët nga dita e parë e menseve të fundit, kurse mosha konceptionale nga dita e konceptimit
- C) Mosha gestacionale përlogaritët nga dita e parë e menseve të fundit, kurse mosha konceptionale nga dita kur del pozitiv testi i barrës
- D) Mosha gestacionale llogaritët nga dita e parë kur del pozitiv testi i barrës, kurse mosha konceptionale nga dita e konceptimit

5. Infermieristikë Obstetrikë Gjinekologjike

1. Cila pyetje bën pjesë në anamnezën obstetrikale?

- A) Keni kryer ndonjë abort?
- B) Keni përdorur kontraceptivë?
- C) Kur ka ndodhur menarka juaj?
- D) Sa i gjatë është fluksi juaj menstrual?

2. Kur gruaja shtatzanë paraqitet për herë të parë në klinikë mamia/mjeku i drejton disa pyetje nëse ka alergji nga medikamentet ose ka alergji të tjera, në cilën anamnezë bën pjesë?

- A) Medikale

- B) Medikale familjare
- C) Medikale të shkuar
- D) Obstetrikale

3. Kur gruaja shtatzanë paraqitet për herë të parë në klinikë mamia/mjeku i drejton disa pyetje. Anamneza për hepatit bën pjesë në?

- A) Anamnezën medikale
- B) Anamnezën medikale familjare
- C) Anamnezën medikale të shkuar
- D) Anamnezën obstetrikale

4. Cila nga pyetjet e mëposhtme bën pjesë në anamnezën obstetrikale?

- A) Keni kaluar infeksione seksualisht të transmetueshme?
- B) Keni kryer ndonjë intervent që i perket traktit riprodhues?
- C) Kur e keni bërë Pap - Testin e fundit dhe rezultati i tij?
- D) Sa është numri i lindjeve dhe fëmijëve të jetueshëm?

5. Cila nga alternativat bën pjesë në anamnezën gjinekologjike?

- A) Hystori për dysmenorrhea
- B) Infeksione gjatë periudhes së post partumit
- C) Probleme të post partumit hemoragjik
- D) Rezultatet e testeve të barrës, nëse janë kryer

6. Cila nga alternativat përfshihet në anamnezën obstetrikale?

- A) Cila ka qënë mënyra e lindjes?
- B) Kur ka ndodhur kojtusi i parë?
- C) Kë Metodë kontrceptive ke përdorur?
- D) Sa është numri i partnereve seksual?

7. Konjugata diagonale është distanca midis:

- A) Buzës së sipërme të simfizës pubike dhe promontoriumit
- B) Dy tuberozitetëve iskiadike
- C) Pjesës së pasme të simfizës pubike dhe promontoriumit
- D) Promontoriumit sacral dhe buzës së poshtme të simfizës pubike

8. Konjugata e vërtetë është distanca midis:

- A) Buzës së sipërme të simfizës pubike dhe promontoriumit
- B) Dy tuberozitetëve iskiadike
- C) Promontoriumit sacral dhe buzës së poshtme të simfizës pubike
- D) Pjesës së pasme të simfizës pubike dhe promontoriumit

9. Pjesa e pelvisit e cila është më shumë e përfshirë me lindjen është:

- A) Koksiksi
- B) Pelvisi falls
- C) Pelvisi i vërtetë
- D) Sakrumi

10. Informacioni i siguruar nga metodat e Leopoldit përfshin:

- A) Paraqitjen fetale
- B) Rritjen dhe zhvillimin fetal

- C) Vleresimin e toneve fetale
- D) Vleresimin e tonusit maternal

11. Metodatat e Leopoldit kryesisht janë përdorur për të:

- A) Për të hequr presurën nga kordoni umbilikal
- B) Përcaktuar nëse vezika është e distenduar
- C) Sygjeruar vendin e monitorimit external të kontraksioneve uterine
- D) Vleresuar prezentacionin dhe zbritjen

12. Një grua 4 javëshe shtatzanë i kërkon mamisë se kur ajo është në gjendje të dëgjojë RZF- të e fëmijës së saj. Mami i thotë asaj se me stetoskop ultrasonografik special apo fetoson i cili i amplifikon (i zmadhon) tonet, R.Z.F. mund të dëgjohen afërsisht pas:

- A) 2 - 4 javësh
- B) 6 - 8 javësh
- C) 10 - 12 javësh
- D) 14- 16 javësh

13. Pamundësia për të dëgjuar RZF me stetoskop të zakonshëm obstetrikal është kur kemi:

- A) Anomali fetale
- B) Moshë barre 28 javë
- C) Multifetal
- D) Obezitet amtar

14. Sa shpejt arrin të percaktojë barrën, ekografia me sondë vaginale?

- A) 6 jave
- B) 4 jave
- C) Afërsisht 10 javë
- D) Pas 10 ditësh

15. Si shenjë positive e barrës përfshihet:

- A) Amenorrhea
- B) Lëvizjet fetale që ndihen nga nëna
- C) Rritja abdominale
- D) Sonographya

16. Një shenjë supozuese e shtatzanisë është:

- A) Kontraksionet e Braxton- Hicks
- B) Ndërprerja e menseve
- C) Shenja e hegarit
- D) Zhurmat uterine

17. Shenja Mc Donald ka të bëjë me:

- A) Diskolorimin
- B) Perkuljen e trupit mbi qafë
- C) Zbutjen e istmusit
- D) Zbutjen e qafes

18. Shenja Goodell është:

- A) Diskolorim (cerviksit, mukozës së vaginës dhe vulvës)
- B) Perkulja e trupit të uterusit mbi cerviks

- C) Zbutja e cerviksit
- D) Zbutja e istmusit

19. Në ekzaminimin fizik, mamia vë re se cervixi i gruas është në ngjyrë të kaltër. Kjo është:

- A) Shënja Chadwick
- B) Shënja Goodell
- C) Shënjë e Hegarit
- D) Shënjë Mc Donald

20. Cila nga pikat e mëposhtme nuk bën pjesë në ndryshimet e lëkurës gjatë shtatzanisë?

- A) Kloasoma gravidarum
- B) Linea nigra
- C) Shenja e Hegarit
- D) Striae gravidarum

21. Mamia i shpjegon gruas se gjatë shtatzanisë sëmundja e mëngjesit (nausea & të vjellat) zakonisht takohet në:

- A) Gjashtë javët e para
- B) Në 6 j - 12 j
- C) Në 8j - 16j
- D) Në muajin e pare
- E) Në muajin e katërt

22. Cila nga pikat e mëposhtme nuk ndikon në lartësinë e fundusit uterin?

- A) Barra binjake
- B) Hydramnioni
- C) Qëndrimi fetal
- D) Tonusi muskular

23. Levizjet aktive fetale fillimisht perceptohen:

- A) Dymbëdhjetë javë
- B) Mes muajit të gjashtë dhe të shtatë
- C) Në muajin e tretë të barres
- D) Para se të perfundojë muaji i katërt

24. Klientja juaj është në javën e 39 të shtatzanisë. Ajo vë re që është e friksuar rreth lindjes. Përgjigja juaj do të jetë:

- A) Është normale të jeni ankioze. Dëshironi të diskutojmë më tepër rreth saj?
- B) Ju mund të keni lindje me epidurale, e si rrjedhojë ju nuk do të ndjeni asgjë.
- C) Mos u shqetëso rreth lindjes, pasi ju do të jeni shumë mirë
- D) Rreth një experience e cila nuk është aktuale, është e frikshme për ta menduar

25. Kujdesi prenatal është ideale të fillojë:

- A) Pas mungesës së tretë të menseve
- B) Pas mungesës së dytë të menseve
- C) Pas mungesës së parë të menseve
- D) Përpara mungesës parë të menseve

26. Në 16 javë niveli i fundusit uterin është:

- A) 1/3 e poshtme qe bashkon umbilikusin me procesin ksifoid

- B) 1/2 e vijës që bashkon simfizën pubike me umbilikusin
- C) 2/3 e vijës që bashkon umbilikusin me procesin ksifoid
- D) Një gisht nën umbilicus

27. Në 24 javë niveli i fundusit uteri është:

- A) 1/3 e sipërme që bashkon umbilikusin me procesin ksifoid
- B) 1/3 e poshtme që bashkon umbilikusin me procesin ksifoid
- C) 1 - 2 gisht mbi umbilicus
- D) 3 - 4 gisht nën procesin ksifoid

28. Znj. X është 14 j shtatzane. Infer - mamia shpreson të palpojë fundusin në cilin nga nivelet e mëposhtme:

- A) Në nivelin e umbilikusit
- B) Nuk palpohehet mbi simfizën pubike
- C) Pak mbi simfizën pubike
- D) Pak mbi umbilicus

29. Tremestri i dytë i shtatzanisë gjatë cilave javë ndodh?

- A) 10 - 22
- B) 12 - 24
- C) 14 - 26
- D) 16 - 28

30. Tremestri i tretë i shtatzanisë fillon nga java e:

- A) 23
- B) 25
- C) 27
- D) 29

31. Znj. E. është në javën e 23 të shtatzanisë. Ajo është informuar se shenjë alarmi në shtatzani është:

- A) Palpitacioni kardiak
- B) Rritja e oreksit
- C) Ulja e lëvizjeve fetale
- D) Ulja e presionit të gjakut

32. Cila nga simptomat e mëposhtme konsiderohet si shenjë paralajmëruese e një problem potencial dhe gruaja shtatzanë duhet të raportojë menjëherë personelin e kujdesit shëndetësor?

- A) Gjakrrjedhje vaginale
- B) Lodhje
- C) Nausea
- D) Shtim i frekuencës urinare

33. Kultura për gonorrhea në shtatzani përfshihet si një nga testet rutinë e cila rekomandohet të bëhet në:

- A) Edo fillim muaji gjatë shtatzanisë,
- B) Fillim të vizitës së parë prenatale
- C) Përfundim të muajit të fundit të shtatzanisë
- D) Vizitën e parë prenatale dhe përsëritet në 36 javë

34. Ç' ndryshim mund të shkaktojë pozicioni lithotomik, në presionin e gjakut tek gruaja shtatzanë?
- A) Asgjë e veçantë nuk vihet re
 - B) E rrit presionin e gjakut
 - C) E ulë presionin e gjakut
 - D) Rrit dhe ul, varet nga linja bazë e presionit të gjakut
35. Kur shtatzana paraqet probleme të uthit (pyrosis) me djegie e kthim të sasive të vogla të lëngjeve me shije të thartë ajo duhet të konsumojë:
- A) Pije me gaz
 - B) Qumësht
 - C) Ushqime të yndyrshme
 - D) Vakte të mëdha
36. Në vizitat e rradhës në shtatzaninë e pakomplikuuar zakonisht nuk përfshihet:
- A) Dëgjimin e RZF-ve
 - B) Ekzaminimin pelvik
 - C) Manovrat e Leopoldit
 - D) Matjet e lartësisë së fundusit
37. Puna gjatë shtatzanisë:
- A) Duhet të reduktohet në tremestrin e tretë
 - B) Nuk ka probleme në barrën normale
 - C) Rrit rrezikun e problemeve në barrë
 - D) Ul rrishtun e problemeve në barrë
38. Mamia instrukton gruan të zbatojë ushtrimet e Kegelit, pasi ato:
- A) Forcojnë dyshtemenë pelvike
 - B) Ndhmojnë në zbritjen e fetusit
 - C) Ndhmojnë në zbutjen e columit
 - D) Përshpejtojnë aktin e lindjes
39. Pozicioni që ju i rekomandoni gruas shtatzanë për t'u çlodhur ose fjetur është:
- A) Anash
 - B) Gjysëm ndenjtur.
 - C) Në shpinë
 - D) Permbys
40. Dita e parë e zakoneve të fundit të gruas ka qënë 3 Maj 2011, duke përdorur rregullën e Negelit kësaj gruaje i takon të lindë:
- A) 10 shkurt 2012
 - B) 10 mars 2012
 - C) 31 qershor 2012
 - D) 06 korrik 2012
41. Një grua shtatzanë ditën e parë të menseve të fundit i pati më 8 prill 2011 dhe ditën e fundit më 13 prill. Duke përdorur rregullën e Negelit dita e lindjes vlersohet se mund të jetë:
- A) 5 nëntor 2011
 - B) 15 janar 2012
 - C) 20 janar 2012

D) 15 korrik 2012

42. Znj X. ju tregon që cikli i fundit menstrual ishte më 1 Tetor 2011. Sipas rregullës së Negelit, që ju dini lindja do të jetë më:

- A) 1 korrik 2011
- B) 8 gusht 2011
- C) 1 gusht 2011
- D) 8 korrik 2012

43. Cila nga vaksinat e mëposhtme mund të administrohet gjatë shtatzanisë:

- A) Parotitit
- B) Poliomeilitit
- C) Rabies
- D) Varicelës

44. Cila nga vaksinat e mëposhtme nuk duhet të administrohen gjatë shtatzanisë?

- A) Difteria
- B) Hepatiti b
- C) Parotiti
- D) Rabies

45. Cila nga vaksinat e mëposhtme nuk duhet të administrohen gjatë shtatzanisë?

- A) Fruthi
- B) Hepatiti b
- C) Rabies
- D) Tetanozi

46. Cila nga vaksinat e mëposhtme mund të administrohet gjatë shtatzanisë?

- A) Difteria
- B) Fruthi
- C) Parotiti
- D) Rubeola

47. Ndërlidhja e pjesëve trupore fetale me njëri - tjetrin është quajtur:

- A) Pozicion fetal
- B) prezentacion fetal
- C) Qëndrim fetal
- D) Shtrirje fetale

48. Ndërlidhja apo raporti i aksit gjatsor të nënës me aksin gjatësor të fetusit është quajtur:

- A) Pozicion fetal
- B) Prezentacion fetal
- C) Qëndrim fetal
- D) Shtrirje fetale

49. Infermierja e cila kryen ekzaminim vaginal për të vlersuar progresin e aktivitetit të lindjes duhet:

- A) Diskutoje konkluzionet (gjetjeve) me gruan dhe partnerin e saj
- B) Kryej një ekzaminim të paktën njëherë në edo orë gjatë fazës aktive të aktivitetit të lindjes
- C) Kryerj ekzaminime shumë frekvente, nëse hemoragjia është prezente

D) Veshja e dy dorezave për edo ekzaminim të kryer

50. Për të përcaktuar frekuencën e kontraksioneve uterine mamia do të vlersojë kohën nga:

- A) Fillimi i një kontraksioni deri në fund të kontraksioni tjetër
- B) Fundi i një kontraksioni deri në fund të kontraksionit tjetër
- C) Shpërthimi i kontraksionit deri në fund
- D) Shpërthimi i një kontraksioni deri në shpërthimin e kontraksionit tjetër

51. Kur një grua vleresohet në stadin e parë të lindjes, infermierija arsyeton që shënja vendimtare që jep kontraksione uterine efektive duhet të jetë:

- A) Dilatacioni i cerviksit
- B) Ruptura e membranave amniotike
- C) Shfaqja e një sasive hemorragjie
- D) Zbritja e fetusit

52. Gjatë fazës aktive të aktivitetit të lindjes cerviksi dilatohet nga:

- A) 1 deri në 4cm
- B) 3 deri në 4cm
- C) 4 deri në 8cm
- D) 8 deri në 10cm

53. Mamia mendon se gruaja është në fazën e ekspulsionit kur gjatë vizitës vaginale vë re se cerviksi i gruas është dilatuar:

- A) 1 deri në 3cm
- B) 2 deri në 6cm
- C) 3 deri në 8cm
- D) 8 deri në 10cm

54. Cila nga pikat e mëposhme nuk bën pjesë në nënfazat e stadi të parë të aktivitetit të lindjes:

- A) Faza aktive
- B) Faza e expulsionit
- C) Faza e tranzicionit
- D) Faza latente

55. Cila fazë e aktivitetit të lindjes është më e gjatë?

- A) Dytë
- B) Katërt
- C) Parë
- D) Tretë

56. Faza e dytë e lindjes nis me:

- A) 1 - 2 orët e para pas daljes së placentës
- B) Dilatacionin komplet dhe përfundon me lindjen e infantit
- C) Fillimin e hapjes dhe zbutjes së cerviksit
- D) Lindjen e infantit dhe përfundon me lindjen e placentës

57. Faza e dytë e lindjes nis me:

- A) 1-2 orët e para pas lindjes
- B) Dilatacionin komplet
- C) Lindjen e infantit

D) Me përfundimin e fazës aktive

58. Mami di që faza e parë e lindjes është:

- A) Dalja e placentës
- B) Dilatacioni
- C) Expulsioni
- D) Rikuperimi i gruas

59. Në njësinë e paralindjes mami po ndjek një grua primigravida. Ajo do ta lejojë gruan të shterzojë kur dilatacioni i qafës së mitrës të jetë:

- A) 10cm
- B) 5 cm
- C) 7cm
- D) 8cm

60. Pjesa paraqitëse fetale përshkruhet me vertex kur:

- A) Fytyra futet e para në pelvis
- B) Koka e flexuar futet e para në pelvis
- C) Shrirja fetale është longitudinale
- D) Të ndenjurat me këmbët përvijohen gjatë abdomenit

61. Një grua multipare ka një aktivitet lindje prej 8 orësh. Membranat e saj sapo u rruptuan. Reagimi i menjëhershëm i mami do të jetë:

- A) Dokumentimi i karakteristikave të likidit
- B) Informojë gruan se primare është siguri i shëndetit të saj
- C) Të përgatisë gruan menjëherë për lindje
- D) Vlerësimi i toneve fetale

62. Një gruaje shtatzane me aktivitet lindje i rruptohen membranat amniotike. Veprimi i menjëhershëm i mami do të jetë:

- A) Inspektimi i karakteristikave të likidit
- B) Kryerja e ekzaminimit vaginal
- C) Vlerësimi i RZF-ve
- D) Vlerësimi maternal i T°, P, R dhe TA.

63. Infermiera shoqëron expulsionin e placentës duke administruar oxytocinë për:

- A) Lehtësimin e dhimbjeve
- B) Lehtësuar qëndrimin dhe relaximin
- C) Prevenimin e infeksionit
- D) Stimulimin e kontraksioneve

64. Cilat nga pikat e mëposhtme nuk i tregojnë mamisë shkolitjen e placentës?

- A) Kontraksionet uterine
- B) Ndryshime të TA dhe pulsit
- C) Ndryshimi i formës së uterusit
- D) Shtimi i një sasi hemoragjike

65. Fokusi primar i kujdesjeve infermierore në stadin e katër të lindjes duhet të jetë:

- A) lehtësimi bashkëveprimit të sapolindur- prindër
- B) Prevenimi i infeksionit

- C) Prevenimi i hemoragjisë dhe shokut
- D) Rrijtja e komfortit maternal

66. Gjatë palpimit për të përcaktuar fundusin uterin tek një e sapo lindur, ju vini re se fundusi i saj është i fortë dhe tre gisht gjërësi mbi umbelikus dhe i devijuar. Ju duhet të:

- A) Kontrollosh për shtim të lohjeve
- B) Masazhosh uterusin e fortë
- C) Matësh presionin arterial
- D) Palposh për vezikë urinare të distenduar

67. Pritshmëria e mamisë lidhur me involucionin normal uterin në periudhën post partumit do të ishte, zbritja e uterusit:

- A) 1 cm në ditë
- B) 1 cm në dy ditë
- C) 1 cm në tre ditë
- D) 1 cm në javë

68. Zonja X lindi një djalë të shëndetshëm 5 ditë përpara. Efarë tipi të lochjeve ju shpresoni të shikoni kur ju do të bëni vleresimin e saj?

- A) Lochia serosa
- B) Lochie alba
- C) Lochie nigra
- D) Lochie rubra (te kuqe)

69. Gruaja ju kërkon juve se "vendi i butë" në kokën e djalit të saj, pas sa kohësh do të largohet? Përgjigja juaj është e bazuar në njohuritë tuaja që fantanela anteriore mbyllet në muajin _____ pas lindjes.

- A) 2
- B) 8
- C) 12
- D) 18

70. Gruaja e cila dëshiron të ushqejnë fëmijën me gji, cilat nga pikat e mëposhtme nevojitet të bëjnë?

- A) Nuk nevojitet ndonjë përgatitje speciale
- B) Të fshij me peshqir thithat edo ditë
- C) Të laj thithat me ujë e sapun pas edo ushqyerje
- D) Të lyej thithat me ndonjë pomadë

71. Gruaja e cila ushqen fëmijën e saj me qumësht gjiri, paraqet se ka nevojë për më shumë informacion lidhur me kujdesin e gjirit nëse ajo:

- A) Lan areolën dhe thithën e edo gjiri me ujë të ngrohtë
- B) Aplikon cremin me vitaminë E ne thithat dhe areolat vetëm përpara ushqyerjes së bebit
- C) Shmang përdorimin e sapunit në thithat dhe areolat
- D) Përdor kulloshtren ose qumështin për të zbutur dhe mbrojtur thithat dhe areolat

72. Gruaja e cila është diagnostikuar me mastit dhe merr antibiotikë duhet të:

- A) Fillojë duke e ushqyer bebin fillimisht me gjirin e painfektuar
- B) Ndërpresë ushqyerjen e fëmijës me gji
- C) Ruaj laktacionin duke shtrydhur dhe shkarkuar qumështin me pompë

D) Ushqejë bebin e saj me gjirin e painfektuar

73. Mjeku porositi, që gruas ti bëhet Rhogama pas lindjes. Mami duhet ta administrojë atë, jo më vonë se ____ orë pas lindjes së fëmijës.

- A) 12
- B) 24
- C) 48
- D) 72

74. Substance abuzuese gjatë barrës e cila shkakton vasoconstriction dhe ulje të perfuzionit placentar si rezultat i komplikimeve maternale dhe fetale është:

- A) Alkooli
- B) Ekokollata
- C) Duhani
- D) Kafeina

75. Dhimbja e fortë e kokës në tremestrin e tretë të shtatzanisë, mund të jetë shenjë paralajmëruese për:

- A) Dehidratim
- B) Hypertension
- C) Lodhje
- D) Pamjaftueshmëri ushqimi

76. Hipertensioni kalimtar është:

- A) Hipertension me edemë të gjeneralizuar, që zhvillohet pas 20 javë gravidancë ose pas lindjes
- B) Hipertension me proteinuri, që zhvillohet pas 20 javë gravidancë ose menjëherë pas lindjes
- C) Hipertension që krijohet gjatë barrës, ose 24 orë pas lindjes pa edemë, pa proteinuri
- D) Zhvillimi i hipertensionit gjatë shtatzanisë dhe që kalon pas lindjes së infantit

77. Eklampsia është:

- A) Hipertensioni i zhvilluar menjëherë pas lindjes
- B) Prania e hipertensionit para 20 javësh gravidancë
- C) Prania e hipertensionit pas 20 javësh gravidancë
- D) Preeklampsi plus konvulsione, koma ose të dyja

78. Znj. X ka eklampsi. Detyra e parë e mamisë është:

- A) Administrimi i O₂ me maskë
- B) Aspirimin e përmbajtjes së gojës për të prevenuar kalimin në rrugën e frymëmarrjes
- C) Të fusë ajër në rrugë orale
- D) Të qëndrojë me pacienten dhe të telefonojë për ndihmë

79. Znj. X është primipare, është monitoruar në klinikën e saj prenatale për HT të induktuar nga barra. Cila nga pikat e mëposhtme do të jetë shqetësuese për infermierën e saj?

- A) Apo një edemë e këmbës me ++
- B) Një proteinuri prej 400mg në 24 orë
- C) Një rritje e tensionit diastolik prej 10mmhg
- D) Një rritje e tensionit sistolik prej 25 mmhg

80. Zonja X është duke marrë përfuzion me MgSO₄ për trajtimin e preeklampsisë së rëndë. Në vlersimin infermieror, infermiera përcakton shenjat vitale: T 37.3°C, P 88, R 10,

TA 148/90 mm Hg, mungesë të refleksit patelar. Pacientja ankon për etje të shtuar e afshe të nxehta.

- A) Dhënie e oksigjenit
- B) Infermieria kërkon për të përcaktuar nivelin e MgSO₄
- C) Pergatitet për dhënie e hidralazinës
- D) Pergatitet për administrimin e Ca glukonatit

81. Znj. X shtrohet në spital për të stimuluar lindjen për arsye të HT të induktuar nga barra. Analizat laboratorike tregojnë vlerën e trombociteve 90.000, rritje të transaminazave dhe ulje të hematokritit. Infermierja njofton mjekun se rezultatet laboratorike tregojnë për:

- A) HELLP sindrom
- B) K.I.D.
- C) Preeklamsi
- D) Trombocitopeni idiopatike

82. Infermierja po merr anamnezën e znj. X gjatë vizitës së parë prenatale kur gruaja rezulton 10 javë me barrë. Cila prej pikave të mëposhtme tregon që znj. X është në rrezik për zhvillimin e diabetit gestacional gjatë kësaj barre?

- A) Ajo është 28 vjeçe
- B) Fëmija i parë i saj ka lindur me seksio
- C) Në anamnezën familjare rezulton diabet i tipit të I-rë
- D) Pesha e fëmijës së fundit në lindje ka qënë 4530gr.

83. Konsultimi para konceptimit është i rëndësishëm për përfundimin e shtatzanisë tek gruaja me diabet, për shkak se kontrolli i dobët i glicemisë para dhe në periudhën e hershme të barrës shoqërohet me:

- A) Anomali kongenetale të fetusit
- B) Episode të shpeshta të hypoglicemisë amtare
- C) Hyperemesis gravidarum
- D) Polihydramion

84. Gjatë vizitës prenatale infermierja i shpjegon dietën Znj. X me diabet pregestacional. Infermierja vleron që instruksioni i saj ka qënë efektiv, kur zonja X thotë:

- A) Dieta dhe insulina duhet të ndryshojë gjatë barrës
- B) Unë do të planifikoj dietën në bazë të nivelit të glukozës
- C) Unë do të vazhdoj me të njëjtën dietë si përpara barrës, për aq kohë sa ajo do të jetë e mirë balancuar
- D) Unë do të jetë e nevojshme të marrë më shumë se 600 kalori në ditë që nga momenti që jam shtatzanë

85. Një grua paraqitet në departamentin e urgjencës duke ankuar për gjakrrjedhje dhe crampe. Fillimisht infermierja i merr anamnezën për menset e fundit, të cilat ajo i kishte patur 6 javë më parë. Me një speculum steril ekzaminohet me kujdes dhe shihet që columi është i mbyllur. Plani i kujdesit në këtë grua do të bazohet në diagnozën e cilit tip të abortit?

- A) I paevitueshëm
- B) Incomplet
- C) Rrezik aborti
- D) Septik

86. Znj. D. është 13 jave shtatzanë. Ajo ankon për dhimbje në fund të barkut dhe hemoragji. Gjatë ekzaminimit vaginal, mjeku konstaton se gruaja ka shkurtim të qafës së mitrës dhe dilatacion të saj. Cili lloj aborti është ky:

- A) Abort progredient
- B) Abort i komplet
- C) Mised abort
- D) Rrezik aborti

87. Gruaja është në javën e tetë të shtatzanisë. Gjatë ekzaminimit me ultrasaund mjeku nuk arrin të kapë RZF. Në këtë rast kemi të bëjmë me:

- A) Abort habitual
- B) Abort i komplet
- C) Abort të paevitueshëm
- D) Missed abort

88. Një grua 10 javë shtatzanë merr në telefon shërbimin prenatal dhe i referon se ajo ka hemoragji vaginale. Cila duhet të jetë përgjigjia fillestare e infermieres:

- A) Ndoshta ju keni abortuar. Sill me vete të gjitha garzat apo lineset dhe hajde në klinikë tani.
- B) Përshkruaj sasinë e hemoragjisë, karakteristikat dhe kohën e gjakrrjedhjes (sa kohë ka zgjatur hemoragjia)
- C) Të rrijë regjim shtrati dhe nëse hemoragjia vazhdon të lajmërojë menjëherë
- D) Të vijë në klinikë sa më shpejt të jetë e mundur me qëllim që të vizitohet

89. Një grua gravide 8 javëshe paraqet rrezik aborti. Kush është trajtimi i duhur për këtë lloj aborti:

- A) Përgatitja e gruas për t'ju bërë dilatacionin e kyretazhi
- B) Vendosja e gruas në regjim shtrati për disa ditë dhe rivlerësimi i saj
- C) Përgatitja e gruas për ekzaminim ekografik për të parë integritetin e sakusit gestacional
- D) Qetësimi i gruas duke i treguar asaj që edhe n.q.se e humbet këtë fëmijë ajo mund të ngelet përsëri shtatzane pas një muaji.

90. Manifestimi klinik i placenta previas që e dallon nga distako placenta është prezenca e:

- A) Aktivitetit uterin
- B) Crampeve
- C) Dhimbjes
- D) Hemoragjisë

91. Gjatë aplikimit të forcepsit infermiere-mamia duhet:

- A) Të ndjehet R.Z.F.
- B) Të ndjehet T.A.
- C) Të vlersojë pulsën amtar
- D) Të vlersojë T°

92. Kur vendoset forcepsi dilatacionin duhet të jetë:

- A) 6 - 7 cm
- B) 7 - 8 cm
- C) 10 cm
- D) Mbi 10 cm

93. Polihydramion kemi kur sasia e likidit amniotic është:

- A) 1000 ml
- B) 500 ml
- C) 1500 ml
- D) Mbi 2000 ml

94. Nëse gruaja ka një lindje në javën e 41 të shtatzanisë së saj, efarë lloj lindje ajo duhet të konsiderohet:

- A) Pretermë
- B) Termë
- C) Postermë
- D) Gestacinale

95. Nëse gruaja ka një lindje në javën e 38 të shtatzanisë së saj, efarë lloj lindje ajo duhet të konsiderohet:

- A) Pretermë
- B) Termë
- C) Postermë
- D) Gestacinale

96. Nëse gruaja ka një lindje para javës së 36 të shtatzanisë së saj, efarë lloj lindje ajo duhet të konsiderohet:

- A) Pretermë
- B) Termë
- C) Postermë
- D) Gestacinale

97. Shtatzania e zonjës x kalon kufirin e 42 j. Në këtë situatë mamia mendon se fetusi i kësaj zonje është i rrezikuar për:

- A) Makrosomi
- B) Malprezentacion
- C) Polihydramion
- D) Sepsis fetal

98. Shënja që një grua shtatzane ka aktivitet të parakohshëm lindje mund të jetë:

- A) Dhimbja që shoqëron kontraksionet uterine është e fortë, konstante dhe lokalizohet në pjesën e sipërme të barkut, në fundusin uterin
- B) Kontraksionet uterine zgjasin të paktën 20 minuta
- C) Kontraktime uterine të cilat ndodhin me një frekuencë prej katër kontraksionesh në 1 orë
- D) Shkurtimi qafës së mitrës deri në 80% edhe dilatacioni 2 cm.

99. Një grua shtatzanë, në javën e 32 të shtatzanisë është përcaktuar të jetë me rrisht për lindje pretermë. Një shenjë, që të ndodhë lindja pretermë do të jetë:

- A) Dhimbja që shoqëron kontraksionet uterine është e fortë dhe konstate
- B) Dilatacioni cervikal është më shumë se 1 cm
- C) Kontraksionet uterine i kemi me një frekuencë, 4 kontraksione në një orë
- D) Përgatitja e qafës mitrës (zbutaja) dhe shkurtimi i saj 25%

100. Një grua e hospitalizuar për aktivitet të parakohshëm po merr MgSO₄ i/v. Rezultati i pritshëm për këtë trajtim do të jetë n.q.s:

- A) Ataket eklamptike nuk do të ndodhin
- B) Kontraksionet uterine ndalohen
- C) Mushkrittë e të porsalindurit fillojnë prodhojnë surfaktant
- D) Nuk ndodh plasja e parakohshme e membranave

101. Mamia duhet të kryej testin nitrazinës për të:

- A) Përcaktuar nëse gjaku është prezent në likidin amniotik
- B) Dalluar likidin amniotik nga urina duke testuar pH
- C) Bërë ndryshimin mes feeve maternale dhe meconiumit
- D) Përcaktuar veeoritë e gravitetit të uterusit

102. Zonja X është 23 javë shtatzanë. Ajo ju telefonon dhe ju thotë se mendon që ka rrjedhje të ujrave nga vagina. ju do ti thoni asaj:

- A) Hajdeni menjëherë në klinikë
- B) Më telefono pas 2 h dhe më trego nëse ka ndryshime të rrjedhjeve
- C) Ne mund të presim deri në vizitën tjetër të radhës
- D) Për sa kohë që bebi lëviz ju mos u shqetësoni

103. Kur gruas i plasin membranat amniotike parakohe mamia duhet të vlersojë T° çdo:

- A) 1 orë
- B) 4 orë
- C) 6 orë
- D) 8 orë

104. Gruaja paraqitet në klinikë dhe ankon për dhimbje (kontraksione). Mamia mendon për aktivitet të parakohshëm atëherë kur:

- A) kontraksionet janë çdo 30 min dhe zgjasin 90 sek
- B) Kontraksionet janë çdo 5 min dhe zgjasin 30 sek
- C) Kontraksionet janë të çrregullta në intervale të ndryshme kohore
- D) Kontraksionet janë të çrregullta, por të forta

105. Znj x është 36 javë shtatzanë. Ajo referon se ka dhimbje shpine, si dhe dhimbje me forcim të barkut. Infermiera në këtë rast vlerson kontraksionet uterine për rreth:

- A) 5 min
- B) 10 min
- C) 15 min
- D) 30 min

106. Pozicioni më i pershtatshëm që ju i rekomandoni gruas shtatzanë pas plasjes së membranave është në:

- A) Dekupitus dorsal
- B) Dekupitus lateral dextra
- C) Dekupitus lateral sinistra
- D) Pozicioni drejt qëndrim

107. Kur infermiere mamia bën planifikimin e kujdesit për gruan të cilës i kanë plasur membranat amniotice, ajo arsyeton që gruaa është e rriskuar për:

- A) Hemoragji
- B) Hypotension në pozicion shtrirë me shpinë
- C) Infeksion intrauterine

D) Lindje precipitoze

108. Menjëherë pas lindjes, gjatë vlersimit që infermieria i bën gruas vë re që fundusi uterin është i squllur dhe ka gjakrrjedhje të madhe. Etiologjia më e mundëshme e kësaj gjakrrjedhje është:

- A) Atonia e uterusit
- B) Hematoma vaginale
- C) Inversioni uterin
- D) Laceracioni vaginal

109. Hemoragjitë e vona të post partumit shkaktohen nga:

- A) Atonia uterine
- B) Mbetjet e fragmenteve placentare
- C) Multipariteti i madh
- D) Zgjatje e aktivitetit të lindjes

110. Pas lindjes, gjatë ekzaminimit të zonjës X ju konstatoi se brënda 15 min linesi i saj arrin të saturohet plotësisht. Veprimi i parë infermier që ju ndërmerni është:

- A) Kontrolloni shënjat vitale
- B) Lajmëroni mjekun
- C) Palponi fundusin uterin
- D) Rrisni marrjen e likideve i/v

111. Zonja X është 25 vjeç. Ajo ka 2 gravidanca, dhe 2 lindje, njëren prej të cilave e pati para 4 orësh ku lindi një fëmije mashkull me peshë 4150gr induktimi i kësaj lindje u bë me oxytocinë. Gruaja vendos të lajmërojë menjëherë infermierën pasi ka shumë gjakrrjedhje. Shkaku i mundshëm i një postpartumi hemoragjik në këtë kliente mund të jetë:

- A) Atonia uterine
- B) Infeksioni puerperal
- C) Laceracion vaginal i pariparuar
- D) Mbetje të fragmenteve placentare

112. Pas lindjes gruaja ka hemoragji të vazhdueshme në sasi të pakët, fundusi uterin i kontraktuar. Kjo vjen si pasojë:

- A) Atonisë së uterusit
- B) Laceracionit të columit
- C) Mbetjeve të fragmenteve placentare
- D) Mbetjeve të membranave amniotike

113. Hemoragjia e hershme e postpartumit (hemoragjia që ndodh brenda 24 orëve të para të pas lindjes) ka më pak gjasa të ndodhë si rezultat i:

- A) Atonin uterine
- B) Formacioneve të hematomave
- C) Laceracionet e labieve, perineumit, vaginës ose cerviksit
- D) Subinvolucionin e uterusit

114. Shkaqet më të shpeshta të subinvolucionit janë:

- A) Barra multiple dhe hemorragjia postpartum
- B) Hemoragjia postpartum dhe infeksioni
- C) Kontraksion persistent dhe mbidozim me oxytocinë

D) Mbetje e fragmenteve placentare dhe infeksioni

115. Katër orë pas një aktiviteti dhe lindje të vështirë, një grua primipare refuzon të ushqejë beben e saj. Ajo është gjithashtu e lodhur dhe nuk dëshiron të flejë. Mamia duhet:

- A) Ta vlersoje si një lodhje e një faze të vështirë
- B) Ta rregjistroje si qëndrim joefektiv i ndërldhjes nënë - fëmijë
- C) Ti thotë gruas që ajo mund të pushojë pasi ushqen beben e saj
- D) Të ktheje bebin në infermieri, duke siguruar gruan që pushimi i saj është prioritet në këtë fazë

116. Gratë në postpartum përjetojnë rrisht të lartë për infeksion të traktit urinar. Për të prevenuar këto infeksione mamia duhet t'u mësojë grave në postpartum që:

- A) Aciditeti i urinës kalon duke pirë 3 gota lëng portokalli edo ditë
- B) Kryerja e një kujdesi perineal sistematik duke zbatuar parimet bazë
- C) Të boshatisë vezikën edo 4 orë gjatë gjithë ditës
- D) Të vazhdojë të marrë likide 1-2 litra cdo ditë

117. Një grua shtatzanë për herë të parë lind dy binjakë në javën e 37 të shtatzanisë. Përshkrimi korrekt i anamnezës obstetrikale të gruas do të jetë:

- A) Multigravida, multipara
- B) Multigravida, primipara
- C) Primigravida, multipara
- D) Primigravida, primipara

118. Barra binjake shpesh:

- A) Kalon ditën e lindjes
- B) Con ne lindje premature
- C) Nuk e ka të parashikueshme kohën e lindjes
- D) Shkon deri në term

119. Shtimi në peshë i pritshëm për gruan shtatzanë me binjakë është:

- A) Më pak se të kishte një fetus
- B) Më shume se të kishte një fetus
- C) Varet se sa janë zhvilluar fetuset
- D) Është e njëjtë si të kishte një fetus

120. Për të prevenuar komplikacionet shumë specialistë rekomandojnë regjimin e shtratit për barrat binjake të fillojë në:

- A) 16 javë të shtatzanisë
- B) 20 javë të shtatzanisë
- C) 28 javë të shtatzanisë
- D) 30 javë të shtatzanisë

121. Bradikardia fetale është më shumë e zakonshme gjatë:

- A) Administratimit tokolitik
- B) Anemisë fetale
- C) Infeksionit intraamniotik
- D) Zgjatjes së kompresionit të cordonit umbilical

122. Takikardia fetale është më shumë e zakonshme gjatë:

- A) Administratimit me MgSO₄
- B) Anestezisë regionale
- C) temperatura maternale
- D) Prolapsit të kordonit umbilikal

123. Infermiera duhet të assistojë lindjen në pozicionin këmbë - duar kur:

- A) Ka prolaps të kordonit
- B) Membranat janë rupturuar
- C) Oxyputi i fetusit është në pozicionin anterior
- D) Prezentacioni i fetusit është me podiume

124. Në pranim të obstetrikës vjen një grua me dhimbje shumë të forta barku. Gjatë vlerësimit që bën mamia vë re se gruaja pavarësisht dhimbjeve nuk ka kontraksione uterine. Ajo është shumë e zbehtë, ka puls të përshpejtuar, si dhe hemoragji të pakët vaginale. Në këtë rast mamia menjëherë dyshon për:

- A) Distako placentë
- B) Distoci uterine
- C) Placenta previa
- D) Rupturë të uterusit

125. Disfunksioni uterin hipertonic zakonisht ndodh në fazën:

- A) Aktive
- B) E expulsionit
- C) E tranzicionit
- D) Latente

126. Cila nga vlersimet e mëposhtme nuk është e lidhur me prezentacionin me podiume?

- A) Prania e mekoniumit në likidin amniotik
- B) Lindja parakohe e femijes
- C) Degjimi RZF kuadratin e jashtëm abdominal
- D) Kalimi i dates se parashikuar të lindjes

127. Znj. E. ka shtatzaninë e saj të parë. Ajo ka një aktivitet lindje prej 15 orësh. Dy orë përpara në ekzaminimin vaginal shihet se cerviksi është dilatuar 5cm dhe columi është zhdukur plotësisht, pjesa prezantuese është në stacionin 0. Në vizitën vaginale të kryer pas 2 orësh vihet re se nuk ka ndryshime. Cili model i aktivitetit anormal është i lidhur me këtë përshkrim?

- A) Arrest i fazës aktive
- B) Fazë aktive e zgjatur
- C) Zbritje e zgjatur
- D) Zgjatja e fazës latent

128. Kur vlerësohet një grua për diskomfort menopauzal, diskomforti i raportuar më shpesh është:

- A) Afshet e nxehta
- B) Dhimbja e kokës
- C) Ndryshim i humorit
- D) Thatësia e vaginës

129. Cila nga pikat e mëposhtme është faktor rrishtës për osteoporosis?

- A) Marrja e pakët e proteinave

- B) Obeziteti
- C) Raca
- D) Trup i dobët

130. Një grua ankon për dhimbje të forta barku e pelvike rreth periudhës së zakoneve, e cila e ka përkeqsuar gjendjen e saj në 5 vitet e fundit. Ajo gjithashtu ankon për dhimbje gjatë mardhënieve seksuale dhe është përpjekur që të ngelet shtatzanë 18 muajt e fundit por pa sukses. Këto simptoma kanë më tepër mundësi të lidhen me:

- A) Dismenorrenë primare
- B) Dismenorrenë sekondare
- C) Endometriozen
- D) Sindromi premenstrual

131. Kur një femer consultohet për dismenorrhea primare, cilat nga ndërhyrjet e më poshtme jo farmakologjike do të përdoret?

- A) Mos bërja e ushtrimeve gjatë periudhës menstruale
- B) Përdorimi i kompresave të ngrohta për të lehtësuar crampet
- C) Shmugia e mardhënieve seksuale gjatë ditës së parë të menseve
- D) Shmangia e cafeinës gjatë periudhes menstruale

132. Me amenorre kuptojmë:

- A) Fluks i pakët menstrual
- B) Fluks i shtuar menstrual
- C) Menstruacione të dhimbshme
- D) Mungesë e menseve

133. Dhimbja e fortë, akute jo menstruale lidhet me:

- A) Cisti ovarial i rupturuar
- B) Dismenorrheanë primare
- C) Dispozitivin Intra- Uterin
- D) Sëmundjet malinje të ovareve

134. Dhimbja menstruale rekurente dhe në mënyrë periodike lidhet me:

- A) Cistet ovariale
- B) Dismenorrhea (primare, sekondare)
- C) Sëmundjet inflamatore pelvike akute
- D) Sëmundjet malinje të uterusit

135. Gjatë intervistës me një zonjë 31 vjeçare, mamia përpara ekzaminimit rutinë, mbledh të dhëna rreth ciklit të fundit menstrual. Ajo duhet të mbledhë informacion shtesë, në rastin kur gruaja përkrahet:

- A) rrjedhje shumë të shtuara
- B) sasi të vogël spottingu mes periodave
- C) Gjatësinë e ciklit menstrual nga 26 deri 29 ditë
- D) Rrjedhje menstruale më pak se 5-6 ditë

136. Në terapinë me estrogen të grave, ju do të përfshini rrezikun ndaj këtij trajtimi për:

- A) Cancer cervikal
- B) Cancer endometrial
- C) Cancer ovarian

D) Osteoporozis

137. Znj. X është diagnostikuar me fibromiom uterin. Kur bëhet plani i kujdesit infermierja duhet të dijë që:

- A) Janë fibromiomat tumore malinje të uterusit
- B) Rriten fibromiomat zakonisht mbas menopauzës
- C) Rritja e fluksit menstrual është një simptomë e zakonshme
- D) Barra mund të ndodhë në uteruset me fibromion

138. Amenorrea hypogonadotropike nuk shkaktohet nga:

- A) Humbje e shpejtë e peshës
- B) Kontraceptivet oralë
- C) Stresi
- D) Ushtrime të forta

139. Cila prej simptomave të mëposhtme të përshkruara nga një grua është karakteristike për sindromin premenstrual (SPM)?

- A) Unë filloj të kem fryrje barku dhe dhimbje gjoksi kur më fillojnë zakonet
- B) Unë kam dhimbje të forta të barkut rreth ditës së tretë të zakoneve
- C) Unë kam nauze, dhimbje koke pas fillimit të zakoneve
- D) Unë ndjehem e irrituar 1 javë -10 ditë para fillimit të menstruacioneve

140. Zonja X është 29 vjeç. Ajo ka qënë e diagnostikuar për lindje preterme, e cila u mbajt nën kontroll me preparate tokolitikë. Zonja kërkon të dijë kur ajo do të jetë në gjendje të shkojë në shtëpi:

- A) Pasi bebi të lindë
- B) Nëse i sigurohet një infermiere për ta kontrolluar
- C) Varet nga shtrimet në spital
- D) Edo kohë që ajo vetë të vendosë

141. Uterusi është një organ muskolor në formë dardhe që përgjigjet për:

- A) Ciklin menstrual
- B) Prodhimin e hormoneve seksuale
- C) Fertilizimin
- D) Zgjimin seksual

142. Për arsye të efekteve të ciklit ovarian në ndryshimet e gjirit, koha më e mirë për të bërë vet-ekzaminimin e gjirit është:

- A) 5 - 7 ditë pas përfundimit të menseve
- B) Ditën e parë të ciklit endometrial
- C) Në mes të ciklit menstrual
- D) Edo kohë është e përshtatshme

143. Volumi i likidit amniotic është një faktor i rëndësishëm në vlersimin të mirëqënies fetale. Oligohydramioni (më pak se 300 ml likid amniotic) lidhet me cilën nga anomalitë fetale:

- A) Renale
- B) Kardiake
- C) Gastrointestinale
- D) Neurologjike

144. Mensturacioni është gjakrrjedhje uterine periodike:

- A) Që ndodh edo 28 ditë
- B) Në të cilën bie shtresa e brendshme e uterusit
- C) Që rregullohet prej hormoneve ovarialë
- D) E cila drejton fertilizimin

145. Për të planifikuar familjen çifti vendos të përdorë metodën natyrore. E rëndësishme për ta është të dinë sa është jetëgjatësia e vezës pas ovulacionit. Mami vëre se mësimdhënia e saj ka qënë efektive kur eifti përgjigjet se jetëgjatësia e vezës është:

- A) 1 - 3 ditë
- B) 3 - 5 ditë
- C) 5 - 7 ditë
- D) 7 - 9 ditë

146. Gjatë instruksionit në lidhje me nivelet e dëshiruara të glukozës kur flitet për diabet gestacional, infermierja shpjegon nivelet e glukozës si p.sh. para ushqimit të cilat janë:

- A) 60-90 mg/dl
- B) 90-120 mg/dl
- C) 110-150 mg/dl
- D) 150-180 mg/dl

147. Znj x është 3 muajshe me barrë. Në vizitën e saj prenatale, ajo i thotë mami se nuk e kupton se çfarë po i ndodh: një minutë ajo është e lumtur që është shtatzanë dhe minutin tjetër ajo qan pa arsye. Cila prej përgjigjeve të mëposhtme të dhëna nga mami është më e përshtatshme?

- A) Është e zakonshme të kesh ndryshime të shpejta emocionale gjatë shtatzanisë
- B) Ju keni biseduar me partnerin tuaj rreth këtij problemi?
- C) Ju vertetë nuk e dëshironi këtë shtatzani?
- D) Mos u shqetëso ju do të ndjeheni më mirë brënda muajit

6. Neonatologji (Pediatri)

1. Transpozicioni i vazave të medha nenkupton:

- A) komunikim ndermjet atriumeve
- B) komunikim ndemjet ventrikujve
- C) aorta që del nga ventrikuli i djathtë
- D) ventrikul unik

2. Cili quhet femije premature?

- A) ai që lind <37 jave moshe barre
- B) ai që lind >42 jave moshe barre
- C) ai që lind =20 jave moshe barre
- D) Ai që lind midis 37-41 jave moshe barre

3. Ikteri fiziologjik shfaqet:

- A) ditën e parë të jetës
- B) ditën e tretë të jetës
- C) ditën e dhjetë të jetës
- D) muajin e parë të jetës

4. Ikteri nga papjtueshmeria e rhezusit shfaqet:
- A) ditën e parë të jetës
 - B) ditën e tretë të jetës
 - C) ditën e dhjetë të jetës
 - D) muajin e parë të jetës
5. Kernikter ose ikteri nuklear prek:
- A) aparatën gastro-intestinal
 - B) aparatën lokomotor
 - C) berthamat nukleare të trurit
 - D) aparatën kardio-respirator
6. Neonati nuk vendoset në gjë kur nëna është e sëmurë nga:
- A) rubeola
 - B) meningiti
 - C) HIV-Aids
 - D) tetanozi
7. Oftalmi është shenja më e zakonshme dhe më e shpëshhtë e:
- A) tetanozit
 - B) gonorese
 - C) sifilizit
 - D) rubeoles
8. Kush nga detreset e mëposhtme nuk quhet "detres kirurgjikal"?
- A) hernia diafragmale
 - B) sëmundja e membranave hialine
 - C) atrezia e koanave
 - D) atrezia e ezofagut
9. Ventrikuli unik ben pjesë në:
- A) kardiopati cianogjene
 - B) kardiopati jocianogjene
 - C) Kardiopati komplekse
 - D) Tetrada Fallo
10. Apgari nuk vlerësohet nëpërmjet:
- A) ngjyres së lekures
 - B) frekuencës respiratore
 - C) frekuencës kardiake
 - D) thithje-gëlltitjes
11. Përbëjnë kundërrindikacion absolut për ushqyerjen me gjë të gjitha më përjashtim të:
- A) HIV i nënës
 - B) Insuficiencë kardiake e dekompesuar e nënës
 - C) TBC aktiv i nënës
 - D) ragadët e gjirit të nënës
12. Pikezimi i Apgarit është:
- A) sëmundje ngjitëse e neonatit

- B) keqformim i lindur
- C) sëmundje e sistemit kardiorespirator
- D) sistem vlerësues i shenjave jetësore të neonatit

13. Ushqyerja ekskluzive me gji duhet te vazhdohet:

- A) dy muaj pas lindjes
- B) kater muaj pas lindjes
- C) gjashte muaj pas lindjes
- D) deri ne vitin e pare te jetes

14. Ne sallën e lindjes veprimi qe duhet bere gjithmone është:

- A) vendos bebin mbi barkun e nenes
- B) largoje ne nje dhome me vete
- C) mbaje larg nga ambjenti ku rri nena
- D) mos I jep informacion nenes

15. Ne sallën e lindjes ekipi neonator duhet te njoftohet:

- A) 30 minuta para lindjes
- B) ne momentin e lindjes
- C) pas lindjes
- D) nuk është e nevojshme te jene ne salle

16. Cila nga ekzaminimet e meposhtme laboratorike na tregon per nivelin e ikterit?

- A) bilirubinemia
- B) azotemia
- C) glicemia
- D) sediment

17. Bebi i porsalindur vendoset ne gji:

- A) menjehere pas lindjes
- B) ditën e pare pas lindjes
- C) tre ditet e par ate lindjes
- D) javën e pare pas lindjes

18. Pikezimi i Apgarit kryhet:

- A) ne minute e pare te jetes
- B) ne minute 0 te jetes
- C) 30 minutat e para
- D) ditën e pare te lindjes

19. Dhëmbët e qumështit zëvendësohen me dhëmbët e përhershëm:

- A) Rreth moshës 3-4 vjeç
- B) Rreth moshës 4-5 vjeç
- C) Rreth moshës 6-7 vjeç
- D) Rreth moshës 8-9 vjeç

20. Faktorët e jashtëm që ndikojnë në rritje e zhvillim janë të gjithë me përjashtim të:

- A) Kushtet social-ekonomike
- B) Klima tropikale
- C) Sëmundjet kronike pas lindjes

D) Faktorët gjenetikë

21. Fëmija e dyfishon peshën e lindjes në moshën:

- A) 1 vjeç
- B) 8 muaj
- C) 10 muaj
- D) 5 muaj

22. Vitamina D merr pjesë në:

- A) mineralizimin e kockës
- B) aktivitetin nervor
- C) pjekurinë seksuale
- D) ematopoezë

23. Fëmija e trefishon peshën e tij në moshën:

- A) 8 muaj
- B) 1.5 vjeç
- C) 2 vjeç
- D) 12 muaj

24. Ikteri i të porsalindurit mund të jetë:

- A) Ikter nga infeksioni
- B) Ikter hemolitik
- C) Ikter fiziologjik
- D) Mund t'i ketë të gjitha origjinat

25. Gjatësia e fëmijës në lindje është rreth:

- A) 50 cm
- B) 40 cm
- C) 30 cm
- D) 60 cm

26. Faktorët e brendshëm që ndikojnë në rritje e zhvillim janë të gjithë me përjashtim të:

- A) hormoneve seksuale
- B) kushteve social-ekonomike
- C) hormoneve e tiroides
- D) hormoni somatotrop

27. Encefalopatia bilirubinike tek një fëmijë në term shfaqet kur vlera e bilirubinës serike arrin në:

- A) ≥ 18 mg/dl
- B) ≥ 10 mg/dl
- C) ≥ 15 mg/dl
- D) ≥ 20 mg/dl

28. Infeksioni neonatal nuk ka të vërtetë:

- A) hipotermi
- B) hipoglicemi
- C) hipobilirubinemi
- D) ulje të frekuencës kardiake

29. Vlerësimi i Apgarit nuk përfshin:

- A) frekuencën kardiake
- B) tonusin muskular
- C) frekuencën respiratore
- D) reflekset primare

30. Shkaktojnë keqformime të lindura të gjitha, me përjashtim të:

- A) rubeola kongenitale
- B) toksoplazmoza kongenitale
- C) CMV kongenital
- D) hepatiti B kongenital

31. Mund të jenë shenja klinike të një infeksioni neonatal të gjitha, me përjashtim të:

- A) hipotermi
- B) hiperglicemi
- C) hepatosplenomegali
- D) bombim i fontanelës

32. Kern ikteri shkaktohet nga:

- A) fiksimi i bilirubinës së palidhur në bërthamat trunore
- B) fillimi i parakohshëm i ablaktacionit
- C) anemia nga mungesa e hekurit
- D) ikteri nga qumështi i gjirit

33. Terapia rehidruese orale është trajtim i zgjedhur për të gjithë fëmijët e dehidruar, me përjashtim të:

- A) të vjella dhe temperaturë e lartë,
- B) koma ose shok,
- C) shigelozë,
- D) helmim ushqimor

34. Ndërlikimi më i shpeshtë i Salmonelozës është:

- A) prolapsi rektal
- B) anemia
- C) dehidrimet e tipeve të ndryshme
- D) meningiti

35. Cili nga ekzaminimet e mëposhtme nuk ka vlerë në shigelozë?

- A) koprokultura
- B) hemokultura
- C) kërkimi për pus e gjak në feçe
- D) gjak komplet

36. Në dehidrimin hipertoni vuan më shumë:

- A) sistemi kardiovaskular
- B) sistemi nervor
- C) trakti tretës
- D) sistemi limfatik

37. Tetanosi neonatal ka të vërteta të gjitha, me përjashtim të:
- A) shkakton sepsis
 - B) shkakton kontraktura muskulare
 - C) shkakton fraktura të kockave
 - D) shkakton trismus
38. Fëmija postmatur është i lindur:
- A) përpara 37 javësh moshë shtatzënie
 - B) me peshë nën 2500 g
 - C) pas javës 42 të shtatzënisë
 - D) nga 37 në 42 javë moshë shtatzënie
39. Mekonium quhet:
- A) qumështi i ditëve të para pas lindjes
 - B) një keqformim i lindur i traktit gastrointestinal
 - C) një sëmundje ngjitëse e transmetuar nga nëna
 - D) jashtëqitja e parë e bebit
40. Doza e Acetaminofenit (Paracetamol) në fëmijë është:
- A) 2 mg/kg për çdo marrje,
 - B) 5 mg/kg për çdo marrje,
 - C) 15 mg/kg për çdo marrje,
 - D) 50 mg/kg për çdo marrje,
41. Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë për stenozen hipertrofike të pilorit:
- A) të vjella që në lindje
 - B) fillon reth muajit të parë
 - C) ka prani të bilës në të vjella
 - D) ka humbje të oreksit
42. Sa është sasia e Tresolit që përdoret për rehidrim oral në dehidrimin e lehtë?
- A) 10 mg/kg peshë
 - B) 20 mg/kg peshë,
 - C) 50 mg/kg peshë,
 - D) 100 mg/kg peshë
43. Forma e dehidrimit (i lehtë-i mesëm-i rëndë) tek fëmija vlerësohet me të gjitha, me përjashtim të:
- A) matja e presionit arterial,
 - B) thellimi i syve,
 - C) dhimbja e kokës,
 - D) niveli i fontanelës së madhe
44. Shkaktarët më të shpeshtë të diarresë në fëmijë (rreth 70% e diarreve) janë:
- A) viruset
 - B) bakteret
 - C) mykrat
 - D) asnjëri

45. Doza e Adrenalinës subkutan për trajtimin e shokut anafilaktik është:
- A) 1 mg për çdo 10 kg peshë,
 - B) 0.5 mg për çdo 10 kg peshë,
 - C) 0.1 mg për çdo 10 kg peshë,
 - D) 10 mg për çdo 10 kg peshë
46. Dhënia e vitaminës K tek i porsalinduri duhet të jetë:
- A) sistematike-e detyrueshme për çdo të porsalindur
 - B) e këshillueshme,
 - C) e panevojshme tek fëmija që ushqehet me gji,
 - D) vetëm në rast hemorragjie të jashtme
47. Sindromi Reye lidhet me përdorimin e:
- A) Aspirinës
 - B) Aminofilinës
 - C) Amfetaminës
 - D) Antibiotikëve
48. Njollat e Koplik-ut janë karakteristike e:
- A) Rubeolës
 - B) Varicelës
 - C) Fruthit
 - D) Skabiesit
49. Ekzantema që shfaqet edhe në lëkurën me flokë flet për:
- A) Rubeolë
 - B) Varicelë
 - C) Fruth
 - D) Skarlatinë
50. Rashi kutan makulo-papulo-vezikular, i shoqëruar me temperaturë të lartë dhe prurit flet për:
- A) Rubeolë
 - B) Varicelë
 - C) Fruth
 - D) Skarlatinë
51. Janë komplikacione të varicelës të gjitha, me përjashtim të:
- A) Qelbëzimi i elementeve kutane
 - B) Sindromi Reye
 - C) Glomerulonefriti
 - D) Herpes Zoster
52. Shenja madhore e glomerulonefritit akut është:
- A) Proteinuria
 - B) Hematuria
 - C) Hipertensioni arterial
 - D) Anemia

53. Për vaksinimin sipas kalendarit të vaksinimit janë të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- A) Është i detyrueshëm për të gjithë fëmijët
- B) Nuk këshillohet të bëhet për fëmijët e lindur para kohe
- C) Ndhmon në krijimin e imunitetit të fëmijës
- D) Për aplikimin e vaksinave duhen respektuar afatet kohore sipas këtij kalendarit

54. Një i porsalindur klasifikohet AGA, kur:

- A) Pësia është midis 3-97% percentile
- B) Gjatësia është midis 3-97 % percentile
- C) Perimetri i kokës është midis 3-97% percentile
- D) Të gjitha

55. Një i porsalindur klasifikohet si SGA kur:

- A) Pësia është nën 3% percentile
- B) Gjatësia është nën 3% percentile
- C) Perimetri i kokës është nën 3 % percentile
- D) Të gjitha

56. Një i porsalindur klasifikohet si LGA kur:

- A) Pësia është mbi 97% percentile
- B) Gjatësia është mbi 97 % percentile
- C) Perimetri i kokës është mbi 97 % percentile
- D) Të gjitha

57. Trajtimi i ikterit përfshin:

- A) ushqyerjen sa më shpesh me gji
- B) fototerapi
- C) eksanguinotransfuzion
- D) të gjitha

58. Një i porsalindur me ikter ka këto shenja klinike:

- A) zverdhje të lëkurës dhe të mukozave
- B) nuk kap gjirin
- C) i plogësht
- D) të gjitha

59. E vjella në refluksin gastro-ezofageal ndodh:

- A) mënjëherë pas ushqyerjes
- B) para ushqyerjes
- C) rreth 1-2 orë pas ushqyerjes
- D) asnjëra

60. E vjella në stenozen hipertrofike të pilorit ndodh:

- A) mënjëherë pas ushqyerjes
- B) para ushqyerjes
- C) rreth 1-2 orë pas ushqyerjes
- D) asnjëra

61. Ushqyerja me gji ka përparësi ndaj asaj me qumësht artificial, sepse:

- A) ka më shumë IgA

- B) ka aminoacide të rëndësishme
- C) rrit lidhjen psiko-afektive nënë-fëmijë
- D) të gjitha

62. Në ekzaminimin e parë të bebit gjithmonë duhet parë:

- A) kalueshmëria anale
- B) kalueshmëria nazale
- C) kalueshmëria ezofago-gastrike
- D) të gjitha

63. Në sallën e lindjes asnjëherë nuk duhet të mungojë:

- A) burimi i oksigjenit
- B) ngrohësi i ambientit
- C) pelenat e ngrohta
- D) asnjëra

64. Një i porsalindur klasifikohet si serotin kur lind:

- A) para javës së 37-të të shtatzanisë
- B) pas javës së 42-të të shtatzanisë
- C) midis 37-41 javë shtatzanie
- D) asnjëra

65. E vjella në stenozen hipertrofike të pilorit është:

- A) përmbajtje qumështi
- B) qumësht i prerë si hirë
- C) më përmbajtje bile
- D) asnjëra

66. E vjella në refluksin gastro-ezofageal është:

- A) me përmbajtje qumështi
- B) qumësht i prerë si hirë
- C) me përmbajtje bile
- D) të gjitha

67. Cilën nga sëmundjet e mëposhtme shfaq më shpejt prematuri:

- A) papjekuri të sistemit respirator
- B) papjekuri të sistemit lokomotor
- C) papjekuri të sistemit nervor
- D) asnjërën

68. Cilën nga sëmundjet shfaq më shpesh prematuri:

- A) papjekuri të sistemit respirator
- B) papjekuri të sistemit gastro-intestinal
- C) papjekuri të sistemit nervor
- D) të gjitha

69. Hipotermia ose temperatura e ulët është karakteristike e:

- A) bebit prematur
- B) bebit hipotrof
- C) bebit serotin

D) asnjëra

70. Përpara një fëmije prematur cilën do të vlerësoni më shumë:

- A) vështirësinë në frymëmarrje
- B) hypogliceminë
- C) hypoterminë
- D) të gjitha

71. Një fëmijë serotin paraqet më së shpeshti:

- A) asfiksi në lindje
- B) vështirësi respiratore
- C) hipoglicemi
- D) të gjitha

72. Një fëmijë që lind SGA paraqet më së shumti:

- A) hypoglicemi
- B) asfiksi në lindje
- C) vështirësi në frymëmarrje
- D) të gjitha

73. Anomalitë e bashkëlindura janë më tepër karakteristike e:

- A) fëmijëve të lindur në term
- B) fëmijëve të lindur SGA
- C) fëmijëve të lindur LGA
- D) asnjëra

74. Një fëmijë që lind LGA paraqet më së shumti:

- A) hypoglicemi
- B) trauma të lindjes
- C) vështirësi në frymëmarrje
- D) të gjitha

75. Përpara një neonati të sëmurë, gjithmonë duhet të bëjmë:

- A) sigurimin e rrugëve ajrore të lira
- B) të ofrojmë oksigjeno-terapi
- C) monitorojmë shenjat vitale
- D) të gjitha

76. Çfarë duhet të shmangim tek një neonat i sëmurë:

- A) banja
- B) ushqyerja
- C) ekzaminimi
- D) të gjitha

77. Çfarë duhet të bëjmë para një fëmije të sëmurë:

- A) të trajtojmë problemin imediat
- B) të gjejmë pse fëmija është sëmurë dhe të trajtojmë shkakun
- C) të monitorojmë çdo faktor rreziku
- D) të gjitha

78. Kemi takikardi neonatale kur:

- A) frekuenca kardiake është <100/min
- B) frekuenca kardiake është >180/min
- C) frekuenca kardiake është 140-160/min
- D) asnjera

79. Kemi takipne neonatale kur:

- A) frekuenca respiratore është <20/min
- B) frekuenca respiratore është >60/min
- C) frekuenca respiratore është 20-60/min
- D) të gjitha

80. Llojet e apnoeve janë:

- A) me origjinë qendrore
- B) me origjinë obstructive
- C) të përziera
- D) të gjitha

81. Ushqyerja me sondë këshillohet tek:

- A) fëmijët që janë <32 javë moshë barre
- B) që kanë vështirësi në thithje-gëlltitje
- C) që kanë një sëmundje akute të frymëmarrjes
- D) të gjitha

82. Kur raporti nënë-fëmijë ecën keq çfarë mund të presim:

- A) braktisje të fëmijës
- B) zhvillim të mangët fizik
- C) crregullime të sjelljes së fëmijës
- D) të gjitha

83. Kush e përmirëson raportin nënë-fëmijë:

- A) të jemi të duruar me prindërit pa përvojë
- B) t'u japim shpresë atyre
- C) t'i lejojmë që të qëndrojnë pa kufizim me fëmijën
- D) të gjitha

84. Mënyra më e përdorshme për matjen e temperaturës tek bebet është:

- A) aksilare
- B) rektale
- C) matja në lëkurën e barkut
- D) të gjitha

85. Një reanimim i suksesshëm varet nga:

- A) parashikimi i një lindje asfiktike
- B) fillimi i menjëhershëm i veprimeve reanimatore
- C) kryerja e veprimeve reanimatore me saktësi
- D) të gjitha

86. Infeksioni neonatal ka si shenja klinike:

- A) konvulsione

- B) hipotoni
- C) çrregullime të ritmit të zemrës
- D) të gjitha

87. Cila nga masat e mëposhtme duhet marrë në një fëmijë me shok anafilaktik të rëndë:

- A) lirimi i rrugëve të frymëmarrjes
- B) oksigjenimi
- C) përdorimi i adrenalinës
- D) të gjitha

88. Obeziteti është:

- A) Një tregues mbiushqyerje
- B) Një tregues nënushqyerje
- C) Një formë malnutricioni
- D) Asnjëra

89. Diarrea nga Shigella karakterizohet klinikisht nga:

- A) diarre me mukus dhe gjak
- B) temperaturë e lartë
- C) dhimbje barku
- D) të gjitha

90. Spazmofilia është pasojë e:

- A) Hipokalçemisë
- B) Hiperkalcemisë
- C) Hipokalçemisë dhe hiperkalcemisë
- D) Asnjëra

91. Spazmofilia paraqitet klinikisht me:

- A) konvulsione parciales-të pjesshme
- B) konvulsione të gjeneralizuara
- C) konvulsione të dukshme ose që provokohen
- D) të gjitha

92. Komplikacionet më të shpeshta të refluksit gastroezofageal janë:

- A) infeksione të përsëritura respiratore
- B) anemia
- C) otiti
- D) të gjitha

93. Kraniotabes është shenjë klinike e:

- A) Rakitit
- B) Hipovitaminozës A
- C) Rakitit dhe hipovitaminozës A
- D) Asnjëra

94. Konvulsionet janë:

- A) urgjencë mjekësore
- B) trajtohen me diazepam-valium
- C) doza=0.5 mg/kg peshë në një marrje/ për rectum

D) të gjitha

95. Disa komplikacione afatgjata të diabetit janë:

- A) dëmtimi i shikimit
- B) dëmtimi i funksionit renal
- C) ulçera trofike kryesisht në këmbë
- D) të gjitha

96. Meningiti i latantit ka:

- A) Konvulsione
- B) Përgjumësi
- C) Apnoe
- D) Të gjitha

7. Infermieristikë Pediatrie, Puerikulture dhe Neonatologjie

1. Aspirimi i lëngut amniotik tek fëmija gjatë lindjes duhet të kryhet jo më shumë se:

- A) 5sek
- B) 10sek
- C) 10min
- D) 15min

2. Pas sa orësh normalizohet temperatura pas lindjes?

- A) 6min
- B) 8min
- C) 5orësh
- D) 8orësh

3. Kush është pozicioni që vendoset fëmija me çrregullime të buzës të lepurit pas operacionit?

- A) shtrirë mbi barke
- B) shtrirë anash
- C) pozicion semifoler
- D) shtrirë me kurriz

4. Pas sa ditësh kthehet në normë faktori i koagulimit mbas lindjes tek fëmija?

- A) 7-10 ditësh.
- B) 12-15 ditësh
- C) 16-19 ditësh
- D) 20-25 ditësh

5. Me çfarë pastrohet mukoza e gojës në fëmijët që është me stenoz të pilorit?

- A) solucion bikarbonat
- B) solucion nitrat
- C) solucion gencian violet
- D) solucion glukoz

6. Edema serosanguine mund të shoqërohet me?

- A) frakture të kafkës

- B) petëkie ose ekimoza
- C) shkollitje të lëkurës
- D) deformin të gojës

7. Cefalofematoma është një hemoragji që ndodh në zonën ndërmjet?

- A) lëkurës dhe kockës
- B) kockës dhe periostit
- C) trurit dhe kockës
- D) periostit dhe trurit

8. Zhvillimi pamor i fëmijës së porsalindur është rreth një gjatësie:

- A) 20 cm
- B) 22cm
- C) 24cm
- D) 28cm.

9. Femija fillimisht kur lind aspirohet nga:

- A) hunda
- B) goja
- C) veshi
- D) syri

10. Gjatë fototerapisë tek eritroblastozen fetale, fëmija duhet të marrë lëngje në ditë:

- A) 20%
- B) 25%
- C) 30%
- D) 35%

11. Kush janë shenjat që fëmija paraqet në një fraktur të klavikulës?

- A) asimetri në refleksin moro
- B) paraliz të krahut
- C) një hemoragji të krahut
- D) demtime të trupit

12. Sa janë vlerat e bilirubinës kur ikteri fiziologjik ka filluar të shfaqet në anësit e poshtme?

- A) 10 mg/dl
- B) 15 mg/dl
- C) 20 mg/dl
- D) 25 mg/dl

13. Paraplegjia prek këto legjione:

- A) Vetëm 1 gjymtyre
- B) Vetëm 1 pjese të trupit
- C) Katr gjymtyret dhe trupin .
- D) 2 kembet dhe trungun e trupit.

14. Faza sensomotore kujt moshe i perket sipas Piazhe:

- A) lindje deri ne 2vjeç

- B) 3 deri në 4 vjeç
- C) 5 deri në 7 vjeç
- D) 8 deri në 10 vjeç

15. Shpirti i inisiatives kundrejt ndjenjës së fajit kujt moshe i perket?

- A) lindje deri 2 vjec
- B) 3-6vjec
- C) 7-11 vjeç
- D) 13-15vjec

16. Rrugët e infektimit të eritrodermis?

- A) Transplacentare
- B) Ushqyerja artificiale
- C) Frymëmarrja
- D) Veshjet

17. Presioni sistolik i gjakut tek infanti:

- A) 15- 20
- B) 30-40
- C) 50-60
- D) 70-90

18. Presioni sistolik i gjakut tek fëmijet e vegjël:

- A) 15-20
- B) 30-40
- C) 50-70
- D) 80-100

19. Presioni sistolik i gjakut tek fëmijet e rritur:

- A) 15-20
- B) 20-40
- C) 50-70
- D) 90-110

20. Shkalla e respiracionit tek infanti:

- A) 10-15
- B) 20-25
- C) 30-40
- D) 50-60

21. Shkalla e respiracionit tek fëmijet e rritur:

- A) 15-20
- B) 30-40
- C) 50-60
- D) 70-80

22. Shënjat klinike kur kemi një ikter të avancur:

- A) fontanela e bonbuar
- B) klithma
- C) dispne

D) takikardi

23. Me çfare shenjash shoqërohet atrezia biliare?

A) distëcion abdominal

B) dhimbje këmbe

C) dhimbje koke

D) nauze

24. Manifastimet klinike të sindromës hemoragjike:

A) gjakosje të umbelikulit

B) dhimbje barku

C) dhimbje këmbe

D) nauze

25. Simptomat e tetanozit neonatal:

A) spazma të muskulaturës së qafës dhe rigiditet

B) të vjella

C) diare

D) dhimbje barku

26. Shenjat klinike të paralizës faciale:

A) nuk mbyll plotësisht syrin

B) nuk merr dot frym

C) nuk lëviz krahun

D) nuk lëviz trupin

27. Sipas Frojdit kujt moshe i perket staid latent:

A) 1-4 vjeç

B) 6-12 vjeç

C) 15-18 vjeç

D) 20-25 vjeç

28. Apneja shoqërohet me:

A) bradikardi

B) dhimbje barku

C) nauze

D) diare

29. Kush janë format që çojnë në hernie umbelikale?

A) shtrëngim ne momentin e jashqitjes

B) dhimbje këmbe

C) dhimbje barku

D) dhimbje koke

30. Kush janë faktorët që kanë lidhje me problemin e sindromës hemoragjike?

A) mungesa e vit K nga nëna

B) mungesa e oreksit

C) nauze

D) diare

31. Paraliza e nervit frenik shkakton paraliz të:
- A) diafragmës
 - B) krahut
 - C) kembës
 - D) barkut
32. Çfarë ndodh në organizëm në fazën e 5 të helmimit nga hekuri?
- A) zhvillohet stënoza e pilorit
 - B) dëmtim të mëlçis
 - C) dëmtim të veshkave
 - D) dëmtim të zemrës V.2
33. Tek kriza vazo-okluzive e drepanocitozes simptomat më madhore janë:
- A) altralgji
 - B) temperaturë
 - C) anemi
 - D) dhimbje
34. Kur epistaksin e kemi nga artëria etmoide ka lidhje më shume me:
- A) traumat
 - B) sëmundjet sistëmiqe
 - C) dëmtime të zemrës
 - D) dëmtime të gojës
35. Në rast se trupi i huaj është i vogël dhe kalibri i bronkut është i madh do kemi këto shenja:
- A) fishkëllim
 - B) vështirësi të frymarrjes
 - C) sekrecione
 - D) dispne
36. Në rast se trupi i huaj ka bere nje bllokim të pjesshem të lymenit do kemi:
- A) Emfizem obstruktive
 - B) Atelektaze
 - C) Pneumotoraks
 - D) Bronkit
37. Kur kemi një infeksion i adenoidit kemi këto shenja kryesore:
- A) dhimbje veshi
 - B) merr frym me gojë
 - C) gjakrrjedhje nga hunda
 - D) gërrhet
38. Respiracioni i pafrytshëm lidhet me:
- A) deficitin e volumit të lëngjeve
 - B) rritjen e kërkesave metabolike
 - C) rritjen e sekrecioneve
 - D) inflamacionin e pemës trakeo-bronkiale
39. Gromerulonefriti akut futët në grupin e sëmundjeve të sistëmit urinar, ku ato do ti quajmë:
- A) reaksion inflamatore

- B) reaktion indor
- C) ulje të imunitëti
- D) sëmundje infektive

40. Në faktorët endokrinologjik tek azma:

- A) tirotoksikoza e përmison azmën
- B) e keqëson gjëndjen
- C) është neutrale
- D) kemi ndikim të fuqishëm

41. Tek azma cilat janë elementë që kanë veprim obstruktiv mbi bronke?

- A) makrofaget
- B) monocidet
- C) bikarbonati
- D) glukonatë

42. Shenjat e intoksikimit nga digoxina:

- A) nauze
- B) lipotëmi
- C) hipoglicemi
- D) anoreksi

43. Tek azma frymarrja e pa frytshme lidhet me:

- A) bllokimin e rrugëve ajrore
- B) përmisimin e sëmundjes
- C) përgjigjja jo e mirë ndaj mjekimit
- D) nga sekretimet e shumta.

44. Azma përfaqëson një:

- A) Dëmtim funksional
- B) Obstruksion të rrugeve respiratore
- C) Sekrecione të shumta
- D) Mjekime jo specifike

45. Haemathrosis është gjakrrjedhje në:

- A) në toraks
- B) në SNQ
- C) në artikulacione
- D) në traktin gastro-intëstinale

46. Parotiti është një sëmundje:

- A) e gjëndrave limfatike
- B) endemike sporadike
- C) enët e gjakut
- D) sistëmin nervor

47. Shkaktari i fruthit është virusi:

- A) virusi RNA
- B) i grupit të herpoviruseve
- C) virusi measles

D) virusi i gripit

48. Në bronkiolit pas hyrjes së virusit kemi këto pasoja:

- A) vështirësi në frymarrje
- B) infiltrim peribronkial
- C) bllokim të anës së prekur
- D) zmadhim të anës së prekur

49. Tipari karakteristik i fibrozës cistike është:

- A) disfunkcion i sipërfaqeve epitëliale
- B) mosfunktionimit të shkëmbimit të brëndshëm të gjëndrave
- C) disfunkcionit të bërthamës qelizore të gjëndrave.
- D) mos oksigjenimi i organizmit

50. Fibroza cistike vjen si pasoje e:

- A) çrregullimi i fluksit hidroelektrolitik midis gjëndrave
- B) çrregullimi i fluksit hidroelektrolitik midis sistëmeve
- C) çrregullimi i fluksit hidroelektrolitik transepitëliale
- D) çrregullimi i fluksit hidroelektrolitik i enëve të gjakut

51. Metodat për përcaktimin e testit për fibrozën cistike bëhet:

- A) mbas muajt të parë të jetës
- B) mbas muajit të gjashtë të jetës
- C) mbas vitit të parë të jetës.
- D) mbas vitit të dytë të jetës

52. Tek fibroza cistike dozat e enzimave do jepen në bazë të:

- A) defiçitit të enzimave
- B) sipas oreksit
- C) sipas harxhimeve në organizem
- D) humbjeve të gjakut

53. Tek të sëmurët me probleme kardiake digogsina shkakton:

- A) redukton të rrahurat e zemrës
- B) rrit të rrahurat e zemrës
- C) neutralizon të rrahurat e zemrës
- D) e ndalon punë e zemrës

54. Shkaku i anemis vjen si pasoje e:

- A) e uljes së masës leukocitare
- B) prodhimit gabim të leukocitëve
- C) uljen e masës eritrocitare
- D) ritjen e masës eritrocitare

55. Në stadin e dytë shiriti i gjedhit migrojnë për në:

- A) mëlçi
- B) mushkri
- C) tru
- D) veshka

56. Mbas sa kohësh kemi ulçeracion të plagës nga pickimi i merimangës e zezë?
A) 3-4 ditë
B) 7-14 ditë
C) 15-20 ditë
D) 22-27 ditë
57. Mbas sa kohësh fillon organizmi të reagoi kur kafshohet nga gjarpëri?
A) 15-20 sek
B) 30-50sek
C) 15-20min
D) 30-40min
58. Veprimet i zgjatur ultralent i insulinës (në rrugë subcutane) kur e ka kulmin:
A) 2-4orë
B) 6-12orë
C) 14-24orë
D) 28-36 orë
59. Sa është dhënia e sasise së lëngjeve për kg/peshe në dehidrimi e lehtë në diare?
A) 25cc
B) 35cc
C) 50cc
D) 100cc
60. Kur fëmija është me të vjella sa lengje duhet të marri në 24 ore per kg-peshe?
A) 50cc
B) 100cc
C) 120cc
D) 200cc
61. Cila është koha që fëmija riinfekton veten me oksiuere?
A) 6-10 orë
B) 3-5 ditë
C) 6-8 javë
D) 10-15 javë
62. Shenja që tregon që fëmija ka askaride?
A) dhimbje abdominale
B) dhimbje muskujsh
C) dhimbje koke
D) dhimbje këmbë
63. Shenjat klinike të Trichinosis?
A) dhimbje koke
B) anemi
C) enjtë të syve
D) dhimbje të këmbeve
64. Manifestimet klinike nga pickimi nga merimanga kafe:
A) petekie e gjeneralizuar

- B) prurit
- C) dhimbje abdominale
- D) anemi

65. Shenjat klinike tek helmimet nga hidrokarburet:

- A) ndryshim e vetëdijes
- B) oliguri
- C) dehidrim
- D) anemi

66. Mbas sa kohësh ndodh perjudha e fsheht tek helmimi nga acetaminofeni?

- A) 2-4 sek
- B) 8-16min
- C) 24-36 ore
- D) 7-10 ditë

67. Kush janë shenjat e idiosinkrazise?

- A) dilatim i pupilave
- B) puls
- C) dhimbje barku
- D) nauze

68. Çfarë shenjash ka stomatiti Vincent?

- A) gjakrrjedhje
- B) erë e keqe
- C) anemi
- D) diare

69. Reaksioni i vonuar mbas sa kohësh zhvillohet plotësisht?

- A) 2-5 orësh
- B) 10-16 orësh
- C) 18-23orësh
- D) 24-72 orësh

70. Tëtonia shfaqet atëhere kur niveli i kalciumit serik ulet nën:

- A) 1-2mg%
- B) 3-5mg%
- C) 7-7.5mg%
- D) 8-10mg%

71. Regjimi diabetik përqëndrohet në:

- A) bërjen e insulinës
- B) kontrolli i diares
- C) kontrolli i të vjellave
- D) lëkura

72. Ku depozitohen askaridet në stadin e parë të tyre:

- A) Duoden
- B) Pankreas
- C) Stomak

D) veshka

73. Sa zgjat perjudha e fshehtë tek helmimi nga Hekuri?

- A) 2-12ore
- B) 13-16 orë
- C) 18-20 orë
- D) 22-26 orë

74. Kujdesi infermieror në ostiomelitin për sigurimin e komfortit?

- A) pozicioni i pershtatshem
- B) dhimbjet e barkut
- C) diare
- D) të vjella

75. Cili është i gabuar në klasifikimin e reaksioneve hipersensitive?

- A) Reaksion anafilaktik
- B) Reaksion indor specifik
- C) Reaksion imun kompleks
- D) Reaksion i shpejtë.

76. Në mjekimin e shokut anafilaktik nuk ndikon?

- A) Adrenalina
- B) Ultrakortëni
- C) Aspirina
- D) Antihitaminikët

77. Cila nga simptomat e mëposhtme nuk vërehet në sëmundjen e serumit?

- A) Edema
- B) Eritema
- C) Hypotirozë
- D) Edeme laringu

78. Cila është zona ku nuk shfaqet dermatiti seborroik?

- A) Skalpi
- B) Balli
- C) Zona inguinale
- D) Shputat e këmbëve
- E) Prapa veshit

79. Cili nga këto shkaktarë nuk e shkaton mungesën e vit D?

- A) Niveli i ulët social-ekonomik
- B) Keqpërthithja e lëndëve ushqimore
- C) Ekspozimi në diell
- D) Banimi në zona të ndotura.

80. Cila nga këto ushqime nuk e përmban vitaminen D?

- A) Vaji i peshkut
- B) Bulmeti
- C) Dritherat

D) Mishi

81. Cila nga simptomat e mëposhtme nuk vërehet në sëmundjen e serumit?

- A) Edema
- B) Eritema
- C) Hypotirozë
- D) Edeme laringu

82. Cila nga alternativat është e saktë, për nevojat e organizmit për jod?

- A) 55-180 mikrogram
- B) 65-175 mikrogram
- C) 80-120 mikrogram
- D) 75- 150 mikrogram

83. Cila nuk bën pjesë në simptomat e mëposhtme, në teprinë e vitaminës D?

- A) Dobësi trupore
- B) Vonesë e theksuar në rritje
- C) Dhimbje kockash
- D) Oreks i shtuar

84. Cila nuk është e saktë, në shenjat e fëmijëve me hypotiroide, në lindje?

- A) Ikteri fiziologjik
- B) Dalje e shpejtë jashtë
- C) Probleme respiratore
- D) Vështirësi në ushyerje

85. Cila nga këto shenja nuk bën pjesë në sëmundjen e osteomielitit?

- A) Tëmperturë e lartë
- B) Zona e prekur e skuqur dhe e nxehtë
- C) Epistaksis
- D) Gjymtyrë e dhimbshme
- E) Muskuj të tëndosur

86. Cili nga parametrat ndryshon shumë në osteomielit?

- A) Eritrocitët
- B) Leukocitët
- C) Hemoglobina
- D) Hematokriti

87. Cilën nga të organet e mëposhtme prek artriti?

- A) Veshkën
- B) Mushkëritë
- C) Kycet
- D) Pankreasin

88. Cila nga këto shenja nuk bën pjesë në artrit?

- A) Inflamacion lokal
- B) Lëvizjes spontane të kyceve
- C) Humbje të vetëdijes

D) Temperaturë.

89. Cili nga ekzaminimet e mëposhtme është i saktë në defektët e lindura të zemrës?

- A) Skaner
- B) Radiografi
- C) Rezonancë
- D) Ekografi

90. Cili nuk e shkakton artritin, nga të dhënat e mëposhtme?

- A) E. Coli
- B) Haemophilus influenzae
- C) Salmonella
- D) Stafilokok

91. Cila nuk është e saktë në ndërhyrjet post - operatore të tonsilitit?

- A) Monitorimi
- B) Pozicionohet shtrirë dhe drejtë
- C) Vlerësohet për shenjat e hemoragjisë
- D) Fillohen perfuzione I/V

92. Skarlatina shkaktohet nga:

- A) Bordetëlla pertusis
- B) Corynae bacterium diphtheriae
- C) Streptokoku B hemolitik i grupit A
- D) Bakteriet

93. Cila nga shenjat e mëposhtme nuk është e saktë, në rihnit?

- A) Tështitje
- B) Obstruksion i rrugëve të frymëmarrjes
- C) Temperaturë
- D) Sekrecione

94. Cila nga këto sëmundje nuk bën pjesë në LTB?

- A) Laringotrakeiti
- B) Epiglottis
- C) Bronkioliti
- D) Trakeiti bacterial

95. Cila nga këto shenja nuk bën pjesë në LTB?

- A) Temperaturë
- B) Dhimbje fyti
- C) Melena
- D) Vështirësi në frymëmarrje

96. Cila nuk bën pjesë në ndërhyrjet e laringo-trakeo -bronkitit?

- A) Ruajtja e pastër e rrugëve ajrore
- B) Dhënia e oksigjeno-tërapisë
- C) Plotësimi i nevojave me lëngje
- D) Dhënia e vit D
- E) Sigurimi i pushimit dhe qetësisë.

97. Cila nga këto nuk bën pjesë në sëmundjet e rrugëve të poshtme respiratore?

- A) Bronkopneumonia
- B) Bronkiti
- C) Bronioliti
- D) Trakeiti
- E) Pneumonia

98. Cila nuk bën pjesë në kujdesin për pulmonet?

- A) Dhënia e Heparinës
- B) Aerosolotërapia
- C) Aspirimi i sekrecioneve
- D) Oksigjenotërapia

99. Cili nga medikamentët e mëposhtëm nuk jepet në astmën bronkiale?

- A) Bronkodilatatorët
- B) Kortikostëroidet
- C) Levotiroksina
- D) Antiacidet

100. Në cilën nga të dhënat e mëposhme nuk bazohet diagnoza e FC?

- A) Historinë e sëmundjes familjare
- B) Në mungesën e enzimave pankreatike
- C) Në dhimbjen abdominale
- D) Në rritjen e koncentrimin elektrolitik të djersës

101. Para marrjes së diuretikeve matet rregullisht:

- A) urinimi
- B) defekimi
- C) të vjellat
- D) tensionin arterial

102. Periudha e fshehtë e poliomyelitit abortiv është:

- A) 3-6 ditë
- B) 7-10 ditë
- C) 13-15 ditë
- D) 16-18 ditë

103. Faza post renale vjen si pasojë e:

- A) nje obstrukcion mekanik i traktit urinar
- B) traktit gastrointëstinal
- C) respirator
- D) venoz

104. Tek variçela fëmija është kontaminues gjatë periudhës:

- A) 1-2 ditë e para shfaqes se ekzantëmes
- B) 3-6 ditë
- C) 7-10 ditë
- D) 12-14 ditë

105. Sa është dhe sa shkurtohet jeta e trombocitëve?

- A) 6-8 ditë ne disa ore
- B) 9-12 ditë
- C) 14-16 ditë
- D) 17-20 ditë

106. Sindromi hemoragjik tek i posalinuri, vjen si pasojë?

- A) e mungesës nga Vit A
- B) e mungesës nga Vit D
- C) e mungesës nga Vit K
- D) e mungesës nga Vit E

107. Cila nga këto shihet në analizën e ikterit?

- A) Rritja e glukozës në gjak
- B) Rritja e azotëmisë
- C) Rritja e glicemisë
- D) Rritja e bilirubinës

108. Cila është ndërhyrja e parë në fëmijën prematur?

- A) ushqyerja
- B) dhënia e oksigjenit
- C) vënia e perfuzioneve I/V
- D) rregullimi i temperaturës

109. Cila është shenjë e infeksionit umbelikal?

- A) nauze
- B) temperaturë
- C) humbje oreksi
- D) zverdhje

110. Ku konsiston ndërhyrja e foshnjes së lindur me ikter?

- A) vendosja nën oksigjen
- B) dhënia e antibiotikëve
- C) bërja e transfuzioneve
- D) futja në fototerapi

111. Cila është simptoma që tregon frakturë të klavikulës?

- A) Shtrembërim të cepit të buzës
- B) Dhimbje kur i prek krahun
- C) Hematomë të fytyrës
- D) Rënie të cepit të syrit

112. Cili organ luan rol në eliminimin e bilirubinës, gjatë jetës fetale?

- A) placenta
- B) mushkëria
- C) zemra
- D) pankreasi

113. Cila është ndëhyrja e parë, që bëhet në foshnjen me asfiksi?

- A) Ushqyerja

- B) Rregullimi i temperaturës
- C) Aspirimi
- D) marrja e analizave

114. Apnea është?

- A) frymarrje e shpejtë
- B) frymarrje e ngadaltë
- C) pauz në frymëmarrje
- D) frymarrje normale

115. Cila është simptomë e stenozes hipretrofike të pilorit?

- A) cianozë
- B) frymëmarrje e vështirësuar
- C) Apnoe
- D) të vjella, si shatërvan

116. Cila është masa e parë që marrim për parandalimin e përhapjes së infeksionit?

- A) dhënia e oksigjenit
- B) rregullimi i temperaturës
- C) izolimi i foshnjës
- D) bërja e ekzaminimeve

117. Me çfarë trajtohet hypoglicemia?

- A) dhënia kaliumit
- B) dhënia e antibiotikëve
- C) dhënia e bikarbonat natriumi
- D) dhënia e perfuzioneve me glukozë 5%

118. Në sa stade ndahet periudha neonatale?

- A) 2 stade
- B) 4 stade
- C) 5 stade
- D) 6 stade

119. Kur bëhet ushqyerja me sondë nazo-gastrike?

- A) në fëmijët me ikter
- B) në fëmijët me frakturë të klavikulës
- C) në fëmijët me buzë dhe qellzë të çarë
- D) në fëmijët me asfiksi

120. Cili është shkaktarë për një lindje asfiktike?

- A) lindja ne term
- B) lindja me sexio-cezarea
- C) lindja post - tërm
- D) Lindja podalike

121. Me çfarë trajtohet një infeksion umbelikal?

- A) me antibiotik
- B) me natri-bikarbonat
- C) me alkool 70 gradë

D) me perfuzione I/V

122. Cili nga këta faktorë nuk ndikon në shfaqjen e diareisë?

- A) Moshë e fëmijës
- B) Kequshqyerja ose humbja në peshë
- C) Higjënë e pastër
- D) Mosruajtja e mirë e ushqimeve

123. Cila nga shkallët e dehidrimit nuk është e saktë?

- A) E lehtë = 10%
- B) Mesatare = 15%
- C) E rëndë = 20%
- D) E rëndë = 25%

124. Cila është e gabuar, në shkaktarët e obezitetit?

- A) Faktorët metabolik
- B) Trashëgues
- C) Nënushqyerja
- D) Psikologjik

125. Cili nga kujdesjet nuk bën pjesë në trajtimet e anoreksisë?

- A) Kujdesi ndaj malnutricionit
- B) Fillimi i një dietë të pasur dhe me lëngje
- C) Mbështetja psikologjike
- D) Përdorimi i laksativëve

126. Cili nga shkaktarët nuk bën pjesë në stomatit?

- A) Sëmundjet sistëmiqe
- B) Traumata
- C) Dalja e dhëmbëve
- D) Higjënë e pastër

127. Kandidoza orale është?

- A) Infeksion kërpudhor
- B) Inflamacion i mukozave orale
- C) Ulcer e membranave të mukozave të gojës
- D) Sëmundje sistëmiqe

128. Cili është ekzaminimi që përcakton llojin e parazitit?

- A) Gjak komplet
- B) Urokulturë
- C) Koprokulturë
- D) Sputum

129. Në cilin nga helmimet nuk këshillohet nxitja e të vjellave?

- A) Helmimet nga medikamentët
- B) Helmimet nga ushqyerja
- C) Helmimet nga salicilatët
- D) Helmimet nga lëndët grryese

130. Cili nga këto nuk është shkaktarë i shfaqes së alergjive?

- A) Ushqimi
- B) Medikamentët
- C) Mungesa e hekurit
- D) Pluhurat.

131. Shkaktojnë endokardit bakterial të gjitha, me përjashtim të:

- A) Streptokoku
- B) Enterokoku
- C) Gonokoku
- D) Rikecia

132. Kemi anemi kur hemoglobina është:

- A) Hemoglobina është nën 12g/dl (6 - 12 vjec).
- B) Hemoglobina është 12g/dl (6 muaj - 6 vjec)
- C) Hemoglobina është 13g/dl (6muaj - 6 vjec)
- D) Hemoglobina është nën 11g/dl (6muaj - 12 vjec)

133. Cila nuk bën pjesë në efektët klinike të talasemisë major?

- A) Difektët në sintezën e hemoglobinës A
- B) Dobësim i strukturës së qelizave të kuqe të gjakut
- C) Rritje e numrit të leukocitëve
- D) Jetëgjatësia e shkurtër e eritrocitit

134. Cilët nga elementët e analizës së gjakut, është i rritur në leucemi?

- A) Eritrocitet
- B) Hemoglobina
- C) Leukocitët
- D) Sedimenti

135. Cila nuk bën pjesë në ndërhyjet e IRA?

- A) Monitorimi i shenjave vitale
- B) Llogaritja me saktësi e marrjen dhe nxjerrjen e lëngjeve
- C) Administrimi i medikamentave
- D) Kryerja e ushimeve fizike
- E) Parandalimi i infeksioneve

136. Me çfarë trajtohet hipoglicemia?

- A) Tresol
- B) Kalcium
- C) Perfuzion solucion glukoze
- D) Vitamine A

137. Me çfarë trajtohet hipokalcemia?

- A) Trajtohet me dhënie të kalciumit.
- B) Trajtohet me dhënie të glukozës.
- C) Trajtohet me dhënie të serumeve.
- D) Trajtohet me dhënie të O₂.

138. Cila nga simptomat e mëposhtme NUK i përket meningjitit?

- A) Dhimbje koke, dhimbje muskujsh, dhimbje kycesh
- B) Të vjella
- C) Temperaturë
- D) Enjtje të gjëndrave parotis
- E) Konvulsion

139. Cilat nga të dhënat e mëposhtme prek encefaliti?

- A) Brinjët e përparme të palsës së kurrizit
- B) Prek indin granular dhe sistemin nervor
- C) Prek meninget dhe parenkimën e trurit
- D) Prek aparatit e frymëmarrjes

140. Në hemoragjitë umbilikale:

- A) Injektohet vit.D për parandalim.
- B) Injektohet vit .A për parandalim.
- C) Injektohet vit.K. për parandalim.
- D) Injektohet vit.C për parandalim.

141. Edemat serosanguine:

- A) Nuk janë leziona cefalike.
- B) Janë leziona cefalike.
- C) Janë leziona cefalo-pelvike.
- D) Nuk janë leziona të asnjë lloji.

142. Ç'është stenoza e pilorit?

- A) Bllokim hipertrofik i muskulit rrethues të kanalit të pilorit.
- B) Zgjerim i muskulit rrethues të kanalit të pilorit.
- C) Bllokimi dhe zgjerimi në të njëjtën i muskulit rrethues.
- D) Ç'rregullim Hidro-elektrolitik.

143. Obeziteti është i shoqëruar nga:

- A) Pasoja mjekësore, psikologjike.
- B) Vetëm pasoja mjekësore.
- C) Vetëm pasoja psikologjike.
- D) Luhatje sipërfaqësore.

144. Zhvillimi i adipositi në disa rastë mund të rritet:

- A) Në moshën e tretë.
- B) Në pesë vitët e para të jetës.
- C) Adoleshencën e vonë.
- D) Në çdo kohë.

145. Medikamentët që shkaktojnë humbjen në peshë tek anoreksikët:

- A) Laksativët, diuretikët
- B) Imipramina, deprimina.
- C) Antëpar, povan.
- D) Aspirina, Fe sulfat.

146. Në rastët e një reaksioni të rëndë nga pickimi i grerëzës apo bletës:

- A) Bëhet lavash stomaku.
- B) Injektohet vit.K.
- C) Bëhet adrenalinë, ultrakortën.
- D) Injektohet vit.A+D.

147. Alergjia është:

- A) Hipersensibilitet ndaj një substance.
- B) Hyposensibilitet ndaj një substance.
- C) Përqasje e virozave të stinës.
- D) Komplikacion nga substancat toksike.

148. Dhënia e luminalit jepet:

- A) Vetëm në rrugë intravenoze.
- B) Në rrugë orale, muskulare.
- C) Vetëm nga goja.
- D) Me transfuzion gjaku.

149. Eritroblastozja fetale quhet ndryshe:

- A) Sëmundje hemolitike e të porsalindurit.
- B) Sëmundje ikterike e të porsalindurit.
- C) Sëmundje baktëriale e të porsalindurit.
- D) Sëmundje e sistemit respirator e të porsalindurit.

150. Cili nga këto manifestime klinike, tregon për sëmundjen e hemofilisë?

- A) Rënie në peshe
- B) Vështirësi në frymëmarrje
- C) Melena
- D) Të vjella

151. Cila nga këto shenja nuk bën pjesë në klinikën e bronkiolitit?

- A) temperaturë 38-39
- B) dhimbje koke
- C) vështirësi në frymëmarrje
- D) konvulsione

152. Cila nga këto ndërhyrje nuk bën pjesë në LTB?

- A) dhënia e transfuzioneve të gjakut
- B) pastrimi i rrugëve të frymëmarrjes
- C) bërja e antibiotiko-tërapisë
- D) Dhënia e oksigjenotërapisë

153. Cili nuk është shkaktarë i bronkopneumonisë?

- A) bakteriet
- B) Streptokoku
- C) Pneumokoku
- D) Stafilokoku

154. Cila nuk bën pjesë në trajtimin e fëmijës me anemi?

- A) aerozolo-tërapia

- B) dhënia e vit B12
- C) dhënia Fe
- D) dhënia e një dietë të pasur me Fe

155. Cila nuk bën pjesë në ndërhyrjen e pacientëve me IRA?

- A) kufizimi i kriprave
- B) dhënia e antibiotiko-tërapisë
- C) bërja e dializës
- D) dhënia e lëngjeve

156. Fibroza cistike është sëmundje:

- A) genetikisht e trashëguar
- B) e fituar
- C) që shkatohet nga viruse
- D) që shkatohet nga bakteriet

157. Cila nuk bën pjesë në manifestimet klinike të trombocitopenisë?

- A) hematemezis
- B) melena
- C) hemoragji e gingivave
- D) temperaturë

158. Meningiti është:

- A) Infamacion i meningeve
- B) Sëmundje virale
- C) Sëmundje bakteriale
- D) Sëmundje e trashëguar

159. Cili është shkaktari i variçelës?

- A) nga një virus
- B) vriçela zostër
- C) virusi paramiksovirus
- D) bakteriet

160. Sa zgjat peridha e inkubacionit tek Robeola?

- A) 10-20 ditë
- B) 17-30 ditë
- C) 6- 7 ditë
- D) 14-21 ditë

161. Cila është rruga e transmetimit të fruthit?

- A) Nëpërmjet rrugëve të frymëmarrjes, spërklave
- B) Rrugës hematogene
- C) Perfuzioneve I/V
- D) Kontaktit të lëkurës

162. Eneurezis nokturna është:

- A) Urinim normal
- B) Urinim me ndërprerje
- C) Urinim i shpeshtë

D) Urinim i pavullnetshëm natën

163. Përgjegjësia kryesore e veshkave është:

- A) Të mbajë constant volumin e lëngjeve
- B) Të mbajë constant frymëshkëmbimin
- C) Të mbajë constant ritmin e zemrës
- D) Të mbajë constant qarkullimin e gjakut

164. Cila nga përgjigjet nuk është e saktë, në fëmijët me sindrom Dawn?

- A) Kanë qëndrim hypotonik
- B) Pëllëmba e dorës me rrudha
- C) Fytyra me pamje normale
- D) Gishti i madh i dorës i vecuar

165. Forma më e rëndë e krizave epileptike, quhet:

- A) Humbje e vetëdijes
- B) Marrje mendsh
- C) Status epileptik
- D) Gjendje të fikti

166. Në purpurën trombocitopenike, ulja e trombocitëve është?

- A) Nën 150.000/mm³
- B) Nën 140.000/mm³
- C) Nën 130.000/mm³
- D) Nën 120.000/mm³

167. Sa shkurtohet jeta e eritrocitit tek trombocitopenia?

- A) 2-4 ditë
- B) 3-5 ditë
- C) 6-8 ditë
- D) 7-10 ditë

168. Cilin nga këto organe nuk prek ethja reumatizmale?

- A) zemrën
- B) Kockat
- C) SNQ
- D) Veshkat

169. Cili nga aparatët preket në 90% të rastëve nga fibroza cistike?

- A) Aparati genito-urinar
- B) Aparati kardiak
- C) Aparati respirator
- D) Aparati i SNQ

170. Cila nuk bën pjesë në shenjat e astmës bronkiale?

- A) kolla e thatë
- B) Vështirësi në frymëmarrje
- C) Fishkëllima në ekspirim
- D) Urinim i pavullnetshëm

171. Dhënia e glucideve ndihmon në:

- A) Kursimin e protëinave të organizmit.
- B) Pakësimin e rezervave të glikogjenit.
- C) Prodhimin e protëinave dhe glikogjenit.
- D) Eliminimin e protëinave dhe glikogjenit.

172. Fëmijët me kequshqyerje rrezikojnë:

- A) Nga plagët e dekubituseve.
- B) Nga plagët e kavitëtit oral.
- C) Nga plagët e narinës.
- D) Nga plagët të lobi i veshit.

173. Gjatë vitit të parë të jetës, fëmija duhet të marrë Vitaminë D:

- A) 1000-1200UI në ditë.
- B) 2000-2200UI në ditë.
- C) 2500-2800UI në ditë.
- D) 2800-3000UI në ditë.

174. Tetania shfaqet atëherë kur niveli i kalciumit serik:

- A) Ulet nën 7-7.5mg%.
- B) Ngrihet mbi 7-7.5mg.
- C) Ngrihet mbi 7-8.5mg.
- D) Ngrihet mbi 8.5-9mg.

175. Ç'është Ketoacidoza diabetike?

- A) Shtim i theksuar i insulinës.
- B) Mungesë e theksuar e insulinës.
- C) Pakësim i kalciumit.
- D) Pakësim i elektrolitëve.

176. Dhimbjet e barkut gjithmonë kanë të bëjnë me problem kirurgjikal:

- A) Është pohim i vërtetë.
- B) Nuk është i vërtetë.
- C) Jo gjithmonë.
- D) Gjithmonë.

177. Ç'rregullimet kryesore të tretjes janë:

- A) Izotonik
- B) Hipotonik
- C) Hipertonik
- D) Entëriti

178. Shkallët e dehidrimit janë:

- A) I lehtë 5%;mesatar10%;i rëndë15%.
- B) I lehtë 10%;mesatar 15%;i rëndë20%.
- C) I lehtë 15%;mesatar20%;i rëndë 25%.
- D) I lehtë 20%;mesatar25%;i rëndë 30%.

179. Faktorët që përcaktojnë vendosjen e trupave të huaj bronkiale janë:

- A) Adaptim jo i mirë me kalibrin e bronkut.

- B) Mungesë mprehtësie që pengon zhytjen e tij.
- C) Tkurrja totale.
- D) Edema reaksionale e bronkut.

180. Trupat e huaj në trake manifestohen:

- A) Vështirësi në frymëmarrje.
- B) Mungesë kolle.
- C) Skuqje të fytyrës.
- D) Frymëmarrje normale.

181. Nëse bronkoskopia rigide dështon:

- A) Është i nevojshëm trajtimi kirurgjikal.
- B) Nuk është i nevojshëm trajtimi kirurgjikal.
- C) Përdoren mënyra të tjera.
- D) Nuk ekzistojnë mënyra të tjera.

182. Ç'është epistaksis?

- A) Është gjakrrjedhja nga hundët.
- B) Është gjakrrjedhja nga goja.
- C) Është gjakrrjedhja nga veshët.
- D) Është mpiksja e gjakut.

183. Virusi respirator sincicial është:

- A) shkaku kryesor në 70% të rasteve.
- B) Shkaku kryesor në 50% të rasteve.
- C) Nuk është shkak kryesor të bronkoliti.
- D) Nuk ekziston fare si mundësi.

184. Matja e gazeve në gjak është e rëndësishme:

- A) Për të testuar influencën e tyre.
- B) Për mbulimin e agjentit etiologjik.
- C) Për të gjykuar gravitetin e sëmundjes.
- D) Për kodifikimin e tyre.

185. Bronkopneumonia:

- A) Takohet në të gjitha moshat.
- B) Takohet në moshën e tretë.
- C) Takohet në adoleshencë.
- D) Takohet në parashkollorë.

186. Mjekimi specifik i astmës:

- A) Vitaminat.
- B) Tirotoksikoza.
- C) Acidet.
- D) Bronkodilatatorët.

187. Disavantazhi i aeorozolit është:

- A) Medikamentët nuk absorbohen me shpejtësi.
- B) Fëmija mund të kërkojë administrimin e tij shumë shpesh.
- C) Medikamentët veprojnë me shpejtësi.

D) Minimizon efektët e përgjithshme.

188. Ç'është hidrokloriaziti dhe përse përdoret?

- A) Është diuretik dhe përdoret për të ulur edemën.
- B) Është vitaminë dhe përdoret për rritje rezistence.
- C) Është antidepresiv dhe përdoret për gjendjet depresive.
- D) Është atropine dhe përdoret për relaksim e muskulaturës së pilorit.

189. Procesi i kujdesjeve në pediatri përfshin:

- A) Moskryerja e ekzaminimeve fizike.
- B) Vendosjen e diagnozës.
- C) Mjekimi i menjëhershëm.
- D) Zbatimi i planeve të kujdesjeve.

190. Synimi i kujdesjeve infermierore është:

- A) Të bëjë të mundur që fëmija të rritet.
- B) Të krijojë kushte për praninë.
- C) Të plotësohet në mirëqenien e vet.
- D) Të kujdeset për krijimin e figurës së vet.

191. Analizat që kryhen tek i porsalinduri prematur:

- A) Gjak komplet, gjak për glicemi.
- B) Analize fecesh, urinë.
- C) Prova e absorvimit.
- D) Të gjitha analizat e mundshme.

192. Vlerësimi për veten i përket:

- A) Gjykimin personal.
- B) Gjykimin përgjithësues.
- C) Gjykimin asnjës.
- D) Gjykimin pa subjekt.

193. Për të parandaluar pasojat e ftohjes:

- A) Prematuri vendoset në inkubator.
- B) Në një dhomë sido që të jetë.
- C) I vishen rroba të trasha.
- D) Të temperatura e dhomës të jetë sa më e lartë.

194. Shpenzimi minimal i O₂ ndodh kur temperatura sipërfaqësore e lëkurës është:

- A) 36.5c.
- B) 36.8c.
- C) 37c.
- D) 37.2c.

195. Te kujdesjet për lëkurën e fëmijës këshillohet:

- A) Përdorimi i sapunëve.
- B) Përdorimi i locioneve alkaline.
- C) Çdo lloj solucioni larës.
- D) Jo çdo lloj solucioni.

196. Nevojat themelore të fëmijës:

- A) Nevojat e jetës së përditshme.
- B) Ushqimi dhe uji.
- C) Mbajtja afër.
- D) Ajër i pastër.

197. Për të parandaluar fleksionin e qafës:

- A) Vendoset një jastëk nën shpatull.
- B) Nuk vendoset jastëk nën shpatull.
- C) Vendoset një jastëk mbi shpatull
- D) Nuk vendoset jastëk mbi shpatull.

198. Nëse ndërpritët ushqyerja me gji:

- A) Ulet niveli serik i bilirubinës.
- B) Ngrihet niveli serik i bilirubinës.
- C) Niveli serik i bilirubinës s'lëviz.
- D) Niveli serik i bilirubinës ngrihet dhe ulet.

199. Me rritjen e moshës së shtatzënisë:

- A) Frekuenca respiratore ulet.
- B) Frekuenca respiratore ngrihet.
- C) Frekuenca respiratore s'pëson ndryshim.
- D) Ndryshimet respiratore janë të pakonsiderushme.

200. Disa nga faktorët që shkaktojnë asfiksionë:

- A) Moshë e nënës, e shtatzënisë.
- B) Lindjet në kohë, barrë e rregullt.
- C) Mospërdorimi i medikamentëve.
- D) Problemet psikologjike.

201. Fototerapia e zgjatur ka efekte:

- A) Parësore.
- B) Dytësore.
- C) Parësore-Dytësore.
- D) Të pariparueshme.

202. Shenjat e ethes tek i porsalinduri:

- A) Lëkurë e thatë.
- B) Shtim të urinimit.
- C) Fytyra dhe trupi tregojnë ngritje në peshë.
- D) Ulje të temperaturës.

203. Traummat e indeve të buta shkaktohen:

- A) Kur ka disproporcion cefalopelvik
- B) kur nuk ka disproporcion pelvik
- C) Kur ka proporcion cefalopelvik
- D) Si pasojë e dëmtimeve të ndryshme.

8. Shëndet Riprodhues

1. Norplanti dhe implanon bejne pjese te metodat:
 - A) injektable
 - B) orale
 - C) barriere
 - D) subdermale
2. Veteinspektimi e vetekzaminimi behet ne:
 - A) Kancerin e qafes se mitres
 - B) Menopauze
 - C) Ne rastin e nje IST je
 - D) Kancerin e gjirit
3. Parandalimi paresor ul:
 - A) Prevalencen e nje semundjeje
 - B) Incidencen e nje semundjeje
 - C) Prevalencen e nje handikapi
 - D) Incidencen e nje handikapi
4. Per te evituar nje shtatezani abstinohet:
 - A) Nga dita 8 deri ne ditën e 14
 - B) Nga dita 6 deri ne ditën e 14
 - C) Nga dita 8 deri ne ditën e 18
 - D) Nga dita 6 deri ne ditën e 12
5. Pilula contraceptive e urgjences miret ne:
 - A) Mes te ciklit
 - B) Fillim te ciklit
 - C) Fund te ciklit
 - D) Nuk ka rendesi ne cfare momenti te ciklit
6. Hormoni luteinizues prodhohet:
 - A) Ne hypofize
 - B) Ne ovare
 - C) Ne testikuj
 - D) Ne uterus
7. Cilat metoda kontraceptive mund te mbrojne nga IST?
 - A) Metoda e diteve kalendarike
 - B) Metodat barriere
 - C) Injektablet
 - D) Metodat orale
8. Nauzea, spotting, shtimi ne peshe, dhimbje koke kane lidhje me:
 - A) Pranueshmerine e metodes
 - B) Efikasitetin e metodes
 - C) Sigurine e metodes
 - D) Tolerancen e metodes

9. Testosteroni është:

- A) Qeliza seksuale mashkullore
- B) Hormoni seksual femeror
- C) Hormoni seksual mashkullor
- D) Qeliza seksuale femerore

10. E vetmja metode kontraceptive qe mbron nga HIV/AIDS është:

- A) Metoda kirurgjikale
- B) Spermicidet
- C) Kondomi
- D) Metodrat hormone

11. Hormoni folikulo stimulus prodhohet nga:

- A) Hypofiza dhe hypotalamusi
- B) Ovarret
- C) Uterusi
- D) Testikujt

12. Deproverat bejne pjese ne metodat:

- A) Orale
- B) Kirurgjikale
- C) Subdermale
- D) Injektuale

13. Amniotomia është:

- A) Marrja e likidit amniotik për vlersim
- B) Ruptuimi artificial i membranave
- C) Rupturimi spontan i membranave
- D) Studimi citologjik i likidit amniotik

14. Duke zbatuar metodën kalendarike, cikli më i shkurtër është 21 ditë dhe cikli më i gjatë është 28 ditë. Duke zbatuar formulën gjeni ditët kur çifti duhet të shmangë periudhën e fertilitetit.

- A) nga dita 3 - 17
- B) nga dita 9 - 12
- C) nga dita 15 - 30
- D) nga dita 20 - 25

15. Zonja X ka zgjedhur metodën kalendarike për të kontrolluar kontracëpsionin. Gjatë proësit të vlersimit, më e rëndësishme për infermierën është:

- A) Ekzaminimi i pigmentacionit të lëkurës dhe cilesisë së flokëve për ndryshime hormone
- B) Marrja e anamnezës menstruale për 6-12 muajt e fundit
- C) Njohja e experiencës së mëparshme të gruas për të kontrolluar lindjen
- D) Përcaktimi i shtimit dhe humbjes në peshë

16. Zonja X është duke përdoruar temperaturën bazale trupore si metodë kontraceptive. Ajo shkon për kontroll në klinikë dhe i tregon infermieres "periodat e mia janë paksuar dhe temperatura nuk është rritur" përgjigja më e përshtatshme e mamisë duhet të jetë:

- A) Ju keni qënë e sëmurë këtë muaj

- B) Ju ndoshta nuk patët ovulacion këtë muaj
- C) Kjo ndoshta nënkupton që ju jeni shtatzanë
- D) Mos u mërzitni ndoshta kjo nuk është asgjë

17. Sifilia shkaktohet nga:

- A) Clamidia tracomatis
- B) Herpesi simpleks
- C) Neiseria gonorrhoea
- D) Treponema pallidum

18. Substancat spermicide veprojnë me anë të:

- A) Barrierave mekanike
- B) Duke frenuar ovulacionin
- C) Duke shtuar rritjen e epitelit vaginal.
- D) Shkatërrimit të spermës

19. Në barrierat mekanike hyjnë:

- A) Implanti kontraktiv subdermal
- B) Sfungjerët
- C) Shkumrat
- D) Xhelet

20. Në barrierat kimike futen:

- A) Depo- proveara
- B) DIU
- C) Norplanti
- D) Spermitostatikët

21. Zonja X 30 vjeçe në anamnezë e saj kemi shtatzani 0 dhe para (lindje) 0. Ajo ankon për prurit vaginal dhe për shtim të rrjedhjeve vaginale. Ajo dhe i shoqi nuk kanë marrdhënie jashtëmartesore. Për 7 vite si metodë kontraktive ato kanë përdorur kondomin. Në anamnezën e saj medikale kemi diabet mellitus, si dhe në historinë familjare kemi diabet gestacional. Faktorët predispozues për të zhvilluar infeksionin nga kandida janë:

- A) Diabeti melitus
- B) Nuligraviteti
- C) Nuliparitety
- D) Përdorimi i kondomit

22. Condomët duhet të përdoren në barrë:

- A) Asnjëherë
- B) Nga gratë me rrezik për candida
- C) Nga gratë me rrezik të lartë për sst
- D) Nga të gjitha gratë shtatzana

23. Një grua e re vjen në klinikë dhe ju shpjegon ju, që një natë më parë gjatë marrdhënies seksuale kondomi u çua. Në konsultë me këtë kliente ju e këshilloni atë që kontraksioni post koital ul rrezikun e një shtatzanie dhe është shumë efektive kur:

- A) Ajo merret në edo kohë përpara ciklit
- B) Doza e parë merret sa më shpejt që të jetë e mundur

- C) Doza e parë mund të merret pas 72 orëve
- D) Mund të merret dhe pas tre ditësh

24. D.I.U. është një mjet kontrceptiv i cili:

- A) Është i përbërë nga një shtresë e hollë gome
- B) Jep një mbrojtje më të mirë se sa pilula
- C) Mbron nga infeksionet seksualisht të transmetueshme
- D) Nuk është i përshtatshëm për gratë e palindura

25. Zoti dhe Zonja X po kalojnë momente të vështira për pamundësinë e tyre për të krijuar shtatzanësi. Ata duan të dinë se efarë mund të bëjnë për të ruajtur ekuilibrin e tyre emocional. Përgjigja më e përshtatshme nga ana e mamisë është:

- A) T'i tregojnë gjithë shokëve të tyre dhe familjeve
- B) Të bisedojnë me homologët e tyre infertil
- C) Të kërkojnë mbështetje nga grupet e specializuara për këtë problem
- D) Të fillojnë procedurat e menjëherëshme për adoptim

26. Një grua është duke përdorur diafragmën inkorrekte nëse ajo:

- A) Aplikon spermicid brenda kupës dhe rreth buzëve të diafragmës
- B) E lan atë me sapun të butë dhe ujë pas përdorimit dhe më pas e pudros atë me niseshte
- C) Lëviz atë brenda 2 h pas aktit të fundit të coitusit
- D) Vendos diafragmën 6 h para marrdhënies

27. Znj. X sapo ka patur abort në tremestrin e I-rë dhe është dërguar në shtëpi duke i dhënë kontrceptivë oral për tu mbrojtur nga një barrë, ajo është këshilluar të:

- A) Të fillojë marrëdhëniet seksuale, pasi të ketë mbaruar hemorragjia vaginale.
- B) Të mënjanojë kontaktin seksual të paktën 10 ditë
- C) Të përdorë kondom dhe shkumë për javën e parë
- D) Të përdorë një metodë tjetër kontrceptive për një cikël të plotë

28. Procedura e sterilizimit në meshkuj është:

- A) Lidhja e tubave
- B) Spermicitet
- C) Spermitostatikë
- D) Vasektomia bilaterale

29. Zoti dhe Zonja X e kanë plotësuar numrin e fëmijëve të dëshiruar dhe diskutojnë me infermiere maminë në lidhje me sterilizimin femëror dhe mashkullor. Cila prej thënieve të mëposhtëme është më e përshtatshme të thuhet nga mamia?

- A) Komplikacionet madhore pas sterilizimit janë të rralla
- B) Mbyllja tubare është e përkohëshme dhe shpesh e rikthyeshme
- C) Sterilizimi i burrit dhe i gruas është 100% efektiv
- D) Vazektomia, zakonisht ka një ndikim në marrëdhëniet seksuale

30. Metoda më frekvente për kontrollin e lindjeve e përdorur nga femrat 15-19 vjeçare është:

- A) Depo-Provera
- B) DIU-ja
- C) Kontrceptivët oral
- D) Norplanti

31. Zonja X kohët e fundit ka përdorur diafragmë dhe spermicid si kontracepsion. Ajo i kërkon infermieres, se cilat janë ndryshimet madhore ndërmjet kapës cervikale dhe diafragmës.

Përgjigja më e përshtatëshme nga infermierja do të ishte:

- A) Diafragma mund të lihet për një kohë më të gjatë, pas marrëdhënieve seksuale
- B) Kapa mund të vendoset në mënyrë të sigurtë, disa orë para marrëdhënieve, pa patur nevojë për të shtuar spermicidin më vonë
- C) Marrëdhëniet e përsëritura me diafragmë, janë më të përshtatshme
- D) Me kapën nuk përdoret spermicid, kështu që ai është më i thjeshtë

32. Zonja X është diagnostikuar dhe trajtuar për sindromin e shokut toksik. Ajo në ndonjë rast të marrëdhënieve seksuale ka përdorur kontraceptivë të marrë vetë në farmaci. Bazuar në anamnezën e saj, çfarë kontracptivësh, nuk duhet të përdorë ajo dhe partneri:

- A) Diafragmat
- B) Kondom vaginal.
- C) Kondomi
- D) Sfungjerët

33. SST që transmetohen më shpesh janë:

- A) C. Trachomatis
- B) N. Gonorrhea
- C) Sifilizi
- D) Vulvovaginal candidosis

34. Zonja X është beqare dhe përshkruan jetën e saj seksuale, si aktive dhe me shumë partnerë. Ajo dëshiron një metodë kontraceptive, e cila është e sigurtë dhe që nuk ndikon në aktivitetin e saj seksual. Ajo kërkon D.I.U. Përgjigja më e përshtatëshme e mamisë do të ishte:

- A) D.I.U. do t'ju mbrojë ju nga SST
- B) D.I.U. nuk ndikon në aktivitetin seksual
- C) Përqindja e barrave është më e lartë me D.I.U.
- D) Rreziku i SIP është më i madh për ju

35. Në efektet anësore të steriles përfshihen:

- A) Depresioni
- B) Gjendja e ankthit
- C) Nauzeja dhimbja e kokës
- D) Rrjedhjet vaginale, hemoragjia

36. Cilat nga pikat e mëposhtme sugjeron infermieren që gruaja mund të ketë vaginitis monialis?

- A) Ankesë për kuarje vulvare irrituese
- B) Dhimbje mesi të padurueshme
- C) Sekrecine të ujshme në ngjyrë të verdhë
- D) Temperaturë

37. Shendeti riprodhues i perket:

- A) Vetem femrave
- B) Vetem adoleshenteve
- C) Meshkujve
- D) Te gjithëve

38. Implantet jane metoda kontracepsinhormonale:

- A) Hormonale
- B) Jo hormonale
- C) Kimikate
- D) Asnjera nga keto

39. Pilulat progestative kunderindikohen ne:

- A) Gjashte mujorin e pare te ushqyerjes me gji
- B) Gjashte javet e para te ushqyerjes me gji
- C) Tre muajt e pare te ushqyerjes me gji.
- D) Asnjera nga keto

40. DIU vendoset kur femra eshte:

- A) Shtatzane
- B) Ka nje infeksion puerperal
- C) Ka nje semundje inflamatore pelvike.
- D) Asnje nga opsionet

41. Progesteroni prodhohet nga:

- A) Trupi i verdhe
- B) Uterusi
- C) Hypofiza
- D) Asnje nga opsionet

42. Estradioli prodhohet nga:

- A) Hypofiza
- B) Ovaret
- C) Uterusi
- D) Asnje nga opsionet

43. Kush e percakton tipin e pilulave te kombinuara:

- A) Doza e etinil estradiolit
- B) Doza e progesteronit
- C) Doza e te dyve
- D) Asnje nga keta

44. Kontraceptivet oral jane metoda:

- A) Hormonale
- B) Jo hormonale
- C) Kimikate
- D) Asnje nga opsionet

45. Hormoni folikulo stimulus prodhohet nga:

- A) Hypofiza dhe hypotalamusi
- B) Ovaret
- C) Uterusi
- D) Testikujt

46. Menopauza natyrale eshte si rezultat i:

- A) Ndalimit te aktivitetit folikular ovarian

- B) Ablacionit kirurgjikal te ovareve
- C) Frenimit jatrogjen te funksionit te ovareve
- D) Te treja se bashku

47. PAP testi behet per te diagnostikuar:

- A) Kancerin e qafes se mitres
- B) Kancerin e gjirit
- C) HIV/AIDS
- D) Asnje nga opsionet

48. Nje mesazh duhet te jete:

- A) I gjate
- B) I shkurter
- C) Te mos perseritet
- D) Asnje nga opsionet

49. Ne rastin e metodes kirurgjikale te meshkujt:

- A) Metoda eshte efikase menjehere
- B) Metoda eshte efikase pas nje viti
- C) Metoda eshte efikase pas 6 muajsh
- D) Metoda eshte efikase pas 9 muajsh

50. Cfare eshte ovulacioni:

- A) Pjekja e vezes
- B) Dalja e vezes nga folikuli
- C) Pjekja dhe dalja e vezes nga folikuli
- D) Asnje nga opsionet

51. Endometri bëhet sekretiv, pra receptiv, nën efektin e:

- A) LH & FSH
- B) FSH & Progesteron
- C) Progesteron & LH
- D) Estrogjen & Progesteron

52. Virusi i HIV-it transmetohet me anë të:

- A) Prekjës & ushqimit
- B) Gjakut e produkteve të tij & raporteve seksuale
- C) Ushqimit & gjakut e produkteve të tij
- D) Raporteve seksuale & ushqimit

53. Vdekshmëria amtare dhe foshnjore janë më të larta:

- A) Kur nëna është 16-20 vjec
- B) Kur nëna është 20 - 25 vjec
- C) Kur nëna është 25 - 29 vjec
- D) Kur nëna është më pak se 20 vjec apo më shumë se 30 vjec

54. Cili nga faktorët e mëposhtëm, përbën faktor rreziku për kancerin e qafës së mitrës:

- A) Shtatzania e parë mbi 30 vjec
- B) Raporte seksuale të hershme & nulipariteti
- C) Shtatzania e parë < 30 vjec

D) Mëmësia e parakohshme

55. Hormonet seksuale femërore janë:

- A) FSH & prolaktina
- B) Estrogjeni & progesteroni
- C) Prolaktina & estrogjeni
- D) Progesteroni & FSH

56. Pilulat duhet të merren:

- A) Ditën e parë të ciklit, por jo më vonë se dita e pestë e tij
- B) Nga dita e pestë në ditën e dhjetë të ciklit
- C) Ne dhjetëditëshin e dytë të ciklit
- D) Në dhjetëditëshin e tretë

57. Kur kemi vendosur DIU, shenjat e alarmit janë:

- A) Nauzeja & cefaleja
- B) Temperatura & sekrecionet e shtuara
- C) Dhimbja e gjoksit takikardia
- D) Nauzeja dhe të vjellat

58. Crregullimet minore të menopausës janë:

- A) Osteoporozë
- B) Afshet & crregullimet psikologjike
- C) Ateroskleroza
- D) Crregullimet kardiovaskulare

59. Në crregullimet seksuale të femrat hyjnë:

- A) Ejakulacioni prekoks
- B) Sekrecionet vaginale të shtuara
- C) Dispareunia & anorgazmia
- D) Sekrecionet vaginale të pakësuara

60. Pengesat e aksesit për adoleshentët në shërbimet e SHR janë:

- A) Mungesa e edukatës seksuale & mentaliteti
- B) Familja
- C) Moshë
- D) Grupi shoqëror të cilit i përket

61. Trupi i verdhe sekreton:

- A) Estradiol & progesteron
- B) Progesteron dhe prolaktinë
- C) Prolaktinë dhe estradiol
- D) Vetëm progesteron