

KIRURGJI

1. Pavioni kirurgjikal eshte vendi ku:

- A) Trajtohen te semuret;
- B) Trajtohen te semuret kirurgjikal;
- C) Shtrohen per trajtim te semuret kirurgjikal;
- D) Asnjera

2. Shtrimi ne pavionin kirurgjikal tek adultet bazohet:

- A) Ne baze te seksit;
- B) Ne baze te parimeve te asepsise;
- C) Ne baze te moshes;
- D) Asnjera;

3. Pneumotoraksi nuk shkaktohet nga:

- A) Traumat;
- B) Nga nje patologji neoplazike e pulmonit;
- C) Nga aplikimi i sistemeve totalisht te qendrueshme;
- D) Nga hipertensioni;

4. Plaga nuk quhet:

- A) E paster;
- B) E kontaminuar;
- C) E infektuar;
- D) Asnjera;

5. Kateteri eshte per perdorim:

- A) Venoz;
- B) Urinar;
- C) Nazo-gastrik;
- D) Te gjitha

6.Ka kapsul piogjene

- A) Abscesi;
- B) Flegmona;
- C) Celuliti;
- D) Asnjera;

7. Nuk eshte e vertete ne obezitet:

- A) Haset shpesh;
- B) Gjendet me shume ne meshkujt;
- C) Faktore predispozues mund te jete rritja e estrogjineve ne gjak;
- D) Lidhet me nenushqyerjen;

8.Nuk eshte semundje kirurgjikale:

- A) Ulcera e perforuar,
- B) Kanceri i stomakut
- C) Ulcera stenozante grada IV
- D) Asnjera

9.Perben urgjence kirurgjikale:

- A) Kalkuloza e kolecistes;
- B) Akalazia e ezofagut;
- C) Hernia strangulative;
- D) Noduli i ftohte i tiroides;

10. Eshte komplikacion nga aplikimi i sistemeve totalisht te qendrueshme:

- A) Pneumotoraksi;
- B) Tromboembolia;
- C) Te dyja;
- D) Asnjera

11. Kanceri i gjirit prek me shpesh::

- A) Kuadratin medial te siperm;
- B) Kuadratin medial te poshem;
- C) Kuadratin lateral te poshem;
- D) Kuadratin lateral te siperm;

12. Perdorimi I garzave hyn ne :

- A) Antiseptiken fizike
- B) Antiseptiken kimike
- C) Antiseptiken mekanike
- D) Te gjitha

13. Në pozicionimin e pacientit në tavolinën e operacionit duhet pasur parasysh:

- A) Të evitohet komprimimi abdominal i tejzgjatur
- B) Të përdoren metodat që parandalojnë dekubituset
- C) Të evitohet aplikimi për kohë të gjatë në gjymtyrë i lakut hemostatik
- D) Te gjitha

14. Operacion ku nuk përdoret antibioprofilaksia eshte ne:

- A) Ezofag.
- B) Kalkuloze te kolecistes.
- C) Tumor te kolonit
- D) Te gjitha

15. Nuk eshte urgjence ekstreme kirurgjikale:

- A) Ruptura e lienit,
- B) Ruptua kataklizmike e barres ekstrauterine,
- C) Hembolia arteriale mezenteriale,
- D) Asnjera

16. Nje hemorragji konsiderohet e rende po qe se:

- A) Aspirimi gastrik sjell panderprerje gjak te kuq;
- B) Melena e ujeshme perseritet ne intervale te shkurtra kohe;
- C) Per te mbajt presioni venoz dhe arterial afer shifrave normale jane te nevojshme transfuzione te shumta;
- D) Te gjitha

17. Nuk eshte origjine e hemorragjise digjестive te cirrotiket::

- A) Ruptura e variceve te ezofagut;
- B) Turbullimet e hemostazes;
- C) Turbullimet trofike te mukozes + staza venoze nga hipertensioni portal;
- D) Asnjera;

18. Shkaqet më të shpeshta të alterimeve të ventilimit në gjendjet e emergjencës janë:

- A) Pneumotoraksi valvular
- B) Hemotoraksi masiv
- C) Frakturat multiple të brinjëve ("flail chest")
- D) Te gjitha

19. Rektosigmoidoskopia ne nje hemorragji te poshtme tregon pranine e nje::

- A) Hemorroide te gjakosur;
- B) Tumori;
- C) Procesi inflamator;
- D) Te gjitha;

20. Ileusi akut i zorres se holle nuk ka orirgjine nga:

- A) Herniet interne,
- B) Briljet;
- C) Tumoret rektale beninje;
- D) Ileusi biliar;

21. Nuk eshte okluzion nga shtrengimi ai i shkaktuar nga::

- A) Brilja,
- B) Volvusi,
- C) Invaginacioni
- D) Ileusi biliar

22. Eshte okluzion nga obstrukcioni ai i shkaktuar nga:

- A) Tumoret beninje te zorres
- B) Tumoret malinje te zorres,
- C) Ileuset biliar,
- D) Te gjitha

24. Kolecistiti akut kalkuloz nuk eshte urgjence absolute kirurgjikale:

- A) Ne perionitin biliar,
- B) Piokolecistit;
- C) Kolecistopankreatit,
- D) Gangrene te kolecistes

25. Kolecistiti akut nuk konsiderohet rast i “keq” kirurgjikal ne:

- A) Pacientet geriartrik
- B) Insuficience renale,
- C) Ne obezitet,
- D) Ne lehoni,

26. Hemorragjia nga barra ekstrauterine eshte:

- A) Hemorragji digjестive e larte,
- B) Hemorragji digjестive e poshtme,
- C) Hemorragji retroperitoneale
- D) Hemoperitoneum

27. Defibrilatori nuk eshte :

- A) Nje paisje me ane te te cilit i jep pacientit nje shkarkim elektrik te kontrolluar per te nderprere nje aritmi;
- B) Nje paisje me ane te te cilit i jep pacientit nje shkarkim elektrik te pakontrolluar per te nderprere nje aritmi;
- C) Nje paisje qe ushqehet me bateri te karikueshme ose rrjet i vazhdueshem tensioni;

D) Asnjera;

28. Salla operatore eshte vendi ku:

- A) Trajtohen kirurgjikalisht te semuret;
- B) Ku shtrohen per trajtim pacientet;
- C) Ku shtrohen per trajtim pacientet kirurgjikal;
- D) Ku trajtohen intensivisht te semuret kirurgjikal;

29. Eshte parimi me i rendesishem ne ndarjen ne dhoma te te semureve kirurgjikal:

- A) Moshë;
- B) Seksi;
- C) Asepsia;
- D) Asnjera

30. Nuk eshte karakterisitke ne ileusin mekanik:

- A) Stop i feceve dhe gazrave;
- B) Nauze e te vjella;
- C) Dhimbja abdominale;
- D) Mungesa e hidroniveleve ne ro-grafi;

31. Agjenti me I vlefshem I perdorur si sterilizues te autoklavi eshte:

- A) Ajri uhor nenpresion;
- B) Forma e autoklavit;
- C) Koha;
- D) Nxehtesia;

32. Eshte komplikacion i nderhryjeve venoze qendrore:

- A) Pneumotoraksi;
- B) Hemotoraksi;
- C) Limforrea;
- D) Te gjitha;

33. Ulcerat e lekures mund te jene me origjine:

- A) Vaskulare;
- B) Traumatike;
- C) Neoplazike;
- D) Te gjitha

34. Nuk eshte karakteristike e fazes akute te infeksionit :

- A) Dhimbja;
- B) Temperatura;
- C) Leukopenia;
- D) Hiperemia;

35. Eshte inflamacion i gjendrave limfatike:

- A) Adeniti;
- B) Celuliti;
- C) Furunkuli;
- D) Limfangoidi;

36. Nuk eshte parameter kryesor ne vleresimin e gjendjes se te ushqyerit:

- A) Klinik;
- B) Immunologjik;
- C) Dietetik;
- D) Bioumoral;

37. Nuk eshte e vertete per ushqimin parenteral:

- A) Eshte ushqim artificial i pacientit kirurgjikal;
- B) Merret me rruge venoze;
- C) Merret me rruge arteriale;
- D) Merret kur ushqimi oral ose enteral jane te pamundura;

38. Cila nga keto plage eshte plage e paster:

- A) Plaga traumatike e bere brenda 8 oreve te para;
- B) Plaga nga djegiet;
- C) Plaga operatore;
- D) Te gjitha

39. Materiali qepes (sukurat) nuk e ndajme ne baze te origjines se materialit perberes ne:

- A) Natyral;
- B) Artificial;
- C) Sintetik
- D) Asnjera

40. Portagia eshte instrument kirurgjikal qe perdoret per:

- A) Te suturuar;
- B) Per te diveriguar;
- C) Per te mbajtur agen
- D) Per te mbajtur lamen;

41. Kirurgji miniinvazive quhet:

- A) Lapartomia;
- B) Torakotomia;
- C) Laparoskopia;
- D) Asnjera

42. Nuk eshte urgjence kirurgjikale:

- A) Hemorragjia digjестive;
- B) Ulcer bulbi duodeni e perforuar;
- C) Kalkuloza e kolecistes;
- D) Apendiciti akut;

43. Antiseptiken nuk e ndajme ne :

- A) Fizike;
- B) Kimike;
- C) Biologjike;
- D) Asnjeren;

44. Kateteri nuk eshte per perdorim:

- A) Vaskular;
- B) Vezikal;
- C) Ureteral;
- D) Asnjera;

45. Fluktacioni eshte karakteristike per:

- A) Flegmonen;
- B) Limfangoidin;
- C) Abscesin;
- D) Asnjeren

46. Fibrogastroskopia mund te jete mjet trajtimi per:

- A) Hemorragjine digjестive;
- B) Perforacionin e ulcers duodenale;
- C) Stenozen pylorike;
- D) Peritonitin post ulcers se perforuar;

47. Nuk ndodh ne hemorragjine gastro intestinale:

- A) Melene;
- B) Hemoptizi;
- C) Hematemeza;
- D) Anemia;

A) 48. Eshte karakterisitke ne ileusin mekanik:

- A) Stop i feceve dhe gazrave;
- B) Nauze e te vjella;
- C) Prania e hidroniveleve ne ro-grafi;
- D) Te gjitha

49. Nuk eshte komplikacion i nderhryjeve venoze qendrore:

- A) Pneumotoraksi;
- B) Nenushqyerjai;
- C) Limforrea;
- D) Embolia;

50. Eshte karakteristike e fazes akute te infeksionit :

- A) Dhimbja;
- B) Temperatura;
- C) Leukocitoza;
- D) Te gjitha

51. Nuk eshte e vertete per abscesin:

- A) Prania e kapsules piogjene;
- B) Prania e fluktuacionit;
- C) Mund te jete i nxehte / i ftohte
- D) Te gjitha

52. Eshte inflamacion i gjendrave te djerses:

- A) Adeniti;
- B) Celuliti;
- C) Hidroadeniti;
- D) Furunkuli;

53. Nuk eshte parameter kryesor ne vleresimin e gjendjes se te ushqyerit:

- A) Klinik;
- B) Imunologjik;
- C) Dietetik;
- D) Bioumoral;

54. Nuk eshte e vertete per ushqimin enteral:

- A) Eshte ushqim artificial i pacientit kirurgjikal;
- B) Merret me rruge venoze;
- C) Merret me rruge arteriale;
- D) Te gjitha

55. Cila nga keto plage nuk mbyllet per primum:

- A) Plaga traumatike e trajtuar pas 8 oreve te para;
- B) Plaga operatore;
- C) Asnjera
- D) Te gjitha

57. Elektrobisturia eshte instrument kirurgjikal qe perdoret per:

- A) Te prere;
- B) Te koaguluar;
- C) Te dyja;
- D) Asnjera

58. Kirurgji miniinvazive quhet:

- A) Lapartomia;
- B) Torakoskopia;
- C) Asnjera
- D) Te gjitha

59. Eshte urgjenca me e shpeshte kirurgjikale:

- A) Hemorragjia digjестive;
- B) Ulcer bulbi duodeni e perforuar;
- C) Apendiciti akut;
- D) Kalkuloza e kolecistes;

60. Infeksioni rrugeve limfatike quhet :

- A) Mastit;
- B) Limfadenit;
- C) Limfangoid;
- D) Asnjeren;

61. Kateteri nuk eshte per perdorim:

- A) Vaskular;
- B) Vezikal;
- C) Ureteral;
- D) Asnjera;

SHENDET RIPRODHUES

1.Shendeti riprodhues i perket:

- A) Vetem femrave
- B) Vetem adoleshenteve
- C) Meshkujve
- D) Te gjithëve

2.Implantet jane metoda kontracepsinhormonale

- A) Hormonale
- B) Jo hormonale
- C) Kimikate
- D) Asnjera nga keto

3.Pilulat progestative kunderindikohen ne;

- A) Gjashte mujorin e pare te ushqyerjes me gji
- B) Gjashte javet e para te ushqyerjes me gji
- C) Tre muajt e pare te ushqyerjes me gji.
- D) Asnjera nga keto

5. Ne kancerin e qafes se mitres kontaminimi ndodh nepermjet:

- A) Gjaket
- A) Rruges seksuale
- B) Shiringave
- C) Asnjera nga keto

11. DIU vendoset kur femra eshte:

- A) Shtatzane
- B) Ka nje infeksion puerperal
- C) Ka nje semundje inflamatore pelvike.
- D) Asnje nga opsionet

12. Parandalimi paresor ul:

- A) Prevalencen e nje semundjeje
- B) Incidencen e nje semundjeje
- C) Prevalencen e nje handikapi
- D) Incidencen e nje handikapi

13. Per te evituar nje shtatezani abstinohet:

- A) Nga dita 8 deri ne ditën e 14
- B) Nga dita 6 deri ne ditën e 14
- C) Nga dita 8 deri ne ditën e 18
- D) Nga dita 6 deri ne ditën e 12

14. Pilula contraceptive e urgjences miret ne:

- A) Mes te ciklit
- B) Fillim te ciklit
- C) Fund te ciklit
- D) N uk ka rendesi ne cfare momenti te ciklit

15. Hormoni luteinizues prodhohet:

- A) Ne hypofize
- B) Ne ovare
- C) Ne testikuj
- D) Ne uterus

17.Hormoni folikulo stimulus

- A)Provokon ovulacionin
- B)Mban trupin e verdhe
- C)Nxit rritjen dhe zhvillimin e folikulit ovarian
- D)Asnje nga opsionet

19.Nauzea,spotting,shtimi ne peshe,dhimbje koke,kane lidhje me:

- A)Pranueshmerine e metodes
- B)Efikasitetin e metodes
- C)Sigurine e metodes
- D)Tolerancen e metodes

20.Estradioli prodhohet nga:

- A)Hypofiza
- B)Ovaret
- C)Uterusi
- D)Asnje nga opsionet

21.Kush e percakton tipin e pilulave te kombinuara:

- A) Doza e etinil estradiolit
- B) Doza e progesteronit
- C) Doza e te dyve
- D) Asnje nga keta

23.Testosteroni eshte:

- A) Qeliza seksuale mashkullore
- B) Hormoni seksual femeror
- C) Hormoni seksual mashkullor
- D) Qeliza seksuale femerore

24.Kontraceptivet oral jane metoda:

- A) Hormonale
- B) Jo hormonale
- C) Kimikate
- D) Asnje nga opsionet

25. Hormoni folikulo stimulus prodhohet nga:

- A) Hypofiza dhe hypotalamusi
- B) Ovarët
- C) Uterusi
- D) Testikujt

26. Depoproverat bëjnë pjesë në metodat:

- A) Orale
- B) Kirurgjikale
- C) Subdermale
- D) Injektable

28. Metodat barriere janë:

- A) Metoda kontraceptive hormonale
- B) Metoda kontraceptive jo hormonale
- C) Metoda kontraceptive të urgjencës

30. E vetmja metode kontraceptive që mbrojnë nga HIV/AIDS është:

- A) Metoda kirurgjikale
- B) Spermicidet
- C) Kondomi
- D) Metodat hormonale

31. Menopauza natyrore është si rezultat i:

- A) Ndalimit të aktivitetit folikular ovarian
- B) Ablacionit kirurgjikal të ovareve
- C) Frenimit të funksionit të ovareve
- D) Të treja së bashku

33. Cilat metoda kontraceptive mund të mbrojnë nga I.S.T:

- A) Metoda e ditëve kalendarike
- B) Metodat barriere
- C) Injektablet
- D) Metodat orale

34. Vetinspektimi e vetëzaminimi bëhet në:

- A) Kancerin e qafes së mitres

- B) Menopauze
- C) Ne rastin e nje IST je
- D) Kancerin e gjirit

35.PAP testi behet per te diagnostikuar:

- A) Kancerin e qafes se mitres
- B) Kancerin e gjirit
- C) HIV/AIDS
- D) Asnje nga opsionet

37.Nje mesazh duhet te jete:

- A) I gjate
- B) I shkurter
- C) Te mos perseritet
- D) Asnje nga opsionet

39.Norplanti dhe implanon bejne pjese:

- A) Te metodat injektable
- B) Te metodat orale
- C) Te metodat barriere
- D) Te metodat subdermale

40.Ne rastin e metodës kirurgjikale te meshkujt:

- A) Metoda eshte efikase menjehere
- B) Metoda eshte efikase pas nje viti
- C) Metoda eshte efikase pas 6 muajsh

42.Cfare eshte ovulacioni:

- A) Pjekja e vezes
- B) Dalja e vezes nga folikuli
- C) Jane te dyja opsionet
- D) Asnje nga opsionet

LOGOPEDI

1. Hemisferat cerebrale janë:

- A) Identike me njëra-tjetrën;
- B) Thuajse identike me njëra-tjetrën
- C) Plotësisht të ndryshme nga njëra-tjetra
- D) Të pakrahasueshme

2. Hemisferat dallojnë nga njëra-tjetra nga:

- A) Përmasat e lobit frontal;
- B) Përmasat e lobit temporal;
- C) Lokalizimi I zonës së të folurës;
- D) Përmasat e lobit oksipital

3. Ndarja e hemisferave për arsye didaktike bëhet në:

- A) 2 lobe;
- B) 3 lobe;
- C) 4 lobe;
- D) 5 lobe.

4. Korteksi cerebral përbëhet nga:

- A) Kryesisht trupa qelizash nervore;
- B) Kryesisht zgjatimet e qelizave nervore;
- C) Kryesisht qeliza mbështetëse (jo neurone);
- D) Trupa qelizore dhe zgjatime të qelizave nervore në sasi thuajse të barabarta.

5. Vlerësimi i funksioneve të larta konjitive është i rëndësishëm, për:

- A) Kontributin semiologjik në lokalizimin e një lezioni;
- B) Vlerësimin e koeficientit të inteligjencës;
- C) Vlerësimin e funksionit cerebellar të pacientit
- D) Vlerësimin e aftësive motorike të pacientit.

6. Cila nga shenjat e mëposhtëme ka të bëjë me çrregullim të vëmendjes:

- A) Afazia;
- B) Apraksia;
- D) Aleksia;
- C) Shpërqëndrimi

7. Afazia , është:

- A) Çrregullim i vëmendjes,
- B) Çrregullim i të folurit,
- C) Çrregullim i nuhatjes
- D) Çrregullim i shikimit;

8. Çrregullimet e leximit quhen:

- A) Disleksi ;
- B) Afazi;
- C) Anosmi;
- D) Agnozi

9. Apraksia është:

- A) Paaftësi për të kryer lëvizje të vullnetshme në mungesë të defiçiteve motore;
- B) Paaftësi për të folur;
- C) Paaftësi për të nuhatur;
- D) Paaftësi për të shkruar.

10. Crregullimet e memories quhen:

- A) Afazi;
- B) Agrafi;
- C) Amnezi;
- D) Disfagi

11. Nervi cranial tek I cili mund të ndodhë dëmtim central apo periferik është:

- A) Nervi II;
- B) Nervi V;
- C) Nervi IX
- D) Nervi VII

12. Anosmia është shenjë e dëmtimit të :

- A) Nervave olfaktorë;
- B) Nervave facial;
- C) Nervave glosofaringealë;
- D) Nervave trigeminalë.

13. Hemianopsia është:

- A) Deficit motor;
- B) Crregullim sensitiv;
- C) Deficit i fushës vizive;
- D) Crregullim i ekuilibrit.

14. Ptoza palpebrale haset në dëmtimet e :

- A) Nervit olfaktor;
- B) Nervit okulomotor;
- C) Nervit trigeminal;
- D) Nervit hypogloss.

15. Shenja e “Bell”, haset në:

- A) Neuraljinë trigeminale
- B) Paralizën faciale centrale
- C) Paralizën faciale periferike;
- D) Neuraljinë glosso-faringeale.

16. Në dëmtimet e nervit glosso-faringeal kemi humbjen e shijes në:

- A) 1/3 e përparme të gjuhës;
- B) 1/3 e mesme të gjuhës;
- C) 1/3 e pasme të gjuhës;
- D) Gjithë gjuhën.

17. Nervi hypogloss është:

- A) Nerv sensitiv;
- A) Nerv motor;
- B) Nerv miks (sensitivo-motor);
- C) Nerv me funksion parasimpatik.

18. Shenja “Babinski”, haset në:

- A) Dëmtime të rrugëve ekstrapiramidale;
- B) Dëmtime të nervave kraniale;
- C) Dëmtime cerebellare
- D) Dëmtime të rrugëve piramidale

19. Tremori cerebellar është tremor:

- A) Intencional, vecanërisht në fund të lëvizjes;
- B) Tremor qetësie;
- C) Me përqëndrim distal;
- D) Shoqëruar me crrëgullime të të folurit.

20. Hypotonia muskulare është:

- A) Pakësim i rezistencës ndaj lëvizjes passive të anësive;
- B) Shtim i rezistencës ndaj lëvizjes passive të anësive
- C) Rezistencë e pandryshuar ndaj lëvizjes passive të anësive
- D) Mungesë e rezistencës ndaj lëvizjes passive të anësive.

21. Në mononeuropati, kemi dëmtim të trunkut të nervit periferik, nga:

- A) Shkaqe metabolike;
- B) Trauma apo kompresioni;
- C) Shkaqe infective;
- D) Shkaqe gjenetike.

22. Në sindromat miastenike dëmtimi primar është në:

- A) Nervat periferikë;
- B) Fibrat muskulare;
- C) Pllakën neuro-muskulare;
- D) Sistemin nervor qendror.

23. Në miopati, dëmtimi primar është në:

- A) Mekanizmin e kontraksionit muscular;
- B) Në junksionin muskul-nerv;
- C) Në nervat periferikë;
- D) Në harqet reflektore.

24. Rezervat neuronale me glukozë janë të mjaftueshme për:

- A) 0.5 – 1 min;
- B) 1 – 1.5 min;
- C) 1.5 – 2 min;
- D) 2 – 3min.

25. Furnizimi arterial i trurit sigurohet nga:

- A) 2 arterie cerebri anterior;

- B) 2 arteriet cerebri media;
- C) 2 arteriet communicante anterior dhe 2 arteriet communicante posteriore;
- D) 2 arteriet karotis dhe 2 arteriet vertebrale.

26. Patologjite cerebrovaskulare karakterizohen nga:

- A) Deficite subakute neurologjike, nga crregullim metabolic;
- B) Deficite akute neurologjike, nga crregullim I sistemit cerebro-vaskular;
- C) Deficit neurologjik me baze gjenetike;
- D) Deficit neurologjik nga intoksikacionet.

27. Skleroza multiple është patologji:

- A) Dismielinizante hereditare;
- B) Dismielinizante e fituar;
- C) Demielinizante;
- D) Metabolike.

28. M. Alzheimer është sëmundje:

- A) Demielinizante;
- B) Degjenerative progressive;
- C) Traumatike;
- D) Metabolike.

29. Në morbus Alzheimer, ndodh:

- A) Humbje progressive neuronale në korteksin e lobeve parietale e temporal;
- B) Humbje progressive neuronale në korteksin e lobeve oksipitale e frontale;
- C) Humbje progressive neuronale në korteksin e lobeve frontale e parietale;
- D) Humbje progressive neuronale në korteksin e lobeve oksipitale e parietale.

30. Skleroza laterale amiotrofike (SLA), karakterizohet nga:

- A) Humbje progressive neuronale në korteksin frontal;
- B) Humbje neuronale në traktin pyramidal;
- C) Humbje neuronale në fashikujt posterior;
- D) Humbje neuronale në cornu anterior yë medulles spinale.

31. Atrofitë spinocerebellare, janë:

- A) Patologji demielinizante;
- B) Patologji metabolike;
- C) Patologji hereditare;
- D) Patologji vaskulare.

32. Patologjitë metabolike të trashëguara të sistemit nervor shkaktohen nga:

- A) Defekte të një gjeni që kodon për një enzimë apo protein të rëndësishme;
- B) Defekte të kontraksionit muskular;
- C) Defekte të funksionit të harkut reflektor;
- D) Defekte të funksionit të pllakës neuro-muskulare.

33. Morbus Eïllson është pasojë e :

- A) Anomalisë së një proteine transportuese të hekurit në organizëm;
- B) Anomalisë së një proteine transportuese të klorit në organizëm;
- C) Anomalisë së një protein transportuese të azotit në organizëm;
- D) Anomalisë së një proteine transportuese të bakrit në organizëm.

34. MMSE, është test i cili përdoret:

- A) Për të vlerësuar forcën muskulare;
- B) Për të vlerësuar funksionet e larta konjitive;
- C) Për të vlerësuar sensibilitetin;
- D) Për të vlerësuar ekuilibrin.

35. Prova Romberg përdoret:

- A) Për vlerësimin e ekuilibrit;
- B) Për vlerësimin e memories;
- C) Për vlerësimin e sensibilitetit;
- D) Për vlerësimin e të folurit.

36. Dëmtimet e motoneuroneve inferior shkaktajnë:

- A) Reflekse të pandryshuara;
- B) Hiperrefleksi;
- C) Hyporefleksi;
- D) Arefleksi.

37. Dëmtimet e motoneuroneve superiore shkaktajnë:

- A) Reflekse të pandryshuara;
- B) Hiperrefleksi;
- C) Hyporefleksi;
- D) Arefleksi.

38. Zona motore primare ndodhet në:

- A) Korteksin motor;
- B) Korteksin parietal;
- C) Korteksin oksipital;
- D) Korteksin temporal

39. Dhimbje neuropatike është dhimbje që shkaktohet nga:

- A) Lezione të korteksit cerebral;
- B) Lezione të radikseve nervore;
- C) Lezione muskulare;
- D) Lezione të fibrave nervore.

40. Për të ekzaminuar sensibilitetin termik përdoren:

- A) Një epruvetë qelqi me ujë të ngrohtë;
- B) Një epruvetë qelqi me ujë të ftohtë;
- C) Dy epruveta qelqi, njëra me ujë të ngrohtë dhe tjetra me ujë të ftohtë;
- D) Një age sterile.

41. Zona sensore primare ndodhet në:

- A) Korteksin frontal;
- B) Korteksin parietal;
- C) Korteksin oksipital;
- D) Korteksin temporal

42. Në sindromën hipotalamike (dëmtime të hipotalamusit), kemi:

- A) Hypoestezi dhe disestezi;
- B) Hiperestezi;
- C) Hypoestezi;
- D) Anestezi.

43. Halucinacionet olfaktore kanë të bëjnë me:

- A) Mungesën e nuhatjes;
- B) Ekzagjerimin e nuhatjes;
- C) Mungesën e shijes;
- D) Perceptimin e aromave inekzistente.

44. Ataksia statike është:

- A) Paaftësia për të ruajtur ekuilibrin në pozicionin në këmbë;
- B) Paaftësia për të ruajtur ekuilibrin në ecje me sytë hapur;
- C) Paaftësia për të ruajtur ekuilibrin në ecje me sytë mbyllur;
- D) Paaftësia për të kryer provën index-nasi.

45. Dismetria është:

- A) Paaftësia për ruajtjen e ekuilibrit në ecje;
- B) Paaftësia për të arritur në mënyrë korrekte një shenjë;
- C) Paaftësia për të kapur një objekt;
- D) Paaftësia për të ecur me sytë mbyllur.

46. Agnozia është:

- A) Crregullim i kuptimit të të folurës;
- B) Crregullim i orientimit në kohë dhe hapësirë;
- C) Crregullim i njohjes së objekteve në prani të sistemeve sensoriale intakte;
- D) Crregullim i sensibilitetit taktil.

47. Elektroneurografia përcakton:

- A) Aktivitetin elektrik kortikal;
- B) Vijueshmërinë funksionale të harqeve reflektore;
- C) Funksionin e fibrave muskulare;
- D) Shpejtësinë e konduksionit nervor motor apo sensitiv;

48. Epilepsia reflektore përbëhet nga atake epileptike që:

- A) Shpërthejnë pas një stimuli të caktuar;
- B) Janë të palidhura me stimuj të ndryshëm;
- C) Hasen më tepër në të rriturit;
- D) Janë me bazë gjenetike.

49. EEG bën regjistrimin e :

- A) Funksionit të harqeve reflektore;
- B) Aktivitetit elektrik kortikal;
- C) Funksionit të fibrave muskulare;
- D) Funksionit të fibrave nervore.

50. Aura e migrenës është:

- A) Faza e dhimbjes maksimale të kokës;
- B) Periudha pas qetësimit të kësaj dhimbjeje;
- C) Simptomatologjia specifike që shfaqet para dhimbjes;
- D) Nuk ka lidhje me dhimbjen e kokës.

NEUROLOGJI

1. Neuronet e kanë origjinën në :
 - A) Epitelin e tubit neural;
 - B) Kavitetin e tubit neural;
 - C) Ektoderme;
 - D) Endodermë.

2. Rrjeta dendritike e një neuroni është:
 - A) Pjesa dalëse e informacioneve;
 - B) Pjesa receptive e neuronit;
 - C) Pjesa ku kryhen proceset metabolike të nevojshme për mbijetesën e neuronit;
 - D) Pjesa e përpunimit të informacionit të ardhur në neuron.

3. Neuronet më të mëdha të SNQ janë:
 - A) Neuronet e korteksit cerebellar;
 - B) Neuronet e mesencefalorit;
 - C) Neuronet e medullës oblongata;
 - D) Neuronet motore të zonës primare motore.

4. Deficencat enzimatike lizozomale të transmetuara gjenetikisht shkaktojnë:
 - A) Patologjitë degjenerative;
 - B) Patologjitë demielinizante;
 - C) Patologjitë e depozitimit lizozomal;
 - D) Patologjitë vasculare.

5. Degjenerimi I korteksit apo sistemeve të tjera neuronale, nënkupton:
 - A) Atrofi graduale neuronale që çon në humbje neuronale;
 - B) Humbje të qelizave gliale;
 - C) Humbje dhe pakësim të zgjatimeve aksonale;
 - D) Humbje të mbështjellës mielike.

6. Barriera hemato-encefalike është:

- A) Një system I transportit të substancave nga gjaku në likuorin cerebro-spinal;
- B) Një system që pengon kalimin e substancave nga gjaku në likuor cerebrospinal;
- C) Një system që nuk lidhet me kalimin e substancave nga gjaku në likuorin cerebrospinal;
- D) Një sistem Ikontrollit të transportit transkapilar, I cili ruan homeostazën në SNQ.

7. Edema cerebrale vazogjenike shkaktohet nga:

- A) Dalja e gjakut nga vazat cerebrale në hapësirat përreth tyre;
- B) Humbja e lëngut në hapësirën intersticiale për shkak të prishjes së integritetit të barrierës endoteliale;
- C) Dalja e gjakut në hapësirat qarkulluese të likuorit cerebrospinal;
- D) Dalja e gjakut në hapësirën subaraknoidale.

8. Edema citotoksike shkaktohet nga:

- A) Dalja e gjakut në hapësirën subaraknoidale;
- B) Dalja e gjakut në hapësirat qarkulluese të likuorit cerebrospinal;
- C) Akumulimi intraqelizor I likuorit;
- D) Dalja e gjakut nga vazat cerebrale në hapësirat përreth tyre.

9. Edema citotoksike është më e shprehur në :

- A) Korteksin cerebral;
- B) Substancën e bardhë cerebrale;
- C) Ganglionet bazale;
- D) Cerebellum.

10. Leukomalacia periventrikulare është:

- A) Humbje e korteksit frontal;
- B) Humbje e korteksit temporal;
- C) Humbje e substancës së bardhë përreth ventrikujve lateral;
- D) Humbje e korteksit parietal.

11. Amnezia Korsakoff është një crregullim I shkaktuar nga:

- A) Lezionet bilaterale frontale;
- B) Lezionet bilateral të hypokampusit;
- C) Lezionet bilateral mezencefalike;
- D) Lezionet bilateral oksipitale.

12. Shkaku më i shpeshtë i leukomalacisë periventriculare është:

- A) Hemorragjia cerebellare;
- B) Iskemia neonatale;
- C) Traumat e lindjes;
- D) Hypoksia perinatale.

13. Encefalopatia bilirubinike është:

- A) Encefalopati metabolike e fituar e periudhës neonatale;
- B) Encefalopati metabolike e të rriturit;
- C) Encefalopati hypoksike-iskemike;
- D) Encefalopati metabolike e trashëguar.

14. Termi porencefali përshkruan :

- A) Një lesion gliotik cerebral;
- B) Një lesion iskemik kortikal cerebral;
- C) Një kavitet të mbushur me lëng në trurin fetal apo neonatal;
- D) Një hemorragji intraventriculare cerebrale.

15. Severiteti i sëmundjeve të depozitimit lizozomal varet nga:

- A) Moshë e shfaqjes;
- B) Mënyra e trashëgimisë;
- C) Sëmundjet shoqëruese;
- D) Aktiviteti residual i enzimës lizozomale.

16. Klasifikimi i sëmundjeve të depozitimit lizozomal bazohet në:

- A) Enzimën deficitare dhe përbërjen kimike të akumuluar;
- B) Zonën më të prekur nga akumulimi i substancës kimike;
- C) Kohën e shfaqjes;
- D) Mënyrën e trashëgimisë.

17. Shenjat klinike të Leukodistrofisë metakromatike shfaqen në fëmijët:

- A) E porsalindur;
- B) 0 – 1 vjec;
- C) 1 – 2 vjec;
- D) > 2 vjec.

18. Fëmijët me Sëmundjen Krabbe, zakonisht jetojnë:

- A) 3 - 4 vjec
- B) 2 – 3 vjec
- C) 1 – 2 vjec
- D) 6 – 12 muaj.

19. Në sëmundjen Gaucher janë përcaktuar:

- A) 1 fenotip klinik;
- B) 2 fenotipe klinike;
- C) 3 fenotipe klinike;
- D) 4 fenotipe klinike.

20. Lipofuscinozat ceroide neuronale ndahen në katër grupe në bazë të:

- A) Indeve më frekvente të depozitimit;
- B) Kohës së shfaqjes;
- C) Mënyrës së trashëgimisë;
- D) Formave klinike.

21. Në sëmundjen Niemann-Pick të tipit C, në lizozome kemi depozitim të:

- A) Kolesterolit;
- B) Sfingomielinës;
- C) Triglicerideve;
- D) Sfingolipideve.

22. Proceset kryesore të përfshira në formimin e sistemit nervor qendror janë :

- A) Formimi i tubit neural, proliferimi i qelizave neuronale, migrimi, lidhjet sinaptike dhe mielinizimi;
- B) Diferencimi i ektodermës dhe endodermës;
- C) Formimi i kavitetëve të mbushura me likuor cerebrospinal;
- D) Ndarja e kateve të vecanta të SNQ.

23. Empiema subdurale është:

- A) Lezion supurativ multifokal kortikal;
- B) Lezion supurativ difuz kortikal;
- C) Lezion supurativ difuz i substancës së bardhë cerebrale;
- D) Lezion supurativ i lokalizuar i kufizuar në hapësirën subdurale.

24. Infeksionet perinatale dhe kongenitale të SNQ kanë shkaktarët më të shpeshtë:
- A) Infeksionet bakteriale;
 - B) Infeksionet mykotike
 - C) Infeksionet virale, parazitare dhe spiroketale;
 - D) Infeksionet tuberkulare.
- .
25. Shenjat dhe simptomat e tumoreve cerebrale përcaktohen nga:
- A) Moshë e pacientit.
 - B) Lloji i qelizave përbërëse të masës tumorale;
 - C) Faktorët sistematikë të individit;
 - D) Lokalizimi i rritjes së tumorit dhe efekti sekondar e edemës vazogjenike.
26. Sëmundja Von Hippel – Lindau sipas trashëgimisë , është:
- A) Sëmundje autosomale dominante;
 - B) Sëmundje autosomale recesive;
 - C) Sëmundje e fituar;
 - D) Sëmundje me trashëgimi të lidhur me kromozomin X.
- .
27. Leukoencefalopatia hemorragjike acute kam bazë:
- A) Hereditare
 - B) Demielinizante;
 - C) Cerebro-vaskulare;
 - D) Traumatike.
- .
28. Skleroza tuberosa është:
- A) Sëmundje e lokalizuar;
 - B) Sëmundje sistematike me prekje më të shpeshtë të heparit;
 - C) Sëmundje sistematike me prekje më të shpeshtë të trurit;
 - D) Sëmundje sistematike me prekje më të shpeshtë të organeve riprodhuese.
- .
29. Anencefalia është:
- A) Mungesë e septum pellucidum;
 - B) Mungesë e korpusit callos;
 - C) Mungesë e cerebellumit;
 - D) Mungesë e plotë e hemisferave cerebrale apo reduktim i shprehur i përmasave të tyre.
- .

30. Angiopatia amiloide cerebrale:
- A) Lidhet me crregullimin e metabolizmit enzimatik në indin cerebral;
 - B) Lidhet me depozitim të amiloidit në paretet e vazave cerebrale;
 - C) Lidhet me deficiencat enzimatike lizozomiale;
 - D) Lidhet me crregullimet e qarkullimit të likuorit cerebrospinal.
- .
31. Angiopatia amiloide cerebrale:
- A) Shkak shumë i shpeshtë i hemorragjive cerebrale;
 - B) Shkak shumë i shpeshtë i patologjive hereditare;
 - C) Shkak shumë i shpeshtë i deficiteve motore;
 - D) Shkak shumë i shpeshtë i dëmtimeve spinale.
- .
32. Mielinoliza central pontine është:
- A) Patologji neonatal hereditare;
 - B) Patologji post-traumatike;
 - C) Patologji acute demielinizante që haset tek alkoolistët kronikë e në shumicën e rasteve shoqërohet me hyponatremi;
 - D) Patologji cerebro-vaskulare.
- .
33. Sindroma Leigh, është një encefalopati mitokondriale e fëmijërisë që prek:
- A) Cerebellumin;
 - B) Korteksin cerebral;
 - C) Substancën e bardhë cerebrale;
 - D) Trunkusin e trurit dhe ganglionet bazale.
- .
34. Sëmundja Alexandër është një leukodistrofi e rrallë e karakterizuar nga:
- A) Grumbullimi aminoacideve anormale në fibrat nervore;
 - B) Grumbullimi në astrocite i fibrave të Rosenthal-it;
 - C) Grumbullimi i lipideve në astrocite;
 - D) Grumbullimi i lizozomeve në astrocite.
- .
35. Sindroma Kearns – sayre është një mitokondropati që:
- A) Prek kryesisht substancën gri cerebrale;
 - B) Prek kryesisht medullen spinale;
 - C) Prek kryesisht substancën e bardhë cerebrale;
 - D) Prek kryesisht ganglionet bazale.

36. Adrenoleukodistrofia e lidhur me kromozomin X, I shfaq shenjat klinike në moshën:
- A) Neonatale;
 - B) 2 – 4 vjec;
 - C) 4- 8 vjec;
 - D) 8 – 12 vjec.
37. Adrenoleukodistrofia e lidhur me kromozomin X, ka:
- A) Crregullime kortikale të dëgjimit dhe shikimit;
 - B) Crregullime të sensibilitetit;
 - C) Deficite motore;
 - D) Atake epileptike.
38. Sindroma Zellëeger ka:
- A) Trashëgimi autosomale recesive;
 - B) Trashëgimi autosomale dominante;
 - C) Trashëgimi të lidhur me kromozomin X;
 - D) Është sëmundje e fituar.
39. Sindroma Zellëeger I shfaq shenjat klinike:
- A) Në periudhën neonatal;
 - B) Në moshën 2 – 4 vjec;
 - C) Në moshën 4 – 8 vjec;
 - D) Në moshën 8 – 10 vjec.
51. Hemisferat cerebrale janë:
- A) Identike me njëra-tjetrën;
 - B) Thuajse identike me njëra-tjetrën
 - C) Plotësisht të ndryshme nga njëra-tjetra
 - D) Të pakrahasueshme

52. Hemisferat dallojnë nga njëra-tjetra nga:
- A) Përmasat e lobit frontal;
 - B) Përmasat e lobit temporal;
 - C) Lokalizimi I zonës së të folurës;
 - D) Përmasat e lobit oksipital
53. Ndarja e hemisferave për arsye didaktike bëhet në:
- A) 2 lobe;
 - B) 3 lobe;
 - C) 4 lobe;
 - D) 5 lobe.
54. Korteksi cerebral përbëhet nga:
- A) Kryesisht trupa qelizash nervore;
 - B) Kryesisht zgjatimet e qelizave nervore;
 - C) Kryesisht qeliza mbështetëse (jo neurone);
 - D) Trupa qelizore dhe zgjatime të qelizave nervore në sasi thujse të barabarta.
55. Vlerësimi I funksioneve të larta konjitive është I rëndësishëm, për:
- A) Kontributin semiologjik në lokalizimin e një lezioni;
 - B) Vlerësimin e koeficientit të inteligjencës;
 - C) Vlerësimin e funksionit cerebellar të pacientit
 - D) Vlerësimin e aftësive motorike të pacientit.
56. Cila nga shenjat e mëposhtëme ka të bëjë me çrregullim të vëmendjes:
- A) Afazia;
 - B) Apraksia;
 - C) Aleksia;
 - D) Shpërqëndrimi

57. Afazia , është:

- A) Crregullim i vëmendjes,
- B) Crregullim i të folurit,
- C) Crregullim i nuhatjes
- D) Crregullim I shikimit;

58. Crregullimet e leximit quhen:

- A) Disleksi ;
- B) Afazi;
- C) Anosmi;
- D) Agnozi

59. Apraksia është:

- A) Paaftësi për të kryer lëvizje të vullnetshme në mungesë të defiçiteve motore;
- B) Paaftësi për të folur;
- C) Paaftësi për të nuhatur;
- D) Paaftësi për të shkruar.

60. Crregullimet e memories quhen:

- A) Afazi;
- B) Agrafi;
- C) Amnezi;
- D) Disfagi

61. Nervi cranial tek I cili mund të ndodhë dëmtim central apo periferik është:

- A) Nervi II;
- B) Nervi V;
- C) Nervi IX
- D) Nervi VII

62. Anosmia është shenjë e dëmtimit të :

- A) Nervave olfaktorë;
- B) Nervave facial;
- C) Nervave glosofaringealë;
- D) Nervave trigeminalë.

63. Hemianopsia është:

- A) Deficit motor;
- B) Crregullim sensitiv;
- C) Deficit I fushës vizive;
- D) Crregullim I ekuilibrit.

64. Ptoza palpebrale haset në dëmtimet e :

- A) Nervit olfaktor;
- B) Nervit okulomotor;
- C) Nervit trigeminal;
- D) Nervit hypogloss.

65. Shenja e “Bell”, haset në:

- A) Neuraljinë trigeminale
- B) Paralizën faciale centrale
- C) Paralizën faciale periferike;
- D) Neuraljinë glosso-faringeale.

66. Në dëmtimet e nervit glosso-faringeal kemi humbjen e shijes në:

- A) 1/3 e përparme të gjuhës;
- B) 1/3 e mesme të gjuhës;
- C) 1/3 e pasme të gjuhës;
- D) Gjithë gjuhën.

67. Nervi hypogloss është:

- A) Nerv sensitiv;
- B) Nerv motor;
- C) Nerv miks (sensitivo-motor);
- D) Nerv me funksion parasimpatik.

68. Shenja “Babinski”, haset në:

- A) Dëmtime të rrugëve ekstrapiramidale;
- B) Dëmtime të nervave kraniale;
- C) Dëmtime cerebellare
- D) Dëmtime të rrugëve piramidale

69. Tremori cerebellar është tremor:

- A) Intencional, vecanërisht në fund të lëvizjes;
- B) Tremor qetësie;
- C) Me përqëndrim distal;
- D) Shoqëruar me crrëgullime të të folurit.

70. Hypotonia muskulare është:

- A) Pakësim I rezistencës ndaj lëvizjes passive të anësive;
- B) Shtim I rezistencës ndaj lëvizjes passive të anësive
- C) Reziztencë e pandryshuar ndaj lëvizjes passive të anësive
- D) Mungesë e rezistencës ndaj lëvizjes passive të anësive.

71. Në mononeuropati, kemi dëmtim të trunkut të nervit periferik, nga:

- A) Shkaqe metabolike;
- B) Trauma apo kompresioni;
- C) Shkaqe infective;
- D) Shkaqe gjenetike.

72. Në sindromat miastenike dëmtimi primar është në:

- A) Nervat periferikë;
- B) Fibrat muskulare;
- C) Pllakën neuro-muskulare;
- D) Sistemin nervor qendror.

.

73. Në miopati të, dëmtimi primar është në:

- A) Mekanizmin e kontraksionit muskular;
- B) Në junksionin muskul-nerv;
- C) Në nervat periferikë;
- D) Në harqet reflektore.

.

74. Rezervat neuronale me glukozë janë të mjaftueshme për:

- A) 0.5 – 1 min;
- B) 1 – 1.5 min;
- C) 1.5 – 2 min;
- D) 2 – 3min.

.

75. Furnizimi arterial i trurit sigurohet nga:

- A) 2 arterie cerebri anterior;
- B) 2 arteriet cerebri media;
- C) 2 arteriet comunicante anterior dhe 2 arteriet comunicante posteriore;
- D) 2 arteriet karotis dhe 2 arteriet vertebrale.

.

76. Patologjitë cerebrovaskulare karakterizohen nga:

- A) Deficite subakute neurologjike, nga crregullim metabolic;
- B) Deficite akute neurologjike, nga crregullim i sistemit cerebro-vaskular;
- C) Deficit neurologjik me baze gjenetike;
- D) Deficit neurologjik nga intoksikacionet.

.

77. Skleroza multiple është patologji:

- A) Dismielinizante hereditare;
- B) Dismielinizante e fituar;
- C) Demielinizante;
- D) Metabolike.

78. M. Alzheimer është sëmundje:

- A) Demielinizante;
- B) Degjenerative progressive;
- C) Traumatike;
- D) Metabolike.

79. Në morbus Alzheimer, ndodh:

- A) Humbje progressive neuronale në korteksin e lobeve parietale e temporal;
- B) Humbje progressive neuronale në korteksin e lobeve oksipitale e frontale;
- C) Humbje progressive neuronale në korteksin e lobeve frontale e parietale;
- D) Humbje progressive neuronale në korteksin e lobeve oksipitale e parietale.

80. Skleroza laterale amiotrofike (SLA), karakterizohet nga:

- A) Humbje progressive neuronale në korteksin frontal;
- B) Humbje neuronale në traktin pyramidal;
- C) Humbje neuronale në fashikujt posterior;
- D) Humbje neuronale në cornu anterior yë medulles spinale.

81. Atrofitë spinocerebellare, janë:

- A) Patologji demielinizante;
- B) Patologji metabolike;
- C) Patologji hereditare;
- D) Patologji vaskulare.

82. Patologjitë metabolike të trashëguara të sistemit nervor shkaktohen nga:

Defekte të një gjeni që kodon për një enzimë apo protein të rëndësishme;

Defekte të kontraksionit muskular;
Defekte të funksionit të harkut reflektor;
Defekte të funksionit të pllakës neuro-muskulare.

83. Morbus Eillson është pasojë e :

- A) Anomalisë së një proteine transportuese të hekurit në organizëm;
- B) Anomalisë së një proteine transportuese të klorit në organizëm;
- C) Anomalisë së një protein transportuese të azotit në organizëm;
- D) Anomalisë së një proteine transportuese të bakrit në organizëm.

84. MMSE, është test I cili përdoret:

- A) Për të vlerësuar forcën muskulare;
- B) Për të vlerësuar funksionet e larta konjitive;
- C) Për të vlerësuar sensibilitetin;
- D) Për të vlerësuar ekuilibrin.

85. Prova Romberg përdoret:

- A) Për vlerësimin e ekuilibrit;
- B) Për vlerësimin e memories;
- C) Për vlerësimin e sensibilitetit;
- D) Për vlerësimin e të folurit.

86. Dëmtimet e motoneuroneve inferior shkaktojnë:

- A) Reflekse të pandryshuara;
- B) Hiperrefleksi;
- C) Hyporefleksi;
- D) Arefleksi.

87. Dëmtimet e motoneuroneve superiore shkaktojnë:

- A) Reflekse të pandryshuara;

- B) Hiperrefleksi;
- C) Hyporefleksi;
- D) Arefleksi.

88. Zona motore primare ndodhet në:

- A) Korteksin motor;
- B) Korteksin parietal;
- C) Korteksin oksipital;
- D) Korteksin temporal

89. Dhimbje neuropatike është dhimbje që shkaktohet nga:

- A) Lezione të korteksit cerebral;
- B) Lezione të radikseve nervore;
- C) Lezione muskulare;
- D) Lezione të fibrave nervore.

90. Për të ekzaminuar sensibilitetin termik përdoren:

- A) Një epruvetë qelqi me ujë të ngrohtë;
- B) Një epruvetë qelqi me ujë të ftohtë;
- C) Dy epruveta qelqi, njëra me ujë të ngrohtë dhe tjetra me ujë të ftohtë;
- D) Një age sterile.

91. Zona sensore primare ndodhet në:

- A) Korteksin frontal;
- B) Korteksin parietal;
- C) Korteksin oksipital;
- D) Korteksin temporal.

92. Në sindromën hipotalamike (dëmtime të hipotalamusit), kemi:

- A) Hypoestezi dhe disestezi;
- B) Hiperestezi;
- C) Hypoestezi;

D) Anestezi.

93. Halucinacionet olfaktore kanë të bëjnë me:

- A) Mungesën e nuhatjes;
- B) Ekzagjerimin e nuhatjes;
- C) Mungesën e shijes;
- D) Perceptimin e aromave inekzistente.

94. Ataksia statike është:

- A) Paaftësia për të ruajtur ekuilibrin në pozicionin në këmbë;
- B) Paaftësia për të ruajtur ekuilibrin në ecje me sytë hapur;
- C) Paaftësia për të ruajtur ekuilibrin në ecje me sytë mbyllur;
- D) Paaftësia për të kryer provën index-nasi.

95. Dismetria është:

- A) Paaftësia për ruajtjen e ekuilibrit në ecje;
- B) Paaftësia për të arritur në mënyrë korrekte një shenjë;
- C) Paaftësia për të kapur një objekt;
- D) Paaftësia për të ecur me sytë mbyllur.

96. Agnozia është:

- A) Crregullim i kuptimit të të folurës;
- B) Crregullim i orientimit në kohë dhe hapësirë;
- C) Crregullim i njohjes së objekteve në prani të sistemeve sensoriale intakte;
- D) Crregullim i sensibilitetit taktil.

97. Elektroneurografia përcakton:

- A) Aktivitetin elektrik kortikal;
- B) Vijueshmërinë funksionale të harqeve reflektore;
- C) Funksionin e fibrave muskulare;

D) Shpejtësinë e konduksionit nervor motor apo sensitiv;

98. Epilepsia reflektore përbëhet nga atake epileptike që:

- A) Shpërthejnë pas një stimuli të caktuar;
- B) Janë të palidhura me stimuj të ndryshëm;
- C) Hasen më tepër në të rriturit;
- D) Janë me bazë gjenetike.

99. EEG bën regjistrimin e :

- A) Funkcionit të harqeve reflektore;
- B) Aktivitetit elektrik kortikal;
- C) Funkcionit të fibrave muskulare;
- D) Funkcionit të fibrave nervore.

100. Aura e migrenës është:

- A) Faza e dhimbjes maksimale të kokës;
- B) Periudha pas qetësimit të kësaj dhimbjeje;
- C) Simptomatologjia specifike që shfaqet para dhimbjes;
- D) Nuk ka lidhje me dhimbjen e kokës.

SEMUNDJET E BRENDSHME

1. Per ulceren peptike jane te verteta pohimet e meposhtme pervec:

- A) Etiopatogjeneza e se ciles ka lidhje me prishjen e ekuilibrit ndermjet faktoreve agresive dhe atyre mbrojtës të mukozës

- B) Ne etiopatogjeneze ka rol helicobacter pilori
- C) Prek vetem doudenin
- D) Preparatet AIJS kane rol te rendesishem ne shkaktimin e ulcers

2. Lupusi Eritematoz i Sistemik eshte te gjitha pervec :

- A) Semundje me etiologji te njohur
- B) Karakterizohet nga depozitimi i antikorpeve dhe komplekseve imune ne indet dhe qelizat e demtuara prej tyre
- C) Patogjeneza lidhet me faktore gjenetike, ambientale, hormone seksuale
- D) Kemi hiperaktivitet te Lim T dhe B

3. Lupusi Eritematoz i Sistemik prek :

- A) Me teper femrat me moshen e riprodhimit
- B) Prek me teper meshkujt
- C) Prek me teper grate ne menopauze
- D) Prek me teper meshkujt ne pubertet

4. Lupusi Eritematoz Sistemik prek me teper :

- A) Femrat e bardha
- B) Femrat me ngjyre
- C) Meshkujt e bardhe
- D) Meshkujt me ngjyre

5. Per Lupusin Eritematoz Sistemik jane te gjitha te verteta pervec:

- A) Semundja mund te preki cdo organ apo sistem
- B) Fillon me shenja te pergjithshme : dobesi, temperature subfebrile, lodhje
- C) Semundja ka shfaqje ne lekure
- D) Nuk shoqerohet me alterime hematologjike

6. Lupusi Medikamentoz i ka te gjitha pervec:

- A) Eshte nje sindrom me shfaqje klinike dhe imunologjike te ngjashme me LES
- B) Shkaktohet nga prokainamidi, hidralazina, izoniazidi, metildopa, klorpromazina
- C) Jane te rralla prekja e SNQ dhe demtimet renale
- D) Demtimet ne organet e brendeshme jane te parikthyeshme

7. Antikorpjet antinuklear :

- A) Perbejne nje shenje laboratorike kryesore ndonese jo specifike per LES
- B) Nuk jane positive ne patologji te tjera
- C) Shkohen ne mikroskop te zakonshem
- D) Nuk perbehet nga nentipa antikorpesh

8. Per mjekimin e LES perdoren te gjitha preparatet e meposhtme pervec :

- A) Preparate AIJS
- B) Antimalarike te sintezes
- C) Preparate citotoksike
- D) Levotiroksine

9. Artriti Reumatoid eshte nje semundje per te cilen jane te verteta te gjitha pervec :

- A) Prek afersisht 0.8% te popullates
- B) Femrat preken me shume se meshkujt
- C) Semundja eshte me shpeshte ne dekadene e pare dhe te dyte te jetes
- D) Karakterizohet nga prania e sinoviteve inflamatore persistentete

10. Artralgjia ne Artritin Reumatoid eshte :

- A) Jo simetrike
- B) Pa rritje te ndjeshmerise gjate palpimit dhe enjtje te artikulacioneve te prekura
- C) Preken me shume artikulacionet e vogla te gishtave
- D) Inflamacioni per kohe te gjate nuk shkakton deformim artikulacionesh

11. Shfaqet ekstrartikulare te AR perfshijne te gjitha pervec:

- A) Prekjen pulmonare
- B) Crrgullimet hematologjike
- C) Crrgullimet okulare
- D) Pranine e hiperkeratozes dhe atrofise se lekures

12. Kush eshte pohimi i gabuar per FR

- A) Eshte i pranishem ne serumin e rreth 83 % te pacienteve
- B) Pozitivitei i tij lidhet me agresivitetin e semundjes
- C) Eshte i njejte me ANA
- D) Eshte pozitiv dhe ne patologji te tjera

13. Per mjekimin e AR perdoren te gjitha pervec :

- A) Anti inflamatorët jo steroid
- B) Glukokortikosteroidët intrartikular dhe sistemik
- C) Metformina
- D) Sulfazalazina

14. Sklerodermia

- A) Patogjeneza e semundjes eshte e sqaruar plotesisht
- B) Nuk eshte e lidhur me faktore nderveprues gjenetik dhe mjedisor
- C) Karakteristike per semundjen eshte prania e fibrozës së lëkurës
- D) Semundja prek me teper meshkujt se femrat

15. Sklerodermia difuze

- A) Karakterizohet vetem nga prekja e anesive distale e proksimale
- B) Nuk preken organet e brendeshme
- C) Ka prognoze te mire
- D) Ka hipomotilitet ezofageal dhe hipofunkcion gastrointestinal

16. Dermatomioziti dhe polimioziti .

- A) Nuk jane semundje autoimune
- B) Te semuret nuk ankohen per dobesi dhe dhimbje muskujsh
- C) Keta te semure kane alterime te cpk, sgot, sgpt, cpk
- D) Keta te semure nuk kane autoantikorpe

17 Rashi ngjyre lejla rreth syve eshte tipik per :

- A) Dermatomiozitin
- B) Polimiozitin
- C) Sindromin sjogren
- D) Sklerodermine

18. Te semuret me miopati kane:

- A) Dobesi te muskujve distale
- B) Dobesi te muskujve proksimale
- C) Dobesi te qafes
- D) Nuk kane shqetesime te lokalizuara

19. Ne polimiozitet janë të pranishme antikorpet :

- A) ANA
- B) Anti-dsDNA
- C) RF
- D) Jo-1

20. Mjekimi në dermatomiozitet

- A) Efekti i tij vlerësohet përmes ndryshimit të vlerave të CPK
- B) Përdoret metformina dhe AIJS
- C) Mjekohet me ACE inhibitor dhe beta bllokues
- D) Semundja është e perkohshme dhe nuk ka nevojë për mjekim

21. Klasifikimi i vaskulitëve paësorë bazohet në:

- A) Agresivitetin e sëmundjes
- B) Permasat e vazave të prekura
- C) Ekzistojnë dy klasa vaskulitesh
- D) Nuk ka ndryshuar gjatë viteve

22. Granulomatoza Wegener eshte :

- A) Vaskulit i vazave te medha
- B) Eshte vaskulit granulomatoz i aparatit respirator i shoqeruar dhe me glomerulonefrit
- C) Te semuret nuk kane demtime otojatrike
- D) Eshe vaskulit i vazave mesatare

23. Spondiliti ankilozant eshte ;

- A) Semundje e femrave ne dhjetevjecarin e katert te peste te jetes
- B) Semundje e meshkujve ne dhjetevjecarin e dyte dhe te trete te jetes
- C) Semundje e grave ne menopauze
- D) Semundje infektive

24. Spondiliti ankilozant eshte semundje inflamatore qe prek :

- A) Kryesisht artikulationet e anesive
- B) Nuk fillon me shenjat e sakroileitit
- C) Prek zakonisht shtyllen kurrizore dhe artikulationet sakroiliake
- D) Dekursi natyror i semundjes nuk perfundon ne invalidizim te plote

25. Ne spondilitin ankilozant FR dhe ANA :

- A) Ne spondilitin ankilozant FR dhe ANA jane negative

- B) Ne spondilitin ankilozant FR eshte negative ANA eshte pozitive
- C) Ne spondilitin ankilozant FR dhe ANA jane pozitive
- D) Ne spondilitin ankilozant FR eshte pozitive ANA eshte negative

26. Ankesat e te semurit me spondilit ankilozant :

- A) Rendohen nga aktiviteti fizik
- B) Nuk ndikohen nga aktiviteti fizik
- C) Ngurtesimi mengjzor zgjat 15 min
- D) Ankesat e te semurit rendohen ne mengjes dhe permiresohen gjate aktivitetit fizik

27. Spondiliti ankilozant mjekohet :

- A) Me terapi medikamentoze dhe terapi fizike
- B) Vetem me terapi medikamentoze
- C) Vetem me terapi fizike
- D) Nuk ka nevoje per mjekim shume te gjate pothuajse gjithe jeten

28. Acidi urik :

- A) Prodhimi i tij nuk lidhet ngushte me metabolizmin e purinave
- B) Hiperuricemia eshte karakteristike e goutes
- C) Ne gout acidi urik ne plazem dhe lengun jashte qelizor eshte ne vlera normale
- D) Hiperuricemia eshte rezultat i vetem nje crregullimi

29. Podagra fillon zakonisht ne :

- A) Artikulacionin e gjurit
- B) Artikulacionet e gishtave te duarve
- C) Artikulacionin e qafes
- D) Gishtin e madh te kembes

30. Diagnostikimi i podagres

- A) Mbeshtetet vetem ne te dhenat klinike
- B) Eshte i nevojshem analizimi i lengut sinovial
- C) Jane te mjaftueshme vetem te dhenat laboratorike
- D) Asnjera prej tyre

31. Insuficenca renale akute klasifikohet ne :

- A) Ne dy kategori : prerenale dhe postrenale
- B) Ne IRA residuale dhe jo residuale
- C) Ne IRA prerenale, intrinseke, dhe postrenale
- D) Asnjera prej tyre

32. Insuficenca renale akute eshte nje sindrome klinike e karakterizuar nga :

- A) Renia e shpejte e filtrimit glomerular, rritje e metejshme e nivelit te kreatinines dhe azotemise

- B) Renia e shpejte e filtrimit glomerular, ulje e metejshme nivelit te kreatinines dhe azotemise
- C) Rritje e shpejte e filtrimit glomerular, ulje e metejshme nivelit te kreatinines dhe azotemise
- D) Rritje e shpejte e filtrimit glomerular, rritje e metejshme nivelit te kreatinines dhe azotemise

33. Kemi infeksion urinar kur :

- A) Eshte e pranishme bakteriuria me $> 10^5$ baktere per ml
- B) Eshte e pranishme bakteriuria me $< 10^2$ baktere per ml
- C) Nuk ka baktere ne urine
- D) Asnjera prej ketyre

34. Cistitet jane :

- A) Infeksione te rrugeve te siperme urinare
- B) Infeksione te rrugeve te poshtme urinare
- C) Jane infeksione te veshkes
- D) Nuk shoqerohen me djegje gjate urinimit

35. Infeksionet e rrugeve urinare:

- A) Infeksionet e rrugeve urinare jane shkak i pergjithshem i sepsit
- B) Infeksionet urinare nuk shoqerohen me dhimbje e djegje gjate urinimit
- C) Nuk shoqerohen me crregullime te aktit te urinimit
- D) Asnjera prej ketyre

36. IRA prerenale shkakohet nga te gjitha pervec:

- A) Diarese
- B) Hemoragjia e brendeshme dhe e jashtme
- C) Humbjet ne lekure (djegjet)
- D) Prania e osteoartritit

37. Nekroza tubulare akute eshte shaku me i shpeshte i :

- A) IRA prerenale
- B) IRA intrinseke
- C) IRA postrenale
- D) Asnjere prej tyre

38. Te gjitha sa me poshte jane te verteta per IRA prostrenale pervec:

- A) Eshte mjaft e shpeshte ndermjet te semureve ambulatorore
- B) Prek me shume burrat sesa grate
- C) Ne shumicen e rasteve i detyrohet bllokimit uretral ose uretral
- D) Shkaktohet nga medikamente qe reduktojne filtrimin glomerular

39. Studimi i sedimentit urinare jep te dhena te rendesishme per cilen kategori te IRA :

- A) IRA prerenale
- B) IRA intrinseke
- C) IRA postrenale
- D) Asnjeren prej tyre

40. Te gjitha jane te verteta per mjekimin e llojeve te ndryshme te IRA pervec:

- A) Shumica e rasteve me IRA zgjidhen me masa konservative
- B) Ne IRA prerenale nga humbja e lengjeve duhet bere korrigjimi i ketyre humbjeve
- C) Ne rastet e IRA me pielonefrit perdoren antibiotike
- D) Nuk merret asnjehere ne konsiderate hemodializa.

41. Glomerulonefriti akut poststreptokoksik :

- A) Nuk eshte nje nga format me te shpeshta te glomerulonefriteve
- B) Perben shkaktun me te shpeshte te glomerulonefriteve tek femijet
- C) Nuk ka lidhje me infeksionet e shkaktuara nga streptokoku beta hemolitik i grupit A
- D) Asnjera prej tyre

42. Fakteore risku per krijimin e infeksioneve te rrugev urinare jane te gjitha pervec:

- A) Shtatezania
- B) Diabeti
- C) Aktiviteti seksual
- D) Prania e osteoartritit bashkeshoqerues.

43. Pamja radiologjike e shkopit te bambuse eshte tipike per cilen patologji:

- A) LES
- B) AR
- C) Polimiozit
- D) Morbus Bekteriev

44. Sakroileiti eshte shenje fillestare e ciles prej ketyre patollogjive :

- A) Sklerodermi
- B) Artrit reumatoid
- C) Osteoartrit
- D) Morbus Bekteriev

45. Aspirina ka te gjitha efektet e meposhtme pervec :

- A) Efekt analgjezik
- B) Efekt antinflamator
- C) Efekt analgjezik
- D) Efekt sedativ

46. Guret ne veshka :

- A) Nuk shkaktohen nga hiperkalciuria apo hiperoksaluria
- B) Levizja e gurit ne sistemin ekskretor nuk shkakton dhimbje
- C) Guret e pelvisit renal mund te asimptomatike apo te shkaktojne vetem hematuri
- D) Shume pak prej gureve perbehen nga oksalatet e kalciumit

47. Me ane te bronkoskopise realizohen te gjitha pervec :

- A) Mundeson vleresimin e anomalive endobronkiale

- B) Vleresimin e rrugeve percjellese te ajrit
- C) Marrjen e biopsise
- D) Ndhmon ne venien e diagnozes se embolise pulmonare

E) 48. Ne azmen bronkiale :

- A) Obstruksioni i rrugeve te ajrit eshte episodik dhe reversibel
- B) Reaktiviteti i rrugeve te ajrit ndaj stimujve specifike dhe jo specifike eshte normal
- C) Te semuret nuk kane ne anamneze prani te semundjeve te tjera alergjike
- D) Asnjera prej ketyre.

49. Bronkiti kronik eshte :

- A) Nje semundje e sistemit respirator e karakterizuar nga prodhimi i shtuar i sekrecioneve mukozale trakeobronkiale te shoqeruara me kolle e sputum per te pakten 3 muaj deri ne 1 vit
- B) Nje semundje e sistemit respirator e karakterizuar nga prodhimi i shtuar i sekrecioneve mukozale trakeobronkiale te shoqeruara me kolle e sputum per te pakten 3 jave.
- C) Nje semundje e sistemit respirator e karakterizuar nga prodhimi i shtuar i sekrecioneve mukozale trakeobronkiale te shoqeruara me kolle e sputum per te pakten 1 muaj.
- D) Asnjera prej sa me siper.

50. Etiopatogjeneza e bronkitit kronik mendohet te lidhet me shkaktaret e meposhtem pervec :

- A) Me tymin e duhanit
- B) Ekspozimi ndaj pluhurave profesionale
- C) Infeksione te shkaktuara nga mykoplazma pneumonie
- D) Ndotja atmosferike

51. Pneumonia eshte :

- A) Pakesim i elasticitetit te rrugeve te ajrit ne nivel te bronkiolave terminale
- B) Shkaktohet nga ekspozimi ndaj pluhurave profesional
- C) Nje infeksion i parenkimes pulmonare i shkaktuar nga lloje te ndryshme bakteriesh, virusesh, myqesh
- D) Asnje prej pohimeve nuk eshte i sakte

52. Pneumoni shkaktojne te tera pervec:

- A) Shigella dysantheriae
- B) Klamidia
- C) Rikeciet
- D) Mykoplazma

53. Rol te rendesishem ne vendosjen e diagnozes se pneumonise ka:

- A) Radiografia pulmonare
- B) Torakocenteza dhe biopsia e pleures
- C) Shintigrafia
- D) Testet kutane

54. Ekzaminimi i sekrecioneve te nje te semuri me pneumoni tregon:

- A) Nese ne preparatin e pregatitur nga sekrecionet mukoalveolare jane te pranishme < 25 qeliza polimorfonukleare dhe > 10 qeliza epiteliale inflamacioni eshte i perpahur
- B) Nese ne preparatin e pregatitur nga sekrecionet mukoalveolare jane te pranishme > 25 qeliza polimorfonukleare dhe < 10 qeliza epiteliale inflamacioni eshte i perpahur
- C) Nese ne preparatin e pregatitur nga sekrecionet mukoalveolare jane te pranishme < 25 qeliza polimorfonukleare dhe > 10 qeliza epiteliale inflamacioni nuk eshte i perpahur
- D) Te gjitha jane te pasakta

55. Kolesterolitotal duhet mbajtur ne keto vlera :

- A) Kolesterolitotal nen 460 mg/dl
- B) Kolesterolitotal nen 200 mg/dl
- C) Kolesterolitotal nen 500 mg/dl
- D) D kolesterolitotal nen 50 mg/dl

56. Faktor madhor rrisiku per SAK jane te tere pervec

- A) Dislipidemia
- B) Niveli i larte i kolesterolit
- C) Inaktiviteti fizik
- D) Anamneza familjare

57. Faktor rrisiku per Sak jane te gjithe pervec

- A) Anamneza familjare
- B) Perdorimi i alkolit
- C) Gjendja social ekonomike
- D) Perdorimi i substancave kozmetike

58. Lidhja e SAK me moshen :

- A) Me rritjen e moshes rritet risku per SAK
- B) Me rritjen e moshes ulet risku per SAK
- C) Nuk ka asnje lidhje te SAK me moshen
- D) Moshja eshte faktor risku madhor per SAK

59. Ne IRA prerrenale demtimi renal eshte rezultat i te gjithave pervec:

- A) Humbje e volumit nga trakti gastrointestinal
- B) Humbje kutaneale e volumit (djegjet)
- C) Humbje e volumit si rezultat i hemoragjise interne dhe ekstrene
- D) Demtimit strukturor i nefroneve

60. Oliguria percaktohet si :

- A) Si sekretimi i me pak se 400 ml/ urine ne dite
- B) Si sekretimi i me pak se 200 ml/ urine ne dite
- C) Si sekretimi i me shume se 3 l/ urine ne dite
- D) Si sekretimi i me pak se 100 ml/urine ne dite

61. Anuria percaktohet si :

- A) Si sekretimi i me pak se 300 ml/ urine ne dite
- B) Si sekretimi i me pak se 400 ml/ urine ne dite
- C) Si sekretimi i me shume se 2 l/ urine ne dite
- D) Si sekretimi i me pak se 100 ml/urine ne dite

62. Ne crregullimet e ritmit bejne pjese te gjitha pervec :

- A) Takikardia sinusale
- B) Bradikardia sinusale
- C) Flateri atrial
- D) Infarkti i miokardit

63. Takikardia paroksizmale supraventrikulare me rihyrje pa parangacmim eshte :

- A) Crregullim i ritimit sinusal
- B) Crregullim i ritmit atrial
- C) Crregullim i ritmit junksional
- D) Asnjera prej tyre

65. Crregullimet e ritmit sinusal perfshijne te gjitha pervec:

- A) Takikardia sinusal
- B) Bradikardia sinusale
- C) Fibrilacioni atrial
- D) Aritmia sinusale dhe disfunksioni i nyjes sinusale.

66. Polakiuria eshte:

- A) Urinim naten
- B) Urinim me djegje
- C) Urinim i shpeshte
- D) Urinim i dhimbshem

67. Enuresis nocturna eshte:

- A) Urinim i dhimbshem
- B) Urinim me djegje
- C) Urinim i shtuar
- D) Urinim naten

68. Lupusi eritematoz sistemik

- A) Eshte semundje qe prek meshkujt me shpesh se femrat
- B) Eshte semundje qe prek femrat e bardha me shpesh se ato me ngjyre
- C) Eshte semundje qe prek me shpesh femrat dhe ka incidence me te madhe ne grate me ngjyre
- D) Eshte semundje qe prek njelloj si meshkujt dhe femrat

69. Tiroidja normale:

- A) Eshte e palpueshme
- B) Nuk eshte e palpueshme
- C) Eshte e palpueshme vetem tek meshkujt
- D) Eshte e palpueshme vetem tek femrat

70. Karakteristike per fazen akute te tirotoksikozes eshte prania e:

- A) T3 dhe T4 te rritura dhe TSH te ulet
- B) T3 dhe T4 te rritura dhe TSH e larte
- C) T3 dhe T4 te ultra dhe TSH te ulet
- D) Asnjera prej tyre

71. Per mjekimin e morbus Graves perdoren te gjitha pervec :

- A) Karbimazoli
- B) Metimazoli
- C) Indometacina
- D) Propiltiuracili

72. Tiroidit Hashimoto i perkasin te gjitha pervec :

- A) Eshte inflamacion kronik me natyre autoimune i tiroides
- B) Gusha mund te paraqitet asimetrike
- C) Nuk jane te pranishme asnje lloj autoantikorpesh
- D) Pothuajse gjithmone jane te pranishme antikorpet antimikrozomiale

73. Shkaktare te hipertiroidizmit jane te gjitha pervec:

- A) Semundjet autoimune
- B) Patologji tumorale
- C) Patologji inflamatore
- D) Atireoza

74. Morbus Basedov:

- A) Prek me shpesh femrat e moshes 30 deri ne 50 vjec
- B) Mungon ekzoftalmia
- C) Funkcioni kardiak eshte normal
- D) Mungon osteoporoza

75. Rreziqet e hipotiroidizmit jane te gjitha pervec:

- A) Koma miksedematoze
- B) Aksidentet kardiake
- C) Prania e astenise
- D) Nervoziteti

76, Eshte i pranishem diabeti kur:

- A) Glicemia esell ne dy dozime eshte me e larte se 1.40 g/l
- B) Glicemia esell ne dy dozime eshte me e larte se 2.40 g/l
- C) Glicemia esell ne dy dozime eshte me e larte se 0.20 g/l
- D) Glicemia esell ne dy dozime eshte me e larte se 0.10 g/l

77. Ne komplikacionet metabolike akute te diabetit hyjen te gjitha pervec:

- A) Acidoketoza
- B) Koma hiperosmolare
- C) Mikroangiopatia diabetike
- D) Hipoglicemite

78. Diabeti i tipit te pare mjekohet me :

- A) Daonil
- B) Metformine
- C) Insuline
- D) Diete hiperkalorike

79. Diabeti i tipit te dyte mjekohet me:

- A) Daonil, metformine
- B) Insuline
- C) Diete hiperkalorike
- D) Kufizim i aktivitetit fizik

80. Tension arterial normal konsiderohen vlerat e meposhtme:

- A) Sistoliku me i vogel se 140 mmhg dhe diastoliku me i vogel se 90 mmhg
- B) Sistoliku me i madh se 140 mmhg dhe diastolike me i madhe se 90 mmhg\
- C) Sistoliku ndermjet 160-180 mmhg dhe diastolike 90-120 mmhg
- D) Sistoliku me i madh se 190 mmhg dhe diastoliku me i madh se 100 mmhg

81. Hipertension pragu konsiderohet :

- A) Me shume se 180 mmhg dhe ose me shume se 105
- B) Sistolike 140-180 mmhg dhe ose diastolike 90-105
- C) Sistoliku 140-180 mmhg dhe ose diastoliku 90-95
- D) Sistoliku me i vogel se 140 mmhg dhe diastoliku me i vogel se 90 mmhg

82. Faktore ambientale qe favorizojne krijimin e HTA jane te gjitha pervec:

- A) Perdorimi i natriumit
- B) Perdorimi i pakte i kaliumit
- C) Aktiviteti fizik
- D) Obeziteti

83. Fakte ambjantale qe favorizojne krijimin e HTA jane te gjitha pervec

- A) Alkoli
- B) Obeziteti
- C) Dieta e pasur me kalcium
- D) Aktiviteti fizik

84. Mjekimi i HTA perfshin te gjitha pervec :

- A) Aktivitetin fizik
- B) Shtimi i ne peshe
- C) Kufizimi i kripes
- D) Lenia e alkolit

85. Mjekimi farmakologjik i HTA perfshin te gjitha pervec :

- A) Metotreksat
- B) Betablokues
- C) Ace inhibitore
- D) Antagoniste te kalciumit

86. Panusi eshte strukture histologjike qe vihet re tek te semuret me :

- A) Lupus Eritematoz Sistemik
- B) Sklerodermi difuze
- C) Artrit Reumatoid
- D) Dermatomiozit

87. Shfaqet ekstrartikulare me te rralla qe vihen re ne Artritit Reumatoid jane :

- A) Nderlikimet kardiake
- B) Demtimet ne veshka
- C) Vaskuliti reumatoid
- D) Demtime te syve

88. Manifestimi me i zakonshem dhe nga me te hershmit qe vihet re ne Morbus Bekteriev eshte :

- A) Rashi malar ne forme fluture
- B) Artriti simetrik i artikulacioneve te vogla te duarve
- C) Sakroileiti
- D) Polifagi dhe polidipsi

89. Pielonefriti

- A) Perfaqeson nje infeksion te rrugeve te siperme urinare
- B) Perfaqeson nje infeksion te rrugeve te poshtme urinare
- C) Cnuk eshte i dhimbeshem
- D) Ansjera prej tyre

90. Glomerulonefritet klasifikohen ne:

- A) Paresore dhe dytesore
- B) Akute dhe kronike
- C) Akute kronike dhe me ecuri te shpejte
- D) A+C

91. Hipotiroidizmi shfaqet me simptomat e meposhtme pervec:

- A) Krampe muskulare
- B) Tolerance ndaj te ftohtit
- C) Konstipacion
- D) Gjendje te pergjumur

92. Cili nga medikamentet konsiderohet si linja e pare e mjekimit ne depresionin madhor dhe crregullimin obsesiv kompulsiv:

- A) Inhibitorët selektive të rikapjes së serotoninës
- B) Antidepresantët triciklike

- C) Stabilizuesit e humorit
- D) Benzodiasepinat

93. Cila prej pergjigjeve tregon pranine e tolerances ndaj opioideve:

- A) Per te kontrolluar dhimbjen nevojiten doza me te medha opioidesh krahasuar me ate qe duhej jave me pare
- B) Duhet dhene stimulante per te balancuar efektet sedative te opioideve
- C) Pacienti behet anksioz kur kujton oren kur duhet te marre opioidet
- D) Pacienti nuk ka konstipacion pas marrjes se dozave te zakonshme te opioideve

94. Nje pacient 53 vjecar i cili mjekohet me ibuprofen 400mg dy here ne dite per te kuruar dhimbjen kronike te mesit krijon edeme e ekstremiteteve te poshtme. Infermierja qe kujdeset per te mendon se edema eshte rezultat i :

- A) Uljes te funksionit renal
- B) Uljes se nivelit te kreatinines
- C) Rritje te filtrimit glomerular
- D) Rritje te nivelit te proteinave plazmatike

95. Cila prej semundjeve te meposhtme muskulo-skeletike karakterizohet nga prania e nyjeve te Heberdenit ?

- A) Lupusi eritematoz sistemik
- B) Artriti reumatoid
- C) Sclerodermia
- D) Osteoporozia

96. Sindroma Kushing :

- A) Eshte semundje qe vjen si pasoje e zvoglimit te prodhimit te kortizolit nga gjendra mbiveshkore
- B) Eshte semundje qe vjen si pasoje e shtimit te prodhimit te kortizolit nga gjendra mbiveshkore
- C) Eshte semundje qe karakterizohet nga dhimbja e mesit dhe ngurtësimi mengjezor
- D) Ne kete semundje mungojne shenjat e virilizmit si depozitimi i dhjavit ne regjionet ndermje shpatullave

97. Karakteristike per sindromen Kushing eshte prania e te gjithave pervec :

- A) Hiperkalemise
- B) Alkaloza metabolike
- C) Prodhimi ektopik i ACRH
- D) Artriti simetrik i artikulacioneve interfalangeal proksimal

98. Terapia e spondilitit ankilozant perfshin:

- A) Vetem terapi medikamentoze

- B) Terapi medikamentoze dhe fizike
- C) Levotiroskine dhe deksametazon
- D) Desmopresine dhe indometacine

99. Te semuret me poliarterit nodoz kutan kane :

- A) Renie ne peshe
- B) Temperature
- C) Demtime ne organe
- D) Noduse subkutane

100. Ne sklerodermine e lokalizuar ka demtime :

- A) Vetem te miokardit
- B) Vetem renale
- C) Vetem gastrointestinale
- D) Vetem te anesive

101. Arteriti Takayasu eshte inflamacion granulomatoz i arterive

- A) Te vogla
- B) Te medha
- C) Te mesme
- D) Nuk eshte inflamacion granulomatoz

102. Ne mjekimin e pneumonise perdoren me shpesh preparatet e meposhtme pervec:

- A) Ampicilina
- B) Ceftazidina
- C) Eritromicina
- D) Metotreksati

103. Cilat nga format e hepatiteve kane tendence te kronicizohen:

- A) Hepatiti a
- B) Hepatiti b
- C) Hepatiti c
- D) Hepatiti b dhe hepatiti c

104. Cirroza e melcise mund te shkaktohet nga faktoret e meposhtem pervec:

- A) Hepatitit B
- B) Hepatitit C
- C) Alkolit
- D) Hepatitit A

105. Ne hepatitin alkolik

- A) Vlerat e aspartat aminotransferazes (GPT) jane ne norme
- B) Vlerat a aspartat amiontransferazes (GPT) jane thuajse dy here me te larta se ato te alanin aminotransferazes (GOT)
- C) Bilirubina eshte ne norme
- D) Pacienti nuk ka ndryshime te oreksit

106.Mjekimi i cirrozës alkoholike përfshin të gjitha përveç :

- A) Diete
- B) Nderprerje të marrjes së alkoolit
- C) Vitamin terapi
- D) Voltaren në doza të larta

107.Osteoporozë mjekohet me :

- A) Bifosfonate
- B) Kripër të arit
- C) D- penicilamine
- D) Azatioprine

108.Steoartriti është:

- A) Semundje inflamatorë muskuloskeletike
- B) Semundje degenerative muskuloskeletike
- C) Semundje endokrine
- D) Semundje gjenetike

109. Glukokortikosteroidet e injektueshem ne artikulacione indikohen te perdoren ne patologjite muskuloskeletike :

- A) Inflamatore
- B) Mekanike
- C) Ne prani te osteoporozes
- D) Ne prani te frakturave

110. Pneumonia atipike karakterizohet nga keto shenja pervec:

- A) Dobesi trupure
- B) Dhimbje koke
- C) Kolle e thate
- D) Melena

ORTOPEDI TRAUMATOLOGJI

1. Elementet qe formojne kallusin e bute e kane prejardhjen nga:

- A) Qelizat mezenkimale te padiferencuara
- B) Fibrat e kolagenit
- C) Indi kartilaginoz
- D) Indi kockor

1. Demtimi i nervit ulnar ndodh me shpesh ne :

- A) Fraktura e olekranit
- B) Fraktura e humerusit
- C) Fraktura e epikondilit medial humeral
- D) Fracture e radiusit

2. Cili eshte komplikacioni me i shpeshte i fractures subkapitale te femurit?

- A) Pseudoarthroza
- B) Nekroze e kokes e pseudoarthrozes
- C) Rigiditeti nekroza
- D) Kufizim i rotacionit

3. Angiografia eshte:

- A) Futja e sondave ne kavitetin artikular
- B) Matja e differences se potencialit ndermjet dy pikave te nje muskuli
- C) Ekzaminimi i spaciumit subaraknoidal me ane te lendeve te kontrastit
- D) Vizualizimi i eneve te gjakut nepermjet lendeve te kontrastit

4. Kuadri radiologjik i osteoarthrozave shfaq:

- A) Osteofikate, fraktura patologjike
- B) Shkopi i bambuse
- C) Skleroze subhondrale, osteofite, zvogelim i rimes artikulare
- D) Osteoporozë

5. C'është fraktura Monteggia?

- A) Fracture e radiusit + fraktur e olekranit
- B) Fraktur suprakondilare + fraktur olekrani
- C) Fraktur e ulnes + fraktur e kokes se radiusit
- D) Fraktur e ulnes + luksacion i kokes se radiusit

6. Tumori gjigandocelular (osteoklastoma) prek me shume:

- A) Epifizen
- B) Diafizen
- C) Apofizen
- D) Metafizen

7. Me cfare shoqerohet me shpesh coxa valga?

- A) Luksacionin congenital kokso femoral
- B) Luksacion habitual i pateles
- C) Epifiziolize e kokes femorale
- D) Anteversionin e shtuar

8. Reparimi dhe zevendesimi i kokes se demtuar ne osteokondrite kerkon:

- A) 2 vjet
- B) 3 vjet
- C) 1.5 vjet
- D) 5 vjet

9. Cili eshte tipi me i shpeshte ne frakturat suprakondilare te humerusit?

- A) Rotator

B) Ekstension

C) Perzier

D) Fleksion

10. Kur vendoset per trajtimin kirurgjikal te skoliozes?

A) Kur skolioza fillon ne moshe te vogel

B) Kur nuk korrigohet edhe me korse millowoki

C) Kur ka dhe kifoze

D) Kur kendi i deformimit dhe ecuria e tij nuk lejojne trajtimin ortopedi

11. Osteoporozja shkaktohet nga:

A) Deficit i mases kockore

B) Deficit i fosforit

C) Deficit i proteinave

D) Deficit i kalciumit

12. Si trajtohet zakonisht luksacioni kokso femoral traumatic :

A) Reponim me anestezi

B) Kirurgji

C) Terheqje skeletike

D) Reponim pa anestezi

13. Ne luksacionin skapulohumeral struktura e demtuar eshte:

A) Indi synovial

B) Kartilago artikulare

C) Kocka

D) Kapsula artikulare

14. Kur diagnostikohet zakonisht scapula alta?

- A) 2-3 vjec
- B) 4-5 vjec
- C) 0-1 vjec
- D) 3-4 vjec

15. Cfare preket ne akondroplazi?

- A) Rritja ne gjeresi e kockes
- B) Rritja ne gjatesi e kockes
- C) Zhvillimi indit lidhor
- D) Zhvillimi i musculatures

16. Ceshte arthroskopia?

- A) Futja e sondave ne kavitetin artikular
- B) Ekzaminimi i spaciumit subaraknoidal me ane te lendeve te kontrastit
- C) Matja e differences se potencialit ndermjet dy pikave te nje muskuli
- D) Injektimi i lendeve te kontrastit ne artikulacion e vleresimi radiologjik i tyre

17. Cili simptom eshte me i shpeshte ne artrozat

- A) Kontrakture e pergjithshme
- B) Rigiditeti mengjesor
- C) Dhimbje episodike

18. Cili eshte komplikacioni me i shpeshte i fractures trokanterike:

- A) Shkurtese ose zgjatje e anesise
- B) Pseudoartroza
- C) Kufizim i levizjeve
- D) Konsolidim vicioz

19. Myelomeningocela shoqeron:

- A) Spina bifida
- B) Sakrolizim i vertebres L5
- C) C)sinostaza vertebrale
- D) Skoliozen kongenitale

20. Kontraktra Volkman eshte:

- A) Kontraktore e m. Flexore
- B) Miosit post traumatic
- C) Shkurtese e kockave te parakrahut
- D) Paralize e m. Flexore te parakrahut

21. Demtimi i nervit median shoqerohet me:

- A) Demtim te tendineve abduktore
- B) Fracture te metakarpeve
- C) Demtim te tendineve flexore
- D) Fraktur colles

22. Sindromi Volkman ndodh me shpesh ne frakturat e:

- A) Diafiza e femurit
- B) Radius e ulna
- C) Radiusit
- D) Ulnes

KIRURGJI (PJESA E PERGJITHSHME)

1. Cilat jane parametrat e ciklit te pare te autoklavit:

A) 10 min, 100 °c, presioni 2bar

B) 7-10 min, 121 °c, 1 bar

C) 10-15 min, 121 °c, 2 bar

D) 5-7 min, 134 °c, 2 bar

E) 7-10 min, 134 °c, 1 bar

2. Cili incision lejon nje nderhyrje ne te njejten kohe ne kavitetin torakal dhe abdominal:

A) Sternotomia

B) Toraco-freno-laparotomik

C) Median

D) Bisubcostal

E) Mc burney

3. Fijet e polipropilenit jane fije:

A) Natyrale

B) Artificial

C) Sintetike

D) Vegjetale

4. Sonda Sengstaken –Blakemore perdoret per:

A) Kateterizimin e vezikes urinare

B) Hemostazen e variceve te ezofagut

C) Tharjen e sekrecioneve gastrike

- D) Enteroklizma
- E) Rastet e okluzionit intestinal

5. Dreni Kehr perdoret per drenimin e:

- A) Rrugeve biliare/biles
- B) Kolonit/duodenit
- C) Toraxit
- D) Kolecistes
- E) Abceseve

6. Skleroterapia ne endoskopi perdoret ne:

- A) Heqjen e trupave te huaj
- B) Zgjerimin e stenozave te aparatit tretes
- C) Hemostazen endoskopike
- D) Polipektomine
- E) ERCP pankreato-kolangiografia retrograde endoskopike

7. Cila nga keto nuk eshte komplikacion i menjehershem pas operacionit?

- A) Obstruksioni i rrugeve te ajrit
- B) Nauze dhe te vjella
- C) Infeksioni i plages
- D) Hipotermia
- E) Ankthi dhe dhimbja

8. Ne reaksionin e alarmit, pergjigja neuronale realizohet nga:

- A) Hormonet
- B) Riekuilibri hidro-elektrolitik
- C) Katekolaminat
- D) Reaksionet hemodinamike
- E) Riekuilibri metabolic

9. Solucionet e glukozes 10%, 20% dhe 33% injektohen ne:

- A) Sistemet venoze periferike
- B) Sistemet venoze qendrore
- C) Sistemet arteriale periferike
- D) Sisteme arteiale qendrore
- E) Kavitate humerale

10. Cila nga keto nuk eshte komplikacion i menjehershem i nderhyrjeve venoze qendrore?

- A) Hematoma lokale
- B) Pneumotoraksi
- C) Ndryshimet kardiake
- D) Infeksionet
- E) Demtimet vaskulare

11. Cila nga keto nuk eshte shenje klinike e embolise me gaz?

- A) Insuficenca kardiokulatore/ cianoze
- B) Polipne
- C) Hiperglicemi
- D) Hypertension i lehte
- E) Dhimbje

12. Cila nga keto nuk eshte komplikacion i mevonshem i nderhyrjeve venoze qendrore?

- A) Infeksioni
- B) Thyerja e kateterit
- C) Hematoma lokale
- D) Mbyllja e kateteri
- E) Tromboza e thelle venoze

13.Keto jane ndryshimet ne qarkullimin venoz ne ulcerat venoze te kembes pervec njeres:

- A) Mungesa e valvulave te thella
- B) Bllokimit te venave te thella
- C) Fistula arterio-venoze
- D) Mosfksionimi neuromuscular
- E) Hipotensioni arterial

14.Cila nga keto nuk eshte shkak i krijimit te ulcerave diabetike:

- A) Mikro/makro angiopatia
- B) Demtimet trofike nga pakesimi i qarkullimit te gjakut
- C) Bllokimet e venave te thella
- D) Prirja per infeksione
- E) Neuropatia

15.Sindromat e imobilizimit kane te bejne me:

- A) Ulcerat nga dekubituset
- B) Ulcerat arteriale
- C) Ulcerat diabetike
- D) Ulcerat neuropatike
- E) Ulcerat venoze

16.Mbas sa kohe keshillohet nderprerja e antibiotikeve pas zhdukjes se shenjave te infeksionit:

- A) 8 oreve
- B) 16 oreve
- C) 1-2 diteve
- D) 2-4 dite
- E) 1 jave

17. Keto jane kushtet e zhvillimit te infeksionit ne plaget kirurgjikale pervec njerit:

- A) Vaskularizimi i keq
- B) Prania e trupave te huaj dhe nekrozave
- C) Flora polimikrobiale
- D) Hapja e plages
- E) Lloji I antibiotikut te perdorur

18. Keto jane faktoret e pergjithshem qe vonojne sherimin e palgeve pervec:

- A) Dehidratimi oi te semurit
- B) Mosha e madhe
- C) Hipoproteinemia
- D) Semundjet endocrine
- E) Prania e trupat te huaj

19..Keto jane faktoret locale qe vonojne shermin e plageve pervec:

- A) Infeksioni bakterial i plages
- B) Deficencat e vitaminave
- C) Hematomat
- D) Qepja jo e rregullt
- E) Indet e devitalizuara

20. Nje palge quhet e kontaminuar kur kalojne se paku:

- A) 1-2 ore
- B) 4 ore
- C) 8 ore
- D) 16 ore
- E) 24 ore

21. Matja e nivelit te albumines ne gjak lidhet me cilin nga parametrat e vleresimit te ushqyerjes se nje pacienti?

- A) Klinike
- B) Antropometrik
- C) Biohumerale
- D) Immunologjike

22. Sa eshte BMI Body mass index ne njerezit normale

- A) 15-20 kg/m²
- B) 20-25
- C) 25-30
- D) 30-35
- E) >35

23 Cila nga keto nuk eshte patologji e menjehershme dhe fillestare e stomive te aparatit tretes:

- A) Pezmatimi I lekures
- B) Fistula
- C) Hemoragjia
- D) Edema
- E) Iskemia dhe nekroza

24Cila nga keto nuk eshte patologji e vone e stomive (gojezave) te aparatit tretes?

- A) Terheqja, mbledhja e gojezes
- B) Granuloma
- C) Fistula
- D) Hernie

E) Stenoze

25. Keto jane shkaqet e abdomenit akut kirurgjikal pervec:

- A) Apendisiti akut
- B) Keto-acidoza diabetike
- C) Divertikuliti (divertikuli i zorres se holle/trashe)
- D) Kolecistiti akut
- E) Infarkti intestinal

26. Keto jane shkaqet e abdomenit akut mjeksor pervec:

- A) Patologjite metabolike dhe endokrine
- B) Semundjet reumatizmale dhe te kolagjenit
- C) Insuficenca mbiveshkore
- D) Infeksionet
- E) Sindrom okluziv nga invaginacioni i zorres

27. Dhimbja ne abdomenin akut shkaktohet nga keto pervec:

- A) Hemoragji
- B) Tranziti intestinal
- C) Bllokimi
- D) Ischemia
- E) Shpimi

28. Karakteri dhe shkalla e ndryshimeve qe ndodhin ne organizmin e te operuarit varen nga keto faktore pervec njerit:

- A) Nga lloji i anestezise
- B) Nga lloji i analizave dhe ekzaminimeve preoperatore
- C) Nga pergatitja preoperatore
- D) Nga gjendja e te semurit para operacionit
- E) Nga lloji i nderhyrjes kirurgjikale

PJESA SPECIALE

1. Tiroidja prodhon:

- A) Serotonine
- B) Kalcitonine
- C) Histamine
- D) Glukagon
- E) TSH

2. Kalcitonina ben:

- A) Uljen e Kalciumit ne lengun jashteqlizor
- B) Rritjen e kalciumit ne lengun jashteqlizor
- C) Uljen e depozitimit te kalciumit ne kocka
- D) Rritjen e kalciumit ne urine
- E) Asnje nga keto

3. Origjina etiologjike e tiroiditit akut eshte:

- A) Virale
- B) I panjohur
- C) Infektive
- D) Autoimmune

4. Tiroiditi kronik sklerotik Riedel jep keto shenja klinike pervec:

- A) Dispne
- B) Disfoni
- C) Hipotiroidizem
- D) Tetani
- E) Enjtje te tiroides

5. Parathormoni ben (4 pike):

- A) Uljen e kalciumit ne lengun jashteqlizor
- B) Rritjen e depozitimit te kalciumit ne kocka
- C) Rritjen e kalciumit ne lengun jashteqlizor
- D) A+b
- E) Uljen e kalciumit ne urine

6. Cila nga keto nuk eshte komplikacion i kirurgjise se tiroideve (tiroidektomise)

- A) Disfoni
- B) Tetani
- C) Infeksion, sepsis
- D) Krize tirotoksike
- E) Kompresion (shtypje)

7. Karakteristikat klinike te morbus Basedow jane keto pervec:

- A) Takikardi
- B) Ekzoftalmi
- C) Shqetesime/pagjumesi
- D) Shtim ne peshe
- E) Rritje e permasave te tiroides

8. Hemotoraksi shkaktohet nga keto gjendje pervec:

- A) Infarkt pulmonar
- B) Infeksion
- C) Trauma
- D) Neoplazi
- E) Koagulopati

9. Cila nga keto nuk eshte shenje e nje mediastiniti akut?

- A) Dhimbje
- B) Hemotoraks
- C) Kollë
- D) Disfagi
- E) Temperature

10. Mezotelioma eshte tumor i:

- A) Bronkeve
- B) Parenkimes pulmonare
- C) Mediastinit
- D) Pleures
- E) Diafragmes

11. Sipas stadifikimit te tumoreve cili nga te meposhtmet eshte me i avancuar? I radhisni ato

- A) T1 n1 m0
- B) T2 n2 m0
- C) T2 n1 m1
- D) T3 n2 m0
- E) T4 n3 m0

12. Cila metode diagnostike konsiston ne vizualizimin e vazave mushkerore me ane te kontrastit?

- A) Radioskopia
- B) Bronkografia
- C) Angiopneumografia
- D) Tomografia e kompjuterizuar
- E) Bronkoskopia

13. Cili nga llojet e pneumotoraksit shkakton me teper ngjeshje te pulmonit?

- A) Pneumotoraksi i mbyllur
- B) Pneumotoraksi i hapur
- C) Pneumotoraksi i hapur me natyre traumatike
- D) Pneumotoraksi valvular
- E) Pneumotoraksi i hapur me natyre idiopatike

14. Karcinoma spinocelulare eshte tumor i:

- A) Tiroides
- B) Paratiroides
- C) Ezofagut
- D) Pulmonit
- E) Stomakut

15. Mastopatia fibrocistike prek grate e moshes:

- A) 20-35 vjec
- B) 25-45 vjec
- C) 40-50 vjec
- D) 50-60 vjec
- E) 55-70 vjec

16. Mbas cilit stad kanceri i gjirit eshte inoperabel/i paoperueshem?

- A) 2a
- B) 2b
- C) 3a
- D) 3b
- E) 4

17. Krahu i fryer (limfedema) eshte pasoje e kirurgjise se:

- A) Toraksit
- B) Gjirit
- C) Pulmonit
- D) Stomakut
- E) Tiroideve

18. Krahu i fryer (limfedema) shfaqet pas:

- A) 3 ditesh
- B) 1-2 javesh
- C) 4-6 javesh
- D) 6-12 javesh
- E) 12-24 javesh

19. Cila nga te meposhtmet nuk eshte karakteristike per fibroadenomen e gjirit?

- A) Ka konsistence te forte
- B) Siperfaqe te lemuar ose e lobular
- C) Prek grate e moshes nen 30 vjec
- D) Paraqet dhimbje
- E) Ka tendence te rritet gjate shtatzanise apo ushqyerjes me gji

20. Cila nga llojet e displazise ne mastopatine fibrocistike ka me teper tendenca malinjiteti?

- A) Displazia qe nuk perhapet
- B) Displazia qe perhapet pa tipi
- C) Displazia fibroze mikrocistike
- D) Dizplazia qe perhapet me atipi
- E) Displazia fibroze makrocistike

21. Akalazia e ezofagut eshte:

- A) Zgjerim i ezofagut ne forme trastezash
- B) Mungesa e lirimit te sfinkterit te poshtem ezofageal
- C) Zhvendosja e stomakut ne kraharor nepermjet hiatusit diafragmatik
- D) Mungesa e lirimit te sfinkterit te siperm ezofageal
- E) Zgjerime venoze submukoze ne ezofagun distal

22. Divertikuli i Zenkerit ka te beje me:

- A) Zgjerimin ne piken e bashkimit te faringut me ezofagun
- B) Zgjerim ne bifurkacionin e trakese
- C) Zgjerim ne pjesen fundore te ezofagut
- D) Mungese e lirimit te sfinkterit te poshtem ezofageal
- E) Zgjerim te stomakut

23. Cila nga te meposhtemet nuk eshte komplikacion i ulcers gastrike:

- A) Hemoragjia
- B) Stenoza
- C) Degjenerim neoplazik
- D) Perforacioni
- E) Refluksi i lengut biliar

24. Karcinoma gastrike gjendet ne me shume se 50% te rasteve ne:

- A) Kurvatura major
- B) Kurvatura minor
- C) Korpusi gastric
- D) Kardiasi i stomakut
- E) Pjesa antropilorike

25. Dhimbja si shenje e kancerit te stomakut eshte:

- A) E hershme
- B) Gjate zhvillit te semundjes
- C) E vonshme
- D) Gjate gjithë kohes

E) Asnjehere

26. Sindromi Dumping eshte komplikacion I kirurgjise se:

- A) Duodenit
- A) Stomakut
- B) Kolecistes
- C) Heparit
- D) Ezofagut

27. Cila nga keto nuk eshte shkak i refluksit gastroezofageal?

- A) Akalazia e ezofagut
- B) Mbipesha
- C) Shtatzania
- D) Ndryshimet ne kendin e hisit
- E) Hernia ezofageale

28. Cila nga keto nuk eshte komplikacion i kirurgjise se stomakut?

- A) Keqperthithje
- B) Sindromi dumping
- C) Hemoragji
- D) Stenoze anastomotike
- E) Ulcer e duodenit

29. Cili nga keto eshte shkak i divertikulit te traksionit?

- A) Rritja e presionit intraluminal
- B) Djegiet
- C) Ulcerat
- D) Proceset cikatrizuese trakeobronkiale te puthitura me ezofagun
- E) Akalazia e ezofagut

30. Biliomat jane pasoja te traumes se:

- A) Stomakut
- B) Duodenit
- C) Heparit
- D) Rrugeve biliare te jashtme

E) Pankreasit

31. Keto jane shkaqet e abcesit hepatic pervec:

- A) Stenoza biliare
- B) Hipertensioni portal
- C) Kalkuloza biliare
- D) Infeksion i pergjithshem
- E) Trauma

32. Nderhyrja kirurgjikale ne adenomen hepatice eshte e keshillueshme te kryhet kur adenoma eshte:

- A) > 1 cm
- B) > 2 cm
- C) > 4 cm
- D) > 6 cm
- E) > 10 cm

33. Karcinoma kolangioqelizore mund te krijohet nga keto shkaqe pervec njerit:

- A) Litiiza intrahepatike
- B) Infeksionet
- C) Semundjet inflamatore te zorres
- D) Cirroza
- E) Lende kontrasti (dioksidi di torio)

35. Hipertensioni portal nga neoplazite e organeve qe ngjeshin venen porta eshte shkak:

- A) Pre hepatic
- B) Hepatic
- C) Post hepatic
- D) Te gjitha keto
- E) Asnje nga keto

36. Cilin organ prek me teper ekinokokoza, kisti hidatik?

- A) Heparin
- B) Mushkerite
- C) Kockat
- D) Zemren
- E) Trurin

37. Guret ne kalkulozen intrahepatike jane:

- A) Kolesterol te perzier
- B) Kolesterol te paster
- C) Me pigmente biliare, te zinj
- D) Me pigmente biliare, te murme
- E) Asnje prej tyre

38. Cili nga keto nuk eshte faktor etiologjik i kolangitit sklerotizues?

- A) Infeksioni
- B) Cirroza
- C) Autoimune
- D) Litiata
- E) Demtimet traumatike

39. Pasojat e kolangitit sklerotizues jane keto pervec:

- A) Cirroza
- B) Hipertensioni portal
- C) Ascitit
- D) Varicet e ezofagut
- E) Kalkuloza e kolecistes

40. Ikteri per shkak te hemolizes akute ka natyre:

- A) Prehepatike
- B) Hepatike
- C) Post hepatike
- D) Te gjitha
- E) Asnje nga keto

41. Ikteri nga deficitet enzimmatike (semundja Crigler-Mayor) ka natyre:

- A) Prehepatike
- B) Hepatike
- C) Post hepatike
- D) Idiopatik

42. Cila nga keto nuk eshte nderlikim pas kolecistektomise (heqjes kirurgjikale te kolecistes):

- A) Fistul biliare
- B) Hemoragji
- C) Dementim i rrugeve biliare
- D) Gure ne rruget biliare
- E) Koleperitoneumi (prania e lengut biliar ne peritoneum)

43. Cila nga keto nuk eshte nderlikim i litiazes se kolecistes?

- A) Fistula biliare
- B) Pezmatimi
- C) Kalkuloza intrahepatike
- D) Hemobilia
- E) Gangrena

44. Ikteri per shkak te kancerit te kokes se pankreasit ka natyre:

- A) Prehepatike
- B) Hepatike
- C) Posthepatike
- D) Idiopatik

45. Incizioni ne piken Mc Burney kryhet per:

- A) Kolecistektoni
- B) Apendektomi
- C) Hernie te paretit abdominal
- D) Kalkuloze biliare
- E) Nefrektomi

46. Cila nga keto shenja nuk eshte e Morbus Crohn:

- A) Diarre me gjak
- B) Temperature
- C) Dhimbje barked
- D) Kolangite

E) Artrite

47. Probabiliteti i shndrrimit te polipozes familjare te kolonit ne kancer te kolonit shkon ne 100% ne:

- A) 10 vjet
- B) 20 vjet
- C) 30 vjet
- D) 40 vjet
- E) 50 vjet

48. Karakteristikat e Morbus Crohn jane:

- A) Inflamacion i lokalizuar ne gjithe gjatesine e traktit G-I
- B) Inflamacion I gjithe shtresave te murit te zorres
- C) Prekje te mezenterit dhe limfonodulave
- D) Te gjitha

49. Cili nga te meposhtmet nuk eshte komplikacion i hernieve te paretit abdominal?

- A) Perforacioni
- B) Inkarcerimi (shtrengimi)
- C) Inflamacioni
- D) Trauma
- E) Ileusi (pengesa e tranzitit intestinal)

50. Cili nga keto nuk eshte nderlikim postoperator i hernies inguinale:

- A) Hematoma e sakusit scrotal
- B) Atrofi testikulare
- C) Perforacion i zorreve
- D) Ileusi (bllokim i zorreve)
- E) Fistul urinare

51. Cila nga keto nuk ndikon ne krijimin e hernieve te paretit abdominal?

- A) Rritja e presionit intraabdominal
- B) Shtendosja e struktures se muskujve
- C) Incizionet e nderhyrjeve te meparshme kirurgjikale

D) Madhesia e pazakonte e vrimave te paretit abdominal

52. Cila nga keto nuk eshte patologji retroperitoneale?

- A) Trauma
- B) Perforacioni
- C) Abcesi
- D) Neoplazite
- E) Fibroza

53. Cili nga keto nuk klasifikohet ne tumore retroperitoneale?

- A) Tumori renal
- B) Lipoma
- C) Leiomioma
- D) Hemangiosarkoma
- E) Fibroma

54. Cila nga keto nuk eshte klinike e fibrozës retroperitoneale?

- A) Ikteri
- B) Tromboflebitet
- C) Diarre
- D) Dhimbje
- E) Edeme e anesive inferior

55. Cila nga keto nuk eshte shenje e neoplazive retroperitoneale?

- A) Hemoragji gastrointestinal
- B) Ikter
- C) Tromboze venoze
- D) Dizuri
- E) Paraplegji

56. Leiomioma e rabdomiosarkoma jane tumore retroperitoneale me origjine nga:

- A) Indi lidhor
- B) Indi nervor
- C) Mbetjet embrionale
- D) Indi muskulor
- E) Indi adipoz

57. Cili nga keto tumore nuk ben pjese ne sindromin MEN 2?

- A) Carcinoma medulare
- B) Feokromacitoma
- C) Adenoma e hipfizes
- D) Hiperplazia e paratiroides

58. Sindromi Zollinger Ellison ka te beje me cilin nga tumoret:

- A) Insulinoma
- B) Gastrinoma
- C) Glukagonoma
- D) Feokromacitoma
- E) Adenoma sekretore

59. Cila nga keto nuk eshte shenje e insulinomes?

- A) Hipoglicemia
- B) Halucinacione
- C) Cefale
- D) Ikter
- E) Palpitacione

60. Vipoma (sekretimi i peptidit vazokativ intestinal) nuk shoqerohet me cilen?

- A) Diarre
- B) Hipokalemi
- C) Hipobilirubinemi
- D) Hipokloreми
- E) Hipovolemi

61. Cila nga keto tumore neuroendokrine nuk e merr origjinen nga pankreasi?

- A) Glukagonoma
- B) Feokromacitoma
- C) Somatostatinoma
- D) Insulinoma
- E) Gastrinoma

62Cila nga keto nuk eshte komplikacion i cistektomise?

- A) Hemoragjia
- A) Tromboza venoze e thelle
- B) Laparocela
- C) Retensioni urinar

63Cila nga keto nuk eshte shkak i hidronefrozes ne nivel ureteral?

- A) Litiiza
- B) Spazma ureterale
- C) Keqformimet
- D) Fibroza retroperitoneale

64Cili nga keto nuk eshte shkak i hidronefrozes renale?

- A) Inkontinenca e urines
- B) Anomali te sistemit
- C) Tumore te parenkimes renale
- D) Litiiza

65Cila nga keto nuk eshte komplikacion i prostatektomise?

- A) Hemoragjia
- B) Sepsisi abdominal
- C) Inkontinenca (mosmbajtja e urines)
- D) Anemia

66Cila nga keto nuk eshte shkak i hidronefrozes?

- A) Litiiza (guret) ne sistemin urinar
- B) Keqformimet
- C) Fibroza retroperitoneale
- D) Dizuria

67Deri ne cfare stadi sipas klasifikimit te Leriche-Fontaine te stenozes ateromatoze te pjeses iliako-femorale merret ne considerate terapia medikamentoze?

- A) Stadi I
- B) Stadi II a
- C) Stadi II b
- D) Stadi III

68Simpatektomia ne mjekimin e stenozes ateromatoze lejon permiresimin e trofizimit kutan nepermjet:

- A) Ngushtimin e vazave qendrore
- B) Zgjerimin e eneve periferike
- C) Ngushtimin e eneve periferike
- D) Rritjen e tensionit arterial

69Aneurizem i vertete quhet kur kemi zgjerim te lumenit te enes:

- A) > 20%
- B) > 30%
- C) > 40%
- D) > 50%

70Cila nga keto nuk eshte komplikacion i aneurizmes se aortes ne evolucionin e saj?

- A) Shkaterrimi (carja)
- B) Infeksioni
- C) Embolia
- D) Disekacioni (ndarja e shtresave te vazes)

71Kirurgjia ne aneurizmen abdominale merret ne konsiderate kur aneurizmi ka diameter:

- A) > 2cm
- B) >3 cm
- C) > 5 cm
- D) > 7 cm

72 Cila nga keto nuk eshte simptom e tromboembolise arteriale:

- A) Dhimbje
- B) Mungese pulsi
- C) Zbehtesi
- D) Hemoragji

73 Semundja Burger, arteriopatia kronike obliterante, lokalizohet ne nivel te arterieve:

- A) Te vogla
- B) Te mesme
- C) Te medha
- D) A+b

74 Per sa kohe provokohet nekroza ishemike e zones se prekur nga tromboembolia arteriale?

- A) 2-3 ore
- B) 6-8 ore
- C) 3-4 ore
- D) 4-6 ore

75 Gjaku rrjedh ne venat e kembes i shtyre nga keto faktore pervec njeres:

- A) Presioni arterial
- B) Kontraksionet e muskujve te kembes
- C) Shtyrja nga valvulat e venave
- D) Aspiracioni kardio torakal

76. Cila nga keto nuk eshte shkak i tromboflebiteve sekondare?

- A) Tumorale
- B) Jo ndonje shkak i dukshem
- C) Infektive
- D) Hematologjike

77. Aneurizma është:

- A) Semundje degjeneruese me grumbullimin e qelizave me prejardhje nga indi lidhor, lipide etj
- B) Zgjerim i vazhdueshëm e i qendrueshëm i nje arterie për shkak të ndryshimeve në muret e saj
- C) Bllokim akut nje arterie ardhur nga trombet në arteriet me demtime të shtresës intime
- D) Çarje gjatësore e tunike media të arteries

78. Cila nga keto nuk bën pjesë në etiopatogjenezën e tromboflebitëve sipëfaqësorë?

- A) Hiperkoagulabiliteti
- B) Demtimet parietale
- C) Hipotensioni arteria
- D) Shtjellat e rrjedhës së gjakut

79. Për të vlerësuar afërsisht gravitetin/sipërfaqen e djegieve përdoret rregulli i:

- A) 30%
- B) 5%
- C) 6%
- D) 9%

OKULISTIKES

4. Konjuktiviti bacterial

- A) Shkaktohet nga viruset
- B) Ka papilla te zmadhuara
- C) Ka prani te folikujve
- D) Ka sekrecione mykoide

6. Ne ankesat subjective nuk ben pjese

- A) Ulja e te parit
- B) Dhimbja
- C) Lotimi i shtuar
- D) Skuqja

7. Ne uvea nuk ben pjese

- A) Irisi
- B) Trupi ciliar
- C) Choroidea
- D) Retina

8. Trupi qelqor

- A) Ka mbaresa nervore
- B) Ka pigment
- C) I jep formen syrit
- D) Ushqen retinen

9. Konjuktivitete virale

- A) Jane te shpeshta ne cdo stine
- B) Kane sekrecione purulente
- C) Ka folikuj ne konjuktive
- D) Ka zmadhim te papilave

10. Mjekimi i konjuktivit viral

- A) Antiviral
- B) Antibiotik
- C) Antimykotik
- D) Kalon pa mjekim

10. Ne ankesat objective nuk ben pjese:

- A) Ulja e te parit
- B) Skuqja
- C) Crrregullimi I pozicionit te syrit
- D) Tumoret

12.Nuk ben pjese ne shtresat e kornese

- A) Membrana e Bawmanit
- B) Stroma
- C) Konet
- D) Endoteli

13.Fuqia perthyese e syrit eshte:

- A) 60 dioptri
- B) 58 dioptri
- C) 62 dioptri
- D) 50 dioptri

14. Ne keratite dallojme gjithe keto pervec:

- A) Infiltrate korneale
- B) Hypopion
- C) Turbullim I vitrozit
- D) Edeme korneale

16. Keratokonusi mjekohet me:

- A) Antibiotik
- B) Syze
- C) Lente e fort kontakti
- D) Kortizonike

18. Makrokornea eshte:

- A) Semundje inflamatore e kornese
- B) Diametri I kornese > 12mm
- C) Dhome e perparme e thelle
- D) Diameter <10 mm

19. Keratokonus eshte

- A) Anomali e perthyerjes se drites
- B) Dalje ne forme koni e kristalinit
- C) Semindje inflamatore
- D) Ka sekrecione purulente

20. Cila forme e keratitit shfaqet me heret?

- A) Keratiti dentritik
- B) Keratiti punktata
- C) Keratiti vezikular
- D) Keratiti stromal

21. Keratiti mykotik

- A) Shfaqet ne dimer
- B) Ka aftesi te perseritet shpesh
- C) Shfaqet nga perdorimi I gjate I kortizonikeve
- D) Mjekohet me antibiotike

23. Ametropia është:

- A) Anomalia e retines
- B) Anomali e kornesë
- C) Shembëllimi bie në retinë
- D) Anomali e përthyerjes së dritës

24. Në hipermetropi:

- A) Shembëllimi bie në retinë
- B) Shembëllimi bie pas retines
- C) Shembëllimi bie para retines
- D) Shembëllimi bie në pika të ndryshme në retinë

25. Keratiti mykotalik mjakohet:

- A) Antivirale
- B) Antibiotike
- C) Antimykotike
- D) Kortizonike

26. Emetropia është:

- A) Anomali e refraksionit
- B) Anomali e kornesë
- C) Shembëllimi bie në retinë
- D) Shembëllimi bie para retines

27. Në miopi:

- A) Shembëllimi bie në retinë
- B) Shembëllimi bie para retines
- C) Shembëllimi bie pas retines

D) Shembellimi bie ne pika te ndryshme te retines

28.Astigmatizimi

- A) Eshte anomaly e kornese
- B) Eshte anomaly e kristalinit
- C) Shembellimi bie ne retine
- D) Kemi demtim te akomodimit

29.Syzet e lugeta perdoren:

- A) Miopi
- B) Hipermetropi
- C) Astigmatizem
- D) Glaukone

30.Shkolitje retinal mund te kemi ne:

- A) Hipermetropi alta
- B) Astigmatizem
- C) Miopi alta
- D) Asnjera

31.Sfinkter dhe dilatators pupile ndodhen ne :

- A) Iris
- B) Trupin ciliar
- C) Choroidea
- D) Retine

32.Fenomeni tindal vihet re ne:

- A) Uveite te perparme
- B) Uveite te pasme
- C) Konjuktivite
- D) Glaukome

33.Syzet e myseta perdoren:

- A) Miopi
- B) Hipermetropi
- C) Astigmatizem
- D) Glaukome

34.Akomodimi realizohet nga:

- A) Retina
- B) Kristalini
- C) Kornea
- D) Trupi qelqor

35. Fenomeni tindal eshte:

- A) Anomali e perthyerjes se drites
- B) Anomali e kristalinit
- C) Turbullim I dhomes se perparme
- D) Turbullim I vitrozit

36. Hypopion eshte:

- A) Grumbullim pusi ne dhomen e perparme
- B) Turbullim I dhomes se perparme
- C) Turbullim I trupit qelqor
- D) Inflamacion I konjuktives

37. Sinecy anterior eshte:

- A) Ngjitje e kornese me kristalinin
- B) Ngjitje e irisit me kornene
- C) Ngjitje e irisit me kristalinin
- D) Ngjitje e kristalinit me vitrozin

38. Tensioni I syrit ne uveite:

- A) Eshte I larte ne fillim , pastaj bie
- B) Eshte I ulet ne fillim , pastaj rritet
- C) Nuk ndryshon
- D) Eshte I larte gjithe kohen

40. Cila shenje I perket uveiteve posteriore?

- A) Turbullime te vitrozit
- B) Turbullime ne kamera anterior
- C) Skuqje ciliare
- D) Dhimbje

41. Syneçy posterior eshte:

- A) Ngjitje e kornese me kristalinin
- B) Ngjitje e irisit me kornene
- C) Ngjitje e irisit me kristalinin
- D) Ngjitje e kristalinit me vitrozin

43. Cila shenje s'eshte e uveitit anterior

- A) Dhimbje e forte
- B) Skuqje konjuktivale
- C) Skuqje ciliare
- D) Asnjera

45. Cili mjekim eshte kryesor ne uveite?

- A) Atropina
- B) Kortizoniket
- C) Antiviralet
- D) Antibiotiket

46. Glaukome eshte:

- A) Tension I larte I syrit
- B) Semundje e nervit optic
- C) Anomali refraksioni
- D) Shtremberim I syrit

47. Lengu uxor I syrit eleminohet nga:

- A) Trabekulat
- B) Trupi qelqor
- C) Kristalini
- D) Kornea

48. Tensioni normal I syrit eshte:

- A) 10 -20 mmhg
- B) 11-22 mmhg
- C) 11-21 mmhg
- D) 10-22mmhg

49. Cili medicament nuk perdoret ne uveite?

- A) Antiviralet
- B) Kortizoniket
- C) Antibiotiket
- D) Atropina

50. Strabizmi eshte:

- A) Shtremberim I kapakeve
- B) Shtremberim I syve
- C) Rritje e tensionit te syrit
- D) Turbullim I vitrozit

51. Lengu uhor nuk eleminohet nga:

- A) Trabekulat
- B) Kanali I shlemit
- C) Hapesirat e fontanes
- D) Kornea

52. Ne glaukome nuk ndodh:

- A) Rritje e tensionit intraocular
- B) Demtim I n. Optic
- C) Ulja e pamjes
- D) Astigmatizmi

53. Kendi I dhomes se perparme:

- A) Kornea-kristalin-trupi ciliar
- B) Trupi qelqor- trupi ciliar-kristalini
- C) Kristalin – trupi qelqor-irisi
- D) Kornea-irisi-trupi ciliar

54. Tensioni I syrit matet me

- A) Tonometer
- B) Ophthalrnoskop
- C) Gonioskop
- D) Biomikroskop

55. Timololi eshte:

- A) B-blokues
- B) A2-Agoniste
- C) Prostaglandine
- D) ACE-inhibitor

56. Azopti eshte:

- A) B-blokues

- B) A₂agoniste
- C) Prostaglandine
- D) Asmi

57. Këndi I CA shihet me :

- A) Tonometer
- B) Biomikroskop
- C) Ophthalmoskop
- D) Gonioskop

58. Fusha vizive:

- A) Tregon demtimet e kornese
- B) Tregon demtimet e pamjes periferike
- C) Tregon demtimet e kristalinit
- D) Asnjeren

59. Travatani eshte:

- A) B-blokues
- B) A₂-agoniste
- C) Prostaglandine
- D) ACE- inhibitor

60. Cilet medikamente perdoren ne glaukome?

61. Keiza glaukوماتoze ndodh:

- A) Ne glaukomen me kend te hapur
- B) Ne glaukomen me kend te mbyllur
- C) Ne glaukomen me tension normal
- D) Asnjera

62. Muskujt e jashtem te syrit jane:

- A) 2
- B) 4
- C) 5
- D) 6

63. Cili muskul i jashtem i syrit inervohet nga n. Abducent?

- A) M.rectus extern
- B) M. Rectus intern
- C) M.rectus superior
- D) M.rectus inferior

64. Cila shenje nuk eshte ne krizen glaukوماتoze?

- A) Iris bombe
- B) Sy i forte si gur
- C) Dhome e perparme e thelle
- D) Edeme korneale

65. Cili m. i jashtem inervohet nga n.troklearis?

- A) M.obliquos inferior
- B) M. Rectus inferior
- C) M.obliquos superior
- D) M.rectus med

PYETJE NË PEDIATRI

1-Dhëmbët e qumështit zëvendësohen me dhëmbët e përhershëm:

- A) Rreth moshës 3-4 vjeç
- B) Rreth moshës 4-5 vjeç
- C) Rreth moshës 6-7 vjeç
- D) Rreth moshës 8-9 vjeç

2-Quhet fëmijë prematur:

- A) Fëmija i lindur para 37 javësh moshë shtatzënie
- B) Fëmija që lind para 37 javësh moshë shtatzënie dhe me peshë nën 2500 g
- C) Fëmija i lindur pas 42 javësh moshë shtatzënie
- D) Fëmija që lind ndërmjet 37 dhe 42 javësh moshë shtatzënie

3-Faktorët e jashtëm që ndikojnë në rritje e zhvillim janë të gjithë me përjashtim të:

- A) Kushtet social-ekonomike
- B) Klima tropikale
- C) Sëmundjet kronike pas lindjes
- D) Faktorët gjenetikë

4-Fëmija e dyfishon peshën e lindjes në moshën:

- A) 1 vjeç
- B) 8 muaj
- C) 10 muaj
- D) 5 muaj

5-Vitamina D merr pjesë në:

- A) Mineralizimin e kockës
- B) Aktivitetin nervor
- C) Pjekurinë seksuale
- D) Hematopoezë

6-Fëmija e trefishon peshën e tij në moshën:

- A) 8 muaj
- B) 1.5 vjeç
- C) 2 vjeç
- D) 12 muaj

7-Ikteri i të porsalindurit mund të jetë:

- A) Ikter nga infeksioni
- B) Ikter hemolitik
- C) Ikter fiziologjik
- D) Mund t'i ketë të gjitha origjinat

8-Për vaksinimin sipas kalendarit të vaksinimit janë të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- A) Eshtë i detyrueshëm për të gjithë fëmijët
- B) Nuk këshillohet të bëhet për fëmijët e lindur para kohe
- C) Ndhmon në krijimin e imunitetit të fëmijës
- D) Për aplikimin e vaksinave duhen respektuar afatet kohore sipas këtij kalendarit

9-Gjatësia e fëmijës në lindje është:

- A) Rreth 50 cm
- B) Rreth 40 cm
- C) Rreth 30 cm
- D) Rreth 60 cm

10-Faktorët e brendshëm që ndikojnë në rritje e zhvillim janë të gjithë me përjashtim të:

- A) Hormonet seksuale
- B) Kushtet social-ekonomike
- C) Hormonet e tiroides
- D) Hormoni somatotrop

11-Encefalopatia bilirubinike tek një fëmijë në term shfaqet kur vlera e bilirubinës serike arrin në:

- A) ≥ 18 mg/dl
- B) ≥ 10 mg/dl
- C) ≥ 15 mg/dl
- D) ≥ 20 mg/dl

12-Për kulloshtren janë të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- A) Kulloshtira prodhohet nga gjendrat mamare ditët e para pas lindjes
- B) Përmban shumë yndyrma e sheqerna dhe pak proteina
- C) Përmban antikorpe të nënës
- D) Mbron fëmijën nga infeksionet

13-Për infeksionin nga Rubeola Kongenitale janë të vërteta të gjitha me përjashtim të:

- A) Prek fetusin me rrugë transplacentare
- B) Shkakton vonesë në rritjen intrauterine dhe anemi tek bebi
- C) Nuk kemi në përdorim asnjë mënyrë parandalimi
- D) Është një nga shkaqet e prematurancës

14-Infeksioni neonatal nuk ka të vërtetë:

- A) Hipotermi
- B) Hipoglicemi
- C) Hipobilirubinemi
- D) Ulje të frekuencës kardiake

15-Apgari është:

- A) Sëmundje ngjitëse e neonatit
- B) Keqformim i lindur
- C) Sëmundje e sistemit kardiorespirator
- D) Sistem vlerësues i shenjave jetësore të neonatit

16-Vaksinimi i fëmijës sipas kalendarit të vaksinimi nuk ka të vërtetë:

- A) Është i detyrueshëm për të gjithë fëmijët
- B) Nuk është i detyrueshëm për fëmijët e lindur para kohe
- C) Aplikimi i vaksinave sipas tij fillon që në lindje
- D) Ndhmon në krijimin e imunitetit të fëmijës

17-Përbëjnë kundërrindikacion absolut për ushqyerjen me gji të gjitha me përjashtim të:

- A) HIV i nënës
- B) Insuficiencë kardiake e dekompesuar e nënës
- C) TBC aktiv i nënës
- D) Ragadet e gjirit të nënës

18-Fëmija katërfishon peshën e lindjes në moshën:

- A) 1 vjeç
- B) 5 vjeç
- C) 2 vjeç
- D) 1.5 vjeç

19-Infeksioni neonatal ka si shenja klinike:

- A) Konvulsione
- B) Hipotoni
- C) Çrregullime të ritmit të zemrës

D) Të gjitha të mësipërmet

20-Proteina C reaktive është e rritur në të gjitha rastet, me përjashtim të:

- A) Meningit
- B) Sepsis
- C) Pneumoni
- D) Hipoksi nga një lindje e vështirë

21-Tetanos neonatal ka të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- A) Shkakton sepsis
- B) Shkakton kontraktura muskulare
- C) Shkakton fraktura të kockave
- D) Shkakton trismus

22-Për fototerapinë janë të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- A) Vepron duke zbërthyer bilirubinën kutane
- B) Ndihmon në uljen e nivelit të bilirubinës së palidhur
- C) Nuk ekziston një vlerë e përcaktuar e nivelit të bilirubinës tek të gjithë neonatët për fillimin e fototerapisë
- D) Përdorimi i saj nuk e parandalon shfaqjen e encefalopatisë bilirubinike

23-Quhet fëmijë postmatur:

- A) Fëmija i lindur përpara 37 javësh moshë shtatzënie
- B) Fëmija i lindur me peshë nën 2500 g
- C) Fëmija i lindur pas javës 42 të shtatzënisë

D) Fëmija i lindur nga 37 në 42 javë moshë shtatzënie

24-Fëmija i moshës 2 vjeç flet:

- A) Rreth 100 fjalë
- B) Rreth 500 fjalë
- C) Rreth 300 fjalë
- D) Rreth 50 fjalë

25-Infeksioni neonatal ka të gjitha shenjat klinike të mëposhtme, me përjashtim të:

- A) Temperaturë e lartë
- B) Rash kutan (njolla të kuqe në lëkurë)
- C) Ikter
- D) Hiperglicemi

26-Mekonium quhet:

- A) Qumështi i ditëve të para pas lindjes
- B) Një keqformim i lindur i traktit gastrointestinal
- C) Një sëmundje ngjitëse e transmetuar nga nëna
- D) Jashtëqitja e parë e bebit

27-Vlerësimi i Apgarit nuk përfshin:

- A) Frekuencën kardiake
- B) Tonusin muskular
- C) Frekuencën respiratore
- D) Refleksët primare

28-Shkaktojnë keqformime të lindura të gjitha, me përjashtim të:

- A) Rubeola kongenitale
- B) Toksoplazmoza kongenitale
- C) Cmv kongenital
- D) Hepatiti b kongenital

29-Mund të jenë shenja klinike të një infeksioni neonatal të gjitha, me përjashtim të:

- A) Hipotermi
- B) Hiperglicemi
- C) Hepatosplenomegali
- D) Bombim i fontanelës

30-Kern ikteri shkaktohet nga:

- A) Fiksimi i bilirubinës së palidhur në bërthamat trunore
- B) Fillimi i parakohshëm i ablaktacionit
- C) Anemia nga mungesa e hekurit
- D) Ikteri nga qumështi i gjirit

31-Gjatësia e fëmijës në fund të vitit të parë është rreth:

- A) 1 m
- B) 75 cm
- C) 50 cm
- D) 85 cm

32- Ikteri tek neonati bëhet i dukshëm në lëkurë kur niveli serik i bilirubinës është:

- A) 2-4 mg/dl
- B) 5-7 mg/dl
- C) 8-9 mg/dl
- D) 10 mg/dl

33-Terapia rehidruese orale është trajtim i zgjedhur për të gjithë fëmijët e dehidruar, me përjashtim të:

- A) Të vjella dhe temperaturë e lartë,
- B) Koma ose shok,
- C) Shigelozë,
- D) Helmim ushqimor

34-Favorizojnë malnutricionin të gjitha, me përjashtim të:

- A) Infeksionet kronike
- B) Përdorimi pa kriter i antibiotikëve
- C) Rrezatim i tepruar nga rrezet e diellit
- D) Kushtet e këqija social-ekonomike

35-Mjekimi i zgjedhur në Giardiazë është:

- A) Amikacina
- B) Mebendazoli
- C) Piperazina
- D) Metronidazoli (flagyl)

36-Ndërlikimi më i shpeshtë i Salmonelozës është:

- A) Prolapsi rektal
- B) Anemia
- C) Dehidrimet e tipeve të ndryshme
- D) Meningiti

37-Kwashiorkor-i karakterizohet nga të gjitha shenjat e mëposhtme, me përjashtim të:

- A) Anamnezë për mosmarrje të mjaftueshme të proteinave, por marrje relativisht e mjaftueshme e kalorive
- B) Fëmija është ushqyer vetëm me gji gjashtë muajt e parë të jetës
- C) Edema
- D) Hipoalbuminemi

38-Cili nga ekzaminimet e mëposhtme nuk ka vlerë në shigelozë:

- A) Koprokultura
- B) Hemokultura
- C) Kërkimi për pus e gjak në feçe
- D) Gjak komplet

39-Hymenolepsis nana transmetohet nga:

- A) Pleshti
- B) Miza
- C) Njeriu
- D) Këpusha,

40-Cila nga masat e mëposhtme duhet marrë në një fëmijë me shok anafilaktik të rëndë:

- A) Lirimi i rrugëve të frymëmarrjes
- B) Oksigjenimi
- C) Përdorimi i adrenalinës
- D) Të gjitha janë të vlefshme

41-Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë për dermatitin atopik:

- A) Është sëmundje me predispozitë të qartë trashëguese
- B) Lidhet me praninë e parazitëve intestinalë,
- C) Prek kryesisht adoleshentët,
- D) Lë imunitet të përjetshëm

42-Në dehidrimin hiperton vuan më shumë:

- A) Sistemi kardiovaskular
- B) Sistemi nervor
- C) Trakti tretës
- D) Sistemi limfatik

43-Obeziteti është

- A) Nje tregues mbiushqyerje
- B) Nenushqyerje
- C) Nje forme malnutricioni
- D) Asnjera

44-Oliva pilorike është nje mase qe palpohet

- A) Ne regjionin epigastrik

- B) Ne regjionin inguinal te majte
- C) Ne regjionin inguinal te djathte
- D) Ne asnjeren

45-Oliva pilorike na orienton ndaj

- A) Refluksit gastro-ezofageal
- B) Stenozes hipertrofike te pilorit
- C) Te dyjave
- D) Asnjeres

46-Në helmimin nga hidrokarburet duhet kryer:

- A) Provokimi i të vjellave,
- B) Lavazhi gastrik,
- C) Asnjë prej tyre
- D) Te dyja veprimet

47-Diarrea nga Shigella karakterizohet klinikisht nga

- A) Diarre me mukus dhe gjak
- B) Temperaturë e lartë
- C) Dhimbje barku
- D) Te gjitha

48-Parazitet intestinale mund te evidentohen me

- A) Koprokulture
- B) Ekzaminimi i gjakut periferik
- C) Te dyja
- D) Asnjera

49-Spazmofilia është pasojë e

- A) Hipokalçemisë
- B) Hiperkalcemise
- C) Te dyja
- D) Asnjeren

50-Spazmofilia paraqitet klinikisht me

- A) Konvulsione parciale-te pjesëshme
- B) Të gjeneralizuara
- C) Konvulsione te dukshme ose qe provokohen
- D) Te gjitha

51-Konvulsionet ne spazmofili mund te provokohen nga

- A) Ekzaminuesi
- B) Prova e manshetes
- C) Goditja e mollezes me cekic neurologjik
- D) Te gjitha

52-Komplikacionet më të shpeshta të refluksit gastroezofageal janë:

- A) Infeksione të përsëritura respiratore
- B) Anemia
- C) Otiti
- D) Te gjitha

53-Kraniotabes është shenjë klinike e

- A) Rakitit
- B) Hipovitaminozes A
- C) Te dyjave
- D) Asnjeres

54-Kraniotabesi evidentohet duke

- A) Amarre anamnezen e te semurit
- B) Shtypur kockat në regjonin oksipital
- C) Auskultimit me stetoskop
- D) Asnjeren

55-Doza e Acetaminofenit (Paracetamol) në fëmijë është:

- A) 2 mg/kg për çdo marrje,
- B) 5 mg/kg për çdo marrje,
- C) 15 mg/kg për çdo marrje,
- D) 50 mg/kg për çdo marrje,

56-Infiltrati eozinofilik Löffler në pulmone mund të haset në:

- A) Enterobiozë (oksiuriazë),
- B) Teniazë,
- C) Askaridozë,
- D) Sepsis nga salmonella

57-Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë për stenozen hipertrofike të pilorit:

- A) Të vjella që në lindje
- B) Ekziston një interval pa shenja klinike ndërmjet lindjes dhe çrregullimeve të para
- C) Ka prani të bilës në të vjella
- D) Ka humbje të oreksit

58-Shkaktojnë çrregullime malabsorbitive të gjitha, me përjashtim të:

- A) Alergjia nga proteinat e qumështit të lopës,
- B) Dermatiti atopik,
- C) Malnutricioni proteino-kalorik,
- D) Lambliaza

59-Sa është sasia e Tresolit që përdoret për rehidrim oral në dehidrimin e lehtë:

- A) 10 mg/kg peshë
- B) 20 mg/kg peshë,
- C) 50 mg/kg peshë,
- D) 100 mg/kg peshë

60-Tetania në fëmijët e vegjël është pasojë e:

- A) Rritjes së glicemisë,

- B) Uljes së kalciumit të jonizuar në gjak,
- C) Uljes së glicemisë,
- D) Rritjes së kalcemisë

61-Shkaku më i shpeshtë i urtikarieve është:

- A) Alergjia ushqimore,
- B) Infeksionet virale,
- C) Alergjia medikamentoze,
- D) Idiopatik- i pa njohur

62-Prania e leukociteve në feçe vihet re në diarrenë nga:

- A) Shigella,
- B) Viruset,
- C) Gabimet në ushqyerje,
- D) Helmimet ushqimore

63-Provokimi i të vjellave ka kundërindikacion absolut në helmimet:

- A) Ushqimore,
- B) Nga marrja e lëndëve kaustike,
- C) Nga paracetamoli,
- D) Nga valiumi

64-Forma e dehidrimit (i lehtë-i mesëm-i rëndë) tek fëmija vlerësohet me të gjitha, me përjashtim të:

- A) Matja e presionit arterial,
- B) Thellimi i syve,
- C) Dhimbja e kokës,
- D) Niveli i fontanelës së madhe

65-Malnutricioni i formës së mesme-të rëndë çon në

- A) Ulje te imunitetit
- B) Prirjen e shtuar për infeksione të përsëritura
- C) Që mund të çojnë deri në vdekje të pacientit
- D) Te gjitha

66-Konvulsionet janë

- A) Urgjencë mjekësore
- B) Trajtohen me diazepam-valium
- C) Doza=0.5 mg/kg peshë në një marrje/ per rectum
- D) Te gjitha

67-Trajtimi i stnozës hipertrofike të pilorit

- A) Nuk është urgjencë mjekësore
- B) Eshte urgjence mjekesore
- C) Nuk ka nevojë për ekzaminime paraprake
- D) Asnjera

68-Shkaktarët më të shpeshtë të diarresë në fëmijë (rreth 70% e diarreve) janë

- A) Viruset
- B) Bakteret
- C) Mykrat
- D) Asnjeri

69-Teniat janë:

- A) Viruse,
- B) Baktere,
- C) Krimba,
- D) Myke

70-Disa komplikacione afatgjata të diabetit janë:

- A) Dëmtimi i shikimit
- B) Dëmtimi i funksionit renal
- C) Ulçera trofike kryesisht në këmbë
- D) Te gjitha

71-Qumështi është i kundërlinduar në helmimet nga

- A) Substancat alkaline-bazike
- B) Hidrokarburet
- C) Te dyja
- D) Asnjeren

72-Shenja Trousseau lidhet me:

- A) Hipokalceminë,
- B) Hipovitaminozën a,
- C) Hipovitaminozën k,
- D) Shokun anafilaktik

73-Doza e Adrenalinës subkutan për trajtimin e shokut anafilaktik është:

- A) 1 mg për çdo 10 kg peshë,
- B) 0.5 mg për çdo 10 kg peshë,
- C) 0.1 mg për çdo 10 kg peshë,
- D) 10 mg për çdo 10 kg peshë

74-Vlerësimi i moshës kockore bëhet më mirë me radiografinë e:

- A) Gjurit,
- B) Artikulacionit radiokarpal,
- C) Kafiljes,
- D) Bërrylit

75-Për hipotiroidizmin kongenital janë karakteristike të gjitha, me përjashtim të:

- A) Fontanela anteriore e posteriore shumë të mëdha,
- B) Vonesë në pjekurinë skeletike,
- C) Ikter,
- D) Hipertension arterial

76-Problemi nutricional më kritik i moshës parashkollore në të gjithë botën është:

- A) Malnutricioni i karbohidrateve,
- B) Malnutricioni i yndyrnave,
- C) Malnutricioni proteinik,
- D) Malnutricioni i mineraleve

77-Shenja Trousseau lidhet me:

- A) Hiperkalceminë,
- B) Hiponatreminë,
- C) Hipokalceminë,

D) Hipotiroidizmin

78-Lavazhi gastrik është i kundërindikuar në marrjen e:

- A) Aspirinës,
- B) Valiumit,
- C) Lëndëve acide,
- D) Vitaminave,

79-Në dehidrimin e rëndë, në 2-3 orët e para të rehidrimit nuk jepet:

- A) Solucion Ringer Lactat
- B) Solucion bikarbonat natriumi [nahco_3]
- C) Solucion fiziologjik [nacl 0.9%], d
- D) Solucion klorur kaliumi [kcl 7.5%]

80-Cili nga ekzaminimet e mëposhtme nuk ka vlerë në shigelozë:

- A) Koprokultura,
- B) Hemokultura,
- C) Ekzaminimi i feçeve për gjak e pus,
- D) Elektrolitët dhe ekuilibri acidobazik,

81-Thithja e kalciumit në zorrë varet nga:

- A) Hormonet e tiroides,
- B) Insulina,
- C) Vitamina d,
- D) Përqëndrimi në gjak i vitaminës c,

82-Cili nga pohimet është i vërtetë për dermatitin atopik:

- A) Është sëmundje me predipozitë të qartë trashëguese,
- B) Lidhet me praninë e parazitëve intestinalë,
- C) Prek kryesisht adoleshentët,
- D) Mjekohet me barna antimykotikë,

83-Njëra nga shenjat e mëposhtme dëshmon për stenoze hipertrofike të pilorit:

- A) Të vjella biliare,
- B) Anoreksia,
- C) Diarrea,
- D) Të vjella ushqimore pas ushqyerjes,

84-Si mund të kuptojë infermieri prirjen e shtuar për fenomene hemorragjike tek fëmija për të cilin përkujdeset?

- A) Kur gjatë vendosjes së kanjulës IV, gjaku koagulon me vështirësi
- B) Kur gjatë aspirimit të sekrecioneve oro-faringeale vihet re prirja e shtuar për gjakosje.
- C) Kur gjatë vendosjes së kateterit urinar vihet re prirja e shtuar për gjakosje.
- D) Te gjitha

85-Diabeti melitus është

- A) Nje semundje kronike
- B) Nje semundje metabolike
- C) Te dyja
- D) Asnjera

86-Diabeti melitus karakterizohet nga keto shenja klinike

- A) Poliuri,
- B) Polifagi,
- C) Polidipsi dhe rënie në peshë
- D) Te gjitha

87-Diarrea nga Salmonella karakterizohet klinikisht nga

- A) Diarre e ujshme e bollshme
- B) E verdhë-jeshile
- C) Me mukus, pa gjak
- D) Te gjitha

88-Trajtimi i stenoze hipertrofike të pilorit është .

- A) Kirurgjikal
- B) Medikamentoze
- C) Te dyja
- D) Asnjera

89-Ketoacidoza diabetike klinikisht është

- A) Një gjendje kritike
- B) Gjatë së cilës ndërgjegja e pacientit është e alteruar
- C) Ka karakteristikë erë açeton nga goja
- D) Te gjitha

90-Diarrea infektive shkaktohet vetëm nga

- A) Bakteret
- B) Viruset
- C) Mykrat
- D) Asnjera

91-Çfarë vë në dukje koprokultura?

- A) Viruset
- B) Myket
- C) Bakteret
- D) Protozoarët,

92-Rakiti është sëmundje e

- A) Skeletit të fëmijës
- B) Aparatit tretes
- C) Aparatit urinar
- D) Asnjeres

93-Rakitit karakterizohet nga

- A) Mosmineralizimi i skeletit te femijes
- A) Dobësi
- B) Deformim i kockave
- C) Te gjitha

94-Kwashiorkor:

- A) Është sëmundje infektive bakteriale,
- B) Shkaktohet nga marrja e pamjaftueshme e yndyrnave,
- C) Shkaktohet nga krimbat e rrumbullakët intestinalë,
- D) Shkaktohet nga marrja e pamjaftueshme e proteinave, e shoqëruar me marrje disi të mjaftueshme të kalorive

95-Në diarrenë akute me mukus e gjak përdoren:

- A) Antidiarrikët,
- B) Antiemetikët,
- C) Antibiotikët,
- D) Opiatet

96-Dhënia e vitaminës K tek i porsalinduri duhet të jetë:

- A) Sistematike-e detyrueshme për çdo të porsalindur
- B) E këshillueshme,
- C) E panevojshme tek fëmija që ushqehet me gji,
- D) Vetëm në rast hemorragjie të jashtme

97-Në rakit është karakteristike:

- A) Hipokalcemia,
- B) Proteinuria,
- C) Anemia,
- D) Hiperglicemia

98-Sa është sasia e likideve për mbushjen e shtratis vaskular në dehidrimin e mesëm:

- A) 10 ml/kg peshë,
- B) 20 ml/kg peshë,
- C) 50 ml/kg peshë,
- D) 90 ml/kg peshë

99-Hipotiroidizmi kongenital mjekohet me:

- A) Hormonin e rritjes,
- B) L-tyroksine,
- C) Kortizonikë,
- D) Insulinë

100-Për stenozen hipertrofike të pilorit janë të vërteta të gjitha, përveç:

- A) Është më e shpeshtë në meshkuj,
- B) Fillimisht të vjellat janë gojë-gojë, pastaj presioni shtohet,
- C) Të vjellat janë biliare,
- D) Rritja e fëmijës dëmtohet nga kjo patologji

101-Cili nga çrregullimet e mëposhtme është i pranishëm në shokun hipovolemik:

- A) Edema të shprehura,
- B) Hiperglicemi,
- C) Hiperalbuminemi,
- D) Acidozë metabolike

102-Janë shenja të rakitit të gjitha, me përjashtim të:

- A) Kraniotabes,
- B) Ngadalësim i rritjes,
- C) Sulkusi i harrisonit,
- D) Skorbuti

103-Çrregullimet alergjike mund të mjekohen me sukses me të gjitha mënyrat e mëposhtme, me përjashtim të:

- A) Mënjanimi i kontaktit me alergjenin
- B) Mjekimi adekuat farmakologjik [adrenalinë, anihistaminikë],
- C) Përdorimi i barnave antimikrobike,
- D) Përdorimi i bronkodilatatorëve

104-Karboni aktiv përdoret për trajtimin e:

- A) Intoksikacioneve në fëmijë
- B) Hipokalcemisë,
- C) Diarresë dhe/ose të vjellave,
- D) Hipokalcemisë,

105-Diarrea infektive nga Shigella karakterizohet klinikisht nga

- A) Diarre e pakët me mukus e gjak
- B) Dhimbje të forta barku
- C) Temperaturë e lartë
- D) Te gjitha

106-Koprokultura për të zbuluar Giardia lamblia duhet të kryhet

- A) Nje here
- B) Më shumë se një herë
- C) Te dyja
- D) Asnjera

107-Përmendni dy rregulla të rëndësishme gjatë aplikimit të kalciumit me rrugë..IV.

- A) Duhet aplikuar patjetër në një venë të shëndoshë, sepse dalja nga vena shkakton nekrozë të indeve
- B) Duhet aplikuar shumë ngadalë, sepse shkakton arrest kardiak
- C) Te dyja
- D) Asnjeren

108-Cili është medikamenti që përdoret për korrigjimin e acidozës metabolike?

- A) Sol. Bikarbonat Na 8.4%
- B) Sol.Ca glukonat
- C) Sol.klorur kaliumi
- D) Asnjera

109-Në një fëmijë me Leishmanjoze shenjat me te mundshme klinike jane

- A) Hepatosplenomegali,
- B) Temperaturë të lartë për më shumë se dy javë
- C) Pancitopeni
- D) Te gjitha

110-Në pacientin me refluks gastroezofageal, gjatë bërjes së fibroezofagoskopisë mukoza e stomakut paraqitet e

- A) Inflamuar
- B) E skuqur
- C) Te dyja
- D) Asnjera

111-Koha e rikolorimit (rimbushjes kapilare) përdoret për vlerësimin e

- A) Perfuzionit indor periferik
- B) Tregon saturimin ne gjak te oksigjenit
- C) Asnjeren
- D) Te dyja

112-Koha e rikolorimit(rimbushjes kapilare në normë është më pak se

- A) 3 sekonda
- B) 6 sekonda
- C) 1 sekonde
- D) Asnjera

113-Sindromi Reye lidhet me përdorimin e:

- A) Aspirinës
- B) Aminofilinës
- C) Amfetaminës
- D) Antibiotikëve

114-Doza e paracetamolit për uljen e temperaturës në fëmijë është:

- A) 5 mg/kg në një marrje
- B) 2 mg/kg në një marrje
- C) 15 mg/kg në një marrje
- D) 20 mg/kg në një marrje

115-Serumi antidifteritik:

- A) Lidh toksinën që qarkullon në gjak
- B) Shkrin membranat e formuara në fyt
- C) Pengon shumimin e mikroorganizmit
- D) Përdoret si profilaksi kundër difterise

116-Për paralizat e poliomyelilitit njëri nga pohimet nuk është i vërtetë:

- A) Janë flakside
- B) Janë simetrike
- C) Janë të përherëshme
- D) Janë proksimale

117-Paraliza e nervit glosofaringeal, me dalje të lëngjeve nga hunda, mund të vihet re në:

- A) Rubeolë
- B) Sinuzit
- C) Difteri
- D) Askaridozë

118- Njollat e Koplik-ut janë karakteristike e:

- A) Rubeolës
- B) Varicelës
- C) Fruthit

D) Skabiesit

119-Ekzantema që shfaqet edhe në lëkurën me flokë flet për:

- A) Rubeolë
- B) Varicelë
- C) Fruth
- D) Skarlatinë

120-Rashi kutan makulo-papulo-vezikular, i shoqëruar me temperaturë të lartë dhe prurit flet për:

- A) Rubeolë
- B) Varicelë
- C) Fruth
- D) Skarlatinë

121-Meningiti i latentit ka:

- A) Konvulsione
- B) Përgjumësi
- C) Apnoe

D) Të gjitha të mësipërmet

122-Janë komplikacione të varicelës të gjitha, me përjashtim të:

- A) Qelbëzimi i elementeve kutane
- B) Sindromi Reye
- C) Glomerulonefriti
- D) Herpes Zoster

123-Fenobarbitali (Luminali) përdoret për trajtimin e:

- A) Giardia lamblia
- B) Laringitit akut
- C) Statusit konvulsiv
- D) Skarlatinës

124-Në varicelë nuk duhen përdorur:

- A) Antihistaminikët
- B) Aspirina
- C) Antibiotikët
- D) Solucionet rehidruese

125-Shenja madhore e glomerulonefritit akut është:

- A) Proteinuria
- B) Hematuria
- C) Hipertensioni arterial
- D) Anemia

126-Eshtë e dobishme të përdoren për pertusin:

- A) Oksigjenoterapi
- B) Diazepam
- C) Inhalacion me bronkodilatatorë
- D) Të gjitha të mësipërmet

127-Gjuha si manaferra të kuqe është karakteristike e:

- A) Rubeolës
- B) Parotitit
- C) Skarlatinës
- D) Fruthit

128-Njëra nga shenjat e mëposhtme nuk bën pjesë në kriteret madhore të Ethes Reumatizmale Akute:

- A) Carditis
- B) Poliartiritis
- C) Bradikardia
- D) Chorea minor

129-Shkakton anemi ferriprive:

- A) Hemofilia
- B) Talasemia
- C) Papajtueshmëria nga faktori Rh
- D) Nënushqyerja

130-Cila nga shenjat e mëposhtme nuk është karakteristike e Sindromit Nefrotik Idiopatik:

- A) Hipoproteinemia

- B) Edema
- C) Poliuria
- D) Proteinuria

131-Në cilën moshë hasen më shpesh konvulsionet febrile:

- A) Tek i porsalinduri
- B) Nga muaji i parë në muajin e pestë të jetës
- C) Pas moshës 12 vjeç
- D) 6 muaj – 5 vjeç

132-Bronkioliti nuk ka të vërtetë:

- A) Takipne
- B) Tirazh
- C) Wheezing
- D) Dispne inspiratore

133-Shoku anafilaktik trajtohet me:

- A) Adrenalinë
- B) Inhalacion me bronkodilatatorë
- C) Kortizonikë
- D) Të gjitha të mësipërmet

134-Diagnoza etiologjike e faringotonsilitit streptokoksik β -hemolitik të grupit A bëhet me:

- A) Hemokulturë
- B) Kulturë fyti
- C) Urokulturë
- D) Gjak komplet

135-Karakteristikat klinike të infeksionit nga Hepatiti A janë si më poshtë, me përjashtim të:

- A) Periudha e inkubacionit është 15-50 ditë
- B) Klinika ka manifestime të shumta ekstrahepatike
- C) Transmetimi është fekal-oral
- D) Infeksioni manifestohet me rritje të transaminazave dhe të bilirubinës

136-Toksina difteritike parapëlqen:

- A) Indin renal
- B) Miokardin
- C) Timusin
- D) Tiroiden

137-Doza e diazepamit për trajtimin e një krize konvulsive është:

- A) 5 mg/kg ne nje marrje
- B) 0.5 mg/kg ne nje marrje
- C) 10 mg/kg ne nje marrje
- D) 0.1 mg/kg ne nje marrje

138-Kolla lehëse është karakteristikë e:

- A) Tonsilitit
- B) Pertusit
- C) Astmës bronkiale
- D) Laringitit

140- Cila nga sëmundjet e mëposhtme nuk shkaktohet nga Streptokoku β -hemolitik ose nuk është pasojë e tij:

- A) Ethja reumatizmale
- B) Skarlatina
- C) Hepatitis
- D) Angina folikulare

141-Paraliza Landry mund të vihet re në:

- A) Poliomielit
- B) Difteri
- C) Laringit
- D) Meningit

142-Rash rozë, temperaturë subfebrile, limfadenopati cervikale – flet për:

- A) Skarlatinë
- B) Rubeolë
- C) Fruth
- D) Varicelë

143-Herpes zoster shkaktohet nga:

- A) Virusi herpes simplex
- B) Virusi i varicelës
- C) Virusi i hepatitit
- D) Virusi HIV

144-Komplikacioni më i shpeshtë i varicelës është:

- A) Bronkopneumonia
- B) Qelbëzimi i elementeve kutane
- C) Meningoencefaliti
- D) Laringotrakeobronkiti

145-Maska e Filatov-it është karakteristikë e:

- A) Fruthit
- B) Rubeolës
- C) Skarlatinës
- D) Varicelës

146-Meningiti i latentit ka të pranishme të gjitha shenjat e mëposhtme klinike, me përjashtim të:

- A) Bombim të fontanelës
- B) Konvulsione
- C) Hipotermi
- D) Fotofobi

147-Cila prej shenjave mund të lidhet me hepatitin akut:

- A) Stridori laringeal
- B) Urtikaria e gjeneralizuar
- C) Temperatura septike
- D) Konvulsionet

148-Për astmën janë të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- A) Kriza e astmës mund të shpërthejë nga një infeksion viral, sforcim fizik, emocion
- B) Është sëmundje inflamatore kronike
- C) Prania e wheezing është e përhershme

D) Sëmundja karakterizohet nga dispne e tipit inspirator

149-Krimbat e rrumbullakët mjekohen me:

- A) Metronidazol (Flagyl)
- B) Mebendazol (Vermox)
- C) Manitol
- D) Makrolidë

150-Shenjë madhore e insuficiencës renale kronike është:

- A) Oligoanuria
- B) Edema
- C) Poliuria
- D) Hematuria

151-Cili nga ekzaminimet e mëposhtme rekomandohet të kryhet në një fëmijë me urtikarie:

- A) Urinë komplet
- B) Urokulturë
- C) Koprokulturë
- D) Feçe parazit

152-Sindroma Reye është komplikacion i:

- A) Skarlatinës
- B) Variçelës
- C) Pertusit
- D) Poliomielitit

153-Nuk transmetohen me rrugë fekal-orale:

- A) Poliomieliti
- B) Hepatiti viral B
- C) Hepatiti viral A
- D) Hepatiti viral E

154-Diagnoza e drepanocitozës bëhet me:

- A) Të dhënat e gjakut komplet
- B) Elektroforezën e hemoglobinës
- C) Matjen e nivelit të bilirubinës në gjak
- D) Matjen e hekurit në gjak

155-Parandalimi dhe trajtimi i tonsilofaringitit nga Streptokoku β -hemolitik i grupit A parandalon:

- A) Miokarditin
- B) Ethen reumatizmale
- C) Skarlatinën
- D) Infeksionin e rrugëve urinare

156-Tonsiliti akut shkaktohet nga dhe mjekohet me:

- A) Escherichia coli; Gentamicinë
- B) Hymenolepsis nana; Cefalosporina
- C) Streptococcus β -hemolyticus; Penicilinë
- D) Staphylococcus aureus; Gentamicinë

157-Manifestimet klinike të rubeolës shfaqen:

- A) Vetëm në periudhën embrionale
- B) Vetëm në momentin e lindjes
- C) Gjatë fëmijërisë së herëshme
- D) Në të gjitha periudhat e lartpërmendura

158-Doza e ibuprofenit për trajtimin ethes në fëmijë është:

- A) 0.1 mg/kg në një marrje
- B) 0.5 mg/kg në një marrje
- C) 1 mg/kg në një marrje
- D) 10 mg/kg në një marrje

159-Cili nga pohimet e mëposhtme nuk është i vërtetë për shokun anafilaktik:

- A) Klinika varet nga rruga e futjes së antigjenit
- B) Është situatë urgjente që prek shumë organe e sisteme
- C) Trajtimi i zgjedhur është ultrakorteni ose prednisoloni iv ose im
- D) Seksi femës preket më tepër

160-Shenjë madhore e sindromit nefrotik është:

- A) Oligoanuria
- B) Hematuria
- C) Hiperlipidemia
- D) Proteinuria masive

161-Forma më e rëndë e difterisë është:

- A) Difteria faringeale
- B) Difteria nazale
- C) Difteria e konjuktivës

D) Difteria laringeale

162-Chorea e Sydenham është karakteristike në:

- A) Encefalopatitë kongenitale
- B) Konvulsionet febrile
- C) Veset e zemrës me cianozë
- D) Ethen reumatizmale

163-Talasemia major nuk ka:

- A) Splenomegali
- B) Qeliza me shenjë
- C) Hbf të rritur
- D) Pakësim të nivelit të hekurit në gjak

164-Meningiti bakterial nuk ka karakteristike në LCS:

- A) Rritjen e neutrofileve
- B) Rritjen e numrit të qelizave
- C) Uljen e glukozës
- D) Uljen e proteinave

165-Për Hemofilia A nuk është vërtetë:

- A) Vjen nga mungesa e faktorit VIII
- B) Karakterizohet nga hemartroza
- C) Është sëmundje autozomale recesive
- D) Mund të ketë hemorragji intrakraniale

166-Nuk është shenjë e insuficiencës kardiake:

- A) Takipnea
- B) Kardiomegalia
- C) Hepatomegalia
- D) Poliuria

167-Karakteristikat klinike të infeksionit nga hepatiti A janë si më poshtë, me përjashtim të:

- A) Periudha e inkubacionit është 15-25 ditë
- B) Klinika ka manifestime të shumta ekstrahepatike
- C) Transmetimi është fekal-oral
- D) Infeksioni manifestohet me rritje të transaminazave dhe bilirubinës

168-Cila nga enzimat e mëposhtme rritet në parotit:

- A) Fosfataza alkaline
- B) Transaminazat
- C) Amilaza
- D) Lipaza

169-Janë të vërteta për Hemofilinë B të gjitha me përjashtim të:

- A) Nuk dallohet klinikisht nga hemofilia A
- B) Niveli i faktorit IX është i ulur
- C) Shfaqet klinikisht vetëm tek vajzat
- D) Trashëgohet në mënyrë autozomale recesive

170-Në rastin e epiglotitit duhet shmangur:

- A) Matja e temperaturës
- B) Oksigjenimi
- C) Shikimi i fytit me spatul
- D) Aerosoloterapia me adrenalinë

171-Hb që gjendet në sasi më të madhe tek i porsalinduri është:

- A) Hba
- B) Hba₂
- C) Hbf
- D) Hbs

172-Cila nga sëmundjet e mëposhtme shkaktohet nga një gjen i lidhur me seksin:

- A) Talasemia
- B) Anemia ferriprive
- C) Hemofilia
- D) Drepanocitoza

173-Mjekimet e mëposhtme janë të dobishme në laringotrakeobronkitin akut, me përjashtim të:

- A) Rritja e lagështisë së mjedisit
- B) Aerosoloterapia me adrenalinë
- C) Oksigjenoterapia
- D) Antitusivët (frenuesit e kollës)

174-Cilën nga shenjat e mëposhtme nuk e gjejmë në infeksionet e rrugëve të sipërme respiratore:

- A) Kollë

- B) Ethe
- C) Polipne
- D) Wheezing

175-Shkaktarë të anginës purulente janë:

- A) Viruset
- B) Streptokoku
- C) Mykoplazma
- D) Ndotësit ambientalë

176-Ethja në fëmijë trajtohet me të gjitha mënyrat e mëposhtme, me përjashtim të:

- A) Ibuprofen
- B) Paracetamol
- C) Aspirinë
- D) Kompresa

177-Në trajtimin e bronkiolitit akut kanë vlerë të gjitha, me përjashtim të:

- A) Inhalacionit me bronkodilatatorë
- B) Mjekimit me antibiotikë
- C) Oksigjenoterapisë
- D) Trajtimin të ethes me antipiretikë

178-Orkiti është komplikacion i:

- A) Skarlatinës
- B) Parotitit
- C) Varicelës
- D) Fruthit

179-Në një fëmijë me purpur trombocitopenike autoimune i gjejmë të gjitha, me përjashtim të:

- A) Petekie dhe ekimoza
- B) Anemi
- C) Numri i trombociteve i ulur
- D) Hepatosplenomegali

180-Në cilën moshë hasen më shpesh konvulsionet febrile:

- A) Tek i porsalinduri
- B) Pas moshës 12-vjeçare
- C) Nga 6 në 12 vjeç
- D) Nga 6 muaj në 5 vjeç

181-Shenja Brudzinski është pozitive në:

- A) Parotit
- B) Miokardit
- C) Meningit
- D) Hepatit

182-Tonsiliti akut shkaktohet nga, dhe mjekohet me:

- A) Escherichia coli, Gentamicinë
- B) Hymenolepsis nana, Cefalosporina
- C) Streptokoku β -hemolitik, Penicilinë
- D) Stafilokoku i artë, Gentamicinë,

183-Fruthi ka shenjë patognomonike:

- A) Maskën e Filatovit
- B) Dermografizmin e bardhë
- C) Njollat e Koplikut
- D) Shenjën Trousseau

184-Nje i porsalindur klasifikohet AGA kur

- A) Pesha eshte midis 3-97% percentile
- B) Gjatesia eshte midis 3-97 % percentile
- C) Perimetri I kokes eshte midis 3-97% percentile
- D) Te gjitha

185-Nje i porsalindur klasifikohet si SGA kur

- A) Pesha eshte nen 3% percentile
- B) Gjatesia eshte nen 3% percentile
- C) Perimetri I kokes eshte nen 3 % percentile
- D) Te gjitha

186-Nje i porsalindur klasifikohet si LGA kur

- A) Pesha eshte mbi 97% percentile
- B) Gjatesia eshte mbi 97 % percentile
- C) Perimetri I kokes eshte mbi 97 % percentile
- D) Te gjitha

187-Quhet femije premature

- A) Ai qe lind <37 jave moshe barre
- B) Ai qe lind >42 jave moshe barre
- C) Ai qe lind =20 jave moshe barre
- D) Ai qe lind midis 37-41 jave moshe barre

188-Ikteri fiziologjik shfaqet

- A) Diten e pare te jetes
- B) Diten e trete te jetes

- C) Diten e dhjete te jetes
- D) Muajin e pare te jetes

189-Ikteri nga papjtueshmeria e rhesusit shfaqet

- A) Diten e pare te jetes
- B) Diten e trete te jetes
- C) Diten e dhjete te jetes
- D) Muajin e pare te jetes

190—Trajtimi i ikterit perfshin

- A) Ushqyerjen sa me shpesh me gji
- B) Fototerapi
- C) Eksanguinotransfuzion
- D) Te gjitha

191-Nje i porsalindur me ikter ka keto shenja klinike

- A) Zverdhje te lekures dhe te mukozave
- B) Nuk kap gjirin
- C) I plogesht
- D) Te gjitha

192-Kernikter ose ikteri nuklear prek

- A) Aparatin gastro-intestinal
- B) Aparatin lokomotor
- C) Berthamat nukale te trurit
- D) Aparatin kardio-respirator

193-E vjella ne refluxin gastro-ezofageal ndodh

- A) Menjehere pas ushqyerjes
- B) Para ushqyerjes
- C) Rreth 1-2 ore pas ushqyerjes
- D) Asnjera

194-E vjella ne stenozen hipertrofike te pilorit ndodh

- A) A-menjehere pas ushqyerjes
- B) B-para ushqyerjes
- C) C-rreth 1-2 ore pas ushqyerjes
- D) D-asnjera

195-Neonati nuk vendoset ne gji kur nena eshte e semure nga

- A) Rubeola
- B) Meningiti
- C) Chiv-aids
- D) Tetanozi

196-Oftalmiti eshte shenja me e zakonshme dhe me e shpeshte e

- A) Tetanozit
- B) Gonorese
- C) Sifilizit
- D) Drubeoles

197-Apgari nuk vleresohet nepermjet

- A) Ngjyres se lekures
- B) Frekuences respiratore
- C) Frekuences kardiake
- D) Thithje-gellititjes

198-Ushqyerja ekskluzive me gji duhet te vazhdohet

- A) Dy muaj pas lindjes
- B) Kater muaj pas lindjes
- C) Gjashte muaj pas lindjes
- D) Deri ne vitin e pare te jetes

199-Ushqyerja me gji ka perparesi ndaj asaj me qumesht artificial sepse

- A) Ka me shume iga
- B) Ka aminoacide te rendesishme

- C) Rrit lidhjen psiko-afektive nene femije
- D) Te gjitha

200-Ne sallen e lindjes veprimi qe duhet bere gjithmone eshte

- A) Vendos bebin mbi barkun e nenes
- B) Largoje ne nje dhome me vete
- C) Mbaje larg nga ambjenti ku rri nena
- D) Mos I jep informacion nenes

201-Ne ekzaminimin e pare te bebit gjithmone duhet pare

- A) Kalueshmeria anale
- B) Kalueshmeria nazale
- C) Kalueshmeria ezofago-gastrike
- D) Te gjitha

202-Ne sallen e lindjes asnjehere nuk duhet te mungoje

- A) Burimi I oksigjenit
- B) Ngrohese I ambjentit
- C) Pelenat e ngrohta
- D) Asnjera

203-Ne sallen e lindjes ekipi neonator duhet te njoftohet

- A) 30 minuta para lindjes
- B) Ne momentin e lindjes
- C) Pas lindjes
- D) Nuk eshte e nevojshme te jene ne sale

204-Nje I porsalindur klasifikohet si serotin kur lind

- A) Para javes se 37-te te shtatzanise
- B) Pas javes se 42 -te te shtatzanise
- C) Midis 37-41 jave shtatzanie
- D) Asnjera

205-E vjella ne stenozen hipertrofike te pilorit eshte

- A) Permbajtje qumeshti
- B) Qumesht I prere si hire

- C) Me permbajtje bile
- D) Asnjera

206-E vjella ne refluxin gastro-ezofageal eshte

- A) Me permbajtje qumeshti
- B) Qumesht I prere si hire
- C) Me permbajtje bile
- D) Te gjitha

207-Bebi I porsalindur vendoset ne gji

- A) Menjehere pas lindjes
- B) Diten e pare pas lindjes
- C) Tre ditet e par ate lindjes
- D) Javen e pare pas lindjes

208-Gjendja septike tek neonati shfaqet me shume me

- A) Temperature te larte--hipertermi
- B) Temperature te ulet---hipotermi
- C) Te dyja
- D) Asnjeren

209-Cilen nga semundjet e meposhtme shfaq me shpejt prematuri

- A) Papjekuri te sistemit respirator
- B) Papjekuri te sistemit lokomotor
- C) Papjekuri te sistemit nervor
- D) Asnjeren

210-Cilen nga semundjet shfaq me shpesh prematuri

- A) Papjekuri te sistemit respirator
- B) Papjekuri te sistemit gastro-intestinal
- C) Papjekuri te sistemit nervor
- D) Te gjitha

211-Hipotermia ose temperature e ulet eshte karakteristike e

- A) Bebit prematur
- B) Bebit hipotrof

- C) Bebit serotin
- D) Asnjerit

212-Perpara nje femije premature cilen do te vleresosh me shume

- A) Veshtiresine ne frymemarje
- B) Hypoglicemine
- C) Hypotermine
- D) Te gjitha

213-Pikezimi I Apgarit kryhet

- A) Ne minute e pare te jetes
- B) Ne minute 0 te jetes
- C) 30 minutat e para
- D) Diten e pare te lindjes

214-Nje femije serotin cfare paraqet me se shpeshti

- A) Asfiksi ne lindje
- B) Veshtiresi respiratore
- C) Hipoglicemi
- D) Te gjitha

215-Nje femije qe lind premature cfare paraqet me se shumti

- A) Veshtiresi ne frymemarje
- B) Hypoglicemi
- C) Hypotermi
- D) Te gjitha

216-Nje femije qe lind SGA cfare paraqet me se shumti

- A) Hypoglicemi
- B) Asfiksi ne lindje
- C) Veshtiresi ne frymemarje
- D) Te gjitha

217-Anomalite e bashkelindura jane me teper karakteristike e

- A) Femijeve te lindur ne term

- B) Femijeve te lindur SGA
- C) Femijeve te lindur LGA
- D) Asnjerit

218-Nje femije qe lind LGA cfare paraqet me se shumti

- A) Hypoglicemi
- B) Trauma te lindjes
- C) Veshtiresi ne frymemarje
- D) Te gjitha

219-Cila nga ekzaminimet e meposhtme laboratorike na tregon per nivelin e ikterit

- A) Bilirubinemia
- B) Azotemia
- C) Glicemia
- D) Sediment

220-Perpara nje neonati te semure gjithmone duhet te beni

- A) Sigurimin e rugeve ajrore te lira
- B) I ofrojme oksigjeno-terapi
- C) Monitorojme shenjat vitale
- D) Te gjitha

221-Cfare duhet te shmangim tek nje neonat I semure

- A) Banja
- B) Ushqyerja
- C) Ekzaminimi
- D) Te gjitha

222-Cfare duhet te bejme para nje femije te semure

- A) Te trajtojme problemin imediat
- B) Te gjejme pse femija eshte semurur dhe te trajtojme shkakun
- C) Te monitorojme cdo factor reziku
- D) Te gjitha

223-Kur raporti nene-femije ecen keq cfare mund te presim

- A) Braktisje te femijes
- B) Zhvillim te manget fizik

- C) Crregullime te sjelljes se femijes
- D) Te gjitha

224-Kush e permireson raportin nene-femije

- A) Te jemi te duruar me prinderit pa pervoje
- B) Tu japim shprese atyre
- C) Ti lejojme qe te qendrone pa kufizim me femijen
- D) Te gjitha

225-Menytrat me te perdorshme per matjen e temperatures tek bebet jane

- A) Aksilare
- B) Rektale
- C) Matja ne lekuren e barkut
- D) Te gjitha

226-Nje reanimim I sukseshem varet nga

- A) Parashikimi I nje lindje asfiktike
- B) Fillimi I menjehershem I veprimeve reanimatore
- C) Kryerja e tyre me saktesi
- D) Te gjitha

227-Mortaliteti infantile nenkupton

- A) Vdekshmerine neonatale brenda vitit te pare te jetes
- B) Vdekshmerine neonatale ne muajin e pare te jetes
- C) Vdekshmerine neonatale ne javen e pare te jetes
- D) Asnjeren

GASTROENTEROLOGJI DHE HEPATOLOGJI

1. Termi adenopati i referohet:

- A) Ënjtjes (zmadhimit) të nyjave limfatike
- B) Ënjtjes së zorrëve të mëdha
- C) Ënjtjes së fshikëzës së tëmthit
- D) Ënjtjes së stomakut

2. Defekimi me feçe të gjakosura njihet si:

- A) Gingivitis
- B) Fissurë anale
- C) Hematokezia
- D) Hemorroide

3. Vjellja e gjakut është i njohur si:

- A) Hemorroide
- B) Hemostasis
- C) Hematemesis
- D) Melena

4. Inflamacioni i mëlçisë njihet si:

- A) Cirrozë
- B) Hepatit
- C) Bulimi
- D) Fistul

5. Ndjesia e djegies retrosternale njihet si:

- A) Cardiosis
- B) Pyrosis

- C) Mostretje
- D) Meteorizëm

6. Të vjellat e shtuara njihen si: A)

- A) Hyperpepsia
- B) Hyperemesis
- C) Hyperamnesia
- D) Hyperfagia

7. Defekimi me feçe në ngjyrë të zezë quhet:

- A) Diarre
- A) Karcinozë
- B) Konstipacion
- C) Melena

A) 8. Inspektimi instrumental i pjesës fundore të zorrës së trashë është i njohur si:

- A) Colostomi
- B) Trakeostomi
- C) Sigmoidoskopi
- D) Tonsilektomi

9. Cila nga të mëposhtmet nuk është patologji e pankreasit:

- A) Pancreatiti akut
- B) Kolecititi akut
- C) Fibroza cistike
- D) Kanceri pankreatik

10. Disfagia është:

- A) Vështirësi në gëlltitje
- B) Vështirësi në tretje

- C) Pamundësi për të përtypur
- D) Vështirësi në defekim

11. Stenoza e lindur e pilorit:

- A) Zakonisht paraqitet që në ditët e para të jetës
- A) Ndodh më shpesh në meshkuj se femra
- B) Paraqitet me të vjella me gjak
- C) Trajtohet me FPP

12. Cirroza është:

- A) Sëmundje kronike degjenerative e mëlçisë
- B) Tumor i gojës
- C) Tumor i stomakut
- D) Prania e gurëve në fshikëzën e tëmthit

13. Një pacient diagnostikuar me hbs Ag (+), propabikish ka:

- A) Një Hepatit B
- B) Koledokolitiazë
- C) Cirrozë biliare primare
- D) Kolangit sklerotizant primar

14. Cili ekzaminim gjaku do të ishte më i dobishëm për të konfirmuar diagnozën e Cirrozës biliare primare:

- A) Antitrupa Antigliadinë
- B) Antitrupa Antimitokondrial (AMA)
- C) Antitrupa Antinuclear
- D) Niveli i amilazes në gjak

15. Për cilin nga viruset e hepatitit ekziston vakcina:

- A) Për virusin A
- B) Për virusin B
- C) Për virusin C

D) Për virusin D

NEFROLOGJI

1. Terapia Renale Zëvendësuese merret në konsiderate kur:

A) Shpejtësia e Filtracionit Glomerular < 15 ml/min.

B) Shpejtësia e Filtracionit Glomerular < 30 ml/min

C) Të dyja

D) Asnjëra

P.S (A)

2. Shpejtësia e progresionit të Insuficencës Renale Kronike në diabetikët varet nga:

A) Kontrolli i glicemisë

B) Kontrolli i hipertensionit sistemik

C) Të dyja

D) Asnjëra

3. Faktori më i rëndësishëm për progresionin e nefropatisë është:

A) Proteinuria

B) Leukocituria

C) Hematuria

D) Asnjëra

P.S. (A)

4. Ndër shkaqet e Insuficencës Renale Kronike mund të jetë:

- A) Diabeti Mellitus
- B) Hipertensioni Sistemik
- C) Pielonefriti kronik
- D) Të gjitha

5. Ndër shkaqet e anemisë në Insuficencën Renale Kronike mund të jetë:

- A) Mosprodhimi i eritropoietinës
- B) Çrregullim i metabolizmit të hekurit
- C) Të dyja
- D) Asnjëra

6. Me progresionin e Insuficencën Renale Kronike manifestohet;

- A) Hipokalçemia
- B) Hiperfosfatemia
- C) Të dyja
- D) Asnjëra

7. Në Insuficencën Renale Kronike të avancuar mund të vihen re këto lezime kutane:

- A) Pruritis
- B) Kalçifikime kutane dhe subkutane
- C) Dermatopati të fistulës arteriovenoze
- D) Të gjitha

8) Faktorë predispozues për Insuficencën Renale Akute mund të jetë:

- A) Mosha e avancuar
- B) Përdorimi i anti-inflamatorëve-josteroidal
- C) Përdorimi i anti-hipertensivëve ACE inhibitorë.
- D) Të gjitha

9. Insuficencën Renale Akute prerrenale mund të induktohet prej:

- A) Hipovolemisë intravaskulare
- B) Uljes efektive të volumit qarkullues
- C) Të dyja
- D) Asnjëra

10. Nekroza Tubulare Akute mund të jetë pasojë e:

- A) Ishemisë
- B) Toksinave
- C) Të dyja
- D) Asnjëra

11. Ndër shkaqet e Insuficencës Renale Akute prerrenale mund të jetë:

- A) Sindromi hepato renal
- B) Tromboza e venës renale
- C) Të dyja
- D) Asnjëra

12. Medikamente potencialisht nefrotoksik janë:

- A) Gentamicina
- B) Amfotericina B
- C) Të dyja
- D) Asnjëra

13. Shkaqe të nekrozës kortikale mund të jenë:

- A) Aborti septik
- B) Pickimi nga gjarpërinjtë
- C) Të dyja
- D) Asnjëra

14. Nuk mund të kalojnë përmes membranës dializuese:

- A) Toksinat e lidhura me proteinat
- B) Toksinat që eliminohen përmes filtrit glomerular normal
- C) Të dyja
- D) Asnjëra

15. Hemodializa është:

- A) Teknikë ekstrakorporeale
- B) Teknikë zëvendësuese e funksionit renal.
- C) Të dyja
- D) Asnjëra

15. Indikacion absolut për fillimin e dializës është:

- A) Edema pulmonare
- B) Hiperkaliemia
- C) Perikarditi uremik
- D) Të gjitha

16. Dializa peritoneale:

- A) Shfrytëzon membranat dializuese prej kuprofani
- B) Nuk ka nevojë për antikoagulant
- C) Të dyja
- D) Asnjëra

17. Vlerësimi i pacientit pre-transplant konsiston ndër të tjera edhe në:

- A) Vlerësimin për antitrupe CMV
- B) Vlerësimin për antitrupe HIV
- C) Të dyja
- D) Asnjëra

18. Faktorë që predispozojnë për infeksione të traktit urinar janë:

- A) Diabeti mellitus
- B) Imunosupresioni
- C) Të dyja
- D) Asnjëra