

BAZAT E INFERMIERISTIKES (216 QUIZ)

Ajo degë e filozofisë që merret me standartet e sjellje dhe të gjykimit moral quhet:

- A) Deontologji
- B) Vlerë
- C) Detyrë
- D) Etikë

Nëse një infermiere përdor uniformen e saj jashtë mjediseve spitalore quhet fajtoreshë pasi ka thyer:

- A) Të drejtat e pacientit
- B) Kodin etik
- C) Ligjin
- D) Parimet

Cili nga këta elementë bën pjesë në konceptet e teorisë infermiere:

- A) Besnikëria
- B) Bamirësia
- C) Autonomia
- D) Infermieristika

Cili nga këta elementë bën pjesë në shtrirjen e roleve infermiere:

- A) Infermieri anesteziist
- B) Infermieri si avokat
- C) Infermieri si vendimarrës
- D) Infermieri si edukues

Homeostaza psikologjike nënkupton një ekulibër të sistemit:

- A) Respirator
- B) Urinar
- C) Gastro-intestinal
- D) Mendor

Në nevojat fiziologjike të pacientit bën pjesë:

- A) Nevoja për siguri
- B) Nevoja për dashuri
- C) Nevoja për ujë
- D) Nevoja për mbrojtje

Një person mund të qëndroj pa oksigjen jo më shumë se:

- A) 1-2 min
- B) 2-3 min
- C) 3-4 min
- D) 4-5 min

Cila nga këto nevoja fiziologjike është më e rëndësishme ndër të tjerat:

- A) Nevoja për oksigjen
- B) Nevoja për ujë
- C) Nevoja për ushqim
- D) Nevoja për gjumë

Aftësia për të influencuar tek të tjerët, për tu përpjekur për një vision, qëllim ose për të ndryshuar qubet:

- A) Menaxhim
- B) Organizim
- C) Planifikim
- D) Lidërsip

Lidershipi drejtues është:

- A) Demokratik
- B) Autoritar
- C) Planifikues
- D) Organizues

Gjatë procesit të komunikimit menaxherët harxhojnë duke komunikuar me persona të ndryshëm :

- A) 30-40% të kohës
- B) 40-50% të kohës
- C) 50-70% të kohës
- D) 75-90% te kohës

Cili nga këto element bën pjesë në parimet e ruajtjes së shëndetit:

- A) Gjëndja emocionale
- B) Parandalimi i drogës & duhanit
- C) Biografia kulturore
- D) Faktorët social

Në sa stade kalon sëmundja:

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6

Cfarë ndodh në stadin e 5 të sëmundjes për pacientin:

- A) Përjeton simptomat
- B) Pranon rolin si i sëmurë
- C) Kontakton me kujdesin shëndetësor
- D) Shërimi & rehabilitimi

Në një poliklinikë nuk bën pjesë një nga këto specialitete të mëposhtme:

- A) Mikrosalla
- B) Laboratori
- C) Konsultat e fëmijeve
- D) Salla operacionit

.Kur një pacient ndodhet në ambulancën e pranimit mund të marrë disa drejtime për trajtimin e tij. Cili prej këtyre më poshtë nuk është i saktë:

- A) Në terpinë intensive
- B) Në sallën e operacionit
- C) Në pavion
- D) Në dhomën e injeksioneve

Një pacient pasi del nga salla e operacionit transportohet në:

- A) Dhomë injeksionesh
- B) Në terpinë intensive
- C) Laborator

D) Mikrokirurgji

Sëmundjet kronike janë sëmundje të cilat kanë një kohëzgjatje:

- A) 1 muaj
- B) 2 muaj
- C) 3 muaj
- D) Mbi 3 muaj

Sa nivele të kujdesit parandalues ndaj sëmundjes kemi:

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

Cila nga këto kujdesje bën pjesë në parandalimin tretësor:

- A) Edukimi shëndetësor
- B) Diagnostimi i sëmundjes
- C) Trajtimi i sëmundjes
- D) Parandalimi i komplikacioneve

Rrishtja e rrishtit për të lindur fëmijë me keqformime ose për shtatëzani me ndërlikime rritet pas moshës:

- A) 30 vjeç
- B) 35 vjeç

C) 40 vjec

D) 45 vjec

Temperatura e dhomës në mjediset spitalore tek fëmijet dhe tek të moshuarit duhet të mbahet:

A) 26-27°C

B) 24-26°C

C) 22-24°C

D) 20-22°C

Cila është ngjyra që përdoret për të lyer muret në sallat e operacionit:

A) E bardhë

B) E kuqe

C) E verdhë

D) Jeshile

Lagështia e pranueshme e ajrit në mjediset spitalore duhet të jetë:

A) 60-65%

B) 50-60%

C) 30-50%

D) 20-30%

Sa etapa ka procesi i kujdesit infermieror:

A) 1

- B) 3
- C) 5
- D) 7

Mledhja e të dhënave nga komunikimi me familjarët dhe klientin është etapa:

- A) E parë e kujdesit infermieror
- B) E dytë e kujdesit infermieror
- C) E tretë e kujdesit infermieror
- D) E katërt e kujdesit infermieror

Në mbledhjen e të dhënave për përcaktimin e diagnozës infermierore nuk bën pjesë një nga elementët e mëposhtëm;

- A) Observimi
- B) Kartela e mjekut
- C) Biseda me klientin
- D) Planifikimi

Hemoragjia nga hundet quhet:

- A) Epistaksis
- B) Petekje
- C) Eritema
- D) Hipoksi

Egzaminimi i një regioni me anë të goditjes quhet:

- A) Palpacion
- B) Perkusion
- C) Askultacion
- D) Vibracion

Të dhënat subjektive janë të dhëna që sigurohen nga:

- A) Testet diagnostikuese
- B) Testet laboratorike
- C) Pacienti dhe familjarët
- D) Observimi

Komunikimi intrapersonal është komunikimi që ndodh brënda:

- A) Një individ
- B) Dy individëve
- C) Një grup individësh
- D) Publik

Sa nivele të komunikimit kemi:

- A) 1
- B) 2

C) 3

D) 4

Në procesin e komunikimit dërguesi është personi i cili :

A) Motivon një person për të komunikuar

B) Mjedisi ku realizohet komunikimi

C) Merr mesazhin

D) Inicion komunikimin

Cila nga këto përgjigje nuk është e saktë. Mesazhet dërgohen me anë të një kanali komunikimi që janë të tipit:

A) Auditiv

B) Viziv

C) Perceptues

D) Prekës

Kufiri i një termometri varjon nga:

A) 37-45 °C

B) 34-42.2 °C

C) 30-41.2 °C

D) 26-40 °C

Gjatë periudhës së ovulacionit femrat kanë një temperaturë më të lartë se normalja. Gjени cila është përgjigja e saktë:

A) 2 °C

- B) 1.5 °C
- C) 1 °C
- D) 0.6 °C

Rritja e temperaturës trupore mbi normalen quhet:

- A) Hipotension
- B) Hypertension
- C) Hipotermi
- D) Hipertermi

Gjeni cila është përgjigja e saktë. Gjatë një hipotermie ndodh:

- A) Rritet shpejtësia e pulsit
- B) Rritet shpejtësia respiratore
- C) Ulet shpejtësia respiratore
- D) Konvulsione

Matja e pulsit apikalo-radial realizohet nga:

- A) 1 infermiere
- B) 2 infermiere
- C) 3 infermiere
- D) Vet pacienti

Administrimi topikal i medikamenteve realizohet në rrugë:

- A) Orale
- B) Parenterale
- C) Traktit respirator
- D) Lëkura & mukozat

Cila nga mënyrat e mëposhtëme të administrimit të medikamenteve nuk bën pjesë në administrimin parenteral:

- A) Intra/muskular
- B) Intra/venoz
- C) Sub/kutan
- D) Transdermal

Kur një medikament duhet të qëndroj në stomak për efekt lokal pacienti pozicionohet;

- A) Djathtas
- B) Majtas
- C) Foëler
- D) Semi-foëler

Kur indi është i vogel ose kemi një age të gjatë injeksionet sub-kutane realizohen në kënd:

- A) 75°
- B) 65°
- C) 55°
- D) 45°

Injeksionet intra/muskulare nuk realizohen në muskulin:

- A) Gluteal
- B) Femoral
- C) Vastus-lateral
- D) Facial

Teknika zikzak e injektimit të medikamenteve realizohet në injeksionet:

- A) Intra/venoze
- B) Intra/muskulare
- C) Intra/dermale
- D) Sub/kutane

Metoda e administrimit të oksigjeno terapisë realizohet me anë të :

- A) Sondës nazo-gastrike
- B) Kateterit urinar
- C) Vigonit
- D) Kateterit nazal

Niveli i lartë i lengjëve në organizëm quhet:

- A) Hiperkalemi
- B) Hipokalemi
- C) Hipovolemi
- D) Hipervolemi

Sa përqind të peshës së përgjithshme trupore zë sasia totale e ujit në organizëm:

- A) 55-85%
- B) 45-75%
- C) 35-65%
- D) 25-55%

Cili nga këta element kimik ka një rol të rëndësishëm në formimin e skeletit të trupit:

- A) Na
- B) K
- C) Ca
- D) Mg

Cili nga këta element kimik ka një rol të rëndësishëm në acidozën dhe alkalozën metabolike:

- A) HPO_4
- B) Cl
- C) Mg
- D) HCO_3

Cili nga këto element nuk bën pjesë në makroelementët ushqimor:

- A) Uji
- B) Karboidratet
- C) Vitaminat
- D) Yndyrnat

Ulja e oreksit ose e dëshirës për të ngrënë quhet:

- A) Nauze
- B) Anoreksi
- C) Vomitus
- D) Flatulencë

Gjatë periudhës së dimrit proceset metabolike:

- A) Ulen
- B) Rriten
- C) Ndikohen nga gjinia
- D) Nuk ndryshojnë

Hapja kirurgjikale që bëhet në stomak nëpërmjet murit abdominal dhe shërben për ushqyerjen e pacienti quhet:

- A) Tonsilectomi
- B) Laringostomi
- C) Gastrostomi
- D) Faringostomi

Cila nga rrugët e mëposhtëme nuk është një rruge ushqyerje për pacientin:

- A) Parenterale
- B) Kateteri nazal
- C) Sonda nazo-gastrike
- D) Orale

Proçesi i zbrazjes së vezikës urinare quhet:

- A) Meatus
- B) Uretër
- C) Miksion
- D) Sfinkter

Zbrazja e vezikës urinare tek adultët ndodh kur në veshkë janë grumbulluar:

- A) 50-150 ml/urinë
- B) 100-200 ml/urinë
- C) 150-250 ml/urinë
- D) 200-300 ml/urinë

Sasia e urinës që mbetet në vezikë pas urinimit quhet:

- A) Poliuri
- B) Anuri
- C) Oliguri
- D) Urinë reziduale

Prania e pusit në urinë quhet:

- A) Glukozuri
- B) Piuri
- C) Hematuri

D) Dizuri

Urinimi i shpeshtë gjatë natës, vecanërisht kur nuk janë marrë sasi të mëdha lëngjesh quhet;

A) Inkontinencë urinare

B) Polakiuri

C) Nikturi

D) Piuri

Sa është sasia e solucionit që shërben për të fryrë balonin e kateterit foley gjatë procesit të kateterizimit urinar:

A) 5 ml

B) 10 ml

C) 15 ml

D) 20 ml

Cili nga medikamentet e mëposhtëm nuk është një antikoagulant:

A) Heparina

B) Potasiumi

C) Oksalati bazik

D) Ampicilina

Hemokultura është një analizë gjaku;

A) Biokimike

B) Klinike

C) Bakteriologjike

D) Parazitologjike

Prova që shërben për të matur sasinë e urinës gjatë 24 orëve quhet;

- A) Adissi
- B) Ziminski
- C) Urokulturë
- D) Glukozuri

Egzaminimi bakterologjik i feçeve quhet;

- A) Hemokulturë
- B) Koprokulturë
- C) Urokulturë
- D) Parazitologjike

Në pozicionet e qëndrimit shtrirë në planin horizontal të pacientit nuk bën pjesë:

- A) Dekubitus dorsal
- B) Dekubitus ventral
- C) Dekubitus lateral
- D) Pozicioni ortopne

Gjatë vendosjes së pacientit në pozicion semi-foëler shpina formon me shtratin një kënd:

- A) 90°
- B) 60°

C) 45°

D) 25°

Plagët që krijohen nga qëndrimi në shtrat për një kohë të gjatë ose nga presioni qohen;

A) Ulçera sipërfaqësore

B) Ulçera të thella

C) Dekubitus

D) Imobilitet

Cili ndër këta faktor ka më tepër ndikim në formimin e dekubitusëve;

A) Anemia

B) Lageshtia

C) Vit. C

D) Temperatura

Sa stade ka gjumi me lëvizje të shpeshta të syve GJ.L.SH.S:

A) 0

B) 2

C) 4

D) 6

Sa stade ka gjumi me lëvizje të ngadalta të syve GJ.L.N.S:

A) 0

B) 2

C) 4

D) 6

Paftësia për të bërë një gjumë cilësor quhet:

A) Narkolepsi

B) Insomnia

C) Apnea e gjumit

D) Somnambulizëm

Një valë e papritur mbingarkese gjumi që ndodh gjatë ditës quhet;

A) Hipersomni

B) Eneurezis

C) Narkolepsi

D) Somnambulizem

Paftësia e zotërimit të defekimit të feçeve dhe gazrave nga anusi quhet:

A) Diarre

B) Koprolite

C) Konstipacion

D) Inkontinencë fekale

Egzaminimi i një organi ose i një regjoni me anë të prekjes quhet:

- A) Askultacion
- B) Perkusion
- C) Palpacion
- D) Vibracion

Të dhënat objektive janë të dhëna që infermieri i merr nga :

- A).Klienti
- B) Observimi
- C) Testet diagnostikuese.
- D) Laboratorike

Komunikimi intrepersonal ndodh:

- A) Brënda një individi
- B) Metakomunikimit
- C) Midis 2 individëve
- D) Publik

Në elementët e komunikimit verbal bën pjesë:

- A) Xhestet
- B) Zhurmat
- C) Humori
- D) Ecja

Matja e temperaturës orale nuk është e sigurtë:

- A) Te pacientët me diarre
- B) Te pacientët e djersitur
- C) Te pacientët me episode krizash
- D) Te pacientët me konstipacion

Rritja e shpejtësisë së pulsit mbi 100 rrah/min quhet:

- A) Takipne
- B) Brakikardi
- C) Bradipne
- D) Bradikardi

“Na” është një anion i cili merr pjesë në :

- A) Tkurrjen muskulare
- B) Metabolizmin e karbohidrateve
- C) Ruajtjen e ekulibrit acido-bazik
- D) Balancën hidrike

Në parimet e kujdesit shëndetësor bën pjesë:

- A) Autonomia
- B) Vërtetësia
- C) Besnikëria
- D) Besueshmëria

Sa përqind të peshës së përgjithshme trupore zë lëngu brëndaqelizor:

- A) 5%
- B) 30%
- C) 50%
- D) 60%

Cila është sasia e oksigjenit që jepet me anë të kanjullës nazale:

- A) 1l/min
- B) 2-4l/min
- C) 5-7 l/min
- D) 6-8 l/min

Nga mëngjesi në darkë temperatura e trupit luan me:

- A) 0.1 °C
- B) 0.2 °C
- C) 0.3 °C
- D) 0.4 °C

Ulja e shpejtësisë së pulsit nën 60 rrah/min quhet:

- A) Takipne
- B) Takikardi

- C) Bradipne
- D) Bradikardi

Cili nga këta muskuj është më i përdorshmi për bërjen e injeksioneve i/m:

- A) Ventro gluteal
- B) Vastus lateral
- C) Deltoid
- D) Femoral

Në rregullat e kujdesit shëndetësor bën pjesë:

- A) Drejtësia
- B) Vërtetësia
- C) Jokeqdashje
- D) Bamirësia

Gjeni cili është pohimi i saktë. Lidershipi drejtues :

- A) Nuk përfshin ndjekësit e tij në zgjidhjen e problemeve
- B) Është lider demokratik
- C) Përfshin ndjekësit e tij në dhënien e ideve
- D) Jep ide të reja

Në faktorët e brëndshëm që ndikojë në sëmundje bën pjesë:

- A) Shtrirja e simptomave

- B) Shoqëria
- C) Faktorët. ekonomik
- D) Niveli kulturor

Parandalimi dytësor konsiston:

- A) Programet e edukimit shëndetësor
- B) Imunizimin e efekteve të sëmundjes
- C) Trajtimin dhe izolimin e sëmundjes
- D) Diagnostikimin e sëmundjes

Cila është temperatura që duhet të ruhet në ambjentet spitalore:

- A) 21-26 gradë celcius
- B).22-27 gradë celcius
- C) 26-28 gradë celcius
- D) 20-22 gradë celcius

Diagnoza mjeksore është:

- A) E drejtuar nga patologjia dhe zgjat aq kohë sa zgjat semundja.
- B) Përshkruan përgjigjen e personave për sëmundjen.
- C) Trajton të sëmurin
- D) Identifikon një simptom të caktuar.

Në elementët e komunikimit joverbal bën pjesë:

- A) Shprehjet e fytyres
- B) Ritmi
- C) Fjalori
- D) Humori

.Zona personale është :

- A) 4 inç-18fit
- B) 18 inç-4fit
- C) 4 inç-12fit
- D) 12 inç-4fit

Matja e temperaturës rektale nuk është e sigurtë të :

- A) Pacientët me episode krizash.
- B) Pacientët që kanë bërë ndërhyrje në zonën rektale.
- C) Pacientët me të vjella.
- D) Pacientët me konstipacion

Sa përqind të peshës së përgjithshme trupore zë lengu intersticial:

- A) 5 %
- B) 10 %
- C) 15 %
- D) 20 %

Sa përqind të oksigjenit në gjak transporton Hg:

- A) 90 %
- B) 93 %
- C) 97 %
- D) 99 %

N.q.se një infermiere përvetëson sendet personale të një pacienti ajo ka thyer:

- A) Kodin etik
- B) Ligjin
- C) Deontologjinë
- D) Vlerat

Njollat e kuqe, të mëdha të ngritura mbi nivelin e lëkures që shpesh janë të dhimbshme quhen:

- A) Petekje
- B) Eritema
- C) Epistaksis
- D) Egzentema

Diagnoza infermierore është :

- A) E njëjtë nga një person tek një tjetër.
- B) Ndryshon nga një person tek një tjetër
- C) Drejtohet nga patologjia

D) Zgjat aq kohë sa zgjat sëmundja.

Distanca që aplikohet në zonën sociale është:

A) 1-12 fit

B) 2-12 fit

C) 3-12 fit

D) 4-12 fit

Pasi jepen medikamentet me anë të tubit nazogastrik pacienti vendoset në pozicion:

A) Shtrirë nga e majta

B) Shtrirë nga e djathta

C) Semi-foëler

D) Foëler

Ca është një kation i cili merr pjesë në këto funksione:

A) Transmetimin e impulseve nervore

B) Transmetimin e impulseve elektrike

C) Nxit aktivitetin e enzimave

D) Nxit aktivitetin e karbohidrateve

Procesi i hapjes së uretrës quhet:

A) Meatus

B) Miksion

C) Polakiuri

D) Poliuri

Paaftësia për të kontrolluar shkarkimin e urinës nga vezika urinare quhet:

A) Oliguri

B) Retesion urinar

C) Inkontinencë urinare

D) Anuri

Pamundësia për të qëndruar në gjumë për shkak të zgjimeve të shpeshta quhet insomni:

A) fillestare

B) Sekondare

C) Terminale

D) Intermitente

Një vale e papritur mbingarkese me gjumë që ndodh gjatë ditës quhet:

A) hipersomni

B) narkolepsi

C) parasomni

D) Insomni

Infeksionet që ndodhin nga kateterizimi mund të shkaktohen nga faktorët:

A) Mosdezifektimi i mirë i zonës përreth uretrës.

B) Mos futja siç duhet e kateterit

C) Mos larja e duarve të pacientit

D) Mos funksionimi siç duhet i uretrës

Rritja e hematokritit tregon:

- A) Anemi
- B) Infeksion
- C) Trashje të gjakut
- D) Hollim të gjakut

Gjeni cila nga tre qëllimet kryesore të elementëve ushqimor është i gabuar:

- A) Formojnë strukturën trupore(kockë, gjak)
- B) Sigurojnë energji e cila matet me kilokalori
- C) Formojnë pjesën muskulare të një organi.
- D) Ndhimojnë rregullimin e reaksioneve kimike

Gjatë stadi të IV të gjumit me lëvizje jo të shpejta të syve shpejtësia e

rrahjeve të zemrës dhe të respiracioneve ulet:

- A) 10-19 %
- B) 20-30 %
- C) 31-40 %
- D) 41-50 %

Ecja në gjumë quhet:

- A) Insomni
- B) Hipersomni
- C) Parasomni
- D) Somnambulizëm

Cili është raporti antikoagulant /gjak që duhet për marjen e një analize:

- A) 0.3ml/5ml
- B) 0.5ml/3ml
- C) 0.5-0.3ml
- D) 0.5ml/5ml

Metodat për kontrollimin e tubit nazogastrik:

- A) Tubi futet me ane të gastrostomise

- B) Tubi futet me anë të një incizioni
- C) Fut me anë të shiringës pak ajër në fund të tubit
- D) Fut me anë të shiringës pak gjak në fund të tubit

SGPT dhe SGOT janë tregues të :

- A) Infarkt të miokardit
- B) Hepatitit
- C) Sëm. të veshkave
- D) Otitit

Cila nga këto prova shërben për të matur dendësinë e urinës:

- A) CPK
- B) Adissi
- C) Ziminski
- D) CPR

Gastrostomia konsiston në:

- A) Observimin e organeve të sipërme digjестive
- B) Futjen e një tubi në stomak me anë të një ndërhyrje kirurgjikale
- C) Futjen e një kateteri nga hunda deri në stomak
- D) Futjen e një kateteri nga goja deri në stomak me anë të një ndërhyrje kirurgjikale

Sa zbritet përqindja metabolike gjatë gjumit:

- A) 5-9 %
- B) 10-15 %
- C) 16-20 %
- D) 21-25 %

Ulçerat që fillojnë në shtresat subkutane mbi një dalje kockore dhe më pas zgjerohen dhe në sipërfaqe quhen:

- A) Ulçera sipërfaqësore
- B) Ulçera të thella

- C) Nekrozë sipërfaqësore
- D) Nekrozë që depërton në thellësi

Cili nga keto pozicione përdoret më pak gjatë vendosjes së pacientit në planin horizontal:

- A) Dekubitus lateral
- B) Dekubitus lateralo-dorsal
- C) Dekubitus lateralo-ventral
- D) Foëler

Ulja e dendesisë së urinës nën vlerën 1010-1030 haset në semundje të :

- A) Heparit
- B) Diabetit
- C) Veshkave
- D) Stomakut

Sa është niveli i protrombinës në gjak:

- A) 70-100%
- B) 70-110%
- C) 70-120%
- D) 70-130%

Gjak vidal është një analizë që bëhet në :

- A) Sëm. infektive
- B) Tifo abdominale
- C) Sëm.pulmonare
- D) Cerozë hepatike

“Ca” është një kation i cili merr pjesë në këto funksione:

- A) Transmetimin e impulseve nervore
- B) Transmetimin e impulseve elektrike
- C) Krijimin e impulseve nervore
- D) Krijimin e impulseve elektrike

Hipertensioni është presioni i gjakut jonormal i cili ndodh kur presioni arterial është:

- A) A)Nën 140 me 90 mmHg
- B) B)140 me 90 mmHg
- C) Mbi 140 me 90 mmHg
- D) Nën 140 nën 90 mmHg

Cili nga vendet e matjes së temperaturës është më pak i sakti:

- A) Rektale
- B) Orale
- C) Aksilare
- D) Temporale

Përmirësimi i tolerancës ndaj aktiviteteve përfshin një nga elementët e mëposhtëm. Cili është pohimi i saktë:

- A) Ushtrimet e frymëmearrjes
- B) Drenimi i mushkrive
- C) Riaktivizimi i aparatit kardiopulmonar
- D) Nebulizmi

Gjatë aplikimit të teknikës zikzak sa sekonda duhet të qëndroj agja në brendësi të muskulit pas injektimit të medikamentit. Gjeni alternativën e saktë:

- A) 0-1 s
 - B) 2-10 s
 - C) 11-15 s
 - D) 16 -20 s
- Përgjigja e saktë

Në administrimin e injeksioneve s/c bëhet:

- A) Tërheqje e lëkurës
- B) Mbledhje e lëkurës
- C) Shtypje e lëkurës
- D) Tendosje e lëkurës

Fazat e një lidhje ndihmuese të komunikimit

janë:

- A) 10
- B) 11
- C) 12
- D) 13

Faza e takimit të parë infermier-klient është:

- A) Faza parandërvepruese
- B) Testimi
- C) Besimi
- D) Orjentimi

Për të shtuar lagështirën e mjedisit në dhomën e pacientit përdoret:

- A) Ventilator
- B) Vaporizator
- C) Kondicioner
- D) Oksigjen i lagështuar

Menaxhimi është:

- A) Aftësia për të influencuar tek të tjerët
- B) Proçesi sistematik i njëjtë me proçesin infermieror
- C) Proçes mësimi
- D) Proçes vlerësimi

Idetë për të cilat individi ndjehet i sigurtë

quhen:

- A) Vlerë
- B) Etikë
- C) Deontologji
- D) Parandjenjë

Sa drejtime merr i sëmuri nga ambulancat e pranimit:

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

Injeksionet jepen në rrugë :

- A) Orale
- B) Paranterale
- C) Endogjene
- D) Egzogjene

Deontologjia është:

- A) Një sistem i parimeve fiziologjike
- B) Teoria e obligimit moral
- C) Kodi udhëheqës
- D) Vlerë individuale

Metakomunikimi është:

- A) Shkëmbimi i mesazhit pa përdorur fjalët
- B) Mesazhet që kërkojnë përdorimin e teknikave efektive të komunikimit
- C) Mesazhi që transporton qëndrimin e dërguesit ndaj vetes dhe mesazhit
- D) Proçes mësimi dhe interpretimi

Cila nga sistemet e mëposhtme nuk ndikon në ekuilibrin homeostatik;

- A) Hipofizia
- B) Sistemi kardiovaskular
- C) Organet gjenitale
- D) Paratiroide

Stadi i tretë i sëmundjes është:

- A) Roli i varur i klientit.
- B) Pranimi i rolit të sëmurë
- C) Kontakti me personelin shëndetësor.
- D) Shërimi dhe reabilitimi

Sistola është periudha kur ventrikujt e zemrës janë:

- A) Të relaksuar
- B) Të kontraktuar
- C) Gjysëm të kontraktuar
- D) Gjysëm të relaksuar

Kur krahu ndodhet mbi nivelin e zemrës TA rezulton:

- A) Gabimisht i lartë
- B) Gabimisht i ulët
- C) Nuk ndryshon
- D) Pak më lartë

Hipotensioni kemi në ato raste kur:

- A) Presioni diastolik 140mmHg dhe sistolik 90mmHg
- B) Presioni sistolik 130 dhe diastolik 80mmHg
- C) Presioni sistolik 90mmHg dhe diastolik 60mmHg
- D) Presioni diastolic 100 dhe sistolik 50

Sasia e ujit në organizëm varet:

- A) Nga madhësia e indit lidhor.
- B) Nga madhësia e indit epithelial.
- C) Nga madhësia e indit adipos.
- D) Nga madhësia e indit sub kutan

Proteinat janë:

- A) Elektorilite.
- B) Jo elektrolite.
- C) Katione.
- D) Anione

Frymëmarrja e shpejtë shoqërohet me temperaturë:

- A) Më të lartë se normalja
- B) Më të ulët se normalja
- C) Të pandryshueshme
- D) Relativisht e =

Bradipnea quhet:

- A) Nën 18 frymëmarrje /min
- B) Mbi 20 frymëmarrje /min
- C) Mbi 30 frymëmarrje /min
- D) Nën 12 frymëmarrje /min

Sa stade ka sëmundja:

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

Në rast të sëmundjeve respiratore çënohet nevoja e:

- A) Vlerësimit
- B) Respektit
- C) Sigurisë
- D) Dashurisë

Rezervat ushqimore që përdor organizmi të parat nëse burimet nuk janë të mjaftueshme janë:

- A) Proteinat
- B) Karbohidratet
- C) Vitaminat
- D) Yndyrnat

”Çfarë mjekimi keni marrë?” bën pjesë tek pyetjet e:

- A) Hapura
- B) Ngushta
- C) Primare
- D) Sekondare

Nëse kemi bllokim të trakesë oksigjenimi :

- A) Mungon
- B) Është i paët
- C) Nuk ndryshon
- D) Është i mjaftueshëm

Përshkrimi i volumit të pulsit është nga:

- A) 0 në 3+
- B) 1 në 4+
- C) -1 në 3
- D) -1 në 4

Kur indi është i madh injeksionet subkutane bëhen me kënd:

- A) 60 gradë
- B) 70 gradë
- C) 80 gradë
- D) 90 gradë

Sasia e dhënies së injeksioneve intra-muskulare maksimale në mililitra është:

- A) 1
- B) 3
- C) 5
- D) 7

Frymëmarrja mesatare tek paraadoleshentët është:

- A) 6-10
- B) 11-19
- C) 20-40
- D) 50-55

Sëmundja Adison karakterizohet nga funksionimi jo i plotë i gjëndrrës:

- A) Adrenale
- B) Hipofizës
- C) Tiroides
- D) Paratiroide

Tek të porsalindurit pulsi është:

- A) 60-80
- B) 80-110
- C) 120-160
- D) 170-190

Metodat për kontrollin e tubit nazo-gastrik janë:

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

Thithja e drejtpërdrejtë e medikamenteve bëhet në rrugë:

- A) Orale
- B) Venoze
- C) Subkutane
- D) Intradermale

Në ekuilibrin homeostatik janë më të aktivizuara:

- A) 3 gjëndrra dhe 4 sisteme
- B) 2 gjëndrra dhe 2 sisteme
- C) 4 gjëndrra dhe 3 sisteme

D) 3 gjëndrra dhe 3 sisteme

Njeriu zgjohet më shpejt në gjumin:

A) Me lëvizje të shpejta të syve

B) Jo të shpejta të syve

C) Nuk luan rol stadi

D) Relativisht njëlloj

Mesatarja e urinës së eliminuar në mililitra normalisht është:

A) 1000

B) 1200

C) 1400

D) 1600

Prania e qelizave epiteliale në urinë duhet të jetë:

A) Negativ

B) E rrallë

C) E shpeshtë

D) Mesatare

Gjatë retensionit urinar vezika urinare:

A) Është e boshatisur

B) Është gjysëm e mbushur

- C) Ka pak urinë reziduale
- D) Fryhet deri sa arrin umbelikusin

Dizuria është:

- A) Urinim i pakët
- B) Urinim i tepërt
- C) Vështirësi në urinim
- D) Paaftësi për të urinuar

pH mesatar i urinës tek individët me dietë të rregullt është:

- A) 2
- B) 4
- C) 6
- D) 8

Urina e mesit për analizë merret pasi janë nxjerrë x ml e para:

- A) 10
- B) 20
- C) 30
- D) 40

Mënyra sesi profesionistët përmbushin detyrat e tyre dhe sigurojnë kujdesin tek pacientët quhet:

- A) deontologji
- B) etikë

- C) vlerë
- D) teleologjike

Organizimi si një ndër etapat e menaxhimit nuk përfshin :

- A) vendosjen e qëllimeve
- B) vendosjen e marrdhënieve
- C) përcaktimi i përgjegjësive
- D) hartimi e një plani veprimi

Koncepti i homeostazës është përshkruar për herë të parë nga E.B.Cannon në vitin:

- A) 1920
- B) 1930
- C) 1939
- D) 1949

Për kujdesin e syve nuk përdoret:

- A) disa tamponë garze që mund të vihen në anë të syrit për të mbajtur solucionin
- B) përdor pamuk të njomur mirë me ujë ose fiziologjik
- C) solucioni duhet të jetë në temperaturën e trupit
- D) fshije menjëherë me tampon duke filluar nga këndi i jashtëm në këndin e brendshëm

Një individ mund të qëndrojë pa ujë:

- A) 2-3 ditë
- B) 3-5 ditë
- C) 5-7 ditë
- D) 8-9 ditë

Cilat nga rezervat trupore shpenzohen në fund:

- A) yndyrnat
- B) karbohidratet
- C) kripërat minerale
- D) proteinat

Faktorët e brendshëm të shëndetit janë:

- A) praktikat familjare
- B) biografia kulturore
- C) faktorët social-ekonomik
- D) perceptimi i sëmundjes

Faktorët e jashtëm që influencojnë sëmundjen janë:

- A) simptoma potenciale
- B) shtrirja e simptomave
- C) natyra e sëmundjes
- D) faktorët ekonomik

Cili nga këta elemente bën pjesë në komunikimin verbal:

- A) shprehja e fytyrës

- B) eçja dhe qëndrimi
- C) xhestet
- D) ritmi

Në komunikimin joverbal bën pjesë:

- A) humori
- B) fjalori
- C) koha dhe përkatësi
- D) eçja dhe qëndrimi

Në karakteristikat e një lidhje ndihmuese nuk bën pjesë:

- A) besimi
- B) empatia
- C) kujdesi
- D) testimi

Zona sociale është:

- A) 4-8 fit
- B) 4-12 fit
- C) 4-16 fit
- D) 4-18 fit

Shoku është një gjendje:

- A) frikë
- B) pasigurie
- C) refuzim për të bashkëvepruar
- D) emocionale e fuqishme

Kur diagnoza nuk është e saktë dhe nuk është vendosur që pacienti të shtrohet ai dërgohet në:

- A) në sallën e operacionit
- B) në terapinë intensive
- C) në pavion ose në klinikë
- D) dhomën e observimit

Biseda indirekte me pacientin përdoret për:

- A) informacion të veçantë
- B) vlerësimin e ndryshimeve
- C) përcaktimi i problemeve
- D) zgjidhjen e problemeve

Cilët janë faktorët që duhet pasur parasysh kur planifikohet kujdesi i pacientit në shtëpi:

- A) ushqimi
- B) rehabilitimi
- C) terapia
- D) edukimi i pacientit

Faktorët e jashtëm të mjedisit që nuk ndikojnë në shëndetin e pacientit janë :

- A)kontrolli i ndriçimit
- B)përdorimi i ngjyrave
- C)kontrolli i lagështirës
- D)nevoja për dashuri dhe ngrohtësi

Një proces menaxhimi përbëhet nga:

- A)dy funksione
- B)tre funksione
- C)katër funksione
- D)pesë funksione

Ndikimi i sëmundjes në vetëkonceptim:

- A)është një proces përshtatje me të gjitha mekanizmat
- B)përfshin përshtatjen e vetëkonceptimit
- C)frekuenca e shfaqjes së simptomave
- D) është një imazh mendor i fortësisë dhe i dobësisë në të gjitha aspektet

Fëmijët(1-3vjeç)fle:

- A)8-10orë në ditë
- B)10-12orë në ditë
- C)12-14orë në ditë
- D)14-16orë në ditë

Përkufizime të diagnozës infermierore janë dhënë që në vitin:

- A)1940
- B)1950
- C)1955
- D)1960

Klasifikimi i dy tipeve të gjumit (**LSHS, LJSHS**) u emërtua për herë të parë në vitin:

- A)1943
- B)1953
- C)1960
- D)1963

Qëndrimi në të ftohtë :

- A)rrit TA
- B)ulë TA
- C)nuk ndikon në shenjat jetësore
- D)është i pandryshyeshëm

Trajtimi i dekubitueseve bëhet me:

- A)acid folik
- B)bikarbonat natriumi
- C)të verdhë veze
- D)xhelatinë

Joni është:

- A)një atom që nuk mbart ngarkesë elektrike
- B)është një molekul që mbetet e pandryshuar
- C)është njësia matse që përdoret në aktivitetet kimike
- D)një atom opo molekul e cila mbart ngarkes elektrike

Frekuenca respiratore 14-18 e kanë:

- A)fëmijët 1-3vjeç
- B)fëmijët 3-5 vjeç
- C)adoloshendët
- D)meshkujt e rritur

Në matjen rektale temperatura është:

- A)36.5 °C
- B)37 °C
- C)37.5°C
- D)38°C

Stadi i parë i sëmundjes është :

- A)pranimi i rolit të sëmurë
- B)kontakti me kujdesin shëndetësor
- C)roli i varur i pacientit
- D)shërimi dhe rehabilitimi

Në rast depresioni temperatura trupore është:

- A)më e lartë se norma
- B)në normë
- C)më e ulët se norma
- D)nuk ndryshon

Frymëmarrja Cheyne-Stoke:

- A)tregon afrimin e vdekjes
- B)nuk është kaq serioze
- C)ka të bëjë me respirime të zhurmshme
- D) spazma e regjionit glotesk

Presioni diastolik është kur ventrikuli i majtë është:

- A)i kontraktuar
- B)gjysëm i kontraktuar
- C)i relaksuar
- D)gjysëm i relaksuar

Pulsi i ndërprerë:

- A)ka një periudhë pulsi normal
- B)nuk ka një periudhë pulsi normal
- C)është një puls i çrregullt që ngadalësohet

D)është një puls i çrregullt që shpejtohet

Tek pulsi çift rrahja e dytë nga dy të rrahurat e rregullta është:

- A) më pak e fortë se rrahja e parë
- B) më e fortë se rrahja e parë
- C) nuk ndikohet nga rrahja e parë
- D) ndikohet nga rrahja e parë

Urina reziduale është:

- A) 1-2ml
- B) 1-3ml
- C) 1-4ml
- D) 1-5ml

Frymëmarrje normale tek femrat e rritura është:

- A) 14-18
- B) 16-20
- C) 20-22
- D) 20-40

Gjatë oksigjeno-terapisë O_2 jepet:

- A) në l/min
- B) në l/sek
- C) në l/orë
- D) në l/ditë

Marrja e oksigjenit nga kateteri nazal:

- A) lejon pacientin të ushqehet dhe të flasë lirshëm
- B) përdoret më shumë tek fëmijët e vegjël
- C) përdoret shpesh tek pacientët që marrin oksigjen në shtëpi
- D) mat distancën nga koanet e hundës deri tek lobi i veshit

-Ruajtja e ekuilibrit hidrik është një pjesë e sistemit të brendshëm hemostatik i cili nuk funksionon n.q.s:

- A) nga mos balancimi i ekuilibrit elektrolitik
- B) presionit osmotik
- C) ngrohjes trupore
- D) ekuilibri acido-bazik

Humbja e ujit me anë të djersës është:

- A) 100-150ml
- B) 200-300ml
- C) 350-400ml
- D) 450-500ml

Sa duhet të jenë marrjet ditore të lëngjeve:

- A) 100-1300ml

- B)1400-1500ml
- C)1500-2000ml
- D)2000-3000ml

Cila nga elementët e mëposhtëm është mikroelementë:

- A)uji
- B)proteinat
- C)yndyrnat
- D)vitaminat

Burimet ditore të ujit me anë të oksidimit metabolik janë:

- A)150-200
- B)200-300
- C)200-400
- D)300-400

Frutat,xhelatinë, kafe bëjnë pjesë tek:

- A)dietë terapeutike
- B)dietë e butë ushqimore
- C)dietë e lëngshme normale
- D)dietë hidrike

Gjej përgjigjen e gabuar përpara futjes së lëndëve ushqyese në tubin nazogastrik:

- A)boshatis stomakun me anë të shiringës
- B)futet tubi në hundë
- C>shto pak ujë pas futjes së ushqimit
- D)vendoset pacienti shtrirë djathtas

Kur temperatura trupore është e lartë humbja mesatare e ujit nëpërmjet urinës është:

- A)1000ml
- B)1200ml
- C)1400ml
- D)1600ml

Fosfatet janë:

- A)katione
- B)anione
- C)minerale
- D)elektrolite

Prodhimi i pakët i urinës quhet:

- A)nikturi
- B)dizuri
- C)anuri
- D)oliguri

Sa % të gjakut total zë plazma:

- A)55%
- B)50%
- C)40%
- D)35%

Neonati(porsalinduri 0-3muaj)fle:

- A)10-12orë në ditë
- B)12-14orë në ditë
- C)14-16orë në ditë
- D)16-20orë në ditë

INFIRMIERISTIK KIRURGJI 60 QUIZ

Termi hiperemi aktive është:

- A) ngjyra e lëkurës pas djegies së saj
- B) ngjyra normale e lëkurës
- C) ngjyra e lëkurës pas mjekimit
- D) ngjyra e lëkurës pas një traume

Hypotermia aksidentale është një gjendje ku personi ekspozohet

- A) në temperatura shumë të ulta
- B) në temperatura të ulta
- C) në situata aksidentale
- D) në temperatura të larta

Hypotermia urbane është :

- A) ekspozimi ekstrem ndaj të ftohtit në mjedise urbane
- B) ulja e temperaturës trupore nga kontakti me ujë të ftohtë
- C) ulja e temperaturës trupore nga patologji të ndryshme
- D) ulja e temperaturës trupore nga të ftohtit

Hemoragjia, quhet e ndërmjetme kur shfaqet

- A) gjatë operacionit
- B) pak orë pas operacionit
- C) pak ditë pas operacionit
- D) pas një traume të jashtëme

Hemoragjia, quhet primare kur shfaqet

- A) pak orë pas operacionit
- B) gjatë operacionit
- C) pak ditë pas operacionit
- D) pas një traume të jashtëme

Ndihma e pare në raste hemoragjie është:

- A) vendosja shtrirë e pacientit
- B) vendosja e bandazhit
- C) vendosja e akullit
- D) terapi medikamentoze

Donatori lejohet që të japi gjak pasi të kenë kaluar të paktën

- A) 45 ditë nga dhurimi i fundit
- B) 56 ditë nga dhurimi i fundit
- C) 65ditë nga dhurimi i fundit
- D) 75 ditë nga dhurimi i fundit

Sasia e gjakut që dhurohet është të paktën

- A) 350ml
- B) 450 ml
- C) 550ml
- D) 650ml

Pesha minimale trupore për një donator gjaku duhet të jetë:

- A) 40 kg
- B) 50 kg
- C) 60 kg
- D)70 kg

Mosha minimale për një donator gjaku duhet të jetë

- A) 15 vjeç
- B) 17 vjeç

C) 20 vjeç

D) 25 vjeç

Mosha maksimale për një donator gjaku duhet të jetë

A) 45 vjeç

B) 55 vjeç

C) 65 vjeç

D) 75 vjeç

0

Një person nuk lejohet të dhurojë gjak, në rast ekspozimi ndaj sëmundjeve infektive:

A) më pak së 3 javë

B) më pak së 6 javë

C) më pak së 8 javë

D) më pak së 10 javë

Itërnativa A

Pozicioni më i përshtatshëm për pacientët pas operacionit është :

A) pozicioni semi - Fowler

B) pozicioni Fowler

C) tredelenburg

D) gjinekologjik

Mjeku Reanimator është anëtar

- A) në grupin steril
- B) në grupin jo steril
- C) në grupin vezhgues
- D) në grupin qarkullues

Numërimi i veglave kirurgjikale para dhe pas operacionit kryhet nga

- A) infermiera qarkulluese
- B) infermiera instrumentare
- C) mjeku kirurg
- D) mjeku anesteziat

Temperatura e ambientit në sallën operatore duhet të jetë

- A) 10- 15 °C
- B) 15- 20 °C
- C) 20- 27 °C
- D) 27- 30 °C

Humiditeti në sallën operatore duhet të ruhet

- A) në një nivel 30%
- B) në një nivel 40%
- C) në një nivel 50%
- D) në një nivel 60%

Kthimi i refleksit gag pas operacionit tregon:

- A) mundësimin e fillimit të ushqimit normalisht
- B) vështërsi në gëlltitje të pacientit
- C) rikthim të peristaltikës
- D) vështërsi në frymëmarrje

Flebotomia konsiston në :

- A) venipunkturën dhe thithjen e gjakut
- B) dëmtimin e enës së gjakut
- C) venipunkturën dhe dhënien e gjakut
- D) aplikimin e infuzioneve

Kthimi i tonusit muskular të fshiksëz së urinës ndodh :

- A) 4-6 orë pas operacionit
- B) 6-8 orë pas operacionit
- C) 8-10 orë pas operacionit
- D) 10-12 orë pas operacionit

Rikthimi i peristaltikës së zorrëve ndodh mesatarisht

- A) 12 orë pas operacionit
- B) 24 orë pas operacionit
- C) 48 orë pas operacionit
- D) 72 orë pas operacionit

Administrimi i opiateve para operacionit ndihmojnë :

- A) në paksimin e sekrecioneve
- B) uljen e tonusit muskular
- C) reduktimin e ankthit dhe stresit
- D) tharjen e mukozave

Administrimi i anticholinërgic-ve para operacionit ndikojnë në :

- A) në paksimin e sekrecioneve
- B) reduktimin e ankthit dhe stresit
- C) uljen e tonusit muskular
- D) tharjen e mukozave

Asepsit kirurgjikale janë aktivitete që :

- A) minimizojnë përhapjen e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar
- B) eliminojnë nr. dhe përhapjen e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar
- C) pakësojnë numrin e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar
- D) pakësojnë përhapjen e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar

Asepsia është:

- A) eliminimi i të gjithë mikroorganizmave
- B) eliminimi i shumicës së mikroorganizmave
- C) pakësimi i të gjithë mikroorganizmave
- D) pakësimi i shumicës së mikroorganizmave

Dezifektimi është :

- A) eliminimi i shumicës së mikroorganizmave në sipërfaqe të një objekti
- B) pakësimi i shumicës së mikroorganizmave në sipërfaqe të një objekti
- C) pastrimi i sipërfaqes së një objekti
- D) dezifektimi i sipërfaqes së një objekti

Dekontaminimi është

- A) pakësimi i shumicës së mikroorganizmave në sipërfaqe të një objekti
- B) eliminimi i shumicës së mikroorganizmave në sipërfaqe të një objekti
- C) pastrimi i sipërfaqes së një objekti të caktuar
- D) dezinfektimi i objekteve të ndotura me materiale infektive

Instrumentat sterilizohen në autoklavë me një temperaturë prej:

- A) 90°C
- B) 100 °C
- C) 110 °C
- D) 121 °C

Paketimi me tre letra plus një të linjt zgjat :

- A) një muaj
- B) dy muaj
- C) tre muaj
- D) mbi tre muaj

Zierja për 20 minuta shkakton:

- A) pastrim

- B) sterilizim
- C) dekontaminim
- D) desifektim të nivelit të lartë

Përdorimi i klizmës pastruese është obligative të aplikohet para :

- A) të gjitha llojeve të operacioneve
- B) në operacionet që përfshijnë traktin gastro – intestinal
- C) në operacionet që përfshijnë traktin uro –genital
- D) nuk rekomandohet të aplikohet më para operacionit

Infermiera qarkulluese është pjesë e

- A) grupit steril
- B) grupit josteril
- C) grupit vëzhgues
- D) nuk është antare e bllokut operator

Ruajtja e sigurisë dhe integritetit të fushës sterile gjatë procedurës kirurgjikale është detyrë e :

- A) kirurgut primar
- B) anestezistit
- C) infermieres qarkulluese
- D) infermieres instrumentare

Në rastin e patologjive të Ca sigmorektal mund të jetë e indikuar

- A) ileostomia
- B) kolostomia
- C) jejunostomia
- D) gastrostomia

Cila nga alternativat e mëposhtme tregon për një procedurë diagnostikuese

- A) kolostomia
- B) ileostomia
- C) kolonoskopia
- D) jejunostomia

Dieta e pacientëve me gastrostomi duhet të jetë

- A) e lëngshme
- B) e fortë
- C) ushqim normal
- D) nuk ka kufizim në dietë

Pas operacioneve gastrike pacienti këshillohet të qëndroj në pozicionin

- A) Fowler
- B) Semi- Fowler
- C) Tredelenburg
- D) Gjinekologjik

Trajtimi më i suksesshëm për karcinomën gastrike të avancuar është:

- A) Kirurgjia
- B) Kimioterapia
- C) Radioterapia
- D) Kirurgjia e shoqëruar me kimio-radioterapi

Është procedurë diagnostikuese :

- A) qarkullimi ekstrakorporal
- B) koronarografia
- C) stenti
- D) koronaroskopia

Gjeni alternativën e saktë :

- A) gastrostomia është procedurë diagnostikuese
- B) gastrostomia kryhet vetëm me kirurgji
- C) gastrostomia është procedurë që shërben për ushqimin e pacientëve
- D) gastrostomia shërben për aspirimin e sekrecioneve gastrike

Kolonoskopia është procedurë diagnostikuese për:

- A) traktin urinar
- B) traktin hepato biliar
- C) traktin e sipërm gastrointestinal
- D) traktin e poshtëm intestinal

Plagët nga dekubituset janë plagë që shkaktohen:

- A) nga traumat e hapura
- B) nga armët e zjarrit
- C) nga aksidentet automobilistike
- D) nga qëndrimi në shtrat për një kohë të gjatë

Faktorët që ndikojnë për formimin e dekubituesëve janë të gjitha përveç:

- A) kequshqyerja
- B) higjiena e ulët
- C) gjendja emocionale

D) qëndrimi gjatë në shtrat

Në një retension urinar përdoret:

A) Kateteri Robinson

B) Kateteri Nichols

C) Kateteri Foley

D) Kateteri Moby- Dick

Gastrostomia është procedurë që ushqen pacientin nga:

A) ezofagu

B) stomaku

C) jejunum

D) kolon

Ndërrimi i pensamentëve të plagës operatore bëhet:

A) 10 - 15 orë pas operacionit

B) 16 - 24 orë pas operacionit

C) 36 - 48 orë pas operacionit

D) 52 - 72 orë pas operacionit

Trajtimi fillestar i plagës bëhet me:

- A) antibiotik
- B) kortizonik
- C) sol. fiziologjik
- D) betadinë

Çfarë është Litotripsia :

- A) thyerja e gurëve në vezikën urinare
- B) thyerja e gurëve në veshka
- C) thyerja e gurëve në uretër
- D) thyerja e gurëve në kolecist

Një plagë quhet e papastër kur:

- A) nuk ka rrjedhje të madhe nga organet viscerale
- B) kur ka pezmatim pa eksudat qelbëzues
- C) që nuk kanë shenja të pezmatimit
- D) nëse ka suporacion

Një plagë quhet e kontaminuar kur

- A) nuk ka rrjedhje të madhe nga organet viscerale
- B) kur ka pezmatim pa eksudat qelbëzues
- C) që nuk kanë shenja të pezmatimit
- D) nëse ka suporacion

Faktorët e rrezikut për infeksione spitalore të plagëve janë të gjitha përveç

- A) përkujdesja perioperative
- B) sterilizimi i pajisjeve
- C) gjendja e të sëmurit
- D) statusi emocional i të sëmurit

Irrigimi i plagës nënkupton:

- A) suturimi i plagës
- B) trajtimi me antibiotik
- C) lavazhi i plagës
- D) fashimi i plagës

Në djegien e shkallës së dytë përfshihet:

- A) shkatërrimi i shtresave të epidermës
- B) shkatërrimi i epidermës dhe shtresave të sipërme të dermës
- C) shkatërrim të indeve nënshtresore.
- D) shkatërrim total të epidermës dhe të dermës

Gjatë djegies pacienti ka humbje më të theksuar të :

- A) plazmës
- B) gjakut
- C) urinës
- D) djersës

Ku përdoret rregulli i 9-ës:

- A) në politrauma
- B) në ngririet trupore
- C) në djegiet trupore
- D) plagët me armë zjarri

Ileusi adinamik zakonisht ndodh:

- A) 1 ditë pas operacionit
- B) 2 - 3 ditë pas operacionit
- C) 4 - 6 ditë pas operacionit

D) 6 - 8 ditë pas operacionit

Ileusi adinamik:

A)Ka një prognozë të varfër

B)Në përgjithësi ka prognozë të mirë

C)Trajtimi është gjithmonë kirurgjikal

D) Është shkaku më i rrallë i obstrukcionit intestinal

Për të parandaluar ulçerën stazike venoze duhet te:

A)Ndërpritet aktiviteti fizik

B)Ekspozohet zona e prekur në temperatura të ftohta

C)Pozicionohen ekstremitetet më poshtë se niveli i zemrës

D)Të kontrollohen pulset periferike dhe temperatura e ekstremiteteve.

Faktor që nuk ndikon në kalkulozën e aparatit urinar është:

A)Staza urinare

B)Infeksioni i traktit urinar

C)Staza venoze

D)Dehidrimi

Për të mbajtur bilancin elektrolitik, nuk është vlerësim specifik:

A)Niveli i elektroliteve

B)Marrjet dhe nxjerrjet e likideve

C)Turgori i lëkurës

D)Niveli i gazeve në gjak

INFERMIERISTIK INFEKTIV 30 QUIZ

Personat e infektuar dhe që janë alkoolike kanë tendencë të dobësimit funksional të

A) aparatit kardiak

B) urinar

C) lokomotor

D) olfaktor

Shoku septik fillon me të gjitha shenjat e mëposhtme përveç:

A) ethe

B) stres

C) temperaturë të lartë

D) hypotension

Infeksioni nozokomial nuk merret me :

A) me vendosjen e kateterit Foley

B) kanjulave IV

C) sondës nazogastrike

D) komunikim të drejtëpërdrejt me pacientin

Organizmi shkaktar për gjendjen e sepsit të rëndë nuk mund të jetë:

A) Escherichia coli

B) klebsiella

C) stafilococcus aureus

D) virusi

Menaxhimi i Shoku-t Septik bëhet:

- A) me dhënien e antibiotikëve
- B) likideve
- C) oksigjenit
- D) të gjitha

Sa duhet të jetë diureza që të themi se funksioni renal vjen duke u përmirësuar:

- A) 20 ml/ore
- B) 25 ml/ore
- C) 30 ml/ore
- D) 40 ml/ore

Efektin e vetë dëmtues virusi i SIDA-s e ka mbi:

- A) limfocitet A
- B) limfocitet C
- C) limfocitet T
- D) limfocitet E

Cili është streptokoku më i hasur tek njerëzit:

- A) streptokoku hemolitik i grupit E
- B) streptokoku hemolitik i grupit C
- C) streptokoku hemolitik i grupit D
- D) streptokoku hemolitik i grupit A

Mononukleozë Infektive shkaktohet nga :

- A) neisseria gonorea
- B) clostridium botulinum
- C) virusi Epstein-Barr
- D) Plasmodium

Patogenët infeksioz kualifikohen si sëmundje ngjitëse për shkak të:

- A) aftësisë që sjell termi i infektueshëm
- B) aftësisë së infektueshmërisë
- C) transmetimit të mundshëm nga një person te tjetri
- D) asnjë nga të mësipërmet

Transmetimi i sëmundjes infektive nga një vektor mekanik vjen nga:

- A) mizat
- B) mushkonjat
- C) karkalecat

D) gjinkallat

Transmetimi i sëmundjes infektive nga një vektor organik vjen nga:

A) mizat

B) mushkonjat

C) karkalecat

D) gjinkallat

Në mbikqyrjen e infeksioneve spitalore të plageve deri në:

A) 70% të infeksioneve mund të shfaqen para hospitalizimit

B) 70% të infeksioneve mund të shfaqen gjatë hospitalizimit

C) 70% të infeksioneve mund të shfaqen pas daljes nga spitali

D) nuk egziston ndonjë e dhënë e saktë

Shkalla e prevalencës është raporti :

A) nr.total i të sëmurëve me sëmundje infektive / nr. i pacientëve në total

B) nr. i pacientëve në total / nr.total i të sëmurëve me sëmundje infektive

C) nr. i pacientëve në spital në krahasim me popullatën

D) nr. i pacientëve në infektiv / me nr. e pacientëve në spital

Incidenca e infeksionit për plagët operatore të pastra duhet të jetë:

- A) nën 5%
- B) nën 7 %
- C) nën 10 %
- D) nën 15 %

Incidenca e infeksionit për plagët operatore të papastra mund të jetë:

- A) deri 10%
- B) deri 20%
- C) deri 25 %
- D) deri 30 %

Kateterët venoze periferik rekomandohen të ndërrohen :

- A) Pas çdo 12-24 orë pas përdorimit
- B) Pas çdo 24 – 48 orë pas përdorimit
- C) Pas çdo 48 – 72 orë pas përdorimit
- D) Pas çdo 72 – 96 orë pas përdorimit

Shkaktari më i shpeshtë i infeksioneve spitalore është :

- A) E. Coli

- B) Candidas
- C) Spiroketa
- D) Streptokoku

Shenja Kernig's është karakteristikë e

- A) salmonelozes
- B) meningokokut
- C) stafilokokut
- D) botulizmit

Periudha e inkubacionit të mononukleozës infektive varion :

- A) 10- 20 ditë
- B) 20- 30 ditë
- C) 30- 50 ditë
- D) 40- 60 ditë

Triada ethe – dhimbje fyti- zmadhim i nodjve limfatik cervical është karakteristik e:

- A) tetanozit
- B) meningokoksisë
- C) mononukleozes infektive
- D) stafilokoksisë

Forma më e shpeshtë e salmonelozës është :

- A) ethet tifoide
- B) forma gastrointestinale
- C) bakteremia me ose pa infeksion
- D) mbartia asimptomatike

Sëmundja e “papastërtisë” mund të quhet

- A) salmonelozë
- B) amebiazë
- C) ethet tifoide
- D) shigelozë

Shoku septik shfaqet nga :

- A) gram pozitivet
- B) gram negativet
- C) mundet nga të dy
- D) myku

Infeksionet Nosokomiale ndryshe quhen:

- A) infeksionet komune
- B) infeksionet ambjentale
- C) infeksionet spitalore
- D) infeksionet shtëpiake

Agjenti shkaktar në një infektion mund të jetë:

- A) virus
- B) protozoar
- C) bakter
- D) apo të gjithë

Nuk bejnë pjesë në grupin e përhapjes së infeksionëve nga vektorët:

- A) njerëzit
- B) minjtë
- C) mizat
- D) mushkonjat

Faktorët e rrezikut për infeksione spitalore të plagëve janë të gjitha përveç:

- A) përkujdesja perioperative
- B) sterilizimi i pajisjeve
- C) gjendja e të sëmurit
- D) statusi emocional i të sëmurit

Hepatiti viral është ndryshe:

- A) hepatiti A
- B) hepatiti B
- C) hepatiti C
- D) hepatiti D

Vaksina profilaktike për hepatitin B aplikohet në :

- A) një dozë
- B) dy doza
- C) tre doza
- D) katër doza

INFIRMIERISTIK ANESTEZI 30 QUIZ

Cili është qëllimi kryesor i vlerësimit infermieror preoperator?

- A) Të reduktojë morbiditetin dhe mortalitetin perioperator
- B) Të merren të dhëna për sëmundjen kirurgjikale
- C) Të hartohet një strategji menaxhimi
- D) Të hartohet një plan anestetik

Sa orë para duhet të ushqehen neonatët dhe fëmijët para kirurgjisë?

- A) 2 orë para kirurgjisë
- B) 30 minuta para kirurgjisë
- C) 6 orë para kirurgjisë
- D) 4 orë para kirurgjisë

Bronkospazma mund të shkaktojë:

- A) Qëndrueshmëri hemodinamike
- B) Hiperventilim postoperator

- C) Insuficiencë renale
- D) Hipoventilim dhe hipoksemi

Insuficienca respiratore në kirurgjine abdominale ndodh nga:

- A) Depresion i qendrës respiratore pas anestezisë
- B) Distensioni abdominal
- C) Dhimbja abdominale
- D) Të gjitha shkaqet e mësipërme

Cili është standarti bazë për të vlerësuar shkëmbimin e gazeve në pulmone?

- A) Presioni arterial i dioksidit të karbonit
- B) Presioni arterial i oksigjenit
- C) PH dhe gazet e gjakut arterial
- D) Niveli i oksihemoglobinës

Vlera e saktë e presionit arterial të oksigjenit është:

- A) 50-70 mmHg
- B) 90-100 mmHg
- C) 100-120 mmHg
- D) 30-40 mmHg

Shoku hipovolemik shkaktohet nga humbja e:

- A) 20-25% të masës qarkulluese të gjakut
- B) 5-10% të masës qarkulluese të gjakut
- C) 2-3% të masës qarkulluese të gjakut
- D) 1-5% të masës qarkulluese të gjakut

Në shokun hipovolemik kemi:

- A) Hipertension
- B) Lëkurë të zbehtë dhe të ftohtë
- C) Puls i ngadaltë
- D) Diurezë të shtuar

Interventet infermierore në rastin e shokut fillojnë me:

- A) Rivendosjen e funksionit kardiak

- B) Reduktimin e ankthit
- C) Përmirësimi i oksigjenimit
- D) Rivendosjen e bilancit elektrolitik

Likidet intravenoze zëvendësuese janë:

- A) Jo toksike
- B) Nuk japin reaksione
- C) Janë të eliminueshëm nga organizmi
- D) Asnjë likid nuk i plotëson këto kërkesa

Pas ingestionit të substancave korrozive është kundërindikuar:

- A) Shplarja me likide menjëherë pas ingestionit
- B) Lavazhi gastrik
- C) Hollimi i substancës korrozive
- D) Sigurimi i rrugëve respiratore

Në helmimet ingestive me helme, kur pacienti nuk është koshient së pari aplikojmë:

- A) Lavazhin me sondë orogastrike
- B) Aspirimin gastrik
- C) Vendosja e tubit endotrakeal për të mbrojtur rrugët respiratore

D) Provokimin e të vjellave

Në helmimet me substanca fortësisht acide ose bazike kundraindikohen:

A)Inserimi i sondës nazogastrike me shumë kujdes

B)Radiografia

C)Provokimi i të vjellave

D)Përdorimi i qumështit në raste të veçanta

Veprimi i parë infermieror në rastin e reaksionit akut hemolitik është:

A)Administrimi i kortikosteroideve

B)Trajtimi i hipotensionit me likide dhe vazopresorë

C) Dërgimi i një mostre gjaku në bankën e gjakut

D)Ndërprerja e menjëhershme e transfuzionit

Simptomat më specifike të reaksionit anafilaktik mund të jenë:

A)Temperaturë

B)Urtikarje, edema,marrje mendsh,dispne

C)Hipotension

D)Hemoragji e pashpjegueshme

Dhimbja e patrajtuar shkakton:

- A) Rritjen e kërkesave për oksigjen
- B) Ulje të pulsit
- C) Ulje të presionit arterial
- D) Reduktim të ideve suicidale

Shoku anafilaktik nuk paraqitet me:

- A) Bronkospazëm
- B) Ulje të sekrecioneve gastrike
- C) Hipovolemi
- D) Rritje të peristaltikës intestinale

Vlerat e presionit venoz central janë:

- A) Shumë të ulëta në shokun hipovolemik
- B) Shumë të ulëta në shokun septik
- C) Normale në shokun kardiogjen
- D) Shumë të larta në shokun hemoragjik

Shoku është një sindrom i:

- A)Hipertensionit dhe perfuzionit relativisht të lartë indor
- B)Presionit arterial të lartë
- C)Hipotensionit dhe perfuzionit të ulët indor
- D)Rritjes së masës qarkulluese

Rastet kur nuk indikohet intubimi endotrakeal:

- A)Ventilim i papërshtatshëm
- B)Obstruksion i rrugëve respiratore
- C)Saturimi i oksigjenit është mbi 90%
- D)Insuficienca respiratore

Intubimi endotrakeal nuk konsiderohet i vështirë nëse:

- A)Qafa është e shkurtër dhe e trashë
- B)Nuk ka trauma në rrugët e sipërme respiratore
- C)Trakea e zhvendosur nga vija e mesit
- D)Edema është prezente

Rastet kur nuk duhet të kryhet intubimi endotrakeal:

- A) Mekanizmat respiratore të pacientit të pamjaftueshëm
- B) Hapja e rrugëve respiratore të obstruktuar
- C) Në një rast intoksikacioni të rëndë
- D) Për të lehtësuar aspirimin

Halotani është lëndë anestetike e cila përdoret:

- A) Vetëm tek fëmijët
- B) Vetëm tek të rriturit
- C) Tek fëmijët dhe të rriturit
- D) Duke mos u përzier me oksigjenin

Obeziteti nuk favorizon komplikacione postoperative të tilla si :

- A) Infeksion
- B) Dehishencë të suturave
- C) Obstruksion të rrugëve respiratore
- D) Psikozën postoperative

Të dhënat për sistemin respirator në kujdesin intensiv, duhet të vlerësohen dhe dokumentohen:

- A) Çdo 1 orë
- B) Çdo 15 minuta

C)Çdo 5 minuta

D)Çdo 2 orë

Obstruksioni respirator nuk manifestohet me:

A)Cianozë

B)Apne

C) Nivele normale të gazeve në gjakun arterial

D) Përdorim të muskujve aksesorë

Në rastin e ventilimit jo të përshtatshëm kemi:

A)Ulje të presionit të dioksidit të karbonit

B)Ulje të PH të gjakut (acidozë respiratore)

C)Rritje të PH sistemik

D)Funksion të ruajtur të miokardit

Stafi infermieror para interventit kirurgjikal nuk mund të përcaktojë:

A)Diagnozën, lidhur me ankthin preoperator

B)Diagnozën ,lidhur me nivelin e dhimbjes

C)Llojin e anesteziës që do të aplikohet

D)Komplikacionet potenciale në periudhën postoperatore

Anestezia gjenerale mund të realizohet:

A)Vetëm duke administruar lëndë anestetike inhalatore

B) Duke kombinuar lëndët anestetike inhalatore, I/Venoze dhe oksigjen

C)Nëpërmjet lëndëve anestetike I/Venoze

D) Duke administruar lëndë anestetike S/Kutane

Për të mbajtur një ventilim normal duhet të:

A)Të aspirohet vazhdimisht në trake

B)Mos ndryshohet pozicioni i pacientit

C)Të hiqen drenat pas 7-8 ditësh

D)Administrohet oksigjen jo i lagështuar

1. Cila pyetje bën pjesë në anamnezën obstetrikale?

A) Keni kryer ndonjë abort?

B) Keni përdorur kontraceptivë?

C) Kur ka ndodhur menarka juaj?

D) Sa i gjatë është fluksi juaj menstrual?

2. Kur gruaja shtatzanë paraqitet për herë të parë në klinikë mamia/mjeku i drejton disa pyetje. Pyetja, nëse ka alergji nga medikamentet ose ka alergji të tjera, në cilën anamnezë bën pjesë?
- Medikale
 - Medikale familjare
 - Medikale të shkuar
 - Obstetrikale
3. Kur gruaja shtatzanë paraqitet për herë të parë në klinikë mamia/mjeku i drejton disa pyetje. Anamneza për hepatit bën pjesë në?
- Anamnezën medikale
 - Anamnezën medikale familjare
 - Anamnezën medikale të shkuar
 - Anamnezën obstetrikale
4. Cila nga pyetjet e mëposhtme bën pjesë në anamnezën obstetrikale?
- Keni kaluar infeksione seksualisht të transmetueshme?
 - Keni kryer ndonjë intervent që i perket traktit riprodhues?
 - Kur e keni bërë Pap - Testin e fundit dhe rezultati i tij?
 - Sa është numri i lindjeve dhe fëmijëve të jetueshëm?
5. Cila nga alternativat bën pjesë në anamnezën gjinekologjike?
- Hystori për dysmenorrhea
 - Infeksione gjatë periudhes së post partumit
 - Probleme të post partumit hemoragjik
 - Rezultatet e testeve të barrës, nëse janë kryer
5. Cila nga alternativat përfshihet në anamnezën obstetrikale?
- Cila ka qënë mënyra e lindjes?
 - Kur ka ndodhur kojtusi i parë?
 - Kë Metodë kontraceptive ke përdorur?
 - Sa është numri i partnereve seksual?
6. Konjugata diagonale është distanca midis :
- Buzës së sipërme të simfizës pubike & promontoriumit
 - Dy tuberoziteteve iskiadike
 - Pjesës së pasme të simfizës pubike & promontoriumit
 - Promontoriumit sacral & buzës së poshtme të simfizës pubike
7. Konjugata e vërtetë është distanca midis :
- Buzës së sipërme të simfizës pubike & promontoriumit
 - Dy tuberoziteteve iskiadike

- C) Promontoriumit sacral & buzës së poshtme të simfizës pubike
- D) Pjesës së pasme të simfizës pubike & promontoriumit

8. Pjesa e pelvisit e cila është më shumë e përfshirë me lindjen është:

- A) Koksiksi
- B) Pelvisi falls
- C) Pelvisi i vërtetë
- D) Sakrumi

9. Informacioni i siguruar nga metodat e Leopoldit përfshin:

- A) Paraqitjen fetale
- B) Rritjen dhe zhvillimin fetal
- C) Vlersimin e toneve fetale
- D) Vlersimin e tonusit maternal

10. Metodat e Leopoldit kryesisht janë përdorur për të:

- A) Për të hequr presurën nga kordoni umbilikal
- B) Përcaktuar nëse vezika është e distenduar
- C) Sygjëruar vendin e monitorimit external të kontraksioneve uterine
- D) Vlersuar prezentacionin dhe zbritjen

11. Një grua 4 javëshe shtatzanë i kërkon mamisë se kur ajo është në gjendje të dëgjojë RZF- të e fëmijës së saj. Mami i thotë asaj se me stetoskop ultrasonografik special apo fetoson i cili i amplifikon (i zmadhon) tonet, R.Z.F. mund të dëgjohen afërsisht pas:

- A) 2 – 4 javësh
- B) 6 – 8 javësh
- C) 10 – 12 javësh
- D) 14- 16 javësh

12. Pamundësia për të dëgjuar RZF me stetoskop të zakonshëm obstetrikal është kur kemi:

- A) Anomali fetale
- B) Moshë barre 28 javë
- C) Multifetal
- D) Obezitet amtar

13. Sa shpejt arrin të përcaktojë barrën, ekografia me sondë vaginale:

- A) 6 javç
- B) 4 javç

- C) Afersisht 10 javë
- D) Pas 10 ditësh

14. Xheni di që një shënjë pozitive e barrës është:
- A) Kontraksionet e Braxton Hickit
 - B) Lëvizjet fetale të cilat preken nga infer- mamia
 - C) Ndjesia e të lëvizurit
 - D) Testi pozitiv i barrës

15. Si shenjë positive e barrës përfshihet:
- A) Amenorrhea
 - B) Lëvizjet fetale që ndihen nga nëna
 - C) Rritja abdominale
 - D) Sonographya

16. Një shenjë supozuese e shtatzanisë është:
- A) Kontraksionet e Braxton- Hicks
 - B) Ndërprerja e menseve
 - C) Shenja e hegarit
 - D) Zhurmat uterine

17. Shenja Mc Donald ka të bëjë me:
- A) Diskolorimin
 - B) Perkuljen e trupit mbi qafë
 - C) Zbutjen e istmusit
 - D) Zbutjen e qafes

18. Shenja Goodell është:
- A) Diskolorim (cerviksit, mukozës së vaginës & vulvës)
 - B) Përkulja e trupit të uterusit mbi cerviks
 - C) Zbutja e cerviksit
 - D) Zbutja e istmusit

19. Në ekzaminimin fizik, mamia vë re se cervixi i gruas është në ngjyrë të kaltër. Kjo është:
- A) Shënja Cheduk
 - B) Shënja Goodell
 - C) Shënjë e Hegarit
 - D) Shënjë Mc Donald

20. Cila nga pikat e mëposhtme nuk bën pjesë në ndryshimet e lëkurës gjatë shtatzanisë:
- A) Kloasoma gravidarum
 - B) Linea nigra

- C) Shenja e Hegarit
- D) Striae gravidarum

21. Mamia i spjeron gruas se gjatë shtatzanisë sëmundja e mëngjesit (nausea & të vjellat) zakonisht takohet në :

- A) Gjashte javët e para
- B) Në 6 j – 12 j
- C) Në 8j – 16j
- D) Në muajin e pare
- E) Në muajin e katërt

22. Cila nga pikat e mëposhtme nuk ndikon në lartësinë e fundusit uterin:

- A) Barra binjake
- B) Hydramnioni
- C) Qëndrimi fetal
- D) Tonusi muskular

23. Levizjet aktive fetale fillimisht perceptohen:

- A) Dymbëdhjetë javë
- B) Mes muajit të gjashte dhe të shtatë
- C) Në muajin e trete të barres
- D) Para se të perfundojë muaji i katërt

24. Znj x është 3 muajshe me barrë. Në vizitën e saj prenatale, ajo i thotë mamisë se nuk e kupton se çfarë po i ndodh; një minut ajo është e lumtur që është shtatzanë dhe minutin tjetër ajo qan pa arsye. Cila prej përgjigjeve të më poshtme të dhënë nga mamia është më e përshtatshme?

- A) Është e zakonshme të kesh ndryshime të shpejta emocionale gjatë shtatzanisë
- B) Ju keni biseduar me partnerin tuaj rreth këtij problemi?
- C) Ju vertetë nuk e dëshironi këtë shtatzani?
- D) Mos u shqetëso ju do të ndjeheni më mirë brenda muajit

25. Klientja juaj është në javën e 39 të shtatzanisë. Ajo vë re që është e friksuar rreth lindjes. Përgjigja juaj do të jetë:

- A) Është normale të jeni anksioze. Dëshironi të diskutojmë më tepër rreth saj?
- B) Ju mund të keni lindje me epidurale, e si rrjedhojë ju nuk do të ndjeni asgjë.
- C) Mos u shqetëso rreth lindjes, pasi ju do të jeni shumë mirë
- D) Rreth një experience e cila nuk është aktuale, është e frikshme për ta menduar

26. Kujdesi prenatal është ideale të fillojë:

- A) Pas mundesës së tretë të menseve
- B) Pas mungesës së dytë të menseve
- C) Pas mungesës së parë të menseve

D) Përpara mungesës parë të menseve

27. Në 16 javë niveli i fundusit uterin është:

- A) $\frac{1}{3}$ e poshtme qe bashkon umbilikusin me procesin ksifoid
- B) $\frac{1}{2}$ e vijës që bashkon simphizën pubike me umbilikusin
- C) $\frac{2}{3}$ e vijës që bashkon umbilikusin me procesin ksifoid
- D) Një gisht nën umbilicus

28. Në 24 javë niveli i fundusit uteri është:

- A) $\frac{1}{3}$ e poshtme qe bashkon umbilikusin me procesin ksifoid
- B) $\frac{1}{3}$ e poshtme qe bashkon umbilikusin me procesin ksifoid
- C) 1 – 2 gisht mbi umbilicus
- D) 3 – 4 gisht nën procesin ksifoid

29. Znj. X është 14 j shtatzane. Infer – mamia shpreson të palpojë fundusin në cilin nga nivelet e mëposhtme.

- A) Në nivelin e umbilikusit
- B) Nuk palpohehet mbi simphyzen pubike
- C) Pak mbi symphyzën pubike
- D) Pak mbi umbilicus

30. Tremestri i dytë i shtatzanisë gjatë cilave javë ndodh?

- A) 10 - 22
- B) 12 - 24
- C) 14 – 26
- D) 16 – 28

31. Tremestri i tretë i shtatzanisë fillon nga java e:

- A) 23
- B) 25
- C) 27
- D) 29

32. Znj. E. është në javën e 23 të shtatzanisë. Ajo është informuar se shenjë alarmi në shtatzani është

- A) Palpitacioni kardiak
- B) Rritja e oreksit
- C) Ulja e lëvizjeve fetale
- D) Ulja e presionit të gjakut

33. Cila nga symptomat e mëposhtme konsiderohet si shenjë paralajmëruese e një problem potencial dhe gruaja shtatzanë duhet të raportojë menjëherë personelin e kujdesit shëndetsor.
- A) Gjakrrjedhje vaginale
 - B) Lodhje
 - C) Nausea
 - D) Shtim i frekuencës urinare
34. Kultura për gonorrhea në shtatzani përfshihet si një nga testet rutinë e cila rekomandohet të bëhet në:
- A) Çdo fillim muaji gjatë shtatzanisë,
 - B) Fillim të vizitës së parë prenatale
 - C) Përfundim të muajit të fundit të shtatzanisë
 - D) Vizitën e parë prenatale dhe përsëritet në 36 javë
35. Ç' ndryshim mund të shkaktojë pozicioni lithotomik, në presionin e gjakut tek gruaja shtatzanë
- A) Asgjë e veçantë nuk vihet re
 - B) E rrit presionin e gjakut
 - C) E ulë presionin e gjakut
 - D) Rrit dhe ul, varet nga linja bazë e presionit të gjakut
36. Kur shtatzana paraqet probleme të uthit (pyrosis) me djegie e kthim të sasive të vogla të lëngjeve me shije të thartë ajo duhet të konsumojë :
- A) Pije me gaz
 - B) Qumësht
 - C) Ushqime të yndyrshme
 - D) Vakte të mëdha
37. Në vizitat e rradhës në shtatzaninë e pakomplikuuar zakonisht nuk përfshihet:
- A) Dëgjimin e RZF-ve
 - B) Ekzaminimin pelvik
 - C) Manovrat e Leopoldit
 - D) Matjet e lartësisë së fundusit
38. Puna gjatë shtatzanisë:
- A) Duhet të reduktohet në tremestrin e tretë
 - B) Nuk ka probleme në barrën normale
 - C) Rrit rrezikun e problemeve në barrë
 - D) Ul rrezikun e problemeve në barrë
39. Mamia instruktoren gruan të zbatojë ushtrimet e Kegelit, pasi ato:

- A) Forcojnë dyshtemenë pelvike
- B) Ndihmojnë në zbritjen e fetusit
- C) Ndihmojnë në zbutjen e columit
- D) Përshpejtojnë aktin e lindjes

40. Pozicioni që ju i rekomandoni gruas shtatzanë për t'u çlodhur ose fjetur është:

- A) Anash
- B) Gjysëm ndenjur.
- C) Në shpinë
- D) Permbys

41. Dita e parë e zakoneve të fundit të gruas ka qënë 3 Maj 2011, duke përdorur rregullën e Negelit kësaj gruaje i takon të lindë:

- A) 10 shkurt 2012
- B) 10 mars 2012
- C) 31 qershor 2012
- D) 06 korrik 2012

42. Një grua shtatzanë ditën e parë të menseve të fundit i pati më 8 prill 2011 dhe ditën e fundit më 13 prill. Duke përdorur rregullën e Negelit dita e lindjes vlersohet se mund të jetë

- A) 5 nëntor 2011
- B) 15 janar 2012
- C) 20 janar 2012
- D) 15 korrik 2012

43. Znj X. ju tregon që cikli i fundit menstrual ishte më 1 Tetor 2011. Sipas rregullës së Negelit, që ju dini lindja do të jetë më:

- A) 1 korrik 2011
- B) 8 gusht 2011
- C) 1 gusht 2011
- D) 8 korrik 2012

44. Cila nga vaksinat e mëposhtme mund të administrohet gjatë shtatzanisë:

- A) Parotitit
- B) Poliometilitit
- C) Rabies
- D) Varicelës

45. Cila nga vaksinat e mëposhtme nuk duhet të administrohen gjatë shtatzanisë:

- A) Difteria
- B) Hepatiti b
- C) Parotiti
- D) Rabies

46. Cila nga vaksinat e mëposhtme nuk duhet të administrohen gjatë shtatzanisë:
- A) Fruthi
 - B) Hepatiti b
 - C) Rabies
 - D) Tetanozi
47. Cila nga vaksinat e mëposhtme mund të administrohet gjatë shtatzanisë:
- A) Difteria
 - B) Fruthi
 - C) Parotiti
 - D) Rubeola
48. Ndërlidhja e pjesëve trupore fetale me njëri – tjetrin është quajtur:
- A) Pozicion fetal
 - B) prezentacion fetal
 - C) Qëndrim fetal
 - D) Shtrirje fetale
49. Ndërlidhja apo raporti i aksit gjatsor të nënës me aksin gjatësor të fetusit është quajtur
- A) Pozicion fetal
 - B) Prezentacion fetal
 - C) Qëndrim fetal
 - D) Shtrirje fetale
50. Infermierja e cila kryen ekzaminim vaginal për të vlersuar progresin e aktivitetit të lindjes duhet:
- A) Diskutojç konkluzionet (gjetjeve) me gruan dhe partnerin e saj
 - B) Kryej një ekzaminim të paktën njëherë në çdo orë gjatë fazës aktive të aktivitetit të lindjes
 - C) Kryerj ekzaminime shumë frekvente, nëse hemoragjia është prezente
 - D) Veshja e dy dorezave për çdo ekzaminim të kryer
51. Për të përcaktuar frekuencën e kontraksioneve uterine mamia do të vlersojë kohën nga
- A) Fillimi i një kontraksioni deri në fund të kontraksioni tjetër
 - B) Fundi i një kontraksioni deri në fund të kontraksionit tjetër
 - C) Shpërthimi i kontraksionit deri në fund
 - D) Shpërthimi i një kontraksioni deri në shpërthimin e kontraksionit tjetër
52. Kur një grua vlersohet në stadin e parë të lindjes, infermierija arsyeton që shënja vendimtare që jep kontraksione uterine efektive duhet të jetë:
- A) Dilatacioni i cerviksit

- B) Ruptura e membranave amniotike
- C) Shfaqja e një sasive hemorragjike
- D) Zbritja e fetusit

53. Mami i mëson gruas shtatzanë rreth karakteristikave të kontraksioneve të aktivitetit të vërtetë. Mami vlerëson të arsyetuarit e gruas nëpërmjet instruksionit kur gruaja “do të përjetojë kontraksione të aktivitetit të vërtetë”
- A) Ato shkaktojnë diskomfort në pjesën e sipërme të uterusit tim
 - B) Kontraksionet uterine do të bien kur unë do të ecë
 - C) Vazhdojnë të jenë të çrregullta, por bëhen të forta.
 - D) Vazhdojnë të jenë të forta edhe nëse unë relaxohem e bëj një dush

54. Gjatë fazës aktive të aktivitetit të lindjes cerviksi dilatohet nga:
- A) 1 deri në 4cm
 - B) 3 deri në 4cm
 - C) 4 deri në 8cm
 - D) 8 deri në 10cm

55. Mami mendon se gruaja është në fazën e tranzicionit kur gjatë vizitës vaginale vë re se cerviksi i gruas është dilatuar
- A) 1 deri në 3cm
 - B) 2 deri në 6cm
 - C) 3 deri në 8cm
 - D) 8 deri në 10cm

56. Cila nga pikat e mëposhme nuk bën pjesë në nënfazat e stadi të parë të aktivitetit të lindjes:
- A) Faza aktive
 - B) Faza e expulsionit
 - C) Faza e tranzicionit
 - D) Faza latente

57. Cila fazë e aktivitetit të lindjes është më e gjatë?
- A) Dytë
 - B) Katërt
 - C) Parë
 - D) Tretë

58. Faza e dytë e lindjes nis me:
- A) 1 – 2 orët e para pas daljes së placentës
 - B) Dilatacionin komplet dhe përfundon me lindjen e infantit
 - C) Fillimin e hapjes dhe zbutjes së cerviksit
 - D) Lindjen e infantit dhe përfundon me lindjen e placentës

59. Faza e tretë e lindjes nis me
- 1-2 orët e para pas lindjes
 - Dilatacionin komplet
 - Lindjen e infantit
 - Me përfundimin e fazës aktive
60. Kur një grua nulipara telefonon spitalin, për të raportuar që është me aktivitet lindje, mamia duhet fillimisht:
- T'i kërkojë gruas të përshkruaj, pse ajo mendon që është në aktivitet?
 - T'i tërheq vëmendjen që konsumi i ushqimeve dhe lëngjeve duhet stopuar
 - T'i thotë gruas të qëndrojë në shtëpi derisa të rupturohen membranat
 - Të vendosë, që gruaja të vijë në klinikë për të vlersuar aktivitetin e lindjes
61. Mamia di që faza e parë e lindjes është :
- Dalja e plaçentës
 - Dilatacioni
 - Expulsioni
 - Rikuperimi i gruas
62. Në njësinë e paralindjes mamia po ndjek një grua primigravida. Ajo do ta lejojë gruan të shterzohë kur dilatacioni i qafës së mitrës të jetë:
- 10cm
 - 5 cm
 - 7cm
 - 8cm
63. Pjesa paraqitëse fetale përshkruhet me vertex kur:
- Fytyra futet e para në pelvis
 - Koka e flexuar futet e para në pelvis
 - Shrirja fetale është longitudinale
 - Të ndenjurat me këmbët përvijohen gjatë abdomenit
64. Një grua multipare ka një aktivitet lindje prej 8 orësh. Membranat e saj sapo u rupturuan. Reagimi i menjëhershëm i mamisë do të jetë:
- Dokumentimi i karakteristikave të likidit
 - Informojë gruan se primare është sigurimi i shëndetit të saj
 - Të përgatisë gruan menjëherë për lindje
 - Vlersimi i toneve fetale
65. Një gruaje shtatzanç me aktivitet lindje i rupturohen membranat amniotike. Veprimi i menjëhershëm i mamisë do të jetë:
- Inspektimi i karakteristikave të likidit
 - Kryerja e ekzaminimit vaginal

- C) Vlersimi i RZF-ve
- D) Vlersimi maternal i T°, P, R dhe TA.

66. Infermieria shoqëron expulsionin e placentës duke administruar oxytocinë për:

- A) Lehtësimin e dhimbjeve
- B) Lehtësuar qëndrimin dhe relaximin
- C) Prevenimin e infeksionit
- D) Stimulimin e kontraksioneve

67. Cilat nga pikat e mëposhtme nuk i tregojnë mamisq shkollitjen e placentës?

- A) Kontraksionet uterine
- B) Ndryshime të TA dhe pulsit
- C) Ndryshimi i formës së uterusit
- D) Shtim i një sasive hemoragjie

68. Fokusi primar i kujdesjeve infermierore në stadin e katër të lindjes duhet të jetë

- A) lehtësimi bashkëveprimit i sapolindur- prindër
- B) Prevenimi i infeksionit
- C) Prevenimi i hemoragjisë dhe shokut
- D) Rrijtja e komfortit maternal

69. Gjatë palpimit për të përcaktuar fundusin uterin tek një e sapo lindur, ju vini re se fundusi i saj është i fortë dhe tre gishtë gjëresë mbi umbelikus dhe i devijuar. Ju duhet të:

- A) Kontrolloni për shtim të lohjeve
- B) Masazhoni uterusin e fortë
- C) Matësh presionin arterial
- D) Palposhi për vezikë urinare të distenduar

70. Pritshmëria e mamisë lidhur me involucionin normal uterin në periudhën post partumit do të ishte, zbritja e uterusit :

- A) 1 cm në ditë
- B) 1 cm në dy ditë
- C) 1 cm në tre ditë
- D) 1 cm në javë

71. Zonja X lindi një djalë të shëndetshëm 5 ditë përpara. Çfarë tipi të lohjeve ju shpresoni të shikoni kur ju do të bëni vlersimin e saj.

- A) Lochia serosa
- B) Lochie alba
- C) Lochie nigra
- D) Lochie rubra (te kuqe)

72. Gruaja ju kërkon juve se “vendi i butë” në kokën e djalit të saj, pas sa kohësh do të largohet? Përgjigja juaj është e bazuar në njohuritë tuaja që fantanela anteriore mbyllet në muajin _____ pas lindjes.
- A) 2
B) 8
C) 12
D) 18
73. Nëna e cila sapo ka lindur vë re se, në pjesën e pasme të kokës se foshnjës së saj ka një vend të butë në formë trekëndëshi. Ajo i kërkon mamisë, se pas sa kohësh largohet?
- A) 2 javësh
B) 6-8 javësh
C) 18 javësh
D) 20 javësh
74. Gruaja e cila dëshiron të ushqejnë fëmijën me gji, cilat nga pikat e mëposhtme nevojitet të bëjnë ?
- A) Nuk nevojitet ndonjë përgatitje speciale
B) Të fshij me peshqir thithat çdo ditë
C) Të laj thithat me ujë e sapun pas çdo ushqyerje
D) Të lyej thithat me ndonjë pomadë
75. Gruaja e cila ushqen fëmijën e saj me qumësht gjiri, paraqet se ka nevojë për më shumë informacion lidhur me kujdesin e gjirit nëse ajo:
- A) Lan areolën dhe thithën e çdo gjiri me ujë të ngrohtë
B) Aplikon cremin me vitaminë E në thithat dhe areolat vetëm përpara ushqyerjes së bebit
C) Shmang përdorimin e sapunit në thithat dhe areolat
D) Përdor kulloshtren ose qumështin për të zbutur dhe mbrojtur thithat dhe areolat
76. Gruaja e cila është diagnostikuar me mastit dhe merr antibiotikë duhet të
- A) Fillojë duke e ushqyer bebin fillimisht me gjirin e painfektuar
B) Ndërpresë ushqyerjen e fëmijës me gji
C) Ruaj laktacionin duke shtrydhur dhe shkarkuar qumështin me pompë
D) Ushqejë bebin e saj me gjirin e painfektuar
77. Mjeku porosit, që gruas ti bëhet Rhogama paslindjes. Mamia duhet ta administrojë atë, jo më vonë se ____ orë pas lindjes së fëmijës.
- A) 12
B) 24
C) 48
D) 72

78. Substance abuzuese gjatë barrës e cila shkakton vasoconstriction dhe ulje të perfuzionit placentar si rezultat i komplikimeve maternale dhe fetale është
- Alkooli
 - Çokollata
 - Duhani
 - Kafeina
79. Dhimbja e fortë e kokës në tremestrin e tretë të shtatzanisë, mund të jetë shenjë paralajmëruese për:
- Dehidratim
 - Hypertension
 - Lodhje
 - Pamjaftueshmëri ushqimi
80. Hipertensioni kalimtar është
- Hipertension me edemë të gjeneralizuar, që zhvillohet pas 20 javë gravidancë ose pas lindjes
 - Hipertension me proteinuri, që zhvillohet pas 20 javë gravidancë ose menjëherë pas lindjes
 - Hipertensioni që krijohet gjatë barrës, ose 24 orë pas lindjes pa edemë, pa proteinuri
 - Zhvillimi i hipertensionit gjatë shtatzanisë dhe që kalon pas lindjes së infantit
81. Eklampsia është
- Hipertensioni i zhvilluar menjëherë pas lindjes
 - Prania e hipertensionit para 20 javësh gravidancë
 - Prania e hipertensionit pas 20 javësh gravidancë
 - Preeklampsi plus konvulsione, koma ose të dyja
82. Znj. X ka eklampsi. Detyra e parë e mamisë është:
- Administrimi i O₂ me maskë
 - Aspirimin e përmbajtjes së gojës për të prevenuar kalimin në rrugën e frymëmarrjes
 - Të fusë ajër në rrugë orale
 - Të qëndrojë me pacienten dhe të telefonojë për ndihmë
83. Znj. X është primipare, është monitoruar në klinikën e saj prenatale për HT të induktuar nga barra. Cila nga pikat e mëposhtme do të jetë shqetësuese për infermieren e saj?
- Apo një edemë e këmbës me ++
 - Një proteinuri prej 400mg në 24orë
 - Një rritje e tensionit diastolik prej 10mmhg
 - Një rritje e tensionit sistolik prej 25 mmhg
84. Zonja x është duke marrë përfuzion me MgSO₄ për trajtimin e preeklampsisë së rëndë. Në vlersimin infermior, infermiera përcakton shenjat

vitale: T 37.3°C, P 88., R 10, TA 148/90 mm Hg, mungesë të refleksit patelar.

Pacientja ankon për etje të shtuar e afshe të nxehta.

- A) Dhënien e oksigjenit
 - B) Infermieria kërkon për të përcaktuar nivelin e MgSO₄
 - C) Përgatitet për dhënien e hidralazinës
 - D) Përgatitet për administrimin e Ca glukonatit
85. Znj. X shtrohet në spital për të stimuluar lindjen për arsye të HT të induktuar nga barra. Analizat laboratorike tregojnë vlerën e trombociteve 90.000, rritje të transaminazave, dhe ulje të hematokritit. Infermierja njofton mjekun se rezultatet laboratorike tregojnë për:
- A) HELLP sindrom
 - B) K.I.D.
 - C) Preeklamsi
 - D) Trombocitopeni idiopatike
86. Infermierja po merr anamnezën e znj. X gjatë vizitës së parë prenatale kur gruaja rezulton 10 javë me barrë. Cila prej pikave të mëposhtme tregon që znj. X është në rrezik për zhvillimin e diabetit gestacional gjatë kësaj barre?
- A) Ajo është 28 vjeçe
 - B) Fëmija i parë i saj ka lindur me seksio
 - C) Në anamnezën familjare rezulton diabet i tipit të I-rë
 - D) Pësua e fëmijës së fundit në lindje ka qënë 4530gr.
87. Gjatë instruksionit në lidhje me nivelet e dëshiruara të glukozës kur flitet për diabet gestacional, infermierja shpjegon nivelet e glukozës si p.sh. para ushqimit të cilat janë:
- A) 60-90 mg/dl
 - B) 90-120 mg/dl
 - C) 110-150 mg/dl
 - D) 150-180 mg/dl
88. Konsultimi para konceptimit është i rëndësishëm për përfundimin e shtatzanisë tek gruaja me diabet, për shkak se kontrolli i dobët i glicemisë para dhe në periudhën e hershme të barrës shoqërohet me
- A) Anomali kongenetale të fetusit
 - B) Episode të shpeshta të hypoglicemisë amtare
 - C) Hyperemesis gravidarum
 - D) Polihydramion
89. Gjatë vizitës prenatale infermierja i shpjegon dietën Znj. X me diabet pregestacional. Infermierja vleron që instruksioni i saj ka qënë efektiv, kur zonja X thotë:
- A) Dieta dhe insulina duhet të ndryshojë gjatë barrës
 - B) Unë do të planifikoj dietën në bazë të nivelit të glukozës

- C) Unë do të vazhdoj me të njëjtën dietë si përpara barrës, për aq kohë sa ajo do të jetë e mirë balancuar
- D) Unë, do të jetë e nevojshme të marrë më shumë se 600 kalori në ditë që nga momenti që jam shtatzanë

90. Një grua paraqitet në departamentin e urgjencës duke ankuar për gjakrrjedhje dhe crampe. Fillimisht infermierja i merr anamnezën për menset e fundit, të cilat ajo i kishte patur 6 javë më parë. Me një speculum steril ekzaminohet me kujdes dhe shihet që columi është i mbyllur. Plani i kujdesit në këtë grua do të bazohet në diagnozën e cilit tip të abortit?

- A) I paevitueshëm
- B) Incomplet
- C) Rrezik aborti
- D) Septik

91. Znj. D. është 13 javë shtatzanë. Ajo ankon për dhimbje në fund të barkut dhe hemoragji. Gjatë ekzaminimit vaginal, mjeku konstaton se gruaja ka shkurtim të qafës së mitrës dhe dilatacion të saj. Cili lloj aborti është ky

- A) Abort iminent
- B) Abort inkomplet
- C) Mised abort
- D) Rrezik aborti

92. Gruaja është në javën e tetë të shtatzanisë. Gjatë ekzaminimit me ultrasaund mjeku nuk arrin të kapë RZF. Në këtë rast kemi të bëjmë me:

- A) Abort habitual
- B) Abort inkomplet
- C) Abort të paevitueshmëm
- D) Mised abort

93. Një grua 10 javë shtatzanë merr në telefon shërbimin prenatal dhe i referon se ajo ka hemoragji vaginale. Cila duhet të jetë përgjigjia fillestare e infermieres:

- A) Ndoshta ju keni abortuar. Sill me vete të gjitha garzat apo lineset dhe hajde në klinikë tani.
- B) Përshkruaj sasinë e hemoragjisë, karakteristikat dhe kohën e gjakrrjedhjes (sa kohë ka zgjatur hemoragjia)
- C) Të rrijë regjim shtrati dhe nëse hemoragjia vazhdon të lajmërojë menjëherë
- D) Të vijë në klinikë sa më shpejt të jetë e mundur me qëllim që të vizitohet

94. Një grua gravide 8 javëshe paraqet rrezik aborti. Kush është trajtimi i duhur për këtë lloj aborti:

- A) Përgatitja e gruas për t'ju bërë dilatacionin e kyretazhi
- B) Vendosija e gruas rregjim shtrati për disa ditë dhe rivlerësimi i saj

- C) Përgatitja e gruas për ekzaminim ekografik për të parë integritetin e sakusit gestacional
- D) Qetësimi i gruas duke i treguar asaj që edhe n.q.se e humbet këtë fëmijë ajo mund të ngelet përsëri shtatzane pas një muaji.

95. Manifestimi klinik i placenta previas që e dallon nga distako placenta është prezenca e
- A) Aktivitetit uterin
 - B) Crampeve
 - C) Dhimbjes
 - D) Hemoragjisë

96. Gjatë aplikimit të forcepsit infermiere-mamia duhet:

- A) Të ndjeke R.Z.F.
- B) Të ndjekë T.A.
- C) Të vlersojë pulsën amtar
- D) Të vlersojë T°

97. Kur vendoset forcepsi dilatacioni duhet të jetë:

- A) 6 – 7 cm
- B) 7 - 8 cm
- C) 10 cm
- D) Mbi 10 cm

100

98. Gruaja shtatzanë paraqet një abdomen të mbidistenduar. Gjatë palpacionit abdominal dhe vlersimit ekografik përcaktohet se fetusit është i madh (makrosom). Kjo rritje fetale takohet tek gratë të cilat:

- A) Kanë polihydramion
- B) Konsumojnë alkool
- C) Konsumojnë duhan
- D) Shtatzaninë serotine

99. Polihydramion kemi kur sasia e likidit amniotic është:

- A) 1000 ml
- B) 500 ml
- C) 1500 ml
- D) Mbi 2000 ml

100. Nëse gruaja ka një lindje në javën e 41 të shtatzanisë së saj, çfarë lloj lindje ajo duhet të konsiderohet:

- A) Pretermë
- B) Termë
- C) Postermë
- D) Gestacinale

101. Nëse gruaja ka një lindje në javën e 38 të shtatzanisë së saj, çfarë lloj lindje ajo duhet të konsiderohet:
- A) Pretermë
 - B) Termë
 - C) Postermë
 - D) Gestacinale
102. Nëse gruaja ka një lindje para javës së 36 të shtatzanisë së saj, çfarë lloj lindje ajo duhet të konsiderohet:
- A) Pretermë
 - B) Termë
 - C) Postermë
 - D) Gestacinale
103. Shtatzania e zonjës x kalon kufirin e 42 j. Në këtë situatë mamia mendon se fetusi i kësaj zonje është i rrezikuar për:
- A) Makrosomi
 - B) Malprezentacion
 - C) Polihydramion
 - D) Sepsis fetal
104. Shënja që një grua shtatzane ka aktivitet të parakohshëm lindje mund të jetë:
- A) Dhimbja që shoqëron kontraksionet uterine është e fortë, konstante dhe lokalizohet në pjesën e sipërme të barkut, në fundusin uterin
 - B) Kontraksionet uterine zgjasin të paktën 20 minuta
 - C) Kontraktime uterine të cilat ndodhin me një frekuencë prej katër kontraksionesh në 1 orë
 - D) Shkurtimi qafës së mitrës deri në 80% edhe dilatacioni 2 cm.
105. Një grua shtatzanë, në javën e 32 të shtatzanisë është përcaktuar të jetë me rrisht për lindje pretermë. Një shenjë, që të ndodhë lindja pretermë do të jetë:
- A) Dhimbja që shoqëron kontraksionet uterine është e fortë dhe konstante
 - B) Dilatacioni cervical është më shumë se 1 cm
 - C) Kontraksionet uterine i kemi me një frekuencë, 4 kontraksione në një orë
 - D) Përgatitja e qafës mitrës (zbutaja) dhe shkurtimi i saj 25%
106. Një grua e hospitalizuar për aktivitet të parakohshëm po merr MgSO₄ i/v. Rezultati i pritshëm për këtë trajtim do të jetë n.q.s.:
- A) Ataket eklampitike nuk do të ndodhin
 - B) Kontraksionet uterine ndalohen
 - C) Mushkëritë e të porsalindurit fillojnë prodhojnë surfaktant
 - D) Nuk ndodh plasja e parakohshme e membranave

107. Mama duhet të kryej testin nitrazinës për të
- Përcaktuar nëse gjaku është prezent në likidin amniotik
 - Dalluar likidin amniotik nga urina duke testuar pH
 - Bërë ndryshimin mes feçeve maternale dhe meconiumit
 - Përcaktuar veçoritë e gravitetit të uterusit
108. Zonja X është 23 javë shtatzanë. Ajo ju telefonon dhe ju thotë se mendon që ka rrjedhje të ujrave nga vagina ju do ti thoni asaj:
- Hajdeni menjëherë në klinikë
 - Më telefono pas 2 h dhe më trego nëse ka ndryshime të rrjedhjeve
 - Ne mund të presim deri në vizitën tjetër të radhës
 - Për sa kohë që bebi lëviz ju mos u shqetësoni
109. Kur gruas i plasën membranat amniotike parakohe mama duhet të vlersojë T° çdo:
- 1 orë
 - 4 orë
 - 6 orë
 - 8 orë
110. Gruaja paraqitet në klinikë dhe ankon për dhimbje (kontraksione). Mama mendon për aktivitet të parakohshëm atëherë kur:
- kontraksionet janë çdo 30 min dhe zgjasin 90 sek
 - Kontraksionet janë çdo 5 min dhe zgjasin 30 sek
 - Kontraksionet janë të çrregullta në intervale të ndryshme kohore
 - Kontraksionet janë çrregullta, por të forta
111. Znj x është 36 javë shtatzanë. Ajo referon se ka dhimbje shpine, si dhe dhimbje me forcim të barkut. Infermiera në këtë rast vleron kontraksionet uterine për rreth
- 5min
 - 10 min
 - 15 min
 - 30 min
112. Pozicioni më i pershtatshëm që ju i rekomandoni gruas shtatzanë pas plasjes së membranave është në
- Dekupitus dorsal
 - Dekupitus lateral dextra
 - Dekupitus lateral sinistra
 - Pozicioni drejt qëndrim

113. Kur infermiere mamia bën planifikimin e kujdesit për gruan të cilës i kanë plasur membranat amniotice, ajo arsyeton që gruaja është e rriskuar për:
- A) Hemoragji
 - B) Hypotension në pozicion shtrirë me shpinë
 - C) Infeksion intrauterine
 - D) Lindje precipitoze
114. Menjëherë pas lindjes, gjatë vlersimit që infermieria i bën gruas vë re që fundusi uterin është i squllur dhe ka gjakrrjedhje të madhe. Etiologjia më e mundëshme e kësaj gjakrrjedhje është.
- A) Atonia e uterusit
 - B) Hematoma vaginale
 - C) Inversioni uterin
 - D) Laceracioni vaginal
115. Hemoragjitë e vona të post partumit shkaktohen nga:
- A) Atonia uterine
 - B) Mbetjet e fragmenteve placentare
 - C) Multipariteti i madh
 - D) Zgjatje e aktivitetit të lindjes
116. Pas lindjes, gjatë ekzaminimit të zonjës X ju konstatoni se brënda 15 min linesi i saj arrin të saturohet plotësisht. Veprimi i parë infermier që ju ndërmmerni është:
- A) Kontrolloni shënjat vitale
 - B) Lajmëroni mjekun
 - C) Palponi fundusin uterin
 - D) Rrisni marrjen e likideve i/v
117. Zonja X është 25 vjeç. Ajo ka 2 gravidanca, dhe 2 lindje, njëren prej të cilave e pati para 4 orësh ku lindi një fëmije mashkull me peshë 4150gr induktimi i kësaj lindje u bë me oxytocinë. Gruaja vendos të lajmërojë menjëherë infermieren pasi ka shumë gjakrrjedhje. Shkaku i mundshëm i një postpartumi hemoragjik në këtë kliente mund të jetë:
- A) Atonia uterine
 - B) Infeksioni puerperal
 - C) Laceracion vaginal i pariparuar
 - D) Mbetje të fragmenteve placentare
118. Pas lindjes gruaja ka hemoragji të vazhdueshme në sasi të pakët, fundusi uterin i kontraktuar. Kjo vjen si pasojë:
- A) Atonisë së uterusit
 - B) Laceracionit të columit
 - C) Mbetjeve të fragmenteve placentare
 - D) Mbetjeve të membranave amniotike

119. Hemoragjia e hershme e postpartumit (hemoragjia që ndodh brenda 24 orëve të para të pas lindjes) ka më pak gjasa të ndodhë si rezultat i
- A) Atonin uterine
 - B) Formacioneve të hematomeve
 - C) Laceracionet e labieve, perineumit, vaginës ose cerviksit
 - D) Subinvolucionin e uterusit
120. Shkaqet më të shpeshta të subinvolucionit janë:
- A) Barra multiple dhe hemorragjia postpartum
 - B) Hemoragjia postpartum dhe infeksioni
 - C) Kontraksion persistent dhe mbidozim me oxytocinë
 - D) Mbetje e fragmenteve placentare dhe infeksioni
121. Katër orë pas një aktiviteti dhe lindje të vështirë, një grua primipare refuzon të ushqejë beben e saj. Ajo është gjithashtu e lodhur dhe nuk dëshiron të flejë. Mamia duhet:
- A) Ta vlersojë si një lodhje e një faze të vështirë
 - B) Ta rregjistrojë si qëndrim joefektiv i ndërlidhjes nënë – fëmijë
 - C) Ti thotë gruas që ajo mund të pushojë pasi ushqen beben e saj
 - D) Të kthejë bebin në infermieri, duke siguruar gruan që pushimi i saj është prioritet në këtë fazë
122. Gratë në postpartum përjetojnë rrisht të lartë për infeksion të traktit urinar. Për të prevenuar këto infeksione mamia duhet t'u mësojë grave në postpartum që:
- A) Aciditeti i urinës kalon duke pirë 3 gota lëng portokalli çdo ditë
 - B) Kryerja e një kujdesi perineal sistematik duke zbatuar parimet bazë
 - C) Të boshatisë vezikën çdo 4 orë gjatë gjithë ditës
 - D) Të vazhdojë të marrë likide 1-2 litra çdo ditë
123. Një grua shtatzanë për herë të parë lind dy binjakë në javën e 37 të shtatzanisë. Përshkrimi korrekt i anamnezës obstetrikale të gruas do të jetë
- A) Multigravida, multipara
 - B) Multigravida, primipara
 - C) Primigravida, multipara
 - D) Primigravida, primipara
124. Barra binjake shpesh:
- A) Kalon ditën e lindjes
 - B) Çon në lindje premature
 - C) Nuk e ka të parashikueshme kohën e lindjes
 - D) Shkon deri në term

125. Shtimi në peshë i pritsëm për gruan shtatzanë me binjakë është:
- A) Më pak se të kishte një fetus
 - B) Më shume se të kishte një fetus
 - C) Varet se sa janë zhvilluar fetuset
 - D) Është e njëjtë si të kishte një fetus
126. Për të prevenuar komplikacionet shumë specialistë rekomandojnë regjimin e shtratit për barrat binjake të fillojë në:
- A) 16 javë të shtatzanisë
 - B) 20 javë të shtatzanisë
 - C) 28 javë të shtatzanisë
 - D) 30 javë të shtatzanisë
127. Bradikardia fetale është më shumë e zakonshme gjatë:
- A) Administratimit tokolitik
 - B) Anemisë fetale
 - C) Infeksionit intraamniotik
 - D) Zgjatjes së kompresionit të cordonit umbilical
128. Takikardia fetale është më shumë e zakonshme gjatë:
- A) Administratimit me MgSO₄
 - B) Anestezisë regionale
 - C) temperatura maternale
 - D) Prolapsit të kordonit umbilikal
129. Infermiera duhet të assistojë lindjen në pozicionin këmbë - duar kur:
- A) Ka prolaps të kordonit
 - B) Membranat janë rupturuar
 - C) Oxyputi i fetusit është në pozicionin anterior
 - D) Prezentacioni i fetusit është me podiume
130. Në praninë të obstetrikës vjen një grua me dhimbje shumë të forta barku. Gjatë vlersimit që bën mamia vë re se gruaja pavarësisht dhimbjeve nuk ka kontraksione uterine. Ajo është shumë e zbehtë, ka puls të përshpejtuar, si dhe hemoragji të pakët vaginale. Në këtë rast mamia menjëherë dyshon për:
- A) Distako placentë
 - B) Distoci uterine
 - C) Placenta previa
 - D) Rupturë të uterusit
131. Disfunksioni uterin hipertonic zakonisht ndodh në fazën:
- A) Aktive
 - B) E ekspulsionit
 - C) E tranzicionit

- D) Latente
- E)

132. Cila nga vlersimet e mëposhtme nuk është e lidhur me prezentacionin me podiome?

- A) Prania e mekoniumit në likidin amniotik
- B) Lindja parakohe e fëmijës
- C) Dëgjimi RZF kuadratin e jashtëm abdominal
- D) Kalimi i datës së parashikuar të lindjes

133. Znj. E. ka shtatzaninë e saj të parë. Ajo ka një aktivitet lindje prej 15 orësh. Dy orë përpara në ekzaminimin vaginal shihet se cerviksi është dilatuar 5cm, dhe columi është zhdukur plotësisht, pjesa prezantuese është në stacionin 0. Në vizitën vaginale të kryer pas 2 orësh vihet re se nuk ka ndryshime. Cili model i aktivitetit anormal është i lidhur me këtë përshkrim?

- A) Arrest i fazës active
- B) Fazë active e zgjatur
- C) Zbritje e zgjatur
- D) Zgjatja e fazës latent

134. Amniotomya është:

- A) Marrja e likidit amniotik për vlersim
- B) Ruptuimi artificial i membranave
- C) Rupturimi spontan i membranave
- D) Studimi citologjik i likidit amniotik

135. Duke zbatuar metodën kalendarike, cikli më i shkurtër është 21 ditë dhe cikli më i gjatë është 28 ditë. Duke zbatuar formulën gjeni ditët kur çifti duhet të shmangë periudhën e fertilitetit.

- A) nga dita 3 - 17
- B) nga dita 9 - 12
- C) nga dita 15 - 30
- D) nga dita 20 - 25

136. Zonja X ka zgjedhur metodën kalendarike për të kontrolluar kontracëpsionin. Gjatë procesit të vlersimit, më e rëndësishme për infermierën është:

- A) Ekzaminimi i pigmentacionit të lëkurës dhe cilesisë së flokëve për ndryshime hormonale
- B) Marrja e anamnezës menstruale për 6- 12 muajt e fundit
- C) Njohja e experiencës së mëparshme të gruas për të kontrolluar lindjen
- D) Përcaktimi i shtimit dhe humbjes në peshë

137. Zonja X është duke përdoruar temperaturën bazale trupore si metodë kontracëptive. Ajo shkon për kontroll në klinikë dhe i tregon infermierës “periodat e

mia janë paksuar dhe temperatura nuk është rritur” përgjigja më e përshtatshme e mamisë duhet të jetë:

- A) Ju keni qënë e sëmurë këtë muaj
- B) Ju ndoshta nuk patët ovulacion këtë muaj
- C) Kjo ndoshta nënkupton që ju jeni shtatzanë
- D) Mos u mërzitni ndoshta kjo nuk është asgjë

138. Sifilia shkaktohet nga

- A) Clamidia tracomatis
- B) Herpesi simpleks
- C) Neiseria gonorrhoea
- D) Treponema pallidum

139. Substancat spermicide veprojnë me anë të:

- A) Barrierave mekanike
- B) Duke frenuar ovulacionin
- C) Duke shtuar rritjen e epitelit vaginal.
- D) Shkatërrimit të spermës

140. Në Barrierat mekanike hyjnë :

- A) Implanti kontrceptiv subdermal
- B) Sfungjerët
- C) Shkumrat
- D) Xhelet.

141. Në barrierat kimike futen :

- A) Depo- proveara.
- B) DIU
- C) Norplanti
- D) Spermitostatikët

142. Zonja X ,30 vjeç në anamnezë e saj kemi shtatzani 0 dhe para (lindje) 0 ajo ankon për prurit vaginal dhe për shtim të rrjedhjeve vaginale. Ajo dhe i shoqi nuk kanë marrdhënie jashtmartesore. Për 7 vite si metodë kontrceptive ato kanë përdorur kondomin. Në anamnezën e saj medikale kemi diabet mellitus, si dhe në historinë familjare kemi diabet gestacional. Faktorët predispozues për të zhvilluar infeksionin nga kandida janë:

- A) Diabeti melitus
- B) Nuligraviteti
- C) Nuliparitety
- D) Përdorimi i kondomit

143. Condomët duhet të përdoren në barrë

- A) Asnjëherë

- B) Nga gratë me rrezik për candida
- C) Nga gratë me rrezik të lartë për SST
- D) Nga të gjitha gratë shtatzana

144. Një grua e re vjen në klinikë dhe ju spjeron ju, që një natë më parë gjatë marrdhënies seksuale kondomi u çua. Në konsultë me këtë kliente ju e këshilloni atë që kontracepsioni post koital ul rrezikun e një shtatzanie dhe është shumë efektive kur:

- A) Ajo merret në çdo kohë përpara ciklit
- B) Doza e parë merret sa më shpejt që të jetë e mundur
- C) Doza e parë mund të merret pas 72 orëve
- D) Mund të merret dhe pas tre ditësh

145. Kur ju diskutoni kontracepsionin postcoital me një kliente. Ju do ta këshilloni atë që:

- A) E rëndësishme është marrja e 2 tab të para menjëherë pas kontaktit
- B) Ju do të merrni 2 tab nga goja, si dhe 2 të tjera pas 12 orësh
- C) Ju do të prisni 1 muaj dhe do të shohim nëse do të vijnë periodat
- D) Sa më shumë kohë që kalon, trajtimi nuk funksionon

146. D.I.U. është një mjet kontraktiv i cili :

- A) Është ipërbërë nga një shtresë e hollë gome
- B) Jep një mbrojtje më të mirë se sa pilula
- C) Mbron nga infeksionet seksualisht të transmetueshme
- D) Nuk është i përshtatshëm për gratë e palindura

147. Zonja X është beqare dhe përshkruan jetën e saj seksuale, si aktive dhe me shumë partnerë. Ajo dëshiron një metodë kontrceptive, e cila është e sigurtë dhe që nuk ndikon në aktivitetin e saj seksual. Ajo kërkon D.I.U.. Përgjigja më e përshtatshme e mamisë do të ishte :

- A) D.I.U. do t'ju mbrojë ju nga SST
- B) D.I.U. nuk ndikon në aktivitetin seksual
- C) Përqindja e barrave është më e lartë me D.I.U.
- D) Rreziku i SIP është më i madh për ju

148. Zoti dhe Zonja X po kalojnë momente të vështira për pamundësinë e tyre për të krijuar shtatzanësi. Ata duan të dinë se çfarë mund të bëjnë për të ruajtur ekuilibrin e tyre emocional. Përgjigja më e përshtatshme nga ana e mamisë është :

- A) T'i tregojnë gjithë shokëve të tyre dhe familjeve
- B) Të bisedojnë me homologët e tyre infertil
- C) Të kërkojnë mbështetje nga grupet e specializuara për këtë problem
- D) Të fillojnë procedurat e menjëherëshme për adoptim

149. Një grua është duke përdorur diafragmën inkorrekte nëse ajo

- A) Aplikon spermicid brënda kupës dhe rreth buzëve të diafragmës
- B) E lan atë me sapun të butë dhe ujë pas përdorimit dhe më pas e pudros atë me niseshte
- C) Lëviz atë brënda 2 h pas aktit të fundit të coitusit
- D) Vendos diafragmën 6 h para marrdhënies

150. Znj. X .sapo ka patur abort në tremestrin e I-rë dhe është dërguar në shtëpi duke i dhënë kontraktivë oral për tu mbrojtur nga një barrë , ajo është këshilluar të :
- A) Të fillojë marrëdhëniet seksuale, pasi të ketë mbaruar hemorragjia vaginale.
 - B) Të mënjanojë kontaktin seksual të paktën 10 ditë
 - C) Të përdorë kondom dhe shkurë për javën e pare
 - D) Të përdorë një metodë tjetër kontraktive për një cikël të plotë

151. Proçedura e sterilizimit në meshkuj është :
- A) Lidhja e tubave
 - B) Spermicitet
 - C) Spermitostatikë
 - D) Vasektomia bilaterale

152. Zoti dhe Zonja X e kanë plotësuar numrin e fëmijëve të dëshiruar dhe diskutojnë me infermiere maminë në lidhje me sterilizimin femëror dhe mashkullor. Cila prej thënieve të mëposhtëme është më e përshtatshme të thuhet nga mamia?
- A) Komplikacionet madhore pas sterilizimit janë të rralla.
 - B) Mbyllja tubare është e përkohëshme dhe shpesh e rikthyeshme
 - C) Sterilizimi i burrit dhe i gruas është 100% efektiv
 - D) Vazektomia, zakonisht ka një ndikim në marrëdhëniet seksuale

153. Metoda më frekvente për kontrollin e lindjeve e përdorur nga femrat 15-19 vjeçare është
- A) Depo-Provera
 - B) DIU-ja
 - C) Kontraktivët oral
 - D) Norplanti

154. Depo – provera është një metodë kontraktive e zgjedhur për gratë të cilat dëshirojnë :
- A) Kanë një anamnezë për probleme trombolitike, ose Ca të gjirit
 - B) Kanë vështirësi në mbajtjen mënd për të marrë çdo ditë pilulat
 - C) Një cikël menstrual të rregullt dhe parashikim të tij
 - D) Nuk janë në shtëpi dhe rrallë këshillohen me mjekun.

155. Zonja X kohët e fundit ka përdorur diafragmë dhe spermicid si kontraksion. Ajo i kërkon infermieres, se cilat janë ndryshimet madhore ndërmjet kapës cervikale dhe diafragmës. Përgjigja më e përshtatshme nga infermierja do të ishte :
- A) Diafragma mund të lihet për një kohë më të gjatë, pas marrëdhënies seksuale

- B) Kapa mund të vendoset në mënyrë të sigurtë, disa orë para marrëdhënieve, pa patur nevojë për për të shtuar spermicidin më vonë
- C) Marrëdhëniet e përsëritura me diafragmë, janë më të përshtatshme
- D) Me kapën nuk përdoret spermicid, kështu që ai është më i thjeshtë

156. Zonja X është diagnostikuar dhe trajtuar për sindromin e shokut toksik. Ajo në ndonjë rast të marrëdhënieve seksuale ka përdorur kontraktivë të marrë vetë në farmaci. Bazuar në anamnezën e saj, çfarë kontraktivësh, nuk duhet të përdorë ajo dhe partneri i saj ?

- A) Diafragmat
- B) Kondom vaginal.
- C) Kondomi
- D) Sfungjerët

157. Zonja X është beqare dhe përshkruan jetën e saj seksuale, si active dhe me shumë partnerë. Ajo dëshiron një metodë kontraktive, e cila është e sigurtë dhe që nuk ndikon në aktivitetin e saj seksual. Ajo kërkon D.I.U.. Përgjigja më e përshtatshme e mamisë do të ishte :

- A) D.I.U. do t'ju mbrojë ju nga SST
- B) D.I.U. nuk ndikon në aktivitetin seksual
- C) Përqindja e barrave është më e lartë me D.I.U.
- D) Rreziku i SIP është më i madh për ju

158. SST që transmetohen më shpesh janë :

- A) C. Trachomatis
- B) N. Gonorrhea
- C) Sifilizi
- D) Vulvovaginal candidosis

159. Në efektet anësore të steriles përfshihen :

- A) Depresioni
- B) Gjendja e ankthit
- C) Nauzeja dhimbja e kokës
- D) Rrjedhjet vaginale, hemoragjia

160. Cilat nga pikat e mëposhtme sugjeron infermieren që gruaja mund të ketë vaginitis monialis?

- A) Ankesë për kuarje vulvare irrituese
- B) Dhimbje mesi të padurueshme
- C) Sekrecine të ujshme në ngjyrë të verdhë
- D) Temperaturë

161. Kur vlersohet një grua për diskomfort menopauzal, diskomforti i raportuar më shpesh është

- A) Afshet e nxehta
- B) Dhimbja e kokës
- C) Ndryshim i humorit
- D) Thatësia e vaginës

162. Cila nga pikat e mëposhtme është faktor rrisht për osteoporosis?

- A) Marrja e pakët e proteinave
- B) Obeziteti
- C) Raca
- D) Trup i dobët

163. Një grua ankon për dhimbje të forta barku e pelvike rreth periudhës së zakoneve, e cila e ka përkeqsuar gjendjen e saj në 5 vitet e fundit. Ajo gjithashtu ankon për dhimbje gjatë marrdhënieve seksuale, dhe është përpjekur që të ngelet shtatzanë 18 muajt e fundit por pa sukses. Këto simptoma kanë më tepër mundësi të lidhen me:

- A) Dismenorrenë primare
- B) Dismenorrenë sekondare
- C) Endometriozen
- D) Sindromi premenstrual

164. Kur një femer consultohet për dismenorrhea primare, cilat nga ndërhyrjet e më poshtme jo farmakologjike do të përdoret?

- A) Mos bërija e ushtrimeve gjatë periudhës menstruale
- B) Përdorimi i kompresave të ngrohta për të lehtësuar crampet
- C) Shmagia e marrdhënieve seksuale gjatë ditës së parë të menseve
- D) Shmagia e caffeinës gjatë periudhës menstruale

165. Me amenorre kuptojmë:

- A) Fluks i pakët menstrual
- B) Fluks i shtuar menstrual
- C) Menstruacione të dhimbshme
- D) Mungesë e menseve

166. Dhimbja e fortë, akute jo menstruale lidhet me:

- A) Cisti ovarial i rruptuar
- B) Dismenorreanë primare
- C) Dispozitivin Intra- Uterin
- D) Sëmudjet malinje të ovareve

167. Dhimbja menstruale rekurente dhe në mënyrë periodike lidhet me:

- A) Cistet ovariale
- B) Dismenorreanë (primare, sekondare)
- C) Sëmudjet inflamatorë pelvike akute

D) Sëmundjet malinje të uterusit

168. Gjatë intervistës me një zonjë 31 vjeçare, mamia përpara ekzaminimit rutinë, mbledh të dhëna rreth ciklit të fundit menstrual. Ajo duhet të mbledhë informacion shtesë, në rastin kur gruaja përshkruan:

- A) rrjedhje shumë të shtuara
- B) sasi të vogël spottingu mes periodave
- C) Gjatësinë e ciklit menstrual nga 26 deri 29 ditë
- D) Rrjedhje menstruale më pak se 5-6 ditë

169. Në terapinë me estrogen të grave, ju do të përfshini rrezikun ndaj këtij trajtimi për

- A) Cancer cervikal
- B) Cancer endometrial
- C) Cancer ovarian
- D) Osteoporozis

170. Znj. X është diagnostikuar me fibromiom uterin. Kur bëhet plani i kujdesit infermierja duhet të dijë që:

- A) Janë fibriomat tumore malinje të uterusit
- B) Rriten fibriomat zakonisht mbas menopauzës
- C) Rritja e fluksit menstrual është një simptomë e zakonshme
- D) Barra mund të ndodhë në uteruset me fibromion

171. Amenorrea hypogonadotropike nuk shkaktohet nga:

- A) Humbje e shpejtë e peshës
- B) Kontraceptivet oralë
- C) Stresi
- D) Ushtrime të forta

172. Cila prej simptomave të mëposhtme të përshkruara nga një grua është karakteristike për sindromin premenstrual (SPM)

- A) Unë filloj të kem fryerje barku dhe dhimbje gjoksi kur më fillojnë zakonet
- B) Unë kam dhimbje të forta të barkut rreth ditës së tretë të zakoneve
- C) Unë kam nauze, dhimbje koke pas fillimit të zakoneve
- D) Unë ndjehem e irrituar 1 javë –10 ditë para fillimit të menstruacioneve

173. Zonja X është 29 vjeç. Ajo ka qënë e diagnostikuar për lindje preterme, e cila u mbajt nën kontroll me preparate tokolitikë. Zonja kërkon të dijë kur ajo do të jetë në gjendje të shkojë në shtëpi:

- A) Pasi bebi të lindë
- B) Nëse i sigurohet një infermiere për ta kontrolluar
- C) Varet nga shtrimet në spital

D) Çdo kohë që ajo vetë të vendosë

174. Uterusi është një organ muskolor në formë dardhe që përgjigjet për:

- A) Ciklin menstrual
- B) Prodhimin e hormoneve seksuale
- C) Fertilizimin
- D) Zgjimin seksual

175. Për arsye të efekteve të ciklit ovarian në ndryshimet e gjirit, koha më e mirë për të bërë vet-ekzaminimin e gjirit është:

- A) 5 – 7 ditë pas përfundimit të menseve
- B) Ditën e parë të ciklit endometrial
- C) Në mes të ciklit menstrual
- D) Çdo kohë është e përshtatshme

176. Volumi i likidit amniotic është një faktor i rëndësishëm në vlersimin të mirëqënies fetale. Oligohydramioni (më pak se 300 ml likid amniotic) lidhet me cilën nga anomali të fetale///

- A) Renale
- B) Kardiake
- C) Gastrointestinale
- D) Neurologjike

177. Mensruacioni është gjakrrjedhje uterine periodike:

- A) Që ndodh çdo 28 ditë
- B) Në të cilën bie shtresa e brendshme e uterusit
- C) Që rregullohet prej hormoneve ovariale
- D) E cila drejton fertilizimin

178. Për të planifikuar familjen çifti vendos të përdorë metodën natyrore. E rëndësishme për ta është të dinë sa është jetëgjatësia e vezës pas ovulacionit. Mami vëre se mësimdhënia e saj ka qënë efektive kur çifti përgjigjet se jetëgjatësia e vezës është:

- A) 1 – 3 ditë
- B) 3 – 5 ditë
- C) 5 – 7 ditë
- D) 7 – 9 ditë

**TESTI INFERMIERISTIK PEDIATRIE, INFERMIERISTIK PUERIKULTURE
DHE INFERMIERISTIK NEONATOLOGJIE (250 KUIZ)**

Sa është koha që duhet të përdorim, që të stimuloj respiracin dhe të parandalojmë apnen?

- A) 3-4 min
- B) 5-10min
- C) 10-15min
- D) 15-20min

Aspirimi i lëngut amniotik tek fëmija gjatë lindjes duhet të kryhet jo më shumë se?

- A) 5sek
- B) 10sek
- C) 10min
- D) 15min

Pas sa orësh normalizohet temp pas lindjes?

- A) 6min
- B) 8min
- C) 5orësh
- D) 8orësh

Kush është pozicioni që vendoset fëmija me çrregullime të buzës të lepurit pas operacionit,?

- A) shtrirë mbi barke
- B) shtrirë anash
- C) pozicion semifoler
- D) shtrirë me kurriz

Pas sa ditësh kthehet në normë faktori i koagulimit mbas lindjes tek fëmija ?

- A) 7-10 ditësh.

- B) 12-15 ditësh
- C) 16-19 ditësh
- D) 20-25 ditësh

Me çfarë pastrohet mukoza e gojës në fëmijët që është me stnoz të pilorit?

- A) solucion bikarbonat
- B) solucion nitrat
- C) solucion gencian violet
- D) solucion glukoz

Edema serosanguine mund të shoqerohet me ?

- A) frakture të kafkës
- B) petekie ose ekimoza
- C) shkollitje të lëkurës
- D) deformin te gojës

Cefalofematoma është një hemoragji që ndodh në zonën ndërmjet?

- A) lëkurës dhe kockës
- B) kockës dhe periostit
- C) trurit dhe kockës
- D) periostit dhe trurit

Zhvillimi pamor i fëmijës së porsalindur është rreth një gjatësie ?

- A) 20 cm
- B) 22cm
- C) 24cm
- D) 28cm.

Femija fillimisht kur lind aspirohet nga?

- A) hunda
- B) goja
- C) veshi
- D) syri

Qëllimi i vlerësimit të cefalohematomës është për të parë ndërlikime të tilla si:?

- A) hematom sub-durale
- B) humbje të kujtesës
- C) humbje të tisorave oreale
- D) aponeurezis

Gjatë fototerapisë tek eritroblastozen fetale, fëmija duhet të marrë lëngje në dite?

- A) 20%
- B) 25%
- C) 30%
- D) 35%

Kush janë shenjat që fëmija paraqet në një fraktur të klavikulës?

- A) asimetri në refleksin moro
- B) paraliz të krahut
- C) një hemoragji të krahut
- D) demtime të trupit

Sa janë vlerat e bilirubinës kur ikteri fiziologjik ka filluar të shfaqet në anësit e poshtme?

- A) 10 mg/dl
- B) 15 mg/dl
- C) 20 mg/dl
- D) 25 mg/dl

Paraplegjia prek këto legjione?

- A) Vetem 1 gjymtyre

- B) Vetem 1 pjese te trupit
- C) Katr gjymtyret dhe trupin .
- D) 2 kembet dhe trungun e trupit.

Faza sensomotore kujt moshe i perket sipas Piazhes

- A) lindje deri ne 2vjeç
- B) 3 deri në 4 vjeç
- C) 5 deri në 7 vjeç
- D) 8 deri në 10 vjeç

Shpirti i iniciatives kundrejt ndjenjës së fajit kujt moshe i perket?

- A) lindje deri 2 vjec
- B) 3-6vjec
- C) 7-11 vjeç
- D) 13-15vjec

Rrugët e infektimit të eritrodermis?

- A) Transplacentare
- B) Ushqyerja artificiale
- C) Frymëmarrja
- D) Veshjet

Presioni sistolik i gjakut tek infanti

- A) 15- 20
- B) 30-40
- C) 50-60
- D) 70-90

Presioni sistolik i gjakut tek fëmijet e vegjël

- A) 15-20
- B) 30-40
- C) 50-70
- D) 80-100

Presioni sistolik i gjakut tek fëmijet e rritur

- A) 15-20
- B) 20-40
- C) 50-70
- D) 90-110

Shkalla e respiracionit tek infanti

- A) 10-15
- B) 20-25
- C) 30-40
- D) 50-60

Shkalla e respiracionit tek fëmijet e vegjel

- A) 20-30
- B) 40-50
- C) 60-70
- D) 80-90

Shkalla e respiracionit tek fëmijet e rritur

- A) 15-20.
- B) 30-40
- C) 50-60
- D) 70-80

Shënjat klinike kur kemi një ikter te avancur.

- A) fontanela e bonbuar
- B) klithma
- C) dispne

D) takikardi

Me çfare shenjash shoqërohet atrezia biliare?

- A) distecion abdominal
- B) dhimbje këmbe
- C) dhimbje koke
- D) nauze

Manifastimet klinike të sindromës hemoragjike ?

- A) gjakosje te umbelikut
- B) dhimbje barku
- C) dhimbje këmbe
- D) nauze

Simptomat e tetanozit neonatal

- A) spazma të muskulaturës së qafës dhe rigiditet
- B) te vjella
- C) diare
- D) dhimbje barku

Shenjat klinike te paralizës faciale?

- A) nuk mbyll plotesisht syrin
- B) nuk merr dot frym
- C) nuk lëviz krahun
- D) nuk lëviz trupin

Sipas Frojdit kujt moshe i perket staid latent?

- A) 1-4 vjeç
- B) 6-12 vjeç
- C) 15-18 vjeç
- D) 20-25 vjeç

Apneja shoqërohet me

- A) bradikardi
- B) dhimbje barku
- C) nauze
- D) diare

Kush janë format që çojnë në hernie umbelike

- A) shtrëngim në momentin e jashqitjes
- B) dhimbje këmbë
- C) dhimbje barku
- D) dhimbje koke

Kush janë faktorët që kanë lidhje me problemin e sindromës hemoragjike ?

- A) mungesa e vit K nga nëna
- B) mungesa e oreksit
- C) nauze
- D) diare

Paraliza e nervit frenik shkakton paraliz të

- A) diafragmës
- B) krahut
- C) kembës
- D) barkut

Çfarë ndodh në organizëm në fazën e 5 të helmimit nga hekuri?

- A) zhvillohet stenoza e pilorit
- B) dëmtim të mëlçis
- C) dëmtim të veshkave
- D) dëmtim të zemrës

Tek kriza vazo-okluzive e drepanocitozes simptomat më madhore janë:

- A) altralgi
- B) temperature
- C) anemi
- D) dhimbje

Kur epistaksin e kemi nga arterja etmoide ka lidhje më shume me:

- A) traumat
- B) sëmundjet sistemike
- C) dëmtime të zemrës
- D) dëmtime të gojës

Në rast se trupi i huaj është i vogël dhe kalibri i bronkut është i madh do kemi këto shenja:

- A) fishkëllim
- B) vështirësi të frymarrjes
- C) sekrecione
- D) dispne

Në rast se trupi i huaj ka bërë një bllokim të pjesshëm të lymenit do kemi:

- A) emfizem obstruktive
- B) atelektaze
- C) pneumotoraks
- D) bronkit

Kur kemi një infeksion i adenoidit kemi këto shenja kryesore:

- A) dhimbje veshi
- B) merr frym me gojë
- C) gjakrrjedhje nga hunda
- D)gërrhet

Respiracioni i pafrytshëm lidhet me:

- A) deficitin e volumit të lëngjeve
- B)rritjen e kërkesave metabolike
- C) rritjen e sekrecioneve
- D)inflamacionin e pemës trakeo-bronkiale

Glomerulonefriti akut futet në grupin e sëmundjeve të sistemit urinar, ku ato do ti quajmë:

- A) reaksion inflamator
- B) reaksion indor
- C) ulje të imuniteti
- D) sëmundje infektive

Në faktorët endokrinologjik tek azma:

- A) tirotoksikoza e përmison azmën
- B) e keqëson gjëndjen
- C) është neutrale .
- D) kemi ndikim të fuqishëm

Tek azma cilat janë elemente që kanë veprim obstruktiv mbi bronke:
makrofaget

A)

- B) monocidet
- C) bikarbonati
- D) glukonate

Shenjat e intoksikimit nga digoxina:

- A) nauze
- B) lipotemi
- C) hipoglicemi
- D) anoreksi

Tek azma frymarrja e pa frytshme lidhet me

- A) bllokimin e rrugëve ajrore
- B) përmisimin e sëmundjes
- C) përgjigjja jo e mirë ndaj mjekimit
- D) nga sekretimet e shumta.

Azma përfaqëson një:

- A) Dëmtim funksional
- B) Obstruksion te rrugeve respiratore
- C) Sekrecione të shumta
- D) Mjekime jo specifike

Haemathrosis është gjakrrjedhje ne:

- A) në toraks
- B) në SNQ
- C) në artikulacione
- D) në traktin gastro-intestinale

Parotiti është një sëmundje:

- A) e gjëndrave limfatike
- B) endemike sporadike
- C) enët e gjakut
- D) sistemin nervor

Shkaktari i fruthit është virusi :

- A) virusi RNA
- B) i grupit të herpoviruseve
- C) virusi measles
- D) virusi i gripit

Në bronkiolit pas hyrjes së virusit kemi këto pasoja:
vështirësi në frymarrje

A)

- B) infiltrim peribronkial
- C) bllokim të anës së prekur
- D) zmadhim të anës së prekur

Tipari karakteristik i fibrozës cistike është:

- A) disfunktion i sipërfaqeve epiteliale
- B) mosfunktionimit të shkëmbimit të brëndshëm të gjëndrave
- C) disfunktionit i bërthamës qelizore të gjëndrave.
- D) mos oksigjenimi i organizmit

Fibroza cistike vjen si pasojë e

- A) çrregullimi i fluksit hidroelektrolitik midis gjëndrave
- B) çrregullimi i fluksit hidroelektrolitik midis sistemeve
- C) çrregullimi i fluksit hidroelektrolitik transepitelial
- D) çrregullimi i fluksit hidroelektrolitik i enëve të gjakut

Metodat për përcaktimin e testit për fibrozën cistike bëhet :

- A) mbas muajt të parë të jetës
- B) mbas muajit të gjashtë të jetës
- C) mbas vitit të parë të jetës.
- D) mbas vitit të dytë të jetës

Tek fibroza cistike dozat e enzimave do jepen në bazë të :

- A) defiçitit të enzimave
- B) sipas oreksit
- C) sipas harxhimeven në organizem
- D) humbjeve të gjakut

Rrezikun për ndryshimin e funksionit kardio-vaskular lidhet me :

- A) me pamjaftushmërin e punës së zemrës
- B) me mungesën e mjekimit
- C) me pamundësin për të kuptuar gjëndjen
- D) me pamjaftushmerin e lëndëve proteinike

Tek të sëmurët me probleme kardiake digogsina shkakton:

- A) redukton të rrahurat e zemrës
- B) rrit të rrahurat e zemrës
- C) neutralizon të rrahurat e zemrës
- D) e ndalon punë e zemrës

Shkaku i anemis vjen si pasoj e :

- A) e uljes së masës leukocitare
- B) prodhimit gabim të leukociteve
- C) uljen e mases eritrocitare
- D) ritjen e masës eritrocitare

Në dëmtimet kronike renale, ulja e filtrimit renal, fillon nga:

- A) rritja e pH

- B) rritja e produktit të katabolizimit të proteinave
- C) rritja e nivelit të serumit të fosfateve
- D) rritja e nivelit të yndyrave

Ne stadin e dytë shiriti i gjedhit migrojnë për në :

- A) mëlçi
- B) mushkri
- C) tru
- D) veshka

Mbas sa kohësh kemi ulçeracion të plagës nga pickimi i merimangës e zezë?

- A) 3-4 dite
- B) 7-14 dite
- C) 15-20 dite
- D) 22-27 dite

Mbas sa kohësh fillon organizmi të reagoi kur kafshohet nga gjarpëri?

- A) 15-20 sek
- B) 30-50sek
- C) 15-20min
- D) 30-40min

Sëmundjet që hasen në fëmijët alergjik sipas sistemit trupor në sistemin qarkullues:

- A) spazmaciliare
- B) tension
- C) agronulocitoz
- D) glicemi

Pas sa kohësh shfaqen simptomat nëse i njëjti serum është marrë disa herë?

- A) 7- 12 min
- B) 7-12 orë

- C) 1-5 dite
- D) 1-5 javë

Veprimet i zgjatur ultralent i insulinës (në rrugë subcutane) kur e ka kulmin ?

- A) 2-4orë
- B) 6-12orë
- C) 14-24orë
- D) 28-36 orë

Sa është dhënja e sasis së lëngjeve për kg/peshe në dehidrimi e lehtë në diare?

- A) 25cc
- B) 35cc
- C) 50cc
- D) 100cc

Kur fëmija është me të vjella sa lëngje duhet te marri në 24 ore per kg-peshe?

- A) 50cc
- B) 100cc
- C) 120cc
- D) 200cc

Cila është koha që fëmija riinfekton veten me oksiure?

- A) 6-10 orë
- B) 3-5 ditë
- C) 6-8 javë
- D) 10-15 javë

Shenja që tregon që fëmija ka askaride?

- A) dhimbje abdominale
- B) dhimbje muskujsh
- C) dhimbje koke
- D) dhimbje këmbe

Shenjat klinike të Trichinosis?

- A) dhimbje koke
- B) anemi
- C) enjte te syve
- D) dhimbje të këmbeve

Manifestimet klinike nga pickimi nga merimanga kafe?

- A) petekie e gjeneralizuar
- B) prurit
- C) dhimbje abdominale
- D) anemi

Gjatë helmimit bëjme futjen e sondës gastrike dhe aplikojmë tretësire kripore:

- A) 10-25ml
- B) 30-40ml
- C) 50-80ml
- D) 100-120ml

Shenjat klinike tek helmimet nga hidrokarbureve?

- A) ndryshim e vetëdijes
- B) oliguri
- C) dehidrim
- D) anemi

Mbas sa kohësh ndodh perjudha e fsheht tek helmimi nga acetaminofeni?

- A) 2-4 sek
- B) 8-16min
- C) 24-36 ore
- D) 7-10 ditë

Sëmundjet që hasen në fëmijët alergjik sipas sistemit trupor në sistemin e lëkurës:

- A) angioedema
- B) katarakt
- C) anemi
- D) hemoragji

Sëmundjet që hasen në fëmijët alergjik sipas sistemit trupor në sistemin nervor :

- A) tremor
- B) purpura
- C) kolika
- D) oliguri

Pas të vjellave fëmija vëzhgohet për shenja të dehidrimit?

- A) thellim të syve
- B) dhimbje barku
- C) dhimbje koke
- D) puls

Kush janë shenjat e indiosinkrazis?

- A) dilatim I pupilave
- B) puls
- C) dhimbje barku
- D) nauze

Çfarë shenjash ka stomatiti vincent:

- A) gjakrrjedhje
- B) erë e keqe
- C) anemi

D) diare

Zhvillimi i alergjis ndikohet nga :

- A) lloji i kontaktit
- B) dhimbjet e barkut
- C) diare
- D) të vjellat

Reaksioni i vonuar mbas sa kohësh zhvillohet plotësisht?

- A) 2-5 orësh
- B) 10-16 orësh
- C) 18-23 orësh
- D) 24-72 orësh

Si pasoj e mungesës së vit D, në kokë kemi çrregullim të tilla si:

- A) dhimbje barku
- B) nauze
- C) diare
- D) vonës në mbylljen e fontanelës

Tetania shfaqet atëhere kur niveli i kalciumit serik ulet nën?

- A) 1-2mg%
- B) 3-5mg%
- C) 7-7.5mg%
- D) 8-10mg%

Regjimi diabetik përqëndrohet në:

- A) bërjen e insulinës
- B) kontrolli i diares
- C) kontrolli i të vjellave
- D) lëkura

Obeziteti është i shoqëruar me një varg pasojash mjekësore ku përfshijm?

- A) diabetin
- B) pulsi i ulur
- C) probleme të dhëmbëve
- D) dhimbje koke.

Ku depozitohen askaridet në stadin e parë të tyre?

- A) Duoden
- B) Pankreas
- C) Stomak
- D) veshka

Sa zgjat perjudha e fshehte tek helmimi nga Hekuri?

- A) 2-12ore
- B) 13-16 orë
- C) 18-20 orë
- D) 22-26 orë

Vlerësimi infermieror në diabetin përqëndrohet në?

- A) gjëndja fiziologjike
- B) informinin për sëmundjen
- C) dhimbjet e barkut
- D) dhimbjet e kokës

Shenjat klinike në reaksionin imuno kompleks?

- A) urtikarje
- B) nauze
- C) të vjella
- D) diare

Kujdesi infermieror në ostiomelitin për sigurimin e komfortit?

- A) pozicioni i pershtatshem
- B) dhimbjet e barkut
- C) diare
- D) të vjella

Kretinizmi vjen si rezultat i ?

- A) deficitit të jodit
- B) anoreksis
- C) diabetit
- D) obezitetit

Ndërlikimet afatgjate të diabeti insulinovartës është:

- A) retinopatia
- B) sëmundjet intestinale
- C) anoreksia
- D) të vjellat

Veshka sekreton hormone si:

- A) Renina
- B) acidi uric
- C) Urea
- D) Kristale

Komplikacionet e skarlatines është:

- A) limfadenoid, mastoite
- B) dhimbjet e barkut
- C) nauzet
- D) lëkura

Tek difteria perjudha e inkubacionit është :

- A) 2-5 dite
- B) 7-10 ditë
- C) 13-16 ditë
- D) 20-24 ditë

Para marrjes së diuretikeve matet rregullisht:

- A) urinimi
- B) defekimi
- C) të vjellat
- D) tensionin arterial

Perjudha e fshehtë e poliometit abortiv është:

- A) 3-6 dite
- B) 7-10 ditë
- C) 13-15 ditë
- D) 16-18 ditë

Faza post renale vjen si pasoj e :

- A) nje obstrukcion mekanik i traktit urinar
- B) traktit gastrointestinal
- C) respirator
- D) venoz

Tek varicela fëmija është kontaminues gjatë perjudhës:

- A) 1-2 dite e para shfaqes se ekzantemes
- B) 3-6 ditë
- C) 7-10 ditë
- D) 12-14 ditë

Sa është dhe sa shkurtohet jeta e trombociteve:

- A) 6-8 dite ne disa ore
- B) 9-12 ditë
- C) 14-16 ditë

D) 17-20 ditë

Sindromi hemoragjik tek i posalinuri, vjen si pasojë?

- A) e mungesës nga Vit A
- B) e mungesës nga Vit D
- C) e mungesës nga Vit K
- D) e mungesës nga Vit E

Cila nga këto shihet në analizën e ikterit?

- A) Rritja e glukozës në gjak
- B) Rritja e azotemisë
- C) Rritja e glicemisë
- D) Rritja e bilirubinës

Cila është ndërhyrja e parë në fëmijën prematur?

- A) ushqyerja
- B) dhënia e oksigjenit
- C) vënia e perfuzioneve I/V
- D) rregullimi i temperaturës

Cila është shenjë e infeksionit umbelikal?

- A) nauze
- B) temperaturë
- C) humbje oreksi
- D) zverdhje

Ku konsiston ndërhyrja e foshnjes së lindur me ikter?

- A) vendosja nën oksigjen
- B) dhënia e antibiotikëve
- C) bërja e transfuzioneve
- D) futja në fototerapi

Cila është simptoma që tregon frakturë të klavikulës?

- A) Shtrembërim të cepit të buzës
- B) Dhimbje kur i prek krahun
- C) Hematomë te fytyrës
- D) Rënie të cepit të syrit

Cili organ luan rol në eliminimin e bilirubinës, gjatë jetës fetale?

- A) placenta
- B) mushkëria
- C) zemra
- D) pankreasi

Cila është ndëhyja e parë, që bëhet në foshnjen me asfiksi?

- A) Ushqyerja
- B) Rregullimi i temperaturës
- C) Aspirimi
- D) marrja e analizave

Apnea është?

- A) frymarrje e shpejtë
- B) frymarrje e ngadaltë
- C) pauz në frymëmarrje
- D) frymarrje normale

Cila është simptomë e stenozés hipretrofike të pilorit?

- A) cianozë
- B) frymëmarrje e vështirësuar
- C) Apnoe
- D) të vjella, si shatërvan

Cila është masa e parë që marrim për parandalimin e përhapjes së infeksionit?

- A) dhënia e oksigjenit
- B) rregullimi i temperaturës
- C) izolimi i foshnjës
- D) bërja e ekzaminimeve

Me çfarë trajtohet hypoglicemia

- A) dhënia kaliumit
- B) dhënia e antibiotikëve
- C) dhënia e bikarbonat natriumi
- D) dhënia e perfuzioneve me glukozë 5%

Në sa stade ndahet periudha neonatale

- A) 2 stade
- B) 4 stade
- C) 5 stade
- D) 6 stade

Kur bëhet ushqyerja me sondë nazo-gastrike?

- A) në fëmijët me ikter
- B) në fëmijët me frakturë të klavikulës
- C) në fëmijët me buzë dhe qelzë të carë
- D) në fëmijët me asfiksi

Cili është shkaktarë për një lindje asfiktike?

- A) lindja ne term
- B) lindja me sexio-cezarea
- C) lindja post – term

D) Lindja podalike

Me çfarë trajtohet nje infeksion umbelikal?

- A) me antibiotic
- B) me natri-bikarbonat
- C) me alkol 70 gradë
- D) me perfuzioneI/V

Cili nga këta faktorë nuk ndikon në shfaqen e diaresë?

- A) Mosha e fëmijës.
- B) Kequshqyerja ose humbja në peshë.
- C) Higjena e pastër.
- D) Mosruajtja e mire e ushqimeve.

Cila nga shkallët e dehidrimit nuk është e saktë?

- A) E lehte = 10%
- B) Mesatare = 15%
- C) E rëndë = 20%
- D) E rëndë = 25%

Cila është e gabuar, në shkaktarët e obezitetit?

- A) Faktorët metabolik
- B) Trashëgues
- C) Nënushqyerja

D)Psikologjik

Cili nga kujdesjet nuk bën pjesë në trajtimet e anoreksisë?

- A)Kujdesi ndaj malnutricionit
- B)Fillimi i një diete të pasur dhe me lëngje
- C)Mbështetja psikologjike.
- D)Përdorimi i laksativëve.

Cili nga shkaktarët nuk bën pjesë në stomatit?

- A)Sëmundjet sistemike
- B)Traumat
- C)Dalja e dhëmbëve
- D)Higjena e pastër

Kandidoza orale është?

- A)Infeksion kërpudhor
- B)Inflamacion i mukozave orale
- C)Ulcer e membranave të mukozave të gojës.
- D)Sëmundje sistemike

Cili është ekzaminimi që përcakton llojin e parazitit?

- A)Gjak komplet
- B)Urokulturë

C)Koprokulturë.

D)Sputum

Në cilin nga helmimet nuk këshillohet nxitja e të vjellave?

A)Helmimet nga medikamentet

B)Helmimet nga ushqyerja

C)Helmimet nga salicilatet

D)Hemimet nga lëndët grryese.

Cili nga këto nuk është shkaktarë i shfaqes së alergjive.

A)Ushqimi

B)Medikamentet

C)Mungesa e hekurit

D)Pluhurat.

Cili është i gabuar në klasifikimin e reaksioneve hipersensitive?

A)Reaksion anafilaktik

B)Reaksion indor specifik

C)Reaksion imun kompleks

D)Reaksion i shpejtë.

Në mjekimin e shokut anafilaktik nuk ndikon?

- A)Adrenalina
- B)Ultrakorteni
- C)Aspirina
- D)Antihistaminikët

Cila nga simptomat e mëposhtme nuk vërehet në sëmundjen e serumit?

- A)Edema
- B)Eritema
- C)Hypotirozë
- D)Edeme laringu

Cila është zona ku nuk shfaqet dermatiti seborroik?

- A)Skalpi
- B)Balli
- C)Zona inguinale
- D)Shputat e këmbëve
- E)Prapa veshit

Cili nga këto shkaktarë nuk e shkaton mungesën e vit D?

- A)Niveli i ulët social-ekonomik
- B)Keqpërthithja e lëndëve ushqimore
- C)Ekspozimi në diell
- D)Banimi në zona të ndotura.

Cila nga këta ushqime nuk e përmban vitD

- A)Vaji i peshkut
- B)Bulmeti
- C)Dritherat
- D)Mishi

Deformimet kockore të avitaminozes D.

- A)Deformim toraksit
- B)Të kolonës vertebrale
- C)Të anësive
- D)Të kockave të fytyrës
- E)Të kockave të kraniumit

Cila nga simptomat e mëposhtme nuk vërehet në sëmundjen e serumit?

- A)Edema
- B)Eritema
- C)Hypotirozë
- D)Edeme laringu
- E)Temperaturë

Cila është zona ku nuk shfaqet dermatiti seborroik?

- A)Skalpi
- B)Balli
- C)Zona inguinale

D)Shputat e këmbëve

E)Prapa veshit.

Cila nga alternativat është e saktë, për nevojat e organizmit për jod?

A)55-180 mikrogram

B)65-175 mikrogram

C)80-120 mikrogram

D)75- 150 mikrogram

Cila nuk bën pjesë në simptomat e mëposhtme, në teprinë e vit D?

A)Dobësi trupore

B)Vonesë e theksuar në rritje

C)Dhimbje kockash

D)Oreks i shtuar

E)Fraktura patologjike

Tetania shfaqet kur, cila është e saktë?

A)Niveli i kalciumit serik ulet nën 7-7.5mg

B)Niveli i kalciumit serik ulet nën 9-9.5mg

C)Niveli i kalciumit serik ulet nën 8-8.5mg

D)Niveli i kalciumit serik ulet nën 6-6.5mg

Cila nuk është e saktë, në shenjat e fëmijëve me hypotiroide, në lindje?

- A)Ikteri fiziologjik
- B)Dalje e shpejtë jashtë
- C)Probleme respiratore
- D)Vështirësi në ushyerje

Cila nga këto shenja nuk bën pjesë në sëmundjen e osteomielitit?

- A)Temperturë e lartë
- B)Zona e prekur e skuqur dhe e nxehtë
- C)Epistaksis
- D)Gjymtyrë e dhimbshme
- E)Muskuj të tendosur

Cilën nga këto nuk prek osteomieliti?

- A)Tibian
- B)Shputat e këmbëve
- C)Humerusin
- D)Shputat e duarve

Cili nga parametrat ndryshon shumë në osteomielit?

- A)Eritrocitet
- B)Leukocitet
- C)Hemoglobina
- D)Hematokriti

Cilën nga të dhënat e mëposhtme prek artriti?

- A) Veshkën
- B) Mushkëritë.
- C) Kycet
- D) Pankreasin

Cila nga këto shenja nuk bën pjesë në artrit

- A) Inflamacion lokal
- B) Lëvizjes spontane të kyceve
- C) Humbje të vetëdijes
- D) Temperaturë.

Cili nga ekzaminimet e mëposhtme është i saktë në defektet e lindura të zemrës?

- A) Skaner
- B) Radiografi
- C) Rezonancë
- D) Ekografi

Cili nuk e shkakton artritin, nga të dhënat e mëposhtme?

- A) E. Coli
- B) Haemophilus influenzae
- C) Salmonela
- D) Stafilokok

Cila nuk është e saktë në ndërhyrjet e tonsilitit?

- A)Ulja e temperaturës
- B)Dhënia e antibiotikëve
- C)Dhënia e transuzioneve
- D)Dhënia e një diete të butë dhe me lëngje.

Cila nuk është e saktë në ndërhyrjet post – operatore të tonsilitit?

- A)Monitorimi
- B)Pozicionohet shtrirë dhe drejtë
- C)Vlerësohet për shenjat e hemoragjisë
- D)Fillohen perfuzione I/V.

Cila nuk është e saktë në ndërhyrjet e tonsilitit?

- A)Ulja e temperaturës
- B)Dhënia e antibiotikëve
- C)Dhënia e transuzioneve
- D)Dhënia e një diete të butë dhe me lëngje.

Cila nuk është e saktë në ndërhyrjet post – operatore të tonsilitit?

- A)Monitorimi
- B)Pozicionohet shtrirë dhe drejtë
- C)Vlerësohet për shenjat e hemoragjisë

D)Fillohen perfuzione I/V.

(Përgjigja e saktëB)

Skarlatina shkaktohet nga?

A)Bordetella pertusis

B)Corynae bacterium diphtheriae

C)Streptokoku B hemolitik i grupit A.

D)Bakteriet

Cila nga shenjat e mëposhtme nuk është e saktë, në rihnit?

A)Teshitje

B)Obstruksion I rrugëve të frymëmarrjes

C)Temperaturë

D)Sekrecione

Cila nga këto sëmundje nuk bën pjesë në LTB?

A)Laringotrakeiti

B)Epiglottis

C)Bronkioliti

D)Trakeiti bacterial

(Përgjigja e saktë C)

Cila nga këto shenja nuk bën pjesë në LTB?

A)Temperaturë

D)himje fyti

C)Melena

D)Vështirësi në frymëmarrje

Cila nuk ben pjesë në ndërhyrjet e laringo-trakeo –bronkitit?

A)Ruajtja e pastër e rrugëve ajrore

B)Dhënia e oksigjeno-terapisë

C)Plotësimi i nevojave me lëngje

D)Dhënia e vit D

E)Sigurimi i pushimit dhe qetësisë.

Cila nga këto nuk bën pjesë në sëmundjet e rrugëve të poshtme respiratore?

A)Bronkopneumonia

B)Bronkiti

C)Bronioliti

D)Trakeiti

E)Pneumonia

Cila nuk bën pjesë në kujdesin për pulmonet?

A)Dhënia e Heparinës

B)Aerzoloterapia

C)Aspirimi i sekrecioneve

D)Oksigjenoterapia

Cili nga medikamentet e mëposhtme nuk jepet në astmën bronkiale?

- A) Bronkodilatatorët
- B) Kortikosteroidet
- C) Levotiroksina
- D) Antiacidet

Cili nga aparatet e mëposhtme preket më shumë fibroza cistike?

- A) Aparati genito-urinar.
- B) Aparati i frymëmarrjes
- C) Aparati kardio-vaskular
- D) Pankreasi

(Përgjigja e saktë B)

Në cilën nga të dhënat e mëposhme nuk bazohet diagnoza e FC.

- A) Historinë e sëmundjes familjare
- B) Në mungesën e enzimave pankreatike
- C) Në dhimbjen abdominale
- D) Në rritjen e koncentrimin elektrolitik të djersës

Cila nga ekzaminimet e mëposhtme në sëmundjet kardiovaskulare, është e saktë.

- A) Gjak komplet
- B) ECO
- C) EKG
- D) Radiografi
- E) Të gjitha

Cila nga kriteret e meposhtme, nuk është manifestim klinik madhor i ethes?

- A)Karditis
- B)Poliarttriti
- C)Artralgjia
- D)Eritema

Shkaktojnë endokardit bakterial të gjitha, me përjashtim të?

- A)Streptokoku
- B)Enterokoku
- C)Gonokoku
- D)Rikecia

Kemi anemi kur hemoglobina është?

- A)Hemoglobina është nën 12g/dl (6 – 12 vjec).
- B)Hemoglobina është 12g/dl (6 muaj – 6 vjec)
- C)Hemoglobina është 13g/dl (6muaj – 6 vjec)
- D)Hemoglobina është nën 11g/dl (6muaj – 12 vjec)

Cfarë vihet re në ekzaminimin fizik të një fëmije anemik?

- A)I zbehtë
- B)I dobët, i lodhur
- C)Anoreksik
- D)Ekstremitete të ftohta

E)Të gjitha

Cila nuk bën pjesë në efektet klinike të talasemisë major?

- A)Difektet në sintezën e hemoglobinës A
- B)Dobësim i strukturës së qelizave të kuqe të gjakut
- C)Rritje e numrit të leukociteve
- D)Jetëgjatësia e shkurtër e eritrocitit.

Cila nga fazat e koagulimit të gjakut në sëmundjen e hemofilisë është e saktë?

- A)Formimi i tromboplastinës inaktive në aktive
- B)Transformimi i protrombinës në trombinë
- C)Transformimi i fibrogjenit në fibrinë.
- D)Të gjitha

Cilët nga elementët e analizës së gjakut, është i rritur në leucemi?

- A)Eritrocitet
- B)Hemoglobina
- C)Leukocitet
- D)Sedimenti

Në sindromin nefrotik kemi?

- A)Hypoproteinemi
- B)Hypovolemi

- C)Edema
- D)Të gjitha

Cili nga sindromet nefrotike nuk ka sukses me terapinë dhe con në vdekje?

- A)Sindromi nefrotik kongenital
- B)Sindromi nefrotik sekondar
- C)Sindromi nefrotik idiopatik

Cila çon në urinim të pavullnetshëm?

- A)Sindromi nefrotik
- B)Glomerulorulo nefriti
- C)Eneurezis nokturna
- D)Insuficiensa renale

Në rast se trupi i huaj ka bere nje bllokim te pjesshem te lymenit do kemi:

- A)Emfizem obstruktive
- B)Atelektaze
- C)Pneumotoraks
- D)Sekrecione

Cila nuk bën pjesë në ndërhyjet e IRA?

- A)Monitorimi i shenjave vitale
- B)Llogaritja me saktësi e marrjen dhe nxjerrjen e lëngjeve
- C)Administrimi i medikamentave

D)Kryerja e ushtimeve fizike

E)Parandalimi i infeksioneve.

Cila nga këto faza i përket sëmundjes së pertusit?

A)Faza katarale

B)Faza proksimale

C)Faza e kovalishencës

D)Të gjitha

Meningiti përhapet me anë të?

A)Rrugës ajrore, spërklave

B)Rrugës hematogene

C)Rrugës aerogene

D)Ushqimit

Cila nga simptomat e mëposhtme si përket meningitit?

A)Dhimje koke, dhimbje muskujsh, dhimbje kycesh

B)Të vjella

C)Temperaturë

D)Enjtje të gjëndrave parotis

E)Konvulsion

Cilat nga të dhënat e mëposhtme prek encefaliti?

A)Brinjët e përparme të palsës së kurrizit

B)Prek indin granular dhe sistemin nervor

C)Prek meninget dhe parenkimën e trurit

D)Prek aparatit e frymëmarrjes

Cili nga këto manifestime klinike, tregon për sëmundjen e hemofilisë?

A) rënie në peshe

B)Vështirësi në frymëmarrje

C)Melena

D)Të vjella

Cila nga këto shenja nuk bën pjesë në klinikën e bronkiolitit?

- A)temperaturë 38- 39
- B)dhimbje koke
- C)vështirësi në frymëmarrje
- D)konvulsione

Cila nga këto ndërhyrje nuk bën pjesë në LTB?

- A)dhënia e transfuzioneve të gjakut
- B)pastrimi i rrugëve të frymëmarrjes
- C)bërja e antibiotiko-terapisë
- D)Dhënia e oksigjenoterapisë

Cili nuk është shkaktarë i bronkopneumonisë?

- A)bakteriet
- B)Streptokoku
- C)Pneumokoku
- D)Stafilokoku

Cila nga simptomat e mëposhtme nuk është e pranishme në meningit?

- A)temperatura
- B)ethe
- C)rigiditet i muskujve

D)çrregullim i ritmit të zemrës

Cila nuk bën pjesë në trajtimin e fëmijës me anemi

A)aerozolo-terapia

B)dhënia e vit B12

C)dhënia Fe

D)dhënia e një diete të pasur me Fe

Cila nuk bën pjesë në ndërhyrjen e pacientëve me IRA?

A)kufizimi i kriprave

B)dhënia e antibiotiko-terapisë

C)bërja e dializës

D)dhënia e lëngjeve

Fibroza cistike është?

A) sëmundje genetikisht e trashëguar

B) sëmundje e fituar

C) sëmundje që shkatohet nga viruse

D) sëmundje që shkatohet nga bakteriet

Cila nuk bën pjesë në manifestimet klinike të trombocitopenisë?

- A) hematemezis
- B) melena
- C) hemoragji e gingivave
- D) temperaturë

Meningiti është?

- A)Inflamacion i meningeve
- B)Sëmundje virale
- C)Sëmundje bakteriale
- D)Sëmundje e trashëguar

Cili është shkaktari i variçelës?

- A) nga një virus
- B) vriçela zoster
- C)virusi paramiksovirus
- D)bakteriet

sa zgjat peridha e inkubacionit tek Robeola?

- A)10-20 ditë
- B)17-30 ditë
- C)6- 7 ditë
- D)14-21 ditë

Cili nga shkaktarët e mëposhtëm nuk është i hepatit?

A)Virusi i hepatititA

B)Virusi i hepatititB

C)Virusi i hepatititD

D)Virusi i hepatititG

Cila nuk është rruga e saktë e transmetimit të heptit B?

A)Aerogene

B)Ushqyerjes

C)Hematogene

D)Spërklave

Cila është rruga e transmetimit të fruthit?

A)Nëpërmjet rrugëve të frymëmarrjes, spërklave

B)Rrugës hematogene

C)Perfuzioneve I/V

D)Kontaktit të lëkurës

Cila nuk bën pjese në ndërhyrjet e glomerulonefriti akut?

A)Monitorohet statusi i lëngjeve

- B)Parandalimi I infeksionit
- C)Dhënia e oksigjeno-terapisë
- D)Kujdesi për dëmtimin e lëkurës

eneurezis nokturna është

- A)Urinit normal
- B)Urinit me ndërprerje
- C)Urinit i shpeshtë
- D)Urinit i pavullnetshëm natën

përgjegjësia kryesore e veshkave është

- A)Të mbajë constant volumin e lëngjeve
- B)Të mbajë constant frymëshkëmbimin
- C)Të mbajë constant ritmin e zemrës
- D)Të mbajë constant qarkullimin e gjakut

cila nga përgjigjet nuk është e saktë, në fëmijët me sindrom Daën?

- A)Kanë qëndrim hypotonik
- B)Pëllëmba e dorës me rrudha
- C)Fytyra me pamje normale
- D)Gishti i madh i dorës i vecuar

Forma më e rëndë e krizave epileptike, quhet

- A) Humbje e vetëdijes
- B) Marrje mendsh
- C) Status epileptik
- D) Gjendje të fikti

në analizën e gjakut të fëmijëve me leuçemi, kemi rritje?

- A) Të eritrociteve
- B) Hemoglobinës
- C) Hematokritit
- D) Leukociteve

në purpurën trombocitopenike, ulja e trombociteve është?

- A) Nën $150.000/\text{mm}^3$
- B) Nën $140.000/\text{mm}^3$
- C) Nën $130.000/\text{mm}^3$
- D) Nën $120.000/\text{mm}^3$

Sa shkurtohet jeta e eritrocitit tek trombocitopenia?

- A) 2-4 dite
- B) 3-5 dite

C)6-8 dite

D)7-10 dite

cilin nga këto organe nuk prek ethja reumatizmale?

A)Zemrën

B)Kockat

C)SNQ

D)Veshkat

Cili nga apartet preket në 90% të rasteve nga fibroza cistike

A)Aparati genito-urinar

B)Aparati kadiak

C)Aparati respirator

D)Aparati i SNQ

Cila nuk bën pjesë në shenjat e astmës bronkiale?

A) kolla e thatë

B)Vështirësi në frymëmarrje

C)Fishkëllima në ekspirim

D)Urinitim i pavullnetshëm

Dhënia e glucideve ndihmon në:

- A)Kursimin e proteinave të organizmit.
- B)Pakësimin e rezervave të glikogjenit.
- C)Prodhimin e proteinave dhe glikogjenit.
- D)Eliminimin e proteinave dhe glikogjenit.

Fëmijët me kequshqyerje rrezikojnë:

- A)Nga plagët e dekubituseve.
- B)Nga plagët e kavitetit oral.
- C)Nga plagët e narinës.
- D)Nga plagët te lobi i veshit.

Gjatë vitit të parë të jetës, fëmija duhet të marrë:

- A)Vitaminë D 1000-1200UI në ditë.
- B)Vitaminë D 2000-2200UI në ditë.
- C)Vitaminë D 2500-2800UI në ditë.
- D)Vitaminë D 2800-3000UI në ditë.

Tetania është:

- A)Një gjendje e shtuar ekstabiliteti neuromuskular.
- B)Një gjendje e pakësuar ekstabiliteti neuromuskular.
- C)Një mungesë totale ekstabiliteti neuromuskular.
- D)Një gjendje e shtimit dhe pakësimit në të njëjtën kohë.

Tetania shfaqet atëherë kur niveli i kalciumit serik:

- A)Ulet nën 7-7.5mg%.
- B)Ngrihet mbi 7-7.5mg.
- c)Ngrihet mbi 7-8.5mg.
- D)Ngrihet mbi 8.5-9mg.

Ç'është Ketoacidoza diabetike?

- A)Shtim i theksuar i insulinës.
- B)Mungesë e theksuar e insulinës.
- C)Pakësim i kalciumit.
- D)Pakësim i elektroliteve.

Dhimbjet e barkut gjithmonë kanë të bëjnë me problem kirurgjikal:

- A)Është pohim i vërtetë.
- B)Nuk është i vërtetë.
- C)Jo gjithmonë.
- D)Gjithmonë.

Ç'rregullimet kryesore të tretjes janë:

- A)Izotonik
- B)Hipotonik
- C)Hipertonik
- D)Enteriti.

Shkallët e dehidrimit janë:

- A)I lehtë 5%;mesatar10%;i rëndë15%.
- B)I lehtë 10%;mesatar 15%;i rëndë20%.
- C)I lehtë 15%;mesatar20%;i rëndë 25%.
- D)I lehtë 20%;mesatar25%;i rëndë 30%.

Faktorët që përcaktojnë vendosjen e trupave të huaj bronkiale janë:

- A)Adaptim jo i mirë me kalibrin e bronkut.
- B)Mungesë mprehtësie që pengon zhytjen e tij.
- C)Tkurrja totale.
- D)Edema reaksionale e bronkut.

Trupat e huaj në trake manifestohen:

- A)Vështirësi në frymëmarrje
- B)Mungesë kolle.
- C)Skuqje të fytyrës.
- D)Frymëmarrje normale.

Nëse bronkoskopia rigide dështon:

- A)Është i nevojshëm trajtimi kirurgjikal
- B)Nuk është i nevojshëm trajtimi kirurgjikal.
- C)Përdoren mënyra të tjera.
- D)Nuk ekzistojnë mënyra të tjera.

Ç'është epistaksis?

- A) Është gjakrrjedhja nga hundët
- B) Është gjakrrjedhja nga goja.
- C) Është gjakrrjedhja nga veshët
- D) Është mpiksja e gjakut

Tyneloli mund të aplikohet:

- A) Brenda në hundë.
- B) Brenda në veshë.
- C) Brenda në gojë.
- D) Nën lëkurë.

Virusi respirator sincicial është:

- A) Shkaku kryesor në 70% të rasteve
- B) Shkaku kryesor në 50% të rasteve.
- C) Nuk është shkak kryesor te bronkoliti
- D) Nuk ekziston fare si mundësi.

Matja e gazeve në gjak është e rëndësishme:

- A) Për të testuar influencën e tyre.
- B) Për mbulimin e agjentit etiologjik.
- C) Për të gjykuar gravitetin e sëmundjes.
- D) Për kodifikimin e tyre.

Bronkopneumonia:

- A) Takohet në të gjitha moshat
- B) Takohet në moshën e tretë
- C) Takohet në adoleshencë.
- D) Takohet në parashkollorë.

Mjekimi specifik i astmës:

- A) Vitaminat.
- B) Tirotoksikoza.
- C) Acidet.
- D) Bronkodilatatorët.

Disavantazhi i aeorozolit është:

- A) Medikamentet nuk absorbohen me shpejtësi.
- B) Fëmija mund të kërkojë administrimin e tij shumë shpesh.
- C) Medikamentet veprojnë me shpejtësi.
- D) Minimizon efektet e përgjithshme.

Ç'është hidroklortiaziti dhe përse përdoret?

- A) Është diuretik dhe përdoret për të ulur edemën.
- B) Është vitaminë dhe përdoret për rritje rezistence.
- C) Është antidepressiv dhe përdoret për gjendjet depresive.
- D) Është atropine dhe përdoret për relaksim e muskulaturës së pilorit.

Procesi i kujdesjeve në pediatri përfshin:

- A) Moskryerja e ekzaminimeve fizike.
- B) Vendosjen e diagnozës.
- C) Mjekimi i menjëhershëm.
- D) Zbatimi i planeve të kujdesjeve.

Synimi i kujdesjeve infermiere është:

- A) Të bëjë të mundur që fëmija të rritet.
- B) Të krijojë kushte për pranim.
- C) Të plotësohet në mirëqenien e vet.
- D) Të kujdeset për krijimin e figurës së vet.

Analizat që kryhen tek i porsalinduri prematur:

- a) Gjak komplet, gjak për glicemi.
- B) Analize fecesh, urinë.
- C) Prova e absorvimit.
- D) Të gjitha analizat e mundshme.

Vlerësimi për veten i përket:

- A) Gjykimit personal.
- B) Gjykimit përgjithësues.
- C) Gjykimit asnjës.
- D) Gjykimit pa subjekt.

Për të parandaluar pasojat e ftohjes:

- A)Prematuri vendoset në inkubator.
- B)Në një dhomë sido që të jetë.
- C)I vishen rroba të trasha.
- D)Temperatura e dhomës të jetë sa më e lartë.

Shpenzimi minimal i O₂ ndodh:

- A)Kur temperatura sipërfaqësore e lëkurës është 36.5c.
- B)Kur temperatura sipërfaqësore e lëkurës është 36.8c.
- C)Kur temperatura sipërfaqësore e lëkurës është 37c.
- D)Kur temperatura sipërfaqësore e lëkurës është 37.2c.

Metodat më të përdorura për ruajtjen e temperaturës tek fëmijët janë:

- A)Rrobat me materiale të leshta.
- B)Llambat ngrohëse, borsat me ujë të ngrohtë.
- C)Lejimi i temperaturave sa më të larta.
- D)Banjat me ujë sa më të nxehtë.

Te kujdesjet për lëkurën e fëmijës këshillohet:

- A)Përdorimi i sapunëve
- B)Përdorimi i locioneve alkaline
- C)Çdo lloj solucion larës.
- D)Jo çdo lloj solucion.

Nevojat themelore të fëmijës:

- A)Nevojat e jetës së përditshme

B)Ushqimi dhe uji.

C)Mbajtja afër.

D)Ajër i pastër.

Për të parandaluar fleksionin e qafës:

A)Vendoset një jastëk nën shpatull.

b)Nuk vendoset jastëk nën shpatull.

C)Vendoset një jastëk mbi shpatull

D)Nuk vendoset jastëk mbi shpatull.

Nëse ndërpritet ushqyerja me gji:

A)Ulet niveli serik i bilirubinës.

B)Ngrihet niveli serik i bilirubinës.

C)Niveli serik i bilirubinës s'leviz.

D)Niveli serik i bilirubinës ngrihet dhe ulet.

Me rritjen e moshës së shtatzënisë:

A)Frekuenca respiratore ulet.

B)Frekuenca respiratore ngrihet.

C)Frekuenca respiratore s'pëson ndryshim.

D)Ndryshimet respiratore janë të pakonsiderushme.

Mekanizmat e thithjes dhe të tretjes:

A)Përcaktohen pas lindjes.

B)Përcaktohen para lindjes.

C)Përcaktohen shumë më vonë.

D)Nuk përcaktohen absolutisht.

Disa nga faktorët që shkaktojnë asfiksionë:

A)Moshë e nënës, e shtatzënisë.

B)Lindjet në kohë, barrë e rregullt.

C) Mospërdorimi i medikamenteve.

D)Problemet psikologjike.

Fototerapia e zgjatur ka efekte:

A)Parësore.

B)Dytësore.

C)Parësore-Dytësore.

D)Të pariparueshme.

Shenjat e etes tek i porsalinduri:

A)Lëkurë e thatë.

B)Shtim të urinimit.

C)Fytyra dhe trupi tregojnë ngritje në peshë.

D)Ulje të temperaturës.

Traumat e indeve të buta shkaktohen:

A)Kur ka disproporcion cefalopelvik

B)kur nuk ka disproporcion pelvik

C)Kur ka proporcion cefalopelvik

D)Si pasojë e dëmtimeve të ndryshme.

Në hemoragjitë umbilikale:

A)Injektohet vit.D për parandalim.

B)Injektohet vit .A për parandalim.

C)Injektohet vit.K. për parandalim.

D)Injektohet vit.C për parandalim.

Edemat serosanguine:

A)Nuk janë leziona cefalike.

B)Janë leziona cefalike.

C)Janë leziona cefalo-pelvike.

D)Nuk janë leziona të asnjë lloji.

Ç'është stenoza e pilorit?

A)Blokim hipertrofik i muskulit rrethues të kanalit të pilorit.

B)Zgjerim i muskulit rrethues të kanalit të pilorit.

C)Blokimi dhe zgjerimi në të njëjtën i muskulit rrethues.

D)Ç' rregullim Hidro-elektrolitik.

Obeziteti është i shoqëruar nga:

A)Pasoja mjekësore, psikologjike.

B)Vetëm pasoja mjekësore.

C)Vetëm pasoja psikologjike.

D)Luhatje sipërfaqësore.

Zhvillimi i adiposity në disa raste mund të rritet:

- A) Në moshën e tretë.
- B) Në pesë vitet e para të jetës.
- C) Adolehencën e vonë.
- D) Në çdo kohë.

.

Medikamentet që shkaktojnë humbjen në peshë tek anoreksikët:

- A) Laksativët, diuretikët
- B) Imipramina, deprimina.
- C) Antepar, povan.
- D) Aspirina, Fe sulfat.

Leukopenia është:

- A) Humbja e bilancit të elektroliteve.A)
- B) Shtimi i bilancit të elektroliteve.
- C) Ekuilibër acido-bazik
- D) Disekuilibër acido-bazik.

Në rastet e një reaksioni të rëndë nga pickimi i grerëzës apo bletës:

- A) Bëhet lavash stomaku.
- B) Injektohet vit.K.
- C) Bëhet adrenalinë, ultrakorten.
- D) Injektohet vit.A+D.

Alergjia është:

- A) Hipersensibilitet ndaj një substance.
- B) Hyposensibilitet ndaj një substance.
- C) Përqasje e virozave të stinës
- D) Komplikacion nga substancat toksike.

Dhënia e luminalit jepet:

- A) Vetëm në rrugë intravenoze.
- B) Në rrugë orale, muskulare
- C) Vetëm nga goja.
- D) Me transfuzion gjaku.

Eritroblastoza fetale quhet ndryshe:

- A) Sëmundje hemolitike e të porsalindurit.
- B) Sëmundje ikterike e të porsalindurit.
- C) Sëmundje bakteriale e të porsalindurit.
- D) Sëmundje e sistemit respirator e të porsalindurit.

Me çfarë trajtohet hipokalcemia?

- A) Trajtohet me dhënien e kalciumit.
- B) Trajtohet me dhënien e glukozës.
- C) Trajtohet me dhënien e serumeve.
- D) Trajtohet me dhënien e O₂.

Me çfarë trajtohet hipoglicemia?

- A) Me dhënien e tresolit.
- B) Me dhënien e kalciumit.
- C) Me perfuzion solucion glukoze.
- D) Me dhënien e vit.A.

Kuicet e Obstetrike –Gjinekologjisë

1. Cili nga këto hormone nuk prodhohet nga placenta gjatë barrës:
 - A) Gonadotropina korionike humane (hCG)
 - B) Hormoni laktogjen placentar
 - C) Prolaktina
 - D) Progesteroni
2. Cili nga këto hormone perdoret për diagnozën kimike të barrës:
 - A) Gonafotropina korionike humane (hCG)
 - B) Prolaktina
 - C) Progesteroni
 - D) Estradioli
3. Cili nga hormonet e mëposhtme siguron zhvillimin dhe mbajtjen e barrës:
 - A) Gonafotropina korionike humane (hCG)
 - B) Prolaktina
 - C) Progesteroni
 - D) Estradioli
4. Cili nga hormonet e meposhtme është tregues i mireqenies së unitetit materno-feto-placentar:
 - A) Gonafotropina korionike humane (hCG)
 - B) Prolaktina
 - C) Progesteroni
 - D) Estradioli
5. Cila është frekuenca e rrahjeve të zemres fetale RZF:

- A) 70-80/min
 - B) 90-110/min
 - C) 120-160/min
 - D) > 160/min
6. Cila nga këto mundësi nuk është e pranishme në javën e 12-të të shtatzanisë:
- A) Amenorea
 - B) Hormoni bhCG në gjak
 - C) Rrahjet e zemres fetale në ekografi
 - D) Levizjet fetale të ndjera nga nena
7. Kordoni umbilikal përmban
- A) Dy vena dhe një arterie
 - B) Dy arterie dhe dy vena
 - C) Dy arterie dhe një venë
 - D) Një arterie dhe një venë
8. Volumi i gjakut në barrë rritet me
- A) 10-20 %
 - B) 30-40 %
 - C) 50-60 %
 - D) 70-80 %
9. Diametri më i madh i kokës fetale është
- A) Suboksipital
 - B) Oksipito-mental
 - C) Biparietal
 - D) Oksipito-frontal
 - E) Bitemporal
10. Në cilën javë të shtatzanisë fillojnë të dallohen gjenetalet e jashtme fetale:
- A) Javën e 8-te
 - B) Javën e 9-te
 - C) Javën e 10-te
 - D) Javën e 11-te
 - E) Javën e 12-te
11. Një grua që nuk ka lindur e që nuk ka ngelur ndonjëherë me barrë quhet:
- A) Nulligravida
 - B) Nullipare
 - C) Primi gravida

D) Primipare

12. Si quhet pariteti korrekt i nje gruaje qe ka patur nje abort ne tremujorin e pare, nje barre ektopike dhe nje barre gemelare ne terme:

A) Nullipare

B) Nulligravide

C) Primipare

D) Multipare (pluripare)

13. Si quhet pariteti korrekt i nje gruaje qe ka patur dy aborte, nje abort spontan 22 jave dhe nje lindje cezariane per soference fetale:

E) Nullipare

F) Nulligravide

G) Primipare

H) Multipare (pluripare)

14. Fraktura me e shpeshte kockore gjate lindjes se fetusit eshte

A) E femurit

B) E kraniumit

C) E humerusit

D) E klavikules

15. Puerperium quhet:

A) Periudha menjëherë pas lindjes deri në 4-6 javë pas lindjes

B) Periudha para fillimit te aktivitetit të lindjes

C) Periudha e aktivitetit të lindjes

D) Asnjera nga keto

16. Cila nga substancat e meposhtme clirohet ose është pergjegjëse për prodhimin e qumështit të gjirit (laktogjenezën):

A) Estrogjeni

B) Progesteroni

C) Oksitocina

D) Prostaglandinat

E) Prolaktina

17. Cila nga substancat e mëposhtme clirohet ose është pergjegjese për rrjedhjen (daljen) e qumështit të gjirit:

A) Estrogjeni

B) Progesteroni

C) Oksitocina

- D) Prostaglandinat
 - E) Prolaktina
18. Cila nga substancat e mëposhtme është përgjegjëse për involucionin uterin:
- A) Estrogjeni
 - B) Progesteroni
 - C) Oksitocina
 - D) Prostaglandinat
 - E) Prolaktina
19. Cila nga pohimet e mëposhtme është e saktë për kontracepsionin pas lindjes:
- A) Duhet filluar menjëherë tek gruaja që nuk ushqen bebin me gji
 - B) Nuk është i rëndësishëm tek gruaja që ushqen bebin me gji
 - C) Nuk është i rëndësishëm deri në shfaqjen e menstruacioneve të para
 - D) Nuk është i nevojshëm për një muaj pas Sectio Cezarea
20. Cila nga keto përcaktime përshkruan në mënyrë korrekte paraqitjen podalike të plotë:
- A) Këmbët dhe kofshët e fetusit janë të flektuara
 - B) Këmbët e shtrira dhe kofshët e flektuara
 - C) Këmbët dhe kofshët e shtrira
 - D) Asnjëra nga të mësipërmët
21. Cila nga këto paraqitje i referohet paraqitjes me koke të fetusit:
- A) Podalike
 - B) Cefalike
 - C) Oblike
 - D) Transversus
22. Ne cilën nga situatat e mëposhtme mund të pohohet se ka ndodhur aplikimi (fiksimi) i pjesës prezantuse;
- A) Koka fetale është në pelvis
 - B) Diametri biparietal i kokës fetale ka kaluar planin e hyrjes pelvike
 - C) Verteksi është në pozicion transvers
 - D) Koka fetale është flektuar
23. Cila nga keto substanca do i mungojë një gruaje vegjetariane gjatë barrës:
- A) Kalciumi
 - B) Acidi folik
 - C) Hekuri
 - D) Vitamina B12
 - E) Proteina

24. Cila nga indikacionet dietetike të mëposhtme NUK është e duhura për gruan shtatzënë:
- A) Ulja e perdorimit të kripës
 - B) Shtesa e kalciumit
 - C) Shtesa e hekurit
 - D) Shtimi i acidit folik
 - E) Shtimi i të paktën 6 kg peshë në barrë
25. Nje grua ne shtatzanine e pare te saj pi nje pakete cigare ne dite. Ne ekzaminimin ekografik te tremujorit te trete, per se duhet te kerkojme:
- A) Vellimin e likidit amniotik
 - B) Rritjen fetale
 - C) Anomalite fetale
 - D) Levizjet fetale
 - E) Levizjet respiratore fetale
26. Cili nga ekzaminimet e mëposhtme nuk është test i zakonshem gjatë nje barre pa komplikime:
- A) Dozimi në serum i bhCG
 - B) Hemoglobina
 - C) Testet imunologjike
 - D) Pap testi
 - E) Grupi i gjakut dhe faktori Rh
27. Cili nga kushtet e mëposhtme NUK lidhet me një shtim të riskut të sëmundshemrisë perinatale:
- A) Kushtet e dobëta socioekonomike
 - B) Moshë e nënës nën 20 vj
 - C) Duhanpirja
 - D) Alkolizmi
 - E) Ushtrimet fizike
28. Cili nga kushtet e mëposhtme Nuk lidhet me moshën e nënës në 20 vj:
- A) Peshë e ulët në lindje
 - B) Vdekje fetale
 - C) Diskinezi uterine
 - D) Anomali gjenetike të konceptimit
 - E) Lindje premature
29. Cili nga pohimet e mëposhtme Nuk është korrekt për faktorët e riskut në barrë:

- A) Nje grua me nje barre ektopike ne anamneze ka nje risk me te shtuar per nje barre tjetere ektopike
- B) Nje pluripare e thelle ka nje risk te shtuar per hemoragji pas lindjes
- C) Risku i partusit prematur rritet me rritjen e numrit te lindjeve premature ne anamneze
- D) Nje lindje e mepareshme cezariane perben nje indikacion absolut per nje lindje tjetere cezariane

30. Në një laceracion vulvo-vaginal të gradës së tretë, cila strukturë nuk preket:

- A) Sfinkteri anal
- B) Mukoza rektale
- C) Perineumi
- D) Muskujt perinealë

31. Në një laceracion vulvo-vaginal të grades së dyte, cila strukturë nuk preket:

- A) Sfinkteri anal
- B) Perineumi
- C) Muskujt perinealë
- D) Fascia e muskujve perinealë

32. Cila nga pasojat e meposhtme nuk lidhet me epiziotomine mediolaterale:

- A) Veshtiresia e riparimit
- B) Nganjehere veshtiresi per tu sheruar
- C) Dispareuni me rate
- D) Shpesh arrin sfinkterin anal dhe rektumin
- E) Rezultate anatomike te pakenaqshme

33. Cila nga pohimet e mëposhtme nuk është karakteristike për kontraksionet uterine në fazen aktive të lindjes:

- A) Arrijnë një presion 40 mm Hg
- B) Shkaktojnë dilatacion të qafes së mitrës
- C) Prcaktojnë trashesinë e segmentit uterin inferior
- D) Vijnë cdo 2-4 min
- E) Zgjasin 45 sekonda

34. Barra me moshe më shumë se 42 jave quhet:

- A) Barrë preterm
- B) Barrë premature
- C) Barrë ne term
- D) Barrë serotine

35. Cila nga keto situata nuk lidhet me barren serotine (post term):

- A) Perqendrimi i pamjaftueshem i oksitocines
 - B) Ngjyrosja e likidit amniotik
 - C) Incidence e rritur e interventeve
 - D) Makrosomia fetale
36. Sindroma e postmaturit (serotinit) perfshin gjithë mundesite e mëposhtme, përveç:
- A) Rritja e trashësisë së indit asipoz subkutan
 - B) Lëkura e rrudhosur, që deskuamohet
 - C) Gjurme mekoniumi mbi lekure, membranë e kordon
 - D) Thonj të gjatë
37. Elementi kryesor në vleresimin e barres përtej termit është:
- A) Ekografia
 - B) Percaktimi real kur ka ndodhur barra
 - C) Monitorimi i rrahjeve të zemrës fetale
 - D) Matja e likidit amniotik
38. Nëse testi i glicemise pas ngarkeses me 50 gr sheqer, tek një grua shtatzane me një feto morto in utero në anamnezë, është 140, si do vazhdohet me tej:
- A) Nuk ka nevojë për ekzaminime të mëtejshme
 - B) Dieta me 2000 kalori në ditë
 - C) Një test standart të tolerances së sheqerit
 - D) Vleresimin e glukozurisë në shtëpi
39. Dyshohet për diabet në barrë në të gjitha këto raste, përveç:
- A) Anamnezë familjare për diabet
 - B) Femijë makrosomë
 - C) Glukozuri që persiston
 - D) Vdekje fetale in utero
 - E) Aborte habituale
40. I porsalinduri nga nëna diabetike NUK rrezikohet nga:
- A) Hipoglicemia
 - B) Hiperglicemia
 - C) Hipocalcemia
 - D) Makrosomia
41. Në rastin e vendosjes së diagnoses së diabetit gestacional, cila nga rekomandimet e mëposhtme nuk është i duhuri:
- A) Dieta e pershtatshme
 - B) Monitorimi i glicemisë

- C) Fillimi i insulinës në rast të hiperglicemisë që persiston
- D) Ndërprerja e barrës

42. Cila nga shenjat e mëposhtme evokon një krđiopati ne shtatzani:

- A) Edema e gjymtyreve te poshtme
- B) Zhurma sistolike
- C) Shtimi I sforcos respiratore
- D) Dispnea
- E) Aritmia

43. Cila nga situatat e mëposhtme NUK shton riskun e imunizimit Rhezus:

- A) Menyra e lindjes
- B) Gjakosjet vaginale
- C) Preeclampsia
- D) Mosha e nenes

44. Në një shtatzënë me preekelampsi, cila nga anomalitë e mëposhtme gjendet më shpesh në urinë:

- A) Proteinuria
- B) Hematuria
- C) Glukozuria
- D) Ketonuria

45. Cila nga këto gjendje NUK shërben si factor risku per hipertensionin gestacional:

- A) Barra multiple
- B) Hipertensioni kronik
- C) Mosha më e vogel se 20 vj
- D) Diabeti

46. Cila nga shenjat ne vazhdim NUK eshte shenje e hipertensionit gestacional te rrepte:

- A) Oligohidramnion
- B) Proteinuria > 3 gr/24 ore
- C) Trombocitopenia
- D) Rritja e nivelit te kreatinines
- E) Shtimi I transaminazave

47. Eklampsia karakterizohet nga:

- A) Dhimbje koke e forte dhe e qendrueshme
- B) Hiperrefleksibilitet
- C) Konvulsione te tipit grand mal
- D) Njolla para syve

48. Cili nga faktoret e meposhtem NUK kontribon ne zhvillimin e nje infeksioni akut te rrugeve urinare gjate barres, lindjes dhe puerperiumit:
- A) Shtypja e uretereve ne traktin pelvik nga rritja e vellimit uterin
 - B) Rritja e tonusit dhe peristaltikes se ureters
 - C) Bakteriuria asimptomatike
 - D) Ulja e sensibilitetit te vezikes pas anestezise epidurale
 - E) Kateterizimi vezikal pas lindjes
49. Cila nga shenjat ose simptomat e meposhtme NUK takohet ne nje paciente me emboli pulmonare akute:
- A) Takikardia
 - B) Takipnea
 - C) Dhimbja torakale e tipit te pleuritit
 - D) PaO₂ me I madh se 80 mm Hg
50. Cili eshte mbartesi natyral i Toksoplasmozes:
- A) Gjaku
 - B) Macja
 - C) Peshku i kontaminuar
 - D) Femijet ne moshe shkollore
51. Cili eshte shkakun me i shpeshte ne rastin e lindjes premature:
- A) Laceracioni vaginal
 - B) Polipi endocervikal
 - C) Dilatacioni cervical
 - D) Placenta previa
 - E) Distako e placentes
52. Prematur perkufizohet nje neonat i lindur para:
- A) Javes 24 te barres
 - B) Javes 34 te barres
 - C) Javes 36 te barres
 - D) Javes 40 te barres
53. Frenuesit e sintezes se prostaglandinave nuk perdoren pergjithesisht si tokolitike, sepse:
- A) Jane jo efektive
 - B) Jane shume te kushtueshem
 - C) Shkaktojne acidoze laktike
 - D) Shkaktojne mbylljen e parakohshme te duktusit botalli
 - E) Shkaktojne hipertension te rende

54. Cili nga medikamentet e meposhtme NUK perdoret per nderprejten e aktivitetit te parakohshem te lindjes:
- A) Sulfati I magneziumit
 - B) Fenobarbitali
 - C) Ritodrina
 - D) Terbutalina
55. Cili nga elementet e meposhtem nuk ben pjese ne profiling biofizik fetal:
- A) Stress test
 - B) Levizjet respiratore fetale
 - C) Tonusi fetal
 - D) Levizjet fetale
 - E) Vellimi i likidit amniotic
56. Ne metodat diagnostikuese joinvazive ne obstetrike NUK ben pjese:
- A) Ekografia
 - B) Stress test
 - C) Amniocenteza
 - D) Profili biofizik
57. Abort habitual quhet prania e njepasnjeshme e :
- A) Dy aborteve spontane
 - B) Tre aborteve spontane
 - C) Kater aborteve sponatene
 - D) Me shume se 5 aborte spontane
58. Cili nga pikat e meposhtme nuk eshte shkak I GEU (barres ektopike):
- A) Cisti ovarial
 - B) SIP akut
 - C) Kirurgjia e gjirit
 - D) Section cezarea
 - E) Tubektomia bilaterale
59. Placenta previa eshte vendosja e placentes ne:
- A) 1/3 e poshtme te kavitetit uterin
 - B) 1/3 e siperme te kavitetit uterin
 - C) Fundus uteri
 - D) Murin e perpareshem uterin

60. Ne ratin e placentes previa, cili ekzaminim duhet shmangur, sepse mund te perkeqesoje gjakrrjedhjen:
- A) Eksplorimi vaginal
 - B) Ekografia
 - C) Monitorimi i RZF
 - D) Asnjera prej tyre
61. Cilat nga karakteristikat e meposhtme nuk i perket distaco placentë:
- A) Gjaku eshte i erret me koagula
 - B) Intervali mes kontraksioneve eshte me i shkurter se norma ose mungon
 - C) Placenta eshte e vndosur ne 1/3 e poshtme te kavitetit uretin
 - D) Distako ka lidhje me traumat abdominale dhe preeklampsine
62. Cili nga keto komplikacione te barres nuk eshte karakteristik per tremujorin e dyte te barres:
- A) Lindja premature
 - B) Inkompetenca cervikale
 - C) Plasja e parakoheshme e membranave
 - D) Distako placentë
63. Shkak i refluksit ezofageal eshte :
- A) Preeklampsia
 - B) Rritja e nivelit te estrogjenit
 - C) Rritja e nivelit te progesteronit
 - D) Hernia hiatale
64. Cila nga situatat e meposhtme NUK eshte pasoje e ekspozimit ndaj nje agjenti teratogjen:
- A) Vdekja
 - B) Malformimet
 - C) Vonesa e rritjes
 - D) Gemelari bizigotik
65. Cili nga organet apo lokalitetet anatomike nuk ben pjese ne organet e jashtme gjentiale:
- A) Vulva
 - B) Vagina
 - C) Mons pubis
 - D) Perineumi
 - E) Buzet e medha
 - F) Buzet e vogla
66. Zgjatja mesatare e ciklit menstrual është:

- A) 22 ditë
- B) 25 ditë
- C) 28 ditë
- D) 35 ditë
- E) 38 ditë

67. Ardhja e ciklit menstrual shkaktohet nga:

- A) Clirimi i prolaktinës
- B) Clirimi pulsatil i GnRH (hormoni clirues i gonadotropinave)
- C) Zgjatja e ndryshueshme e fazës folikulare
- D) Nga sinteza e progesteronit në corpus luteum
- E) Nga sekretimi i estrogjeneve nga ovari

68. Indikator me i mire qe pararend ovulacionin eshte:

- A) Piku i estrogjenit
- B) Shtimi i sekretimit te FSH
- C) Fillimi i stimi te sekretimit te LH
- D) Shtimi preovulator i progesteronit
- E) Piku i LH

69. Cili nga keto hormone stimulon clirimin e prolaktines:

- A) FSH
- B) LH
- C) Te dy
- D) Asnjeri

70. Cili nga keto hormone stimulon qelizat bazale ovarike:

- A) FSH
- B) LH
- C) Te dy
- D) Asnjeri

71. Cili nga metodat kontraceptive te meposhtme ka si mekanizem kryesor veprimi inhibimin (bllokimin) e ovulacionit:

- A) DIU (diapozitivi intra uterin)
- B) Mifepristoni
- C) Pilulat e urgjences
- D) Agonistet e GNRH

72. Cila nga ndodhite e meposhtme NUK eshte karakteristike per fazen fertile te ciklit menstrual:

- A) Piku i estrogenit
- B) Prodhimi i progesteronit
- C) Mukusi cervikal i qarte dhe i bollshem
- D) Ovulacioni
- E) Ndjenja e lageshtimit vulvar

73. Cila nga keto NUK paraqet mekanizem veprimi te spermicideve (kontraceptiveve kimike barriere):

- A) Neutralizimi i aciditetit vaginal
- B) Shkaterrimin e spermatozoideve
- C) Reduktimin e levizjes se spermatozoideve
- D) Inaktivizimin e enzimave akrozomiale

74. Cila nga pohimet e meposhtme nuk eshte e vertete per kontracepsionin barriere:

- A) Mbron ndaj SST
- B) Kerkon kontrole mjekesore te rregullta
- C) Pothuajse mungojne efektet anesore
- D) Mbron nga karcinoma e qafes se mitres
- E) Jane efektive, te sigurta dhe te rikthyeshme

75. Cila nga karakteristikat e meposhteme NUK eshte tipike per fazen folikulare te ciklit:

- A) Kohezgjatja e ndryshueshme
- B) Rritja dhe zhvillimi i folikujve ovariene
- C) Temperatura bazale mbi 36,5
- D) Rritja vaskulare e endometrit
- E) Sekretimi estrogenik nga ovari

76. Cila nga shenjat e me poshtme NUK takohet ne rastin e barrës ektopike (GEU):

- A) Dhimbje ne kuadrantet e poshtme te barkut
- B) Gjakrrjedhje vaginale ose spotting
- C) Amenorrea
- D) Proctoragjia (hemoragji rektale)
- E) Dhimbje ne shpatull

77. Trajtimi i GEU (barres ektopike) mund te behet me :

- A) Laparaskopi
- B) Laparatomy
- C) Methotroxate
- D) Te gjitha
- E) Asnjera nga keto

78. Cilat nga patologjite e meposhteme NUK eshte pasoje e semundjes inflamatore perlvike:

- A) Endometrioza

- B) Barra ektopike
 - C) Aderencat pelvike
 - D) Dispareunia
 - E) Hydrosalpingsi
79. Cila nga situatat e mëposhtme NUK shoqërohet me risk të shtuar për SIP:
- A) Fillimi i kontakteve seksuale 15 vj
 - B) Nderprerje të vullnetshme të barres
 - C) Marrja e kontraktiveve orale
 - D) Perdorimi i DIU
80. Cila nga metodat e mëposhtme lejon konfirmimin e diagnozës së SIP (semundja inflamatorë pelvike):
- A) Numri i leucotivëve në gjak
 - B) Kuldocenteza (punkcioni i Duglas-it)
 - C) Laparaskopia
 - D) Ekografia
81. Cila nga metodat e mëposhtme NUK është e vlefshme për diagnostikimin e SIP:
- A) Laparaskopia
 - B) Ekografia
 - C) Kuldocenteza (punkcioni i Duglas-it)
 - D) Histerosalpingografia
 - E) Vizita rektale
82. Diagnoza e endometriozeës vendoset në baze të:
- A) Anamnezës
 - B) Ekzaminimit objektiv
 - C) Anamnezës për infertilitet
 - D) Dozimi i CA 125
 - E) Shikimi direkt i lezionit endometrioziq dhe biopsia
83. Lokalizimi më i shpeshtë i endometriozeës është:
- A) Vezika
 - B) Apendiksi
 - C) Omentumi
 - D) Tubat e Fallopit
 - E) Siperfaqja peritoneale pelvike
84. Terapia më e përshtatshme për një grua 35 vjeçe që është nënshtruar intervenitit kirurgjikal radikal (hysterectomia totale cum adnesis) është:
- A) Danazoli
 - B) Kontraktivet orale
 - C) Antiinflamatorët jo steroidienë
 - D) Terapia estrogenike zëvendësuese

- E) Agonistët e hormonit clirues të gonadotropinave (GnRH)
85. Cila nga pohimet e mëposhtmet NUK shërben si teori për endometriozen:
- A) Metaplazia e epitelit celomik
 - B) Hiperplazia endometriale
 - C) Menstruacioni retrograd
 - D) Deficiti imunologjik
 - E) Përhapja me rrugë limfatike
86. Cila nga terapitë e mëposhtme NUK është e indikuar për trajtimin e endometriozes:
- A) Agonistët e hormonit clirues të gonadotropinave (GnRH)
 - B) Progesteroni
 - C) Kontraceptivet orale
 - D) Methotraksati
 - E) Danazoli
87. Kur në një ovar konstatohet kist çokollate bëhet fjale për:
- A) Barre ekstrauterine
 - B) Endometrioze
 - C) Hematome e corpus luteum
 - D) Asnje nga të mësipërmet
88. Cili nga shkaktarët e mëposhtëm të vaginitëve kërkon patjetër trajtim të të dy partnerëve:
- A) Trichomonas
 - B) Candida
 - C) Streptocoku i grupit B
 - D) Laktobacillus
89. Vaginozat bakteriale paraqiten me karakteristikat e mëposhtme, pervec:
- A) pH 5-5,5
 - B) Clue cells
 - C) Arome peshku të prishur
 - D) Janë pa arome
 - E) Mjekohen me metronidazol
90. Nëse paraqitet një grua me infeksion kronik nga Candida, mjeku duhet të sigurohet për praninë në anamnezë të patologjive të mëposhtme, ME PERJASHTIM TE:
- A) Diabetit
 - B) Barres
 - C) Antibiotikoterapisë
 - D) Përdorimit të kontrceptiveve orale
 - E) Dusheve vaginale me solucione acide (<4,5)
91. Parimet e trajtimit të gonorresë, ME PERJASHTIM TE:
- A) Doza unike

- B) Trajtimi i partnerit
- C) Trajtimi spitalor
- D) Mjekimi i semundjeve bashkëshoqëruese

92. Me cilat nga patologjitë e mëposhtme janë të lidhura ME SHPESH metrorragjitë disfunktionale:

- A) Polipet endometriale
- B) Anovulacioni
- C) Cerviciti
- D) Cregullimet e koagulimit
- E) Endometrioza

93. Alterimet menstruale që verëhen në rastin e shkurtimit të fazes folikulare të ciklit janë:

- A) Menoragjia
- B) Menometroragjia
- C) Polimenorrea
- D) Ciklet anovulatore
- E) Metroragjite

94. Cila nga patologjitë e mëposhtme janë më të lidhura me metrorragjitë disfunktionale:

- A) Leukemia
- B) Trombocitopenia
- C) Mola hidatiforme
- D) Polipi endometrial
- E) Sindroma e ovarit policistik

95. Me çfare termi (emri) percaktohen menstruacionet me humbje gjaku 100 ml dhe me ritëm cdo 35 ditë:

- A) Menometroragjia
- B) Menoragjia
- C) Polimenorea
- D) Oligomenorea
- E) Metroragjia

96. Me çfarë termi (emri) percaktohen menstruacionet me humbje gjaku 40 ml dhe ritëm cdo 35 dite:

- A) Menometroragjia
- B) Menoragjia
- C) Polimenorea
- D) Oligomenorea
- E) Metroragjia

97. Cila nga metodat diagnostike të mëposhtme është më e sakta për diagnozën e barrës ektopike (GEU):

- A) Biopsia endometriale
- B) Laparaskopia

- C) Dozimi I b-hCG serike
- D) Ekografia pelvike
- E) Punksioni i Douglas-it (Culdocetesis)

98. Cili nga ekzaminimet laboratorike te meposhtme karakterizon barren ektopike ose molen:

- A) Trombocitopenia
- B) Progesterone I rritur
- C) Hematokriti
- D) B hCG ne nivele te rritura
- E) Asnjera nga keto

99. Cili nga ekzaminimet laboratorike te meposhtme karakterizon anovulacionin (mungesen e ovulacionit):

- A) Trombocitopenia
- B) Progesterone i rritur
- C) Hematokriti
- D) B hCG e rritur
- E) Asnjera nga keto

100. Cila nga thëniet e mëposhtme NUK është korrekte për infeksionin nga HPV

- A) Kondilomat gjenitale shkaktohen nga ky virus
- B) Nentipet 16 dhe 18 janë të lidhur me kancerin e qafës së mitrës
- C) Raporti seksual është e vetmja mënyrë transmetimi e mundshme
- D) Lezionet e bardha pas ngjyrosjes me acid acetik vihen re gjatë kolposkopisë

101. Cilën nga keto lezione të listuara më poshtë është me i mundshmi për HPV tip 6 ose 11:

- A) Ulcera e bute
- B) Ulcera e dhimbshme e forte
- C) Kondiloma e sheshtë
- D) Kondiloma acuminatum (si lulelaker)

102. Cila nga keto SST kalon nepër tre stade të njëpasnjëshme nëse lihet pa u mjekuar:

- A) HPV
- B) Sifilizi
- C) Chlamidia tracomatis
- D) Gardnerella vaginalis

103. Cila nga thëniet e mëposhtme NUK është e saktë për trajtimin e gonoresë:

- A) Doza unike
- B) Trajtimi ambulator
- C) Trajtimi në spital
- D) Trajtimi në çift
- E) Trajtimi i semundjeve bashkëshoqëruese

104. Miomat submukoze mund të shoqerohen me keto shenja dhe simptoma, PERVEC:

- A) Anemi
- B) Infertilitet
- C) Menometroragji
- D) Qarkullim gjaku parazitar nga organet e tjera

105. Ndrshimet e ciklit menstrual te lidhura me fibromiomat uterine kanë karakteristikat e mëposhtme, PERVEC:

- A) Nje shtim gradual të hemoragjisë
- B) Menstruacione qe zgjasin me shume se norma
- C) Fluks më të shtuar gjatë të njejtit numër ditësh zgjatjeje të menstruacioneve
- D) Anemizim të guas
- E) Cikle te cregullta me hemoragji

106. Miomat janë të lidhura me kushtet e meposhtme klinike PERVEC se me:

- A) Aneminë
- B) Amenorenë
- C) Dismenorea
- D) Pielonefritin
- E) Pollakiuria

107. Cila nga karakteristikat e meposhtme nuk i perket fibromiomave uterine:

- A) Jane te vetme ose multiple
- B) Variojne 1-20 cm
- C) Jane te pranishme ne 20-50 % te grave
- D) Jane indikacioni me i shpeshte per histerektomi
- E) Degjenerimi malinj i tyre ndodh ne 50 % te rasteve

108. Cili nga lokalizimet e meposhtme eshte i sakte per vendodhjen e fibromiomave:

- A) Intramurale
- B) Submukoze
- C) Subseroze
- D) Te gjitha

109. Cila nga ankesat e meposhtme nuk lidhet me kliniken e fibromiomave uterine:

- A) Te vjellat
- B) Dhimbja
- C) Shtypja
- D) Problemet riprodhuese
- E) Menometroragjia

110. Cili nga cregullimet e lidhura me barren nuk ndodh si pasoje e fibromiomave uterine:

- A) Hiperemesis gravidarum
- B) Aborte spontane
- C) Degjenerimi i kuq

- D) Lindja premature
 - E) Hemoragjia pas lindjes
111. Fibromioma uterine gjate barres
- A) I zvogelojne permasat
 - B) I rrisin permasat
 - C) Pesojne transformim malinj
 - D) Nuk pesojne ndryshime
112. Cila nga terapite e meposhtme eshte e duhura per trajtimin e fibromiomave uterine:
- A) Qendrimi prites
 - B) Trajtimi medikamentoz
 - C) Trajtimi kirurgjikal
 - D) Te gjitha
113. Cila nga metodat diagnostikuese te meposhtme NUK eshte e duhura per vleresimin e endometrit:
- A) Laparaskopia
 - B) Histeroskopia
 - C) Biopsia endometriale
 - D) Histerografia
 - E) Kultura e nje kampioni nga endometri
114. Cila nga metodat diagnostike te meposhtme eshte e duhura per vleresimin e kalueshmerise tubare:
- A) Testi post-koital
 - B) Histerosaplingografia
 - C) Laparaskopia
 - D) Spermograma
 - E) Biopsia e endometrit
115. Cila nga metodat diagnostike te meposhtme eshte e duhura per vleresimin e malformacioneve te kavitetit uterin:
- A) Testi post-koital
 - B) Histerosaplingografia
 - C) Laparaskopia
 - D) Spermograma
 - E) Biopsia e endometrit
116. Cila nga metodat diagnostike e meposhtme eshte E DUHURA per vleresimin e sasisë dhe cilesisë se mukusit cervical dhe nderveprimin me spermën:
- A) Testi post-koital
 - B) Histerosaplingografia

- C) Laparaskopia
 - D) Spermograma
 - E) Biopsia e endometrit
117. Cila nga situatat e mëposhtme NUK është treguese e ndodhjes së ovulacionit:
- A) Shtimi i temperatures normale
 - B) Barra
 - C) Endometri i tipit sekretiv
 - D) Menstruacioni
118. Cila nga situatat e mëposhtme NUK flet për sterilitet femëror:
- A) Mungesa e kalueshmerise tubare
 - B) Anovulacioni
 - C) Kriptokirdia
 - D) Insuficienca e progesteronit në fazën e dytë të ciklit
119. Cila nga cila nga ekzaminimet e mëposhtme NUK përdoret për identifikimin e infertilitetit mashkullor:
- A) Spermograma
 - B) Testi post-coital
 - C) Biopsia endometriale
 - D) Antikorp anti-spermatozoidike
120. Cila nga situatat e mëposhtme konsiderohet si një urgjencë relative për një vajzë të re me amenore:
- A) Agenezia vaginale
 - B) Sindroma e Turner
 - C) Malformacionet uterine
 - D) Hymen imperforatus
 - E) Sindroma e pandjeshmerise nga androgjenet
121. Cila nga situatat e mëposhtme NUK është e lidhur me sindromen Asherman:
- A) Lindja
 - B) Endometrioza
 - C) Kyretimi i kavitetit endometrial
 - D) Hemoragjia postpartum
 - E) Tuberkulozi gjenital
122. Për fillimin dhe mbajtjen e ciklit menstrual NUK është e nevojshme:
- A) Hormoni clirues i gonatropinave (GnRH)
 - B) Një endometer i ndjeshëm ndaj hormonet steroide seksuale
 - C) Kalueshmëria tubare
 - D) Gonadotropinat
 - E) Hormonet steroide seksuale me origjinë ovariale

123. Cili nga ekzaminimet hormonale eshte kryesor per percaktimin e ndodhise se menopauzes:
- A) FSH
 - B) LH
 - C) Prolaktina
 - D) Androgjenet
 - E) Asnjeri nga keto
124. Hirsutizmi eshte:
- A) Rritja e shtimit te qimeve te nje grua
 - B) Mungesa e qimeve tek nje grua
 - C) Mungesa e zhvillimit te gjinjve tek nje grua
 - D) Asnjera nga keto
125. Afshet e nxehta ne menopauze krijohen nga:
- A) Rritja e FSH
 - B) Rritja e LH
 - C) Rënia e estrogjeneve
 - D) Rënia e progesteronit
 - E) Asnjera prej tyre
126. Trajtimi i keshilluar per osteoporozë ne menopauze i perfshin te gjitha PERVEC:
- A) Estrogjen
 - B) Progesterone
 - C) Ushtrime fizike
 - D) Kalcium
 - E) Vitamine D
127. Pasojat afatgjata te menopauzes jane:
- A) Anemia
 - B) HTA dhe diabeti
 - C) Osteoporozja dhe arterioskleroza
 - D) Depresioni
128. Cili nuk perben nje faktor risku per kancerin e qafes se mitres:
- A) Raporti i pare seksual ne moshe shume te re
 - B) Partnere seksuale te shumte
 - C) Duhanpirja
 - D) Hiperkolesterolemia
 - E) HPV
129. Cilët nga ekzaminimet e mëposhtme vlerëson infertilitetin mashkullor:
- A) Matja e temperaturës bazale
 - B) Biopsia andometriale
 - C) Spermograma
 - D) pap-testi

130. Cili është trajtimi i duhur në pamjaftueshmëri ovariane:
- A) Qendrimi pritës
 - B) Histerosalpingografia
 - C) Laparaskopia
 - D) Induksioni i ovulacionit
131. Avantazhet e kondomit janë:
- A) Bllokon ovulacionin
 - B) Redukton riskun e transmetimit të SST
 - C) Nuk lejon implantimin e barrës në endometër
132. Gjatë laktacionit janë të lejuar kontraktivët oralë :
- A) Monofazikë të kombinuar
 - B) Dyfazikë të kombinuar
 - C) Trefazikë të kombinuar
 - D) Vetëm me progesteron
133. Metodrat kontraktive afatgjata të rikthyeshme përfshijnë:
- A) DIU
 - B) Spermicidet
 - C) Kondomi
 - D) Diafragma
134. Dizavantazhet e kontraktiveve progesteronike përfshijnë:
- A) Metroragji
 - B) Amenore
 - C) Nauze
 - D) Humbje në peshë
135. Diagnoza e menopauzës vendoset pas :
- A) 3 muaj amenore
 - B) 6 muaj amenore
 - C) 12 muaj amenore
 - D) 18 muaj amenore
136. Ulja e estrogjeneve gjatë menopauzës con në prekje të ketyre funksioneve, me perjashtim të:
- A) Sistemit tretës
 - B) Lekurës dhe indeve
 - C) Sistemit vazomotor
 - D) Sistemit urogjenital
137. Faktorët favorizues të osteoporozës në menopauzë janë:
- A) Menopauza natyrale e parakoheshme
 - B) Terapia zëvendësuese hormonale

- C) Aktiviteti i shtuar fizik
D) Obeziteti
138. Kohëzgjatja e THZ në menyrë që pacientja të perfitojë duhet të jetë:
A) Te paktën 5 vj
B) 5-10 vjet
C) > 10 vj
D) Gjithë jetën
139. Dispareunia është :
A) Dhimbja gjatë menstruacioneve
B) Dhimbja gjatë kontakteve seksuale
C) Dhimbja në mesin e ciklit (ovulatore)
D) Dhimbja pelvike e papërcaktuar
140. HPV është i lidhur me kancerin e :
A) Gjirit
B) Mitrës
C) Vaginës
D) Qafes së mitrës
141. Gonorhea shoqërohet më shpesh me :
A) HIV-AIDS
B) Trichomonas vaginalis
C) Chlamidia tracomatis
D) Sifilizi
142. SST favorizohen nga :
A) Menopauza
B) Abstenenca seksuale
C) Përdorimi i profilaktikëve
D) Numri i lartë i partnerëve seksualë
143. Nëntipat e HPV që përfshihen si onkoviruse me risk të lartë janë:
A) 6, 11
B) 16, 18
C) 21, 23
D) 52, 53
144. Trajtimi kirurgjikal i kancerit të ovarit përfshin:
A) Histerektomia
B) Ovaektomia bilaterale (e dyanshme)
C) Salpingektomia
D) Te gjitha sa më sipër
145. Diagnoza e kancerit të gjirit vendoset me :

- A) Inspeksion
 - B) Palapacion
 - C) Imazheri
 - D) Asnjera nga te gjitha
146. Kush eshte ekzaminimi baze depistues per kancerin e qafes se mitres:
- A) Ekografia
 - B) Vizita gjinekologjike
 - C) Pap-testi
 - D) Kultura e sekrecioneve vaginale
147. Kush përbën faktor parandalues për kancerit e gjirit:
- A) Menarka e herëshme
 - B) Menopauza e voneshme
 - C) Nullipariteti
 - D) Të gjitha
 - E) Asnjera
148. Percaktimi i nëntipit te HPV-së percaktohet përmes:
- A) Pap-testit
 - B) Ekografisë
 - C) Tipizimit
 - D) Kulturës së sekrecioneve vaginale
149. Avantazhet e kontraktivëve oralë të kombinuar janë :
- A) Mbrojtja kundër kancerit vulvar
 - B) Mbrojtja kundër kancerit të gjirit
 - C) Mbrojtja kundër kancerit të qafes së mitrës
 - D) Mbrojtja kundër kancerit të endometrit e të ovarit
150. Kur fillon veprimin e mbrojtjes kontraktivi vetem me progesterone:
- A) Menjehere
 - B) Pas 24 oresh
 - C) Pas nje jave
 - D) Pas 2 javesh
151. Menopauza artificiale nenkupton te gjitha obsionet e meposhtme, pervec:
- A) Ablacioni kirurgjikal I dy ovareve
 - B) Ndalimit natyral te aktivitetit folikular oovarian
 - C) Kemioterapia
 - D) Radioterapia
152. Faktor risku ne arterioskleroze perben:
- A) Trashegimia
 - B) Perdorimi i tepert I sheqernave ne diete
 - C) Aktiviteti I shtuar fizik

- D) Asnjera nga keto
153. Mjekimi i gonorese rekomandohet te jete:
A) Mjekim me doze unike
B) 7-14 dite
C) 21 dite
D) Mjekim me cikle
154. Infeksioni vaginal i shoqeruar me leukore me ere si te peshkut te prishur shkaktohet nga:
A) Chlamydia tracomatis
B) Streptokoku B hemolitik
C) Trichomonas vaginalis
D) Gardnerela vaginalis
155. Cila nga theniet e me poshtme nuk perben factor favorizues per kancerin e gjirit:
A) Nullipariteti
B) Menopauza e vonshme
C) Kanceret e tjere te traktit gjnital
D) Trashegimia
156. Kur harrohet pilula kontrceptivi, cili eshte qendrimi i duhur:
A) Nderpritet paketa e filluar
B) Merren dy pilula njeherazi
C) Hidhet tableta e harruar dhe merret pasardhesja
D) Merret pilula e harruar brenda 12 oreve dhe vazhdohet pilula e radhes
157. Kontrceptivet orale te kombinuar jane te pershtatshem per pacientet me :
A) Dismenore
B) Probleme hepatike
C) SST
D) Tromboemboli
158. Terapia ndaj HPV:
A) Eleminon virusin
B) Redukton perhapjen
C) Rrit imunitetin

Te gjitha sa thame

Tezat e Lendes Pediatri-----Diploma MAMI

1-Transpozicioni i vazave te medha nenkupton

- 1-komunikim ndermjet atriumeve
- 2--komunikim ndemjet ventrikujve
- 3-aorta qe del nga ventrikuli I djathte
- 4- ventrikul unik

P.S--

2-Nje I porsalindur klasifikohet AGA kur

- 1-Pesha eshte midis 3-97% percentile
- 2-Gjatesia eshte midis 3-97 % percentile
- 3-Perimetri I kokes eshte midis 3-97% percentile
- 4-Te gjitha

P.S--

3-Nje I porsalindur klasifikohet si SGA kur

- 1- Pesha eshte nen 3% percentile
- 2- Gjatesia eshte nen 3% percentile
- 3- Perimetri I kokes eshte nen 3 % percentile
- 4- Te gjitha

P.S--

4-Nje I porsalindur klasifikohet si LGA kur

- 1- Pesha eshte mbi 97% percentile
- 2- Gjatesia eshte mbi 97 % percentile
- 3- Perimetri I kokes eshte mbi 97 % percentile
- 4- Te gjitha

P.S---

5-Quhet femije premature

- 1-ai qe lind <37 jave moshe barre
- 2-ai qe lind >42 jave moshe barre
- 3-ai qe lind =20 jave moshe barre
- 4-Ai qe lind midis 37-41 jave moshe barre

P.S-----

6-Ikteri fiziologjik shfaqet

- 1- diten e pare te jetes
- 2- diten e trete te jetes
- 3- diten e dhjete te jetes
- 4- muajin e pare te jetes

P.S-----

7-Ikteri nga papjtueshmeria e rhezusit shfaqet

- 1- diten e pare te jetes
- 2- diten e trete te jetes
- 3- diten e dhjete te jetes
- 4- muajin e pare te jetes

P.S-----

8-Trajtimi I ikterit perfshin

- 1- ushqyerjen sa me shpesh me gji
- 2- fototerapi

- 3- Eksanguinotransfuzion
- 4- Te gjitha

P.S-----

9-Nje I porsalindur me ikter ka keto shenja klinike

- 1- zverdhje te lekures dhe te mukozave
- 2- nuk kap gjirin
- 3- I plogesht
- 4- Te gjitha

P.S-----

10-Kernikter ose ikteri nuklear prek

- 1- aparatit gastro-intestinal
- 2- aparatit lokomotor
- 3- berthamat nukale te trurit
- 4- aparatit kardio-respirator

P.S-----

11-E vjella ne refluxin gastro-ezofageal ndodh

- 1- menjehere pas ushqyerjes
- 2- para ushqyerjes
- 3- reth 1-2 ore pas ushqyerjes
- 4- asnjera

P.S-----

12-E vjella ne stenozen hipertrofike te pilorit ndodh

- 1- menjehere pas ushqyerjes
- 2- para ushqyerjes
- 3- rreth 1-2 ore pas ushqyerjes
- 4- asnjera

P.S-----

13-Neonati nuk vendoset ne gji kur nena eshte e semure nga

- 1 -rubeola
- 2 -meningiti
- 3 -HIV-Aids
- 4 -tetanozi

P.S-----

14-Oftalmiti eshte shenja me e zakonshme dhe me e shpeshte e

- 1 -tetanozit
- 2-gonorese
- 3 -sifilizit
- 4 -rubeoles

P.S-----

15-Kush nga detreset e meposhtme nuk quhet "detres kirurgjikal"

- 1-hernia diafragmale
- 2 -semundja e membranave hialine
- 3-atrezia e koanave
- 4 -atrezia e ezofagut

P.S-----

16-Ventrikuli unik ben pjese ne

- 1-kardiopatite cianogjene
- 2-kardiopatite jocianogjene

3-Kardiopatite komplekse

4-Tetrada Fallo

P.S-----

17-Apgari nuk vleresohet nepermjet

- 1 -ngjyres se lekures
- 2 -frekuences respiratore
- 3 -frekuences kardiake
- 4 -thithje-gellititjes

P.S-----

18-Ushqyerja ekskluzive me gji duhet te vazhdohet

- 1-dy muaj pas lindjes
- 2- kater muaj pas lindjes
- 3- gjashte muaj pas lindjes
- 4-deri ne vitin e pare te jetes

P.S-----

19-Ushqyerja me gji ka perparesi ndaj asaj me qumesht artificial sepse

- 1- ka me shume IgA
- 2- ka aminoacide te rendesishme
- 3- rrit lidhjen psiko-afektive nene femije
- 4- te gjitha

P.S-----

20-Ne sallën e lindjes veprimi qe duhet bere gjithmone eshte

- 1- vendos bebin mbi barkun e nenes
- 2- largoje ne nje dhome me vete
- 3- mbaje larg nga ambjenti ku rri nena
- 4- mos I jep informacion nenes

P.S-----

21-Ne ekzaminimin e pare te bebit gjithmone duhet pare

- 1- kalueshmeria anale
- 2- kalueshmeria nazale
- 3- kalueshmeria ezofago-gastrike
- 4- te gjitha

P.S-----

22-Ne sallën e lindjes asnjehere nuk duhet te mungoje

- 1- burimi I oksigjenit
- 2- ngrohësi I ambjentit
- 3- pelenat e ngrohta
- 4- asnjera

P.S-----

23-Ne sallën e lindjes ekipi neonator duhet te njoftohet

- 1-30 minuta para lindjes
- 2- ne momentin e lindjes
- 3- pas lindjes
- 4-nuk eshte e nevojshme te jene ne salle

P.S-----

24-Nje I porsalindur klasifikohet si serotin kur lind

- 1- para javes se 37-te te shtatzanise
- 2- pas javes se 42 -te te shtatzanise
- 3- midis 37-41 jave shtatzanie
- 4- asnjera

P.S-----

25-E vjella ne stenozen hipertrofike te pilorit eshte

- 1- permbajtje qumeshti
- 2- qumesht I prere si hire
- 3- me permbajtje bile
- 4- asnjera

P.S-----

26-E vjella ne refluksin gastro-ezofageal eshte

- 1- me permbajtje qumeshti
- 2- qumesht I prere si hire
- 3- me permbajtje bile
- 4- te gjitha

P.S----

27-Bebi I porsalindur vendoset ne gji

- 1- menjehere pas lindjes
- 2- diten e pare pas lindjes
- 3- tre ditet e par ate lindjes
- 4- javen e pare pas lindjes

P.S-----

28-Gjendja septike tek neonati shfaqet me shume me

- 1- temperature te larte--hipertermi
- 2- temperature te ulet---hipotermi
- 3- te dyja
- 4- asnjeren

P.S--

29-Cilen nga semundjet e meposhtme shfaq me shpejt prematuri

- 1- papjekuri te sistemit respirator
- 2- papjekuri te sistemit lokomotor
- 3- papjekuri te sistemit nervor
- 4- asnjeren

P.S---

30-Cilen nga semundjet shfaq me shpesh prematuri

- 1- papjekuri te sistemit respirator
- 2- papjekuri te sistemit gastro-intestinal
- 3- papjekuri te sistemit nervor
- 4- te gjitha

P.S----

31-Hipotermia ose temperature e ulet eshte karakteristike e

- 1- bebit prematur
- 2- bebit hipotrof
- 3- bebit serotin

4- asnjerit

P.S--

32-Perpara nje femije premature cilen do te vleresosh me shume

- 1- veshtiresine ne frymemarje
- 2- hypoglicemine
- 3- hypotermine
- 4- te gjitha

P.S--

33-Pikezimi I Apgarit kryhet

- 1- ne minute e pare te jetes
- 2- ne minute 0 te jetes
- 3- 30 minutat e para
- 4- ditën e pare te lindjes

P.S--

34-Nje femije serotin cfare paraqet me se shpeshti

- 1- asfiksi ne lindje
- 2- veshtiresi respiratore
- 3- hipoglicemi
- 4- te gjitha

P.S-

35-Nje femije qe lind premature cfare paraqet me se shumti

- 1- veshtiresi ne frymemarrje
- 2- hypoglicemi
- 3- hypotermi
- 4- te gjitha

P.S---

36-Nje femije qe lind SGA cfare paraqet me se shumti

- 1- hypoglicemi
- 2- asfiksi ne lindje
- 3- veshtiresi ne frymemarrje
- 4- te gjitha

P.S---

37-Anomalite e bashkelindura jane me teper karakteristike e

- 1- femijeve te lindur ne term
- 2- femijeve te lindur SGA
- 3- femijeve te lindur LGA
- 4- asnjerit

P.S--

38-Nje femije qe lind LGA cfare paraqet me se shumti

- 1- hypoglicemi
- 2- trauma te lindjes
- 3- veshtiresi ne frymemarje
- 4- te gjitha

P.S--

39-Cila nga ekzaminimet e meposhtme laboratorike na tregon per nivelin e ikterit

- 1- bilirubinemia

- 2- azotemia
- 3- glicemia
- 4- sediment

P.S--

40-Perpara nje neonati te semure gjithmone duhet te beni

- 1- sigurimin e rugeve ajrore te lira
- 2- I ofrojme oksigjeno-terapi
- 3- Monitorojme shenjat vitale
- 4- Te gjitha

P.S-----

41-Cfare duhet te shmangim tek nje neonat I semure

- 1- banja
- 2- ushqyerja
- 3- ekzaminimi
- 4- te gjitha

P.S---

42-Cfare duhet te bejme para nje femije te semure

- 1- te trajtojme problemin imediat
- 2- te gjejme pse femija eshte semurur dhe te trajtojme shkakun
- 3- te monitorojme cdo factor reziku
- 4- te gjitha

P.S-

43-Kemi takikardi neonatale kur

- 1- frekuenca kardiake eshte <100/min
- 2- frekuenca kardiake eshte >180/min
- 3- frekuenca kardiake eshte 140-160/min
- 4- asnjeren

P.S--

44-Kemi takipne neonatal kur

- 1- frekuenca respiratore eshte <20/min
- 2- frekuenca respiratore eshte >60/min
- 3- frekuenca respiratore eshte 20-60/min
- 4- te gjitha

P.S---

45-Llojet e apnoeve jane

- 1- me origjine qendrore
- 2- me origjine obstructive
- 3- te perziera
- 4- te gjitha llojet e mesiperme

P.S--

46-Ushqyerja me sonde keshillohet tek

- 1- femijet qe jane <32 jave moshe barre
- 2- qe kane veshtiresi ne thithje-gellititje
- 3- qe kane nje semundje akute te frymemarjes
- 4- te gjitha

P.S-----

47-Kur raporti nene-femije ecen keq cfare mund te presim

- 1- braktisje te femijes
- 2- zhvillim te manget fizik
- 3- crregullime te sjelljes se femijes
- 4- te gjitha

P.S--

48-Kush e permireson raportin nene-femije

- 1- te jemi te duruar me prinderit pa pervoje
- 2- tu japim shprese atyre
- 3- ti lejojme qe te qendrone pa kufizim me femijen
- 4- te gjitha

P.S----

49-Menytrat me te perdorshme per matjen e temperatures tek bebet jane

- 1- aksilare
- 2- rektale
- 3- matja ne lekuren e barkut
- 4- te gjitha

P.S-----

50-Nje reanimim I suksesshem varet nga

- 1- parashikimi I nje lindje asfiktike
- 2- fillimi I menjehershem I veprimeve reanimatore
- 3- kryerja e tyre me saktesi
- 4- te gjitha

P.S---

51-Dhëmbët e qumështit zëvendësohen me dhëmbët e përhershëm:

- 1-Rreth moshës 3-4 vjeç
- 2-Rreth moshës 4-5 vjeç
- 3-Rreth moshës 6-7 vjeç
- 4-Rreth moshës 8-9 vjeç

P.S--

52-Faktorët e jashtëm që ndikojnë në rritje e zhvillim janë të gjithë me përjashtim të:

- 1-Kushtet social-ekonomike
- 2-Klima tropikale
- 3-Sëmundjet kronike pas lindjes
- 4-Faktorët gjenetikë

P.S--

53-Fëmija e dyfishon peshën e lindjes në moshën:

- 1-1 vjeç
- 2-8 muaj
- 3-10 muaj
- 4-5 muaj

P.S--

54-Vitamina D merr pjesë në:

- 1-mineralizimin e kockës
- 2-aktivitetin nervor
- 3-pjekurinë seksuale
- 4-hematopoezë

P.S--

55-Fëmija e trefishon peshën e tij në moshën:

- 1-8 muaj
- 2-1.5 vjeç
- 3-2 vjeç
- 4-12 muaj

P.S--

56-Ikteri i të porsalindurit mund të jetë:

- 1-Ikter nga infeksioni
- 2-Ikter hemolitik
- 3-Ikter fiziologjik
- 4-Mund t'i ketë të gjitha origjinat

P.S--

57-Për vaksinimin sipas kalendarit të vaksinimit janë të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- 1-Eshtë i detyrueshëm për të gjithë fëmijët
- 2-Nuk këshillohet të bëhet për fëmijët e lindur para kohe
- 3-Ndihmon në krijimin e imunitetit të fëmijës
- 4-Për aplikimin e vaksinave duhen respektuar afatet kohore sipas këtij

kalendarit

P.S--

58-Gjatësia e fëmijës në lindje është:

- 1-rreth 50 cm
- 2-rreth 40 cm
- 3-rreth 30 cm
- 4-rreth 60 cm

P.S--

59-Faktorët e brendshëm që ndikojnë në rritje e zhvillim janë të gjithë me përjashtim të:

- 1-hormonet seksuale
- 2-kushtet social-ekonomike
- 3-hormonet e tiroides
- 4-hormoni somatotrop

P.S--

60-Encefalopatia bilirubinike tek një fëmijë në term shfaqet kur vlera e bilirubinës serike arrin në:

- 1 ≥ 18 mg/dl
- 2 ≥ 10 mg/dl

3 \geq 15 mg/dl

4 \geq 20 mg/dl

P.S--

61-Për kulloshtren janë të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- 1-kulloshtira prodhohet nga gjendrat mamare ditët e para pas lindjes
- 2-përmban shumë yndyrma e sheqerna dhe pak proteina
- 3-përmban antikorpe të nënës
- 4-mbron fëmijën nga infeksionet

P.S--

62-Për infeksionin nga Rubeola Kongenitale janë të vërteta të gjitha me përjashtim të:

- 1-prek fetusin me rrugë transplacentare
- 2-shkakton vonesë në rritjen intrauterine dhe anemi tek bebi
- 3-nuk kemi në përdorim asnjë mënyrë parandalimi
- 4-është një nga shkaqet e prematurancës

P.S--

63-Infeksioni neonatal nuk ka të vërtetë:

- 1-hipotermi
- 2-hipoglicemi
- 3-hipobilirubinemi
- 4-ulje të frekuencës kardiake

P.S--

64-Pikezimi I Apgarit është:

- 1-sëmundje ngjitëse e neonatit
- 2-keqformim i lindur
- 3-sëmundje e sistemit kardiorespirator
- 4-sistem vlerësues i shenjave jetësore të neonatit

P.S--

65-Përbëjnë kundëriindikacion absolut për ushqyerjen me gji të gjitha me përjashtim të:

- 1-HIV i nënës
- 2-Insuficiencë kardiake e dekompesuar e nënës
- 3-TBC aktiv i nënës
- 4-ragadet e gjirit të nënës

P.S--

66-Infeksioni neonatal ka si shenja klinike:

- 1-konvulsione
- 2-hipotoni
- 3-çrregullime të ritmit të zemrës
- 4-të gjitha të mësipërmet

P.S--

67-Tetanos neonatal ka të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- 1-shkakton sepsis
- 2-shkakton kontraktura muskulare
- 3-shkakton fraktura të kockave
- 4-shkakton trismus

P.S --

68-Quhet fëmijë postmatur:

- 1-fëmija i lindur përpara 37 javësh moshë shtatzënie
- 2-fëmija i lindur me peshë nën 2500 g
- 3-fëmija i lindur pas javës 42 të shtatzënisë
- 4-fëmija i lindur nga 37 në 42 javë moshë shtatzënie

P.S--

69-Mekonium quhet:

- 1-qumështi i ditëve të para pas lindjes
- 2-një keqformim i lindur i traktit gastrointestinal
- 3-një sëmundje ngjitëse e transmetuar nga nëna
- 4-jashtëqitja e parë e bebit

P.S--

70-Vlerësimi i Apgarit nuk përfshin:

- 1-frekuencën kardiake
- 2-tonusin muskular
- 3-frekuencën respiratore
- 4-reflekset primare

P.S--

71-Shkaktojnë keqformime të lindura të gjitha, me përjashtim të:

- 1-rubeola kongenitale
- 2-toksoplazmoza kongenitale
- 3-CMV kongenital
- 4-hepatiti B kongenital

P.S--

72-Mund të jenë shenja klinike të një infeksioni neonatal të gjitha, me përjashtim të:

- 1-hipotermi
- 2-hiperglicemi
- 3-hepatosplenomegali
- 4-bombim i fontanelës

P.S--

73-Kern ikteri shkaktohet nga:

- 1-fiksimi i bilirubinës së palidhur në bërthamat trunore
- 2-fillimi i parakohshëm i ablaktacionit
- 3-anemia nga mungesa e hekurit

4-ikteri nga qumështi i gjirit

P.S--

74-Terapia rehidruese orale është trajtim I zgjedhur për të gjithë fëmijët e dehidruar, me përjashtim të:

- 1- të vjella dhe temperaturë e lartë,
- 2- koma ose shok,
- 3- shigelozë,
- 4- helmim ushqimor

P.S--

75-Ndërlikimi më i shpeshtë i Salmonelozës është:

- 1- prolapsi rektal
- 2- anemia
- 3- dehidrimet e tipeve të ndryshme
- 4- meningiti

P.S--

76-Cili nga ekzaminimet e mëposhtme nuk ka vlerë në shigelozë:

- 1- koprokultura
- 2- hemokultura
- 3-kërkimi për pus e gjak në feçe
- 4- gjak komplet

P.S--

77-Cila nga masat e mëposhtme duhet marrë në një fëmijë me shok anafilaktik të rëndë:

- 1- lirimi i rrugëve të frymëmarrjes
- 2- oksigjenimi
- 3- përdorimi i adrenalinës
- 4-të gjitha janë të vlefshme

P.S--

78-Në dehidrimin hiperton vuan më shumë:

- 1- sistemi kardiovaskular
- 2-sistemi nervor
- 3- trakti tretës
- 4- sistemi limfatik

P.S--

79-Obeziteti është

- 1-Nje tregues mbiushqyerje
- 2-Nenushqyerje
- 3-Nje forme malnutricioni
- 4-Asnjera

P.S--

80-Diarrea nga Shigella karakterizohet klinikisht nga

- 1-diarre me mukus dhe gjak
- 2- temperaturë e lartë
- 3- dhimbje barku
- 4-te gjitha

P.S--

81-Spazmofilia është pasojë e

- 1-Hipokalçemisë
- 2-Hiperkalcemise
- 3-Te dyja
- 4-Asnjeren

P.S--

82-Spazmofilia paraqitet klinikisht me

- 1-konvulsione parciales-te pjesëshme
- 2- të gjeneralizuara
- 3-Konvulsione te dukshme ose qe provokohen
- 4-Te gjitha

P.S--

83-Komplikacionet më të shpeshta të refluksit gastroezofageal janë:

- 1-infeksione të përsëritura respiratore
- 2-anemia
- 3-otiti
- 4-Te gjitha

P.S--

84-Kraniotabes është shenjë klinike e

- 1-Rakitit
- 2-Hipovitaminozes A
- 3-Te dyjave
- 4-Asnjeres

P.S--

85-Doza e Acetaminofenit (Paracetamol) në fëmijë është:

- 1- 2 mg/kg për çdo marrje,
- 2- 5 mg/kg për çdo marrje,
- 3- 15 mg/kg për çdo marrje,
- 4-50 mg/kg për çdo marrje,

P.S--

86-Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë për stenozen hipertrofike të pilorit:

- 1- të vjella që në lindje
- 2-fillon reth muajit te pare
- 3-ka prani të bilës në të vjella
- 4- ka humbje të oreksit

P.S--

87-Sa është sasia e Tresolit që përdoret për rehidrim oral në dehidrimin e lehtë:

- 1- 10 mg/kg peshë
- 2- 20 mg/kg peshë,
- 3- 50 mg/kg peshë,
- 4-100 mg/kg peshë

P.S--

88-Forma e dehidrimit (i lehtë-i mesëm-i rëndë) tek fëmija vlerësohet me të gjitha, me përjashtim të:

- 1-matja e presionit arterial,
- 2-thellimi i syve,
- 3-dhimbja e kokës,
- 4-niveli i fontanelës së madhe

P.S--

89-Konvulsionet janë

- 1-urgjencë mjekësore
- 2-trajtohen me diazepam-valium
- 3-doza=0.5 mg/kg peshë në një marrje/ per rectum
- 4-te gjitha

P.S--

90-Shkaktarët më të shpeshtë të diarresë në fëmijë (rreth 70% e diarreve) janë

- 1-viruset
- 2-bakteret
- 3-mykrat
- 4-asnjëri

P.S--

91-Disa komplikacione afatgjata të diabetit janë:

- 1-dëmtimi i shikimit
- 2- dëmtimi i funksionit renal
- 3- ulçera trofike kryesisht në këmbë
- 4- te gjitha

P.S--

92-Doza e Adrenalinës subkutan për trajtimin e shokut anafilaktik është:

- 1- 1 mg për çdo 10 kg peshë,
- 2- 0.5 mg për çdo 10 kg peshë,
- 3- 0.1 mg për çdo 10 kg peshë,
- 4- 10 mg për çdo 10 kg peshë

P.S--

93-Dhënia e vitaminës K tek i porsalinduri duhet të jetë:

- 1-sistematike-e detyrueshme për çdo të porsalindur
- 2- e këshillueshme,
- 3- e panevojshme tek fëmija që ushqehet me gji,
- 4-vetëm në rast hemorragjie të jashtme

P.S---

94-Sindromi Reye lidhet me përdorimin e:

- 1-Aspirinës
- 2-Aminofilinës
- 3-Amfetaminës
- 4-Antibiotikëve

P.S-

95-Njollat e Koplik-ut janë karakteristikë e:

- 1-Rubeolës
- 2-Varicelës
- 3-Fruthit
- 4-Skabiesit

P.S--

96-Ekzantema që shfaqet edhe në lëkurën me flokë flet për:

- 1-Rubeolë
- 2-Varicelë
- 3-Fruth
- 4-Skarlatinë

P.S--

97-Rashi kutan makulo-papulo-vezikular, i shoqëruar me temperaturë të lartë dhe prurit flet për:

- 1-Rubeolë
- 2-Varicelë
- 3-Fruth
- 4-Skarlatinë

P.S--

98-Meningiti i latantit ka:

- 1-Konvulsione
- 2-Përgjumësi
- 3-Apnoe
- 4-Të gjitha të mësipërmet

P.S--

99-Janë komplikacione të varicelës të gjitha, me përjashtim të:

- 1-Qelbëzimi i elementeve kutane
- 2-Sindromi Reye
- 3-Glomerulonefriti
- 4-Herpes Zoster

P.S--

100-Shenja madhore e glomerulonefritit akut është:

- 1-Proteinuria
- 2-Hematuria
- 3-Hipertensioni arterial
- 4-Anemia

P.S----