



**1) REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI I TIRANËS
2) FAKULTETI INFERMIERISË
T I R A N Ë**

Adresa : Rr. Dibrës, pranë Q. S. U. "Nënë Tereza", Tiranë; Tel. & Fax : 362 619;
Tel. : 345 823; E-mail : shli_tirane@yahoo.com

FAKULTETI I INFERMIERISE
DEPARTAMENTI I DIAGNOSTIKES DHE REHABILITIMIT SHENDETESOR

DEGA : IMAZHERI

PYETJE TË SPECIALITETIT

231. Lëndet e kontrastit në uro - angiografi

- A) janë shume toksike
- B) përkufizohen “negative”
- C) janë molekula me permbajtje jodi
- D) të gjitha janë të sakta

232. Kërkimi i limfonodujve për stadifikimin e tumoreve preferohet të kryhet me

- A) echo color doppler
- B) radiografi
- C) tomografi kompjuterizuar
- D) limfografi

233. Karakteristika patognomonike e spondilitit ankilozant në radiografi është

- A) kolona si shkop bambuje
- B) prania e osteofiteve marginale
- C) osteoporoza difuze
- D) osteoskleroza

234. Sa janë harqet kardiake në radiografinë standart të toraksit

- A) Pesë, dy në të djathtë dhe tre në të majtë
- B) Pesë, dy në majtë dhe tre në të djathtë
- C) Katër, një në të djathtë dhe tre në të majtë
- D) Gjashtë, tre në të djathtë dhe tre në të majtë

235. Cili është ekzaminimi i parë që indikohet për studimin e aortës abdominale

- A) ekografia me lende kontrasti
- B) ekografia e thjeshtë
- C) Skaneri
- D) Rezonanca

236. Nëse dyshohet për rapturë të aneurizmes së aortës abdominale ekzaminimi që kryhet është

- A) asnjë, pacienti operohet menjëherë
- B) angio – skaner
- C) angiografi dixhitale
- D) ekografia me kontrast

237. Ekzaminimi i zgjedhur për studimin e gjendrave mamare në paciente nën 40 vjeç është

- A) Rezonanca magnetike
- B) Mamografia
- C) Ekografia
- D) Shintigrafia

238. Cila thënie nuk është e saktë? Tomografia me multi dedektore në krahasim me ato me dedektore unik:

- A) përfiton imazhe me rezolucion më të lartë
- B) mbulon pjesë më të mëdha të trupit në më pak kohë
- C) redukton mundësinë e ekspozimit ndaj rrezatimit jonizues
- D) përdor më pak sasi të lëndës së kontrastit

239. Në studimin e sarkoidozës nuk është e indikuara

- A) shintigrafia me ⁶⁷Gallium
- B) radiografia e toraksit
- C) Skaneri me kontrast
- D) Rezonanca magnetike

240. Në studimin e nodujve të tiroide nuk është e indikuara

- A) ekografia
- B) angiografia digjitale
- C) shintigrafia
- D) biopsia nën eko

241. Skaneri në studimin e tumoreve pulmonare ka për qëllim

- A) të karakterizojë tumorin duke evituar biopsinë
- B) të vlerësojë aftësinë thithëse të kontrastit evlëshme për terapinë
- C) të stadifikojë tumorin (loko -regjional dhe në distancë)
- D) të vlerësojë rrugën e vazave për nderhyrjen kirurgjikale

242. ne pacientin adult me episod te papritur epilepsie nuk eshte e indikuar

- A) Studimi angiografik i vazave periaortale
- B) rezonanca e trurit
- C) skaner i kokes
- D) Elektroencefalograma

243. Ne vleresimin e osteoporozes ekzaminimi i pare qe kryeht eshte

- A) radiografia e kockave
- B) shintigrafia
- C) densitometria kockore
- D) rezonanca magnetike

244. lendet e kontrastit me barium jane te kundraindikuara ne pacientet me

- A) konstipacion kronik
- B) suspekt perforacion intestinal
- C) insuficiencie renale kronike
- D) diabet

245. studimi me skaner me rezolucion te larte eshte i indikuar ne

- A) tumor pulmonar primitiv
- B) bronkopneumonite kronike obstruktive
- C) versamentet pleurike
- D) metastazat miliariforme

246. Nese dydhohet per disekim te aortes torakale duhet te kryeht urgjentisht

- A) ekokardiografia
- B) radiografi e toraksit
- C) shintigrafi me tallium
- D) eko color doppler

- 247.ekzaminimi i pare ne suspekt tumor kockor konsiderohet
- A) radiografia
 - B) shintigrafia
 - C) rezonanca magnetike
 - D) skaneri

- 248.Ne radiografine e toraksit ne projeksionin posterior - anterior harku i dyte kardiak ne te majte perfaqson
- A) atriumin e majte
 - B) arterien pulmonare
 - C) harkun e aortes
 - D) ventrikulin e majte

- 249.metoda e pare ne ekzaminimin e venave varikoze te ekstremiteteve inferior eshte
- A) flebografi dixhitale
 - B) angiorezonanca
 - C) angioskaner
 - D) eko color dopler

- 250.per diagnozen e pneumotoraksit ne fillim kryhet
- A) ekografia transezofageale
 - B) skaneri pa kontrast
 - C) skaneri me kontrast
 - D) radiografi toraksi

- 251.studimi me Skaner me multidedektore ne suspekt emboli pulmonare
- A) Nuk ka asnje rol
 - B) Studion arterien pulmonare dhe shenjat e trombozes venoze te thelle
 - C) Kundraindikohet per shkak te rrezikut qe sjell lenda e kontrastit
 - D) Eshte ekzaminimi i pare qe kryehet ne urgjence

- 252.metodika e duhur per realizimin e biopsise pulmonare eshte
- A) fluoroskopia
 - B) ekografia

- C) skaneri
- D) rezonanca

253. nxirja e filmit radiografik lidhet

- A) proporcion te drejte me perthithjen e rrezatimit jonizues qe kalon trupin
- B) proporcion te zhdrejte me thithjen e rrezatimit jonizues qe kalon trupin
- C) Proporcion te zhdrejte me distancen trup film
- D) Proporcion te drejte me distancen burim film

254. cila metodike zgjidhet per te studiuar detajet anatomike te aneurizmes se aortes torakale

- A) radiografia e toraksit
- B) angiografia dixhitale
- C) angioskaner
- D) ekografia transezofageale

255. nese dyshohet per stenoze te srteries renale ne pacientin hipertensiv, ekzaminimi i pare qe kryhet eshte

- A) angioskaner
- B) Angiorezonance
- C) Eko color doppler
- D) Angiografi dixhitale

256. nese ka rrjedhje nga thithi i gjirit ekzaminimi i indikuar eshte

- A) ekografia e gjirit
- B) mamografia
- C) galaktografia
- D) rezonanca magnetike me dhe pa kontrast

257. Ne studimin e steonoze karotide ekzaminimi i zgjedhur eshte

- A) eko color doppler
- B) angiorezonance
- C) angioskaner
- D) angiografi dixhitale

258. Rezonanca magnetike e gjurit nuk vlereson

- A) menisqet
- B) ligamentet cruciat
- C) kalcifikimet
- D) versamentin intraartikular

259. ekzaminimi i pare qe kryhet ne pacientet me hemoptize eshte

- A) skaneri
- B) shintigrafia me gallium
- C) shintigrafi me hemoglobine te markuar
- D) radiografia e toraksit ne dy projeksione

260. ne studimin e luksacionit te shpatulles ekzaminimi i indikuar eshte

- A) radiografi me ngarkese
- B) rezonance pa kontrast
- C) rezonance me kontrast intraartikular
- D) skaneri

261. ekzaminimi i pare ne iktus hemorragjik eshte

- A) rezonanca magnetike
- B) skaneri me kontrast
- C) skaneri pa kontrast
- D) angiografia dixhitale

262. cili nga ekzaminimet e meposhtme indikohet per vleresimin e medulles spinale

- A) skaneri
- B) rezonanca magnetike
- C) radiografia
- D) osteodensitometria kockore

263. ne nje subjekt me hiperparatiroidizem primar cili nga ekzaminimet e meposhtme nuk eshte e indikuar

- A) ekografia
- B) rezoanca magnetike

- C) skaneri
- D) radiografia e qafes

264. cila eshte rruga kryesore e eliminimit te lendeve te kontrastit jodik nga organizmi

- A) anale
- B) hepatike
- C) salivare
- D) renale

265. Ne nje radiografi direkte abdomeni cila eshte shenja qe tregon dyshim klinik te okluzionit intestinal

- A) opacitet abdominal i perhapur
- B) radiotransparence abdominale e perhapur
- C) nivele hidroaerike abdominale
- D) linje ajri subdiafragmatik

266. ne rast traume muskulare me suspekt hematome ne pulpen e kembes cila metode eshte me e pershtatshme

- A) Skaner pa kontras
- B) Skaner me kontrast
- C) Radiografi konvencionale
- D) Ekografi

277 Nese dyshohet per perforacion intestinal cili eshte ekzaminimi i pare qe duhet kerkuar ne urgjence

- A) ekografi abdominale
- B) radiografia e traktit tretes me sulfat bariumi
- C) klizme me dopio kontrast
- D) radiografi direkte abdomeni

Pyetja 278. Ekzaminimi radiologjik i toraksit nuk mund te kryhet me

- A) aparat mamografie
- B) me shtrat horizontal radiografie
- C) me aparature Dr
- D) me aparature CR

279. nje kist renal i thejshte ne ekzaminimin ekografik do te jete

- A) anekogen
- B) Hiperekogen
- C) Hipoekogen
- D) Izoekogen

280. Cili ekzaminimesht eme i indikuar per ndjekjen e pacientit me pankreatit akut

- A) ERCP
- B) Kolangio rezonanca
- C) Kolangiografia
- D) Ekografia

281. nese nje pacient mbi 50 vjec me episode hematurie dhe ekografikisht nuk rezulton kalkuloze renale, cili eshte ekzaminimi qe duhet kryer?

- A) radiografi e aparatit urinar
- B) Ekografi me kontrast
- C) urografi
- D) Uro skaner

282. nese dyshohet per frakture menisku post traumatik, cili ekzaminim duhet kryer

- A) radiografi koinvencionale
- B) rezonance magnetike
- C) Ekografi
- D) skaner i artikulacionit

283. ne nje grua me diagnoze mamografike te mikroklacifikimeve parenkimale cili ekzaminim i rekomandohet me pas

- A) galaktografia
- B) biopsia nen eko
- C) biosia stereotaksike
- D) Ekografia

284. nese dyshohet per ikter obstruktiv cili ekzaminim preferohet te kryhet ipari

- A) kolangiorezonance
- B) skaner abdomeni pa kontrast
- C) ekografi abdomeni
- D) skaner abdomeni me kontrast

285. ne nje grua 25 vjec me nje nodul mamar te prekshem, cili eshte ekzaminimi me i indikuar

- A) galaktografia
- B) ekografia
- C) mamografia
- D) rezonanca

286. Gadolinio e pershkron barrieren hemato encefalike ne

- A) ne rastet e tumoreve
- B) kur eshte demtuar barriera hematoencefalike
- C) asnjehere
- D) gjithmone

287. cili ekzaminim esht eme indikuar ne rast te ndjekjes se komplikacioneve te nje pankreatiti akut

- A) ekografia abdominale
- B) radiografia abdominale
- C) Kolangiorezonanca
- D) Skaneri me lende kontrasti

288. Ne nje pacient 70 vjec me gjak okult pozitiv ne fece dhe me dyshim per tumor intestinal cili ekzaminim duhet kryer

- A) Iriografia me kontrast unik
- B) Iriografia me dopio kontrast
- C) Kolonsigmoidoskopia
- D) Skaner abdomeni me kontrast

289. Ne nje pacient me metastaza kockore cili eshte ekzaminimi qe vlereson me mire perhapjen e semundjes

- A) skaner me kontrast i te gjithe trupit
- B) skaner pa kontrast i te gjithe trupit

- C)shintigrafia kockore skeletike
- D)rezonance e kollones lumbare

290 Cilat jane burimet e energjise qe perdoren ne MRI?

- A) infrared
- B) fusha magnetike dhe valet e radios
- C) rrezatimi jonizues
- D) ultratingujt

291. Cili eshte aspekti radiografik tipik i likuidit pleural ne radiografine e pulmonit ne pozicion ortostatik

- A)opacitet modular
- B)zone radiotrasparente apikale
- C)Zone radiotrasperente bazale
- D)Opacitet bazal me kufij te sipërm konkav

292. Ne patologjite koronare acute cili ekzaminim konsiderohet I standartit te arte per te vleresuar anatomine e koronareve

- A) Kardio CT
- B) Ekokardiografia
- C) Kardio MRI
- D) Koronarografia

293. Ne nje pacient me kolika renale acute cili eshte ekzaminimi I pare qe realizohet

- A) pielo MRI
- B) uro MRI
- C) ekografi
- D) urografi

294. ne pacientin me arteropati obliteante periferike cili eshte ekzmainimi me I mire per tu kryer

- A) Angio MRI
- B) ANgio CT
- C) Ekokolor Doppler
- D) Angiografi

295. cili ekzaminim indikohet per te vleresuar funksionin renal

- A) Uro CT
- B) Shintigrafia renale
- C) Urografia
- D) Uro MRI

296. cili eshte ekzaminimi i pare qe realizohet ne nje pacient me trauma kraniale

- A) Radiografi crani
- B) MRI e trurit
- C) CT bazale
- D) Ct me contrast

297. nese dyshohet per semundje inflamatore kronike intestinale cili ekzaminim dyhet kryer per te perftuar nje diagnosze me te sakte

- A) Entero MRI
- B) Radiografi e aparatit tretes
- C) Kolonsigmoidoskopia
- D) Ekografi me contrast oral

298. nese dyshohet klinikisht per emboli pulmonare cili eshte ekzaminimi qe na jep diagnozen me te sakte

- A) Radiografi toraksi
- B) Angio CT e toraksit
- C) Ekokardiografia
- D) Ekografia trasezofageale

299. kolangio MRI kerkon

- A) Perdorimin e lendes se kontrastit
- B) Mosperdorimin e lendes se kontrastit
- C) Kateterizimin e vijave biliare
- D) Perdorimin ne ikterin hepatoqelizor

300. ne rast se dyshohet per perforacion gastric cili eshte ekzaminimi I pare qe realizohet

- A) Radiografi me sulfat barium
- B) Radiografi direkte abdomen ne kembe
- C) CT abdominal
- D) Ekografi

301. nese dyshohet per limfonoduj mediastinale cila metodike eshte me e pershtatshme per te vleresuar mediastinin

- A) Ekografia
- B) CT
- C) Ekodopler me contrast
- D) Radiografi direkte e toraksit

302. kriteret radiologjike te malinjitetit te nje nodusi pulmonary te paqarte jane

- A) Forme e crregullt
- B) Konture te cregullt
- C) Mungesa e kalcifikimeve apo kalcifikime qendrore
- D) Te gjitha jane te sakte

303. Galaktografia

- A) Duhet te kryhet gjithmone kur ka sekrecione seroze pluriorificiare
- B) Kerkoehet para interventit per te percaktuar vendin e tumorit dhe parenkimen perreth
- C) Kryhet ne rast te pranise se sekrecioneve mono orificiare
- D) Kryhet nen kontrollin ekografik

304. nese dyshohet klinikisht per rupture te aneurizmes se aortes abdominale nen arterien renale cili ekzaminim duhet kryer

- A) Radiografi direkte abdomen
- B) CT me contrast
- C) MRI
- D) Angiografi

305. koha e pergjysmimit fizik ten je izotopi radioaktiv eshte

- A) Koha kur radioaktiviteti fillestar reduktohet me 50%
- B) Koha kur lenbda radioactive zhduket plotesisht
- C) Koha brenda se ciles radioizotopi ehste I perdorshem
- D) Asnje nga pergjigjet e mesiperme

306. ne studimin e retroperitoneumit metoda diagnostike e preferuar eshte:

- A) Urografi
- B) CT
- C) Ekografi
- D) MRI

307. cili nga indet e meposhtme humane eshte me rezisten ndaj rrezatimit
- A) Lekura
 - B) Indi I lemuar
 - C) Ovaret
 - D) Epiteli
308. cila esht metodika me e ndjeshme ne diagnostikimin e torsionit testicular
- A) Urografia
 - B) CT
 - C) Ekokolor Doppler
 - D) MRI
309. radiografia e abdomenti
- A) Duhet kryer esell
 - B) Duhet te kryhet para CT
 - C) Indikohet ne rast te suspektit te okluzionit intestinal
 - D) Te gjitha jane te sakta
- 310 Ekazminimi I zgjedhur per kerkimin e metastazave koskore ne nje pacient onkologjik asimptomatik eshte
- A) Shintigrafia kockore
 - B) MRI
 - C) CT
 - D) Radiologjia konvencionale
311. MRI e trurit eshte absolutisht e kundraindikuuar ne
- A) Pacientet epileptike
 - B) Ne pacientet te operuar ne koke
 - C) Ne paciente me anemi falciforme
 - D) Ne pacientet me pace maker kardiak
312. Nese dyshohet per pneumotoraks, nese radiodiografia e toraksit nuk eshte e qarete cila teknike ka vlera me te medha diagsotike
- A) CT
 - B) MRI
 - C) Shintigrafi
 - D) Angiografi

313. cili ekzaminim kryhet I pari ne vleresimin e tendinopative
- A) Ekografia
 - B) Radiografi e indeve te buta
 - C) CT
 - D) Kserografi
314. ne cilat raste indikohet kolangiografia perkutane
- A) Kolecistit kronik
 - B) ikter obstruktiv
 - C) kolelitiaze
 - D) cirroze biliare
315. ekografia transvaginale ne studimin e patologjive uterine eshte
- A) e perdorshme shume pak sepse ka vlera diagnostike
 - B) nje metode e sakte edhe per studimin e tumoreve uterine
 - C) e perdorshme vetem ne vleresimin e malformacioneve uterine
 - D) vlefshme vetem nese kryhet me contrast
316. diagnostikimi I nje pacienti me ematemeze realizohet me
- A) radiografi e traktit tretes me contrast
 - B) radiografi direkte abdomen
 - C) ekografi
 - D) endoskopi
317. CT e toraksit
- A) realizohet Pas kryerjes se radiografive
 - B) lejon kryerjen e biopsive perkutane
 - C) lejon stadifikimin e formacioneve
 - D) te gjitha jane te sakta
318. ne dyshim kliniko- radiologjik te karcinomes pulmonare , eksaminimi I indikuar eshte
- A) ekotomografia me color Doppler
 - B) MRI
 - C) CT
 - D) Arteriografia

319. ne rast te hematomes posttraumatike ne kofshe cila teknike radiografike eshte me e pershtatshme

- A) Ekotomografia
- B) Kserografia
- C) Termografia
- D) Grafi direkte

320 . cili eshte ekzaminimi I pare I zgjedhur per diagnozen e frakturave kockore

- A) Radiografi ditekte ne projeksione te ndryshme
- B) Shintigrafia
- C) MRI
- D) CT

321. Ne emboli pulmonare ekzaminimi mei pershtatshem eshte

- A) Kavografia superior
- B) CT spirale
- C) MRI
- D) Ekokolor Doppler

322. cila lende kontrasti indikohet intravene ne CT

- A) Sulfat barium
- B) Gadolinio
- C) Lende jodike e tretshme ne uje
- D) Radiotrasparente

323. ne studimin e veshit te mesem metodika e zgjedhur eshte

- A) MRI
- B) Radiografi
- C) Tomografi
- D) CT me rezolucion te larte

324. cila nga keto qeliza eshte me e ndjeshme ndaj rrezatimit

- A) Limfocitet
- B) Astroцитet
- C) Hepatocitet
- D) Qelizat nervore

325. cfare eshte dozimetria

- A) Matja e dozave se thithet nga organizmi dhe qelizat e tij
- B) Vleresimi I dozave te rrezatimit qe shkaktojne detyr te qendrueshme ne organizem
- C) Vlereson frekuencen e tumoreve ne raport me dozen e rrezatimit
- D) Te gjitha jane te sakta

326. cfare jane ultratingujt

- A) Energji mekanike
- B) Sasi elementare energjie
- C) Drite e dukshme
- D) Vale te radiofrakuenca

327. cila eshte metoda qe perdoret me shpesh per funksionet perkutane te vijave biliare

- A) Ekografia
- B) MRI
- C) Kolangiografia intravenoze
- D) ERCP

328. cili eshte ekzaminimi I pare qe kryhet per studimin e bifurkacionit carotid

- A) AngioMRI
- B) Angiografi
- C) Ekografi
- D) MRI

329. radiondjeshmeria e indeve varet nga

- A) Aktiviteti mitotic
- B) Nga oksigjenimi
- C) Nga sasia e indit dhjamor
- D) Asnjera nuk eshte e sakte

330. ne rast te osteopenise ekzaminimi radiografi standart

- A) Mundeson diagnozen ne faze fillestare
- B) Mundeson diagnozen vetem ne faze te vonshme
- C) Mundeson humbjen sasiore koncore
- D) Eshte I pavlefshem

331. cila teknike ekografike perdoret ne studimin e eneve te gjakut

- A) Ekotomografia
- B) Doppler I vazhdueshem

- C) Color Doppler
- D) Te gjitha jane te sakta

332. nje formacion me permbajte te ujhme ne ekografi duket

- A) Hypoekogen
- B) Anekogen
- C) Hiperekogen
- D) Izoekogen

333. MRI e gjirit nuk ka specificitet te larte ne diagnostikim

- A) Ne prani te protezave te gjirit
- B) Ne studimin e mikorkalcifikimeve
- C) Ne monitorim gjate kimioterapise
- D) Asnjera nuk eshte e sakte

334. ne studimin e surrenaleve ekzaminimi I zgjedhur eshte

- A) MRI
- B) CT
- C) Ekografi
- D) Angiografi

335. cfare burimi energjie perdoret ne ekografi

- A) Rrezatimi jonizues
- B) Valet mekanike
- C) Infrate kuqe
- D) Elektromagnetike

336. ne cilat nga patologjia e meposhtme ekzaminimi radiologjik jep pak ose aspak informacion

- A) Hepatitis akut
- B) Steatoza
- C) Cirroza
- D) Absesi

337. cila nga ekzaminimet e meposhtme perdoret ne nje trauma kraniale

- A) MRI
- B) CT
- C) Radiografi krani
- D) EEG

338. kundraindikacionet absolute te MRI ne patologjite kardiovaskulare
- A) Pacemaker
 - B) Klaustrofobi
 - C) Klipet metalike kirurgjikale
 - D) Suturat metalike post sternotomise
339. cila eshte metoda e zgjedhur ne studimin e variceles
- A) Ekodoppler
 - B) CT
 - C) Linfografia
 - D) Arteriografia selekstive e arteries ipogastrike
340. cfare lloj rrezatimi perdoret ne CT
- A) Ultraviolet
 - B) Ultratingull
 - C) Rreze X
 - D) vale elektromagnetike
341. ne rast se dyshohet per kalkuleze te vijave biliare cila teknike diagnostikuese kryhet e para
- A) Ekografia
 - B) Ekokolor Doppler
 - C) Shintigrafia
 - D) CT
342. cila eshte rruga kryesore e eliminimit te lendeve te kontrastit me permbajjte jodike
- A) Hepatik
 - B) Renal
 - C) Lekura
 - D) Salivare
343. ne rast se dyshohet per tumor te prostates cila nga teknikat e meposhtme kryhet e para
- A) CT
 - B) Angiografia
 - C) MRI
 - D) Ekografia transrektale
344. cila nga metodat e meposhtme nuk e vizualizon diskun intervertebral
- A) Radiografia standarte e kollones vertebrale

- B) CT me contrast
- C) CT baze
- D) MRI

345. ne nje radiografi toraksi kendi kostrofrenik eshte I pozicionuar

- A) Ne hapesiren retrokardiake
- B) Mes brinjeve dhe sternumit
- C) Mes trakese dhe harkut pulmonary
- D) Ne bazen e pulmonit ne ekstremin lateral

346. ne cilat nga rastet e meposhtme kundraindikohet perdorimi I lendeve te kontrastit ne ekografi

- A) Insuficience e rende hepatike
- B) Insuficience e rende renale
- C) Insuficience respiratore
- D) Patologji kardiovaskulare

347. cila nga keto struktura ndan fossa nasalis nga kaviteti oral

- A) Palatum molle
- B) Palatum duro
- C) Palatum molle e palatum duro
- D) Asnjera

348. flebografia eshte ekzaminim qe diagnostikon

- A) Arteriet
- B) Venat
- C) Artikulacionet
- D) Te gjitha strukturat

349. per vleresimin e lezioneve angiomatoze ne parenkimen hepatike cili eshte protokolli diagnostic

- A) Ekografi, angiografi, MRI
- B) Ekografi, CT, MRI
- C) Angiografi, ekografi, ekokolor Doppler
- D) MRI, ekografi

350. per te bere diagnozen e hidronefrozes eshte e mjaftueshme vetem

- A) MRI

- B) CT
- C) Urografia
- D) Ekografia

351. ne nje pacient me iktus cerebral akut ekzaminimi I pare qe kryhet eshte

- A) Angiografia cerebrale
- B) Radiografia e toraksit
- C) CT
- D) Elektroencefalograma

352. MRI e kollones vertebrale ka vlere ne studimin e

- A) Medulles spinale dhe rrenjeve nervore
- B) Komponentit kockor vertebral
- C) Vaskularizimit te medulles
- D) Funksionit dinamik te kollones

353. vizualizimi I ezofagut arrihet me

- A) Sulfat barium
- B) Radiografi toraksi
- C) Ekografi
- D) Shintigrafi me tekneций

354. urografia intravenoze kundraindikohet ne patologjite e meposhtme pervec

- A) Nefritit akut
- B) Kardiopati e rende
- C) Insuficienca hepatike
- D) Diabeti insipid

355. shenjat radiologjike te asbestozes pulmonare jane

- A) Pllaka pleurale
- B) Aspect retikuloendotelial I perhapur
- C) Strije retikulare bazale
- D) Te gjitha jane te sakta

356. cili eshte ekzaminimi I pare I zgjedhur ne tumoret e medulles spinale

- A) CT
- B) MRI
- C) Mielografia
- D) Shintigrafia

357. ne osteoporoze
- A) Masa kockore eshte e zvogeluar
 - B) Masa kockore eshte normale
 - C) Masa kockore eshte e rritur
 - D) Asnjera nuk eshte e sakte
358. cfare tipesh radiologjike te kalkulavebiliare ekzistojne
- A) Vetem radiopake
 - B) Vetem radiotrasparente
 - C) Vetem te perziere
 - D) Radiopak , radiotrasparente dhe te perziere
359. cila teknike radiologjike vlereson frakturat kockore faciale qe nuk duken mire ne grafi
- A) Ekografia
 - B) CT me shtresa te holla
 - C) MRI
 - D) Zonografia e fytyres
360. ne studimin e pneumopatise interstiziale ekzaminimi me I mire konsiderohet
- A) Radiografi toraksi
 - B) Ekografia
 - C) CT
 - D) MRI
361. ne radiografine P-A te toraksit harku kardiak inferior ne te djathte perkon me
- A) Atriumin e majte
 - B) Infundibulin e arteries pulmonare
 - C) Ventrikulin e majte
 - D) Atriumin e djathte
362. per evidentimin e metastazave pulmonare ekzaminimi I zgjedhur eshte
- A) CT
 - B) MRI
 - C) Angiografi
 - D) Ekografi toraksi

363. te gjitha situatat e meposhtme mund te japin imazh kalçifikimi ne radiografine e andomenit pervec

- A) Kalkuloza renale
- B) Aneurizma e ortes
- C) Pankreatiti kronik
- D) Divertikuli Meckel

364. ne vleresimin e limfadenopaive retroperitoneale , cila nga teknikat e meposhtme eshte me e pershtatshme

- A) Ekografia endokavitare
- B) PRT
- C) CT
- D) SPECT

365. cila nga patologjite e meposhtme mund te jape metastaza kockore me densitet te rritur

- A) Carcinoma e prostatës
- B) Carcinoma e ovarit
- C) Melanoma
- D) Carcinoma pulmonbare

366. cila eshte metodika me e pershtatshme per studimin e prostatës

- A) Ekografia transabdominale
- B) Ekografia trasrektale
- C) CT
- D) Cistografia miksionale

367. ne pankreatitin akut eshte me e vlefshme

- A) Ekografia
- B) MRI
- C) CT
- D) Radiografia tradicionale

368. cila nga patologjite emeposhtme nuk perben indikacion per histerosalpingografi

- A) Steriliteti primar apo sekondar
- B) Aborti spontan
- C) Kisti ovarial
- D) Tumori pelvic

369. cila eshte metodika kryesore qe perdoret per follow – up (ndjekje) te pacientit me transplant renal

- A) CT
- B) MRI
- C) Urografi
- D) Ekografi + ekokolor Doppler

370. ne studimin e artikulazionit te shpatulles cila nga ekzaminimet e meposhtme nuk ka vlere diagnostike

- A) Angiografia
- B) Radiografia e artikulacionit
- C) CT
- D) MRI

371. spondilolisteze do te thote

- A) Rreshkitje prapa te trupit te nje vertebre
- B) Rreshqitje laterale te trupit ten je vertebre
- C) Rreshqitje anterior te trupit ten je vertebre
- D) Frakture e trupit ten je vertebre

372. ne tumoret e rektumit, CT eshte ne gjendej ete percaktoje

- A) Shtrirjen ekstraparietale, limfonodujt lokoregjonale
- B) Shkallen e prekjes se paretit rectal
- C) Shtrirjen jashte paretit
- D) Asnjeren prej te mesipermeve

373. cila eshte metodika e zgjedhur ne studimin e mameles

- A) Mamografia
- B) Ekografia
- C) MRI
- D) Termografia

374. ne rast te renit polikistik, urografia intravenoze rezulton

- A) Ekzaminimi kryesor ne protokollin diagnostic
- B) Ekzaminim sekondar pas ekografise
- C) Ekzaminim me vlere nese kryhet dhe shintigrafia
- D) Ekzaminim qe nuk ka rol ne diagnozen diferenciale

375. ne cilat nga patologjite e meposhtmehepatike, biopsia perkutane nen drejtimin ekografik rezulton metode komplementare diagnostike

- A) Angioma e thjeshte
- B) Angioma kavernoze
- C) ne tumoret primitive
- D) shunti porto –kaval

376. Cila eshte shenja ekografike qe karakterizon kalkujt

- A) efekti pasqyre
- B) hija akustike
- C) hije posteriore ne forme koni
- D) perdorcimi paretit posterior

377. sa lobe ka pulmoni I djathte

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

378. cila metode ekzaminimi stadifikon me sakte karcinomen ekstrakapsulare te prostates

- A) CT
- B) MRI
- C) Urografia
- D) Ekotrasnrektale

379. komponenti glandular I mameles duket ne radiografi

- A) Radiotrasparente
- B) Radiopake
- C) E kalcifikuar
- D) Te gjitha jane te sakta

380. ne rast pankreatiti kronik cila teknike jep informacion me tesakte

- A) Shintigraifa sekuenziale
- B) CT me dhe pa contrast
- C) Radiografi direkte abdomen
- D) Angiografia selective

381. imazhi ‘plus’ ne radiografine me sulfat barium te stomakut vjen nga

- A) Gastritis kronik
- B) Polipi gastric

- C) Lipoma gastrike
- D) Ulcera gastrike

382. kur perdoret ekografia ne studimin e mamelles

- A) Vetem ne grate e reja
- B) Vetem ne grate e moshuara
- C) Kur duhet te diferencohet natyra solide apo likuidiene e nje lezioni
- D) Ne asnjeren nga keto rast

383. rapture e ligamentit cruciat ne artikulationin e gjurit diagnostikohet tme mire me

- A) CT
- B) Ekografi
- C) MRI
- D) Grafi ne dy projeksione e gjurit

384. cili eshte ekzaminimi I pare qe realizohet ne studimin e sinuseve paranazale

- A) CT
- B) MRI
- C) Radiografi crani
- D) Ortopantomografia

385. Aparatura e osteodensitometrise kockore sherben per

- A) Te pershkruar morfologjikisht skeleton
- B) Per te percaktuar asen kockore
- C) Per te matur
- D) Permbajtjen dhe densitetin kockor
- E) Per te bere diagnoszen e hershme te frakturave patologjike

386. ne radiografine e toraksit harku I trete ne te majte I hijes se zemres perkon me

- A) Vena kava
- B) Ventrikulin e majte
- C) Aorten zbritese
- D) Atriumin e majte

387. Me i ndjeshem nga rrezatimi eshte

- A) Indi kolagjen
- B) Indi tirodien
- C) Indi hepatic
- D) Palca e kurrrizit

388.s Shintigrafia

- A) Kryhet gjithmone ne rast te patologjive traumatike
- B) Kryhet nepermjet injektimit iV te tekneziumit 99
- C) Perdoret ne kerkimin e metastazave kockore edhe nese radiografia eshte pa problem
- D) Nuk indikohet ne pacientet mbi 60 vjec

389. per studimin e pemes vakulare arterioze lenda e kontrastit preferohet te injektohet

- A) Me rruge rektale
- B) Me rruge venoze
- C) Me rruge arteriale
- D) Me rruge respiratore

390. Ne pulmon shisura e vogel ndan

- A) Lobin superior nga ai I inferior
- B) Lobin e mesem nga ai superior
- C) Lobin e mesem nga ai inferior
- D) Lingulen nga lobi inferior

391. te gjitha patologjite e meposhtme japin imazh 'minus' ne grafine me sulfat barium pervec

- A) Tumorit gastric
- B) Polipit gastric
- C) Lipomes gastrike
- D) Gastritit kronik

392. cili ekzaminim eshte kryesor ne studimin prostates ne nje pacient mbi 50 vjec me rritje te PSA

- A) CT
- B) MRI
- C) Ekotrasrektale
- D) Urografia

393. patologjia nodular tiroides studiohet fillimisht me

- A) grafi te indeve te but ate qafes
- B) shintigrafi
- C) MRI
- D) Ekografi

394. cila ng ateknikat e meposhtme eshte kryesorja ne studimin e tubave uterine
- A) Radiografia direkte
 - B) Ekografia
 - C) CT
 - D) Histeroslappingografia
395. cilat jane efektet kryesore te rrezatimit jonizues
- A) Somatike
 - B) Gjenetike
 - C) Somatike dhe gjenetike
 - D) Asnjera
396. per studimin e lezioneve solide renale jane te vlefshme
- A) Ekografia
 - B) Urografia
 - C) CT
 - D) Te gjitha
397. ne rast te suspektit te embolise pulmonare radiografia e toraksit duhet
- A) Te mos kryhet ansjehere
 - B) Ka gjithnje vlere diagsotike
 - C) Duhet kryer gjithmone
 - D) Kryhet pas shintigrafise ventilo –perfuzionale
398. sulfati I bariumit I perdorur per diagnose thithet shume shpejt nga organizmi
- A) Jo
 - B) Po
 - C) Varet nga sasia e dhene
 - D) Varet nga perqendrimi
399. cialt jane karakteristikat ekografiek ten je structure solide dhe homogjene
- A) Prania eekove me densitet te njejte te shperndare homogjenikisht
 - B) Prania e ekove te dobeta ne zonat me permbajtje likuidiene
 - C) Hije akustike laterale
 - D) Anekogjenicitet
400. ne studimin e traumes faciale kryhet
- A) Vetem radiografia e craniumit

- B) Vetem CT
- C) Vetem MRI
- D) Radiografi crani dhe me pas CT

401. per studimin e qafes ekzaminimi I pare eshte

- A) CT
- B) MRI
- C) Ekografia
- D) Angiografia

402. ureterocela shkakton

- A) Diltacion ureteral cistik qe del ne vezike
- B) Komprimim te vezikes
- C) Hidroneforze
- D) Dilatacion ureteral

403. ne radiografine e toraksit radioopaciteti ulet ne pranine e

- A) Versamentit pleurik
- B) Pneumotoraksit
- C) Kistit
- D) Asnjera

404. shisurat pleurike

- A) Evidentohen ne radiografi dhe ne CT
- B) Evidentohen vetem ne radiografi
- C) Evidentohen vetem ne CT
- D) Evidentohen me ekografi

405. cilat jane kundraindikacionet kryesore ne kryerjen e MRI

- A) Pacemaker apo aperture te tjera te terapise intensive
- B) Prania e fragmenteve metalike ne korne
- C) Proteza valvulare karidake metalike
- D) Te gjitha jane te sakata

406. cfare eshte efekti doppler

- A) Modifikim I frekuences se ultratingullit kur reflektohet nga nej trup ne levizje
- B) Modifikim I drejtimit te ultratingullit nga veprimi me eritrocitet
- C) Reflektim I ultratingullit nga paretet vaskulare
- D) Modifikim I ultratingullit nga verpimi me indin dhjamor

407. si percaktohen ne ekografi strukturat e thjeshta likuidiene
- A) Anekogene
 - B) Hiperkogene
 - C) Isodense
 - D) Izoekogene
408. lenda e kontrastit ne CT
- A) Administrohet me rruge venoze dhe orale
 - B) Nuk rekomandohen
 - C) Administrohen vetem liposolubilet
 - D) Ne CT e traktit tretes jepet sulfat barium
409. per te diangostikuar dhimbjene kokes eshte e nevojshme te kryhet
- A) EEG
 - B) MRI cerebrale
 - C) CT
 - D) ASnjeren
410. ne nje pacient me suspekt per iktus CT cerebrale kryehet ne urgjence
- A) Gjithmone
 - B) Asnjehere
 - C) Vetem nese ka hemorragji
 - D) Vetem ne pacient ne koma
411. nese dyshohet per disekim intracranial te arteries vertebrale ekzaminimi I pare qe kryhet eshte
- A) Radiografi crani
 - B) Punksioni lumbar
 - C) Angio MRI intrakraniale
 - D) Asnjera
412. cilat jane ekzaminimet kryesore per te vene diagnozen e sklerozes multiple
- A) CT cerebrale , EEG
 - B) EMG, ekzaminimi I likidit, biopsi nervi
 - C) MRI , ekzaminim likidi
 - D) MRI, ekodopler e vazave pariaortike, hemokoagulim

413. cili ekzaminim konsiderohet I standartit te arte per studimin e strukturave arteriale
- A) Ekografia
 - B) Ekodoppler
 - C) MRI
 - D) Angiografi
414. ne cilat raste gadoliniumi e pershkon barrieren hematoencefalike
- A) Gjithmone
 - B) Kur barrier eshte e demtuar
 - C) Vetem tek femijet
 - D) Asnjehere
415. Cili ekzaminim lejon studimin e fazave te vatrave hemorragjike ne parenkimen cerebrale
- A) CT me contrast
 - B) Angiografia
 - C) AngioMRI
 - D) MRI pa contrast
416. Nuk eshte e vertete qe izotopet e nje elementi kane :
- A) nr atomike identike
 - B) nr mase atomike identike
 - C) cilesi fizike identike
 - D) densitet te njejte
417. Radioaktiviteti :
- A) radionuklidi eshte nje atom me nukleus te paqendrueshem
 - B) aktiviteti i radionuklidit eshte nr i shperberjeve ne nje ore (-)
 - C) njesia e aktivitetit eshte Bekereli
 - D) radioaktiviteti eshte nje proces stokastik
418. Ne projektionin PA te kycit te kembes , maleoli medial nuk duhet te vendoset mbi talus. Nese kjo ndodh ne duhet te
- A) bejme imobilizim me te mire
 - B) rregullojme rotacionin e kembes
 - C) rrisim dorsi fleksionin e kembes
 - D) ndryshojme drejtimin dhe kendin e rrezes qendrore

419. Nuk bën pjesë në nukleusin e një atomi :

- A) një neutron
- B) një proton
- C) një pozitron
- D) një foton
- E) një elektron

420. Radioaktiviteti:

- A) një nr fikso i atomesh zberthehen në njesinë e kohës (-)
- B) gjysmja e jetës efektive është gjithmone më e shkurtër sesa gjysmja e jetës biologjike ose fizike
- C) energjia është karakteristike për radionuklidin
- D) jodi-131 emeton pjesëza beta

421. Rrezatimi në dalje (i matur në hyrje të sipërfaqes së trupit të pacientit) nga tubi i rrezeve –x rritet me :

- A) rritjen e kilovoltazhit
- B) rritjen e levizjes brenda tubit
- C) rritjes së nr atomik të targetit
- D) rritjen e distancës me pacientin (-)

422. Rezolucioni hapësiror në CT varet nga :

- A) trashësia e prerjes
- B) vëllimi i prerjes
- C) madhësia e pikselit
- D) madhësia e matrisit

423. Ku ndodhet rrezja qendrore për projektimin PA të dorës

- A) Në mes të karpëve
- B) Në bazën e metakarpit të tretë
- C) Në artikulationin metakarpofalangeal të tretë
- D) Në artikulationin interfalangeal proksimal të gishtit të tretë

424. Duke filluar nga pozicioni prone sa grade duhet te rrotullohet dora per te përfutuar projektionin PA oblik te dores

- A) 15
- B) 25
- C) 35
- D) 45

425. Cila manover ne pozicionimin e kycit te dores hap hapesiren interkarpale ne grafine laterale te dores

- A) Hiperfleksionin
- B) Hiperekstensioni
- C) Devijimi ulnar
- D) Devijimi radial

426. cili projektion i kycit korrigjon shkurtimin e kockes skafoide

- A) PA
- B) Lateral
- C) PA me devijim ulnar
- D) PA me devijim radial

427. Ne cilin projektion te kycit te dores procesi styloid radial eshte i mbivendosur mbi procesin stiloid ulnar

- A) PA
- B) Lateral
- C) PA oblik
- D) PA aksial

428. Si duhet te pozicionohet dora dhe kyçi per te përfutuar projektionin PA oblik te kycit te dores

- A) Dora ne pronacion, rrotullohet kyçi me pjesen ulnare lart
- B) Dora ne pronacion, rrotullohet kyçi me pjesen radiale lart
- C) Dora ne supinacion, rrotullohet kyçi me pjesen lunare lart
- D) Dora ne supinacion, rrotullohet kyçi me pjesen radiale lart

429. Cili projektion i kycit tregon me mire koniken skafoide dhe artikulacionet qe lidhen me te
- A) Projektioni lateral
 - B) Projektioni inferosuperior
 - C) Projektioni me devijim ulnar
 - D) Projektioni me devijim radial
430. Cili eshte pozicioni i dores ne radiografine AP te parakrahut per te evituarmbivendosjen radiale
- A) Pronacioni i dores
 - B) Supinacioni i dores
 - C) Plani koronal i epikondileve te humerusit paralel me kaseten
 - D) Plani koronal i epikondileve te humerusit pingul me kaseten
431. Ne cilin projektion te parakrahut duhet qe bërryli te perthyhet me 90^0
- A) AP
 - B) Lateral
 - C) AP oblik medial
 - D) AP oblik lateral
432. Cili projektioni bërrylit tregon koken radiale pa superpozime
- A) AP
 - B) Lateral
 - C) AP oblik lateral
 - D) AP oblik medial
433. Si duhet te pozicionohet plani koronal i epikondileve te humerusit ne krahasim me kaseten per te përftuar projektionin lateral te bërrylit
- A) Paralel
 - B) Pingul
 - C) 45 grade rrotullim lateral
 - D) 45 grade rrotullim medial
434. Cili projektion i ekstremitetit superior tregon me mire koken radiale pa superpozime
- A) Ap oblik lateral i kycit
 - B) PA oblik medial i kycit

- C) AP oblik lateral i bërrylit
- D) AP oblik medial i bërrylit

435. Ne cilin projeksion oblik te ekstremitetit superior duket koka e radiusit e mbivendosur mbi ulnen

- A) AP oblik lateral i kycit
- B) PA oblik medial i kycit
- C) AP oblik lateral i bërrylit
- D) Ap oblik medial i bërrylit

435. Si duhet te pozicionohet plani koronal i epikondileve te humerusit ne krahasim me kaseten per te përftuar projeksionin AP te bërrylit

- A) Paralel
- B) Pingul
- C) 45 grade rrotullim lateral
- D) 45 grade rrotullim medial

436. ne cilin projeksion te bërrylit tregohet me mire olekranoni ne profil

- A) AP
- B) Lateral
- C) AP oblik lateral
- D) AP oblik medial

437. Cili projeksion i bërrylit tregon olekranonin ne fossa olekrane dhe procesin koronoid ne profil

- A) AP
- B) Lateral
- C) Ap oblik lateral
- D) AP oblik medial

438. kur realizohet projeksioni AP i humerusit cili element tregon saktesine e kryerjes se radiografise

- A) Centrimi i rrezes qendrore
- B) Pozicionimi i epikondileve
- C) Pozicionimi i kasetes

D) Vizualizimi i tuberkulet te vogel ne profil

439. Cili kriter vleresues tregon se humerusi eshte pozicionuar korrekt per projeksionin AP

- A) Epikondilet jane te mbivendosur
- B) Tuberkule i vogel duket ne profil
- C) Tuberkule i madh eshte i vendosur mbi koken e humerusit
- D) Koka humorale dhe tuberkuli i madh duken ne profil

440. duke ju referuar kasetes, si percaktohet nese humerusi eshte i vendosur korrekt per pozicionin lateral te tij

- A) Dora eshte ne pronacion
- B) Dora eshte vendosur ne pozicion korrekt lateral
- C) Plani koronal i epokondileve humorale eshte paralel
- D) Plani koronal i epikondileve humorale eshte pingul

441. Cili kriter vlerësues tregon se humerusi eshte pozicionuar korrekt per projeksionin lateral

- A) Tuberkule i vogel duket ne profil
- B) Divergjenca e tufes se rrezeve evidenton artikulacionin e bërrylit
- C) Koka e humerusit dhe tuberkule imadh duken ne profil
- D) Vizualizim maksimal i epikondileve pa rrotacion

442. Ne cilin klasifikim kockor grupohen brinjet

- A) Te sheshte
- B) Te gjata
- C) Te shkurtra
- D) Te crregullta

443. ne cilin klasifikim kockor grupohet sternumi

- A) Te sheshta
- B) Te gjata
- C) Te shkurtra
- D) Te crregullta

444. Cilat jane pjeset perberese te sternumit

- A) Koka, trupi dhe procesi ksifoid
- B) Koka , trupi dhe procesi odontoid
- C) Manubrium, trupi dhe procesi ksifoid
- D) Manubrium, trupi dhe procesi odontoid

445. Cila pjese e sternumit ndodhet me superiorisht

- A) Koka
- B) Trupi
- C) Manubriumi
- D) Prosesi ksifoid

446. Cila nga strukturat e mëposhtme artikulon lateralisht me incizuren jugulare

- A) Brinjet
- B) Klavikulat
- C) Trupi i sternumit
- D) Prosesi ksifoid

447. Ne cilen pjese te sternumit lokalizohet incizura jugulare

- A) Konturi lateral i sternumit
- B) Konturi lateral i manubriumit
- C) Konturi superior i trupit
- D) Konturi superior i manubriumit

448. cila pjese e sternumit eshte e lokalizuar ne nivel te T10

- A) Trupi
- B) Kendet
- C) Manubriumi
- D) Prosesi ksifoid

449. cila pjese e sternumit artikulon me ciftin e pare te brinjeve

- A) Konturi lateral i manubriumit
- B) Konturi lateral i trupit
- C) Konturi superior i manubriumit
- D) Konturi superior i trupit

450. Cili pozicion radiografik tregon sternumin te projektuar brenda hijes se zemres
- A) Oblik anterior i majte
 - B) Oblik posterior i majte
 - C) Oblik anterior i djathte
 - D) Oblik posterior i djathte
451. Per pozicionin oblik te sternutmit sa grade duhet te rrotullohet pacienti
- A) 15 – 20 grade
 - B) 25 – 30 grade
 - C) 30 -40 grade
 - D) 35 – 45 grade
452. Si drejtohet rrezja qendrore per te treguar me mire sternumin ne pozicion oblik
- A) Pingul
 - B) 15 grade kaudal
 - C) 15 grade cefalik
 - D) 20 grade kaudal
453. Cila procedure kryhet per te marre projeksionin lateral te sternumit
- A) Zhvendosen shpatullat përpara
 - B) I kërkohet pacientit te beje frymëmarrje te ngadalta
 - C) Ngre te dy krahet lart dhe mbeshtet parakrahet mbi koke
 - D) Rritet distanca burim – kasete deri ne 180 cm
454. Cila procedure kryhet per te treguar vetem nje artikulation sterniklavikular ne projeksionin PA
- A) Mbeshtetet mjekra ne trup
 - B) Drejtohet rrezja qendrore 15 grade medialisht
 - C) Kthehet koka e pacientit drejt anes ne studim
 - D) Ngrihet shpatulla ne studim 15 grade
455. Cila procedure kryhet per te treguar te dy artikulationet sternoklavikulare ne projeksionin PA
- A) Mbeshtetet mjekra ne trup
 - B) Drejtohet rrezja qendrore 15 grade medialisht
 - C) I kërkohet pacientit te beje frymëmarrje te ngadalte
 - D) Drejtohet rrezja qendrore qe te hyje ne nivel te T7

456. Si duhet te drejtohet dhe ku, rrezja qendrore per projeksionin PA per te dy artikulacionet sternoklavikular

- A) Pingul ne T3
- B) Pingul ne T7
- C) Medialisht me 15 grade, qe hyn ne T3
- D) Cefalik 15 grade, qe hyn ne T7

457. Per te treguar artikulacionet sternoklavikular bilaterelisht, cili kriter vleresimi tregon se pacienti eshte pozicionuar korrekt

- A) Duhet te duket rrotullim i lehte i anes se prekur
- B) Sternumi duhet te duket i teri
- C) Nuk duket rrotullim i artikulacioneve sternoklavikular
- D) Te dy klavikulat duhet te evidentohen plotësisht

458. Cili nga dy projeksionet e mëposhtme tregon me mire harkun anterior te brinjëve 5 dhe 6 te djathte

- A) PA dhe PA oblik me pacientin ne oblik anterior te majte
- B) PA dhe PA oblik me pacientin ne oblik antero te djathte
- C) AP dhe AP oblik me pacientin ne oblik posterior te majte
- D) AP dhe AP oblik me pacientin ne oblik posterior te djathte

459. Cili nga dy projeksionet e mëposhtme tregon me mire harkun anterior te brinjëve 6 dhe 7 te anes se majte

- A) PA dhe PA oblik me pacientin ne oblik anterior te majte
- B) PA dhe PA oblik me pacientin ne oblik anterior te djathte
- C) AP dhe AP oblik me pacientin ne oblik posterior te majte
- D) AP dhe AP oblik me pacientin ne oblik posterior te djathte

460. Cili nga dy projeksionet e mëposhtme tregon me mire harkun anterior te brinjëve 5 dhe 6 te anes se majte

- A) PA dhe PA oblik me pacientin ne oblik anterior te majte
- B) PA dhe PA oblik me pacientin ne oblik antero te djathte
- C) AP dhe AP oblik me pacientin ne oblik posterior te majte
- D) AP dhe AP oblik me pacientin ne oblik posterior te djathte

461. Cili nga dy projeksionet e mëposhtme tregon me mire harkun anterior te brinjeve 6 dhe 7 te anes se djathte

- A) PA dhe PA oblik me pacientin ne oblik anterior te majte
- B) PA dhe PA oblik me pacientin ne oblik antero te djathte
- C) AP dhe AP oblik me pacientin ne oblik posterior te majte
- D) AP dhe AP oblik me pacientin ne oblik posterior te djathte

462. Cili procedure kryhet per te treguar me mire harkun anterior te brinjeve 6 dhe 7

- A) Pacienti ne kembe, grafia kryhet pas mbushjes me fryme
- B) Pacienti ne kembe, grafia merret pas nxjerrjes se frymes
- C) Pacienti shtrire, grafia merret pas mbushjes me fryme
- D) Pacienti shtrire, grafia merret pas nxjerrjes se frymes

463. Ne se kushtet e pacientit e lejojne cila procedure duhet kryer per te marre radiografien me te mire per harqet posteriore te brinjeve 10, 11 dhe 12

- A) Pacienti prone, grafia kryhet pas mbushjes me fryme
- B) Pacienti prone, grafia kryhet pas nxjerrjes se frymes
- C) Pacienti supine, grafia kryhet pas nxjerrjes se frymes
- D) Pacienti supine, grafia kryhet pas mbushjes me fryme

464. Cili nga dy projeksionet e mëposhtme tregon me mire harkun posterior te brinjeve 10, 11 dhe 12 te anes se djathte

- A) PA dhe PA oblik me pacientin ne oblik anterior te majte
- B) PA dhe PA oblik me pacientin ne oblik antero te djathte
- C) AP dhe AP oblik me pacientin ne oblik posterior te majte
- D) AP dhe AP oblik me pacientin ne oblik posterior te djathte

465. Cili nga dy projeksionet e mëposhtme tregon me mire harkun anterior te brinjeve 10, 11 dhe 12 te anes se majte

- A) PA dhe PA oblik me pacientin ne oblik anterior te majte
- B) PA dhe PA oblik me pacientin ne oblik antero te djathte
- C) AP dhe AP oblik me pacientin ne oblik posterior te majte
- D) AP dhe AP oblik me pacientin ne oblik posterior te djathte

466. Cili pozicion radiografik tregon me mire harkun posterior te brinjës se 11 te pasuperpozuar nga vertebrat

- A) Oblik anterior te majte
- B) Oblik posterior te majte
- C) Oblik anterior te djathte
- D) Oblik posterior te djathte

467. Cili pozicion radiografik tregon me mire harkun posterior te brinjës se 10 te pasuperpozuar nga vertebrat

- A) Oblik anterior te majte
- B) Oblik posterior te majte
- C) Oblik anterior te djathte
- D) Oblik posterior te djathte

468. Cili pozicion radiografik tregon me mire harkun anterior te brinjës se 6 te pasuperpozuar nga vertebrat

- A) Oblik anterior te majte
- B) Oblik posterior te majte
- C) Oblik anterior te djathte
- D) Oblik posterior te djathte

469. Cili pozicion radiografik tregon me mire harkun anterior te brinjës se 5 te pasuperpozuar nga vertebrat

- A) Oblik anterior te majte
- B) Oblik posterior te majte
- C) Oblik anterior te djathte
- D) Oblik posterior te djathte

470. duke ju referuar pacientit, ku dihet te lokalizohet buza e siperme e kasetës per te treguar brinjët mbi diafragme ne projeksionin PA te brinjëve

- A) Ne nivel te T7
- B) Ne nivelt e klavikules
- C) 3.8 cm mbi shpatull
- D) 3.8 cm mbi kendin sternal

471. Per projeksionin AP qe tregon brinjët mbi diafragme kur duhet te mbahet fryma dhe fare efekti ka

- A) Ne inspirim te plote, do te ule diafragmen
- B) Ne inspirim te plote , do te ngreje diagrafmen

- C) Ne ekspirim te plote, do te ule diafragmen
- D) Ne ekspirim te plote, do te ngreje diafragmen

472. Per projeksionin AP qe tregon brinjet nen diafragme kur duhet te mbahet fryma dhe fare efekti ka

- A) Ne inspirim te plote, do te ule diafragmen
- B) Ne inspirim te plote, do te ngreje diafragmen
- C) Ne ekspirim te plote, do te ule diafragmen
- D) Ne ekspirim te plote, do te ngreje diafragmen

473. Per projeksionin AP qe tregon brinjet nen diafragme, ku lokalizohet kasete ne lidhje me pacientin

- A) Centrohet kasete ne nivel te L3
- B) Centrohet kasete ne nivel te kreshtes iliake
- C) Buza e poshtme e kasetes ne nivel te L3
- D) Buza e poshtme e kasetes ne nivel te kreshtave iliake

474. Cili projeksion tregon me mire pjesen aksilare te brinjëve

- A) AP
- B) PA
- C) Lateral
- D) AP oblik

475. Cila procedure mund te tregojë me mire brinjet 7, 8 dhe 9 te zhvendosur nga hija e diafragmes

- A) Rrezja qendrore pingul me T7
- B) Frymëmarrje te shpejta per te turbulluar diafragmen
- C) Centrim i larte dhe kend kaudal i rrezes qendrore
- D) Centrim i larte dhe kend cefalik i rrezes qendrore

476. Si emertohet zona mes dy kavitetëve pleurave

- A) Hilus
- B) Mediastin
- C) Hapësira pleurave
- D) Kavitetit torakal

477. cila strukture nuk duket ne mediastin ne radiografine PA te toraksit

- A) Zemra
- B) Trakea
- C) Diafragma
- D) Ezofagu

478. cila patologji e pulmonit shoqerohet me zevendesimin e ajrit me likuid ne nivel te intersticiumit pulmonar dhe alveolar

- A) Atelektaza
- B) Tuberkulozi
- C) Pneumotoraksi
- D) Edema

479. Pse radiografia e toraksit realizohet ne distance 180 cm

- A) Per te eliminuar lëvizjen e pavullnetshme te zemres
- B) Per te minimizuar zmadhimin e zemres
- C) Per te rritur zmadhimin e zemres
- D) Per te projektuar klavikulat mbi apekset

480. pse radiografia e pulmonit realizohet pas mbajtjes se frymes

- A) Per te eliminuar shenjat e brinjeve
- B) Per te hapur me mire pulmonet
- C) Per te treguar me mire pulmonin e kolabuar
- D) Per te reduktuar lëvizjen kardiake

481. Si eshte plani midsagital dhe midkoronal ne PA e pulmonit ne lidhje me kaseten

- A) Midsagital:paralel; midkoronal:paralel
- B) Midsagital:paralel; midkoronal: pingul
- C) Midsagital:pingul; midkoronal:paralel
- D) Midsagital:pingul; midkoronal:pingul

482. Per projeksionin PA te toraksit, cila manover realizohet per te larguar shpatullat nga fusha pulmonare

- A) Vendosen duart ne bel
- B) Rrotullohen shpatullat përpara
- C) Kryqëzohen duart mbi koke
- D) Vendosen duart pas kurrizit

483. pse realizohen dy radiografi PA te pulmonit (ne inspirim dhe ekspirim)
- A) Per te treguar pneumotoraksin
 - B) Per te vlerësuar zemren dhe vazat e medha
 - C) Per te matur gjeresine e mediastinit
 - D) Per te demonstruar lëvizjen e diafragmes
484. Cila eshte menyra me e mire per pare rrotullimin e pacientit ne radiografine PA te pulmonit
- A) Numri i brinjeve te evidentuara mbi diafragme
 - B) Pamja asimetrike e e artikulacioneve sternoklavikular bilateral
 - C) Sasia e ajrit apikal qe duket mbi klavikula
 - D) Pamja e kufijve laterale te kapules jashte fushes pulmonare
485. per cilin projektion te kraharorit duhet qe plani midsagital te jete paralel me kaseten
- A) Projektioni PA
 - B) Projektionim lateral
 - C) Projektioni AP (dekupitus lateral te majte)
 - D) Projektioni AP aksial
486. Si eshte plani midsagital dhe midkoronal ne projektionin lateral te pulmonit ne lidhje me kaseten
- A) Midsagital:paralel; midkoronal:paralel
 - B) Midsagital:paralel; midkoronal: pingul
 - C) Midsagital:pingul; midkoronal:paralel
 - D) Midsagital:pingul; midkoronal:pingul
487. cili projektion i kraharorit tregon me mire apekset pulmonare te pambuluara nga klavikulat
- A) Projektioni PA
 - B) Projektioni lateral i majte
 - C) Projektioni AP
 - D) Projektioni AP aksial
488. Sa grade duhet te rrotullohet pacienti ne projektionin PA oblik per te vlerësuar zemren dhe vazat e medha
- A) Oblik anterior te djathte 45° , oblik anterior te majte 45°
 - B) Oblik anterior te djathte 45° , oblik anterior te majte $55 - 60^{\circ}$
 - C) Oblik anterior te djathte $55 - 60^{\circ}$, oblik anterior te majte 45°
 - D) Oblik anterior te djathte $55 - 60^{\circ}$, oblik anterior te majte $55 - 60^{\circ}$

489. sa grade dueht te rrotullohet pacienti per projeksionin PA oblik per te vlerësuar fushen pulmonare

- A) Oblik anterior te djathte 45^0 , oblik anterior te majte 45^0
- B) Oblik anterior te djathte 45^0 , oblik anterior te majte $55 - 60^0$
- C) Oblik anterior te djathte $55 - 60^0$, oblik anterior te majte 45^0
- D) Oblik anterior te djathte $55 - 60^0$, oblik anterior te majte $55 - 60^0$

490. Ne pozicionin dekupitus lateral ne rast te pacientit qe nuk qendron dot ne kembe cila patologji duket me mire

- A) Fraktura e brinjeve
- B) Kardiomegalia
- C) Kolapsi pulmonar
- D) Niveli i likuidit apo i ajrit

491. Si eshte plani midsagital dhe midkoronal ne projeksionin AP (ne dekupitus lateral te majte) te pulmonit ne lidhje me kaseten

- A) Midsagital:paralel; midkoronal:paralel
- B) Midsagital:paralel; midkoronal: pingul
- C) Midsagital:pingul; midkoronal:paralel
- D) Midsagital:pingul; midkoronal:pingul

492. Cila gjendje patologjike tregohet me mire ne projeksionin AP (dekupitus lateral te majte) te pulmonit

- A) Ajri i lire ne te dy anet e pulmonit
- B) Nivelet e likuidit ne dy anet e pulmonit
- C) Ajri i lire ne te majte dhe likuidi i lire ne te djathte
- D) Likuidi i lire ne te majte dhe ajri i lire ne te djathte

493. Cila gjendje patologjike tregohet me mire ne projeksionin AP (dekupitus lateral te djathte) te pulmonit

- A) Ajri i lire ne te dy anet e pulmonit
- B) Nivelet e likuidit ne dy anet e pulmonit
- C) Ajri i lire ne te majte dhe likuidi i lire ne te djathte
- D) Likuidi i lire ne te majte dhe ajri i lire ne te djathte

494. Cili pozicion kërkon vendosjen e pacientin supine me kaseten te vendosru vertikalisht mbështetur ne anen e djathte dhe me rreze qendrore paralel drejt kasetes

- A) Dekupitus ventral
- B) Dekupitus dorsal
- C) Dekupitus lateral i djathte
- D) Dekupitus lateral i majte

495. cili pozicion radiografik kërkon vendosjen e pacientit prone

- A) Dekupitus ventral
- B) Dekupitus dosrsal
- C) Dekupitus lateral i djathte
- D) Dekupitus lateral i majte

496. cili eshte kriteri vlerësues per radiografine PA te pulmonit

- A) Brinjet duhet te duken te shtrembëruara
- B) Sternumi duhet te jete lateral jo i rrotulluar
- C) Harku posterior i brinjeve duhet te duket mbi diafragme
- D) Harku posteriro i brinjeve duhet te mbulohe nga kollona vertebrale

497. cili eshte kriteri vlerësues ne radiografine laterale te pulmonit

- A) Ne te djathte duhet te duket nje pjese e vogel e zemres
- B) Harku posterior i brinjeve duket pas kollones vertebrale
- C) Nje hije e lehte e vertebrale torakale superior shihet pas hijes se zemres
- D) Distanca nga kolona vertebrale ne kufirin lateral te brinjeve duhet te jete e njejte ne te dy anet

498. cili eshte kriteri vlerësues per radiografine AP aksiale te pulmonit

- A) Brinjet duhet te duken te shtrembëruara
- B) Klavikula shtrihet nen apekset pulmonare
- C) Sternumi duhet te jete lateral jo i rrotulluar
- D) Hapësira intervertebrale torakale duhet te jete ehapur

499. cili eshte kriteri vlerësues per radiografine AP aksiale te pulmonit

- A) Klavikulat duhet te ndodhen mbi apekset pulmonare
- B) Hapësira intervertebrale torakale duhet te jete hapur
- C) Brinjet te vendosura pas kollones torakale
- D) 5 cm nga apekset pulmonare duhet te shihen mbi klavikula

500 . ne cilin klasifikim kockor futet skapula

- A)Te sheshte
- B)Te gjate
- C)Te shkurter
- D)Te crregullt

501. ne cilin klasifikim kockor futet klavikula

- A. Te sheshte
- B. Te gjate
- C. Te shkurter
- D. Te crregullt

502. si quhet fossa ne sipërfaqen anteriore te klavikules

- A. Subskapulare
- B. Infraspinale
- C. Supraspinate
- D. Nuja skapulare

503. Ku ndoshet procesi korakoid ne lidhje me trupin e kapules

- A) Medial dhe superior
- B) Medial dhe inferior
- C) Lateral dhe superior
- D) Lateral dhe inferior

504. cilet nga du kontruet e kapules bashkohen per te formuar kendin medial

- A) Medial dhe lateral
- B) Medial dhe superior
- C) Aksial dhe lateral
- D) Aksial dhe superior

505. Ku lokalizohet fossa supraspinoze ne skapule

- A) Ne sipërfaqen anteriore, mbi spina skapule
- B) Ne sipërfaqen anteriore, nen spina skapule
- C) Ne sipërfaqen posteriore, mbi spina skapule
- D) Ne sipërfaqen posteriore , nen spina skapule

506. Ku lokalizohet fossa infraspinoze ne skapule

- A) Ne sipërfaqen anteriore, mbi spina skapule
- B) Ne sipërfaqen anteriore, nen spina skapule
- C) Ne sipërfaqen posteriore, mbi spina skapule
- D) Ne sipërfaqen posteriore , nen spina skapule

507. Ku centrohet rrezja qendrore ne projeksionin AP te shpatulles

- A) 2.5 cm medial procesit korakoid
- B) 2.5 cm inferior procesit korakoid
- C) 5 cm medial procesit korakoid
- D) 5 cm inferior procesit korakoid

508. Si duhet te pozicionohet epikondilet humorale ne lidhje me planin e kasetes ne projeksionin Ap te shpatulles me rrotullim ekstern

- A) Paralel
- B) Pingul
- C) Oblik lateral me kend 45 grade
- D) Oblik medial me kend 45 grade

509. Si duhet te pozicionohet epikondilet humorale ne lidhje me planin e kasetes ne projeksionin Ap te shpatulles me rrotullim intern

- A) Paralel
- B) Pingul
- C) Oblik lateral me kend 45 grade
- D) Oblik medial me kend 45 grade

510. Si duhet te pozicionohet epikondilet humorale ne lidhje me planin e kasetes ne projeksionin Ap te shpatulles me rrotullim neutral

- A) Paralel
- B) Pingul
- C) Oblik lateral me kend 45 grade
- D) Oblik medial me kend 45 grade

511. Cili projeksion i shpatulles tregon me mire tuberkulen e madh te humerusit ne profil

- A) Projeksioni lateral transtorakal
- B) Projeksioni AP me rrotullim neutral
- C) Projeksioni AP me rrotullim ekstern
- D) Projeksioni AP me rrotullim intern

512. Cili projeksion i shpatulles tregon me mire koken e humerusit ne profil

- A) Projektioni lateral transtorakal
- B) Projektioni AP me rrotullim neutral
- C) Projektioni AP me rrotullim ekstern
- D) Projektioni AP me rrotullim intern

513. Cili projektion i shpatulles tregon me mire tuberkulen e vogel te humerusit ne profil dhe e orientuar drejt kavitetit glenoid

- A) Projektioni lateral transtorakal
- B) Projektioni AP me rrotullim neutral
- C) Projektioni AP me rrotullim ekstern
- D) Projektioni AP me rrotullim intern

514. Cili projektion i shpatulles përftohet kur pacienti eshte supine me shaptullen e djathte te mbështetur ne kasete dhe rrezja qendrore vertikale pingul ne kasete dhe epikondilet humorale paralel me kaseten

- A) Projektioni lateral transtorakal
- B) Projektioni PA oblik (shkapular)
- C) Projektioni AP me rrotullim ekstern
- D) Projektioni AP me rrotullim intern

515. si realizohet projektioni lateral transtorakal(Metoda Lawrence) nese pacienti nuk e ngre dot lart krahu e shendoshe

- A) Rregullojme proceduren e frymëmarrjes
- B) Rregullojme kendin e rrezes qendrore
- C) Rregullojme vendosjen e kasetes
- D) Rrotullojme pacientin

516. cili projektion i ekstremitetit te sipërm kryhet per te treguar frakturen e humerusit proksimal kur krahu nuk mund te levizet

- A) Projektioni tangencial, modifikimi Fisk
- B) Projektioni AP i shpatulles me rrotullim interno
- C) Projektioni AP me rrotullim ekstern
- D) Projektioni lateral transtorakal

517. kur realizojme metoden Lawrence cilen teknike frymëmarrjeje realizojme per te permiresuar kontrastin

- A) Frymëmarrje te shkurtra te shpejta
- B) Frymëmarrje te thella
- C) Mbahet fryma ne fund te ekspirimit
- D) Mbahet fryma ne fund te inspirimit

518. Cili projektion i shpatulles kërkon qe rrezja qendrore te jete me kend 15- 30 grade medial dhe te hyje ne aksialen e krahut te semure

- A) Projektioni AP
- B) Projektioni PA oblik
- C) Projektioni aksial inferosuperior
- D) Projektioni lateral transtorakal

519. Si dyhet te drejtohet rrezja qendrore per te përftuar projektionin PA oblik te shpatulles (Projektionin Y)

- A) Cefalik 10 -15 grade
- B) Cefalik 15- 20 grade
- C) Cefalik 25- 30 grade
- D) Pingul me kaseten

520. ne cilin pozicion vendoset pacienti per te treguar shaptullen e majte ne projektionin PA oblik (shkapular Y)

- A) Oblik anterior te majte
- B) Oblik posterior te majte
- C) Oblik anterior te djathte
- D) Oblik posterior te djathte

521. Cili projektion i shpatulles kekron pacientin e rrotulluar deri sa plani midkoronal te formoje nje kend 45- 60 grade me planin e kasetes

- A) Projektiono lateral transtorakal
- B) Projektioni oblik PA
- C) Projektioni AP me rrotullim interno
- D) Projektioni AP me rrotullim ekstern

522. nese e lejojne kushtet e pacientit cili artikulacion duket me pacientin ne kembe

- A) Glenohumeral
- B) Skapulohumeral
- C) Sternoklavikular
- D) Akromioklavikular

523. sa grade dhe ne cilin drejtim drejtohet rrezja qendrore per te përftuar projektionin PA aksial te klavikules

- A) 15 -30 grade kaudal
- B) 15-30 grade cefalik

- C) 25-30 grade kaudal
- D) 25-30 grade cefalik

524. sa grade dhe ne cilin drejtim drejtohet rrezja qendrore per te përftuar projektionin PA aksial te klavikules me pacientin supin

- A) 15 -30 grade kaudal
- B) 15-30 grade cefalik
- C) 25-30 grade kaudal
- D) 25-30 grade cefalik

525. kur realizohet projektioni AP i kapules, rrezja qendrore drejtohet ne nje pike 5 cm drejt procesit korakoid

- A) Lateral
- B) Medial
- C) Inferior
- D) Superior

526. Cili faktor kontrollon kontrastin radiografik

- A) Koha e ekspozimit
- B) Miliamperazhi
- C) Kilovoltazhi
- D) Asnjera

527. Cili term radiografik i referohet shkalles se erresires mes dy zonave fqinje ne nje radiografi

- A) Densiteti
- B) Kontrasti
- C) Zmadhimi
- D) Detajet e ruajtura

528. Cili nga faktoret e meposhtem kontrollon distorcionin (shtemberimin)

- A) Vendosja
- B) Miliamperazhi
- C) Miliamper per sekonde
- D) Distance burim – film

529. Cili është përgjegjës për marrjen e historisë së sëmundjes nëse radiologu nuk e sheh pacientin

- A) Tekniku radiolog
- B) Infermieri radiolog
- C) Shefi i teknikeve radiolog
- D) Receptonistja e departamentit

530. Cila metodë përdoret për pastrimin e zorrëve në një pacient që kryen ekzaminim radiografik të barkut

- A) Laksative, enema, ushtrime
- B) Diete e kufizuar, enema, ushtrime
- C) Diete e kufizuar, laksative, enema
- D) Diete e kufizuar, laksative, ushtrime

531. Cili është indri që prodhon peristaltikë

- A) Kardiak
- B) Lidhor
- C) I bute
- D) Asnjë

532. Cila nga kushtet e mëposhtme patologjike kërkojnë ulje të vlerave të faktorëve teknikë krahasuar me procedurën e zakonshme

- A) Edema
- B) Pneumonia
- C) Emfizema
- D) Likidi pleural

533. Çfarë ndryshojmë në faktorët teknikë për të evituar levizjet e vullnetshme në pacientet e vjetër ose me sëmundje më të mëdha

- A) Rrisim miliamperazhin
- B) Ulim miliamperazhin
- C) Rrisim kohën e ekspozimit
- D) Ulim kohën e ekspozimit

534. Cila procedurë redukton mundësinë e levizjes nga ana e pacientit

- A) Rritja e miliamperazhit
- B) Rritja e kohes se ekspozimit
- C) Dhenia e udhezimeve te kujdeshme pacientit
- D) Perdorimi i skermave per detaje te imta

535. Cili rregull perdoret per vendosjen e markuesve ne radiografine AP oblike te kollones cervikale

- A) Perdoret kryesisht shenuesi D (djathas)
- B) Perdoret kryesisht shenuesi S (Sinister /majtas)
- C) Vendoset markuesi per te treguar anen me prane kasetes
- D) Vendoset markuesi per te treguar anen me larg kasetes

536. Cfare informacioni nuk eshte pjese e informacionit te shenuar ne radiografi

- A) Emri i pacientit
- B) Data e ekzaminimit
- C) Emri i teknikut
- D) Emri i spitalit

537. Pse eshte e nevojshme qe diafragma te perfshije vetem zonen e interesit

- A) Zgjeron kontrastin
- B) Redukton miliamperazhin e nevojshem
- C) Redukton rrezatimin shperndares
- D) Kompeson rritjen e distances objekt –kasete

538. Si ndikon ne imazhin radiografik perqendrimi i tufes se rrezevevetem mbi zonen e ekzaminimit

- A) Permireson detajet dhe rrit densitetin radiografik
- B) Permireson detajet dhe rrit densitetin radiografik
- C) Redukton pjeserisht zmadhimin dhe rrit densitetin radiografik
- D) Redukton pjeserisht zmadhimin dhe rrit kontrastin radiografik

539. Ne nje radiografi te sternum cili nga faktoret e meposhtem ndikon ne permiresimin e imazhit radiografik

- A) Rritja e distances objekt – film
- B) Ulja e distances burim –film
- C) Ulja e distances burim –objekt
- D) Dritarja e diaphragmes ne fushe 35 x 43 cm duke perfshire zonen e interesit

540. Ne cilin ekzaminim eshte i nevojshmem perdorimi i mbrojteseve te plumbit ne paceintet ne moshe fertiliteti (riprodhimi)

- A) Kyci I dores
- B) Koka
- C) Kraharori
- D) Zona sakrale

541. Cila dege merret me studimin e funksionit te organeve te njeriut

- A) Anatomia
- B) Osteologjia
- C) Fiziologjia
- D) Fispatologjia

542. Cilat jane planet kryesore te trupit

- A) Sagital, koronal, horizontal, oblik
- B) Sagital , koronal, midaksilar, transvers
- C) Midsagital, midkoronal, horizontal, oblik
- D) Midsagital, midkoronal, midaksilar, transvers

543. Cili plan e ndan trupin ne dy pjese te barabarta te majte dhe te djathte

- A) Oblik
- B) Horizontal
- C) Midsagital
- D) Midkoronal

544. Cilat jane kavitetet me te medha te trupit

- A) Pelvik dhe pleural

- B) Pelvik dhe abdominal
- C) Torakal dhe pleural
- D) Torakal dhe abdominal

545. Cila strukture lokalizohet brenda kavitetit torakal

- A) Hepar
- B) Zemra
- C) Kolecista
- D) Vezika urinare

546. Ne cilin kuadrant te trupit lokalizohet apendiksi

- A) Kuadranti i siperm i djathte
- B) Kuadranti i poshtem i djathte
- C) Kuadranti i siperm i majte
- D) Kuadranti i poshtem i majte

547. Si quhet regjioni i trupit i lokalizuar nen umbilicus

- A) Epigaster
- B) Hypogaster
- C) Hypokondri i majte
- D) Hypokondri i djathte

548. Cila verteber lokalizohet ne nivel te procesit ksifoid

- A) C7
- B) T7
- C) T10
- D) L3

549. Cila strukture eshte pjese e skeletit aksial

- A) Kafka
- B) Ekstremitetet e poshtme
- C) Ekstremitetet e siperme
- D) Rrethi pelvik

550. Cila kocke ka kavitet medular

- A) Tibia
- B) Sacrumi
- C) Kocka parietale
- D) Sternumi

551. Kockat klasifikohen ne baze te

- A) Madhesise
- B) Formes
- C) Funksionit
- D) Origjines

552. Ne cilin klasifikim kockor futen vertebrat

- A) Te sheshta
- B) Te gjata
- C) Te shkurtra
- D) Te çrregullta

553. Ne cilin klasifikim kockor futet trapeziumi

- A) Te sheshta
- B) Te gjata
- C) Te shkurtra
- D) Te çrregullta

554. Cili specialitet merret me studimin e kockave

- A) Anatomia
- B) Osteologji
- C) Artrologji
- D) Fiziologji

555. Cili term i referohet pjeses se trupit ne anen e kundert ne trup

- A) Laterla
- B) Posterior
- C) Ipsilateral
- D) Kontrolateral

556. Cili term i referohet rrezes qendrore

- A) Pamja
- B) Metoda
- C) Pozicioni
- D) Projeksioni

557. Cili term i referohet nje pozicionimi te pergjithshem te trupit

- A) Aksial
- B) Recumbent
- C) Tangencial
- D) Oblik anterior I majte

558. Cili term I referohet levizjes se njestructure te trupit larg aksit qendror te trupit

- A) Fleksion
- B) Inversion
- C) Abduksion
- D) Aduksion

559. Secili nga falanget proksimale artikulon me

- A) Metakarpet
- B) Kockat karpale
- C) Falanget distale
- D) Artikulacionet karpometakarpale

560. Cila strukture kockore ndodhet ne pellemben e dores

- A) Karpet
- B) Falanget
- C) Metatarset
- D) Metakarpet

570. Cila nga kockat e meposhtme artikulon me bazen e kockave metakarpale

- A) Karpet
- B) Falanget
- C) Parakrahu
- D) Artikulacionet metakarpofalangeal

571. Cili artikulacion i dores eshte i formuar nga artikulimi i kokes se metakarpit me gishtin

- A) Karpometakarpal
- B) Metakarpofalangeal
- C) Interfalangeal distal
- D) Interfalangeal proksimal

572. Cilat kocka lokalizohen ne rreshtin proksimal te kycit

- A) Skafoidi, lunatic, kapitati , hamate
- B) Skafoidi, lunatic, pisiform, trikuentum
- C) Trapezium, trikuentrum, lunatic dhe skafoidi
- D) Trapezium, trapezoidi, kapitati dhe hamati

573. Ku lokalizohet kocka skafoide

- A) Ana mediale e rreshtit distal
- B) Ana mediale e rreshtit proksimal
- C) Ana laterale e rreshtit distal
- D) Ana laterale e rreshtit proksimal

574. Ku lokalizohet trapeziumi

- A) Ana mediale e rreshtit distal
- B) Ana mediale e rreshtit proksimal
- C) Ana laterale e rreshtit distal
- D) Ana laterale e rreshtit proksimal

575. Ku eshte lokalizuar kocka hamate

- A) Ana mediale e rreshtit distal
- B) Ana mediale e rreshtit proksimal
- C) Ana laterale e rreshtit distal
- D) Ana laterale e rreshtit proksimal

576. Cilat kocka klasifikohen ne kockat e shkurtra

- A) Karpet
- B) Vertebrat
- C) Falanget
- D) Metakarpet

577. Cili eshte artikulacioni me distal kyçit te dores

- A) Interkarpal
- B) Radiokarpal
- C) Karpometakarpal
- D) Metakarpofalangeal

578. Cili eshte artikulacioni me proskimal i kyçit te dores

- A) Interkarpal
- B) Radiokarpal
- C) Karpometakarpal
- D) Metakarpofalangeal

579. Cila strukture kockore eshte e lokalizuar ne fundin distal te radiusit

- A) Koka
- B) Qafa
- C) Tuberkuli
- D) Procesi stiloid

580. Cilat struktura kockore jane te lokalizuar ne fundin proksimal te radiusit

- A) Koka dhe tuberkuli
- B) Koka dhe procesi stiloid
- C) Olekranoni dhe tuberkuli
- D) Olekranoni dhe procesi stiloid

581. Cilat jane strukturat kockore te parakrahut

- A) Radiusi dhe ulna
- B) Radiusi dhe karpet
- C) Humerusi dhe ulna
- D) Humerusi dhe karpet

582. Cila strukture kockore ne pjesen distale te parakrahut ndodhet lateralisht

- A) Koka e ulnes
- B) Koka e radiusit
- C) Procesi stiloid ulnar
- D) Procesi stiloid radial

583. Cila strukture e kockave te gjata lokalizohet lehte duke prekur pjesen posteriore proksimale te parakrahut

- A) Procesi stiloid
- B) Tuberoziteti radial
- C) Procesi koronoid
- D) Olekranoni

584. Cila strukture kockore ne pjesen distale te parakrahut ndodhet medialisht

- A) Procesi koronoid
- B) Olekranoni
- C) Procesi stiloid ulnar
- D) Procesi stiloid radial

585. Cila nga keto dy struktura artikulon per te formuar artikulationin radioulnar distal

- A) Koka e ulnes dhe fundi radial i ulnes
- B) Koka e ulnes dhe fundi ulnar i radiusit
- C) Koka e radiusit dhe fundi radial i ulnes
- D) Koka e radiusit dhe fundi ulnar i radiusit

586. Cila structure artikulon me os capitatum

- A) Koka ulnare
- B) Koka radiale
- C) Fosa glenoide
- D) Koka humerale

587. Cila strukture artikulon me troklean

- A) Ulna distale
- B) Radiusi distal
- C) Ulna proksimale
- D) Radiusi proksimal

588. Ne cilin artikulation ndodhet kapitulumi

- A) Te kycit te dores
- B) Te kycit te kembes
- C) Te berrylit
- D) Te shpatulles

589. Cili proces kockor ndoshet na siperfaqen anteriore te humerusit proksimal

- A) Tuberkuli i vogel
- B) Tuberkuli i madh
- C) Epikondili lateral
- D) Epikondili medial

590. Cila strukture artikulon me ulnen per te formuar artikulationin humeroulnar

- A) Troklea
- B) Kapitulumi
- C) Koka radiale
- D) Koka humerale

591. Sa artikulacione ka humerusi

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

592. Cila strukture artikulon me radiusin per te formuar artikulacionin humeroradial

- A) Troklea
- B) Kapitulumi
- C) Fundi radiale
- D) Koka humerale

593. Per te perftuar radiografien laterale te gishtit te 2-5 te dores, ne cilen artikulacion drejtohet rrezja qendrore

- A) Karpometakarpal
- B) Metakarpofalangeal
- C) Interfalangeal distal
- D) Interfalangeal proksimal

594. Nga pozicioni prone, sa grade duhet te rrotullohet gishti per te marre projeksionin PA oblik te atij gishti

- A) 15
- B) 30
- C) 45
- D) 90

595. Si duhet te pozicionohet dora per projeksionin PA medial oblik te dores

- A) Nga pozicioni prone, rrotullohet dora lart drejt anes ulnare
- B) Nga pozicioni prone rrotullohet dora lart drejt anes radiale
- C) Nga pozicioni supin, rrotullohet dora lart drejt anes ulnare
- D) Nga pozicioni supin, rrotullohet dora lart drejt anes radiale

596. Cili lloj i demtimit rrezatues shkakton semundje malinje?

- A) efekti i vonshem gjenetik
- B) efekti i vonshem somatik
- C) efekti i hershem gjenetik
- D) fekti i hrshem somatik

597. Cilet demtime rrezatuese nuk jane zbuluar tek njerezit?

- A) tumoret neoplazike solide
- B) demtimet e efekteve te vonshme gjenetike
- C) demtimet e efekteve te vonshme somatike
- D) demtimet e efekteve te hershme somatike

598. Kush fraze pershkruan me mire rrezatimin qe shkakton katarakt?

- A) doze e ulet, demtim me efekt te vonshem
- B) doze e ulet, demtim me efekt te hershem
- C) doze e larte, demtim me efekt te vonshem
- D) doze e larte, demtim me efekt te hershem

599. Me sa rad eshte i barabarte 1gray (Gy)?

- A) 1
- B) 10
- C) 100
- D) 1000

560. Sa sieverts (Sv) eshte i barabarte 1 rem?

- A) 0.01
- B) 0.10
- C) 10
- D) 100

561. Cili eshte ndryshimi themelor midis 'rem' dhe njesive te tjera te rrezatimit?

- A) 'rem' eshte njesia ne SI per dozen e rrezatimit
- B) 'rem' perdoret vetem per qellimin e mbrojtjes ndaj rrezatimit
- C) 'rem' eshte perdoret per te treguar nivelin e aktivitetit te radionuklideve
- D) 'rem' eshte perdoret per te treguar shkallen e ekspozimit per nje ekspozim te dhene

562. Intesiteti i rrezatimit per nje ekspozim te dhene rrezesh X matet me:

- A) rads (ose Gy)

- B) rem (ose Sv)
- C) curie (ose Bequerels [Bq])
- D) milirentgen (ose coulombs [C]/kg)

563. Cila njesi e rrezatimit i referohet shumes se ekspozimit profesional marre nga radiologet?

- A) millirads (ose mGy)
- B) milliroentgen (ose C/kg)
- C) millicuries (ose mBq)
- D) millirems (ose mSv)

564. Cila njesi e rrezatimit i referohet sasise se rrezatimit i marre nga nje pacient gjate nje ekzaminimi?

- A) millirads (ose mGy)
- B) milliroentgen (ose C/kg)
- C) millicuries (ose mBq)
- D) millirems (ose mSv)

565. Cila gjendje konsiderohet si nje efekt i hershem i ekspozimit radiatues?

- A) kancer
- B) leucemia
- C) kataraktet
- D) eritema e lekures

566. Cila gjendje konsiderohet si nje efekt i vonë i ekspozimit radiatues?

- A) vdekshmeria
- B) leucemia
- C) eritema e lekures
- D) depresioni hematologjik

567. Cila nga efektet e vona te rrezatimit radiatues nuk ekziston me ne ditet e sotme si pasoje e permirsimit te praktikave mbrojtese rrezatuese?

- A) kanceri
- B) leucemia
- C) neoplazia e tumorit solid

D) ulja e jetegjatesise

569 Cili demtim radiacioni perfaqeson nje model pragu te lidhjes doze-pergjigje?

- A) kanceri
- B) leucemia
- C) e ritema e lekures
- D) neoplazia e tumorit solid

570. Cila zone e trupit mund te perballoje me se miri efektt e radiacionit?

- A) Kafka
- B) Duart
- C) Parakrahet
- D) Lens (ne sy)

571. Sipas Raportit No.91 NCRP (1987) , cila eshte doza aktuale e akumuluar ekuivalente per ekspozimin profesional?

- A) 10 SV((1000rems) shumezuar me moshen e radiologut
- B) 5 Sv (5000rems)shumezuar me moshen e radiologut
- C) 10mSv (1 rem) shumezuar me moshen e radiologut
- D) 50 mSv(5 rem) shumezuar me moshen e radiologut

578.Cili eshte ekzaminimi radiografik i vetem ku ekspozimi ne lekuren e radiologut arrin limitin e tij perpara se te arrihet limiti i te gjithe trupit?

- A) Fluoroskopi
- B) Mamografi
- C) Radiografia mobile
- D) Radiografia kirurgjikeSE

579. Cila pajisje perdoret me shpesh per te matur ekspozimin hyres ne lekure (ESE)?

- A) Dhoma e jonizuar
- B) Densitometri
- C) Matesi geiger
- D) Desitometri termoluminishent (TLD)

580. Cila nga ekzaminimet radiologjike prodhon ekspozim hyres ne lekure me te vogel?

- A) Kafka
- B) Toraxi
- C) Urografia retrograde
- D) Colona vertebrale toraxike

581. Cili ekzaminim radiografik prodhon dozen me te larte mesatare per palcen?

- A) Kafka
- B) Toraxi
- C) Humerus
- D) Colona vertebrale lumbare

582. Cili nga ekzaminimet radiografike prodhon dozen me te larte fetale?

- A) Kafka
- B) Toraxi
- C) Kolecista
- D) Colona vrtebrale lumbare

583. Cili ekzaminim radiografik prodhon ekspozimim me te larte ndaj radiologut?

- A) Kafka
- B) Fluoroscopia
- C) Urografia ekskretore
- D) Colona vertebral lumbare

584. Ku duhet ta vendose nje radiograf dozimetrim gjate procedures se fluoroskopise?

- A. Nen perparen e plumbit,ne nivel te belit
- B. Nen perparen e plumbit, ne nivel te qafes
- C. Mbi perparen e plumbit ,ne nivel te belit
- D. Mbi perparen e plumbit, ne nivel te qafes

585. Ku duhet ta vendose radiologia shtatezene nje 'shenuesen fetal' (monitor fetal) gjate procesit te fluoroskopise?

- A) Nen perparen e plumbit,ne nivel te belit
- B) Nen perparen e plumbit, ne nivel te qafes
- C) Mbi perparen e plumbit ,ne nivel te belit
- D) Mbi perparen e plumbit, ne nivel te qafes

586. Sa dhe cfare lloje kockash e perbejne kemben dhe kycin?

- A) 14 falange,5 metatarse dhe 7 tarse
- B) 14 falange, 7 metatarse dhe 5 tarse
- C) 7 falange, 5 metatarse dhe 14 tarse
- D) 7 falange, 14 metatarse dhe 5 tarse

587.Ne cilin klasifikim kockash bejne pjese tarset?

- A) Te sheshte
- B) Te gjata
- C) Te shkurtra
- D) Te crregullta

588. Cila eshte pjesa me distale e metatarseve?

- A) baza
- B) koka
- C) tuberoziteti
- D) procesi styloid

589.Ne cilen pjese te kembes ndodhet tuberoziteti qe eshte lehtesisht i palpueshem?

- A) segmenti distal i metatarsit te pare
- B) segmenti distal i metatarsit te peste
- C) segmenti proksimal i metatarsit te pare
- D) segmenti proksimal i metatarsit te peste

590.Cila nga kockat tarsale eshte kocka tarsale me superiore?

- A) Talus
- B) Cuboid
- C) Navikulari
- D) Kalkaneus

591. Cila nga kockat tarsale eshte kocka me e madhe?

- A) Talus
- B) Cuboid
- C) Navikulari
- D) Kalkaneus

592. Cila nga kockat tarsale eshte e lokalizuar ne anen laterale te kembes midis kalkaneusit dhe metatarsit te katert dhe te peste?

- A) Talus
- B) Cuboid
- C) Navikular
- D) Kuneiformi lateral

593. Cila nga kockat tarsale eshte e lokalizuar ne anen mediane te kembes midis talusit dhe tre kuneiformeve?

- A) Talus
- B) Kuboid
- C) Navikular
- D) Kalkaneus

594. Cila kocke artikulon medialisht me kuboidin?

- A) Metatarsi i pare
- B) Kuneiformi medial
- C) Kuneiform intermedian
- D) Kuneiform lateral

595. Cila kocke artikulon superiorisht me kalkaneusin?

- A) Tibia
- B) Talusi
- C) Fibula
- D) Navikular

596. Cilat kocka artikulojne distalisht me tarsin navikular?

- A) Falanget
- B) Kuneiformet
- C) Metatarset
- D) Talusi dhe kalkaneusi

597. Cilat kocka artikulojne distalisht me tre kuneiformet?

- A) Falanget
- B) Kuneiformet
- C) Metatarset
- D) Talusi dhe kalkaneusi

598. Cilat kocka artikulojne me metatarset?

- A) kalkaneus dhe kuboid
- B) kalkaneus dhe navikular
- C) kuneiform dhe kiboid
- D) kuneiform dhe navikular

599. Cila nga kuneiformet eshte me i madhi?

- A) mediali
- B) intermediali
- C) i treti
- D) laterali

600. Ne cilen zone te kembes lokalizohet kocka kuneiforme?

- A) Midis kuboid-it dhe kalkaneus-it
- B) Midis kuboid-it dhe metatarseve
- C) Midis navikular-it dhe kalkaneusit
- D) Midis navikularit dhe metatarseve

601. Cila nga dy kockat tarsale artikulojne me njera tjetren me ane te tre faqet?

- A) talusi dhe kuboidi
- B) talusi dhe kalkaneusi
- C) navikulari dhe kuboidi
- D) navikulari dhe kalkaneusi

602. Cila nga pjeset e talusit artikulon me tibian distale?

- A) stiloidi
- B) tuberkul
- C) troklea
- D) epikondil

603. Ku lokalizohet ne kembe malleolusi medial?

- A) tibia distale
- B) fibula distale
- C) tibia proksimale
- D) fibula proksimale

604. Ku lokalizohet ne kembe malleolusi lateral?

- A) tibia distale
- B) fibula distale
- C) tibia proksimale
- D) fibula proksimale

605. Cila strukture lokalizohet ne fundin proksimal te fibules?

- A) baza
- B) apexi
- C) tuberoziteti
- D) trokanteri

606. Ku lokalizohet eminenca intercondilare?

- A) tibia distale
- B) femuri distal
- C) tibia proksimale

D) femuri proksimal

607. Ku lokalizohet platea tibiale?

- A) tibia distale
- B) femuri distal
- C) tibia proksimale
- D) femuri proksimal

608. Ne cilen ane te tibias lokalizohet 'krista'?

- A) laterale
- B) mediale
- C) anterior
- D) posterior

609. Cili term i referohet kurrizit te mprehte ne kufirin anterior te tibias?

- A) apexi
- B) kresta
- C) tuberkul
- D) eminenca

610. Cili term i referohet procesit prominent ne sipërfaqen anteriore te tibias proksimale e cila eshte pikerisht inferiorisht kondileve?

- A) apexi
- B) styloidi
- C) eminenca
- D) tuberoziteti

611. Cili artikulation eshte i formuar nga artikulationi i kokes se fibules me kondilin lateral te tibias?

- A) gjuri
- B) kyçi kembes
- C) tibiofibulari distal

D) tibiofibulari proksimal

612. Cila strukture eshte e lokalizuar ne koken fibules?

- A) apexi
- B) kondili
- C) malleolusi lateral
- D) malleolusi medial

613. Me cilen strukture artikulon koka e fibules?

- A) malleolusi lateral
- B) malleolusi medial
- C) condili tibial lateral
- D) condili tibial medial

614. Cili term i referohet majes inferiore te pateles?

- A) baza
- B) apexi
- C) stiloid
- D) tuberkul

615. Cila pjese e pateles eshte baza?

- A) apexi
- B) kufiri lateral
- C) kufiri medial
- D) kufiri superior

616. Ne cilen pjese te femurit lokalizohet trokanteri major?

- A) lateralisht dhe inferiorisht
- B) lateralisht dhe superiorisht
- C) medialisht dhe inferiorisht
- D) medialisht dhe superiorisht

617. Ne cilen pjese te femurit lokalizohet trokanteri minor?

- A) lateralisht dhe inferiorisht
- B) lateralisht dhe superiorisht
- C) medialisht dhe inferiorisht
- D) medialisht dhe superiorisht

618. Ku lokalizohet fovea capitis?

- A) tibia distale
- B) femur distal
- C) tibia proksimale
- D) femuri proksimal

619. Cila strukture femorale artikulon me tibian?

- A) condilet
- B) tuberkulat
- C) trokanterat
- D) epikondilet

620. Me cilen strukture artikulon koka e femurit?

- A) kondil
- B) trokanter
- C) epikondil
- D) acetabulum

621. Ne projeksionin AP te shpites se kembes, me sa grade dhe ne cfare drejtimi duhet te drejtohet rrezja qendrore?

- A) 10 grade kaudalisht(drejt gishtave)
- B) 10 grade cefalisht(drejt thembres)
- C) 15 grade kaudalisht(drejt gishtave)
- D) 15 grade cefalisht(drejt thembres)

622. Me sa grade dhe ne cilin drejtim duhet te rrotullohet kamba per projektionin AP oblik per te treguar gishtin e dyte?

- A) 15 ne 25 grade medialisht
- B) 13 ne 25 grade lateralisht
- C) 30 ne 45 grade medialisht
- D) 30 ne 45 grade lateralisht

623. Si dhe ne cilen pike qendrore duhet te drejtohet rrezja qendrore per projektionin AP oblik per te treguar te peste gishtat e kembes?

- A) pingul me artikulacionin interfalangeal te gishtit te trete
- B) pingul me artikulacionin e trete metatarsofalangeal
- C) 15 grade posteriorisht (ne drejtim te thembres) ne artikulacionin interfalangeal proksimal te gishtit te trete
- D) 15 grad posteriorisht (ne drejtim te thembres)ne artikulacionin metatarsofalangeal.

624. Me sa grade dhe ne cfare drejtimi duhet te rrotullohet kamba per projektionin AP oblik per te treguar gishtin e madh?

- A) 10 dhe 15 grade mdialisht
- B) 10 dhe 15 grade lateralisht
- C) 30 dhe 45 grade medialisht
- D) 30 dhe 45 grade lateralisht

625. Cfare termi tjetër i referohet projektionit AP te kembes?

- A) Plantodorsal
- B) Dorsoplantar
- C) Inferosuperior
- D) Superoinferior

626. Me sa grade dhe ne cilin drejtim duhet te rrotullohet rrezja qendrore per projektionin AP aksial te kembes?

- A) 10 grade kaudalisht(drejt gishtave)
- B) 10 grade cefalisht(drejt thembres)
- C) 15 grade kaudalisht(drejt gishtave)
- D) 15 grade cefalisht(drejt thembres)

627. Cili projektion i kembes demonstron me se miri kuboidin dhe artikulationin e tij?

- A) lateral
- B) dorsoplantar
- C) AP lateral oblik
- D) AP medial oblik

628. Sa grade dhe ne cfare drejtimi duhet te rrotullohet komba per projektionin AP oblik?

- A) 15 grade lateralisht
- B) 30 grade medialisht
- C) 45 grade lateralisht
- D) 45 grade medialisht

629. Sa grade dhe ne cfare drejtimi duhet te rrotullohet komba per projektionin AP oblik per te treguar me mire kuboidin dhe artikulationin e tij?

- A) 30 grade lateralisht
- B) 30 grade medialisht
- C) 45 grade lateralisht
- D) 45 grade medialisht

630. Si dhe ne drejtim te cfare pike duhet drejtuar rrezja qendrore per projektionin AP oblik per kemben?

- A) perpendikularisht me koken e metatarsit te trete
- B) perpendikularisht me bazen e metatarsit te trete
- C) 10 grade posteriorisht (ne drejtim te themmbres) kokes se metatarsit te trete
- D) 10 grade posteriorisht (ne drejtim te thembres) bazes se metatarsit te trete

631. Ku duhet te centrohet rrezja qendrore per projektionin AP oblik te kembes?

- A) ne bazen e metatarsit te trete
- B) ne koken e metatarsit te trete
- C) ne artikulationin metatarsofalangeal te gishtit t trete

D) ne artikulationin interfalangeal proksimal te gishtit te trete

632. Pavarsisht nga gjendja e pacientit, cili manovrim i pozicionit duhet te kryhet per te pozicionuar kemben per projektionin lateral?

- A) fleksion-plantare te kembes
- B) rrotullimi i kembes lateralisht deri sa gjuri eshte perkundrejt tavolines
- C) sigurohemi qe siperfaqja plantare eshte ne kontakt me kaseten
- D) sigurohemi qe siperfaqja plantare eshte perpendikular me kaseten

633. Si duhet drejtuar rrezja qendrore per te treguar sa me mire hapesirat e artikulationit tarsometatarsale per projektionin AP te kembes?

- A) perpendikular
- B) 10 grade posteriorisht (ne drejtim te thembres)
- C) 15 grade posteriorisht (ne drejtim te thembres)
- D) 20 grade posteriorisht (ne drejtim te thembres)

634. Cili projektion i kembes tregon me mire sinus tarsi?

- A) projektioni AP
- B) projektioni lateral
- C) projektioni AP oblik (rrotullim lateral)
- D) projektioni AP oblik (rrotullim medial)

635. Cili projektion i kembes tregon me mire shumicen e tarseve me sa me pak superimpozim?

- A) projektioni AP
- B) projektioni lateral
- C) projektioni AP oblik (rrotullim lateralisht)
- D) projektioni AP oblik (rrotullim medialisht)

636. Cili projektion i kembes tregon me mire bazat e metatarsave te katert dhe peste te lire nga superimpozimi?

- A) projektioni AP
- B) projektioni lateral

- C) projekzioni AP oblik (rrotullim ne lateral)
- D) projekzioni AP oblik (rrotullim ne anen mediale)

637. Cili projekzion i kembes mund te tregojë metatarset gati te mbivendosur mbi njeri tjetrin?

- A) projekzioni AP
- B) projekzioni lateral
- C) projekzioni oblik AP (rrotullim ne lateral)
- D) projekzioni oblik AP (rrotullim ne anen mediale)

638. Cilet dy projeksiione perfshijne serite tipike qe tregojne me se miri kalkaneusin?

- A) projeksionet AP (dorsoplantar) dhe lateral
- B) projeksionet AP (dorsoplantar) dhe oblik medial
- C) projeksionet axial (plantodorsal) dhe lateral
- D) projeksionet axial (plantodorsal) dhe oblik medial

639. Sa grade dhe ne cfare drejtimi duhet drejtuar/centruar rrezja qendrore per projeksinin axial (plantodorsal) te kalkaneusit?

- A) 10 grade kaudat
- B) 10 grade cefalik
- C) 40 grade kaudat
- D) 40 grade cefalik

640. Ne cili nivel te siperfaqes plantare duhet te centrohet rrezja qendrore per projeksininaksial (plantodorsal) te kalkaneusit?

- A) ne qender te kalkaneusit
- B) ne tuberositetin e kalkaneusit
- C) baza e metatarsit te trete
- D) koka e metatarsit te trete

641. Ku duhet te drejtohet rrezja qendrore per projeksinin laterl te kalkaneusit?

- A) ne drejtim te qendres se kembes

- B) ne drejtim te qendres se kalkaneusit
- C) ne drejtim te bazes se metatarsit te trete
- D) ne drejtim te kokes se metatarsit te trete

642. Ku duhet te drejtohet rrezja qendrore per projeksionin lateral te kycit?

- A) malleolus latral
- B) malleulus medial
- C) ne qender te kalkaneusit
- D) n baze e metatarsit te trete

643. Me sa grade dhe ne cilin drejtim duhet te rrotullohet shputa dhe komba per te treguar me mire artikulacionin mortise per projeksionin AP oblik te kycit?

- A) 15-20 grade lateralisht
- B) 15-20 grade medialisht
- C) 40-45 grade lateralisht
- D) 40-45 grade medialisht

644. Cili projeksion i kycit tregon me se miri hapsiren e lire te artikulacionit talo-fibular nga superpozimi i kockave?

- A) projeksioni AP
- B) projeksioni lateral
- C) projeksioni AP oblik (rrotullim lateral)
- D) projeksioni AP oblik (rrotullim medial)

645. Cili artikulacion duhet te shihet ne profil me ane te projeksionit AP oblik (rrotullim medial) te kycit?

- A) subtalar
- B) talofibular
- C) talokalkaneal
- D) tibofibular distal

646. Duke iu referuar planit te kasetes, si duhet te pozicionohet malleoli per projeksionin AP oblik te kycit per te treguar te hapur artikulacionin mortise?

- A) paralel
- B) perpendikular
- C) 45 grade me rrotullim lateral
- D) 45 grade me rrotullim medial

647. Cili projeksion i kycit duhet te performohet per te treguar me mire nje nderprerje ligamentoze?

- A) projeksioni AP me inversion
- B) projeksioni AP me dorsifleksion
- C) projeksioni AP oblik (rrotullim lateral)
- D) projeksioni AP oblik (rrotullim medial)

648. Per projeksionin lateral te gjurit, me sa grade duhet te fleksohet gjuri?

- A) 10 ne 20 grade
- B) 20 ne 30 grade
- C) 30 ne 40 grade
- D) 40 ne 50 grade

649. Duke iu referuar gjurit, ku duhet te centrohet kaseta per projeksionin PA aksial te gjurit (metoda Holmblad)?

- A) ne apeksin e pateles
- B) ne piken me superiore te pateles
- C) 2 inch (5cm) nen apeksin e pateles
- D) 2 inch (5cm) mbi hapsiren e artikulacionit femuro-tibial

650. Me sa grade duhet te jete kendi qe duhet te formohet midis femurit dhe tavolines radiografike per projeksionin PA aksial te gjurit (metoda Holmblad)?

- A) 20 grade
- B) 45 grade

- C) 70 grade
- D) 90 grade

651. Cila nga projektionet e meposhtme te gjurit tregon me se miri fossa interkondilare?

- A) projektioni AP
- B) projektioni lateral
- C) projektioni AP oblik (rrotullim medial)
- D) projektioni PA aksial (metoda Holmblad)

652. Me sa grade dhe ne cilin drejtim duhet te drejtohet rrezja qendrore per projektionin lateral te gjurit?

- A) perpendikular
- B) 5 ne 7 grade kaudad
- C) 5 ne 7 grade cefalik
- D) 10 grade cefalik

653. Cila strukture e gjurit tregohet me se miri ne projektionin tangencial?

- A) patella
- B) fossa interkondilare
- C) hapsira artikulare e gjurit
- D) eminencia interkondylare

654. Cila strukture e gjurit tregohet me se miri ne projektionin PA aksial (metoda Holmblad)?

- A) patella
- B) crista tibiale
- C) artikulacioni tibio-fibular
- D) fossa femorale interkondylare

655. Cili projektion i gjurit tregon me se miri artikulacionin proksimal tibio fibular pa superpozim kockash?

- A) projektioni AP
- B) projektioni lateral
- C) projektioni AP oblik (rrotullim lateral)
- D) projektioni AP oblik (rrotullim medial)

656. Cili projektion i gjurit tregon me se miri hapsiren patello-femorale?

- A) projektioni lateral
- B) projektioni AP oblik (rrotullim lateral)
- C) projektioni AP oblik (rrotullim medial)
- D) projektioni PA axial (metoda Holmblad)

657. Cilat nga kriteret vlersuese te meposhtme indikojne qe gjuri eshte pozicionuar sakte per nje projektion latreral?

- A) kondilet femorale jane te superpozuara
- B) artikulacioni proksimal tibio-fibular eshte i hapur
- C) patella eshte paralele me receptorin e imazhit
- D) kondilet femorale jane paralele me receptorin e imazhit

658. Cfare duhet te behet per te parandaluar qe hapsira artikulare e gjurit te mbulohet nga hija e zmadhuar e kondilit femoral medial kur performohet projektioni lateral i gjurit?

- A) qese me rere per te mbeshtetur gjurin
- B) rrezja qendrore t drejtohet perpendikularisht
- C) rrezja qendrore te centrohet 5 deri ne 7 grade cefalik
- D) te ulet distanca burim-receptor imazhi

659. Cila nga kriteret vlersuese te me poshtme indikon ose tregon qe gjuri eshte pozicionuar sakte per projektionin AP?

- A) hapsira femuro-tibiale eshte e hapur
- B) kondilet femurale jane perpendikulare
- C) artikulacioni proksimal tibio-fibular eshte i hapur
- D) patella eshte perpendikulare me receptorin e imazhit

660. Ku duhet te tregohet patellane radiografine e projekSIONIT AP oblik te gjurit me rrotullim medial?

- A) mbi kondilin lateral te femurit
- B) mbi kondilin medial te femurit
- C) e centruar midis kondileve femorale
- D) e superpozuar me artikulacionin tibio-fibular

661. Ku duhet te tregohet patella ne radiografine e projekSIONIT AP oblikte gjurit me rrotullim lateral?

- A) mbi kondilin lateral femoral
- B) mbi kondilin medial femoral
- C) e centruar midis kondileve femorale
- D) e superpozuar me artikulacionin femuro-tibial

663. Per projekSIONIN lateral te pateles, cila manover e pozicionit redukton hapsiren artikulare femuro-patellare?

- A) duke shtrire drejt kemben
- B) duke superpozuar kondilet tibiale
- C) duke superpozuar kondilet femorale
- D) duke fleksuar gjurin me shume se 10 grade

664. Ne cilen pjese te gjurit duhet te hyje rrezja qendrore per projekSIONIN PA axial (metoda Holmblad)?

- A) anterior
- B) posterior
- C) kondili lateral
- D) kondili medial

665. Cila nga projeksionet e meposhtme te gjurit tregon me se miri fossen femorale interkondylare?

- A) projeksioni AP
- B) projeksioni lateral
- C) projeksioni AP oblik (rrotullim medial)
- D) projeksioni PA axial (metoda Camp-Coventry)

666. Cili projeksion i gjurit duhet te perdoret per te demonstruar patellen plotesisht te superpozuar ne femur?

- A) projeksioni AP
- B) projeksioni lateral
- C) projeksioni AP oblik (rrotullim lateral)
- D) projeksioni AP oblik (rrotullim medial)

667. Cili projeksion i gjurit duhet te perdoret per te demonstruar patellen ne profil?

- A) projeksioni AP
- B) projeksioni lateral
- C) projeksioni AP oblik (rrotullim lateral)
- D) projeksioni AP oblik (rrotullim medial)

668. Per nje paciente prone ne nje tavoline radiografike me gjurin e centruar ne qender dhe me gjurin e fleksuar derisa pjesa e poshtme ee kembes te formoje nje kend 40 grade me tavolinen, si duhet te drejtohet rrezja qendore per te treguar fossen femorale intercondylare?

- A) 3 ne 5 grad kaudalisht
- B) 3 ne 5 grade cefalik
- C) 40 grade kaudalisht
- D) 40 grade cefalik

669. Per cilin projeksion te gjurit pacienti duhet te jete prone ne tavoline, me gjurin e fleksuar derisa kamba ta formoje nj kend 40 grade me tavolinen. dhe rrezja qendore te drejtohet perpendikularisht me axin e gjate te kembes, duke hyre nga ana e pasme e gjuri?

- A) projekzioni tangencial(Metoda Settegast)
- B) projekzioni PA oblik (rrotullim medial)
- C) projekzioni PA axial (metoda Holmblad)
- D) Projkesioni PA axial (metoda Camp-Coventry)

670. Si duhet te drejtohet rrezja qendrore per projeksinin bilateral AP me peshe te gjurit?

- A) perpendikularisht
- B) 3 ne 5 grade kaudad
- C) 3 ne 5 grade cefalik
- D) 10 grade cefalik

671. Cili projeksin i gjurit mund te realizohet me pacientin ne kembe,me gjurin e prekur te flektuar dhe me siperfaqen e tij anteriore ne kontakt me receptorin e imazhit vertikalisht, dhe me nje rreze qendrore qe hyn horizontalisht duke hyre ne siperfaqen posteriore te gjurit?

- A) projekzioni tangencial(Metoda Settegast)
- B) projekzioni AP ,duke mbajtur peshe
- C) projekzioni PA axial (metoda Holmblad)
- D) Projekzioni PA axial (metoda Camp-Coventry)

672. Cili faktor pozicionimi vendos shkallen e kendit qe rrezja qendrore duhet te mare per projeksinin tangencial (metoda Settegast) per te treguar patellen?

- A) pjesa e mprehte
- B) shkalla e fleksionit te gjurit
- C) distanca objekt-imazh
- D) distanca burim-receptor imazhi

673. Si duhet te drejtohet rrezja qendrore per projeksinin AP te femurit?

- A) perpendikularisht
- B) 3 ne 5 grade kaudad
- C) 3 ne 5 grade cefalik
- D) 15 grade cefalik

674. Cila manover pozicionimi duhet te performohet per te vendosur qafen femorale ne profil per projeksionin AP te femurit?

- A) flexim i gjymtyreve te poshtem
- B) rrotullo gjymtyret e poshtem 10 ne 15 grade lateralisht
- C) rrotullo gjymtyret e poshtem 10 ne 15 grade medialisht
- D) ngri anen e papreekur te pelvisit me 10 ne 15 grade

675. Cila manover e pozicionimit duhet te performohet per te parandaluar qe qafa femorale te shfaqet e shkurtuar ne projeksionin AP te femurit?

- A) Kendo rrezen qendrore 10 ne 15 grade kaudad
- B) kendo rrezen qendrore 10 ne 15 grade cefalik
- C) Rotullo gjymtyret e poshtme 10 ne 15 grade lateralisht
- D) rrotullo gjymtyret e poshtme 10 ne 15 grade medialisht

676. Per projeksionin AP te femurit tek nje i rritur, cfare duhet te behet qe te sigurohet qe te dy artikulacionet e femurit trgohen?

- A) Rrotullo gjymtyret e poshtem me 15 grade lateralisht
- B) Rrit distancen burim- kasete
- C) Perdor nje drejtues per ta ndare kaseten ne gjysem
- D) Performo nje eskpozim te dyte me nje kasete tjeter

677. Per cilen nga projeksionet ,gjymtyret e poshtme duhet te rrotullohen medialisht me 10-15 grade?

- A) Projeksioni AP i femurit
- B) Projeksioni lateral i femurit
- C) Projeksioni AP medil i kembes
- D) Projeksioni AP oblik i gjurit

678. Per cilen nga projeksionet, duhet te rrotullohet pelvisi me 10 ne 15 grade nga laterali i vertete?

- A) projeksioni AP i kembes
- B) projeksioni AP i femurit
- C) projeksioni lateral i kembes
- D) projeksioni lateral i femurit

679. Per projektionin lateral te femurit,si duhet te pozicionohet pelvisi ne menyre qe te demonstron vetem artikulacioni i gjurit me boshtin distal femoral?

- A) Lateral i vertete
- B) Nga supin,pjesa e paprekur e ngritur me 15 grade
- C) Nga laterali i vertete,i rrotulluar anteriorisht me 10 ne 15 grade
- D) Nga laterali i vertete, i rrotulluar posteriorisht me 10 ne 15 grade

680. Cila strukture e pelvisit artikulon me femurin?

- A) Acetabulum
- B) Apertura inferiore
- C) Siperfaqe artikulare
- D) Foramen obturator

681. Cilat kocka te pelvisit e perbejne acetabulin?

- A) vetem ilium dhe pubis
- B) vetem ilium dhe ishium
- C) vetem pubis dhe ishium
- D) pubis,ishium dhe ilium

682. Ne cilen kocke lokalizohet ala?

- A) ilium
- B) pubis
- C) femur
- D) ishium

683. Cilat nga strukturat e meposhtme pelvike nuk perdoret si nje pike palpuese pozicionimi?

- A) crista iliace

- B) spina iskiake
- C) simfiza pubike
- D) spina anteriore superiore iliace

684. Cili segment i kockave te belit artikulon per te formuar foramen obturator?

- A) vetem ilium dhe pubis
- B) vetem ilium dhe ishium
- C) vetem pubis dhe ishium
- D) pubis, ishium dhe ilium

685. Cili eshte emri i kufirit qe shtrihet ne kockat e belit nga spina iliace posteriore superiore ne spinen iliace anteriore superiore?

- A) crista iliace
- B) fossa sciaticae e madhe
- C) siperfaqe artikulare iliace
- D) buza e pelvisit minor

686. Cili eshte emri i procesit qe ndan fossa sciaticae minore nga fossa sciaticae majore ne kockat e belit?

- A) spina isciake
- B) isciak ramus
- C) inferior ramus i os pubis
- D) superior ramus i os pubis

687. Cila pjese e kockave te pelvisit duron peshen e trupit kur nje person eshte ne pozicionin ulur?

- A) spina isciake
- B) tuberositas isciak
- C) inferior ramus i os pubis
- D) spina iliace inferiore posteriore

688. Ku eshte i lokalizuar ne pelvis trupi i os pubis?
A) ben pjese ne acetabulum
B) ben pjese ne simfisen pubik
C) eshte midis inferior dhe superior rami te os pubis
D) eshte midis ramit isckial dhe ramit inferior te os pubis

689. Ku duhet te centrohet kasete per projeksionin AP te pelvisit?
A) ne nivel te crista iliace
B) ne nivel te simfizes pubike
C) 5 cm nen trokanterin major
D) ne mes te linjes qe lidh dy spinat iliace anterior superior dhe simfizes pubike

690. Ku duhet te hyje rrezja qendrore ne trupin e pacientit per projeksionin AP te pelvisit?
A) 5cm mbi crista iliace
B) 5cm mbi simfizen pubike
C) ne nivel te spinen iliace anteriore superiore
D) 5 cm mbi nivl te spines iliace antriore superiore

691. Cila manover pozicionimi duhet te performohet per te vendosur qafen femorale paralel me IR per nje projeksion AP te pelvisit?
A) rrotullo gjymtyret e poshtem me 15-20 grade lateralisht
B) rrotullo gjymtyret e poshtem 15-20 grade medialisht
C) flexo belin 15-20 grade dhe extendo gjymtyret e poshtem
D) flexo belin dhe abducto femurin lateralisht me 15-20 grade

692. Si duhet te drejtohet rrezja qendrore per projeksionin AP oblik (metoda e modifikuar Cleaves) per te treguar pelvisin lateral?
A) perpendikular
B) 20 grade cefalik
C) 40 grade cefalik

D) paralel me axin e gjate te femurit

693. Per cilin projektion te gjymtyreve te poshtem ose pelvisit duhet qe te fleksohet pelvisi dhe femuri te abductohet nga linja e mesit e pacientit?

A) projektioni AP i pelvisit

B) projektioni AP i pelvisit

C) projektioni AP oblik peer qafen femorale (metoda e modifikuar Cleaves)

D) projektioni axiolateral i belit (metoda Danelius-Miller nje modifikim i metodes Lorenz)

694. Ne cilen zone te pjeses qendore te pacientit duhet te drejtohet rrezja qendrore per projektionin AP oblik (metoda e modifikuar Cleaves)?

A) ne nivel te crista iliace

B) 2.5cm mbi simfizen pubike

C) ne nivel te spines iliace anteriore superiore

D) 5cm mbi spinen iliace anteriore superiore

695. Cili projektion i pelvisit apo i ijeve nuk duhet te performohet nese pacienti dyshohet se ka nje fracture intertrokantrike?

A) projektioni AP i pelvisit

B) projektioni AP I pelvisit

C) projektioni lateral i pelvisit (metoda lauenstein)

D) projektioni axiolateral i belit (metoda Danelius-Miller nje modifikim i metodes Lorenz)

696. Per projektionin AP oblik (metoda e modifikuar Cleaves), cili eshte qellimi i abduksionit me nje kend te caktuar te femurit?

A) per te pozicionuar pelvisin nje nje pozicion te vertete lateral

B) per te parandaluar superpozimin e acetabulit m pelvisin

C) per te pozicionuar qafen femorale paralel me kaseten

D) per te parandaluar superpozimin e kokes femorale me acetabulin

697. Cila strukture duhet te centrohet ne qendren e tavolines kur projektioni AP oblik pershtatet per te treguar vetem nje ije?

- A) trupi femoral
- B) simfiza pubike
- C) trokanteri major
- D) spina iliace anteriore superiore

698. Per cilin projektion te nje ane te pelvisit duhet qe ana e paprekur te fleksohet dhe kofsha te largohet nga rrezja qendrore?

- A) projektioni AP
- B) projektioni lateral (metoda lauenstein)
- C) projektioni axiolateral i belit (metoda Danelius-Miller nje modifikim i metodes Lorenz)
- D) projektioni AP oblik (metoda Danelius-Miller nje modifikim i metodes Lorenz)

699. Per cilin projektion te plvisit duhet qe rrezja qendror te drejtohet horizontalisht ne drejtim te anes mediale te kofshes se prekur?

- A) projektioni AP
- B) projektioni lateral (metoda lauenstein)
- C) projektioni axiolateral i belit (metoda Danelius-Miller nje modifikim i metodes Lorenz)
- D) projektioni AP oblik (metoda Danelius-Miller nje modifikim i metodes Lorenz)

700. Cila nga dy kurbat vertebrale jane anteriorisht konkave?

- A) cervikale dhe lumbare
- B) cervikale dhe pelvike
- C) toracike dhe lumbare
- D) toracike dhe pelvike

701. Cila nga dy kurbat vertebrale kane nje kurve kifotike?

- A) cervikale dhe lumbare
- B) cervikale dhe pelvike
- C) toracike dhe lumbare

D) toracike dhe pelvike

702. Cila nga dy kurbat vertebrale jane lordoze?

- A) cervikale dhe lumbare
- B) cervikale dhe pelvike
- C) toracike dhe lumbare
- D) toracike dhe pelvike

703. Cilat nga dy kurbat vertebrale jane kurbat e para te kolones?

- A) cervikale dhe lumbare
- B) cervikale dhe pelvike
- C) toracike dhe lumbare
- D) toracike dhe pelvike

704. Cila gjendje spinale perfshin nje kurvatim te ekzagjeruar dorsal te colones vertebrale toracike?

- A) Lordosis
- B) Scoliosis
- C) Kifosis
- D) Spina bifida

705 . Cila nga gjendjet spinale abdominale perfshin cfaredo kurvatim lateral te colones vertebrale toracike?

- A) Lordosis
- B) Scoliosis
- C) Kifosis
- D) Spina bifida

706. Cili eshte emri i procesit te shkurter, te mprehte qe projektohet posteriorisht nga aspekti lateral dhe superior i trupit te vertebres te nje vertebre tipike?

- A) Laminae
- B) Pedicul
- C) Prosesi spinosus
- D) Prosesi transvers

707. Nga kryqezimi i cfare dy strukturash vertebrale e marin origjinen proceset transverse ne nje verteber tipike?

- A) Pedicul dhe trupi
- B) Pedicul dhe lamina
- C) Prosesi spinoz dhe trupi
- D) Prosesi spinoz dhe lamina

708. Cilat strukturat vertebrale bashkohen ne origjinen e procesit spinosus te nje vertebre tipike?

- A) te dy laminat
- B) te dy pedukujt
- C) pedukuli dhe trupi]
- D) Pedukuli dhe procesi transvers

709. Ne cilen strukture lokalizohet dens-i?

- A) C1
- B) C2
- C) Prosesi spinoz
- D) Prosesi transvers

710. Cila strukture njihet si "atlasi"?

- A) C1
- B) C2
- C) Dens
- D) Prominens vertebra

711. Cila strukture njihet si "axis"?

- A) C1
- B) C2
- C) Dens
- D) Prominens vertebra

712. Ne cilen strukture lokalizohet densi?

- A) Trupin e C1
- B) trupin e C2
- C) Procesi transvers i C1
- D) Procesi transvers i C2

713. Cila strukture vertebrale cervikale perforohen me nje foramen per pasazhin te nje arterie vertebrale dhe vene?

- A) trupi
- B) penduculus
- C) procesi spinoz
- D) procesi transvers

714. Vertebrat toraxkale dallojne nga vertebrat lumbare dhe cervikale sepse kane:

- A) Gjysmefaciet
- B) asnje proces transvers
- C) Procesin spinoz me te gjate
- D) Tipe bifide te procesit spinos

715. Cilat struktura artikulojne me gjysmefaciet vertebrale?

- A) kokat e brinjeve
- B) tuberculat e brinjeve
- C) proceset transverse
- D) artikulacioni sygapophyseal

716. Vertebrat lumbare ndryshojne nga ato cervikale dhe toracike sepse vertebrat lumbare kane?

- A) gjysmefaciet
- B) proces spinoz te tipit bifid
- C) procese spinose me te medha e te gjera
- D) formanina pergjate procesit transvers

717. Cila pjese e sakrumit formojne bashkimet me pars ilia-t e pelvisit?

- A) brinja sacrale
- B) siperfaqe auriculare
- C) promontory sacrale
- D) crisa sacral mediane

718. Cili projektion i vertebres cervikale tregon imazhin e densit pa foramen magnum?

- A) projektioni lateral
- B) projektioni AP axial oblik
- C) projektioni AP (goje hapur)
- D) projektioni AP (metoda Futch)

719. Cila strukture cervikale tregohet me mire ne projektionin AP (goje hapur)?

- A) C1 dhe C2
- B) proceset spinoze
- C) proceset transverse
- D) disqet intervertebrale

720. Si duhet te drejtohet rrezja qendrore per projektionin AP (goje hapur)?

- A) perpendikularisht
- B) kaudalisht 15 grade
- C) cefalik 15 grade
- C) 20 grad caudad

721. Si dhe ku duhet te drejtohet rrezja qendrore per projektionin AP axial te colones vertebrale cervikale?

- A) perpendikular me C4
- B) perpendikular me C7
- C) 15-20 grade cefalik me C4
- D) 15-20 grade cefalik me C7

723. Si duhet te pozicionohet kasete per projektionin AP axial te kolones vertebrale cervikale?

- A) e centruar ne C4
- B) e centruar ne majen e mastoidit
- C) me kufirin e siperm ne nivel te C4
- D) me kufirin e siperm ne nivelin e majes se mastoidit

724. Per cilin projektion te kolones cervikale ,rrezja qendrore duhet te mare nje kend me rreth 15-20 grade cefalik?

- A) projektioni AP axial
- B) projektioni PA Axial oblik
- C) projektioni AP (gojen e hapur)
- D) projektioni AP (metoda Fuchs)

725. Cila nga kriteret vleresuese nuk aplikohet ne projektionin Ap axial per kolonen vertebrale cervikale?

- A) hapsira e diskut intervertebral duhet te jete e hapur
- B) proceset spinoze duhet te kete nje distance ekuivalente me pedukijt
- C) kendi mandibular duhet te kete nje distance ekuivalente me vertebrat
- D) C1 dhe C2 duhet te shihen pa asnje superpozim te mandibules

726. Cili projektion i kolones vertebrale cervikale kerkon distance burim – kasete prej 180cm?

- A) projektioni AP
- B) projektioni lateral
- C) projektioni PA axial oblik
- D) projektioni AP axial oblik

727. Cila manover duhet te perdoret per te ndihmuar ne perfitimin e maksimumit te uljes se skapulave ne projektionin lateral te colones vertebrale cervikale?

- A) Drejtimi i rrezes qendrore me 15 grade caudad
- B) drejtimi i rrezes qendrore me 15 grade cefalik
- C) drejtimi perpendikular i rrezes qendrore ne C7
- D) Mbajtja e frymemarrjes pas nje ekspirimi te plote

728. Cfare duhet bere ne menyre qe skapula e zmadhuar me larg nga kasete te projektohet nen vertebrae cervikale te poshtme, per projektionin lateral te colones vertebrale?

- A) Drejto rrezen qendrore horizontalisht ne C4
- B) Drejto rrezen qendrore horizontalisht ne C7
- C) Kend i rrezes qendrore me 15 grade caudad
- D) Kend i rrezes qendrore me 15 grade cefalik

729. Cfare duhet te behet ne menyre qe te evitohet superpozimi i rami mandibule me vertebrae cervikale ne projektionin lateral te colones vertebrale cervikale?

- A) Te ngrihet mjekrra
- B) Drejto kaseten horizontalisht ne C4
- C) Drejto kaseten horizontalisht ne C7
- D) Ke ndo kaseten me 15 grade cefalik

730. Cfare duhet te behet qe te reduktohet zmadhimi i shkaktuar nga rritja e distances objekt-imazh ne projektionin lateral te vertebrae cervikale?

- A) Kendo kaseten me 15 grade cefalik
- B) Instrukto pacientin qe te mbaje pesha ne cdo dore
- C) Realizo ekspozimin kur te kemi nje ndalim te ekspirimit te plote
- D) Perdor nje burim – kasete 180 cm

731. Cili projektion i colones vertebrale cervikale perdor te njejtin drejtim dhe qenderzim te rrezes qendrore si ne studimin e hiperekstensioni dhe hiperfleksioni te vertebrae cervikale?

- A) projektioni lateral
- B) projektioni AP axial
- C) projektioni Ap axial oblik
- D) projektioni AP (goje te hapur)

732. Cili projektion ne vertebrat cervikale tregon proceset spinoze te ngritura ne nivel dhe gjerisht te ndara nga njera tjetra?

- A) projektioni AP axial
- B) projektioni AP axial oblik
- C) projektioni me hiperfleksion lateral
- D) projektioni me hiperekstension lateral

733. Cili projektion i vertebrave cervikale tregon proceset spinoze te shtypura dhe ne lidhje te ngushte?

- A) projektioni AP
- B) projektioni AP axial oblik
- C) projektioni me hiperfleksion lateral
- D) projektioni me hiperekstension lateral

734. Cili projektion i vertebrave cervikale duhet te prodhoje nje imazh radiografik i cili e tregon trupin e mandibules se pacientit afersisht perpendikular me kufirin e poshtem te radiografise?

- A) projektioni AP (goje hapur)
- B) projektioni AP axial oblik
- C) projektioni me hiperfleksion lateral
- D) projektioni me hiperekstension lateral

735. Cili projektion per vertebrat cervikale duhet te ekspozohet me nje rreze qendrore horizontale dhe perpendikulare?

- A) lateral
- B) AP axial
- C) AP me gojen e hapur
- D) AP axial oblik

736. Si duhet te drejtohet rrezja qendrore per projektionin AP axial te colones vertebrale cervikale

- A) horizontalisht
- B) perpendikularisht
- C) Kaudal me 15 - 20 grade

D) Cefalik me 15 - 20 grade

737. Si duhet te drejtohet rrezja qendrore per projeksionin PA axial oblik te kolones vertebrave cervikale?

- A) vertikalisht
- B) Perpendikularisht
- C) Caudalisht me 15-20 grade
- D) Cefalikisht me 15-20 grade

738. Cili projeksion i colones vertebrale cervikale tregon me mire formanina intervertebrae-n?

- A) projeksioni lateral
- B) projeksioni AP axial
- C) projeksioni AP axial oblik
- D) projeksioni AP (goje hapur)

739. Cili pozicion i colones vertebrale cervikale tregon me mire formaninen intervertebrale te majte me rrezen qendrore me kend 15-20 grad cefalik?

- A) laterali i majte
- B) LAO anteriori oblik i majte
- C) LPO posteriori oblik i majte
- D) RPO posteriori oblik i djathte

740. Cili pozicion i colones vertebrale cervikale tregon me se miri formanina intervertebrale te djathte me rreze qendrore m kend 15-20 grad caidad?

- A) laterali i djathte
- B) LAO
- C) LPO
- D) RAO

741. Me sa grade duhet te rrotullohet i gjithe trupi per projeksionin e colones cervikale nga pozicioni AP ose dhe PA?

- A) 15 grade
- B) 20 grade

- C) 45 grade
- D) 90 grade

742. Cili kriter vleresimi i takon projeksionin AP (metoda Fuchs) te vertebrave cervikale?

- A) Rami mandibular duhet te jete i superpozuar
- B) Te 7 vertebrat cervikale duhet te jene te dukshme
- C) Foramina intervertebrae dhe hapësira e diskut duhet te jete e hapur
- D) I gjithë densi duhet te jete i dukshem permes foramen magnum

743. Cili kriter vleresues i takon projeksionin AP axial te colones vertebrale cervikale?

- A) Te 7 vertebrat cervikale duhet te jene te dukshme
- B) Proceset spinoze duhet te kene nje distance te njejte me pedukujt
- C) Foramina intervertebrae duhet te jete e hapur me ato qe jane prane me kaseten
- D) Foramina intervertebrae duhet te jete e hapur me ato qe jane larg me kaseten

744. Cili kriter vleresues i perket projeksionit lateral te colones vertebrale cervikale?

- A) Te 7 vertebrat cervikale duhet te jene te dukshme
- B) Proceset spinoze duhet te kene nje distance te njejte me pedukujt
- C) Foramina intervertebrae duhet te jete e hapur me ato qe jane prane me kaseten
- D) Foramina intervertebrae duhet te jete e hapur me ato qe jane larg me kaseten

745. Cili kriter vleresues i perket projeksionit AP aksial oblik te colones vertebrale cervikale?

- A) Rami mandibule duhet te jete i superpozuar
- B) Proceset spinoze duhet te kene nje distance te njejte me pedukujt
- C) Foramina intervertebrae duhet te jete e hapur me ato qe jane prane me kaseten
- D) Foramina intervertebrae duhet te jete e hapur me ato qe jane larg me kaseten

746. Cili kriter vleresues i perket projeksionit PA oblik axial te colones vertebrale cervikale?

- A) Rami mandibule duhet te jete i superpozuar
- B) Proceset spinoze duhet te kene nje distance te njejte me pedukujt
- C) Foramina intervertebrae duhet te jete e hapur me ato qe jane prane me kaseten

D) Foramina intervertebrae duhet te jete e hapur me ato qe jane larg me kaseten

747. Cili projektion duhet te perfshihet ne nje seri cervikale nese projektioni lateral nuk tregon vertebren C7?

- A) projektioni AP oblik axial
- B) projektioni lateral (metoda Twining)
- C) projektioni lateral (pozicioni decubitus dorsal)
- D) projektioni AP , me nje kasete perpendikulare

748. Per projektionin lateral (metoda Twining) te vertebrave cervikale, si dhe ku duhet te drejtohet rrezja qendrore?

- A) perpendikulare me C4
- B) perpendikulare me hapsiren e diskut intervertebral te C7-T1
- C) me kend 15 grade cefalik ne C4
- D) me kend 15 grade cefalik ne hapsiren e diskut intervertebral te C7 dhe T1

749. Cila nga strukturat e meposhtme tregohen me se miri ne projektionin lateral (metoda Twining)?

- A) vertebrat e poshtme cervikale
- B) vertebrat e poshtme toraxike
- C) artikulationet zygapofiseal toraxike
- D) foramina intervrtebrale toraxike

750. Per projektionin AP te kolones vertebrale torakale ,ku duhet te drejtohet kasete ne murin anterior te kafazit?

- A) ne kendin sternal
- B) dhembeza superasternale
- C) lehtesisht mbi kendin sternal
- D) lehtesisht nen kendin sternal

751. Duke iu referuar pacientit ,ku duhet te pozicionohet kufiri i siperm i kasetes per projektionin AP te kolones vertebrale torakale?

- A) ne nivel te T7

- B) lehtesisht në kendin sternal
- C) në nivel të kurrizit mandibular
- D) 3.8-5cm mbi kufirin e sipërm të skapules

752. Për projektionin AP të kolonës vertebrale torakale me pacientin në pozicionin supin, përse gjunjët dhe bëli i pacientit duhet të flektohen?

- A) për të reduktuar kifozen dorsale
- B) për të rritur kifozen dorsale
- C) për të ulur diafragmen në nivelin e saj me të ulët
- D) për të rritur diafragmen në nivelin e saj me të lartë

753. Cili projektion tregon më së miri foraminet intervertebrale të kolonës vertebrale torakale?

- A) projektioni AP
- B) projektioni latral
- C) Nga laterali i vertetë, pacienti rrotullohet me 20 gradë anteriorisht
- D) Nga laterali i vertetë, pacienti rrotullohet me 20 gradë posteriorisht

754. Nderkohe që performohet projektioni lateral i kolonës torakale, cila është procedura më e preferuar që duhet të performohet kur aksi i gjatë i kolonës vertebrale nuk është horizontal?

- A) drejto rrezja qendrore me 10-15 gradë caudad
- B) drejto rrezja qendrore me 10-15 gradë cefalik
- C) extendo krahnin e majtë të pacientit deri sa e duron koka e pacientit
- D) Ngri regjionin e poshtëm ose të sipërm torakal me një mbështetëse radiotransparente

755. Në cilin nivel të trupit duhet të drejtohet rrezja qendrore për projektionin lateral të kolonës vertebrale torakale?

- A) këndi sternal
- B) kurrizi mandibular
- C) procesi ksifoid
- D) këndi inferior i skapules

756. Çfarë kompensimi duhet të bëhet në projektionin lateral të kolonës vertebrale torakale me një pacient recumbent kur regjioni i poshtëm torakal nuk është paralel me tavolinën radiologjike?

- A) Vendos jastek nen koken e pacientit
- B) drejto rrezet qendrore perpendikular me T10
- C) kend i rrezes qendrore me 10-15 grade caudad
- D) kend i rrezes qendrore me 10-15 grade cefalik

757. Cila nga strukturat e meposhtme tregohen me mire ne projeksionin lateral (metoda Twining)?

- A) Vertebrat e sipërme cervikale
- B) Vertebrat e sipërme toraxike
- C) Artikulacioni zygapofizeal toraxik
- D) Foramina intervertebrale cervikale

758. Cili projeksion i kolones vertebrale demonstron me mire kyfozen?

- A) projeksioni AP i kolones vertebrale lumbare
- B) projeksioni AP i kolones vertebrale torakale
- C) projeksioni lateral i kolones vertebrale lumbare
- D) projeksioni lateral i kolones vertebrale torakale

759. Cili projeksion i kolones vertebrale tregon me mire skoliosis?

- A) projeksioni PA i kolones vertebrale toraxike
- B) projeksioni lateral i kolones vertebrale lumbare
- C) projeksioni lateral i kolones vertebrale toraxike
- D) projeksioni AP i vertebrale cervikale (goje hapur)

760. Cili projeksion i kolones vertebrale tregon me mire lordosis?

- A) projeksioni AP i kolones vertebrale lumbare
- B) projeksioni AP i kolones vertebrale torakale
- C) projeksioni lateral i kolones vertebrale lumbare
- D) projeksioni lateral i kolones vertebrale torakale

761. Perse duhet ti fleksoje pacienti gjunjet dhe pelvisin ne projeksionin AP te kolones vertebrale lumbare?

- A) per te rritur kurben lordike
- B) per te reduktuar kurben lordike

- C) për të rritur diafragmen në nivelin më të lartë të saj
- D) për të ulur diafragmen në nivelin më të ulët të saj

762. Si duhet të pozicionohet kasetja për një projektion AP të kolonës vertebrale lumbare?

- A) të centruar në procesin ksifoid
- B) të centruar në nivel të crista iliaca
- C) të centruar në nivel të trochanter major
- D) në kufirin e sipërm në nivel të crista iliaca

763. Cila manovër pozicioni duhet të performohet për të reduktuar kurvaturën normale lordike për projektionin AP të kolonës vertebrale lumbare?

- A) ekstendim i plote i këmbeve
- B) fleksion i gjunjëve dhe pelvisit
- C) këndim i rrezes qendrore me 2 - 8 grade caudad
- D) vendosja e jastekut radiolucet nën spinën lumbare

764. Cili plan ose linjë e pacientit duhet të centrohet në mesin e tavolinës për projektionin AP të kolonës vertebrale lumbare?

- A) oblik
- B) horizontal
- C) midsagital
- D) midcoronal

765. Ku duhet të drejtohet rrezja qendrore për projektionin AP të kolonës vertebrale lumbare për një ekzaminim lumbosakral?

- A) L2
- B) L4
- C) 7.8cm mbi crista iliaca
- D) 5cm mbi simfizen pubike

766. Cili plan ose linje e pacientit duhet te centrohet ne mesin tavolines per projektionin lateral te kolons vertebrale lumbare?

- A) oblik
- B) horizontal
- C) midsagital
- D) midcoronal

767. Cili projektion i kolones vertebrale lumbare tregon me mire foraminen intervertebrale?

- A) projektioni AP
- B) projektioni lateral
- C) projektioni PA oblik
- D) projektioni AP oblik

768. Me sa grade dhe ne cilin drejtim duhet te drejtohet rrezja qendrore per projektionin lateral te kolones vertebrale lumbare kur kolona vertebrale eshte paralel me tavolinen radiologjike?

- A) perpendikularisht
- B) 5 grade kaudad
- C) 5 grade cefalik
- D) 8 grade kaudad

769. Me sa grade dhe ne cilin drejtim duhet te drejtohet rrezja qendrore per projektionin lateral te kolones vertebrale lumbare kur kolona vertebrale nuk eshte paralel me tavolinen radiologjike?

- A) perpendikular per meshkujt, 8 grade caudad per femrat
- B) perpendikular per femrat, 5 grade caudad per meshkujt
- C) 5 grad caudad per meshkujt, 8 grade caudad per femrat
- D) 5 grade caudad per femrat, 8 grade caudad per meshkujt

770. Me sa grade dhe ne cilin drejtim duhet te drejtohet rrezja qendrore per projektionin lateral L5-S1 kur kolona vertebral lumbare eshte paralel me tavolinen?

- A)perpendikulare
- B)5 ne 8 grade kaduad
- C)5 ne 8 grade cefalik
- D) 10 ne 15 grade caudad

771. Cila strukture vertebrale demonstron me se miri nese nje pacient supin rrotullohet me 45 grade me anen e djathte te ngritur dhe me nje rreze qendrore perpendikulare qe drejtohet ne vertebrat lumbare?

- A) foramina intervertebrale
- B) trupat e vertebrave lumbare ne profil
- C) artikulationi zygapofiseal ne anen e majte
- D) artikulationi zygapofiseal ne anen e djathte

772. Sa grade jane te nevojshme per rrotullimin e trupit per projektionin AP oblik te kolones lumbare vertebrale?

- A) 15-20 grade
- B) 25-30 grade
- C) 45 grade
- D) 70 grade

773. Cili projektion i colones vertebrale lumbare e vendos planin midsagital perpendikular me kaseten?

- A) projektioni AP
- B) projektioni Lateral
- C) projektioni AP oblik
- D) projektioni Lateral , L5-S1

774. Cili projektion i colones vertebrale lumbare e vendos planin midsagital paralel me kaseten?

- A) projektioni AP
- B) projektioni lateral
- C) projektioni LPO
- D) projektioni RPO

775. Me sa grade dhe ne cilin drejtim duhet te drejtohet kasete per projektionin AP axial te junktionit lumbosaakral?

- A) perpendikularisht
- B) 5-8 grade kaudal
- C) 5-8 grade cefalik
- D) 30-35 grade cefalik

776. Cili projektion tregon me mire artikulacionin sakroiliak te djathte?

- A) projektionin AP me pacientin supin
- B) projeksoni lateral m pacientin recumbent ne lateralin e djathte
- C) projektioni PA oblik me pacientin ne pozicionin LAO
- D) projektioni AP oblik me pacientin ne pozicionin LPO

777. Cili projektion tregon me mire artikulacionin sakroiliak te majte ?

- A) projektionin AP me pacientin supin
- B) projeksoni lateral m pacientin recumbent ne lateralin e djathte
- C) projektioni PA oblik me pacientin ne pozicionin LAO
- D) projektioni AP oblik me pacientin ne pozicionin RPO

778. Sa grade rrotullimi nevojiten per rrotullimin e trupit nga pozicioni supin per projektionin AP oblik te artikulacionit sakroiliak?

- A) 15 ne 20 grade
- B) 25 ne 30 grade
- C) 35 ne 45 grade
- D) 45 ne 55 grade

779. Me sa grade dhe ne cilin drejtim duhet te drejtohet rrezja qendrore per projektionin AP axial te sacrumit?

- A) perpendikular
- B) 10 grade caudad
- C) 10 grade cefalik
- D) 15 grade cefalik

780. Me sa grade dhe ne cilin drejtim duhet te drejtohet rrezja qendrore nese eshte e nevojshme te kemi ne pacient ne pozicionin prone per nje projektion PA axial te sacrumit?

- A) perpendikular

- B) 10 grade caudad
- C) 10 grade cefalik
- D) 15 grade caudad

781. Me sa grade dhe ne cilin drejtim duhet te drejtohet rrezja qendrore nese eshte e nevojshme te kemi nje pacient ne pozicionin prone per nje projeksion PA te koksigeusit?

- A) perpendikular
- B) 10 grade caudad
- C) 10 grade cefalik
- D) 15 grade caudad

782. Me sa grade dhe ne cilin drejtim duhet te drejtohet rrezja qendrore per projeksionin AP te koksigeusit?

- A) perpendikular
- B) 10 grade caudad
- C) 10 grade cefalik
- D) 15 grade caudad

783. Me sa grade dhe ne cilin drejtim duhet te drejtohet rrezja qendrore per projeksionin lateral te sakrumit?

- A) perpendikular
- B) 10 grade caudad
- C) 10 grade cefalik
- D) 15 grade caudad

785. Me sa grade dhe ne cilin drejtim duhet te drejtohet rrezja qendrore per projeksionin lateral te koksigeusit?

- A) perpendikular
- B) 10 grade caudad
- C) 10 grade cefalik
- D) 15 grade caudad

786. Cili projektion i metodes Ferguson duhet te performohet per te vleresuar me mire skoliozen?

- A) PA ne kembe
- B) AP ne kembe
- C) PA shtrire
- D) AP shtrire

787. Ne cilin pozicion duhet te vendoset pacienti kur performohet nje ekzaminim i matjes se kockave te gjata?

- A) Prone
- B) Supin
- C) Vertikalisht
- D) Lateral

788. Si duhet te pozicionohen gjymtyret e poshtem per projektionin bilateral te tyre?

- A) ne nje pozicion lateral me ekstension te plote
- B) ne nje pozicion lateral me fleksion parcial
- C) ne pozicionin anatomik me nje rrotullim lehtesisht medial
- D) ne pozicionin anatomil me nje rrotullim lehtesisht lateral

789. Cili ekzaminim demonstron strukturat artikulare kur nderfutet vetem nje lende kontrasti jonizues i tretshem ne uje?

- A) Pneumoarthrography
- B) Arteriografia opake
- C) Arteriografia me kontrast te dyfishte
- D) Arteriografia me kontrast negativ

790. Cili ekzaminim kombinon lendet e kontrastit radioopak dhe radiotrasparent ne nje artikulation per te treguar strukturat e indit te bute?

- A) Pneumoarthrography
- B) Arteriografia opake
- C) Arteriografia me kontrast unik
- D) Arteriografia me kontrast te dyfishte

791. Cila dhome ekzaminimi duhet te perdoret per arteriografine me kontrast?

- A) Kirurgjikale
- B) Sonografike
- C) Radiografia -urologjik
- D) Radiografia fluoroskopike

792. Cila arteriogramë do te perfshinte me mire tekniken me subtraksion me radiografine konvencionale?

- A) arteriografia e shpatullave
- B) arteriografia e kycit per sindromen tunelit carpal
- C) arteriografine e pelvisit per dislokacionin kongenital te tyre
- D) arteriografin e pelvisit per te zbuluar humbjen e nje proteze te pelvisit

793. Cili artikulation ekzaminohet nga arteriografia me kontrast me shpesh se cfaredo artikulationi tjetër?

- A) pelvisi
- B) gjunjët
- C) kyçi
- D) shpatulla

794. Cila është arsyeja më e shpeshtë e kryerjes së arteriografisë së pelvisit tek femijët?

- A) abuzimi i femijeve
- B) aksidentet automobilistike
- C) matja e kockave të gjata
- D) dislokacioni kongenital i pelvisit

795. Cila eshte nje nga dy arsytet me te shpeshta ne kryerjen e arteriografise se pelvisit tek adultet?

- A) aksidentet automobilistike
- B) matja e kockave te gjata
- C) dislokacioni kongenital i pelvisit
- D) zbulimi i humbjes se nje proteze te pelvisit

796. Cila nga dy modalitetet radiografike ka reduktuar shume kerkesen per arteriografine e artikulacionit temporomandibular?

- A) CT dhe sonografia
- B) CT dhe RM
- C) Orthoroentgenografi dhe sonografia
- D) Orthoroentgenografi dhe RM

797. Cilat struktura tregohen me arteriografine me kontrast?

- A) bursat
- B) tendinat
- C) ventrikujt
- D) disku intervertebral

798. Cilat jane dy metodat per performimin e arteriografise me kontrast te gjunjeve?

- A) E menjehershme dhe e vonuara
- B) Invazive dhe jo-invazive
- C) Rreze vertikale dhe rreze horizontale
- D) Rreze perpendikulare dhe rreze e kenduar

799. Cila nga pikat e meposhtme eshte nje shembull i traumes se verber?

- A) morthi
- B) plag me arme zjarri
- C) demtimi nga carja
- D) aksident automobilistik

800. Cila procedure duhet te kryhet kur behet nje radiografi per te lokalizuar penetrimin e nje trupi te huaj?

- A) Reduktim i kVp per te perftuar nje kontrast me nje shkalle te ulet
- B) Shenjo hyrjen dhe/ose daljen me nje markues radioopak
- C) Siguro nje pershkrim me shkrim per lokalizimin e plages
- D) Perdor dy here SID e zakonshme per te rritur detajet e struktures

801. Cilen procedure duhet te kryjeje nje radiolog nese nje pacient traumatik fillon dhe shfaq nje krize?

- A) Siguro pirjen e ujit
- B) Rrotullo pacientin ne anen e duhur
- C) Informo mjekun ndjekes
- D) Mbulo pacientin me nje kuverte

802. Cila nga sipmtomat e meposhtme shoqerohet me nje dentim godites?

- A) logorea (te flasesh shume)
- B) i ftohte, lekure e ftohte dhe e lagesht
- C) djersitje e tepruar
- D) pergjumesi e rritur

803. Cila nga arsyet e meposhtme *nuk* eshte nje rregull i duhur per traumat radiografike?

- A) Gjithnje bej te pakten tre radiografi per cdo zone te demtuar
- B) Asnjehere mos ler nje pacient te pa trajtuar gjate nje procedure te marrjes se imazhit
- C) Mos leviz asnjehere nje pajisje imobilizimi pa nje urdher te mjekut
- D) Gjithnje pyet mjekun pergjegjes perpara se ti jepni pacientit ndonje gje per te ngrene apo pire

804. Cila nga projeksionet e meposhtme duhet te kryhet e para per nje pacient me trauma multiple?

- A) projeksioni AP lumbar
- B) projeksioni lateral lumbar,pozicioni decubitus dorsal
- C) projeksioni AP cervikal
- D) projeksioni lateral cervikal,pozicioni decubitus dorsal

805. Gjate kryerjes se projekSIONIT AP axial oblik per vertebrat cervikale per nje pacient traumatik supin,si duhet te drejtohet rrezja qendrore nese perdoret vetem nje kend?

- A) 15 grade cefalik
- B) 45 grade cefalik
- C) 15 grade lateromedialisht
- D) 45 grade lateromedialisht

806. Gjate kryerjes se projekSIONIT AP te abdomenit ne nje pacient traumatik, cfare duhet te perftohet perpara se te levizet pacienti ne tavolinen radiologjike?

- A) shenjat vitale
- B) miratim me shkrim nga pacienti
- C) leje nga mjeku ndjekes
- D) vertebra cervikale laterale,pozicioni decubitus dorsal

807. Cila nga procedurat e meposhtme duhet te performoje radiografi nese nje pacient traumatik ka gjakosje nga plaga?

- A) Te mbroje kaseten me plastike
- B) Te mbylle kaseten brenda nje jastik-cante
- C) Te siguroje likide per pacientin oralisht ose ne rruge intravenoze
- D) Personli i dhomes se emergjences te asistojne ne procedure

808. Perse duhet te perdoret pozicioni decubitus lateral i majte per te treguar ajrin e lire brenda ne kavitetin abdominal?

- A) Ajri i lire do te mblidhet nen hemidiafragmen e majte
- B) Nivelet e fluidit do te mblidhen nen hemidiafragmen e djathte
- C) Densiteti i heparit siguron kontrast te mire per ajrin e lire
- D) Densiteti i stomakut siguron kontrast te mire per ajrin e lire

809. Gjate kryerjes se projekSIONIT AP te abdomenit ,pozicioni decubitus lateral i majt, cila nga procedurat e meposhtme duhet te kryhet ku ne interes te pare eshte niveli i likidit?

- A) Sigurohu qe e gjithë anan e majte te tregohet
- B) Sigurohu qe e gjithë ana e djathte te tregohet
- C) Centro kaseten 10 cm mbi crista iliaca per te perfshire diafragmen

D) sigurohu qe pacienti do ta pije te gjithë goten me uje perpara se te behet radiografia

810. Cili projektion i abdomenit duhet te kryhet per te treguar nivelin e ajrit apo fluidit kur nje pacient traumatik eshte i paaftë te pozicionohet ne pozicionin vertikal apo lateralin recumbent?

- A) AP
- B) AP oblik i majte
- C) AP oblik i djathte
- D) Lateral, pozicioni dorsal decubitus

811. Kur kryhet projektioni AP per pelvisin ne nje pacient traumatik ,cila nga procedurat e meposhtme *nuk* duhet kryer?

- A) Perdor nje grille direkt nen pacientin
- B) Rrotullo femurin 15 grade medialisht
- C) Transfero pacientin ne nje tavoline radiografike
- D) Centro kaseten ne nivel 5cm inferior cristes iliace anterosuperior

812. Cfare veprimi duhet te realizoje nje radiolog nese nje pacient traumatik gjysme i vetedijshem fillon te vjelle gjate procedures radiografike?

- A) Siguro shenjat vitale
- B) Jepi pacientit nje cante plastike
- C) Levize pacientin ne pozicionin ulur
- D) Rrotulloje pacientin ne pozicionin recumbent lateral

813. Cila nga procedurat e meposhtme duhet te performoje nje radiograf ne nje pacient traumatik me nje demtim ne koke qe shfaq pupila te pabarabarta?

- A) jepi pacientit nje gote m uje
- B) leviz pajisjen e imobilizimit
- C) Informo menjehere mjekun kurues
- D) Rrotullo pacientin ne pozicionin recumbent lateral

814. Cila nga procedurat e meposhtme te craniumit do te tregonte me mire nje frakture te dyshuar te craniumit posterior?

- A) AP
- B) PA
- C) AP axial, Metoda Towne
- D) Lateral, pozicioni decubitus dorsal

815. Cila linje e pozicionimit te kokes duhet te jete afersisht perpendikulare me kaseten gjate kryerjes se projeksonit acantioparietal, metoda Reverse Waters, per kockat faciale te nje pacienti traumatik supin?

- A) Mentomatal
- B) Orbitomeatal
- C) Glabellomeatal
- D) Infraorbitomeatal

816. Si duhet te drejtohet rrezja qendrore gjate prformimit te projeksonit acantioparietal, metoda Revers Waters, per kockat faciale ne nje pacient traumatik supin?

- A) 37 grad cefalik
- B) perpendikular me kaseten
- C) Paralel m linjen mentomeatale
- D) paralel me linjen infraorbitomeatale

817. Cila nga rregullat e pergjithshme te meposhtme duhet te ndiqen gjate radiografimit te gjymtyreve te siperm apo te poshtme ne nje pacient traumatik?

- A) Gjithnje perfto dy radiografi, 90 grade secila
- B) Gjithnje poziciono per nje projekson te vertete AP dhe lateral
- C) Gjate demostrimit te kockave te gjata, gjithnje leviz pajisjen e imobilizimit
- D) Gjate demostrimit te kockave te gjata, gjithnje transfero pacientin ne tavolinen radiologjike

818. Cila eshte ndarja e pare per sistemin digjestiv?

- A) Goja
- B) Stomaku
- C) Intestinet e vogla
- D) Gjendrat salivare

819. Cila nga gjendrat salivare eshte me e madhja?

- A) parotid
- B) Sublingual
- C) Submandibular

820 . Per sialografin,ne cilen strukture injektohet lenda e kontrastit?

- A) Vena
- B) Artierie
- C) Muskuj
- D) Duktusi salivar

821. Cili projektion sialografik e drejton rrezet qendrore pergjate rrenjeve mandibulare?

- A) projektioni lateral
- B) projektioni tangencial
- C) projektioni verticosubmental
- D) projektioni axial (metoda intraorale)

822. Cili projektion sialografik tregon nje glandul parotide te superpozuar nga nje rrenje mandibulare?

- A) projektioni lateral
- B) projektioni tangencial
- C) projektioni verticosubmental
- D) projektioni axial (metoda intraorale)

823. Cila nga dy projektionet sialografike tregon me se miri gladulat parotide?

- A) axial dhe lateral
- B) axial dhe verticocubmental
- C) tangencial dhe lateral
- D) tangencial dhe verticosubmental

824. Cili projektion sialografik tregon nje zone te pambuluar te zones sublinguale?

- A) projektioni lateral
- B) projektioni tangencial
- C) projektioni verticosubmental
- D) projektioni axial (metoda intraorale)

825. Cila eshte struktura muskulomembranoze e lokalizuar perpara vertebres dhe pas hundes ,gojes dhe laringut?

- A) Glotis
- B) Trakea
- C) Faringu
- D) Ezofagu

826. Cila struktura e qafes eshte perafersisht 4cm ne gjeresi dhe e lokalizuar nen tavanin e gjuhes dhe perpara faringut laringeal?

- A) laringu
- B) trakea
- C) ezofagu
- D) orofaringu

827. Cila struktura formon prominences laringeeale?

- A) Epiglotis
- B) Cordat e verteta vokale
- C) kartilagu cricoid
- D) kartilagu tiroid

829. Cila struktura ndalon rrjedhen ne laring gjate pertypjes?

- A) faringu
- B) epiglotis
- C) cartilagu cricoid
- D) kartilagu tiroid

830. Cila strukture e qafes eshte e lokalizuar me superiorisht?

- A) Laringu
- B) Glotis
- C) Faringu
- D) Epiglotis

831. Per projektionin AP i cili tregon faringun dhe laringun, ne cilin nivl duhet te drejtohet rrezja qendrore?

- A) C1
- B) C7
- C) angulus mandibule
- D) promimencia laringeale

832. Per AP paraprake dhe projektionin lateral qe tregon laringun dhe faringun, kur duhet te behet ekspozimi per te siguruar mbushja e lumenit te fytit me ajer?

- A) gjate ekspirimit
- B) gjate insiprimit
- C) pas suspensionit te ekspirimit
- D) pas suspensionit te insiprimit

833. Cili pozicionim i trupit duhet te perdoret per ekzaminimin tomografik te faringut dhe laringut?

- A) Prone
- B) Supin
- C) Vertikal lateral
- D) Recumbent lateral

834. Per projektionin lateral qe tregon orofaringun, ne cilin nivel pacienti duhet te drejtohet rrezja qendrore?

- A) C7
- B) angulus mandibule
- C) prominencia laringeale
- D) meatus akusticus externus

835. Cilen procedure duhet te performoje pacienti per studime tomografike te strukturave faringolaringeale?

- A) Inspirim i qete me hunde
- B) Fonimi i "e-e-e" me ze te larte
- C) Suspensioni i frymemarjes pas espirimit
- D) Suspensioni i frymemarjes pas inspирimit

836. Per radiografine e nje AP vertikal te abdomenit te nje adulti me konstrukt mesatar,perse duhet te rritet lehtesisht kaseten mbi nivelin e centrimt per radiografine supin?

- A) Per te perfshire fshikzen
- B) per te perfshire diafragmen
- C) per te vizualizuar guret ne temth
- D) per te vizualizuar guret ne rene

837. Per radiografine e abdomenit k ur duhet te ndalohet frymemarja dhe cfare efekti do te kete ajo tek pacienti?

- A) Ne ekspirimin e plote: ngrin diafragmen
- B) Ne ekspirimin e plote: ul diafragmen
- C) Ne inspирimin e plote: ngrin diafragmen
- D) Ne inspирimin e plote: ul diafragmen

838. Perse eshte e deshirueshme perfshirja e diafragmes ne radiografine vertikale te abdomenit?

- A) per te treguar ajrin e lire ne abdomen
- B) per te treguar nivelin e fluidit ne torax
- C) per te treguar nivelin e fluidit ne abdomen
- D) per te treguar kalkulat ne koleciste dhe rene

839. Cila nga udhezimet e meposhtme nuk eshte e nevojshme te ndiqet kur vendoset per perdorimin e mbrojteseve te gonadeve per radiografine abdominale?

- A) pacienti ka nje potencial te arsyeshem produktiviteti
- B) gonadet shtrihen 5cm nga rrezja primare

- C) qellimi i performimit te ekzaminimit nuk kompromentohet
- D) leja per te perdorur mbrojtset e gonadeve garantohet nga pacienti

840. Cili projektion duhet te perdoret per te demonstruar ajrin e lire brenda ne kavitetin abdominal kur pacienti eshte i paafte te qendroj drejte per nje radiografi abdomeni?

- A) projektioni AP me pacientin supin
- B) projektioni lateral,pozicioni dekubitus dorsal
- C) projektioni AP, pozicioni decubitus lateral i majte
- D) projektioni AP, pozicioni dekubitus lateral i djathte

841. Cili projektion nuk tregon nivelin e ajrit te lire brenda ne abdomen?

- A) projektioni Ap me pacientin supin
- B) projektioni Ap me pacientin ne kembe
- C) projektioni lateral,pozicioni dekubitus dorsal
- D) projektioni Ap ,pozicioni dekubitus lateral i majte

842 . Cili eshte disavantazhi me i madh i projektionit PA i abdomenit nga projektioni AP i abdomenit?

- A) Projektioni PA redukton dozen e ekspozimit ne gonade
- B) Projektioni PA zmadhon kolecisten per nje vizualizim me te mire
- C) Projektioni PA tregon rami pubis nen fshikezen e urines
- D) projektioni PA redukton distancen objekt-receptor imazhi te reneve

843.Cili pozicion radiograf i abdomenit kerkohet qe pacienti te jete supin dhe qe rrezja qendrore te jete e drejtuar ne anen laterale te pacientit,duke hyre lehtesisht anteriorisht planit midsagital?

- A) Dekubitus dorsal
- B) Dekubitus ventral
- C) Dekubitus lateral i majte
- D) Dekubitus lateral i djathte

845. Cili pozicion radiografik i abdomenit kerkon qe pacienti te vendoset ne pozicionin recumbent lateral ne anen e majte te tij apo te saj ,me kasete te vendosur nen pacientin dhe e centruar ne abdomen ne nivel te crista iliaca ,dhe qe rrezja qendrore te drejtohet qe te hyje ne anen e djathte te pacientit lehtesisht anteriorisht planit midsagital?

- A) lateral i majte
- B) Lateral i djahte
- C) dekubitus lateral i majte
- D) dekubitus lateral i djathe

846. Projektioni lateral me pacientin te vendosur ne pozicionin dekubitus dorsal, projektioni lateral i majte, dhe pozicioni dekubitus lateral i majte i abdomenit kerkon cilen nga te poshte renditurat?

- A) rrezja qendrore duhet te hyje ne anen e majte te pacientit
- B) Pacienti duhet ta ndaloje frymemarrjen pas ekspirimit
- C) pacienti duhet ta ndaloje frymemarrjen pas inspirimit
- D) rrezja qendrore duhet te hyje ne anen anteriore te abdomenit

847. Per projektionin lateral me pacientin e vendosur ne pozicionin dekubitus dorsal,ku duhet te hyje rrezja qendrore tek pacienti?

- A) 5cm anteriorisht planit midsacronal ne nivel te crista iliaca
- B) 5cm anteriorisht planit midcoronal dhe 5 cm mbi nivel te crista iliaca
- C) 5cm posteriorisht planit midcoronal ne nivel te crista iliaca
- D) 5cm posteriorisht planit midcoronal dhe 5 cm mbi nivel te crista iliaca

848. Per projektionin lateral me pacientin e vendosur ne pozicionin dekubitus dorsal ,cila procedure duhet te performohet per tu siguruar qe i gjithe abdomeni te perfshihet ne radiografi?

- A) Perdor jastek si suport per te ngritur pacientin
- B) Centro kaseten ne nivel te procesit ksifoid
- C) Centro kaseten ne siperfaqen anteriore te abdomenit
- D) Drejto rrezjen qendrore me rreth 5cm nen crista iliaca

849. Cila strukture duhet te ekzaminohet per te pare nese pacienti eshte rrotulluar per nje projektion lateral te abdomenit?

- A) pelvisi dhe vertebrat lumbare
- B) pelvisi dhe vertebrat torakale
- C) diafragma dhe vertebrat lumbare
- D) diafragama dhe vertebrat torakale

850. Cila procedure duhet te kryhet per nje projeksion radiografik PA pasues kur projeksioni primar PA tregoi hijen e kolecistes te superpozuar nga nje brinje?

- A) realizo ekspozimin pas nje inspirimi te plote
- B) perdor jastek radiolucent per te ngritur pacientin
- C) drejto rrezet qendrore kaudalisht me 10-15 grade
- D) Vendos pacientin ne pozicionin Trendelenburg

851. Cila procedure ndan ne menyre me efektive hijen e kolecistes nga vertebra?

- A) realizo ekspozimin pas nje inspirimi te thell
- B) rrotullo pacientin ne nje pozicion oblik
- C) vendose pacientin ne pozicionin Trendelenburg
- D) pozicionoje pacientin per nje projeksion dekubitus dorsal

852. Cili projeksion demonstron me mire stratifikimin e gureve te kolecistes?

- A) projeksioni AP me pacientin supin
- B) projeksioni PA me pacientin prone
- C) Projeksioni AP, pozicioni dekubitus lateral i djathte
- D) projeksioni PA oblik (pozicioni RAO) me pacientin recumbent

853. Cili projeksion tregon me mire kolecisten qe eshte e lokalizuar ne fossa iliaca?

- A) vendosja e pacientit ne pozicionin prone
- B) vendosja e pacientit ne pozicionin supin
- C) vendosja e pacientit ne pozicionin vertikal(ne kembe)
- D) realizo ekspozimin pas nje inspirimi te plote

854. Cili projeksion e vendos kolecisten me prane kasetes?

- A) projeksioni PA
- B) projeksioni AP
- C) projeksioni PA oblik (pozicioni LAO) me pacientin me qendrim ne kembe
- D) Projeksioni AP oblik (pozicioni LPO) me pacientin shtrire

855. Cili projektion prodhon nje zvogelim te imazhit te kolecistes?

- A) projektioni lateral i djathte
- B) projektioni PA me pacientin prone
- C) projektioni PA me pacientin ne qendrim ne kembe
- D) Projektioni PA oblik (pozicioni LAO) me pacientin me qendrim ne kembe

856. Cili nga projektionet e meposhtme nuk e rrit ndarjen midis hijes se kolecistes nga vertebra?

- A) projektioni lateral i djathte
- B) projektioni PA me pacientin prone
- C) projektioni PA oblik (pozicioni LAO) me pacientin ne qendrim ne kembe
- D) Projektioni PA oblik (pozicioni LAO) me pacientin shtrire

857. Cili eshte nje disavantazh i perdorimit te pozicionit dekubitus lateral te djathe per demostrimin e kolecistes?

- A) Pozicioni jep mundesine e ndarjes se kolecistes nga hepari
- B) Ky pozicion jep mundesine qe stomaku te siguroje nje densitet homogjenoz te sfondit
- C) Ky pozicion jep mundesine qe kolecista te drejtohet ne drejtim te anes se majte te abdomenit
- D) Ky pozicion jep mundesine qe kolecista te drejtohet ne drejtim te anes se djathte te abdomenit

858. Cili nga dy projektionet vizualizon me mire stratifikimin e gureve ne koleciste?

- A) AP supin dhe projektioni PA prone
- B) AP supin dhe projektioni PA me pacientin ne kembe
- C) Projektioni AP (dekubitus lateral i djathte) dhe projektioni prone
- D) projektioni AP (dekubitus lateral i djathte) dhe projektioni PA me pacientin ne kembe

857. Cili projektion i kolecistes mund te realizohet vetem me rrezen qendrore te drejtuar horizontalisht?

- A) Projektioni PA
- B) projektioni lateral i djathte
- C) projektioni PA oblik (pozicioni LAO)
- D) projektioni AP,pozicioni dekubitus lateral i djathte

858. Ne cilin konstrukt te trupit stomaku eshte horizontalisht dhe i vendosur lart ne abdomen?

- A) Stenik
- B) Astenik
- C) Hipostenik
- D) Hiperstenik

859. Cila kurbature eshte e lokalizuar ne kufirin e djathte te stomakut?

- A) e vogla (lesser)
- B) e madhja (major)
- C) inferior
- D) superior

860. Cila zone eshte ne pjesen me superiore te stomakut?

- A) Koka
- B) Trupi
- C) Fundus
- D) Pylori

861. Cila zone eshte ne pjesen me inferiore te stomakut?

- A) Trupi
- B) Cardias
- C) Fundus
- D) Pylori

862. Ezofagu distal ne cilen zone hedh permbajtien e tij?

- A) Duodenum
- B) Canali pilorik
- C) Bulbi duodenal

D) Antrumi Cardiak

863. Cila hapje eshte e lokalizuar midis stomakut dhe zorreve te holla?

- A) Orifici cardiac
- B) orifici pyloric
- C) Orifici ileocekal
- D) Ampula Vater

864. Cila hapje eshte ne fundin distal te zorreve te holla?

- A) Anus
- B) orifici cardiac
- C) Orifici pyloric
- D) Orifici ileiocekal

865. Cila strukture eshte pjesa proksimale e zorres se holle?

- A) Ileum
- B) Pyloris
- C) jejenum
- D) Duodenum

866. Cila strukture eshte pjesa distale e zorreve te holla?

- A) Ileum
- B) Pyloris
- C) jejenum
- D) Duodenum

867. Ne cilin regjion abdominal e ka origjinen zorra e trashe?

- A) iliaku i majte
- B) iliaku i djathte
- C) Lumbari i majte
- D) lumbari i djathte

868. Cila strukture eshte pjesa proximale e zorreve te trasha?

- A) ileumi
- B) cekumi
- C) rectumi
- D) sigmoidi

869. Cila pjese e zorreve te trasha lokalizohet midis pjeses asendente dhe desendente te tyre?

- A) cekum
- B) rektum
- C) sigmoid
- D) transvers colon

870. Cila strukture lokalizohet midis kolonit asendente dhe transverse?

- A) sigmoid
- B) flecura kolike e maje
- C) fleksura kolike e djathte
- D) kolon desendente

871. Ku lokalizohet fleksura kolike e majte ne zorret e trasha?

- A) midis cekumit dhe kolon asendente
- B) midis kolon asendente dhe kolon transvers
- C) midis kolon transvers dhe kolon desendente
- D) midis kolon desendente dhe sigmoidit

872. Cila strukture eshte pjesa xhep e zorreve te trasha nen junksionin midis ileumit dhe kolonit?

- A) cecum
- B) rectum
- C) sigmoid
- D) apendix veriformis

873. Ku lokalizohet ne zorret trashta sigma?

- A) midis cekumit dhe kolon asendente
- B) midis kolon asendente dhe kcolon transvers
- C) midis kolon transvers dhe kolon desendente
- D) midis kolon desendente dhe rektumit

874. Me perafersi sa kohe i duhet nje vakti me barium per te arritur valvulen iliocekale?

- A) 30 min ne 1 ore
- B) 2 ne 3 ore
- C) 4 ne 5 ore
- D) 24 ore

875. Me perafersi sa kohe i duhet nje vakti me barium te arrije rektumin?

- A) 2 ne 3 ore
- B) 4 ne 5 ore
- C) 6 ne 8 ore
- D) 24 ore

876. Cila nga dy modalitetet e marrjes se imazhit jane me shpesh te perdorura ne ekzaminimin e kanalit ushqyes pas nderfutjes se produktit te bariumit?

- A) Fluoroscopia dhe sonografia
- B) Fluoroscopia dhe radiografia
- C) CT dhe sonografia
- C) CT dhe radiografia

877. Cili tip i lendes se kontrastit perdoret me shpesh per ekzaminimin e traktit te siperm TGI?

- A) Nje vaj, perberje viskoze
- B) Nje suspension i sulfatit te bariumut
- C) perberje jojonike injektuese
- D) nje solucion te tretshem ne uje, solucion jodi

878. Per te treguar me mire funksionin e gellitjes,ne cilin poizion duhet te qendroje pacienti per te filluar fazen fluoroskopike me kontrast unik te ekzaminimit te ezogagut?

- A) vertikal
- B) decubitus lateral i majte
- C) LAO recumbent
- D) RPO recumbent

879. Cila nga dy pozicionet recumbent oblike mund te perdoret per te treguar me mire nje imazh pa pengesa midis vertebrave dhe zemres te nje ezofagu te mbushur me barium?

- A) oblik anterior i majte dhe oblik posterior I majte
- B) oblik anterior I majte dhe oblik posterior I djathte
- C) oblik anterior I djathte dhe oblik posterior I majte
- D) oblik anterior I djathte dhe oblik posterior I djathte

880. Cila nga pikat e meposhtme eshte nje avantazh i ekzaminimit me kontrast te dyfishte te traktit te siperm digjektiv krahas ekzaminimit me kontrast njefish te tij?

- A) Pacienti mund ta toleroje me mir eproceduren
- B) Reduktohet rrezatimi ndaj pacientit
- C) Lezione te vogla ne linjen mukozale tregohen me mire
- D) ekzaminimi mund te performohet me pacientin ne kembe sesa shtrire

881. Cili pershkrim i referohet ekzaminimit bifazik TGI?

- A) Nje studim me kontrast njefish te te gjithe kanalit alimentar
- B) Nje studim me kontrast njefish te traktit te siperm TGI?
- C) Nje studim me kontrast dyfish te traktit te siperm TGI
- D) Nje kombinim i kontrastit njefish me ate dyfish te traktit te siperm TGI?

882. Per projeksionin PA si pjese e ekzaminimit e siperm TGI perse duhet qe pulmonet e poshtme te perfshihen ne nje kasete me 35 x 43 cm?

- A) per te treguar pneumotoraxin
- B) per te treguar nje hernie hiatale te mundshme
- C) per te treguar nivelet e likidit ne toraks
- D) per te treguar bulzat e gazit ne fundusin e stomakut

883. Per ekzaminimin e TGI se sipërme me kontrast dyfish, cili projektion prodhon imazhin me te mire te bules duodenale te mbushur me gaz dhe kanalit pyloric?

- A) Projektioni oblik posterior i majte me pacientin vertikalisht (ne kembe)
- B) Projektioni oblik posterior i majte me pacientin recumbent(shtrire)
- C) Projektioni oblik anterior i djathte me pacientin vertikalisht (ne kembe)
- D) Projektioni oblik anterior i djatht me pacientin recumbent (shtrire)

884. Per ekzaminimin eTGI se sipërme me kontrast njefish me pacientin recumbent, cili projektion prodhon imazhin me te mire te nje kanali pyloric dhe bulbe duodenale te bushur me barium ne nje pacienti i cili ka nje konstrukcion te tipit stenik?

- A) projektioni AP
- B) projektioni lateral i majte
- C) projektioni LPO(oblik AP i majte)
- D) projektioni RAO (oblik PA i djathte)

885. Per ekzaminimin TGI se sipërme me pacientin shtrire ,cili projektion stimulon me mire peristaltiken gastrike per te treguar me mire kanalin pyloric dhe bulbin duodenal?

- A) projektioni AP
- B) projektioni lateral i majte
- C) projektioni AP oblik i majte (LPO)
- D) projektioni PA oblik i djathte (RAO)

886. Cila procedure e frymemarrjes duhet te performohet nga pacienti kur realizohen radiografite e TGI se sipërme?

- A) e ngadalte,frymemarrje e thelle
- B) e shpejte, frymemarrje ngulcuese
- C) ekspiracion i nderprere
- D) inspiracion i nderprere

887. Per ekzaminimin me kontrast te dyfishte, ekzaminimi I TGI se sipërme per pacientin shtrire,cila procedure projektioni tregon me mire fundusin e mbushur me gaz?

- A) projektioni lateral i majte

- B) projekzioni AP, pozicioni decubitus lateral i majte
- C) projekzioni AP oblik i majte (LPO)
- D) projekzioni PA oblik i djathte (RAO)

888. Per ekzaminimin UGI me pacientin shtrire, cili projekcion tregon me mire hapsiren e djathte retrogastrike?

- A) projeksin lateral i djathte
- B) projekzioni AP, pozicioni decubitus lateral i majte
- C) projekzioni AP oblik i majte (LPO)
- D) projekzioni PA oblik i djathte (RAO)

889. Per projeksin AP me pacientin supin (si pjese e ekzaminimit te TGI se siperme) cila procedure duhet te kryhet per te treguar me mire hernimin diafragmatik (hernia hiatale)?

- A) Kendimi i rrezes qendrore 30 ne 35 grade caudalisht
- B) Vendose pacientin dhe shtratin ne nje pozicion te plote Trendelenburg
- C) Instrukto pacientin te nderprese frymemarrjen pas nje inspirimi te plote
- D) Vendos jastek radiotrasperant nen torax per te ngritur shpatullat

890. Ne cilin nivel te pacientit duhet te drejtohet rrezja qendrore per projeksin oblik anterior te djathte si pjese te ekzaminimit TGI te siperme?

- A) T9- T10
- B) T11- T12
- C) L1- L2
- D) L3- L4

891. Cili ekzaminim i kanalit ushqyes kerkon qe nje seri radiografish te behen ne intervale specifike te kohes pas injektimit te kontrastit?

- A) Seria e TGI se siperme
- B) Klizma e bariumit
- C) Ezofagografia

D) Seria e zorreve te vogla

892. Per nje seri te zorreve te holla te nje pacienti me hypomodalitet te zorreve te holla, cila procedure duhet te performohet per te pershejtuat peristaltikes?

- A) rrotullo pacientin me 360 grade
- B) instrukto pacientin te pije nje gote me uje te ftohte
- C) instrukto pacientin te performoje manovren e Valsaves
- D) Vendose pacientin ne nje pozicion te plote Trendelenburg

893. Cila strukture, kur vizualizohet ne radiografi si pjese e nje serie te zorreve te holla, zakonisht indikon ne kompletimin e ekzaminimit?

- A) ileum
- B) cekum
- C) jejenim
- D) duodenum

894. Cila eshte sekuenca e duhur per te mbushur me barium zorret e trasha gjate performimit te irigografise

- A) rectum, sigmoid, kolon asendente, kolon transvers, dhe kolon desendente
- B) rectum sigmoid, kolon desendente, kolon transvers dhe kolon asendente
- C) sigmoid, rectum, kolon asendente, kolon transverse dhe kolon desendente
- D) sigmoid, rectum, kolon desendente, kolon transvers dhe kolon asendente

895. Cila procedure duhet te perdoret gjate irigografise per te relaksuar zorret e trasha dhe ti mundesoje pacientit per te mbajtur me mire suspensionin e sulfatit te bariumit?

- A) instrukto pacie4ntin te performoje manovren Valsava
- B) te rritet sasia e bariumit 24 inch siper rectumit
- C) administro suspension te sulfatit te bariumit te ftohte
- D) administro suspension te sulfat te bariumi te ngrohte

896. Perpara se nje klizme te futet gjate irigografise,perse duhet qe nje sasi e vogel e sulfatit te bariumit e miksuar te lejohet qe te derdhet ne nje ene boshe?

- A) per te lubrifikuat klizmen
- B) per te hequr ajrin nga tubi
- C) per te vendosur nese mikstura eshte shume e ngrohte apo shume e ftohte
- D) per te siguruar qe perberja e mikstures eshte e pershtatshme

897. Cila procedure duhet te perfundohet kur nderfutet maja e klizmes per irigografi

- A) Lubrifiko majen me xhelatine vajguri
- B) vendose pacientin ne pozicionin Trendelenburg
- C) insuflo mbajtjen e majes ajer-mbushese perpara inserimit
- D) sigurohu qe maja te inserohet jo me shume se 8.9 - 10cm

898. Per projektionin PA gjate irigografise, cili eshte avantazhi i vendosjes se tavolines se rrezeve-X dhe te pacientit ne nje pozicion te lehte Trendelenburg?

- A) per te treguar valvulen iliocekale
- B) per te mundesuar qe me shume ajer te injektohet ne colon
- C) per te ndihmuar n ndarjen e mbivendosjes se palave distale te zorreve te holla
- D) per te levizur colon transvers me lart ne abdomen

899. Cila strukture e zorreve te medha jane ne interesin primare te projektionin AP axial ose PA axial gjate irigografise?

- A) sigmoidi dhe rektumi
- B) cekumi dhe valvula iliocekale
- C) flexura kolike e majte dhe e djathe
- D) kolona asendente dhe desendente

890. Me sa grade dhe ne cilin drejtim duhet qe rrezja qendrore te drejtohet per projektionin PA axial gjate irigografise?

- A) 20 ne 25 grade caudal
- B) 20 ne 25 grade cefalik
- C) 30 ne 40 grade caudal
- D) 30 ne 40 grade cefalik

891. Cila strukture e zorreve te trasha eshte e interesit primare per projektionin PA oblik te djathe (pozicioni RAO) gjate ekzaminimit te irigografise

- A) kanali anal
- B) fleksura kolike majte
- C) fleksura kolike e djathte
- D) kolon desendente

892. Cila nga dy projektionet oblike mund te performohet per te treguar me mire fleksuren kolike te majte gjate irigografise?

- A) projektioni PA oblik i majte (pozicioni LAO) dhe projektioni AP oblik i majte (pozicioni LPO)
- B) Projektioni PA oblik i majte (pozicioni LAO) dhe projektioni AP oblik i djathte (pozicioni RPO)
- C) projektioni PA oblik i djathte (pozicioni RAO) dhe projektioni AP oblik i majte (pozicioni LPO)
- D) projektioni PA oblik i djathte (pozicioni RAO) dhe projektioni AP oblik i djathte (pozicioni RPO)

893. Cila strukture e zorres se trashe tregohet me mire nese pacienti rrotullohet me 45 grade nga nje pozicion supin per te larguar anen e djathte te abdomenit nga tavolina e rrezeve-X gjate irigografise?

- A) ileum
- B) cekum
- C) fleksura kolike e majte
- D) fleksura kolike e djathte

894. Per pozicionin decubitus lateral te djathte si pjese e nje irigografie, cili projektion duhet te behet per te siguruar qe kolon asendente tregohet ne imazh?

- A) centro kaseten ne cresten iliace
- B) ngri pacientin me nje suport radiotrasparent
- C) vendos pacientin dhe tavolinen ne nje pozicion te plote Trendelenburg
- D) Realizo ekspozimin pas nderprerjes se frymemarrjes nga ana e pacientit

895. Cili projektion i irigografise kerkon nje kasete 24 x 30 cm qe te vendoset per se gjeri dhe te centrohet ne nivel antero-superior te spina iliaka anterior superior

- A) projektioni AP
- B) projektioni lateral
- C) projektioni AP,pozicioni decubitus lateral i majte
- D) projektioni AP oblik i majte(pozicioni LPO)

896. Cili projektion ne irigografi nuk kerkon qe fleksura kolike te perfshihet ne imazh?

- A) projektioni AP
- B) projektioni lateral
- C) projektioni AP,pozicioni decubitus lateral i majte
- D) projektioni PA i djathte (pozicioni RAO)

897. Cila strukture renale filtron gjakun?

- A) glomeruli
- B) kalicet majore
- C) arteriolat eferente
- D) arteriolat aferente

898. Cili dukt ekskretor urinar e con urinen nga fshikeza jashte trupit?

- A) ureteri
- B) uretra
- C) arteriola eferente
- D) arteriola aferente

899. Cili organ i trupit filtron gjakun dhe prodhon urinen si nje produkt i nje materiali te humbur?

- A) hepar
- B) lien
- C) ren
- D) pankreas

900. Ne cilin nivel vertebral gjendet zakonisht kufiri superior i reneve?

- A) T10
- B) T12
- C) L2
- D) L4

901. Si eshte emri i apertures ne kufirin medial te reneve?

- A) hilium
- B) baza
- C) apexi
- D) pole

902. Cila nga pikat e meposhtme eshte nje ekzaminim ekskretor i perdorur per te treguar traktin e siperm urniar?

- A) cistouretrografia
- B) urografia retrograde
- C) urografia intravenoze
- D) cistografia retrograde

903. Cili ekzaminim ka aftesine te prodhoje nje imazh radiografik qe tregon indin renal kortikal te veshur mire nga lenda e kontrastit?

- A) cistouretrografia
- B) urografia retrograde
- C) urografia intravenoze
- D) cistografia retrograde

904. Cili projektion tregon me se miri levizshmerine e reneve?

- A) projektioni AP me pacientin supin
- B) projektioni AP me pacientin vertikal
- C) projektioni lateral me pacientin rekumbent lateral
- D) projektioni lateral me pacientin supin (pozicioni dorsal decubitus)

905. Ne urografine intravenoze ,cili eshte qellimi i aplikimit te kompresionit mbi fundin distal te te dy uretereve?

- A) per te treguar refluksin uretral
- B) per te treguar mobilitetin e reneve
- C) per te vonuar rreshqitjen e opacitetit te urines brenda fshikzes
- D) per te vonuar rreshqitjen e opacitetit te urines nga fshikza

906. Cila nga pikat e meposhtme nuk eshte nje arsye per te perftuar nje shkrepje radiografike me pacientin rekumbent per urografine ekskretore?

- A) per te rritur faktoret ekspozues
- B) per te treguar calukulat urinare
- C) per te stabiluar lokalizimin e veshkave
- D) per te treguar mobilitetin e veshkave

907. Per urografine ekskretore,cfare duhet te beje nje pacient adult perpara se te shkoje ne tavolinen e ekzaminimit?

- A) boshatisjen e fshikzes
- B) heqja e bizhuterive
- C) te pije 12 gota ujesh pernjeheresh
- D) te pije 12 gota uje me gaz

908. Cili eshte qellimi i perftimit te nje radiografie me projekcion AP te reneve 30 sekonda pas injektimit te bolusit te lendes se kontrastit ne urografine ekskretore?

- A) per te treguar refluksin ureteral
- B) per te treguar kortexin renal te opacifikuar
- C) per te treguar arterien renale te opacifikuar
- D) per te treguar mobilitetin e reneve

909. Cili eshte qellimi i vendosjes se pacientit ne 15-20 grade ne tavolinen radiografike dhe pozicionin Trendelenburg per projekcionin AP gjate urografise ekskretore?

- A) per te treguar ureteret distal
- B) per te treguar corteksin renal te opacifikuar
- C) per te treguar bazen e fshikzes
- D) per te treguar mobilitetin e reneve

910. Me sa grade duhet te rrotullohet pacientin per projeksionin oblik posterior (AP) gjate urografise ekskretore?

- A) 15
- B) 30
- C) 45
- D) 60

911. Per urografine intravenoze te nje femije, cfare duhet ti jepet pacientit kur radiografia direkte tregon nje sasi ekskretore te gazit intestinal qe i mbivendoset reneve?

- A) nje laksativ
- B) nje klizme pastruese
- C) uje te ftohte
- D) karbonat

912. Cili ekzaminim kerkon qe pacienti te vendoset ne tavolinen speciale radiografike per ekzaminimin urografik?

- A) cistouretrografia
- B) urografia retrograde
- C) urografia intravenoze
- D) cystografia retrograde

913. Cilat struktura renale nuk tregohen gjate ekzaminimit te urografise retrograde?

- A) ureteret
- B) nefronet
- C) kalicet e vogla
- D) kalicet e medha

914. Ne lidhje me projeksionin AP, cili projeksion preferohet te perfshihet me shume ne radiografi per urografine retrograde?

- A) projekzioni PA
- B) projekzioni PA oblik
- C) projekzioni AP oblik
- D) projekzioni AP, pozicioni dekubitus lateral

915. Cili eshte qellimi i vendosjes se tavolines 10-15 grade Trendelenburg per urografine retrograde?

- A) per te treguar ureteret
- B) per te treguar levizshmerine e reneve
- C) per te prodhuar nje efekt nefrograme te reneve
- D) per te ndaluar lenden e kontrastit te dale nga renet

916. Cili eshte qellimi i ngritjes se kokes se tavolines me 35-40 grade per urografine retrograde?

- A) per te treguar ureteret
- B) per te treguar levizshmerine e reneve
- C) per te prodhuar nje efekt nefrograme te reneve
- D) per te ndaluar lenden e kontrastit te dale nga renet

917. Cila gjendje do te tregohet me mire gjate cistografise?

- A) cisti renal
- B) kalkuli renal
- C) refluksi ureteral
- D) hidronefrosis

918. Per projekzionin AP axial te fshikezes, me sa grade dhe ne cfare drejtimi duhet te drejtohet rrezja qendrore?

- A) 15 grade kaudal
- B) 15 grade cefalik
- C) 25 grade kaudal
- D) 25 grade cefalik

919. Per cistografine retrograde, cili projektion duhet te performohet per te treguar murin anterior dhe posterior te fshikzes?

- A) projektioni AP vertikal
- B) projektioni AP rekumbent
- C) projektioni lateral direkt
- D) projektioni AP, pozicioni dekubitus lateral

920. Per cistouretrografine per nje pacient mashkull adult, ne cfare niveli tek pacienti duhet te centrohet kasete?

- A) vertebra T12
- B) vertebra L3
- C) vertebra L5
- D) simfiza pubike

921. Per cistouretrografine per nje pacient mashkull adult, cila nga pikat e meposhtme duhet te perdoret per te perftuar nje radiografi kur pacienti eshte duke urinuar?

- A) projektioni PA rekumbent
- B) projektioni dekubitus dorsal
- C) projektioni dekubitus lateral
- D) projektioni rekumbent AP oblik

922. Cilat struktura jane pjese e sistemit reprodaktiv femeror?

- A) ovaret, uretra, dhe tubat fallopian
- B) ovaret, testet, dhe duktuset deferente
- C) epididimus, uterus, dhe tubi fallopian
- D) epididimus, testet, dhe duktusi deferent

923. Cila pjese e ureteres eshte me superiorisht?

- A) trupi
- B) cerviksi
- C) fundusi
- D) istmus

924. Cila strukture transporton qelizat femerore reproduktive nga nje gonade ne uterus?

- A) uretra
- B) tubi uterine
- C) duktusi deferent
- D) duktusi ejakulator

925. Cila strukture prodhon qeliza riprodhuese femerore?

- A) ovaret
- B) uterus
- C) tesikul
- D) epididimus

926. Cila strukture prodhon spermatozoma?

- A) ovare
- B) testikuli
- C) prostata
- D) epididimus

927. Cila strukture transporton qelizat riprodhuese mashkullore nga nje gonade ne ureter?

- A) tubi uterin
- B) tubi fallopian
- C) duktusi deferent
- D) duktusi ejakulator

928. Cila strukture eshte e ngjitur ne cdo gonad mashkullor?

- A) uretra
- B) prostata
- C) epididimusi
- D) duktusi ejakulator

929. Cili ekzaminim mund te performohet ne nje paciente shtatzene?

- A) fetografia
- B) prostatografia
- C) pneumografia pelvike
- D) histerosalpinografia

930. Cili ekzaminim mund te performohet ne nje paciente joshtatzene?

- A) fetografia
- B) pelvimetri
- C) placentografia
- D) Histerosalpingografia

931. Cili ekzaminim nderfut nje lende kontrasti permes nje kanjule uterine?

- A) fetografia
- B) pelvimetri
- C) palncetografia
- D) Histerosalpingografia

932. Cili ekzaminim percakton diametrat pelvik?

- A) fetografia
- B) pelvimetri
- C) palncetografia
- D) Histerosalpingografia

933. Cili ekzaminim percakton funksionimin e tubave uterine?

- A) fetografia
- B) pelvimetri
- C) palncetografia
- D) Histerosalpingografia

934. Cili tip i lendes se kontrastit preferohet per Histerosalpingografia?

- A) vaji viskoz
- B) i tretshem ne uje
- C) sulfat bariumi

935. Kur duhet te performohet nje ekzaminim histerosalpinografik?

- A) pas trimestrit te pare
- B) gjate trimestrit te pare
- C) 10 dite pas fillimit te menstruacioneve
- D) 10 dite perpara fillimit te menstruacioneve

936. Cili projekcion preferohet per prostatografine?

- A) AP axial
- B) PA axial
- C) lateral
- D) AP oblik (pozicioni RPO)

937. Cila pike orientuese pozicioni ndodhet ne bazen e spines nazale?

- A) Nasion
- B) Canthus
- C) glabela
- D) acantioni

938. Cili projektion eshte nje ngritje e lehte qe lokalizohet midis harqeve syoerciliare?

- A) Nasion
- B) Canthus
- C) glabela
- D) acantioni

939. Cila pike orientuese pozicioni ndodhet ne piken me superiore te kockave nasale?

- A) Nasion
- B) Canthus
- C) glabela
- D) acantioni

940. Cila pike orientuese pozicioni ndodhet me superiorisht?

- A) Nasion
- B) Gonion
- C) glabela
- D) acantioni

941. Ne cilin regjion te kafkes lokalizohet gonion?

- A) Midis orbitave
- B) ne pjesen anteriore te kockes frontale
- C) ne pjesen posteriore te kockes oksipitale
- D) ne pjesen lateroposteriore te mandibules

942. Ne cilin rajon te kafkes lokalizohet canthus-i i jashtem?

- A) midis orbitave
- B) ne kendin mandibular
- C) pergjate cdo eminence parietale
- D) ne kufirin lateral te cdo orbite

943. Cila pike orientuese pozicioni ndodhet ne segmentin anterior te mandibules?

- A) Nasion
- B) Gonion

- C) Acantion
- D) Mentus

944. Cila suture artikulon kocken frontale me te dy kockat parietale?

- A) Sagitale
- B) Koronale
- C) Skuamoza
- D) lamdoidea

945. Cila suture bashkon te dy kockat parietale ne nivel te verteksit te kafkes?

- A) sagitale
- B) coronale
- C) skuamozale
- D) lamdoidea

946. Cila suture bashkon kocken parietale bashke me kocken sfenoidale dhe temporale?

- A) sagitale
- B) coronale
- C) skuamozale
- D) lambdoidea

947. Cila suture bashkon kockat pariatele me kocken oksipitale?

- A) sagitale
- B) coronale
- C) sakumozale
- D) lamdoidea

948. Fontanela lokalizohet ne junksionin e ciles prej dy suturave?

- A) coronale dhe sagitale
- B) coronale dhe skuamozale
- C) lambdoidea dhe sagitale

D) lambdoidea dhe skuamozale

949. Lambda frontale lokalizohet ne junksionin e ciles prej dy suturave?

- A) coronale dhe sagitale
- B) coronale dhe skuamozale
- C) lamdboidea dhe sagitale
- D) lambdoidea dhe skaumozale

950 . Fontanela frontale lokalizohet ne junksionin e ciles prej kockave kraniale?

- A) frontal dhe te dy parietalet
- B) oksipitale dhe te dy parietalet
- C) frontale dhe sfenoidale
- D) oksipitale dhe sfenoidale

951. Fontanela lambda lokalizohet ne junksionin e ciles prej kockave kraniale?

- A) frontal dhe te dy parietalet
- B) oksipitale dhe te dy parietalet
- C) frontale dhe sfenoidale
- D) oksipitale dhe sfenoidale

952. Ne cilen prej kockave kranile lokalizohen harqet superciliare?

- A) frontale
- B) parietale
- C) etmoide
- D) oksipitale

953. Ne cilen prej kockave kraniale lokalizohet pllaka cibriforme?

- A) frontale
- B) etmoidale
- C) temporale
- D) sfenoidale

954. Ne cilen prej kockave kraniale lokalizohet crista galli?

- A) etmoidale
- B) oksipitale
- C) temporale
- D) sfenoidale

955. Cila prej kockave kraniale ka nje piramide petroze?

- A) parietale
- B) etmoidale
- C) temporale
- D) sfenoidale

956. Ne cilen prej kockave kraniale lokalizohet sella turcika?

- A) frontale
- B) etmoidale
- C) temporale
- D) sfenoidale

957. Cila prej kockave kraniale ka nje proces mastoid?

- A) parietale
- B) etmoidale
- C) temporale
- D) sfenoidale

958. Ne cilen prej kockave kraniale lokalizohet pllaka perpendikulare?

- A) parietale
- B) etmoidale
- C) temporale
- D) sfenoidale

959. Cila prej kockave kraniale ka si krahet e vogla dhe ato te medha?

- A) etmoidi

- B) oksipitale
- C) temporale
- D) sfenoidale

960. Me cilen prej kockave kraniale artikulon vertebra e pare cervikale?

- A) etmoidin
- B) oksipitalen
- C) temporalen
- D) sfenoidalen

961. Inferiorisht ciles prej kockave kraniale projektohet procesi pterigoid?

- A) frontale
- B) etmoidale
- C) temporale
- D) sfenoidale

962. Pjese e ciles prej kockave kraniale eshte foramen magnum?

- A) frontale
- B) oksipitale
- C) temporale
- D) sfenoidale

963. Pjese e ciles prej kockave kraniale eshte procesi zygomatik?

- A) frontale
- B) parietale
- C) temporale
- D) sfenoidale

964. Pjese e ciles prej kockave kraniale eshte Meatus akustikus ekstern ?

- A) frontale
- B) parietale
- C) temporale

D) sfenoidale

965. Posteriorisht ciles nga kockat kraniale projektohet procesi temporal ?

- A) vomer
- B) maxilla
- C) zygoma
- D) temporal

966. Cila kocke perfshin kockat e hundes?

- A) nasal
- B) lacrimal
- C) palatin
- D) maxilla

967. Me cilen prej kockat e poshterenditura artikulon mandibula?

- A) hioid
- B) maxilla
- C) zygoma
- D) temporal

968. Ku lokalizohen kockat lakrimale?

- A) brenda kavitetit nasal
- B) ne murin lateral te cdo orbite
- C) ne murin medial te cdo orbite
- D) inferiorisht sinuseve maksilare

969. Ku mund ta gjejme os vomer?

- A) posteriorisht kockes nazale

- B) ne dyshemene e kavitetit nazal
- C) ne murin lateral te orbitave
- D) ne anen posteriore te tavanit te gojes

970. Cila prej kockave perfshin pjesen me te madhe te murit lateral te kaviteteve orbitale?

- A) maxila
- B) lakrimal
- C) palatine
- D) zygomatike

971. Cili term i referohet procesit anterior te ramus mandibule?

- A) brinja
- B) condile
- C) corakoid
- D) coronoid

972. Cili term i referohet procesit posterior te ramus mandibule?

- A) brinja
- B) condile
- C) corakoid
- D) coronoid

973. Cila prej kockave faciale ka procese alveolare ?

- A) vomer dhe mandibula
- B) vomer dhe zigmoatik
- C) maxila dhe mandibula
- D) maxila dhe zygomatik

974. Cila prej kockave formon 1/4 e tavanit te gojes?

- A) maxila
- B) palatin
- C) zygomatik
- D) konka nazale inferiore

975. Cila prej strukturave lokalizohet ne maxile?

- A) nasion
- B) hunda
- C) akantion
- D) pika mentale

976. Cila prej dy linjave apo pllakave te pozicionimit duhet te jete perpendikulare me kaseten per projektionin PA te kafkes?

- A) linja orbitomeatale dhe plani midsagital
- B) linja orbitomeatale dhe linja intrerpupilare
- C) linja infraorbitomeatale dhe plani midsagital
- D) linja infraorbitomeatale dhe linja interpupilare

977. Duke iu referuar pacientit, ku duhet te centrohet kasete per projektionin PA te kafkes?

- A) nasion
- B) glabella
- C) acantion
- D) pika mentale

978. Duke iu referuar pacientit, ku duhet te centrohet kasete per prjektionin lateral te kafkes?

- A) nasion
- B) meatus akustikus external
- C) 5cm mbi meatus akustikus eksternal
- D) 5cm nen meatus akustikus eksternal

979. Duke iu referuar kasetes, si duhet te pozicionohet linja interpupilare dhe plani midsagital per projektionin lateral te kafkes?

- A) linja interpupilare: paralele; plani midsagital: paralel

- B) linja interpupulare: paralel; plani midsagital: perpendikular
- C) linja interpupulare : perpendikulare ; plani midsagital : paralel
- D) linja interpupulare : perpendikulare ; plani midsagital : perpendikulare

980. Per projeksionin AP axial, metoda Towne e kafkes, me sa grade dhe ne cfare drejtimi duhet te centrohesh rrezja qendrore kur linja orbitomeatale eshte perpendikulare me kaseten?

- A) 30 grade kaudal
- B) 30 grade cefalik
- C) 37 grade kaudal
- D) 37 grade cefalik

981. Cila linje pozicioni duhet te jete paralel me kaseten per projeksionin Submentovertikal te kafkes?

- A) linja orbitomeatale
- B) linja glabellomeatale
- C) linja acantiomeatale
- D) linja infraorbitomeatale

982. Cili projeksion i kafkes mund te performohet korrektesisht me rreze qendrore me kend 37 grade?

- A) Ap axial, metoda Towne
- B) PA axial, metoda Haas
- C) PA axial, metoda Caldwell
- D) oblik perpendikular, metoda Rhese

983. Cili projeksion i kafkes mund te performohet korrektesisht me rrezen qendrore me kend 15 grade?

- A) submentovertikal
- B) Ap axial, metoda Towne
- C) PA axial, metoda Haas
- D) PA axial, metoda Caldwell

984. Cili projektion i kafkes prodhon nje imazh me paraqitje te plote te baze se kraniumit

- A) lateral
- B) PA axial,metoda towne
- C) PA me rreze qendrore perpendikulare
- D) Submentovertikal, metoda Schuller

985. Cili projektion i kafkes projekton kocken petroze ne nje te treten e poshte te orbitave?

- A) Ap axial, metoda Towne
- B) PA axial, metoda Haas
- C) PA axial, metoda Caldwell
- D) Pa me perpendikulare

986. Cili projektion i kafkes duhet te perfitohet kur kocka frontale eshte ne interes te pare?

- A) PA axial, metoda Haas
- A) Ap axial, metoda Towne
- C) PA axial, metoda Caldwell
- D) Pa me rreze qendrore perpendikulare

987. Cili kriter vleresues i perket projektionit AP axial ,metoda Towne i kafkes?

- A) tavani i orbitave duhet te jete i superozuar
- B) protuberanca mentale duhet ti mbivendoset kockes anteriore frontale
- C) pjesa e sella turcika duhet te shihet brenda ne formanen magnium
- D) distanca nga kufiri lateral i kafkes ne kufirin lateral te orbites duhet te jete i njejte ne te dy anet

988. Cili nga kriteret vleresuese i perket projektionit PA te kafkes?

- A) tavani i orbitave duhet te jete i superozuar
- B) protuberanca mentale duhet ti mbivendoset kockes anteriore frontale
- C) pjesa e sella turcika duhet te shihet brenda ne formanen magnium
- D) distanca nga kufiri lateral i kafkes ne kufirin lateral te orbites duhet te jete i njejte ne te dy anet

989. Cili kriter vleresues i perket projektionit lateral te kafkes?

- A) tavani i orbitave duhet te jete i superpozuar

- B) protuberanca mentale duhet ti mbivendoset kockes anteriore frontale
- C) pjesa e sella turcika duhet te shihet brenda ne formanen magnium
- D) distanca nga kufiri lateral i kafkes ne kufirin lateral te orbites duhet te jete i njejte ne te dy anet

990. Cili kriter vleresues i perket projekSIONIT Submentovertikal te kafkes?

- A) tavani i orbitave duhet te jete i superozuar
- B) protuberanca mentale duhet ti mbivendoset kockes anteriore frontale
- C) pjesa e sella turcika duhet te shihet brenda ne formanen magnium
- D) distanca nga kufiri lateral i kafkes ne kufirin lateral te orbites duhet te jete i njejte ne te dy anet

991. Per projekSIONIN PA axial ,metoda Haas e kafkes, ku duhet te hyje rrezja qendrore ne koken e pacientit?

- A) nasion
- B) acantion
- C) 3.8cm mbi protuberances oksipitale eksternale
- D) 3.8cm nen protuberances oksipitale eksternale

992. Me sa grade dhe ne cilin drejtim duhet te drejtohet rrezja qendrore per projekSIONIN PA axial ,metoda Haas e kafkes?

- A) 15 grade kaudad
- B) 15 grade cefalik
- C) 25 grade kaudad
- D) 25 grade cefalik

993. Per projekSIONIN oblik parietoorbital ,metoda Rhese e kafkes, cila linje e pozicionit duhet te jete perpendikulare me kaseten?

- A) orbitomeatale
- B) glabellomeatale
- C) acantiomeatale
- D) infraorbitomeatale

994. Duke iu referuar orbitave, ku duhet te meret imazhi i formanenit optik ne radiografi per te indikuar pozicionimin korrekt te pacientin per projeksionin oblik parietoorbital,metoda Rhese e kafkes?

- A) brenda kuadrantit te brendshem te poshtem
- B) brenda kuadrantit te jashtem te poshtem
- C) brenda kuadrantit te brendshem te siperm
- D) brenda kuadrantit te jashtem te siperm

995. Per prjekSIONIN oblik parietoorbital, metoda Rhese e kafkes, sa grade duhet te formohet midis palnit midsagital dhe kasetes?

- A) 25 grade
- B) 37 grade
- C) 53 grade
- D) 55 grade

996. Duke iu referuar kasetes, si duhet te pozicionohet linja interpupilare dhe plani midsagital per projeksionin lateral per te treguar sella trucika?

- A) linja interpupilare: paralele; plani midsagital: paralel
- B) linja interpupilare: paralel; plani midsagital: perpendikular
- C) linja interpupilare : perpendikulare ; plani midsagital : paralel
- D) linja interpupilare : perpendikulare ; plani midsagital : perpendikulare

997. Per projeksionin lateral per te treguar sella turciken, ku duhet te drejtohet rrezja qendrore?

- A) 1.9 cm anterior dhe 1.9 cm inferiorisht meatus akustikus ekstern
- B) 1.9 cm anterior dhe 1.9 cm superiorisht meatus akustikus ekstern
- C) 1.9 cm posterior dhe 1.9 cm inferiorisht meatus akustikus ekstern
- D) 1.9 cm posterior dhe 1.9 cm superiorisht meatus akustikus ekstern

998. Duke iu referuar pacienti,ku dhe ne cfare drejtimi duhet te kete rrezja qendrore per projektionin lateral te kockave faciale?

- A) Zygoma
- B) Kocka nazale
- C) Cantusi i jashtem
- D) 1.9cm anterior dhe 1.9cm superior meatusit akustik ekstern

999. Duke iu referuar kasetes, si duhet te drejtohet rrezja qendrore per projektionin parietocantial,metoda Waters?

- A) perpendikular
- B) 15 grade kaudad
- C) 23 grade kaudad
- D) 37 grade kaudad

1000. Ku duhet te shihet ne imazh crista petroze ne projektionin parietocantial te kockave faciale?

- A) superiorisht ndaj orbitave
- B) ne 1/3 e poshtme te orbitave
- C) permes sinuseve maxilare
- D) poshte sinuseve maxilare

1001. Cila linje pozicioni dhe cili kend indikon pozicionin e sakte te kokes per projektionin parietocantial ,metoda Waters?

- A) linja orbitomeatale: 37 grade me kaseten
- B) linja orbitomeatale: perpendikulare me kaseten
- C) linja infraorbitomeatale: 37 grade me kaseten
- D) linja infraorbitomeatale: perpendikulare me kaseten

1002. Cili kriter vleresues i perket projektionit parietoacantial ,metoda Waters?

- A) dyshemeja orbitale duhet te jete e superpozuar
- B) crista petroze duhet te jete e projektuar brenda orbitave
- C) harqet zygomatike duhet te jene te lira nga mbivendosja e strukturave
- D) crista petroze duhet t jete projektuar menjehere nen sinuset maxilare

1004. Cili kriter vleresues i perket projekSIONIT parietocantial,metoda Waters?

- A) dyshemeja orbitale duhet te jete e superpozuar
- B) crista petroze duhet te jete e projektuar brenda orbitave
- C) harqet zygomatike duhet te jene te lira nga mbivendosja e strukturave
- D) distanca midis kufijve lateral te kafkes dhe orbitave duhet te jete e njejte ne te dy anet

1005. Cili kriter vleresues i perket projekSIONIT lateral te kockave faciale?

- A) dyshemeja orbitale duhet te jete e superpozuar
- B) crista petroze duhet te jete e projektuar brenda orbitave
- C) harqet zygomatike duhet te jene te lira nga mbivendosja e strukturave
- D) crista petroze duhet te jete projektuar menjehere nen sinuset maxilare

1006. Cili kriter vleresues i perket projekSIONIT Submentovertical per harqet bilaterale zygomatike ?

- A) dyshemeja orbitale duhet te jete e superpozuar
- B) harqet zygomatike duhet te jene te superimpozuara
- B) crista petroze duhet te jete e projektuar brenda orbitave
- C) harqet zygomatike nuk duhet te jene te mbuluara nga strukturat e tjera

1007. Duke iu referuar kasetes, si duhet te rregullohet plani midsagital per projekSIONIN tangencial duk treguar cdo hark zygomatik ne menyre individuale?

- A) paralel me kaseten
- B) 15 grade nga perpendikularja
- C) 37 grade per kaseten
- D) 53 grade per kaseten

1008. Per te treguar trupin e mandibules,me projekSIONIN axiolateral oblik ,si duhet te pozicionohet koka e pacientit?

- A) Te mbaje koken ne pozicionin e vertete lateral
- B) Nga laterali i vertete ,rrotullo koken me 15 grade ne drejtim te kasetes

- C) Nga laterali i vertete ,rrotullo koken me 30 grade ne drejtim te kasetes
- D) Nga laterali i vertete ,rrotullo koken me 45 grade ne drejtim te kasetes

1009. Me sa grade dhe ne cilin drejtim duhet te drejtohet rrezja qendrore per projektionin axiolateral oblik te mandibules?

- A) 15 grade kaudad
- B) 15 grade cefalik
- C) 25 grade kaudad
- D) 25 grade cefalik

1010. Cili projektion performohet me koken e pacientit te pozicionuar ne pozicionin e vertete lateral dhe me rreze qendrore te drejtuar 25 grade cefalik?

- A) projektioni axiolateral oblik i artikulationit temporomandibular
- B) projektioni axiolateral oblik i mandibules
- C) projektioni parietocantial i kockave faciale
- D) projektioni tangencial i harqeve bilaterale zygomatike

1011. Cili kriter vleresues i perket projektionit axiolateral oblik te mandibules?

- A) rami mandibule duhet te jete i superimpozuar
- B) ana e kundert e mandibules nuk duhet te jete e mbivendosur nga ramus mandibul
- C) condilet mandibulare duhet te jete anteriorisht cristes petroze
- D) protuberanca mentale duhet te jete e superimpozuar anteriorisht nga kocka frontale

1012. Cila nga strukturat e meposhtme mund te tregohet mire ne nje projektion axiolateral oblik?

- A) kockat faciale
- B) harqet zygomatik
- C) sinuset maxilare
- D) artikulationi temporomandibular

1013. Me sa grade dhe ne cilin drejtim duhet te drejtohet rrezja qendrore ne projektionin axiolateral oblik te artikulationit temporomandibular?

- A) 15 grade kaudad
- B) 15 grade cefalik
- C) 25 grade kaudad
- D) 25 grade cefalik

1014. Per projektionin AP axial te artikulationit temporomandibular, ku duhet te drejtohet rrezja qendrore?

- A) nasion
- B) glabela
- C) axantion
- D) 7.6cm mbi nasion

1015. Duke iu referuar pacientit,ku duhet te centrohet kasete per projektionin axiolateral oblik te artikulationit temporomandibular?

- A) ne glabele
- B) 1.2cm anteriorisht meatusit akustik ekstern
- C) 2.5cm posterior meatusit akustik ekstern
- D) 5cm mbi meatusit akustik ekstern

1016. Cila strukture duhet te radiografohet duke e patur pacientin gjithnje ne pozicionin vertikal?

- A) orbitat
- B) mastoidet
- C) harqet zygomatike
- D) sinuset paranazale

1017. Cila nga te poshtepemenduar eshte projektioni i vetem per sinuset paranazale qe tregon ne menyre te plote te katert grupet e sinuseve?

- A) lateral

- B) sybmentovertikal
- C) PA axial ,metoda Caldwell
- D) parietoacantial ,metoda Waters

1018. Duke iu referuar cantusit te jashtem,ku duhet te drejtohet rrezja qendrore per projeksionin lateral te sinusit?

- A) inferior
- B) superior
- C) anterior
- D) posterior

1019. Cili grup i sinuseve eshte i rendesise se pare ne projeksionin lateral te sinuseve?

- A) frontal
- B) maxilar
- C) etmoidal
- D) sfenoidal

1020. Cili grup i sinuseve tregohet me mire ne projeksionin PA axial,metoda Caldwell?

- A) frontali dhe sfenoidali
- B) frontali dhe etmoidali anterior
- C) maxilari dhe sfenoidali
- D) maxilari dhe etmoidali anterior

1021. Per projeksionin PA ,metoda Caldwell i sinuseve, cila linje pozicioni ne lidhje me planin midsagital ,duhet te jete perpendikulare me kaseten?

- A) orbitomatal
- B) interpupilar
- C) glabelomeatal
- D) infraorbitomeatal

1022. Ku duhet te shihet crista petroze ne imazhin e perftuar nga projeksioni PA axial, metoda Caldwell e sinuseve?

- A) superior orbitave
- B) nje e treta e poshtme e orbitave
- C) permes sinuseve maxilare
- D) nen sinuset maxilare

1023. Cila linje pozicioni duhet te formoje nje kend 37 grade me kaseten per projeksionin parietoacantial,metoda Waters?

- A) orbitomeatal
- B) glabelomeatal
- C) acantiomeatal
- D) infraorbitomeatal

1024. Duke iu referuar kasetes, si duhet te drejtohet rrezja qendrore per projeksionin Parietoacantial,metoda Waters?

- A)perpendikular
- B)15 grade kaudad
- C)23 grade kaudad
- D)37grade kaduad

1025. Cili grup i sinusve paranazale tregohet me mire ne projeksionin parietoacantial,metoda Waters?

- A) frontal
- B) maxilar
- C) etmoidal
- D) sfenoidal

1026. Ku duhet te shihet crista petroze ne imazhin e perftuar nga projeksioni parietoacantial ,metoda Waters e sinuseve paranazale?

- A) superior orbitave
- B) ne nje te terten e poshtme te orbitave

- C) permes sinuseve maxilare
- D) nen sinuset maxilare

1027. Ne projektionin parietoacantial,metoda Waters, ne cilen strukture duhet te dale rrezja qendrore?

- A) nasion
- B) glabella
- C) acantion
- D) pika mentale

1028. Cili grup i sinusve paranazale nuk tregohet me mire ne imazhin e perftuar nga projektioni parietoacantial,metoda Waters?

- A) frontal
- B) maxilar
- C) etmoidal
- D) sfenoidal

1029. Cili prej dy grupeve te sinuseve paranazale tregohet me mire ne projektionin Submentovertikal krahasuar me sinuset e tjera?

- A) forntal dhe maxilar
- B) frontal dhe sfenoidal anterior te bazes se kafkes?
- C) etmoidal dhe maxilar
- D) etmoidal dhe sfenoidal

1030. Cili projektion i sinuseve tregon nje imazh simetrik te pjeses anteriore te bazes se kafkes?

- A) lateral
- B) submentovertikale
- C) PA axial,metoda Caldwell
- D) parietocantial,metoda Waters

1031. Ne cilin projektion te sinuseve kaseta eshte e centruar ne nasion?

- A) lateral
- B) submentovertikale
- C) PA axial,metoda Caldwell
- D) parietocantial,metoda Waters

1032. Ne cilin projektion te sinuseve ,linja mentomeatale eshte afersisht perpendikulare me planin e kasetes

- A) lateral
- B) submentovertikale
- C) PA axial,metoda Caldwell
- D) parietocantial,metoda Waters

1033. Ne cilin projektion te sinuseve linja orbitomeatale duhet te formoje nje kend 15 grade me kaseten?

- A) lateral
- B) submentovertikale
- C) PA axial,metoda Caldwell
- D) parietocantial,metoda Waters

1034. Cili kriter vleresues i perket projektionit lateral te sinuseve paranazal?

- A) duhet te perfshihen te katert grupet e sinuseve
- B) piramida petroze duhet te shtrihet ne nje te treten e poshtme te orbitave
- C) protuberanca mentale duhet te jete e superimpozuar nga kocka frontale anteriore
- D) piramida petroze duhet te shtrihet nen dyshemene e sinuseve maxilare

1035. Cili kriter vleresues i perket projektionit lateral te sinuseve paranazale?

- A) dyshemete e orbitave duhet te jene te superimpozuar
- B) piramida petroze duhet te shtrihet ne nje te treten e poshtme te orbitave
- C) kondilet mandibulare duhet te jene anterioriosht cristes petroze
- D) protuberanca mentale duhet te jete e superimpozuar nga kocka frontale anteriore

1036. Cili kriter vleresues i perket projekSIONIT PA axial,metoda Caldwell te sinuseve?

- A) duhet te perfshihen te katert grupet e sinuseve
- B) duhet te vizualizohen sinuset frontale dhe etmoidale
- C) kondilet mandibulare duhet te jene anteriorisht piramidave petroze
- D) piramida petroze duhet te shtrihet nen dyshemene e sinuseve maxilare

1037. Cili kriter vleresues i perket projekSIONIT parietoacantial,metoda Waters,te sinuseve paranazale?

- A) duhet te perfshihen te katert grupet e sinuseve
- B) piramida petroze duhet te shtrihet ne nje te treten e poshtme te orbitave
- C) protuberanca mentale duhet te jete e superimpozuar nga kocka frontale anteriore
- D) piramida petroze duhet te shtrihet nen dyshemene e sinuseve maxilare

1038. Cili kriter vleresues i perket projekSIONIT submentovertikal te sinuseve paranazale?

- A) rami mandibular duhet te jete i superimpozuar
- B) sinusi frontal dhe etmoidal duhet te shihen qarte
- C) protuberanca mentale duhet te mbivendoset me kockes anteriore frontale
- D) crista petroze duhet te shtrihet nn dyshemene e sinuseve maxilare

1039. Cili kriter vleresues i perket projekSIONIT projekSIONIT submentovertikal te sinuseve?

- A) crista petroze shtrihet ne nje te treten e poshtme t orbitave
- B) kondilet mandibulare duhet te jene anteriorisht cristes petroze
- C) condilet madnibulare duhet te jene postriorisht cristes petroze
- D) crista petroze duhet te shtrihet menjehere nen dyshemene e sinuseve maxilare

1040. Cila metode prjekSIONI prodhon nje pamje axiolaterale te mastoidit?

- A) metoda Watrers
- B) metoda Arcelin
- C) metoda Stevens
- D) metoda Law e modifikuar

1041. Cili projekSION kerkon qe rrezja qendrore te jete e drejtuar 15 grade kaudalisht?

- A) pariatoacantial,metoda Waters
- B) axiolateral oblik(metoda Arcelin,profili anterior)
- C) axiolateral oblik(metoda Stevens,profili posterior)
- D) axiolateral(metoda Law e modifikuar,kendim me tube te vete)

1042. Cili projekSION kerkon qe koka e pacientit te rrotullohet nga projekSIONI i vertete lateral,duke e levizur fytyren afer kasetes derisa plani midsagital te formoje nj kend 15 grad me kaseten?

- A) pariatoacantial,metoda Waters
- B) axiolateral oblik(metoda Arcelin,profili anterior)
- C) axiolateral oblik(metoda Stevens,profili posterior)
- D) axiolateral(metoda Law e modifikuar,kendim me tube te vete)

1043. Cili projekSION kerkon qe rrezja qendrore te hyje me rreth 5cm posteriorisht dhe 5cm superiorisht meatusit akustik ekstern?

- A) pariatoacantial,metoda Waters
- B) axiolateral oblik(metoda Arcelin,profili anterior)
- C) axiolateral oblik(metoda Stevens,profili posterior)
- D) axiolateral(metoda Law e modifikuar,kendim me tube te vete)

1044. Per projekSIONIN aksiolateral (metoda Law e modifikuar,kendim me tub te vetem),me sa grade dhe ne cilin drejtim duhet te drejtohet rrezja qendrore?

- A) 10 grade kaudad
- B) 10 grade cefalik
- C) 15 grade kaudad
- D) 15 grade cefalik

1045. Cili kriter vleresues i perket projekSIONIT axiolateral (metoda Law e modifikuar,kendim me tub te vetem),?

- A) crista petroze duhet te shtrihet ne 1/3 e poshtem te orbitave
- B) crista petroze duhet te jete e treguar ne profil pa distrocion
- C) procesi mastoid duhet te jete i projektuar nen hijen e kockave oksipitale
- D) mastoidi prane kasetes duhet te perfshihet,me qelizat e ajrit te demonstruara dhe te centruara ne kasete

1046. Me sa grade dhe ne cilin drejtim duhet te drejtohet rrezja qendrore per projektionin axiolateral oblik (metoda Stevens,profili posterior)?

- A) 10 grade kaudad
- B) 10 grade cefalik
- C) 12 grade kaudad
- D) 12 grade cefalik

1047. Me sa grade dhe ne cilin drejtim duhet te drejtohet rrezja qendrore per projektionin axiolateral oblik (metoda Arcelin,profili anterior)?

- A) 10 grade kaudad
- B) 10 grade cefalik
- C) 12 grade kaudad
- D) 12 grade cefalik

1048. Cili kriter i perket projektionit axiolateral oblik (metoda Stevens,profili posterior)?

- A) crista petroze duhet te shtrihet ne 1/3 e poshtm te orbitave
- B) crista petroze duhet te jete e treguar ne profil pa shtremberime
- C) procesi mastoid duhet te jete i projektuar nen hijen e kockave oksipitale
- D) mastoidi prane kasetes duhet te perfshihet,me qelizat e ajrit te demonstruara dhe te centruara ne kasete

1049 . Cilat vaza nisin menjehere si pasoje e ndarjes se arteries?

- A) venat
- B) venulat
- C) arteriolat
- D) kapilaret

1050. Ne cilen pjese te trupit lokalizohet vena bazilare?

- A) koke
- B) abdomen
- C) gjymtyret e poshtem
- D) gjymtyret e siperm

1051. Cila dhome e zemres merr gjak te paoksigjenuar?

- A) atriumi i majte
- B) ventrikuli i majte
- C) atriumi i djathte
- D) ventrikuli i djathte

1053. Cila dhome e zemres merr gjak nga vena pulmonare?

- A) atriumi i majte
- B) ventrikuli i majte
- C) atriumi i djathte
- D) ventrikuli i djathte

1054. Cili eshte qellimi i septave ne zemer?

- A) per te ndare atrian nga ventrikuli
- B) per te siguruar hapjen ne atria
- C) per te formuar valvulen atrioventrikulare
- D) per ta ndare zemren ne gjysmen e majte dhe te djathte

1056. si quhet sistemi i rrjedhjes se gjakut nga ventrikuli i djathte ne atriumin e djathte

- A) i thelle
- B) sistemik
- C) superficial
- D) pulmonary

1057. Cilat arterie jane dy deget e para nga aorta ascendente?

- A) coronare
- B) vertebrale
- C) subclacian
- D) carotidi comun

1058. Nepermjet ciles valvul kalon gjaku kur del nga qarkullimi sistemik i zemres?

- A) aortike
- B) mitrale
- C) bikuspidale
- D) trikuspidale

1059. Cila nga pikat e meposhtme eshte nje disavantazh i lendes se kontrastit jjonik krahasuar me kontrastin jonik te perqendrimit te paket jodinik?

- A) rrit viskozitetin
- B) rrit efektet e aspektit kardiovaskular
- C) rrit kerkesa e faktorit ekspozues
- D) ul kontrastin radiografik te vazave te opaccifikuara

1060. Perse nuk ndodh ekspozimi ne te dy planet ne te njejten kohe gjate marrjes se imazhit simultan biplanar?

- A) do te mbingarkohet tubi i rr-x
- B) rrezatimi shperndares do te mjegulloje imazhin
- C) kerkohen dy injektive me lende kontrasti
- D) gjeneratori e rrezeve X nuk mund te sikronizohen per ekspozime multiple

1061. Cila angiograme kerkon perdorimin e filterit per te perftuar nje densitet me uniform midis strukturave vertebrale dhe pulmoneve?

- A) AP celiac axis
- B) AP pulmonare
- C) pulmonare laterale
- D) AP superiore mesenterike

1062. Ne cilin nivel te pacientit duhet te drejtohet kasete dhe rrezja qendrore per aortogramen abdominale?

- A) T6
- B) T10
- C) L2
- D) Crista iliace

1063. Ne cilin nivel te pacientit duhet te drejtohet kasete dhe rrezja qendrore per aortogramen celiake?

- A) T6
- B) T10
- C) L2
- D) S1

1064. Cila zone e pacientit duhet te pergatitet per injektimin e lendes se kontrastit per venografine cefalike?

- A) kofsha
- B) kyçi i kembes
- C) kyçi i dores
- D) krahu i siperm

1065. Cila zone e trupit te pacientit duhet te pergatitet per injektimin e lendes se kontrastit per demostrimin e vena cava superior?

- A)kofsha
- B) nyje e kembes
- C) dore
- D) krahu i siperm

1066. Cila zone e trupit te pacientit eshte nje zone e preferuar per inserimin e kateterit permes lekures per arteriografine e carotides interne?

- A) qafa
- B) kofsha

- C) abdomen
- D) krahu i siperm

1067. Perse nje radiografi duhet te behet perpara mberritjes se lendes se kontrastit per angiografine cerebrale?

- A) qe te sherbeje si nje maske substracioni
- B) qe te sigurohet qe kolimimi eshte i sakte
- C) per te kontrolluar pozicionimin e sakte te pacientit
- D) per te verifikuar qe jane perdorur faktoret e ekspozimit ne menyre korrekte

1068. Cila faze e rrjedhjes se gjakut duhet te kete ekspozimin me te shumte me filma gjate angiografise cerebrale?

- A) venosi
- B) arteriali
- C) capilari
- D) parenkimali

1069. Cila linje pozicioni i kafkes duhet te jete perpendikular me planin horizontal per projektionin AP baze gjate arteriografise cerebrale?

- A) orbitomeatal
- B) glabelomeatal
- C) acantiomeatal
- D) infraorbitomeatal

1070. ku centrohet rrezja qendrore per projektioni PA te gishtit te trete ted ores

- A) ne koken e metakarpit te trete
- B) bazen e metakarpit te trete
- C) artikulacionin interfalangeal distal te gishtit te trete
- D) artikulacionin interfalangeal proksimal te gishtit te trete

1071. Ku duhet te centrohet rrezja qendrore ne porjektionin PA ted ores

- A) ne mes te karpeve
- B) ne bazen e metakarpit te trete

- C) ne artikulacionin metakarpofalangeal te trete
- D) ne artikulacionin interfalangeal proksimal te gishtit te trete

1072. Duke u nisur nga pozicioni prone sa grade duhet te rrotullohet dora per projektionin PA oblik te saj

- A) 15 grade
- B) 25 grade
- C) 35 grade
- D) 45 grade

1073. cila manover e kycit te dores hap hapesiren karpale ne anen laterale te kycit

- A) Hiperfleksioni
- B) Hiperekstensioni
- C) Devijimi radial
- D) Devijimi ulnar

1074.//180 Semundja e rrezes eshte

- A) e shkaktuar nga rrezet e diellit
- B) e shkaktuar nga rrezet x
- C) e pademshme per njeriun
- D) asnje percaktim nuk eshte i sakte

1075. Cili projektion I kycit te dores kerkon kaseten te anohet drejt berrylit me kend 20 grade me horizontin

- A) PA
- B) PA oblik
- C) PA me devijim ulnar
- D) PA aksial (Metoda Stecher)

1076. ne cilin projektion te anessise se siperme gishti I katert nuk eshte parallel me kaseten

- A) Projektioni PA e dores
- B) Projektioni PA I kycit
- C) Projektioni lateral I gishtit te katert
- D) Projektioni PA oblik I gishtit te katert

1077. cili projektioni I berrylit tregon procesin olekranon ne profil

- A) Projektioni AP
- B) Projektioni lateral
- C) Projektioni AP lateral oblik
- D) Projektioni AP medial oblik

1078. cili projektion I kycit tregon me mire kocken skafoide dhe artikulacionet e saj

- A) Projektioni lateral
- B) Projektioni inferosuperior
- C) Projektioni me devijim ulnar
- D) Projektioni me devijim radial

1079. cili projektion I berrylit tregon kokat radiale te pambuluara

- A) AP
- B) Lateral
- C) AP lateral oblik
- D) AP medial oblik

1080. sa duhet te perthyhet berryli per projektionin lateral te tij

- A) 25 grade
- B) 45 grade
- C) 90 grade
- D) 180 grade