

## 01.Farmakologji dhe Endokrinologji

### Pyetja 1

Ne një pneumoni nga Staphylococcus aureus meticiline-rezistent, antibiotiku i zgjedhur është:

- A) piperacilina
- B) oksaciliana
- C) gentamicina
- D) vankomicina
- E) klaritromicina

### Pyetja 2

Medikamentet hipoglicemiantë orale të klasës së sulfanilureve:

- A) përdoren gjithmone si monoterapi
- B) indikohen në diabetim mellitus tip 1
- C) stimulojnë sekretimin e insulines dhe mund të shkaktojnë hipoglicemi të rëndë
- D) ndryshe nga biguanidet, nuk kanë nevojë për praninë e qelizave beta pankreatike funksionuese
- E) mund të antagonizojnë efektin hipoglicemiant të biguanideve

### Pyetja 3

Te tërë agjentet antidiabetike të mëposhtëm mund të shkaktojnë drejtepërdrejte hipoglicemi, me përjashtim të:

- A) glipizidit
- B) klorpropamidit
- C) metformines
- D) tolbutamidit
- E) insulines Lantus

### Pyetja 4

Tregoni se cili prej medikamenteve antitumorale të mëposhtme nuk është antimetabolit:

- A) metotreksati
- B) cisplatini
- C) 5-fluorouracili
- D) citarabina
- E) 6-merkaptopurina

### Pyetja 5

Cili prej medikamenteve të mëposhtme mund të shkaktojë agranulocitozë të rëndë:

- A) nizatidina
- B) klozapina
- C) haloperidoli
- D) karboksicisteina
- E) kodeina

### Pyetja 6

Cili prej medikamenteve të mëposhtme mund të zhvillojë tolerancë pas përdorimit të zgjatur:

- A) benzodiazepina

- B) statinat
- C) antidiabetiket orale
- D) betablokuesit
- E) antagonistet e kalciumit

Pyetja 7

Salbutamoli është:

- A) antihistaminik
- B) beta-blokues
- C) antiserotoninik
- D) beta2-adrenergjik stimules
- E) antikolinergjik

Pyetja 8

Ne cilin rast mund të përdoret në mënyrë të pershtatshme imipramina:

- A) pagjumesi
- B) epilepsi
- C) mani
- D) glaukome
- E) enureze noktune te adoleshentit

Pyetja 9

Inhibimi enzimatik:

- A) percakton efektet farmakologjike dhe terapeutike te shumë medikamenteve
- B) është një fenomen me interes toksikologjik por jo terapeutik
- C) është një fenomen pa asnjë interes praktik
- D) kerkon një kontakt te përsëritur ose te zgjatur te medikamentit me enzimen
- E) është gjithmone i parikthyeshem

Pyetja 10

Cili prej antibiotikeve te mëposhtëm është aktiv kundrejt haemophilusit:

- A) bacitracina
- B) teikoplanina
- C) ampicilina
- D) cikloserina
- E) penicilina G

Pyetja 11

Tregoni cili është avantazhi i rruges se administrimit sublingual:

- A) ben te mundur një kontroll te sakte te posologjise
- B) absorbimi nuk është i shpejte
- C) lehteson absorbimin e medikamenteve shumë pak liposolubel
- D) ka risk te ulet per efekte te padeshiruara
- E) medikamentet nuk i nenshtrohen metabolizmit gjate kalimit te pare

Pyetja 12

Mund te pritet nefrotoksicitet nga te tere medikamentet e mëposhtme, me perjashtim te:

- A) amfotericines B
- B) amoksilines
- C) gentamicines
- D) cisplatinit
- E) vankomicines

Pyetja 13

Kortikosteroidet indikohen ne te tera patologjite e mëposhtme, me perjashtim te:

- A) insuficiencet renale kronike
- B) statusit astmatik
- C) sindromes nefrosike
- D) kolagenopative
- E) herpes simplex okular

Pyetja 14

Cili është efekti i padëshiruar me i rende i klozapines:

- A) diskinezia tardive
- B) konstipacioni
- C) shenja ekstrapiramidale
- D) aritmitet
- E) agranulocitoza

Pyetja 15

Te tere medikamentet e mëposhtme janë agoniste beta-adrenergjike, me perjashtim te:

- A) fentolamines
- B) izoproterenolit
- C) noradrenalines
- D) adrenalines
- E) dobutamines

Pyetja 16

Aktualisht ne kardiopatine ishemike përdoren te tere medikamentet e mëposhtme, me perjashtim te:

- A) antiagreganteve trombocitare
- B) nitroderivateve
- C) beta-blokuesve
- D) ACE-inhibitoreve
- E) kortizonikeve

Pyetja 17

Kokaina ka veprim te tipit:

- A) simpatikolitik
- B) anestetik lokal
- C) parasimpatikomimetik
- D) miorelaksant

E) spazmolitik

Pyetja 18

Cili prej diuretikeve te mëposhtme është me i pershtatshmi per trajtimin e hiperkalciurise:

- A) furosemidi
- B) triamtereni
- C) hidroklortiazidi
- D) acetazolamidi
- E) manitoli

Pyetja 19

Cili prej medikamenteve te mëposhtme është një beta-blokues selektiv:

- A) praktololi
- B) propranololi
- C) sotaloli
- D) atenololi
- E) pindololi

Pyetja 20

Farmakovigjilenca është:

- A) faza IV e eksperimentimit klinik te medikamenteve (faza post-marketing)
- B) observatori kombetar per monitorimin e shpenzimit farmaceutik
- C) vleresimi i efikasitetit klinik te medikamenteve te reja
- D) enti european përgjegjës per autorizimin e perdorimit klinik te medikamenteve te reja
- E) faza e fundit e eksperimentimit preklinik te medikamenteve

Pyetja 21

Cili prej medikamenteve te mëposhtme është përgjegjës per toksicitet renal:

- A) bikarbonati i natriumit
- B) ciklosporina
- C) cimetidina
- D) azitromicina
- E) diazepami

Pyetja 22

Suksinilkolina përdoret si:

- A) ganglioplegjik
- B) bllokues neuromuskulor
- C) bllokues i receptoreve alfa-adrenergjike
- D) vagolitik
- E) bllokues i receptoreve beta-adrenergjike

Pyetja 23

Amiloridi është:

- A) një diuretik i anses

- B) një diuretik osmotik
- C) një diuretik tiazidik
- D) një inhibitor i anidrazes karbonike
- E) një kursyes i kaliumit

Pyetja 24

Ne hipertiroidizem përdoren të tjerë medikamentet e mëposhtme, me përjashtim të:

- A) metimazoliti
- B) propiltiouracilit
- C) jodit
- D) karbimazoliti
- E) karbamazepines

Pyetja 25

Gjysmehajta ( $t_{1/2}$ ) e një medikamenti është:

- A) në përpjesëtim të drejtë me klirensin total
- B) në përpjesëtim të zhdrejtë me vëllimin e shpërndarjes
- C) mund të reduktohet në dozat toksike
- D) varet nga biodisponueshmëria
- E) në përpjesëtim të drejtë me vëllimin e shpërndarjes

Pyetja 26

Të një pacient me hipoakuzi dhe/ose vertigo nuk duhet të jepet:

- A) penicilina
- B) cefalosporina
- C) makrolide
- D) karbapenike
- E) aminoglukozide

Pyetja 27

Të një pacient që merr simvastatine, marrja e njëkohshme e klaritromicines mund të shkaktojë:

- A) gastralgji
- B) cefale
- C) çrregullime të akomodimit
- D) shfaqjen e miopatisë dhe të rhabdomiolizës
- E) vertigo

Pyetja 28

Pacientit me astmë nuk i jepet:

- A) salbuterol
- B) digoksine
- C) lidokaine
- D) bretil
- E) propranolol

Pyetja 29

Nepermjet cilit prej mekanizmave vepron metformina:

- A) rrit numrin e receptoreve te insulines
- B) rrit çlirimin e insulines nga pankreasi
- C) rrit kapjen e glukozes nga indet
- D) rrit lipolizen dhe glikogjenolizen
- E) rrit prodhimin e acidit laktik

Pyetja 30

Propiltiouracili:

- A) shkakton një grumbullim jodi ne tireoglobuline
- B) stimulon formimin e hormonit tiroidien
- C) shkakton reduktimin e vellimit te tiroides
- D) inhibon transportin aktiv te jodit
- E) inhibon dejodizimin e T4

Pyetja 31

Adrenalina shtohet ne anesteziket lokale per:

- A) te nxitur hemostazen
- B) te stimuluar riparimin lokal te indeve
- C) te lehtesuar penetrimin e tyre pergjate degeve nervore
- D) te vonuar absorbimin e anestezikeve lokale
- E) te fuqizuar aksionin bllokues te kanaleve te Na+

Pyetja 32

Cili prej medikamenteve te mëposhtme përdoret ne menyre me te pershtatshme ne diabetin insipid:

- A) hidroklortiazidi
- B) triamtereni
- C) manitoli
- D) acetazolamidi
- E) furosemidi

Pyetja 33

Cili prej FANS(AIJS) te mëposhtëm ka potencialin me te ulet gastrotoksik:

- A) acidi acetyl salicilik
- B) diklofenaku
- C) paracetamoli
- D) indometacina
- E) sulindakaku

Pyetja 34

Cili prej medikamenteve përdoret per profilaksine e sëmundjes se membranave hialine:

- A) kortikosteroidet
- B) insulina
- C) hormonet e tiroides
- D) androgjenet

E) beta2-stimuluesit

Pyetja 35

Te tera patologjite e mëposhtme janë indikacion per dhenien e jodit, me perjashtim te:

- A) tiroidit Hashimoto
- B) krizes tireotoksike
- C) kontaminimit aksidental me izotope radioaktive
- D) pergatitjes per nderhyrje kirurgjikale ne tiroide
- E) strumes endemike

Pyetja 36

Ne rast shoku anafilaktik duhet te jepet menjehere:

- A) kardiotonike
- B) dopamine dhe antihistaminike
- C) diuretike
- D) adrenaline dhe kortizonike
- E) ansiolitike

Pyetja 37

Mekanizmi i veprimit te medikamenteve antipsikotike konsiston ne bllokimin e siteve receptoriale te neurotransmetuesit:

- A) dopamine
- B) histamine
- C) acetilkoline
- D) adrenaline
- E) GABA

Pyetja 38

Cila cefalosporine ka gjysmejeten me te gjate:

- A) cefamandoli
- B) ceftriaksoni
- C) cefsulodina
- D) cefonicidi
- E) cefatrizina

Pyetja 39

Medikamentet e mëposhtme janë antituberkulare, me perjashtim te:

- A) izoniazidit
- B) azitromicines
- C) etambutolit
- D) rifampicines
- E) rifabutines

Pyetja 40

Te një pacient me astme bronkiale ose SPOK, per anginen pectoris duhet te perdoret:

- A) një beta-blokues
- B) amlodipina
- C) warfarina
- D) aspirina
- E) verapamili

Pyetja 41

Toksiciteti kardiak kufizon përdorimin klinik të:

- A) aktinomicines D
- B) amfetaminave
- C) bleomicines
- D) cisplatinin
- E) doksorubicines

Pyetja 42

Cili prej medikamenteve antidiarrike të mëposhtëm shkakton më pak efekte kolaterale të lidhura me sistemin nervor qendror:

- A) kodeina
- B) morfina
- C) loperamidi
- D) difenoksilati
- E) parakodeina

Pyetja 43

Cili antibiotik përdoret në rast meningiti nga streptococcus pneumoniae:

- A) oksitetraciklina
- B) cefotaksime
- C) gentamicina
- D) fosfomicina
- E) klindamicina

Pyetja 44

Te tërë faktorët e mëposhtëm ndikojnë mbi transportin placentar të një medikamenti, me përjashtim të:

- A) hidrosolubilitetit të medikamentit
- B) peshës molekulare
- C) fluksi placentar të gjakut
- D) liposolubilitetit të medikamentit
- E) pH fetal

Pyetja 45

Efekti kolateral kryesor i terapise me hekur është/janë:

- A) pergjumja
- B) kolla
- C) hipertensioni



- D) çrregullimet gastrointestinale:
- E) alterimet e diurezes

Pyetja 46

Ne terapine e dhembjes kronike, udhezuesit indikojne:

- A) morfine me rruge subkutane
- B) morfine me rruge orale
- C) sekuencen FANS - opioide te dobeta - opioide te forta
- D) buprenorfine
- E) një FANS

Pyetja 47

Te tere medikamentet e mëposhtme janë potencialisht nefrotoksike, me perjashtim te:

- A) streptomices
- B) amfotericines B
- C) ciprofloksacines
- D) vankomicines
- E) cisplatin

Pyetja 48

Cili prej medikamenteve antihipertensive te mëposhtme mund te shkaktoje kolle:

- A) antagonistet alfa1-adrenergjike
- B) sartanet
- C) antagonistet e kalciumit
- D) ACE-inhibitorët
- E) nitroderivatet

Pyetja 49

Tregoni se cila prej patologjive te mëposhtme është kundraindikacion per perdorimin e metoklopramidit:

- A) diabete
- B) morbus Parkinson
- C) nauzeja dhe te vjellat nga kemioterapia
- D) patologjite ankisioze
- E) artriti reumatoid

Pyetja 50

Cili është antipiretiku i zgjedhur per një sindrome febrile me natyre te mundshme virale te një fëmijë5 vjeç:

- A) acidi acetil salicilik
- B) piroksikami
- C) fenilbutazoni
- D) paracetamoli
- E) celekoksibi

Pyetja 51

Nitroglicerina:

- A) dilaton kryesisht venat
- B) dilaton kryesisht arteriolat
- C) rrit pasngarkesen
- D) nuk provokon tolerance
- E) nuk duhet të përdoret se bashku me një beta-blokues

Pyetja 52

Acidi klavulanik është i rëndësishëm sepse:

- A) penetron lehtësisht te Gram+
- B) është specifik për Gram+
- C) inaktivizon beta-laktamazat bakteriale
- D) është një inhibitor i transpeptidazës së parët të qelizor
- E) ka një spekter veprimi të ngjashëm me atë të penicilines

Pyetja 53

Cili efekt kolateral është karakteristik në terapinë me ampiciline:

- A) anemia hemolitike
- B) hiponatremia
- C) ekzantema makulopapulare
- D) konstipacioni
- E) nefriti

Pyetja 54

Që të shfaqet efekti terapeutik i antidepressiveve triciklike, është e nevojshme që nga fillimi i marrjes së medikamentit të kalojnë:

- A) 3 minuta
- B) 3 ore
- C) 2-3 javë
- D) 1 ditë
- E) 2 muaj

Pyetja 55

Një i moshuar me diabet insulino-vartës duhet të marrë një trajtim me beta-blokues për shkak të hipertensionit dhe të angines. Cili mund të jetë medikamenti më i pranueshëm:

- A) propranololi
- B) pindololi
- C) timololi
- D) nadololi
- E) atenololi

Pyetja 56

Një prej penicilinave të mëposhtme është betalaktamazë-rezistent. Cila:

- A) amoksisilina
- B) tikarcinilina

- C) piperacilina
- D) metecilina
- E) feneticilina

Pyetja 57

Cili prej medikamenteve te mëposhtme është barbiturik qe përdoret si antiepileptik:

- A) pentobarbitali
- B) fenobarbitali
- C) tiopentali
- D) diazepami
- E) sekobarbitali

Pyetja 58

Medikamente me te efektshme per reduktimin e perqendrimeve plazmatike te triglicerideve janë:

- A) statinat
- B) fibratet
- C) probukoli
- D) rezinat sekuestruese te acideve biliare
- E) inhibitoret e lipazes pankreatike

Pyetja 59

Medikamenti me aktiv per nderprerjen e një ataku hemikranie është:

- A) propranololi
- B) metisergidi
- C) klonidina
- D) amitriptilina
- E) triptanet

Pyetja 60

Neuroleptiket janë medikamente qe indikohen ne trajtimin e:

- A) pagjumesise
- B) hipertensionit
- C) konvulsioneve
- D) manise akute
- E) dhembjes

Pyetja 61

Pacientet me ulçere peptike duhet t'i evitojne te tere medikamentet e mëposhtme, me perjashtim te:

- A) kafeines
- B) FANS (AIJS)
- C) metoklopramidit
- D) prednizonit
- E) nikotines

Pyetja 62

Efekti maksimal (Emax) qe arrin një medikament është një matje e:

- A) efikasitetit
- B) fuqise
- C) pergjigjes kuantale
- D) madhësisë së antagonistit
- E) treguesit terapeutik

Pyetja 63

Kontracetivët hormonale femerore mund të provokojnë zhvillimin e:

- A) karcinomes së ovarit
- B) kisteve të ovarit
- C) adenomes hepatike
- D) gastritit
- E) glakomes

Pyetja 64

Ne intoksikimin nga substancat opioide, pupilat janë:

- A) hiperfleksike
- B) midriatike
- C) anizikorike
- D) miotike
- E) të ndermjetme

Pyetja 65

Një përdorim klinik i benzodiazepinave është:

- A) morbus Parkinson
- B) glaukoma
- C) cefalea
- D) ulçera peptike
- E) pagjumësia

Pyetja 66

Medikamentet "gjenerike" kanë këto karakteristika, me përjashtim të:

- A) prodhohen me rruge industriale
- B) nuk jepen detyrimisht me recete
- C) janë bioekuivalente për sa i përket specialitetit të caktuar
- D) nuk janë të mbrojtura me patente
- E) janë të dobishme për patologji multiple pasi janë jospesifike

Pyetja 67

Cili prej medikamenteve përdoret për trajtimin e infeksioneve fungale sistematike:

- A) anfotericina B
- B) ciprofloksacina
- C) penicilina
- D) amiodaroni
- E) streptomocina

Pyetja 68

Cili prej te mëposhtmeve është një indikacion klinik i medikamenteve antihistaminike H2?

- A) astma bronkiale
- B) ankthi
- C) ulçera peptike
- D) diarrea
- E) riniti sezonal

Pyetja 69

Studimi i faktoreve qe percaktojne luhatjet e perqendrimit plazmatik te një medikamenti quhet:

- A) farmakodinamika
- B) mbikeqyrja farmakoceutike
- C) farmakogjenetika
- D) farmakovigjilenca
- E) farmakokinetike

Pyetja 70

Cili prej te mëposhtmeve është një indikacion klinik i medikamenteve antihistaminike H1:

- A) konvulsionet
- B) ulçera gastrike
- C) riniti sezonal
- D) diarrea
- E) ankthi

Pyetja 71

Cili prej medikamenteve te mëposhtme mund të përdoret per trajtimin e tumoreve te gjirit:

- A) vitamina D
- B) propranololi
- C) prednizoloni
- D) tamoksifeni
- E) nizatidina

Pyetja 72

Metabolizmi i kalimit te pare:

- A) rrit biodisponueshmerine e medikamentit
- B) ka një rendesi metabolike te pakte
- C) redukton biodisponueshmerine e medikamentit
- D) rrit gjithmone toksicitetin e medikamentit
- E) redukton gjithmone toksicitetin e medikamentit

Pyetja 73

Cili prej medikamenteve te mëposhtme është aktiv ne infeksionet nga pseudomonas aeruginosa, por mund te shkaktoje ototoksicitet dhe nefrotoksicitet:

- A) karbenicilina

- B) kloramfenikoli
- C) gentamicina
- D) rifampicina
- E) eritromicina

Pyetja 74

Me çfare mund te antagonizohet depresioni respirator i induktuar nga morfina:

- A) buprenorfine
- B) nalokson
- C) pentazocine
- D) metadon
- E) kodeine

Pyetja 75

Cili prej efekteve kolaterale është i mundshem gjate terapise me karbeniciline:

- A) nefrotoksiciteti
- B) ototoksiciteti
- C) disfunksioni trombocitar
- D) mielodepresioni
- E) hiperkalemia

Pyetja 76

Glukokortikoidet nderveprojne me:

- A) kanalet jonike
- B) receptoret brendaqelizore
- C) proteinat G
- D) tirozine kinazen
- E) lipidet

Pyetja 77

Cili prej medikamenteve te mëposhtme mund te shkaktoje vartesi:

- A) benzodiazepinat
- B) kalcitonina
- C) betablokuesit
- D) antikoagulantet orale
- E) antihistaminiket

Pyetja 78

Imipenemi është:

- A) një inhibitor i beta-laktamazes
- B) një antibiotik beta-laktamik
- C) një antifungal
- D) një makrolid
- E) një aminoglukozid

Pyetja 79

Cili prej medikamenteve të mëposhtme antagonizon efektin bronkodilatator dhe vazodilatator të izoproterenolit:

- A) kokaina
- B) feoksibenzamina
- C) fentolamina
- D) reserpina
- E) propranololi

Pyetja 80

Ne të tera sëmundjet e mëposhtme në të ardhmen mund të përdoret terapia gjenike, me përjashtim të:

- A) ulçeres peptike
- B) hemofilisë
- C) fibrozës kistike
- D) tumoreve
- E) AIDS

Pyetja 81

Cili prej medikamenteve të mëposhtme është analgjezik:

- A) haloperidoli
- B) kanamicina
- C) pentazocina
- D) adrenalina
- E) suksinilkolina

Pyetja 82

Të gjithë medikamentet e mëposhtme janë beta-stimulues, me përjashtim të:

- A) propranololit
- B) orciprenalines
- C) izoprenalines
- D) salbutamolit
- E) formetorolit

Pyetja 83

Cili prej FANS përdoret si antiagregant trombocitar:

- A) paracetamoli
- B) nimesulidi
- C) aspirina
- D) nabumetoni
- E) ibuprofeni

Pyetja 84

Kur dëshirohet të arrihet dilatacioni pupilar por jo cikloplegja, medikamenti i zgjedhur është:

- A) omatropina
- B) fenilefrina

- C) izoproterenoli
- D) tropikamidi
- E) pilokarpina

Pyetja 85

Ne cilin prej indeve te mëposhtme shperndahen pergjithesisht me ngadale medikamentet:

- A) mushkeri
- B) melçi
- C) tiroide
- D) ind kockor
- E) muskul skeletik

Pyetja 86

Cili prej te mëposhtmeve nuk është një neurotransmetues:

- A) penicilina
- B) noradrenalina
- C) acetilkolina
- D) dopamina
- E) 5-hidroksitriptamina

Pyetja 87

Amiodaroni është një medikament:

- A) hipnoinduktor
- B) antiacidik
- C) beta-blokues
- D) beta-mimetik
- E) antiaritmik

Pyetja 88

Eliminimi i penicilines G ndodh:

- A) me filtrim glomerular dhe sekretim tubular ne raport pothuajse te njejte
- B) kryesisht nepermjet filtrimit glomerular
- C) kryesisht me rruge biliare
- D) kryesisht nepermjet sekretimit tubular
- E) me rruge pulmonare

Pyetja 89

Një reaksion alergjik ndaj një medikamenti:

- A) ndermjetesohet gjithmone nga prodhimi i antitropave
- B) varet nga doza vetem kur medikamenti jepet me rruge sistemike por jo kur jepet me rruge lokale
- C) zakonisht është ne varesi te dozes
- D) ka gjithmone gravitet te lehte ose te moderuar
- E) induktohet betem nga medikamentet e sintezes

Pyetja 90



Tregoni se cili prej efekteve te mëposhtme nuk induktohet nga glukokortikoidet:

- A) shperndarja e alteruar e indit adipoz
- B) rritja e glicemise
- C) inhibimi i sintezes se leukotrieneve
- D) rritja e sintezes se proteinave ne nivel kutan
- E) imunosupresioni

Pyetja 91

Te tera efektet e mëposhtme janë manifestime te mbidozimit te barbiturateve, me perjashtim te:

- A) hipotermise
- B) konfuzionit mendor
- C) letargjise
- D) eksitimit
- E) hipotensionit

Pyetja 92

Te një pacient me glaukome kundraindikohet perdorimi i:

- A) barbiturateve:
- B) antibiotikeve
- C) antidepressiveve triciklike
- D) benzodiazepinave hipnogjene
- E) amfetaminave

Pyetja 93

Cila prej klasave te mëposhtme inhibon HMG-CoA reduktazen:

- A) estrogjenet
- B) beta-blokuesit
- C) fibratat
- D) statinat
- E) ACE-inhibitorët

Pyetja 94

Terapia me estrogjene shoqerohet me te tera efektet e mëposhtme te padeshirueshme, me perjashtim te:

- A) hiperplazise endometriale
- B) nauzese
- C) hipoglicemise
- D) dhembjeve te gjinjve
- E) hemikranias

Pyetja 95

Efektet e padeshirueshme me te rendesishme te fenotiazines janë:

- A) çrregullimet ekstrapiramidale
- B) paraliza spastike
- C) korea
- D) fotofobia

E) cefalea

Pyetja 96

Cili hormon ose substancë e ngjashme me hormonin, prodhohet më shpesh nga karcinoma e pulmonit?

- A) Gonadotropina korionike
- B) ADH
- C) ACTH (ose substancë e ngjashme me ACTH)
- D) Paratormoni
- E) MSH

Pyetja 97

Struktura kimike bazë e hormoneve steroidee derivon nga:

- A) Ciklopentanoperidrofenantren
- B) Acidet yndyrore të pangopura
- C) Di-naftalene
- D) Strukturë me katër unaza pirrolesh
- E) Acidi arakidonik

Pyetja 98

Cili prej markuesve të gjakut të orienton drejt diagnozës së karcinomës midulare të tiroides?

- A) Kalcitonina
- B) Antigjeni karcinoembriogjenetik (CEA)
- C) Tireoglobulina
- D) Ferritina
- E) Alfa-fetoproteina

Pyetja 99

Feokromocitoma bilaterale është më e shpeshtë tek:

- A) Pacientët e gjinisë femërore
- B) Pacientët me MEN3
- C) Pacientët me paragangliomë
- D) Pacientët me MEN2A
- E) Pacientët duhanpirës

Pyetja 100

Difekti viziv më i shpeshtë tek pacientët me adenomë hipofizare është:

- A) Ulje të aftësisë vizive
- B) Hemianopsia nazale
- C) Katarrakta
- D) Skotomat

E) Hemianopsia bitemporale

Pyetja 101

Në dietën e një pacienti me diabet melitus, sa përqind duhet të jenë karbohidrate?

- A) 80%
- B) 10%
- C) 30%
- D) 20-25%
- E) 50-55%

Pyetja 102

Hipopituitarizmit total (panhipopituitarizëm) tek i riu është përgjegjës për të gjitha alternativat e mëposhtme, përveç njëjës:

- A) Hipotiroidizëm
- B) Hipoparatiroidizëm
- C) Mungesë të zhvillimit seksual
- D) Insufiçencë të surrenaleve
- E) Rritje trupore të vonuar

Pyetja 103

Kuadri endokrinologjik në sëmundjen e Cushing karakterizohet nga:

- A) Difekt të steroidogjenezës surrenalike dhe hiperplazi të gjëndrave surrenale
- B) Rritje të sekretimit të kortizolit dhe aldosteronit
- C) Rritje të sekretimit të kortizolit dhe ulje të sekretimit të ACTH
- D) Rritje të sekretimit të ACTH dhe ulje të sekretimit të kortizolit
- E) Rritje të sekretimit të kortizolit dhe ACTH

Pyetja 104

Sekretimi i kortizolit tek një person normal:

- A) Stimulon sekretimin e aldosteronit
- B) Zhvillon një qark me feedback pozitiv në nivelin e hipofizës
- C) Zhvillon një qark me feedback negativ në nivelin e hipofizës
- D) Zhvillon një qark me feedback pozitiv në nivelin e surrenaleve
- E) Inhibon në mënyrë direkte sekretimin e insulinës

Pyetja 105

Cili trajtim është më i përshtatshëm, në kushtet e hiperkalçemisë të rëndë shkaktuar nga karcinoma e paratiroides, ndërkohë që pritet për rezeksionin kirurgjikal?

- A) Dozë maksimale e diuretikëve tiazidik
- B) Pamidronat disodium 90 mg në 500 ml solucion fiziologjik për 4 orë
- C) Kalcitonina e salmonit 100 U. s/c

- D) 2 L solucion fiziologjik për perfuzion të shpejtë dhe më pas 250 ml/orë shoqëruar me furosemid
- E) Hidrokortizon 100 mg iv

Pyetja 106

Cila prej gjendjeve nuk është karakteristike për krizën nga tireotoksikoza:

- A) Hipertermi e rëndë
- B) Nëse nuk trajtohet mortaliteti është rreth 70%
- C) Përgjigje e mirë ndaj dozave masive të steroidëve
- D) Takikardi e rëndë
- E) Tremor

Pyetja 107

Cili prej medikamenteve mund të shkaktojë hiperuricemi dhe me shumë mundësi një atak gotoz (podagra)?

- A) Verapamil
- B) Penicilina
- C) Acidi askorbik
- D) Diuretikët tiazidik
- E) Aspirina

Pyetja 108

Heqja kirurgjikale e paratiroideve shoqërohet me komplikimin:

- A) Tetani
- B) Hiperkalçemi
- C) Hipofosfatemi
- D) Hiperidroksiprolinuri
- E) Hipertension arterial

Pyetja 109

Cili prej hormoneve nuk prodhohet nga hipofiza?

- A) Kalcitonina
- B) FSH
- C) ACTH
- D) GH (hormoni i rritjes)
- E) TSH

Pyetja 110

Defiçiti i GH (hormoni i rritjes) tek i rrituri shoqërohet me:

- A) Rritje të libidos (dëshirës seksuale)
- B) Difekt të funksionit sistolik
- C) Ulje të kolesterolemisë

- D) Anoreksi, nauze dhe të vjella
- E) Ulje progresive të gjatësisë trupore

Pyetja 111

Cfarë është FAI (free androgen index)?

- A) Testosteroni total
- B) Raporti midis testosteronit total dhe SHBG
- C) Testosteroni i biodisponueshëm
- D) Indeksi i androgjenizimit të indeve
- E) Njësia matëse e prodhimit të androgjenit

Pyetja 112

Gjatë terapisë së komës këtoacidoze, bikarbonatet jepen në mënyrë të ngadaltë për të evituar:

- A) Hipopotaseminë
- B) Rritjen e lëshimit të O<sub>2</sub> nga hemoglobina në inde
- C) Hipopotaseminë e rëndë, me ulje të lëshimit të O<sub>2</sub> nga hemoglobina në inde dhe uljen paradoksale të pH në likidin cerebrospinal
- D) Uljen paradoksale të pH në likidin cerebrospinal
- E) Koha e dhënies nuk ka asnjë rëndësi. E rëndësishme është sasia e bikarbonateve që jepen

Pyetja 113

Cila prej gjendjeve të mëposhtme nuk shoqërohet me anemi?

- A) Hipotiroidizmi
- B) Hipogonadizmi
- C) Sindroma Cushing
- D) Hipertiroidizmi
- E) Hiposideremia

Pyetja 114

Cila prej alternativave nuk është pjesë e kuadrit klinik të sëmundjes Cushing:

- A) Obezitet central
- B) Facies lunaris
- C) Hiponatremi
- D) Hipertension arterial
- E) Hiperglicemi

Pyetja 115

Në trajtimin e hipertiroidizmit mund të nevojiten të gjithë medikamentet e mëposhtme, përveç njërit?

- A) Digitali
- B) Tiroxina
- C) Metimoroli

- D) Propiltiuracili
- E) Betablockues

Pyetja 116

Me pseudohermafroditizëm femëror kuptojmë gjendjen e karakterizuar nga:

- A) Praninë njëkohësisht të vezoreve dhe testikujve
- B) Praninë e gjenitale të jashtme femërore tek persona me gjenotip mashkullor
- C) Homoseksualitet femëror i fshehur
- D) Praninë e gjenitaleve të jashtme femërore tek personat me testikuj
- E) Praninë e vezoreve dhe strukturave mulleriane normale, shoqëruar me gjenitale të jashtme mashkullore, tek personat me gjenotip femëror

Pyetja 117

Në trajtimin e një pacienti diabetik që do ti nënshtrohet një ndërhyrje kirurgjikale madhore është e rëndësishme që:

- A) Të mos jepet glukozë endovenë
- B) Mbajtja e pacientit pa ngrënë për 3 ditë para operacionit
- C) Dhënia e të njëjtës doze të insulinës
- D) Dhënia e laktatit M/6
- E) Të rregullohet doza e insulinës pas operacionit, duke u bazuar tek vlerat e glicemisë dhe glikozurisë

Pyetja 118

Cilat janë shkaqet kryesore të vdekshmërisë nga diabeti melitus tip 2?

- A) Nefropatia
- B) Kardiopatia iskemike
- C) Pankreatiti
- D) Neoplazitë
- E) Iktus

Pyetja 119

Cilët janë medikamentet kryesore që përdoren në trajtimin e këtoacidozës diabetike?

- A) Antibiotikë
- B) Hidratimi dhe insulina
- C) Beta-blokuues
- D) Antagonistët e kalçiumit
- E) Diuretikët

Pyetja 120

Cili ekzaminim diagnostik bazohet në vetitë e qelizës tiroide për të përqëndruar në mënyrë aktive jodin?

- A) Dozimi i tireotropinës (TSH)

- B) Dozmi i tiroksinës plazmatike të lirë (FT4)
- C) Echocolor Doppler i tiroides
- D) Tiroshintigrafisë
- E) Dozimi i tireoglobulinës

Pyetja 121

Diabeti melitus tip 1 është:

- A) Sëmundje gjenetike
- B) Një variant i MODY (Maturity, Onset Diabetes of the Young)
- C) Sëmundje poligjenike, e trashëgueshme, që ndikohet dhe nga faktorët ambientalë
- D) Karakterizohet nga sekretimi me tepri i insulinës
- E) Prek ekskluzivisht fëmijët

Pyetja 122

Cila prej endokrinopative nuk është përgjegjëse për hipertensionin endokrin?

- A) Morbusi Conn
- B) Feokromocitoma
- C) M. Adison
- D) M. Cushing
- E) Hipertiroidizmi

Pyetja 123

Cila prej alternativave nuk është e vërtetë për feokromocitomën?

- A) Është tumor jo gjithnjë benign
- B) Është tumor sporadik ose familjar, por kryesisht i rralë
- C) Është tumor tipik i fëmijërisë
- D) Tumor që nganjëherë shoqërohet me neoplazi të tjera endokrine
- E) Kryesisht prodhon noradrenalinë

Pyetja 124

Sindroma androgjenitale nga deficiëti i 21-hidroksilazës shkakton:

- A) Redukton prodhimin e delta4- androstenedione
- B) Prodhim të shtuar të 17 alfa-hidroksiprogesteron
- C) Prodhim të shtuar të kortizolit
- D) Prodhim të shtuar të aldosteronit
- E) Hipotrofi të surrenaleve

Pyetja 125

Hipertensioni arterial shkaktuar nga adenoma e surrenales, që prodhon aldosteron, vlerësohet më mirë me anë të:

- A) Dozimit në gjak të aldosteronit dhe aktivitetit të reninës si shtirë dhe në këmbë

- B) Dozimit të thjeshtë të potasemisë
- C) Dozimi të aldosteronit në gjak, gjatë qëndrimit shtrirë
- D) Testi për supresimin (bllokimin) me desametazon 2 mg për 2 ditë
- E) Dozimin e kortikosteronit gjatë kateterizimit venoz selektiv

Pyetja 126

Cili është shkaku më i shpeshtë i hipoglicemisë së induktuar?

- A) Terapia me sulfanilure
- B) Përdorimi i alkolit
- C) Terapia me beta-blokues
- D) Terapia me biguanide
- E) Hipoglicemia faktike

Pyetja 127

Prania e mikroalbuminurisë me 80 mg/24 orë tek një pacient diabetik është tregues për:

- A) Cistiti hemorragjik
- B) Asnjë alternim në nivelin renal
- C) Sindroma nefrozike
- D) Kalkuloza renale
- E) Nefropati fillestare

Pyetja 128

Cfarë është saktësia e një dozimi hormonal?

- A) Përqëndrimi minimal i matshëm i një hormoni të caktuar
- B) Riprodhueshmëria e të njëjtës vlerë për një kampion që përsëritet 10 herë
- C) Aftësia e një antitropi për tu lidhur me një molekulë të caktuar
- D) Diferenca midis përqëndrimit të hormonit nga dozimi i gjetur dhe atij që në vërtetë është
- E) Besueshmëria klinike

Pyetja 129

Cili është treguesi më i përshtatshëm për kontrollin metabolik për një periudhë prej disa muajsh tek një pacient diabetik?

- A) Përqëndrimi i HbA1c
- B) Glikozuria e 24 orëve
- C) Glicemia mesatare ditore e përsëritur çdo javë
- D) Përqëndrimi i fruktozaminës
- E) Përqëndrimi i peptidit C bazal dhe pas dhënies së glukagonit

Pyetja 130

Obeziteti kontribuon në shfaqjen e diabetit pasi:

- A) Redukton fazën e hershme të sekretimit të insulinës pas ngarkesës me glukoz



- B) Rrit shpejtësinë e degradimit të insulinës
- C) Rrit sekretimin e glukagonit
- D) Kryesisht shoqërohet me marrje të yndyrnave
- E) Indet periferike përgjigjen më pak ndaj insulinës

Pyetja 131

Tek një pacient me këtoacidozë diabetike lëkura është:

- A) E njomë
- B) I kterike
- C) E dehidratuar
- D) E zbehtë
- E) E skuqur

Pyetja 132

TRH përveç stimulimit për të sekretuar TSH, stimolon dhe sekretimin e:

- A) ACTH
- B) Lipotropina
- C) Prolaktina
- D) GH
- E) MSH

Pyetja 133

Cili është mekanizmi patogjenetik përgjegjës për diabetin mellitus tip 1?

- A) Infektiv
- B) Inflamator
- C) Degjenerativ
- D) Neoplazik
- E) Autoimunitar

Pyetja 134

Cili prej medikamenteve anti-hipertensivë nuk shkakton dizfunktion erektil?

- A) Diuretikët tiazidikë
- B) Simpatikolitikët qëndror
- C) Beta-blokues
- D) ACE-inibitor
- E) Spironoloaktoni

Pyetja 135

Cila nga këto substanca ka efekt kryesor reduktimin e insulinorezistencës?

- A) Sulfaniluree
- B) Antibiotikë

- C) Kemioterapikët
- D) Antagonistët e kalçiumit
- E) Biguanidët

Pyetja 136

Testi i etjes tek diabeti insipidus hipofizar shkakton?

- A) Reduktim të poliurisë dhe ozmolaritetit urinar me 50%
- B) Pa modifikime të diurezës, pa modifikime të ozmolaritetit urinar
- C) Rritje të diurezës dhe ozmolaritetit urinar
- D) Reduktim të diurezës dhe rritje të ozmolaritetit urinar
- E) Reduktim të poliurisë dhe rritje të ozmolaritetit urinar me 50%

Pyetja 137

Ekzaminimi më i përshtatshëm për vlerësimin e funksionalitetit të surrenaleve është:

- A) Matjen e kombinuar midis kortizolit të lirë në urinë dhe ACTH
- B) Dozimi i kortizolemisë në orën 8
- C) Test stimulimi me ACTH në dozë të ulët
- D) Dozimi i kortizolit të lirë në urinë
- E) Ritmin ditor të kortizolit (kampione gjaku të marra nga ora 8.00-16.00)

Pyetja 138

Në çfarë niveli vepron aldosteroni?

- A) Nivelin e tubulit distal të veshkës
- B) Nivelin glomerular
- C) Nivelin kockor
- D) Nivelin e sinapseve neuromuskulare
- E) Nivelin e tubujve proksimalë të veshkave

Pyetja 139

Cila alternativë është e vërtetë rreth tiroiditit subakut?

- A) Ka etiologji virale
- B) Është më e shpeshta ndër tiroiditet
- C) Ka etiologji autoimune
- D) Nuk ka infiltrim autoimun
- E) Pjesa më e madhe e pacientëve nuk ka përmirësim spontan të funksionit të tiroides

Pyetja 140

Për të diagnostikuar akromegalinë, cila prej alternativave të mëposhtme është më e rëndësishmja?

- A) Në Rx-in e kokës, ka zgjerim të selës turcike
- B) Rritje të perimetrit të kokës

- C) Pamundësia e ngarkesës së glukozit për të reduktuar nivelin e HGH (Human Growth Hormon)
- D) Visheromegali (zmadhim të organeve)
- E) Zmadhim të ekstremiteteve

Pyetja 141

Cila prej alternativave rreth diabetit melitus tip 2 nuk është e vërtetë?

- A) Shoqërohet me insulino-rezistencë
- B) Shoqërohet me obezitet
- C) Shoqërohet me retinopati
- D) Shoqërohet me hipertension arterial
- E) Nuk ka familjaritet

Pyetja 142

Obeziteti, steriliteti, hirsutizmi dhe vezorja policistike karakterizojnë:

- A) S. Stein-Leventhal
- B) S. Turner
- C) S. Frolich
- D) S. Meniere
- E) S. Klinefelter

Pyetja 143

Cila prej alternativave të mëposhtme nuk të bën të mendosh për diagnozën e Sindromës së Zollinger-Ellison:

- A) Niveli i rritur i gastrinës në gjak
- B) Pozitivitet të testit respirator ndaj ureazës
- C) Ulçerat multiple gastriointestinale
- D) Pozitivitet i testit të stimulimit të sekretinës
- E) Rritje të sekrecioneve acide gastrike

Pyetja 144

Cila prej gjendjeve të mëposhtme mund të jetë shkak i sindromës nga sekretimi i pamjaftueshëm i ADH (SIADH)?

- A) Hipertiroidizmi
- B) Morbusi i Conn
- C) Karcinoma bronkiale
- D) Hiperparatiroidizmi
- E) Sëmundja Cushing

Pyetja 145

Cila prej gjendjeve të mëposhtme mund të jetë shkak i sindromës nga sekretimi i pamjaftueshëm i ADH (SIADH)?

- A) Sindroma Cushing
- B) Hipokaliemia
- C) Tumori i prostatës
- D) Hiperkalçemia
- E) Karcinoma bronkiale

Pyetja 146

Cilën prej gjendjeve të mëposhtme nuk e shkakton përdorimi kronik i amiodaronit?

- A) Hipogonadizmi
- B) Hipotiroidizmi subklinik
- C) Fibroza pulmonare
- D) Hipertiroidizmi i komplikuar
- E) Turbullimi i kristalinës

Pyetja 147

Cili prej parametrave nuk rritet në kushtet e defiçitit të rëndë të insulinës:

- A) Glukoza
- B) Aminoacidet
- C) Acidet yndyrore
- D) PH
- E) Vëllimi i urinës

Pyetja 148

Cili prej medikamenteve nuk është i këshillueshëm në mënyrë specifike për trajtimin e diabetit mellitus?

- A) Insulina
- B) Biguanidët
- C) Glitazonikët
- D) Metimazoli
- E) Sulfanilure

Pyetja 149

Diabeti mellitus tip 2 shkaktohet nga:

- A) Obezitet
- B) Kryesisht rezistencë ndaj insulinës
- C) Kryesisht defiçit të insulinës
- D) Insulit autoimun
- E) Sekretim i pamjaftueshëm i insulinës + insulinorezistencë

Pyetja 150

Karcinoma midulare e tiroides bën pjesë në cilën prej sindromave?

- A) Sindroma nga neoplazitë endokrine multiple (MEN) tip I
- B) MEN tip II
- C) Poliendokrinopati autoimune tip I
- D) MEN tip III
- E) MEN tip IV

Pyetja 151

Eshtë e vërtetë që statinat:

- A) Reduktojnë sintezën e VLDL
- B) Rrisin numrin e receptorëve për HDL
- C) Reduktojnë metabolizmin hepatic të LDL
- D) Aktivojnë lipazat lipoproteike
- E) Inhibojnë në mënyrë konkurruese HMG-CoA reduktazën

Pyetja 152

Cila prej alternativave nuk është karakteristike për kraniofaringiomën?

- A) Eshtë tumor cistik i zonës selare dhe paraselare
- B) Eshtë tumori më i shpeshtë i zonës hipotalamo-hipofizare në moshat pediatrike
- C) Karakterizohet nga prania e kalçfikimeve radiologjikisht të dukshme
- D) Shtim të sekretimit të GH
- E) Eshtë tumor që merr origjinë nga mbetjet embrionale të xhepit të Rathke

Pyetja 153

Në karcinomën midulare të tiroides kemi shtim të sekretimit të:

- A) Tireoglobulinës
- B) TSH
- C) Kalçitoninës
- D) Adrenomedulina
- E) T3 dhe T4

Pyetja 154

Sa përqind e nodujve jo funksionues të tiroides (të ftohtë) mund të zhvillojë tumor malinj?

- A) >70%
- B) 60-70%
- C) 21-30%
- D) 31-50%
- E) 5-10%

Pyetja 155

Cila prej gjendjeve nuk shkakton tetani?

- A) Hipoparatiroidizmi i rëndë

- B) Rakitizmi
- C) Stenoza e pilorit
- D) Paratiroidektomia
- E) Litiaza renale nga hiperparatiroidizmi primar

Pyetja 156

Cila simptomë është karakteristike tek një pacient mashkull me adenomë hipofizare që sekreton PRL?

- A) Priapizëm
- B) Crregullimi i dëshirës seksuale hipoaktive (e ulur)
- C) Hiperidrozë
- D) Mungesë të ejakulimit
- E) Orkit

Pyetja 157

Shkaku më i shpeshtë i hipotiroidizmit tek i rrituri është:

- A) Hipotiroidizmi i induktuar nga jodi
- B) Tumore të tiroides
- C) Tiroiditi subakut
- D) Tiroiditi i Riedel
- E) Tiroiditi kronik autoimun (Hashimoto)

Pyetja 158

Në cilën prej gjendjeve të mëposhtme nuk jepet një dozë më e lartë me levotiroksinë në kushtet e hipotiroidizmit:

- A) Trimestri i III i shtatzanisë
- B) Sulfati ferroz
- C) Takikardia
- D) Kolestiramina
- E) Rritje në peshë

Pyetja 159

Sindroma e Plummer-Vinson karakterizohet nga:

- A) Purpura trombocitopenike
- B) Divertikuli i ezofagut me ulçer peptike
- C) Anemi, dizfagi dhe glosit
- D) Pirozë retrosternale me regurgitim acid
- E) Sindromë gastro-ezofageale

Pyetja 160

Një grua 50 vjeçare, prej kohësh me tiroiditin kronik të Hashimotos, paraqitet në urgjencë në gjendje kome, pas disa episodesh me të vjella dhe dhimbje abdominale. Është e dizidratuar dhe lëkura e hiperpigmentuar. TA 65/40 mmHg, Fc 100/min. Potasemia 6.6 m

- A) Koma këtoacidoze
- B) Kriza hiposurrenalike
- C) Koma hipoglicemike
- D) Kriza nga tireotoksikoza
- E) Koma mixedematoze

Pyetja 161

Këto acidoza diabetike:

- A) Është kryesisht si pasojë e insulinorezistencës
- B) Është komplikancë akute e të dy tipeve të diabetit
- C) Shfaqet pothuajse vetëm në diabetin tip 1
- D) Shkaktohet kryesisht nga defiqiti i bikarbonateve
- E) Shfaqet tek podagra (gota)

Pyetja 162

Paratiroidet prodhojnë:

- A) Kalçitoninë
- B) Vitaminë D
- C) PTH-rp
- D) Paratormon (PTH)
- E) Fosfatazë alkaline

Pyetja 163

Cilat masa terapeutike më të përshtatshme duhen marr në rastin e hipotensionit të rëndë pas heqjes së feokromocitomës?

- A) Kortikosteroidë
- B) Mineralokortikoidë
- C) Gjak ose plazëm
- D) Agjentë beta-stimulues
- E) Klorur potasiumi

Pyetja 164

Cili prej peptideve nuk gjendet në pankreasin endokrin?

- A) Sekretina
- B) Glukagoni
- C) Insulina
- D) Somatostatina
- E) Glukagoni dhe somatostatina

Pyetja 165

Terapia zëvendësuese me testosteron në hipogonadizmin mashkullor rekomandohet në rastin e:

- A) Të gjitha përgjigjet

- B) Vlera të testosteronit të lirë në limitin inferior të normës në dy matje të përsëritura
- C) Dizfunzioni erektil rezistent ndaj PDE5-inibitor
- D) Nivelit të testosteronit total < 300 (10.4 nmol/L) ng/mL në dy matje të përsëritura
- E) Shtim të estrogjeneve në cirrozën hepatike

Pyetja 166

Sekretimi hormonal jo normal i paratormonit mund të shfaqet tek:

- A) Karcinoma bronkiale me qeliza si kokrra elbi
- B) Fibrosarkoma retroperitonela
- C) Koriokarcinoma
- D) Emangioblastoma
- E) Karcinoma bronkogjene squamoze

Pyetja 167

Cili prej tumoreve nuk bën pjesë tek MEN tip 1?

- A) Mikroprolaktinoma
- B) Melanoma
- C) Tumori karcinoid
- D) Adenoma e kortikosurrenales
- E) Lipoma

Pyetja 168

Në cilën prej patologjive është më e shpeshtë prania e gjinekomastisë?

- A) Pankreatiti kronik
- B) Bronkiti kronik obstruktiv
- C) Cirroza hepatike
- D) Retokoliti ulçeroz
- E) Glomerulonefriti kronik

Pyetja 169

Diagnoza e hiperparatiroidizmit primitiv bazohet tek:

- A) PTH i pandryshuar (PTHi) i rritur, ulje të kalçemisë, rritje të fosforemisë
- B) Rritje të kalçemisë, rritje të fosforemisë, PTHi i pa dozueshëm
- C) Rritje të kalçemisë, me zonë hiperakumuluese në shintigrafinë e kockave
- D) Rritje të kalçemisë, rritje të fosfatazës alkaline
- E) PTHi i rritur, kalçemi e rritur

Pyetja 170

Forma më e shpeshtë e hipertiroidizmit tek i moshuari është:

- A) Adenoma toksike
- B) Morbusi i Basedow



- C) Struma multinodulare toksike
- D) Tiroiditi subakut
- E) Hipertiroidizmi i induktuar nga jodi

Pyetja 171

Cila prej alternativave rreth hiperkaliemisë nuk është e saktë:

- A) Mund të jetë sekondare nga acidoza metabolike
- B) Mund të jetë sekondare nga hemotransfuzionet masive
- C) Mund të jetë sekondare nga mbi përdorimi i furosemidit
- D) Mund të shkaktojë aritmi të rënda kardiake
- E) Hiposurrenalizëm kronik

Pyetja 172

Kriza hipoglicemike shfaqet më lehtësisht tek një person:

- A) Alkolisti kronik
- B) I dobët
- C) Me neoplazi gastrike
- D) Obez
- E) Kaketik

Pyetja 173

Cili nuk është rol fiziologjik i paratormonit?

- A) Rritja e riabsorbimit të kalçiumit e fosforit nga kockat
- B) Rritja e konvertimit të kalçifediolit në kalçitriol
- C) Reduktim i riabsorbimit të kalçiumit nga veshka
- D) Reduktimi i riabsorbimit të fosfateve e bikarbonateve nga veshka
- E) Rritje të sekretimit të kalçtoninës

Pyetja 174

Në sindromën Klinefelter testikujt janë:

- A) Me dimensione të reduktuara dhe konsistencë normale
- B) Me dimensione të reduktuara dhe konsistencë të rritur
- C) Me dimensione normale dhe konsistencë të rritur
- D) Me dimensione normale dhe konsistencë normale
- E) Me dimensione të rritura dhe konsistencë të rritur

Pyetja 175

Tek akromegalia, cili segment skeletik është më i prekuri nga proliferimi (shtimi) nënperiosteal:

- A) Baçini
- B) Sternumi
- C) Femuri

- D) Mandibula
- E) Peroniumi

Pyetja 176

Cila prej alternativave nuk shkakton shtim të sekretimit të prolaktinës?

- A) Dieta hiperkalorike
- B) Stresi
- C) Gjumi
- D) Aktiviteti fizik
- E) Thithja e kapecolit të gjirit

Pyetja 177

Nuk shkaktohet shtim i sekretimit të sekretinës në cilën prej gjendjeve:

- A) Reduktim të vëllimit plazmatik
- B) Reduktim të Na
- C) Dhënia e beta-blokuesve
- D) Variacionet hemodinamike të veshkës në lidhje me fluksin intrarenal të gjakut
- E) Hipotensioni

Pyetja 178

Cila prej simptomave nuk është karakteristike e M. Cushing tek një grua:

- A) Obeziteti android
- B) Poliglobulia
- C) Hipotensioni arterial
- D) Hirsutizmi
- E) Akne

Pyetja 179

Acidoza tek diabeti i pa kompensuar shkaktohet nga:

- A) Rritja e formimit të acidit laktik
- B) Lidhet direkt me shpejtësinë e lipolozës ose të këtogjenezës
- C) Lidhet direkt me shpejtësinë glukoneogjenezës
- D) Shkaktohet nga rritja e përqëndrimit të acidit karbonik në gjak
- E) Hipokaliemia

Pyetja 180

Pankreatiti akut mund të shfaqet gjatë:

- A) Hiperkolesterolemisë
- B) Hipertrigliceridemisë
- C) Formë e kombinuar
- D) Hiperkilomikronemisë

E) Hiper-HDL

Pyetja 181

Morbusi i Addison karakterizohet nga:

- A) Humbja me urinën e joneve të klorit e kaliumit
- B) Humbja me urinën e joneve të natriumit
- C) Alkalozë metabolike, hiperkolesterolemi
- D) Humbja me urinën e joneve të magnezit e kalçiumit
- E) Acidozë metabolike

Pyetja 182

Forma më e shpeshtë e hipertiroidizmit tek moshat e reja dhe adulte është:

- A) Adenoma toksike
- B) Tiroiditi subakut
- C) Hipertiroidizmi i induktuar nga jodi
- D) Morbusi i Basedow
- E) Struma multinodulare toksike

Pyetja 183

Cila prej alternativave nuk është karakteristike për hipoparatiroidizmin:

- A) Dhimbje muskulare
- B) Stipsi (kapsllëk)
- C) Bronkospazma/laringospazma
- D) Kalçfikime të nën lëkurës
- E) Parestezi

Pyetja 184

Cila prej patologjive nuk shkakton hipogonadizëm mashkullor hipergonadotrop?

- A) S. Klinefelter
- B) Hiperprolaktinemi
- C) Anorki
- D) Aplasia e qelizave të Leydig
- E) Kriptorkidizëm bilateral

Pyetja 185

GH stimulon sekretimin e cilit prej hormoneve?

- A) IGF-1
- B) GHRH
- C) TSH
- D) ACTH
- E) GnRH

Pyetja 186

Cili prej haplotipeve HLA shoqërohet më shpesh me diabetin tip 1:

- A) DR3
- B) DR4
- C) B8
- D) DR2
- E) DR3, DR4

Pyetja 187

Hormonet tiroidee derivojnë nga metabolizmi i:

- A) Acidi iopanoik
- B) Tirozinës
- C) Pentaiodotironina
- D) Acetilkolina
- E) Kolesterolit

Pyetja 188

Cilat janë karakteristikat klinike më të shpeshta të akromegalisë?

- A) Visheromegali, reduktim të vëllimit të gjymtyrëve të sipërme, obezitet të trupit
- B) Poliuri, polidipsi
- C) Visheromegali, rritje të vëllimit të gjymtyrëve, facies luani
- D) Gjinekomasti
- E) Struma e përhapur

Pyetja 189

Terapia e tiroidit subakut të De Quervain bazohet tek:

- A) Antibiotikë
- B) Kortizonikë
- C) Tiroksina
- D) Tireostatikë
- E) Sulfamidet

Pyetja 190

Diagnoza laboratorike e hipotiroidizmit primitiv bazohet tek:

- A) Niveli i hormoneve tiroidee të lira normal, TSH normal
- B) Niveli i hormoneve tiroidee të lira reduktuar, TSH i rritur
- C) Niveli i hormoneve tiroidee të lira i reduktuar, TSH normal
- D) Niveli i hormoneve tiroidee të lira normal, TSH i pa dozueshëm
- E) Niveli i hormoneve tiroidee të lira reduktuar, TSH i pa dozueshëm

Pyetja 191

Cili ekzaminim është i këshillueshëm për diagnozën e hershme të nefropatisë diabetike?

- A) Echografia renale
- B) Azotemia
- C) Kreatininemia
- D) RMN renale
- E) Mikroalbuminuria

Pyetja 192

Cila prej shenjave nuk është e pranishme në oftalmopatinë basedowiane:

- A) Ezoftalmi
- B) Hemianopsia bitemporale
- C) Kemoza
- D) Neuriti optik
- E) Diplopia

Pyetja 193

Kortizoli:

- A) Është hiperglicemizant
- B) Është hipoglicemizant
- C) Nuk vepron tek glucidet
- D) Stimulon sintezën pankreatike për insulinë
- E) Ka funksion të ngjashëm me insulinën

Pyetja 194

Tumoret hipofizare jo funksionale paraqesin kuadrin klinik me:

- A) Rritje të gjymtyrëve të sipërme
- B) Cefale dhe reduktim të fushëpamjes
- C) Rritje të libidos (dëshirës seksuale)
- D) Hiperidrozë
- E) Gjinekomasti

Pyetja 195

Në pneumoninë nga stafilokoku aureus rezistent ndaj trajtimit me metacilinës, antibiotiku i zgjedhur do të ishte:

- A) vankomicina
- B) oxacillina
- C) gentamicina
- D) piperacillina
- E) klaritromicina

Pyetja 196

Barnat hipoglicemiant të klasës të sulfaniluresë:

- A) jepen gjithmonë si terapi e vetme
- B) stimulojnë prodhimin e insulinës dhe mund të shkaktojnë një hipoglicemi të formës të rëndë
- C) kanë indikacion në diabetin tip 1
- D) në ndryshim nga biguanidet nuk kanë të nevojshme praninë aktive të qelizave beta të pankreasit
- E) mund të antagonizojnë efektin hipoglicemiant të biguanideve

Pyetja 197

Të gjithë antidiabetikët e poshtëshënuar mund të shkaktojnë hipoglicemi, me përjashtim të:

- A) glipizideve
- B) klorpromamideve
- C) tolbutamideve
- D) metforminës
- E) insulinës lantus

Pyetja 198

Cila nga këto barna mund të shkaktojë një agranulocitozë të rëndë?

- A) klozapina
- B) nizatidina
- C) haloperidoli
- D) karbocisteina
- E) kodeina

Pyetja 199

Cilat nga këto barna mund të shfaqin tolerancë nëse përdoren për një kohë të gjatë?

- A) betablokues
- B) statina
- C) antidiabetikët oral
- D) benzodiazepina
- E) antagonistët e kalçiumit

Pyetja 200

Salbutamoli është një:

- A) stimulues i receptorëve beta2-adrenergjik
- B) beta-blokues
- C) antihistaminik
- D) antikolinergjik
- E) asnjë prej tyre

Pyetja 201

Cili nga barnat e poshtëshënuar paraqitet aktiv në luftën ndaj haemofilus?

- A) bacitracina
- B) teikoplanina
- C) cikloserina

- D) ampicilina
- E) penicilina G

Pyetja 202

Të gjithë barnat e mëposhtëm japin nefrotoksicitet me përjashtim të:

- A) amfotericina B
- B) cisplastina
- C) gentamicina
- D) amoksiciklina
- E) vankomicina

Pyetja 203

Të gjithë barnat e poshtëshënuar janë agonist beta-adrenergjik me përjashtim të:

- A) adrenalinës
- B) izoproterenolit
- C) noradrenalinës
- D) fentolaminës
- E) dobutaminës

Pyetja 204

Në kardiopatinë ishemike përdoren të gjithë barnat e poshtëshënuar me përjashtim të:

- A) kortizonikëve
- B) nitroderivateve
- C) beta-blokuesve
- D) ACE inhibitorëve
- E) antiagregantëve

Pyetja 205

Cili bar është një beta bllokues selektiv?

- A) paraktolol
- B) atenolol
- C) soltalol
- D) propanolol
- E) pindolol

Pyetja 206

Amiloroidi është:

- A) diuretik anse
- B) ruan kaliumin në organizëm
- C) diuretik tiazidik
- D) frenues i anhidrazës karbonike
- E) diuretik osmotik

Pyetja 207

Në një pacient me ulje të dëgjimit duhet të jepet:

- A) penicilinë
- B) cefalosporinë
- C) aminoglikozide
- D) karbon
- E) makrolid

Pyetja 208

Në një pacient në terapi me simvastatina, përdorimi i njëkohshëm i klaritromicinës do të jepte:

- A) dhimbje stomaku
- B) miopati dhe rabdomiolizë
- C) cefale
- D) vertigo
- E) somnolencë

Pyetja 209

Pacientit me astëm nuk i jepet asnjëherë:

- A) salbutamol
- B) digoksinë
- C) propanolol
- D) bretilium
- E) lidokainë

Pyetja 210

Cili AIJS është më pak dëmtues i stomakut?

- A) Acidi acetil salicilik
- B) Diklofenaku
- C) Indometacina
- D) Paracetamoli
- E) Sulindac

Pyetja 211

Mekanizmi kryesor me anë të së cilit AIJS dëmtojnë stomakun është:

- A) bllokimi i sekretimit të mukosit gastrik
- B) shtimi i aciditetit
- C) stimulimi i receptorëve histaminik në nivel të mukozës gastrike
- D) bllokimi i sintezës të prostaglandinave
- E) prodhimi i gastrinës



Pyetja 212

Omeprazoli e realizon funksionin e tij falë:

- A) antagonizimit të receptorëve H<sub>2</sub>
- B) bllokimit të pompës protonike
- C) frenimit të antiporterit Na<sup>+</sup>/H<sup>+</sup>
- D) veprimtarisë antivirale
- E) veprimtarisë antikolinergjike

Pyetja 213

Në shok anafilaktik duhet realizuar menjëherë terapia me:

- A) kardiotonik
- B) adrenalinë dhe kortizonik
- C) diuretik
- D) dopaminë dhe antihistaminik
- E) anksiolitik

Pyetja 214

Efekti anësor që shfaqet gjatë terapisë me hekur është:

- A) çrregullime gastrointestinale
- B) kollë
- C) hipertension
- D) përgjumje
- E) alterime të diurezës

Pyetja 215

Cili nga këto barna mund të shkaktojë kollë :

- A) nitroderivatet
- B) antagonistët e kalçiumit
- C) ACE inhibitorët
- D) Antagonistët e receptorëve alfa 1 adrenergjik
- E) AIJS

Pyetja 216

Në një pacient diabetik insulino vartës, moshë e tretë, cili është beta bllokuesi i përshtatshëm për trajtimin e anginës dhe hipertensionit?

- A) propanolol
- B) pindolol
- C) atenolol
- D) nadolol
- E) timolol

Pyetja 217

Cil nga barnat e poshtë shënuar është një barbiturat që përdoret si antiepileptik?

- A) Pentobarbital
- B) Tiopental
- C) Fenobarbital
- D) Diazepam
- E) Secobarbital

Pyetja 218

Barnat me efikas në reduktimin e nivelit plazmatik të triglicerideve janë:

- A) Statinat
- B) Rezinat jonoshkëmbyese
- C) Fibratet
- D) Frenuesit e lipazës pankreatike
- E) Asnjë prej tyre

Pyetja 219

Në helmimet nga opiatet pupilat janë:

- A) Miotike
- B) Midriatike
- C) Anizokorike
- D) Hiper reflektore
- E) Nuk reagojnë

Pyetja 220

Cili bar mund të antagonizojë frenimin e procesit të frymëshkëmbimit të induktuar nga morfina?

- A) Buprenorfina
- B) Pentazocina
- C) Naloxoni
- D) Metadoni
- E) Kodeina

Pyetja 221

Kokaina ka veprime të tipit :

- A) Simpatolitike
- B) Miorelaksante
- C) Parasimpatomimetike
- D) Anestetike lokale
- E) Spazmolitike

Pyetja 222

Një prej këtyre cefalosporinave përthithet mirë me rrugë orale. Tregoni cila:

- A) Cefalotina
- B) Cefaloridina
- C) Cefalexina
- D) Cefamandoli
- E) Cefuroksima

Pyetja 223

Manitoli është:

- A) Antikoagulant oral
- B) Diuretik osmotik
- C) Beta bllokues
- D) Antagonist i kalçiumit
- E) Antidot në rastet e helmimit me plumb

Pyetja 224

Simptomat më të rënda të abstinencës nga morfina vihen re pas:

- A) 2-4 orëve
- B) 10-20 orëve
- C) 24-72 orëve
- D) 5-8 ditëve
- E) 14 ditëve

Pyetja 225

Të gjitha situatat e më poshtme mund të shkaktojnë hipogliceminë me përjashtim të:

- A) Insulinoma
- B) Mungesa e glukozë-6fosfatit
- C) Sëmundja Addison
- D) Feokromocitoma
- E) Përdorimi i insulinës

Pyetja 226

Të gjitha situatat e më poshtme mund të shkaktojnë hipokalçeminë me përjashtim të:

- A) Hipoparatiroidizmi
- B) Sindroma Cushing
- C) Sekretimi i shtuar i kalçitoninës
- D) Hiperparatiroidizmi
- E) Mungesa e vitaminës D

Pyetja 227

Osteoporoza tip I lidhet me mungesën e hormonit:

- A) Kalçitoninë
- B) Testosteron

- C) Estrogjen
- D) Parathormon
- E) Tireotrop

Pyetja 228

Cilat anomali elektrolitike hasen më shpesh në sëmundjen Addison?

- A) Hiperglicemia
- B) Hipokalçemia
- C) Hipokalemia
- D) Hipernatremi dhe hipokalemi
- E) Hiponatremi dhe hiperkalemi

Pyetja 229

Sëmundja Graves:

- A) Është një shfaqje e mbifunksionit të surenales
- B) Është një formë hipotiroidizmi me etiologji autoimunitare
- C) Është një formë hipertiroidizmi
- D) Asnjë nga këto

Pyetja 230

Feokromocitoma është një neoplazi e cilës prej këtyre strukturave?

- A) Shtresës kortikale të gjëndrës mbiveshkore
- B) Shtresës medulës renale
- C) Shtresës medulare të gjëndrës mbiveshkore
- D) Hipofizës
- E) Timusit

Pyetja 231

Hipertiroidizmi sub-klinik shoqërohet me:

- A) Nivel të rritur të TSH
- B) Nivel të ulur të rT3
- C) Nivel të ulur të TSH dhe nivel normal të FT4
- D) Nivel të ulur të TSH dhe nivel të rritur të FT4
- E) Titër të rritur të antikorpeve

Pyetja 232

Cili nga hormonet e poshtë shënuar mund të japi hiponatremi nëse sekretohet me shumicë?

- A) Angiotenzina II
- B) PAN (peptitdi natri uretik)
- C) Vazopresina/hormoni antidiuretik
- D) Aldosteroni
- E) Testosteroni

Pyetja 233

Pasojat klinike më të shpeshta në tiroiditin Hashimoto përfshijnë:

- A) Hipertiroidizëm subklinik
- B) Galaktorre
- C) Hipoparatiroidizëm
- D) Hipertiroidizëm në fazën e parë, hipotiroidizëm përfundimtar
- E) Sëmundje të tjera autoimune

Pyetja 234

Nivelet e rritura të prolaktinës mund të:

- A) Frenojnë sekrecionin pulsatil të GnRH
- B) Induktojnë ulje të testosteronit qarkullues
- C) Përcaktojnë rënien e libidos
- D) Të gjitha përgjigjet më lart janë të sakta
- E) Provokojnë amenorre

Pyetja 235

Në një pacient me ketoacidozë diabetikë duhet të ruhet:

- A) Fosfori
- B) Bikarbonati
- C) Kalçiumi
- D) Kaliumi
- E) Magnezi

Pyetja 236

Diabeti mellitus tip 1 shoqërohet me të gjitha elementët e poshtëshënuar me përjashtim të:

- A) Poliuri
- B) Polifagi
- C) Shtim në peshë
- D) Polidipsi
- E) Dhimbje abdominale

Pyetja 237

Akromegalia është:

- A) Një sëmundje e kockave
- B) Një sëmundje e hasur në zonat malore
- C) Një hipersekretim kronik i hormonit të rritjes pas pubertetit
- D) Një sëmundje e rëndë maniakale
- E) Policitemia e aviatorëve

Pyetja 238

Në cilën nga sëmundjet e më poshtëme, ketoacidoza paraqitet si ndërlikim madhor dhe i shpeshtë:

- A) Diabeti tip 1
- B) Diabeti tip 2
- C) Hipertensioni arterial
- D) Diabeti insipid
- E) Hipertiroidizmi

Pyetja 239

Hiponatremia mund të vihet re në të gjitha situatat e mëposhtme me përjashtim të:

- A) Hiperkortikozismen
- B) Diabeti insipid
- C) Abuzimi në përdorim të diuretikëve
- D) Ushqyerja me sondë
- E) Polidipsia e moshave të treta

Pyetja 240

Hipokalçemia është ndërlíkimi që haset:

- A) Pas ushtrimeve fizike
- B) Në hipogonadizëm
- C) Pas tiroidektomisë totale
- D) Pas menopauzës jatrogjenike
- E) Gjatë trajtimit me anksiolitik

Pyetja 241

Cila prej familjeve enzimatiske ndërhyjnë në procesin vaskular të erektimit:

- A) Hidroksilazat
- B) Nitroksid-sintetazat + fosfodiesterazat
- C) Peroksidazat
- D) Aromatazat+hidroksilazat
- E) Transferazat

Pyetja 242

Ushtrimet fizike të vazhdueshme:

- A) Rritin kolesterolin HDL
- B) Ulin kolesteroleminë totale
- C) Përmirësojnë tolerancën ndaj glucideve
- D) Japin të gjithë efektet e përmendura më lart
- E) Përmirësojnë BMI (Body Mass Index)

Pyetja 243

Cili është shkaku më i shpeshtë i insuficiencës akute kortikozsurenale?

- A) Sindroma Sheehan
- B) Insuficiencia surenale sekondare si pasojë e ndërprerjes të trajtimit me steroid
- C) Sindroma Schmid
- D) Sindroma Waterhouse-Fridrischen
- E) Insuficiencia surenale primare me etiologji tuberkulare

Pyetja 244

Sasia ditore e proteinave që duhet të merren me dietë është:

- A) 40-50% të energjisë
- B) 30-40% të energjisë
- C) 0.8 gr/kg peshë

- D) 1.5 gr/kg peshë
- E) 2 gr/kg peshë

Pyetja 245

Në cilat vlera të BMI (Body Mass Index) do të konsiderohej një grua mbipeshë?

- A) Midis 20-25
- B) Midis 25-30
- C) Midis 30-35
- D) Më shumë se 27.5
- E) Më shumë se 30

Pyetja 246

Në cilën sëmundje vihet re një ulje e "peshës specifike" të urinës?

- A) Diabet mellitus
- B) Cirroza hepatike
- C) Diabet insipid
- D) Hiperaldosteronizëm
- E) Hipertension arterial

Pyetja 247

Cila nga këto ndryshime nuk vihet re në sëmundjen Addison?

- A) Rritje e sasisë të Na<sup>+</sup> në gjak
- B) Rritje e sasisë të K<sup>+</sup> në gjak
- C) Rritje e azotemisë
- D) Hollim i urinës
- E) Rritje e hematokriti

Pyetja 248

Në cilën sëmundje është e pranishme hiperkalemia?

- A) Sëmundja Addison
- B) Diabet Mellitus
- C) Sindroma Gilbert
- D) Cirroza hepatike
- E) Tireotoksikoza

Pyetja 249

Në kuadër të MEN 1 cili nga këto organe preket më rrallë?

- A) Gjëndrat paratiroide
- B) Pankreasi
- C) Hipofiza
- D) Gjëndrat surenale
- E) Të gjitha

Pyetja 250

Trajtimi i hiperaldosteronizmit primar përfshin:

- A) Dieta e varfër me kripë
- B) Ndërhyrje kirurgjikale
- C) Përdorim të spironolaktonit
- D) Të gjitha
- E) Asnjë prej tyre

Pyetja 251

Në diagnozën e hipogonadizmit mashkullor është thelbësore të vlerësojmë:

- A) Përqëndrimin plazmatik të testosteronit të lirë
- B) Përqëndrimin plazmatik të testosteronit total
- C) LH, testosteron dhe SHBG
- D) FSH, PRL dhe estradiol
- E) Testi hCG për testosteronin

Pyetja 252

Obeziteti, steriliteti, hirsutizmi dhe ovari polistik janë karakteristike të sindromit:

- A) Meniere
- B) Turner
- C) Frolich
- D) Stein-Leventhal
- E) Klinefelter

Pyetja 253

Të gjitha pohimet e më poshtme në lidhje me diabetin tip 2 janë të vërteta me përjashtim të:

- A) shoqërohet me insulinorezistencë
- B) shoqërohet me obezitet
- C) nuk ka shoqërim fmailjar
- D) shoqërohet me HTA
- E) shoqërohet me retinopati

Pyetja 254

Cili prej pohimeve të mëposhtme është i vërtetë në lidhje me tiroiditin subakut?

- A) Është forma më e shpeshtë e tiroiditit
- B) Është me etiologji virale
- C) Është me etiologji autoimune
- D) Nuk shoqërohet me infiltrim granulomatoz
- E) Prek kryesisht meshkujt e bardhë

## 02.Pneumatologji dhe Hematologji

Pyetja 1

Një djale 25 vjeç verën, ndersa po rruhej, shfaqjen e një zmadhimi limfonodal ne nivelin laterocervikal. Nuk ankon asnjë simptome. Ne egzaminimin objektiv përveç limfonodulit qe ka pare djali janë prezent edhe limfonoduj te tjere ne te njejtin regjion. R

- A) I
- B) II



- C) IE
- D) III
- E) IV

#### Pyetja 2

Kriter kryesor për diagnozën e krizës blastike gjatë ecjes së leukozës mieloidë kronike është prezenca e :

- A) hiperuricemia
- B) blastet në palcën e kockës mbi 30%
- C) reduktimi i numrit të rruazave të kuqe
- D) limfoblastoza në palcën e kockës
- E) limfocitoza periferike

#### Pyetja 3

Një pacient diabetik 50 vjeç shtrihet për shkak të shfaqjes së një krize hipoglicemike. Gjatë ecjes së sëmundjes evidentohet një anemi e shkallës së moderuar me një trombocitozë të lehtë [527000/ micron/L].

Hemoglobina e tij është 10 g/dL, MCV [volumi korpuskular me

- A) të kërkohej gjaku okult në fecë dhe të planifikohet për një fibrogastroskopi dhe një kolonoskopi të plote
- B) të pritet 6 muaj dhe të rivelesohet
- C) të nxjerresh nga spitali pa lëvizje
- D) të fillohet terapia me preparate të hekurit
- E) të dërgohet tek mjeku kurues që të vazhdojë me analizë

#### Pyetja 4

Në prani të petekieve dhe të purpurave duhet vlerësuar se çfarë është:

- A) trombocitopenia
- B) mungesa e faktorëve të koagulimit
- C) trombocitoza
- D) hiperkolesterolemia
- E) alterimi i funksionit trombocitar

#### Pyetja 5

Faktori Hageman është :

- A) faktori trombocitar III
- B) faktori X
- C) faktori XII
- D) kalikreina
- E) faktori ristocetinik

#### Pyetja 6

Trajtimi i perzgjedhur i leukemisë mieloidë kronike tek moshat e reja është :

- A) radioterapia
- B) monokimioterapia
- C) polikimioterapia
- D) transplantimi allogjenik i palcës së kockës

E) terapia me interferon

Pyetja 7

Një grua 56vjeç me një histori progresive të karcinomes së ovarit të trajtuar me kimioterapi disa vite më parë, referon shfaqjen koheve të fundit të astenise dhe të hemorragjive të vogla në nivel të kraheve. Vlerat e hemogrames janë si më poshtë: Hemoglob

- A) leukemia limfoblastike akute
- B) anemia megaloblastike
- C) sindrom mielodisplazik
- D) leukemia mieloblastike akute
- E) leukemia mieloide kronike

Pyetja 8

Deformimi si draper i eritrociteve i detyrohet :

- A) alterimet çilesore të hemoglobines
- B) rregullimet elektrolitike
- C) antikorpet
- D) alterimet mitokondriale
- E) sinteza defekte e sasijore e hemoglobines

Pyetja 9

Diagnoza e leukemise akute mund të vihet vetëm në bazë të :

- A) biopsies së palcës së kockës ose mielogrames
- B) egzaminimit të formulës leukocitare
- C) biopsisë së limfonodulit
- D) biopsies splenike
- E) hemogrames

Pyetja 10

Pacienti me hemolizë intravaskulare mund të paraqesë të gjitha shenjat klinike dhe laboratorike të mëposhtme, PËRVEÇ :

- A) niveleve të ulta të haptoglobines
- B) shtimit të bilirubines indirekte
- C) hemoglobinurisë e hemosiderurisë
- D) splenomegalisë
- E) shtimit të Laktatdehidrogjenazës

Pyetja 11

Në remisioin komplet të leukemise akute numri i blasteve në palcën e kockës nuk duhet të jetë më i lartë sesa :

- A) 30%
- B) 20%
- C) 5%
- D) 40%
- E) 50%

Pyetja 12

Çfarë është hiatus leucaemicus:

- A) mungesa e formave me maturim të ndërmjetëm në gjakun periferik
- B) një komplikacion i leukemisë
- C) një variant i nendarjeve të leukemisë
- D) një ilaç antitumorik
- E) mungesa e formave të pjekura në palcën e kockës

Pyetja 13

Te gjithë pacientët me sindrom mielodisplazik paraqesin :

- A) sideroblaste unazore
- B) një numër blastesh >5%
- C) anomalitë kromozomike jo rastësore
- D) displazi në të gjitha linjat qelizore të palcës së kockës
- E) transformim në leukemia akutë

Pyetja 14

Cila prej anemisë të mëposhtme ka mundësi më të mëdha të përgjigjet administrimit të eritropoietinës :

- A) anemia sideropenike
- B) anemia pernicioze
- C) anemia nga insuficienca renale
- D) anemia hemolitike autoimmune
- E) anemia sideropenike

Pyetja 15

Grupet Auer gjenden në mënyrë karakteristike :

- A) në mieloblastet
- B) në mielocitet
- C) në limfoblastet
- D) në eritroblastet
- E) në limfocitet

Pyetja 16

Rritja e IgE serike mund të observohet më shpesh në :

- A) leukemine mieloidë kronike
- B) anemine hemolitike nga defekti i PK
- C) parazitozë
- D) favizem
- E) saturnizem

Pyetja 17

Anemite megaloblastike karakterizohen nga :

- A) mikrocytoza e elementeve të figuruar të gjakut e shoqëruar me deficit të folateve dhe /ose vitaminës B12

- B) retikulocitoza
- C) mungesa e folateve dhe/ose vitamines B12
- D) ikteri
- E) megakoloni toksik

Pyetja 18

Ne anemine nga mungesa e hekurit transferrina është :

- A) normale
- B) e ulur
- C) e rritur
- D) pothuajse mungon
- E) pa rendesi

Pyetja 19

Morbus Cooley është :

- A) një beta-talasemi
- B) një alfa-talasemi
- C) një anemi enzimodeficitare
- D) një disprotidemi
- E) deficit i vitamines B12

Pyetja 20

Hiperuricemia është e shpëstët ne :

- A) hemofili
- B) mononukleozen infective
- C) leukemine mieloide kronike nen trajtim citoreduktues
- D) sindromin Gilbert
- E) aplazine medulare

Pyetja 21

Ne hemofili cilat prej testeve te mëposhtme janë te alteruar ;

- A) koha e koagulimit
- B) koha e hemorragjise
- C) koha e protrombines
- D) fraxhiliteti kapilar
- E) eritrosedimenti

Pyetja 22

Kontrolli i terapise heparinike realizohet me :

- A) vleresimin e trombociteve
- B) kohen e hemorragjise
- C) proven e lakut
- D) dozimin e fibrinogjenit
- E) kohen e tromboplastines parciale

Pyetja 23

Ne egzaminimin objektiv, një pacient me Purpur trombocitopenike idiopatike përveç petekieve dhe ekimozave mund të prezantojë edhe :

- A) një egzaminim fizik normal
- B) limfadenomegali
- C) hepatomegali
- D) splenomegali
- E) Temperaturë të lartë

Pyetja 24

Cila nga situatat e mëposhtme të bëjnë të dyshosh për praninë e një leukocitoze neutrofile :

- A) infeksioni viral
- B) parazitoza
- C) infeksioni bakterial
- D) alergjia
- E) asgjë patologjike

Pyetja 25

Biosinteza e hemit nga ana e eritroblasteve ndodh :

- A) në ribosome
- B) në mitokondria
- C) në unazat Cabot
- D) në trupzat Heinz
- E) në nukleolat

Pyetja 26

Hemofilia C vjen si pasojë e mungesës së:

- A) faktorit II
- B) faktorit V
- C) faktorit VIII
- D) faktorit XI
- E) faktorit IX

Pyetja 27

Ngrenia e batheve mund të provokojë një anemi grave hemolitike në pacientet të cilët kanë një deficit të ciles prej enzimave të mëposhtme:

- A) piruvatkinazës [PK]
- B) gamma glutamilcistein sintetazës
- C) glutation sintetazës
- D) glukozë-6-fosfat dehidrogjenazës [G6PDH]
- E) laktatdehidrogjenazës

Pyetja 28

Një pacient 18 vjeç me një hemofili A të lehtë [ niveli i faktorit VIII=15%] është diagnostikuar nga një histori familjare pozitive por që nuk ka pasur asnjëherë nevojë për trajtim meqenese nuk ka pasur fenomene hemorragjike, duhet të nënshtrohet një interveni

- A) koncentrat I faktorit VIII
- B) krioprecipitat
- C) plazmee fresket e ngrire
- D) desmopressina [ DDAVP]
- E) asnjë trajtim

Pyetja 29

Te gjitha komplikacionet e mëposhtme mund te gjenden ne një pancitopeni si pasoje e mosfunksionit te palces se kockes PËRVEÇ:

- A) tromboza
- B) asthenia, te ndjerit keq ne pergjithesi
- C) hemorragjite gingivale
- D) sepsis
- E) zbehja

Pyetja 30

Trombocitoza esenciale dhe policitemia vera janë :

- A) sindroma mielodisplasike
- B) sëmundje sekondare nga inflamacioni kronik
- C) aplazi medulare
- D) sindroma mieloproliferative kronike
- E) shpesh te lidhura me imunodeficiencat

Pyetja 31

Antitruapat antifosfolipidike gjenden shpesh gjate :

- A) anemise aplastike
- B) lupusit eritematoz sitemik
- C) tumoreve ovariene
- D) tumoreve gastrike
- E) leukemise mieloide kronike

Pyetja 32

Testi i Coombs indirect pozitiv tregon per :

- A) reaksion imunologjik tip III
- B) pranine e antitrupeve antieritrocitare jokomplete ne serum
- C) deficit te piruvat kinazes
- D) ekspozim progresiv ndaj primaquines
- E) reaksion te rende transfuzionine veprim

Pyetja 33

Retikulocitet janë :

- A) qeliza te sistemit retikuloendotelial
- B) qeliza me system retikuloendoplazmik shumë te zhvilluar
- C) eritrocite te reja
- D) granulocite te vjeter
- E) eritrocite te vjeter

Pyetja 34

Kriza retikulocitare verifikohet gjate :

- A) anemise hemolitike
- B) anemise pernicioze ne trajtim me vitaminen B12
- C) policitemise vera nen trajtim me hidroksiure
- D) trombozes intravaskulare te diseminuar
- E) eritroleukemise

Pyetja 35

Cila prej sëmundjeve te mëposhtme nuk i perket te ashtuquajturave syndrome mieloproliferative kronike :

- A) mielofibroza idiomatike
- B) leukemia me qeliza me qime [ tricoleukemia]
- C) leukemia mieloide kronike
- D) policitemia vera
- E) trombocitemia esenciale

Pyetja 36

Cila nga situatat e mëposhtme haset ne policitemi :

- A) leucopenia
- B) hemoviskozimetria normale
- C) shtimi i serise se kuqe ne palcen e kockave
- D) hypotensioni sitemik
- E) poliuria

Pyetja 37

Cila nga rezultatet e mëposhtme tregon per një anemi aregjenerative :

- A) vellimi korpuskular mesatar [MCV] normal
- B) numri i reduktuar i retikulociteve
- C) shtimi i shperndaries se gjeresise se ruazave te kuqe [RDW]
- D) niveli i ulur i hemoglobines
- E) sideremia e rritur

Pyetja 38

Makroglobulinemia Waldentrom është e karakterizuar nga një shtim monoclonal i

- A) IgG
- B) IgA
- C) IgE
- D) IgD
- E) IgM

Pyetja 39

Rezistenca globulare rritet ne :

- A) anemine pernicioze

- B) anemine hemolitike
- C) sarkoidoze
- D) mikrocitoze
- E) sferocitozen hereditare

Pyetja 40

Leukemia lifoide kronike është :

- A) një sëmundje me akumulim të limfociteve B poliklonale
- B) një sëmundje me një linfofopeni të moderuar
- C) një sëmundje me akumulim të plazmociteve
- D) një sëmundje e karakterizuar nga prania e kromozomit Philadelphia
- E) një sëmundje me akumulim të limfociteve B monoklonale

Pyetja 41

Transplanti palces së kockës indikohet në :

- A) Pancitopeninë periferike me palce të pasur
- B) aplazinë medulare grave dhe në leukemite akute
- C) Anemine pernicioze
- D) Anemine sideropenike
- E) Leukemine linfoide kronike

Pyetja 42

Fillimi i leukemisë acute mund të jetë i karakterizuar nga :

- A) Infeksioni febril rezistent ndaj mjekimit
- B) Hipergammaglobulinemia poliklonale
- C) prania në serum të një piku monoclonal
- D) Hiperkalcemia
- E) Hiperkolesterolemia shumë e lartë

Pyetja 43

Endokrinopatitë e mëposhtme mund të jenë të gjitha shkak direkt i një anemie aregjenerative ,  
PËRVEÇ :

- A) hiperparatiroidizmi
- B) hipotiroidizmi
- C) hipopituitarizmi
- D) diabeti mellitus
- E) hipogonadizmi

Pyetja 44

Në Cilën prej patologjive të mëposhtme verifikohet më shpesh trombocitoza:

- A) leukemine limfoblastike acute
- B) leukemine mieloblastike acute
- C) leukemine mieloide kronike
- D) morbus Waldenström
- E) morbus Werlhof



Pyetja 45

Prezenca e artritit reumatoid, splenomegalise, neutropenise është karakteristike gjate :

- A) konektivitetit miks
- B) LES
- C) sindromit Goodpasture
- D) sëmundjes Chediak-Higashi
- E) sindromit Felty

Pyetja 46

Heparina fuqizon veprimin e :

- A) Antitrombines III
- B) Fibrinogjenit
- C) Faktorit VIII
- D) Tromboplastines
- E) Trombones

Pyetja 47

Ne organet e mëposhtëme gjenden ne sasi te madhe limfocitet T , PËRVEÇ :

- A) Linfonodujve
- B) Shpretkes
- C) Timusit
- D) Gjakut periferik
- E) Traktit gastrointestinal

Pyetja 48

Një pacient me deficit te Glukoze-6fosfat dehidrogjenazes [G-6-PD] duhet te evitoje te gjitha këto më poshtë, PËRVEÇ :

- A) Batheve
- B) Chinines
- C) Clorochines
- D) Cefalotines
- E) Sulfamidikeve

Pyetja 49

Cila nga pergjijet e mëposhtme NUK SHOQEROHET me një anemi hemolitike me atitropa te ngrohte :

- A) Linfomat jo hodgkiniane
- B) Fenomeni Raynaud
- C) Sferocitoza
- D) Testi Coombs direct pozitiv
- E) Splenomegalie

Pyetja 50

Cila nga situatat e mëposhtme është ME PAK PROBABEL qe te shoqerohet me një hipereozinofili ?

- A) Infeksionet nga stafilokoku aureus
- B) Leukemia mieloide kronika

- C) Infeksionet parazitare
- D) Sindomi hipereozinofilik
- E) Astma

Pyetja 51

Shizocitet janë elemente te figuruar te gjakut :

- A) Hipokromike
- B) Me dimensione te medha
- C) Te fragmentuar
- D) Ne forme rrakete
- E) Target

Pyetja 52

Sindromi I hiperviskozitetit observohet me shpesh gjate :

- A) Anemive hemolitike autoimmune
- B) Mielomes multiple
- C) Insuficiences respiratore kronike
- D) Leukemise limfoblastike acute
- E) Hemoglobinopative

Pyetja 53

Cila prej ketyre shenjave dhe simptomave shoqeron me shpesh mielomen multiple :

- A) Petekiet
- B) Linfadenopatia
- C) Rubeosis
- D) Splenomegalia
- E) Dhimbjet kockore

Pyetja 54

Koha e protrombines influencohet prej :

- A) Deficiti i faktorit VII
- B) Shtimit te faktorit antiheparinik
- C) Uljes se numrit te trombociteve
- D) Deficiti i faktorit VIII
- E) Deficiti i faktorit IX

Pyetja 55

Zhdukja e nukleolave verehet ne :

- A) Mielocitet
- B) Promielocitet
- C) Mieloblastet
- D) Ne metamielocitet
- E) Ne granulocitet e pasegmentuar

Pyetja 56

Hapi i pare per te diagnostikuar policitemine vera është :

- A) Te percaktohet niveli serik I eritropoietines
- B) Te percaktohet masa e rruazave te kuqe te gjakut dhe e volumit plazmatik
- C) Te behet një ekografi renale
- D) Te behet astrupograma
- E) Te matet fosfatazaalkaline leukocitare

Pyetja 57

Varianti histologjik me malinj i M. Hodgkin është :

- A) Me qeliza te klivuara
- B) Me prevalence linfocitare
- C) Me deplecion linfocitar
- D) Skleroza nodulare
- E) Si qiell me yje

Pyetja 58

Manifestimet klinike te një anemie nga mungesa e vitamins B12 janë te gjitha reversible me administrimin e vitamins B12, PËRVEÇ :

- A) Demet ne palcen e kockes
- B) Anemia
- C) Neutropenia
- D) Trombocitopenia
- E) Neuropatia periferike

Pyetja 59

Pacienti me hemolize akute mund te paraqese te gjitha të dhënat klinike e laboratorike, PËRVEÇ :

- A) Shtim i MCV me polikromatofili
- B) Hiperplazise ne nivel medular
- C) Litiazes biliare
- D) Hiperbilirubinemia indirekte
- E) Shtimi i laktatdehidrogjenazes

Pyetja 60

Janë shkak i poliglobulise sekondare :

- A) Hemofilite
- B) Hemorragjia kronike
- C) Insuficienca respiratore kronike
- D) Leukemia mieloide kronike
- E) Policitemia vera

Pyetja 61

Organi madhor hematopoietik ne jeten embrionale është :

- A) Palca e kockes hematopoietike
- B) Melcia
- C) Shpretka
- D) Sakusi Vitelin

E) Linfonodujt

Pyetja 62

Probabiliteti qe një fëmijë mashkull i një pacienti me hemofili grave te kete hemofili është :

- A) 75%
- B) 25%
- C) 50%
- D) 0%
- E) 100%

Pyetja 63

Kromozomi Philadelphia [Ph<sup>1</sup>] është një marker citogenetik ne një prej situatave te mëposhtme :

- A) Eritroleukemia
- B) Hairy cell leukemia
- C) Leukemia prolinfocitike
- D) Kriza blastike me fenotip eritroid ne LMC
- E) Leukemia mieloide kronike

Pyetja 64

Deficit i vitamines K evidentohet nga një prej analizave te mëposhtme :

- A) Numri i trombociteve
- B) Koha e tromboplastines parciale [PTT]
- C) Koha e protrombines [PT]
- D) Koha e trombines
- E) Koha e hemorragjise

Pyetja 65

Gjate periudhes qe pason transplantin allogjenik te palces se kockes, komplikacionet e mëposhtme i detyrohen gjendjes imunitare te marresit , PËRVEÇ :

- A) Infeksionet mykotike
- B) Reaksionet e flakjes
- C) Graft versus host disease
- D) Herpes - Zoster
- E) Pneumonia intersticiale

Pyetja 66

Cila nga situatat e mëposhtme NUK SHOQEROHET me një zgjatje te kohes se hemorragjise :

- A) Hemofilia
- B) Trombocitopenia grave
- C) Mieloma multiple
- D) Uremia
- E) Morbus vonWillebrandt

Pyetja 67

Splenomegalia është një hasje frekvente ne diagnose gjate :

- A) Mielomes multiple
- B) Mykozes fungoide
- C) Leukemise mieloide kronike
- D) Anemise aplastike
- E) Hemofilise

2

Pyetja 68

Cila nga situatat e me poshtme i perket sindromeve mieloproliferative kronike ?

- A) Leukemia me qeliza me qime
- B) Leukemia mieloblastike
- C) Mielofibrozi idiopatik
- D) Leukemia plazmocelulare
- E) Mieloma multiple

Pyetja 69

Probabiliteti qe vajza e një pacienti me hemofili B te jete një bartese e hemofilise është :

- A) 0%
- B) 25%
- C) 100%
- D) 75%
- E) 50%

Pyetja 70

Eozinofilia mund te haset me shpesh gjate :

- A) Leukemise mielomonocitike
- B) Mielomes multiple
- C) Morbus Hodgkin
- D) Leukemise limfoide kronike
- E) Agranulocitozes

Pyetja 71

Sindromi Sezary është :

- A) Një limfome me limfocite T
- B) Një variant i talasemise
- C) Një leukemi limfoide kronike me infiltrim kutan
- D) Një difekt congenital i IgG
- E) Një variant i leukemise mieloide kronike

Pyetja 72

Nder tumoret primitive te shpretkes, cilet prej tyre janë me te shpështët:

- A) Fibroma
- B) Linfomat
- C) Hemangiomat
- D) Miomat
- E) Linfangiomas

Pyetja 73

Një situatë e një anemie të rëndë sideropenike mund të shkaktohet nga :

- A) Mosmarrje adekuatë e folateve
- B) Bronkopneumonite recidivante
- C) Dietat vegjetariane
- D) Menorragji të persistente
- E) Hepatopatia alkoolike

Pyetja 74

Faktori kryesor që rregullon aktivitetin eritropoietik është :

- A) Veshka
- B) Ferritina
- C) Oksigjeni
- D) Unitete formuese të kolonive eritroide
- E) Palca hemopoietike

Pyetja 75

Cila prej këtyre anemive hemolitike është e shkakuar prej defektit congenital të një enzime eritrocitare [G6PDH]:

- A) Stomatocitoza
- B) Sferocitoza
- C) Elipsocitoza
- D) Favizmi
- E) Hemoglobinuria paroksistike e të ftohtit

Pyetja 76

Vitamina K është e nevojshme për sintezën e secilit prej faktorëve të mëposhtëm të koagulimit, PËRVEÇ se për sintezën e faktorit :

- A) II
- B) X
- C) IX
- D) VII
- E) V

Pyetja 77

Të gjitha pohimet e mëposhtme në lidhje me insuficiencën respiratore janë të vërteta, me përjashtim të:

- A) raporti ventilim-perfuzion paraqitet i ndryshuar në SPOK (sëmundje pulmonare obstruktive kronike) dhe në emfizemën pulmonare
- B) hipoksia është gjithmonë e pranishme
- C) kapaciteti vital paraqitet i ulur në insuficiencën respiratore të tipit restriktiv
- D) hiperkapnia nuk është gjithmonë e pranishme
- E) përqëndrimi alveolar i oksigjenit është më i madh se ai i dioksidit të karbonit

Pyetja 78

Si paraqitet dispnea?

- A) gjithmonë në inspiracion
- B) gjithmonë në ekspiracion
- C) gjithmonë në inspiracion dhe ekspiracion
- D) varet nga presioni i gjakut në qarkullimin pulmonar
- E) ose në inspiracion ose në ekspiracion

Pyetja 79

Cianoza haset në të gjitha situatat e më poshtme me përjashtim të:

- A) poliglobulisë
- B) embolisë pulmonare
- C) metahemoglobinemisë
- D) qëndrimit për kohë të zgjatur në lartësi të mëdha mbi nivelin e detit
- E) anemise të rënde

Pyetja 80

Versamenti pleural paraqitet me natyrë hemorragjike në të gjitha situatat e poshtë shënuara me përjashtim të:

- A) embolisë pulmonare
- B) karcinomës pulmonare
- C) insuficiencës kardiake
- D) mezoteliomës
- E) karcinomës të gjëndrave mamae

Pyetja 81

Imunoglobulinat sekretore IgA prodhohen nga:

- A) pneumocistet tip 1
- B) pneumocistet tip 2
- C) qelizat endoteliale
- D) qelizat e epitelit bronkial
- E) makrofagët alveolar

Pyetja 82

Acidoza respiratore e çekuilibruar, në astrupogramë karakterizohet nga:

- A) rritje e Ph, rritje e PaO<sub>2</sub>, ulje e PaCO<sub>2</sub>
- B) ulje e Ph, rritje e PaCO<sub>2</sub>
- C) ulje e Ph, ulje e PaCO<sub>2</sub>
- D) rritje e Ph, ulje e PaCO<sub>2</sub>
- E) Ph normal, PaCO<sub>2</sub> i ulur

Pyetja 83

Shkaku kryesor i bllokimi të rrugëve ajrore në një pacient i cili ka humbur vetëdijen është:

- A) rënia e gjuhës prapa
- B) fleksioni i epiglotisit
- C) bronkospazma
- D) bllokimi nga grumbullimi i pështymës
- E) kolabimi i trakesë

Pyetja 84

Në insuficiencën respiratore në një pacient obez:

- A) alterimi i funksionit mbizotëron gjatë fazës të inspirimit
- B) alterimi i funksionit mbizotëron gjatë fazës të ekspirimit
- C) të dy fazat e ajrosjes të mushkërive janë të prekura
- D) ka ndryshuar shkëmbimi alveolo-kapilar i gazeve
- E) rritet vëllimi rezidual

Pyetja 85

Në cilën formë të insuficiencës respiratore rritet gjithmonë PaCO<sub>2</sub>?

- A) në insuficiencën ventilatore të pompës
- B) në insuficiencën e shkëmbimit të gazeve në mushkëri
- C) në pamjaftueshmërinë e oksigjenit që marrë/transportuar dhe përdorur
- D) në asnjë nga këto raste

Pyetja 86

Cila nga këto është shkaku më i shpeshtë i embolisë pulmonare?

- A) tromboza e venave sipërfaqësore të gjymtyrëve të poshtme
- B) tromboza në atriumin e djathtë
- C) tromboza e venave të thella të gjymtyrëve të poshtme
- D) endokarditi bakterial
- E) embolia gazoze nga vatrat e frakturave

Pyetja 87

Të gjitha pohimet e më poshtme në lidhje me apnenë obstruktive të gjumit janë të vërteta me përjashtim të:

- A) favorizohen nga përdorimi i pijeve alkolike
- B) shoqërohen me periudha të zgjatura hipoksie dhe hiperkapnie
- C) shkaktojnë një frenim të sistemit nervor simpatik
- D) vihen re në personat që janë shumë obez
- E) faringju në këto raste është lehtësisht i kolabueshëm

Pyetja 88



Cili është shkaku më i shpeshtë i embolisë pulmonare?

- A) fibrilacioni atrial
- B) endokarditi bakterial
- C) abuzimi me substanca narkotike
- D) tromboza venoze e thellë e gjymtyrëve të poshtme
- E) tromboza e venës cava

Pyetja 89

Cili është trajtimi i zgjedhur në mikrocitomën pulmonare të stadi të IV?

- A) kirurgji
- B) kemioterapi
- C) radioterapi
- D) imunoterapi
- E) të gjitha përgjigjet janë të vërteta

Pyetja 90

Një zgavër pulmonare që vihet re në radiografi mund të jetë shprehje e njëres prej këtyre patologjive me përjashtim të:

- A) tuberkulosi post-primar
- B) micetoma
- C) pneumonia nga stafilokoku
- D) pneumonia nga mycoplasma pneumoniae
- E) pneumonia nga pneumocistis carinii

Pyetja 91

Shkaku më i shpeshtë i atelektazës pulmonare lobare është:

- A) infarkti pulmonar
- B) pneumonia pneumokoksike
- C) pneumonitë virale
- D) inhalimi i materialeve ushqimore
- E) bronhektazia

Pyetja 92

Cili prej barnave përdoret më shpesh në profilaksinë ndaj tuberkulozit?

- A) rifampicina
- B) izoniazidi
- C) etambutoli
- D) pirazinamidi
- E) streptomocina

Pyetja 93

Në riakutizimet e Sëmundjes Pulmonare Obstruktive Kronike, antibiotiku i zgjedhur duhet të veprojë në mënyrë aktive kundrejt të gjithë këtyre mikroorganizmave me përjashtim të:

- A) haemofilus influenzae
- B) streptokokut pneumonie
- C) stafilokokut aureus
- D) moraxella catarrhalis
- E) pseudomonas aeruginosa

Pyetja 94

Si lexohet testi i tuberkulinës?

- A) duke matur sipërfaqen e skuqur
- B) duke matur diametrin e skuqjes
- C) duke matur diametrin e papulës
- D) duke matur sipërfaqen e papulës
- E) duke palpuar zonë e ngritur mbi lëkurë

Pyetja 95

Cili prej këtyre trajtimeve është në gjendje të rriti mbijetesën në pacientët me SPOK?

- A) bronkodilatatorët
- B) oksigjenoterapia e zgjatur
- C) antikolinergjikët
- D) ventilimi mekanik
- E) kortikosteroidët

Pyetja 96

Cili gjen onkosupresor akuzohet si kryesori në gjenezën e tumorit pulmonar:

- A) p47
- B) p53
- C) RAS
- D) Myc
- E) Fos

Pyetja 97

Si përkufizohet empiema pleurale?

- A) grumbullim i limfës në hapësirën pleurale
- B) grumbullim i koagulave në hapsirën pleurale pas pneumoektomisë
- C) grumbullim i materialeve purulente në hapsirën pleurale
- D) grumbullim i ajrit dhe gjakut në hapsirën pleurale
- E) grumbullim i serumit në hapsirën pleurale

Pyetja 98

Në bazë të cilave kritere përcaktohet aktiviteti i tuberkulozit pulmonar?

- A) klinike
- B) radiologjike
- C) klinike, radiologjike, mikrobiologjike
- D) mikrobiologjike
- E) klinike dhe mikrobiologjike

Pyetja 99

Ku lokalizohet geni përgjegjës për fibrozën cistike?

- A) në kromozomin 5
- B) në kromozomin 13
- C) në kromozomin 7
- D) në kromozomin 11
- E) në kromozomin 3

Pyetja 100

Kundërrindikacion absolut për realizimin e bronkoskopisë janë:

- A) kolla
- B) rastet kur dyshohet për fistul trakeozofageale
- C) abceset pulmonare të përsëritura
- D) gjendja kardiovaskulare e paqëndrueshme dhe aritmia kardiake
- E) versamenti pleural

Pyetja 101

Të gjitha pohimet e më poshtme për limfomën Hodking janë të vërteta me përjashtim të:

- A) shoqërohet me limfadenopati uni ose bilaterale jo të dhimbshme
- B) në disa pacientë sëmundja fillon si një prurit i gjeneralizuar
- C) trajtimi dhe prognoza varen nga stadi klinik i sëmundjes
- D) temperatura, djersitja dhe humbja mbi 10 % në peshë tregojnë për përkeqësim të prognozës
- E) limfoma Hodking paraqitet rezistente vetëm ndaj trajtimit meradioterapi

Pyetja 102

Në cilën patologji rruazat e gjakut janë në formën e "tabelës të qitjes"

- A) anemi hemolitike autoimune
- B) talasemi
- C) leuçemia akute
- D) limfoma jo Hodking
- E) sëmundja Addison

Pyetja 103

Në aneminë nga mungesa e hekurit cili është ekzaminimi i vetëm që na jep një vlerësim të plotë në lidhje me rezervat e hekurit?

- A) MCV
- B) hemoglobina
- C) hemoglobina korpuskulare mesatare
- D) ferritina serike
- E) transferina serike

Pyetja 104

Në policiteminë vera vihet re:

- A) ulje e vlerës të hemoglobinës + eritrocitozë
- B) rritje e vlerës të hemoglobinës + eritrocitozë
- C) ulje e vlerës të hemoglobinës dhe ulje e sasisë të rruazave të kuqe
- D) rritje e vlerës të hemoglobinës dhe ulje e sasisë të rruazave të kuqe
- E) rritje ose ulje jo sinjifikante e vlerës të hemoglobinës + ulje e sasisë të rruazave të kuqe

Pyetja 105

Tek një femër 23 vjeç diagnostikohet një anemi mikrocitare. Cili është shkaku më i shpeshtë:

- A) hemorragjia kronike
- B) beta-talasemia major
- C) alfa-talasemia
- D) mungesa në folate
- E) mungesa në vitaminë B12

Pyetja 106

Në leuçeminë limfatike kronike gamaglobulinat janë:

- A) të ulura
- B) mungojnë
- C) normale
- D) të rritura
- E) shumë të rritura

Pyetja 107

Vitamina B12 përthithet :

- A) në nivel gastrik
- B) në nivel duodenal
- C) në nivel të ileusit terminal
- D) në nivel të kolonit
- E) përgjatë traktit tretës

Pyetja 108

Deformimi në formë drapri e rruazave të kuqe të gjakut vjen si pasojë e:

- A) difekteve në prodhimin sasiar të hemoglobinës
- B) ndryshimeve mitokondiale
- C) antitropave
- D) çrregullimeve elektrolitike
- E) ndryshimeve cilësore në hemoglobinë

Pyetja 109

Trajtimi i zgjedhur në leuçeminë mieloide kronike në një subjekt në moshë të re është;

- A) radioterapi
- B) monokemioterapia
- C) polikemioterapi
- D) terapia me interferon
- E) transplantimi alogjenik i palcës kockore

Pyetja 110

Diagnoza e leuçemisë akute mund të vendoset vetëm me anë të;

- A) biopsisë të limfonodulit
- B) ekzaminimit të formulës leukocitare
- C) mielogramës
- D) biopsisë të shpretkës
- E) gjakut periferik

Pyetja 111

Çfarë kuptoni me hiatus leuçemik?

- A) një ndërlikim të leuçemisë
- B) mungesën e elementëve të ndërmjetëm (midis të pjekurve dhe të papjekurve) në gjakun periferik
- C) një bar me efekte antiblastike
- D) mungesën e elementëve të pjekur plotësisht në palcën kockore
- E) të gjitha

Pyetja 112

Në limfomën Hodking vihen re të gjithë elementët e më poshtëm me përjashtim të:

- A) uljes të aktivitetit të limfociteve T
- B) rritje të rrezikut për të zhvilluar lehtësisht infeksione tuberkulare
- C) limfonoduj të vegjël dhe shumë të dhimbshëm
- D) anemi normokrome normocitare
- E) tendencë për infeksione mykotike

Pyetja 113

Në hemofili paraqitet e ndryshuar nga vlerat normale:

- A) koha e hemorragjisë
- B) koha e koagulimit
- C) koha e protrombinës
- D) brishtësia kapilare
- E) eritrosedimenti

Pyetja 114

Gjatë ekzaminimit të një pacienti me Purpur Idopatike Trombocitopenike, përveç petekieve dhe ekimozave, mund të vërehet:

- A) splenomegali
- B) limfadenomegali
- C) hepatomegali
- D) një ekzaminim objektiv normal
- E) temperaturë

Pyetja 115

Të gjitha shenjat e mëposhtme janë karakteristike të sëmundjeve pulmonare kronike me perjashtim:

- A) Turgor i jugulareve
- B) Edema periferike
- C) Hepatomegali
- D) Kolle
- E) Gishta si shkop tamburi

Pyetja 116

Cilat patologji mund të jenë shkak i hemoptizisë:

- A) Koagulimi intravaskular i diseminuar
- B) Tumore primitiv beninj ose malinj
- C) Patologji granulomatoze aktive
- D) Emboli - infarkt pulmonar
- E) Të gjitha

Pyetja 117

Bronkiti infektiv akut ka incidencën maksimale në:

- A) Në dimër
- B) Në verë
- C) Në vjeshtë
- D) Në pranverë
- E) Nuk ka diferenca stinore në incidencë

Pyetja 118

Cilët janë mekanizmat patogjenetikë të pneumonisë nga hipersensibiliteti:

- A) Reaksione të mediatuara nga qelizat
- B) Reaksione të lidhura me mungesën e Iga
- C) Reaksione të lidhura me lëshimin e Ige
- D) Reaksione të lidhura me komplimentin

E) Reaksione të lidhura me degradimin e fibrinogjenit

Pyetja 119

Cilët janë shkaqet më të shpeshta të versamenteve pleurale hemoragjike:

- A) Neoplazitë
- B) Pneumonitë
- C) Infeksionet virale
- D) Pneumotoraks
- E) Sarkoidozë

Pyetja 120

Të gjitha gjendjet e mëposhtme përfaqësojnë një faktor rreziku të pranuar për SPOK (sëmundja pulmonare obstruktive kronike) me përjashtim të:

- A) Infeksioneve respiratore rekurente
- B) Tymit të dyhanit
- C) Ndotjes atmosferike
- D) Ndotjes në ambjentin e punës
- E) Alkolizmit kronik

Pyetja 121

Shkaku më i shpeshtë i atelektazës lobare pulmonare është:

- A) Infarkti pulmonar
- B) Pneumoni pneumokoksike
- C) Pneumoni virale
- D) Inhalim i materialeve të traktit tretës
- E) Bronkoektazia

Pyetja 122

Cili është ilaçi që përdoret më shpesh në profilaksinë e tuberkulozit:

- A) Rifampicina
- B) Isoniazidi
- C) Etambutoli
- D) Pirazinamidi
- E) Streptomocina

Pyetja 123

Në riakutizimet e sëmundjes pulmonare obstruktive kronike, antibiotiku i zgjedhur duhet të jetë aktiv kundër të gjithë baktereve të mëposhtme me përjashtim të:

- A) Hemofilus influenza
- B) Streptokokus pneumonie
- C) Stafilokokus aureus
- D) Moraksela katarralis
- E) Pseudomonas aeruginoza

Pyetja 124

Terapia e embolisë pulmonare mund të përfshijë të gjithë medikamentet e mëposhtme me përjashtim të:

- A) A sedatimit me barbiturate
- B) Oksigjenoterapi
- C) Stimulant beta adrenergjik
- D) Dopamin
- E) Asnjëra

Pyetja 125

Në cilat nga gjëndjet e mëposhtme mund të stabilizohet prezenca e insufiçencës respiratore:

- A) Hemogazanaliza: Pao2 70 mmhg, Paco2 55 mmhg
- B) Hemogazanaliza: Pao2 67 mmhg, Paco2 38 mmhg
- C) Hemogazanaliza: Pao2 45mmhg, Paco2 60 mmhg
- D) Hemogazanaliza: Pao2 95 mmhg, Paco2 41 mmhg
- E) Hemogazanaliza: Pao2 65 mmhg, Paco2 47 mmhg

Pyetja 126

Si realizohet leximi i testit të tuberkulinik:

- A) Duke matur sipërfaqen e skuqur
- B) Duke matur diametrin e skuqjes
- C) Duke matur diametrin e papulës
- D) Duke matur sipërfaqen e papulës
- E) Palpimi i zonës së ngritur në vendin e inokulimit të ppd

Pyetja 127

Cfarë nënkuptohet me fibrozë pulmonare idiopatike:

- A) Një formë fibroze pulmonare jo evolutive
- B) Një formë fibroze pulmonare me dekurs të papritur
- C) Një formë fibroze pulmonare e trashëgueshme
- D) Një formë pneumonie intersticiale idiopatike me ecuri klinike progresive
- E) Asnjëra

Pyetja 128

Cila metodë ngjyrimi përdoret zakonisht për identifikimin e shpejtë të Mycobacterium tuberculosis:

- A) Gram
- B) Hematoksilinë
- C) Gimsa
- D) Ziehl-nielsen
- E) Papanikolau

Pyetja 129

Cilët janë komponentët të sistemit mekanik të mbrojtjes pulmonare:

- A) Sistemi mukoregulator, nënndarja dikotomike e bronkeve
- B) Arkitektura anatomike dikotomike, hipersekretimi i mukosit, epiteli prizmatik me cilie vibruese
- C) Arkitektura anatomike dikotomike, sistemi mukoregulator, epiteli prizmatik me cilie vibrante
- D) Arkitektura anatomike dikotomike, sistemi mukoregulator, epiteli kubik



E) Arkitektura anatomike dikotomike, hipersekretimi i mukusit, epiteli kubik

Pyetja 130

Kolapsi pulmonar komplet mund të verifikohet në të gjitha gjëndjet e mëposhtme, me përjashtim të:

- A) Pneumotoraksit
- B) Plagës pulmonare
- C) Obstruksionit të bronkut intermediar
- D) Plagës së paretit torakal nga shtypja
- E) Hemotoraksit të djathtë

Pyetja 131

Cilët nga trajtimet e mëposhtme janë demonstruar të aftë të rrisin mbijetesën në pacientët me SPOK:

- A) Bronkodilatator
- B) Oksigjen për kohë të gjatë
- C) Antikolinergjikët
- D) Ventilacion mekanik
- E) Kortikosteroid

Pyetja 132

Mezotelioma pleuritike mund të manifestohet me karakteristikat e mëposhtme me përjashtim:

- A) Opacifikim difuz i hemitoraksit
- B) Spostim kundralateral i mediastinit
- C) Versament pleural hematik
- D) Prezenca e acidit hialuronik në versamentin pleural
- E) Dhimbje difuze torakale

Pyetja 133

Cili është elementi që përveç anamnezës, është fundamental në diagnozën e pneumokoniozave:

- A) Shintigrafia pulmonare
- B) Prova funksionale respiratore
- C) Lavazhi bronkoalveolar
- D) Radiografia e toraksit
- E) Hemogaz analiza

Pyetja 134

Karcinoma bronkogjenike është ( zgjidh përgjigjen e gabuar):

- A) Përgjegjës për më shumë se 90% të tumoreve pulmonar
- B) Kanceri i dytë më i shpeshtë në burra
- C) Më i shpeshti në moshën e re
- D) Duhanpirja është shkaku kryesor
- E) Vetëm një prognozë jo të favorshme

Pyetja 135

Cila nga alternativat nuk është një indikacion për fibrobronkoskopi:

- A) Vlerësimi i mukozave bronkiale

- B) Heqja e tapave dens të mukusit
- C) Biopsi e neoplazive endobronkiale
- D) Trajtimi i hematemezës
- E) Diagnoza e neoplazive bronkiale

Pyetja 136

Cili është definicioni i empiemës pleuritike:

- A) Grumbullim i limfës në hapsirën pleuritike
- B) Grumbullimi i koagulave në hapsirën pleuritike si pasojë e pneumonektomisë
- C) Mbledhja e materialit purulent në hapsirën pleuritike
- D) Mbledhja e ajrit dhe gjakut në hapsirën pleuritike
- E) Mbledhja e likidit në hapsirën pleuritike

Pyetja 137

Cili është gjeni onkosupresor që akuzohet me shumë në gjenezën e tumoreve pulmonare:

- A) p47
- B) p53
- C) RAS
- D) Myc
- E) Fos

Pyetja 138

Në cilat gjëndje fiziologjike predominon kontrolli metabolik i respiracionit:

- A) Gjatë ushtrimeve fizike
- B) Gjatë tretjes
- C) Në fazat e agjerimit
- D) Gjatë gjumit
- E) Gjatë pagjumesise

Pyetja 139

Cfarë mund të tregojë prova funksionale respiratore gjatë astmës bronkiale:

- A) Sindrom disventilator i tipit restriktiv
- B) Vlera në limite të normës
- C) Sindrom disventilator i tipit obstruktiv
- D) Reduktim të volumit rezidual
- E) Reduktim i izoluar i kapacitetit funksional rezidual

Pyetja 140

Cili nga faktorët e mëposhtëm është një faktor shpërthyes i astmës bronkiale:

- A) Ushtrimet fizike
- B) Refluksi gastroezofageal
- C) Inhalimi i aeroalergenëve
- D) Infeksione virale të rrugëve primare respiratore
- E) Të gjitha

Pyetja 141

Në një krizë bronkospastike akute, substanca e qetësimit që duhet dhënë është:

- A) Neostigmina
- B) Heparina
- C) Adrenalina
- D) Kinidina
- E) Digitali

Pyetja 142

Cila nga këto sëmundje mund të provokojë hipertension pulmonar primar:

- A) Sindromi Cushing
- B) Feokromocitoma
- C) Insufiçenca renale kronike
- D) Stenoza e istmusit aortik
- E) Fibroze pulmonare masive nga silikoza

Pyetja 143

Në bazë të cilave kritere vendoset aktiviteti i tuberkulozit pulmonar:

- A) Klinike
- B) Radiologjike
- C) Klinike, radiologjike, mikrobiologjike
- D) Mikrobiologjike
- E) Klinike dhe mikrobiologjike

Pyetja 144

Cili është izotipi më i zakonshëm i tumoreve malinje të trakesë:

- A) Karcinoma spinoqelizore
- B) Karcinoma adenoskuamoze
- C) Adenokarcinoma
- D) Karcinoma adenoidocistike (cilindroma)
- E) Karcinoma aplazike

Pyetja 145

Çfarë nënkuptohet me stadin zero të sarkoidozës:

- A) Prekje pulmonare e izoluar
- B) Prekje okulare e izoluar
- C) Prekje të izoluara kutane
- D) Manifestime extratorakale në mungesë të anomalive torakale të demonstrueshme radiologjikisht
- E) Asnjëra

Pyetja 146

Antileukotrienet aktualisht janë të indikuara në trajtimin e SPOK:

- A) Jo
- B) Po në shoqërim me antikolinergjikët
- C) Po në shoqërim me kortikosteroidët inhalator
- D) Po vetëm në prezencë të riakutizimeve të sëmundjes

E) Po vetëm në fazën stabël të sëmundjes

Pyetja 147

Të gjithë mekanizmat e mëposhtme patogjenetik janë të pranishëm në astmën nga ushtrimet fizike me përjashtim:

- A) Hiperventilimit
- B) Ftohja e rrugëve ajrore
- C) Dehidrim i rrugëve ajrore
- D) Stimulim nervoz refleksor
- E) Rritjes së presionit sistematik pulmonar

Pyetja 148

Në diagnozën e embolisë pulmonare, arteriografia pulmonare realizohet:

- A) Në të gjitha rastet e dyshuara për emboli pulmonare
- B) Vetëm testi i dimerit rezulton pozitiv
- C) Në rastet kur testi i dimerit, shintigrafia perfuzionale dhe ekografia venoze nuk kanë arritur të dirimere dyshimin diagnostik
- D) Vetëm shintigrafia pulmonare rezulton pozitive
- E) Vetëm prezenca e fibrilacionit atrial

Pyetja 149

Cili nga pohimet e mëposhtme, bën pjesë në fazën diagnostike fillestare të një neoplazie pulmonare hemoragjike:

- A) Echografia abdominale
- B) Eko dopler tronchi sovra- aortal
- C) Ct koke
- D) Fibrobronkoscopia
- E) Ct maksikofaciale

Pyetja 150

Në cilat forma të hipertensionit pulmonar vërehet një rritje e presionit kapilar pulmonar d'incucnameamento:

- A) Hipertension venoz pulmonar nga kardiopati të majta
- B) Hipertension venoz pulmonar nga kardiopati të djathta
- C) Hipertension pulmonar arterioz primitive
- D) Hipertension pulmonar nga hipoksia
- E) Asnjëra

Pyetja 151

Cili medikament përdoret për kontrollin e inflamacionit të rrugëve ajrore në një pacient astmatik:

- A) Aspirina
- B) Kortikosteroid me rrugë inhalatore
- C) Teofilina
- D) Inhibitor cox-2
- E) Beta 2 agonist

Pyetja 152

Cila është neoplazia pulmonare më shumë e lidhur me ekspozimin profesional:

- A) Adenokarcinoma
- B) Mikrocitoma
- C) Ca spinocelulare
- D) Mezotelioma pleuritike
- E) Karcinoide

Pyetja 153

Cili është trajtimi më i nevojshëm në obstrukcion të rrugëve ajrore të një pacienti të prekur nga fibroza cistike:

- A) Drenazhi postural
- B) Antibiotik
- C) Bronkodilatator
- D) Antikolinergjik
- E) Kortikosteroid

Pyetja 154

Cili nga të mëposhtmit është shkaktari më i shpeshtë i pneumonisë në praktikën e mjeksisë së përgjithshme:

- A) Mycoplasma pneumoniae
- B) Hemofilus influenzae
- C) Legionella pneumophila
- D) K.pneumoniae
- E) Streptococcus pneumoniae

Pyetja 155

Sindromi Claude Bernard - Horner karakterizohet nga:

- A) Enoftalmus, ptoze palpebrale dhe anidroze unilaterale
- B) Dhimbje në shpinë dhe krahë përgjatë zonës së inervimit të nervit ulnar
- C) Strie rubre në nivelin abdominal, qafa e buallit dhe facies lunare
- D) Edema mantel dhe turgor i jugulareve
- E) Enoftalm, miozë, ptozë palpebrale dhe anidrozë kontralaterale

Pyetja 156

Cili është testi i funksionalitetit respirator që diferencon astëm bronkiale nga SPOK:

- A) Spirometria e thjeshtë
- B) Body pletizmografia
- C) Testi i difuzionit të monoksidit të karbonit
- D) Testi i bronkoreversibilitetit
- E) Testi i sforcos

Pyetja 157

Cilat janë format më frekvente të hipertensionit pulmonar:

- A) Hipertension pulmonar primitiv

- B) Hipertension pulmonar sekondar nga kardiopati të majta
- C) Hipertension pulmonar nga prezenca e lartësive të mëdha
- D) Sekondar si pasojë e sëmundjeve respiratore kronike
- E) Asnjëra

Pyetja 158

Kur dyshohet prezenca e një karcinoidi pulmonar, në mungesë të diagnozës histologjike, cili egzaminim instrumental mund të jetë i nevojshëm të realizohet:

- A) Shintigrafia pulmonare perfuzionale
- B) Shintigrafia kockore
- C) Shintigrafia pulmonare me oktrotid të markuar radioaktivisht
- D) Ct e kokës
- E) Shintigrafia pulmonare ventilatore

Pyetja 159

Nga se influencohet më shumë aktiviteti i qendrave respiratore:

- A) Nga hiperkapnia
- B) Nga hipokseミア
- C) Nga lëvizjet e paretit torakal
- D) Nga alkalozia
- E) Nga kalçemia

Pyetja 160

Të gjitha simptomat e mëposhtme janë të lidhura me ekspansionin torakal të kancerit pulmonar, me përjashtim të:

- A) Kollës
- B) Hemoptizisë
- C) Dhimbjes torakale
- D) Dispnesë
- E) Pectus excavatum

Pyetja 161

Cili është tumori beninj më i shpeshtë i paretit torakal:

- A) Kondroma
- B) Fibrodisplazia kockore
- C) Esteokondroma
- D) Tumor desmoid
- E) Fibroma

Pyetja 162

Cilat janë medikamentet kryesore që përdoren në kontrollin e bronkokonstriksionit në pacientët me astëm kronike:

- A) Beta 2 agonsitet me veprim të shkurtër
- B) Beta 2 agonistët me veprim të zgjatur
- C) Teofilina
- D) Kortikosteroidët me inhalacion

E) Kortikosteroidët me rrugë sistemike

Pyetja 163

Cili nga të mëposhtmit nuk është faktor favorizues i fillimit të pneumonisë post operatore ose post traumatike:

- A) Hipoventilimi
- B) Eskursion i limituar i hemidiafragmave
- C) Inhibim i refleksit të kollës
- D) Dehidrimi
- E) Fillimi i e aritmive kardiake

Pyetja 164

Ku është i lokalizuar gjeni përgjegjës për fibrozën cistike:

- A) Kromozomin 5
- B) Kromozomin 13
- C) Kromozomin 7
- D) Kromozomin 11
- E) Kromozomin 3

Pyetja 165

Pneumotoraksi masiv trajtohet me:

- A) Oksigjenoterapi
- B) Intubim orotrakeal
- C) Drenim torakal në hapsirën e dytë interkostale hemiklavikulare
- D) Drenim torakal në hapsirën e v interkostale aksilare posterior
- E) Drenim umbilikal

Pyetja 166

Obstruksioni bronkial për definicion të spok:

- A) Është vazhdimisht prezent dhe pse është variabël dhe irreversibël
- B) Nuk është gjithmonë prezente por është irreversibël
- C) Jo domosdoshmërisht është gjithmonë prezente dhe mund të jetë pak a shumë reversible
- D) Është gjithmonë prezente dhe reversible
- E) Asnjëra

Pyetja 167

Cili është kriteri aktual i klasifikimit të SPOK:

- A) Kliniko - funksional
- B) Radiologjik
- C) Ekskluzivisht funksional
- D) Anatomopatologjik
- E) Radiologjikisht - funksional

Pyetja 168

Kundraindikimet absolute të bronkoskopisë janë:

- A) Kollë
- B) Dyshimi i fistulave trakeozofageale
- C) Akses pulmonar refraktar
- D) Status kardiovaskular jo stabël dhe aritmi kardiake
- E) Versament pleural

Pyetja 169

Trajtimi imediat i pneumotoraksit të hipertendosur jotraumatik konsiston në:

- A) Torakotomi
- B) Intubacion trakeal
- C) Drenazh pleuritik
- D) Antibiotikoterapi
- E) Pushim absolut në shtrat

Pyetja 170

Cili është relacioni i polikimioterapisë të mykobakteriozave jo tuberkulare:

- A) Përqëndrimi në nivelin e lezionit dhe shmangia e lindjes së rezistencave sekondare
- B) Shoqërimi me medikamente sensibile dhe shmangia e lindjes së rezistencave sekondare
- C) Përqëndrimi në nivel të lezionit dhe shmangia e lindjes së rezistencave të kryqëzuara
- D) Shoqërimi me medikamente sensibile dhe shmangia e lindjes së rezistencave të kryqëzuara
- E) Shoqërimi me medikamente sensibile, shmangia e lindjes së rezistencave të kryqëzuara dhe reduktim i toksicitetit farmakologjik

Pyetja 171

Pas heparit organi më shumë i prekur nga metastazat e karcinomës pulmonare është:

- A) Skeleti
- B) Gjëndra mbiveshkore
- C) Veshkat
- D) Truri
- E) Shpretka

Pyetja 172

Janë të kundraindikuara në egzekutimin e agoaspirimit perkutan torakal gjëndjet e mëposhtme, me përjashtim të:

- A) Instabiliteti kardiovaskular
- B) Pneumonektomia kuntralaterale
- C) Ciste hidatike
- D) Difekte të koagulimit
- E) Sëmundje buloze pulmonare kundralaterale

Pyetja 173

Cilët janë shkaqet më të shpeshta të stnozës trakeale esktrinseke:

- A) Anomali vaskulare
- B) Neoformacione tiroideje
- C) Neoplazi të paretit torakal
- D) Hipertrofi e ventrikulit të majtë



E) Timoma

Pyetja 174

Cili është komplikacioni më i shpeshtë i azbestozës pulmonare:

- A) Pneumotoraksi
- B) Mezotelioma pleuritike
- C) Adenokarcinoma pulmonare
- D) Ca spinoqelizore
- E) Asnjëra

Pyetja 175

Pneumotoraksi spontan shkaktohet më shpesh nga:

- A) Tuberkulozi
- B) Trauma
- C) Emfizema bulloze
- D) Tumore të mediastinit
- E) Pneumonia

Pyetja 176

Cilat nga substancat e mëposhtme metabolizohen në nivel pulmonar:

- A) Substanca p
- B) Histamina
- C) Dopamina
- D) Angiotenzina ii
- E) Angiotenzina i

Pyetja 177

Cilët janë faktorët e riskut përgjegjës për lindjen e pneumonisë nga hipersensibiliteti

- A) Inhalimi okazional i pluhrave inorganik
- B) Inhalimi perserites i pluhrave inorganik
- C) Inhalime të perseritura të pluhrave organik me dimensione inferiore 5 micron
- D) Inhalim i pluhrave organik mbi 5 mikron
- E) Asnjëra

Pyetja 178

Cilët nga simptomat e mëposhtme nuk është e lidhur drejtpërsëdrejti me tumoret malinje të trakesë:

- A) Hemoptizia
- B) Disfonia
- C) Dispnea
- D) Disfagia
- E) Refluksi gastroezofageal

Pyetja 179

Një versament pleural tuberkular karakterizohet nga:

- A) Rritja e neutrofileve

- B) Rritja e makrofagëve
- C) Rritja e limfociteve
- D) Rritja e plazmociteve
- E) Asnjëra

Pyetja 180

Terapia e pneumonise jashtëspitalore:

- A) Është pothuajse gjithmonë empirike ose e arsyetuar
- B) Nuk drejtohet asnjëherë nga një diagnozë etiologjike
- C) Është gjithmonë e drejtuar nga një diagnozë eziologjike
- D) Është e udhëhequr nga një radiografi
- E) Konsiston në përdorimin e cefalosporinave me spektër të gjerë veprimi

Pyetja 181

Infeksionet mund të ndikojnë në patogjenezën e SPOK:

- A) Si efekte në distancë të infeksioneve respiratore të fëmijërisë
- B) Si efekte akute të riakutizimeve
- C) Si efekte kronike të kolonizimit të rrugëve ajrore
- D) Të gjitha

Pyetja 182

Hipertrofia e një dore në sindromin Horner mund të indikojë egzistencën e:

- A) Sklerozës laterale amiotrofike
- B) Sindromit të tunelit karpal
- C) Tumorit Pancoast
- D) Amiloidozës sistemike
- E) Tuberkulozit limfoglandular

Pyetja 183

Cili është testi i duhur për diagnozën etiologjike të versamenteve pleurale:

- A) Radiografia e toraksit
- B) Ct e toraksit
- C) Torakocenteza
- D) Bronkoskopia
- E) Ekografia torakale

Pyetja 184

Kufiri superior i një versamenti pleural tipik, vendoset sipas një linje të quajtur nga:

- A) Garland
- B) Grocco
- C) Damoiseau - ellis
- D) Koch
- E) Auerbach

Pyetja 185

BAL (bronko lavazhi alveolar) i vetëm mund të jetë diagnostik në pneumoninë nga hipersensibiliteti:

- A) Po gjithmonë
- B) Jo asnjëherë
- C) Vetëm nëse shoqërohet me shënja klinike, radiologjike dhe funksionale
- D) Po vetëm nëse shoqërohet me shënjat klinike
- E) Po nëse shoqërohet me vetëm me shënjat funksionale

Pyetja 186

Në trajtimin e një gjëndje astmatike cili është qëllimi kryesor që mjeku duhet të bëjë:

- A) Të korigjojë bronkokonstriksionin
- B) Të korigjojë hipokseminë
- C) Të korigjojë statusin e inflamacionit
- D) Të korigjojë hiperinflacionin dinamik të rrugëve ajrore
- E) Të korigjojë alterimet metabolike pasuese

Pyetja 187

Cila është terapia e zgjedhur në trajtimin e sarkoidozës:

- A) Metotraxate
- B) Colchicina
- C) Prednisolone
- D) Aziotioprina
- E) Penicilina

Pyetja 188

Në tumoret primitive të trakesë hasen shënjat e mëposhtme, me përjashtim të:

- A) Kollës
- B) Hemoptizisë
- C) Dhimbjes torakale
- D) Dispnesë
- E) Disfonisë

Pyetja 189

Torakocenteza (zgjidh përgjigjen e gabuar)

- A) Përdoret për përcaktimin etiologjikë të versamentit pleural
- B) Mund të egzekutohet për të lehtësuar insufiçencën respiratore shkaktuar nga një versament pleural masiv
- C) Angina jostabile nuk kundraindikon e kryerjen e torakocentezes
- D) Mund të përdoret për të futur agjent sklerozant ose antineoplastik në hapsirën pleuritike
- E) Një koagulopati jo e stabilizuar kundraindikon egzekutimin

Pyetja 190

Edema mantel dhe turgori i venave jugulare janë shënja karakteristike të:

- A) Sindromin claud - bernard - horner
- B) Sindromit të dispnesë
- C) Sindromit të vena cava superior
- D) Sindromit të sekretimit të papërshtatshëm të adh

E) Fenomenit raynaud

Pyetja 191

Cili nga parametrat e mëposhtëm nuk matet gjatë spirometrisë:

- A) Kapaciteti vital të sforcuar
- B) Volumi i rezervës ekspiratore
- C) Volumi i ekspiruar i sforcuar
- D) Kapaciteti inspirator
- E) Volumi rezidual

Pyetja 192

Terapia e një pneumotoraksi të mbyllur është:

- A) Drenim perkutan i kavitetit pleuritik
- B) Astinencë terapeutike sepse pulmoni riekspandohet spontanisht
- C) Intervent kirurgjikal
- D) Astinencë për tre javë me respirator automatik
- E) Aeroterapi

Pyetja 193

Të gjitha të mëposhtmet mund të jenë shkak i sindromit të vena cava superior ,me përjashtim të :

- A) Karcinomës pulmonare
- B) Limfoma
- C) Tumor i mediastinit
- D) Metastaza intratorakale
- E) Bronhektazia

Pyetja 194

Cili është bakteri që tenton të kolonizojë rrugët ajrore në pacientët me fibrozë cistike:

- A) Streptococcus pneumonie
- B) Hemofilus influenzae
- C) Moraxella catarrhalis
- D) Pseudomonas aeruginosa
- E) Hemophilus parainfluenzae

Pyetja 195

Cilët janë indikacionet e trajtimit trombolitik në pacientët me emboli pulmonare:

- A) Brenda 2 orëve nga ngjarja
- B) Vetëm në prezencë të shokut kardiogjen dhe hipotensionit
- C) Brenda 6 orëve nga ngjarja
- D) Në prezencë të dhimbjes torakale dhe cianozesë persistente
- E) Në prezencë të hemoptizisë masive

Pyetja 196

Gjatë pneumonisë nga chlamydia pneumoniae, antibiotiku i zgjedhur është:

- A) Tetraciklina

- B) Beta laktamikët
- C) Penicilina g
- D) Makrolidët
- E) Cefalosporinat

Pyetja 197

Cilat nga karakteristikat e CT orientojnë drejt një lezioni malinj:

- A) Kufij te qarte
- B) Kalcifikimet
- C) Dimension <1 cm
- D) Rritja e vaskularizimit
- E) Densitet homogjen

Pyetja 198

Në pneumoninë nga mikoplazma, pneumonia si terapi mund të përdoret:

- A) Tetraciklin
- B) Eritromycin
- C) Clarithromycin
- D) Azitromicin
- E) Të gjitha

Pyetja 199

Në një individ 60 vjeç fumator që prezanton hemoptizi, diagnoza me probabël është:

- A) Tuberkuloz
- B) Tumor i pulmonit
- C) Bronkoektazi
- D) Çarje e variçeve ezofageale
- E) Cist pulmonar nga echinococ

Pyetja 200

Shkaku më i shpeshtë i hemopneumotoraksit është:

- A) Neoplazia pulmonare
- B) Neoplazia pleuritike
- C) Trauma
- D) Tuberkulozi
- E) Mezotelioma

Pyetja 201

Janë komplikime të torakocentezës të gjitha të mëposhtmet, me përjashtim të:

- A) Pneumotoraksi
- B) Sinkop i thjeshtë ose vazovagal
- C) Embola aerik
- D) Infeksioni
- E) Lezione të pleksit brakial

Pyetja 202

Cila është kohëzgjatja e trajtimit të shkurtër standart të tuberkulozit:

- A) 6 muaj
- B) 4 muaj
- C) 9 muaj
- D) 12 muaj
- E) Në relacion me situatën klinike

Pyetja 203

Cili është mekanizmi fizpatologjik më i rëndësishëm në gjenezën e alterimeve të shkëmbimeve gazore të emfizemës pulmonare:

- A) Vazokonstriksioni arterial hipoksike
- B) Alterim i raportit ventilim-perfuzion
- C) Rritja e kompliancës pulmonare
- D) Rritja e rezistencës së rrugëve ajrore
- E) Reduktim të volumeve pulmonare

Pyetja 204

Sindromi i lobit media mund të shkaktohet nga:

- A) Aneurizma e aortës torakale
- B) Adenopatia peribronkiale
- C) Bronkoektaziz
- D) Stenoza e arteries pulmonare
- E) Emfizema pulmonare

Pyetja 205

Në cilat rrethana aktivizohen muskujt ekspirator:

- A) Kur nevojiten flukse ekspiratore më të larta
- B) Kur nevojiten flukse inspiratore më të larta
- C) Kur nevojitet suporti i muskujve ekspirator në inspiracionin pasardhës
- D) Për të patur një volum rrjedhës më të lartë
- E) Për të patur një kapacitet vital më të lartë

Pyetja 206

Çfarë indikohet me "N" në stadifikimin TNM të tumorit pulmonar:

- A) Dimensioni i tumorit
- B) Lokalizimi i metastazave
- C) Prekja e limfonodulave
- D) Prekja cerebrale
- E) Prekja kockore

Pyetja 207

Cili tip pneumotoraksi specifikisht mbështetet në një mekanizëm valvular:

- A) Pneumotoraks spontan
- B) Pneumotoraks iatrogjen
- C) Hemopneumotoraks

- D) Pneumotoraks i mbitendosur
- E) Pneumotoraks sakat

Pyetja 208

Konsiderohet gaz irritant, i aftë të shkaktojë irritim dhe si pasojë leziona të aparatit respirator, agjenti kimik i mëposhtëm:

- A) Klori
- B) Fosfori
- C) Acidi sulfhidrik
- D) Dioksidi i azotit
- E) Të gjitha

Pyetja 209

Në astmën bronkiale nga se varet ulja e flukseve ekspirator maksimal:

- A) Rritja e kompliancës
- B) Rritja e konduktancës
- C) Ulja e rezistencave
- D) Rritja e rezistencave
- E) Rritja e elasticitetit të kafazit torakal

Pyetja 210

Cila është forma më e shpeshtë e pneumomediastinit:

- A) Idiopatik
- B) Spontan - patologjik
- C) Esencial
- D) Traumatik
- E) Iatrogjen

Pyetja 211

Cilat qeliza përgjegjëse në BAL(lavazhi bronko alveolar) janë indikues të aktivitetit të pneumokoniozës:

- A) Limfocite CD4
- B) Limfocite CD8
- C) Makrofag
- D) Neutrofile
- E) Monocite

Pyetja 212

Agoaspirimi pulmonar është i nevojshëm në diagnozën e:

- A) Bronkoektazisë
- B) Emfizemës
- C) Tbc miliar
- D) Kancerit bronkogjen
- E) Fistulave arteriovenoze

Pyetja 213

Cili nga këta faktorë nuk është determinant për të indikuar tumore bronkopulmonare në fumatorët:

- A) Moshë e fillimit të vesit
- B) Kohëzgjatja në vite e vesit
- C) Numri i cigareve të pira në një ditë
- D) Moshë e madhe e pacientit
- E) Grada e inspirimit të tymit të duhanit

Pyetja 214

Cila është shtrirja e rritjes së densitetit pulmonar në pneumoninë pneumokoksike:

- A) Panlobulare
- B) Bilaterale
- C) Lobare ose sublobare
- D) Intersticiale
- E) Apikale

Pyetja 215

Çfarë nënkuptohet me "kohë dyfishimi":

- A) Koha e nevojshme që do një lezion nodular që të dyfishojë volumin e tij
- B) Koha e nevojshme që do një lezion pulmonar që të dyfishojë diametrin e tij
- C) Koha e nevojshme që do një lezion nodular që të dyfishojë volumin dhe diametrin e tij
- D) Koha që i duhet një lezioni nodular për të dhënë metastaza në distancë
- E) Koha që i duhet një lezioni nodular të dyfishojë cirkumferencën e tij

Pyetja 216

Cili nga medikamentet e mëposhtëm nuk përdoret për kontrollin afatgjatë të patologjisë astmatike:

- A) Kromoglikati
- B) Teofilina
- C) Kortikosteroid
- D) Medikamentet aktive mbi leukotrienet
- E) Të gjitha

Pyetja 217

Cila është rruga kryesore e transmetimit të tuberkulozit:

- A) Rruga digjестive
- B) Rruga konjuktivale
- C) Rruga kutane
- D) Rrugë ajrore
- E) Rrugë gjentiale

Pyetja 218

Të gjitha pohimet e mëposhtme relative me kontaktin me një subjekt të prekur nga tuberkulozi janë të gabuara, me përjashtim:

- A) Përcakton gjithmonë infeksionin nga m.tuberculosis
- B) Nuk përcakton infeksionin nga m.tuberculosis
- C) Përcakton gjithmonë transmetimin e sëmundjes tuberkulare
- D) Nuk përcakton kurrë transmetimin e sëmundjes tuberkulare



E) Mund të japë shkas për infeksion nga m.tuberculosis me ose pa shënja klinike të sëmundjes tuberkulare

Pyetja 219

Cila është terapia për pacientët me fibrozë pulmonare idiopatike:

- A) Kortizon
- B) Azatioprina
- C) Ciclofosamid
- D) Ciclosporina a
- E) Metotrexate

Pyetja 220

Shaku më i shpeshtë i abcesit pulmonar akut është:

- A) Tbc
- B) Atelektazi pulmonare kronike
- C) Inhalimi i materialeve ushqimore
- D) Mungesa e përdorimit të antibiotikëve me përdorim profilaktiv
- E) Kirurgjia e toraksit

Pyetja 221

Cilët nga izotipet e mëposhtme të karcinomës pulmonare janë më frekvente:

- A) Adenokarcinoma
- B) Karcinoide
- C) Karcinoma bronkoalveolare
- D) Condroma
- E) Adrioblastoma

Pyetja 222

Cili është parametri serologjik që përdoret për monitorimin efikas të terapisë heparinike:

- A) Appt
- B) Pt
- C) Inr
- D) Fibrinogjeni
- E) Kalçemia

Pyetja 223

Të gjitha simptomat e mëposhtme janë të shpeshta në ecurinë e hipertensionit pulmonar primar, me përjashtim të:

- A) Dispnea nga sforcoja
- B) Dhimbje prekordiale
- C) Lipotimia
- D) Edema deklive
- E) Reduktim i sjelljes kardiake

Pyetja 224

Në çfarë konsiston roli i mushkërive në modulimin e ekulibrit acido-bazik:

- A) Modulimi me ventilim absorbimin e o<sub>2</sub>
- B) Duke modeluar me ane të ventilimit eliminimin e co<sub>2</sub>
- C) Duke modeluar me ane të ventilimit eliminimin e o<sub>2</sub>
- D) Duke modeluar funksionin eliminues të pulmonit
- E) Duke modeluar funksionin filtrues metabolik të pulmonit

Pyetja 225

Diagnoza citologjike e kancerit të pulmonit mund të arrihet me studimet e mëposhtme, me përjashtim të:

- A) Agoaspirimi
- B) Studim i ekspektoratit
- C) Bronkografia
- D) Bronkoskopia
- E) Mediastinoskopia

Pyetja 226

Në një pacient me hipertension pulmonar sekondar nga sëmundje respiratore kronike, cila nga terapitë e mëposhtme mund të përdoret më shpesh:

- A) Oksigjenoterapi e vazhdueshme
- B) Digital
- C) Antagonistët e kalçiumit
- D) Diuretikët
- E) Teofilina

Pyetja 227

Cilët janë faktorët etiopatogjenetikë që përfshihen në zhvillimin e astmës bronkiale:

- A) Aktiviteti i sistemit nervor autonom në rrugët ajrore
- B) Inflamacion i rrugeve ajrore
- C) Rimodelim i rrugeve ajrore
- D) Lëshimi i mediatorëve me veprim bronkokonstriktiv
- E) Të gjitha

Pyetja 228

Cili është materiali biologjik më i domosdoshëm për diagnostikimin mikrobiologjik të tuberkulozit:

- A) Saliva
- B) Material i marrë me agobiopsi
- C) Gjaku
- D) Ekspektorati
- E) Tumore me metastaza cerebrale të vetme

Pyetja 229

Në rastin e acidozës metabolike mushkria kompeson nëpërmjet:

- A) Rritjes së frekuencës respiratore
- B) Reduktimit të frekuencës respiratore
- C) Ulje të thellsisë së respirimit

- D) Rritje e thellsisë së respirimit
- E) Reduktim të eleminimit të Co<sub>2</sub>

Pyetja 230

Cilët janë qelizat që implikohen në patogjenezën e astmës bronkiale:

- A) Neutrofile
- B) Limfocite
- C) Eozinofile
- D) Bazofile
- E) Plazmocite

Pyetja 231

Cilat leziona imediate mund të provokojnë intubimi trakeal në rastin e manovrave reanimatore:

- A) Stenoza trakeale
- B) Trakeomalacia
- C) Leziona trakeale penetrante
- D) Hemoragji tiroidiene
- E) Paralize e nrvit laringeus rrekurent

Pyetja 232

Simptomat dhe shenjat principale të mykobakteriozes jo tuberkulare të diseminuara janë:

- A) Temperaturë, rënie në peshë, limfadenopati, hepatosplenomegali, dhimbje abdominale, diarre, djersitje profuze, insufiçensë respiratore
- B) Kollë me ekspektorat mukopurulent persistent
- C) Febricola serotina, calo ponderale, kollë, ekspektorim mukopurulent, hemoptozi
- D) Febricola serotina, kollë, hemoptizi, dispne
- E) Febricola serotina, kollë me ekspektorat hemoptoik e mukopurulent, dispne

Pyetja 233

Cila nga të mëposhtmet është indikacion për mediastinoskopi:

- A) Biopsi trakeale
- B) Biopsi tiroide
- C) Biopsi e limfonodulave pretrakeal
- D) Biopsi e paretit torakal

Pyetja 234

Në cilën pjesë të pemës bronkiale predominojnë mekanizma imunologjik mbrojtës:

- A) Në të gjithë sistemin bronkial
- B) Në zonat pertej bronkiolit terminal
- C) Në zonën trakeale
- D) Në zonat poshtë bronkiolit terminal
- E) Në nivel të trakesë e bronkeve të mëdha

Pyetja 235

Në sindromën restriktive ka zakonisht një frekuencë respiratore të lartë si pasojë e:

- A) Rezistencat e rrugëve ajrore janë të reduktuara
- B) Kushtojn sforcimet e vogla për të lëvizur një volum të ulët për çdo akt respirimi
- C) Rezistenca e rrugëve ajrore nuk rritet me frekuencën e respirimit
- D) Tensioni superficial i alveolave mbetet e ulët në volume të ulta
- E) Në inspiracione të thella presioni intrapleuritik ka negativitet normal

Pyetja 236

Çfarë nënkuptohet me stad të parë të sarkoidozës:

- A) Prekje parenkimale e izoluar
- B) Prekje e strukturave limfoglandulare hiliare bilaterale në mungesë të interesimit parenkimal
- C) Prekje kutane e izoluar
- D) Prekje kardiake e izoluar
- E) Prekje artikulare e izoluar

Pyetja 237

Cili është tipi histologjik i tumorit pulmonar më të shpeshtë në pacientët me moshë mbi 65 vjeç:

- A) Skuamocelular
- B) Adenokarcinoma
- C) Karcinoid
- D) Karcinoma bronkoalveolare
- E) Karcinom e padiferencuar

Pyetja 238

Cila është triada simptomatologjike karakteristike e embolisë pulmonare:

- A) Dhimbje torakale, cianozë, ritëm galopi
- B) Dhimbje torakale, dispne, hemoptizi
- C) Takikardi, hipertension arterial, djersitje
- D) Dhimbje shpuese si thike, bradikardia, djersitje
- E) Palpitacione, hipotension, ikter

Pyetja 239

Cili është indikacioni më i shpeshtë në moshë pediatrike për fibrobronkoskopi:

- A) Biopsi endobronkiale
- B) Obstruksion bronkial nga trupa të huaj
- C) Lavazh bronkial për kulturë
- D) Vlersim intraoperator
- E) Neoplazi bronkiale

Pyetja 240

Dhimbje shpuese si thike e papritur e lokalizuar në një hemitoraks dhe dispne, në një të ri deri më parë asimptomatik janë sugjестive për diagnozat e mëposhtme:

- A) Pneumoni lobare
- B) Pneumotoraks spontan
- C) Infarkt miokardi
- D) Emboli pulmonare
- E) Aneurizëm disekante

Pyetja 241

Në cilët volum pulmonar distentimi pulmonar është minimal:

- A) Në korespondim me kapacitetin pulmonar total
- B) Në korespondencë me volumin rezidual
- C) Në korespondencë me volumin e rezervës inspiratore
- D) Në korespondencë me volumin e rezervës ekspiratore
- E) Në korespondencë me kapacitetin vital të sforcuar

Pyetja 242

Absesi pulmonar fillimisht duhet të trajtohet me:

- A) Terapi farmakologjike
- B) Aspiracion transparietal
- C) Pneumotomia
- D) Lobektomia
- E) Drenazh bronkoskopik

Pyetja 243

Si quhet grumbullimi i likidit limfatik në hapsirën pleuritike:

- A) Hidropneumotoraks
- B) Kilotoraks
- C) Hemotoraks
- D) Empiema
- E) Hidrotoraks

Pyetja 244

Në klasifikimin TNM të tumoreve pulmonar M indikon:

- A) Metastaza kockore
- B) Mungesa e metastazave
- C) Prezenca joprobable e metastazave në distancë
- D) Metastaza jo të vlersueshme
- E) Metastaza në limfonoduj

Pyetja 245

Të gjithë organet/aparatet e mëposhtme preken në fibrozën cistike me përjashtim:

- A) Pulmoni
- B) Intestini
- C) Pankreasi
- D) Gjëndrat salivare
- E) Renet

Pyetja 246

Sarkoidoza është një sëmundje e karakterizuar nga:

- A) Një histori natyrale e karakterizuar nga periudha aktive dhe qetësie
- B) Një sëmundje me progresion gjithmonë fatal

- C) Një sëmundje që prezantohet mbi të gjitha në moshë të avancuar
- D) Një sëmundje me interesim ekskluzivisht pulmonar
- E) Një sëmundje që intereson ekskluzivisht limfonodujt

Pyetja 247

Cilat janë mekanizmat patogjenetikë kryesor në hipertensionin pulmonar sekondar nga sëmundje kronike respiratore:

- A) Mbingarkesë ventrikulare e majtë
- B) Mbingarkesë ventrikulare e djathtë
- C) Vozokonstriksion pulmonar hipoksike
- D) Stazë pulmonare
- E) Asnjëra

Pyetja 248

Të gjitha trajtimet e mëposhtme përdoren në trajtimin e fibrozës cistike, me përjashtim të:

- A) Mukolitikëve
- B) Enzimave proteolitike
- C) Drenazhit postural
- D) Antibiotikëve
- E) Asnjëra

Pyetja 249

Cila është terapia më e përshtatshme për profilaksi korrekte të embolisë pulmonare në pacientët me risk të mesëm:

- A) Aspirina
- B) Dikumarol
- C) Heparin me peshë të ulët molekulare
- D) Glukokortikoid
- E) Indometacin

Pyetja 250

Cila është procedura që lejon një diagnozë precize të lezioneve neoplazike trakeale:

- A) Ct torako - mediastinale
- B) Fibrobronkoskopia
- C) Ekografia trakeale
- D) Radiografia e toraxit
- E) Rezonancë magnetike trakeale

Pyetja 251

Cili tip histologjik nga karcinomat jo me qelizave të vogla shoqërohet më lehtë me versamente pleurale:

- A) Karcinoma jo e diferencuar
- B) Adenokarcinoma
- C) Karcinoma spinoqelizore
- D) Karcinoma me qeliza të mëdha
- E) Karcinoide

Pyetja 252

Cila është masa e menjëhershme në një pneumotoraks hipertensiv:

- A) Pushim shtrati
- B) Drenazh
- C) Torakotomi
- D) Sonda nazo gastrike
- E) Bronkoskopia

Pyetja 253

Cili është rezultati kryesor që përfitohet nga përdorimi i antileukotrienëve:

- A) Kontrollonjë të vetëm astmën bronkiale
- B) Eleminonjë inflamacionin bronkial
- C) Lejojnë një reduktim të dozës së steroidëve inhalator
- D) Reduktojnë sekrecionet bronkiale
- E) Reduktojnë përgjigjen imunitare

Pyetja 254

Mbi çfarë bazohet diagnoza e mykobakteriozës:

- A) Egzaminime laboratorike
- B) Kërkimi i antikorpeve, egzaminimi radiologjik
- C) Egzaminimi radiologjik dhe klinik
- D) Izolimi i patogjenit
- E) Egzaminime laboratorike dhe radiologjike

Pyetja 255

Cili nga të mëposhtmet është faktor risku më i rëndësishëm për tuberkulozin:

- A) Infeksioni me hiv
- B) Infeksioni me hepatit viral b
- C) Infeksioni me hepatit viral c
- D) Hepatopatit në përgjithësi
- E) Çfardo infeksioni viral

Pyetja 256

Cila është shënja më e shpeshtë që shoqërohet me diagnozën e bronkitit kronik:

- A) Kollë e thatë
- B) Dispne eforti
- C) Kollë produktive
- D) Dispne qetsie
- E) Stridor laringeal

Pyetja 257

Prezenca e kalçifikimeve si levozhga e vezës në limfonodujt hilar është tipike për kë pneumokoniozë:

- A) Azbesotz
- B) Berilioz

- C) Silikoz
- D) Talkoza
- E) Stanoza

Pyetja 258

Mikrocitoma pulmonare është një tumor me origjinë:

- A) Ind endotelial
- B) Ind neuroendokrin
- C) Ind epiteliar
- D) Fibroblastet
- E) Ind limfoid

Pyetja 259

Me përjashtim të ekspozimit ndaj azbestit, cili nga të mëposhtmet mund të konsiderohen faktor të mundshëm për lindjen e mezoteliomës:

- A) Pleuriti kronik fibroplazik
- B) Trauma
- C) Tymi i duhanit
- D) Rezatimet jonizuese
- E) Të gjitha

### **03.Kardiologji**

Pyetja 1

Krizat lipotimike kanë një incidence të rritur në:

- A) Stenozën e aortas
- B) Insuficiencën e aortas
- C) Stenozën e istmusit të aortas
- D) Insuficiencën mitrale
- E) Steno-insuficiencën mitrale

Pyetja 2

Cfarë kuptoni me termin miokard spongioz?

- A) Mungesa e trabekulave normale në pjesën e brendshme të ventrikulit të majtë si pasojë e një defekti maturimi në jetën intrauterine
- B) Ekzistenca e foramen ovale ndërventrikulare pas lindjes
- C) Prania e trabekulave në pjesën e brendshme të ventrikulit të majtë si pasojë e një defekti maturimi në jetën intrauterine
- D) Zëvendësimi i miokardit me ind dhjamor
- E) Situatë klinike që karakterizohet nga zgjerimi i madh i ventrikulit

Pyetja 3

Rritja e vëllimit qarkullues (volemisë), vjen si pasojë e të gjithë gjendjeve të poshtë shënuara me përjashtim të:

- A) Rritjes të filtrimit glomerular
- B) Rritjes të aktivitetit të reninës plazmatike



- C) Uljes të sekretimit të ADH
- D) Uljes të përthithjes të natriumit
- E) Uljes të sekretimit të aldosteronit

Pyetja 4

Në infarkt in e miokardit cila enzime paraqitet në vlerë më të rritur fillimisht?

- A) LDH
- B) SGOT
- C) Mioglobina
- D) CK-MB
- E) Troponina

Pyetja 5

Në stenozen e valvulës mitrale evidentohen të gjitha këto me përjashtim të:

- A) Hipertrofi e arterieve pulmonare
- B) Hipertrofi e ventrikulit të majtë
- C) Hipertrofi e atriumit të majtë
- D) Hipertension venoz pulmonare
- E) Zhurmë diastolike në apex

Pyetja 6

Cila shenjë nuk zbulohet në stenozen mitrale?

- A) zhurmë diastolike me përforcim presistolik
- B) zhurmë në hapje të valvulës
- C) theksim i tonit të dytë në apex
- D) theksim i tonit të dytë në bazë
- E) pulsi i shpejtë

Pyetja 7

Cili nga pohimet është I vërtetë për bllokun atrio-ventrikular të grades të II-të tip II?

- A) Valë P ndjekur nga komplekse QRS me intervale PR normale ose të alteruar nga vale P që nuk pasohen me komplekse QRS
- B) Zgjatje progresive e intervalit PR në tri komplekse QRS të një pas njëshme, shoqëruar me mungesë të vales P pasuese të QRS
- C) Zgjatje e intervalit PR mbi 0.20 sek për çdo kompleks QRS
- D) Nuk ka lidhje midis vales P dhe komplekseve QRS. Frekunca e komplekseve QRS është 30 bpm
- E) Mungesa e valëve P të dukshme

Pyetja 8

Në cilën prej këtyre sëmundjeve degjohet një "klik" mezo-sistolik?

- A) insuficiencë mitrale
- B) aneurizëm aortale
- C) infarkt
- D) prolaps i valvulës mitrale
- E) defekt interventrikular

Pyetja 9

Në një pacient me fibrilacion atrial kronik cili është niveli i INR në mënyrë të tillë që të evitohet një iktus embolik?

- A) 6
- B) 3
- C) 4
- D) 2
- E) 1

Pyetja 10

Një njeri 57 vjeç, hipertensiv, me hiperkolesterolemi dhe mbipeshë ankon për një dhimbje shtrënguese në krahë në sforcime të lehta (si ngjitje shkallëve, dhënia e biçikletës). Cilin ekzaminim do të kërkonit fillimisht?

- A) Shintigrafi me Talium 201
- B) Ekokardiograma
- C) Koronarografi
- D) Cikloergometri
- E) TAC

Pyetja 11

Cili nga ndërlikimet e infarktit të miokardit mund të na çojë drejt tamponadës kardiake?

- A) Insuficiencia mitrale akute
- B) Insuficiencia kardiake akute
- C) Ruptura e septumit interventrikular
- D) Ruptura kardiake
- E) Insuficiencia mitrale

Pyetja 12

Cili është ndërlikimi më i rëndë që vërehet në stenozen mitrale?

- A) Embolia sistemike
- B) Infarkti pulmonar
- C) Infarkti miokardit
- D) Fibrilacioni atrial
- E) Asistolia

Pyetja 13

Në EKG një ekstrasistol ventrikulare karakterizohet nga:

- A) kompleksi QRS i ngushtë ndjekur nga një pauzë kompesatore
- B) kompleksi QRS i gjerë pa pauzë
- C) kompleksi QRS i gjerë ndjekur nga një pauzë jo kompesatore
- D) kompleksi QRS i ngushtë ndjekur nga një pauzë jo kompesatore
- E) kompleksi QRS i gjerë ndjekur nga një pauzë kompesatore

Pyetja 14

Cila situatë klinike nuk karakterizohet nga ulja e fraksionit të mbushjes të ventrikulit të majtë shoqëruar me kongjestion pulmonar?

- A) Stenoza mitrale
- B) Insuficienca mitrale
- C) Tamponada kardiake
- D) Kardiomiopatia hipertrofike
- E) Infarkti akut i miokardit

Pyetja 15

Cili është niveli i kolesterolit LDL që duhet të arrij një pacient me infarkt miokardi?

- A) < 130 mg/dl
- B) < 200 mg/dl
- C) < 110 mg/dl
- D) < 180 mg/dl
- E) < 100 mg/dl

Pyetja 16

Efekti inotrop pozitiv në zemër realizohet nga:

- A) rritja e hormoneve tiroides
- B) acidoza
- C) hiperkalemia
- D) hipokalemia
- E) frenimi beta-adrenergjik

Pyetja 17

Përcaktuesi kryesor i konsumit të oksigjenit nga miokardi është:

- A) frekuenca kardiake
- B) presioni arterial diastolik
- C) kontraktiliteti miokardit
- D) presioni arterial sistolik
- E) vëllimi ventrikular telediastolik

Pyetja 18

Shkaku më i shpeshtë i pamjaftueshmërisë të zemrës është:

- A) disfunksioni diastolik i ventrikulit të majtë
- B) disfunksioni i ventrikulit të djathtë
- C) hipovolemia
- D) disfunksioni sistolik i ventrikulit të majtë
- E) shoku

Pyetja 19

Raporti ventilim/perfuzion tregon raportin e:

- A) kapacitetit vital dhe fluksit të gjakut qarkullues në mushkëri
- B) ventilimit dhe fluksit të gjakut qarkullues në njësinë e mushkërisë
- C) PCO<sub>2</sub> dhe PO<sub>2</sub> në gjakun arterial
- D) vëllimin e gazeve dhe vëllimin e gjakut qarkullues në mushkëri

E) kapacitetin pulmonar total dhe prurjen kardiake

Pyetja 20

Cilat janë karakteristikat elektrokardiografike të infarktut subendokardial?

- A) subnivelimi i ST dhe mungesa e valës Q
- B) supraniveli ST dhe shfaqja e valës Q
- C) subnivelimi i ST dhe shfaqja e valës Q
- D) subnivelimi i ST dhe shfaqja e valës U
- E) ST në vijën izoelektrike dhe shfaqja e valës Q

Pyetja 21

Në lidhje me një pacient 65 vjeç, hipertensiv, me fibrilacion atrial kronik të stabilizuar, pa faktorë të tjerë riskant, janë të vërteta të gjitha pohimet e më poshtme me përjashtim të:

- A) Duhet realizuar konvertimi i ritmit
- B) Pacient nuk mund të trajtohet vetëm me aspirinë
- C) Pacienti duhet të trajtohet vetëm me barna antihipertensiv
- D) Me përjashtim të rasteve kur ka një kundërlidhje absolute, terapia do të konsistonte në përdorimin e antikoagulantëve oral
- E) Pacienti duhet trajtuar vazhdimisht me heparinë subcutane

Pyetja 22

Cili nga këta faktorë nuk lidhet me trombofilinë?

- A) Defiçiti i proteinës C
- B) Defiçiti i antitrombinës III
- C) Defiçiti i proteinës S
- D) Hiperhomocisteinemia
- E) Neoplazia

Pyetja 23

Përkufizohet si "angina nga eforti":

- A) Angina de nuova
- B) Angina Prinzmetal
- C) Angina e qëndrueshme
- D) Angina e qetësisë
- E) Angina si pasojë e ngarkesës

Pyetja 24

Refluksi pozitiv hepato-jugular flet në favor të:

- A) Obstruksionit të vena cava superior
- B) Pamjaftueshmërisë zemrore me natyrë kongjестive
- C) Obstruksionit të vena portës
- D) Obstruksionit të vena cava inferior
- E) Situatë fiziologjike

Pyetja 25

Terapia në insuficiencën kardiake përfshin përdorimin e të gjithë barnave të poshtë shënuar me përjashtim të:

- A) beta-blokuesve
- B) ACE-inhibitorëve
- C) Eritropoetinës
- D) Statinave
- E) Diuretikëve

Pyetja 26

Cili nuk është efekt anësor i terapisë me ace-inhibitor?

- A) Hipotensioni
- B) Hiponatremia
- C) Ndryshimet në shije
- D) Kolla e thatë
- E) Edema angioneurotike

Pyetja 27

Zhurma e Flint dëgjohe në:

- A) fibrilacion atrial
- B) insuficiencë mitrale
- C) stenoze aortale
- D) duktus Botalli
- E) insuficiencë aortale

Pyetja 28

Në pacientin hipertensiv graviteti i dëmtimit organor lidhet ngushtësisht me:

- A) presionin arterial të monitoruar për 24 orë
- B) presionin arterial të monitoruar në shtëpi
- C) presionin arterial të monitoruar dy herë në ditë
- D) presionin arterial të monitoruar në klinikë
- E) presionin arterial të monitoruar gjatë natës

Pyetja 29

Nga pikëpamja klinike fibrilacioni ventrikular karakterizohet nga:

- A) dispnea e rëndë
- B) infarkti akut
- C) cianoza
- D) arresti kardiocirkulator
- E) gishtat si shkop tamburi

Pyetja 30

Cili është elementi që haset më shpesh në kuadrin klinik të stnozës mitrale?

- A) iktus
- B) hemoptizia
- C) dispnea
- D) prekordialgia

E) ngjirja e zërit

Pyetja 31

Cili lloj i infarktut akut të miokardit (IAM) mund të shoqërohet me një aktivizim vagal?

- A) IAM septal
- B) IAM lateral
- C) IAM diafragmatik
- D) IAM anterior
- E) Asnjë nga këto

Pyetja 32

Cili prej elementëve të mëposhtëm mund të përdoret për të diferencuar insuficiencën ventrikulare të majtë nga insuficienca ventrikulare e djathtë?

- A) Rritja e enzimave hepatike
- B) Asciti
- C) Edema pulmonare
- D) Edema periferike
- E) Tendosja e venave jugulare

Pyetja 33

Cili duhet të jetë bari që i duhet dhënë fillimisht një pacienti me hiperkalemi dhe komplekse QRS të zgjeruar në EKG?

- A) kayexalate
- B) klorur kalçiumi
- C) digoksin
- D) furosemid
- E) bikarbonat natriumi

Pyetja 34

Cili është ndërlikimi më i rëndë që vërehet në stenozen mitrale?

- A) Fibrilacioni atrial
- B) Infarkti pulmonar
- C) Infarkti miokardit
- D) Asistolia
- E) Embolia sistemike

Pyetja 35

Angioplastika koronare percutane indikohet në:

- A) amiloidozën kardiake
- B) insuficiencën kardiake
- C) difektin interatrial
- D) artropatinë e anësisë të poshtme
- E) stenozen koronare

Pyetja 36

Në disekacionin e aortës e dhëna semiotike më e rëndësishme është:

- A) bllok i degës së djathtë
- B) hipokratizmi digitalik
- C) cianoza
- D) mungesa e pulseve arterial
- E) pectus excavatum

Pyetja 37

Hipertensioni arterial në insufiçencën renale kronike vjen si pasojë e:

- A) stenoza të arteries renale të njërës veshkë
- B) stenoza të arteries renale në të dy veshkat
- C) hiperaldosteronizmit primar
- D) rritjes të vëllimit jashtëqelizor si pasojë e retensionit sodik
- E) sindromës Barter

Pyetja 38

Cili nga këta faktorë nuk lidhet me vdekshmërinë e rritur të një pacienti me pamjaftueshmëri kardiake?

- A) Ulja e intervalit RR
- B) Rritja e BNP (brain natriuretik peptide) qarkulluese
- C) Përdorimi i ACE-inhibitorëve
- D) Ventrikuli i majtë merr formë sferike
- E) TA më pak se 80/60 mmHg

Pyetja 39

Shkaku më i shpeshtë i stenoza të valvulës aortale është:

- A) Sëmundje të lindura
- B) Sëmundje reumatizmale
- C) Endokarditi infektiv
- D) Degjenerimet fibrokalçike të valvulës aortale bikuspidale
- E) Degjenerimet fibrokalçike të pleqërisë

Pyetja 40

Cili është simptomi i menjëhershëm i rakturës të aneurizmës të aortës?

- A) Anuria
- B) Melena
- C) Hematemeza
- D) Dhimbja e menjëhershme dhe/ose shoku
- E) Zhdukje e pulseve periferike

Pyetja 41

Pulsi "parvus et tardus" është i pranishëm në:

- A) Stenoza mitrale
- B) Stenoza aortale
- C) Insufiçencën e valvulës pulmonare
- D) Insufiçencën e valvulës aortale
- E) Insufiçencën mitrale

Pyetja 42

Në një pacient me kardiopati ishemike dhe diabet cila është vlera që duhet të ketë tensioni arterial që të quhet optimale?

- A) = 100/80
- B) = 120/80
- C) = 130/80
- D) < 120/80
- E) < 130/80

Pyetja 43

Në ekzaminimin objektiv të një pacienti me flater arterial nuk mund të degjohet:

- A) toni i I-rë
- B) toni i II-të
- C) zhurmë e stenozës mitrale
- D) zhurmë e insuficiencës mitrale
- E) toni i IV-të

Pyetja 44

Në insuficiencën e valvulës aortale vihen re të gjithë elementët e poshtëshënuar me përjashtim të:

- A) zbehje e lëkurës dhe mukozave
- B) rritje e diferencës midis presioneve arterial
- C) zhurma Flinit
- D) pulsimit i dukshëm arterial
- E) pulsi tardus

Pyetja 45

Cili nga elementët e poshtë shënuar nuk është një faktor rreziku kardiovaskular?

- A) Hiperhomocisteinemia
- B) Rritja e TNF qarkulluese
- C) Dislipidemi
- D) Cirkumferenca abdominale= 102 cm në meshkuj dhe =88cm në femra
- E) Proteina C reaktive > 1mg/dl

Pyetja 46

Cili nuk është faktor rreziku për emboli pulmonare?

- A) Trauma/fraktura
- B) Hipotiroidizmi
- C) Insuficiencia kronike venoze
- D) Mosha e madhe
- E) Obeziteti

Pyetja 47

Të gjitha janë karakteristika të anginit të qëndrueshme më përjashtim të:

- A) Ndjesia e rëndesës ose e djeies në regjionin retrosternal



- B) Nuk zgjat më shumë se 20 min
- C) Fillon në qetësi dhe përkeqësohet me sforcimet
- D) Qetësohet pas përdorimit të nitrateve
- E) Gjatë gjumit shpërthen më shumë gjatë fazës REM të tij

Pyetja 48

Studimi fiziologjik endokavitar është i domosdoshëm në :

- A) Pacientet me aritmi ventrikulare malinje
- B) Pacientët me insuficiencë kardiake
- C) Pacientët me bllok të degës të djathtë
- D) Pacientet me bllok dege
- E) Pacientët me ekstrasistola të shpeshta

Pyetja 49

Një djalë 30 vjeç paraqitet tek mjeku me temperaturë me frisione, palpitatione, djerësishtje e shtuar; në ekzaminim objektiv evidentohet një zhurmë sistolike. Për çfarë do të dyshonit?

- A) Rupturë e kordave tendine
- B) Insuficiencë aortale
- C) Endokardit bakterial
- D) Mixoma atriale
- E) Infarkt

Pyetja 50

Në një të sëmurë i cili mban proteza valvulare të tipit mekanik, çfarë terapie do të ndiqnit?

- A) Terapi me antikoagulant, duke rruajtur INR 2.5-3.5 për 6 muaj ndjekur nga terapia me antiagregant
- B) Terapi me antikoagulant, duke rruajtur INR 2.5-3.5 për 1 vit ndjekur nga terapia me antiagregant
- C) Terapi me antikoagulant, duke rruajtur INR 2-3 për një kohë të pa përcaktuar
- D) Terapi me antikoagulant, duke rruajtur INR 2-3 për 6 muaj ndjekur nga terapia me antiagregant
- E) Terapi me antikoagulant, duke rruajtur INR 2.5-3.5 për një kohë të pa përcaktuar

Pyetja 51

Kontraktiliteti i miokardit zvogëlohet si pasojë e:

- A) Përdorimit të glukozidëve digitalik
- B) Angiotenzinës II
- C) hiperkapnisë
- D) katekolaminave
- E) glukagonit

Pyetja 52

Dhimbja torakale që fillon në mënyrë të papritur shoqëruar me polipne dhe hemoptizi modeste vihet re në:

- A) pleurite hemorragjike
- B) pleurite eksudative
- C) pachipleurite
- D) infarkt miokardial
- E) infarkt pulmonar

Pyetja 53

Vendidëgjimi i valvulës aortale, në kushte normale, është:

- A) hapsira e II-të interkostale majtas parasternale
- B) hapsira e III-të interkostale majtas parasternale
- C) hapsira e II-të interkostale djathtas parasternale
- D) hapsira e IV interkostale majtas parasternale
- E) hapsira interkostal subklavikulare

Pyetja 54

Palpitacionet, cefalea pulsante, djersitja natën janë tipike të:

- A) insuficiencës trikuspidale
- B) stenozës aortale
- C) insuficiencës pulmonare
- D) insuficiencës aortale
- E) stenozës mitrale

Pyetja 55

Cila nga këto situata konsiderohet si me rrezik të lartë për zhvillim të endokarditit bakterial:

- A) prolaps i valvulës mitrale pa disfunktion valvular
- B) kardiomiopati hipertrofike
- C) ndërhyrje kirurgjikale për by-pass
- D) endokardit bakterial i mëparshëm
- E) prolaps i valvulës mitrale me insuficiencë mitrale

Pyetja 56

Cfarë tregon prania e valës Q në derivacionet II-III dhe Vf të EKG-së?

- A) IAM anterior
- B) Fibrilacion ventrikular
- C) IAM në zhvillim e sipër në pjesën inferiore
- D) IAM inferior
- E) Flater atrial

Pyetja 57

Insuficiencia ventrikulare e djathtë sekondare është pasojë e:

- A) Stenozës të istmusit të aortës
- B) Insuficiencës valvulare aortale
- C) Sarkoidozës pulmonare kronike
- D) Stenozës valvulare aortale
- E) Hipertensioni arterial malinj

Pyetja 58

Në meshkujt e popullatës, manifestimi i parë i një sëmundje kardiake shpesh herë përfaqësohet nga:

- A) Infarkti
- B) Angina kronike e paqëndrueshme

- C) Vdekja e papritur
- D) Angina e qëndrueshme
- E) Insuficienca kardiake post-ishemike

Pyetja 59

Vlerësimi kryesor në kardiomiopatinë dilatuese është:

- A) EKG
- B) Shintigrafia e miokardit
- C) Koronarografia
- D) Ekokardiografia
- E) Cikloergometria

Pyetja 60

Niveli serik i peptidit atrial natriuretik në një pacient me insuficencë kardiake kronike është në përputhje me:

- A) shkallën e dëmtimit të funksionit të zemrës
- B) gjininë dhe moshën e pacientit
- C) moshën e pacientit
- D) vlerat e presionit sistolik
- E) nivelin e aterosklerozës në arteriet koronare

Pyetja 61

Cili prej barnave të poshtëshënuar është bari i zgjedhur për parandalimin e fibrilacionit ventrikular gjatë trajtimit të infarktut akut të miokardit?

- A) kinidina
- B) digoksina
- C) lidokaina
- D) flrkanidi
- E) propanololi

Pyetja 62

Të gjitha të mëposhtme janë shkaqe të ndalimit të zemrës me përjashtim të:

- A) Takikardia ventrikulare
- B) Çrregullim i përçimit
- C) Asistolia
- D) Bllok atrioventrikular grada III-të
- E) Shok volemik

Pyetja 63

Në rastet me angina pectoris të paqëndrueshme, cili bar duhet konsideruar si terapia mbajtëse, përveç barnave të nevojshëm për të kontrolluar simptomat e angines?

- A) aspirina 100 mg/dita
- B) nitroderivate nën gjuhë sipas nevojës
- C) diltiazem 360 mg/die
- D) verapamil 240 mg + nifedibinë 40 mg/dita
- E) aspirina 325 mg/dita + calciarina 0.5 mg per 2/dita

Pyetja 64

Të gjithë barnat e mëposhtëm janë të nevojshëm në trajtimin e anginës gjoksore të paqëndrueshme me përjashtim të:

- A) Nitrateve
- B) Digoksinës
- C) O<sub>2</sub>
- D) Betablockuesve
- E) Kalçiblockuesve

Pyetja 65

Duke patur parasysh fispatologjinë e shokut hipovolemik, cila nga veprimet e poshtëshënuara nuk duhet ndërmarrë?

- A) terapia me oksigjen
- B) pozicionimi i pacientit shtrirë me shpinë dhe me kokën e ulur
- C) monitorimi i presionit venoz qëndror
- D) aplikimi i terapisë endovenoze me solucione koloidale
- E) aplikimi i terapisë me vazokonstriktor për të ruajtur presionin arterial

Pyetja 66

Tamponada kardiake është një situatë emergjence e cila evidentohet gjatë një:

- A) goditje të fortë të toraksit
- B) stenoze të rëndë mitrale
- C) një aksidenti rrugor
- D) stenoze të rëndë aortale
- E) grumbullimit të likidit të presuar në hapsirën perikardiale

Pyetja 67

Të gjithë barnat antihipertensiv të shënuar më poshtë janë të kundërindikuar në shtatzani, me përjashtim të:

- A) betablockuesit
- B) ACE-inhibitorët
- C) nitratet
- D) kalçiantagonistët
- E) diuretikët

Pyetja 68

Cila nga ndryshimet e poshtëshënuara është karakteristike e cor pulmonar:

- A) sindroma Claude-Bernard-Horner
- B) zgjerimi i ventrikulit të majtë
- C) shunti interventrikular majtas-djathtas
- D) persistimi i pulsit arterial
- E) hipertrofia e ventrikulit të djathtë

Pyetja 69

Niveli serik i peptidit atrial natriuretik në një pacient me insuficincë kardiake kronike është në përputhje me:

- A) moshën e pacientit
- B) gjininë dhe moshën e pacientit
- C) shkallën e dëmtimit të funksionit të zemrës
- D) vlerat e presionit sistolik
- E) nivelin e aterosklerozës në arteriet koronare

Pyetja 70

Cili prej barnave të poshtëshënuar është bari i zgjedhur për parandalimin e fibrilacionit ventrikular gjatë trajtimit të infarktut akut të miokardit?

- A) lidokaina
- B) digoksina
- C) kinidina
- D) flrkanidi
- E) propranololi

Pyetja 71

Të gjitha të mëposhtme janë shkaqe të ndalimit të zemrës me përjashtim të:

- A) Bllok atrioventrikular grada III-të
- B) Çrregullim i përçimit
- C) Asistolia
- D) Takikardia ventrikulare
- E) Shok volemik

Pyetja 72

Në rastet me angina pectoris të paqëndrueshme, cili bar duhet konsideruar si terapia mbajtëse, përveç barnave të nevojshëm për të kontrolluar simptomat e anginës?

- A) aspirina 100 mg/dita
- B) aspirina 325 mg/dita + calciparina 0.5 mg per 2/dita
- C) diltiazem 360 mg/die
- D) verapamil 240 mg + nifedibinë 40 mg/dita
- E) nitroderivate nën gjuhë sipas nevojës

Pyetja 73

Të gjithë barnat e mëposhtëm janë të nevojshëm në trajtimin e anginës gjoksore të paqëndrueshme me përjashtim të:

- A) Nitrateve
- B) Betablokuesve
- C) O<sub>2</sub>
- D) Digoksinës
- E) Kalçiblokuesve

Pyetja 74

Duke patur parasysh fispatologjinë e shokut hipovolemik, cila nga veprimet e poshtëshënuara nuk duhet ndërmarrë?

- A) terapia me oksigjen
- B) pozicionimi i pacientit shtrirë me shpinë dhe me kokën e ulur
- C) aplikimi i terapisë me vazokonstriktor për të ruajtur presionin arterial
- D) aplikimi i terapisë endovenoze me solucione koloidale
- E) monitorimi i presionit venoz qëndror

Pyetja 75

Tamponada kardiake është një situatë emergjence e cila evidentohet gjatë një:

- A) goditje të fortë të toraksit
- B) stenoze të rëndë mitrale
- C) një aksidenti rrugor
- D) grumbullimit të likidit të presuar në hapsirën perikardiale
- E) stenoze të rëndë aortale

Pyetja 76

Cil prej faktorëve të mëposhtëm riskant për zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare përgjigjet edhe për disfunktionin erektil:

- A) duhanpirja
- B) dislipidemia
- C) diabeti melitus
- D) Të gjitha përgjigjet
- E) jeta sedentare

Pyetja 77

Cila nga ndryshime e poshtëshënuara është karakteristike e cor pulmonar:

- A) hipertrofia e ventrikulit të djathtë
- B) zgjerimi i ventrikulit të majtë
- C) shunti interventrikular majtas-djathtas
- D) persistimi i pulsit arterial
- E) sindroma Claude-Bernard-Horner

Pyetja 78

Të gjithë barnat antihipertensiv të shënuar më poshtë janë të kundërindikuar në shtatzani, me përjashtim të:

- A) betablokuesit
- B) ACE-inhibitorët
- C) kalçiantagonistët

- D) nitratet
- E) diuretikët

#### Pyetja 79

Hipertensioni arterial në insufiçencën renale kronike vjen si pasojë e:

- A) stenoza të arteries renale të njërës veshkë
- B) stenoza të arteries renale në të dy veshkat
- C) rritjes të vëllimit jashtëqelizor si pasojë e retensionit sodik
- D) hiperaldosteronizmit primar
- E) sindromës Barter

#### Pyetja 80

Cila nga alterimet e mëposhtme elektrolitike sjell shfaqjen në EKG të një segmenti Q-T të zgjatur me praninë e një vale U?

- A) hipopotasemia
- B) alkalozia
- C) hiperkalçemia
- D) hiperpotasemia
- E) hiponatremia

#### Pyetja 81

Të gjitha situatat e mëposhtme janë shkaqe tipike të pamjaftueshmërisë zemrore distolike me përjashtim të:

- A) hipertensionit arterial me hipertrofi ventrikulare të majtë
- B) takiaritmia
- C) hipertiroidizmi
- D) miokarditet virale
- E) fibroza miokardiale

#### Pyetja 82

Cila shenjë nuk zbulohet në stenoza mitrale?

- A) zhurmë diastolike me përforcim presistolik
- B) puls i shpejtë
- C) theksim i tonit të dytë në apex
- D) theksim i tonit të dytë në bazë
- E) zhurmë në hapje të valvulës

#### Pyetja 83

Në stenoza e aortës cila nga shenjat e mëposhtme vihet re?

- A) puls i kërcyes
- B) pulsimi i arterieve karotide

- C) pulsimi i arterive femorale
- D) pulsi i vonuar
- E) asnjë nga këto

#### Pyetja 84

Në stenozen e aortas, dëgjohet:

- A) toni i II-të në sistol
- B) kërcitje në fillimin e hapjes të valvulës
- C) zhurma diastolike
- D) zhurmë sistolike zbrazëse në hapsirën interkostale të II-të
- E) të gjitha këto

#### Pyetja 85

Cilin prej barnave të poshtë shënuar nuk do ja jepnit një pacienti, në EKG-në e të cilit kohët e fundit është evidentuar fibrilacion atrial:

- A) Beta-blokues+ACE-inhibitor
- B) Digoksinë
- C) Beta stimulues
- D) Kumarol
- E) Antagonist të kalçiumit

#### Pyetja 86

Kundërrindikacion relativ në përdorimin e terapisë me digitalikë është:

- A) hipokalemia
- B) hemiblloku anterior i majtë
- C) hipertiroidizmi
- D) terapia me kortikosteroid
- E) terapia me spironolakton

#### Pyetja 87

Në EKG e një pacienti me Torsade de pointes do të evidentohet:

- A) komplekse QRS të zgjeruara dhe bradikardi
- B) komplekse QRS të zgjeruara dhe takikardi
- C) komplekse QRS të ngushtuara dhe bradikardi
- D) komplekse QRS të ngushtuara dhe takikardi

#### Pyetja 88

Sipas klasifikimit NYHA (New York Heart Association) të insuficiencës kardiake, të gjitha pohimet e më poshtme janë të vërteta me përjashtim të:

- A) në grupin e I-rë në prani të një kardiopatie organike nuk vihet re kufizim i dukshëm i aktivitetit fizik
- B) në grupin e IV-të simptomat e insuficiencës kardiake janë të pranishme edhe në qetësi



- C) edema deklive e kavalje të këmbës nuk bën pjesë në kritetret e klasifikimit
- D) prania e dhimbjes gjoksore e kalon situatën klinike automatikisht në grupin e III-të ose të IV-të
- E) pacientët e grupit të II-të janë asimptomatik në qetësi

#### Pyetja 89

Ekzaminimi i kërkuar normalisht për të konfirmuar diagnozën e anginës të qëndrueshme është:

- A) EKG-ja
- B) Koronarografia
- C) Kateterizimi i kornareve
- D) Prova ushtrimore
- E) Ventrikulografia

#### Pyetja 90

Cila prej shenjave dhe simptomave të mëposhtme është e pranishme në pacientët me insuficiencë kardiakë kongjестive të rëndë?

- A) përqëndrimi i rritur plazmatik i ADH
- B) edema e gjeneralizuar
- C) rritja e përmasave të mëlçisë
- D) etje
- E) të gjitha këto

#### Pyetja 91

Cila nga alternativat e poshtëshënuara paraqet shenjën patognomotike në elektrokardiogramën e një pacienti me fibrilacion atrial?

- A) zgjatje e intervalit QT
- B) subnivelimi i segmentit ST
- C) intervali PR > 0.20 msec
- D) mungesa e valës P
- E) kompleksi QRS i ngushtuar

#### Pyetja 92

Në një pacient me episode sinkopi, bllok atrioventrikular të plotë dhe kriza të shpeshta takikardie atriale është e nevojshme:

- A) përdorimi i terapisë me amiodaron
- B) përdorimi i terapisë me beta-blokues
- C) përdorimi i terapisë me verapamil
- D) përdorimi i terapisë me digitalik
- E) implantimi i një pace-makeri ventrikular

#### Pyetja 93

Cili prej elementëve të mëposhtëm mund të përdoret për të diferencuar insuficiencën ventrikulare të majtë nga insuficiencia ventrikulare e djathtë?

- A) Rritja e enzimave hepatike
- B) Edema pulmonare
- C) Asciti
- D) Edema periferike
- E) Tendosja e venave jugulare

Pyetja 94

Cili duhet të jetë bari që i duhet dhënë fillimisht një pacienti me hiperkalemi dhe komplekse QRS të zgjeruar në EKG?

- A) klorur kalçiumi
- B) kayexalate
- C) digoksin
- D) furosemid
- E) bikarbonat natriumi

Pyetja 95

Cili është elementi që haset më shpesh në kuadrin klinik të stenozës mitrale?

- A) prekordialgia
- B) hemoptizia
- C) dispnea
- D) iktus
- E) ngjirja e zërit

Pyetja 96

Cili prej këtyre ushtrimeve fizike këshillohet në parandalimin, kurimin dhe riaftësimin e pacientëve me sëmundje kardiovaskulare?

- A) anaerobik
- B) aerobik
- C) izokinetik
- D) force
- E) fuqie

Pyetja 97

Terapia në insuficiencën kardiake përfshin përdorimin e të gjithë barnave të poshtë shënuar me përjashtim të:

- A) beta-blokuesve
- B) ACE-inhibitorëve
- C) Statinave
- D) Eritropoetinës
- E) Diuretikëve

Pyetja 98

Cili është niveli i kolesterolit LDL që duhet të arrij një pacient me infarkt miokardi?

- A) < 130 mg/dl
- B) < 200 mg/dl
- C) < 100 mg/dl
- D) < 180 mg/dl
- E) < 110 mg/dl

Pyetja 99

Krizat e lipotimisë janë të shpeshta në:

- A) insuficiencën e aortës
- B) stenozen e aortës
- C) stenozen e istmusit aortal
- D) insuficiencën mitrale
- E) stenozen mitrale

Pyetja 100

Në infarkt të miokardit cila prej enzimave të më poshtme rrite më shpejtë?

- A) Mioglobina
- B) SGOT
- C) LDH
- D) CK-MB
- E) Troponina

Pyetja 101

Në stenozen mitrale hasen të gjitha ndryshimet e më poshtme me përjashtim të:

- A) hipertrofi e arteriolave pulmonare
- B) hipertension venoz pulmonar
- C) hipertrofi atriale e majtë
- D) hipertrofi ventrikulare e majtë
- E) fremitus diastolik

Pyetja 102

Në EKG një ekstrasistol ventrikulare karakterizohet nga:

- A) kompleksi QRS i ngushtë ndjekur nga një pauzë kompesatore
- B) kompleksi QRS i gjerë ndjekur nga një pauzë kompesatore
- C) kompleksi QRS i gjerë ndjekur nga një pauzë jo kompesatore
- D) kompleksi QRS i ngushtë ndjekur nga një pauzë jo kompesatore
- E) kompleksi QRS i gjerë pa pauzë

Pyetja 103

Shkaku më i shpeshtë i pamjaftueshmërisë të zemrës është:

- A) disfunkcioni diastolik i ventrikulit të majtë
- B) disfunkcioni sistolik i ventrikulit të majtë
- C) hipovolemia
- D) disfunkcioni i ventrikulit të djathtë
- E) shoku

Pyetja 104

Në cilën prej këtyre sëmundjeve degjohet një "klik" mezo-sistolik?

- A) insuficiencë mitrale
- B) prolaps i valvulës mitrale
- C) infarkt
- D) aneurizëm aortale
- E) defekt interventrikular

Pyetja 105

Nga pikëpamja klinike fibrilacioni ventrikular karakterizohet nga:

- A) dispnea e rëndë
- B) infarkti akut
- C) arresti kardiocirkulator
- D) cianoza
- E) gishtat si shkop tamburi

Pyetja 106

Cili është ndërlikimi më i rëndë që vërehet në stenozen mitrale?

- A) Fibrilacioni atrial
- B) Infarkti pulmonar
- C) Infarkti miokardit
- D) Embolia sistemike
- E) Asistolia

Pyetja 107

Në pacientin hipertensiv graviteti i dëmtimit organor lidhet ngushtësisht me:

- A) presionin arterial të monitoruar në klinikë
- B) presionin arterial të monitoruar në shtëpi
- C) presionin arterial të monitoruar dy herë në ditë
- D) presionin arterial të monitoruar për 24 orë
- E) presionin arterial të monitoruar gjatë natës

## 04.Mjekësia e Familjes

### Pyetja 1

Mashkull 40 vjeç, ka dhimbje të forta të kockave të këmbëve, zverdhje të syve, urinim me ngjyrë të errët dhe anemi. Lienit nuk preket. Në serinë e kuqe ka qeliza target dhe në formë drapëri, si dhe retikulocite të larta. Diagnoza e mundshme:

- A) Hepatit viral akut
- B) Leukemi akute
- C) Drepanocytosis
- D) Thalasemi major

### Pyetja 2

Femër 35 vjeçe, ka anemi, thonjë të thyeshëm, glosit atrofik. Gjaku periferik: hipokromi, mikrocitozë e eritrociteve. Diagnoza e mundshme

- A) Anemi nga mungesa e hekurit
- B) Anemi hemolitike
- C) Anemi nga mungesa e acidit folik
- D) Anemi nga mungesa e vit.B12

### Pyetja 3

Burrë 75 vjeç, ka gjendrra të rritura në të gjitha regionet. Shpretka 4 cm, hepari 4cm. Gjaku periferik: er 4000000, HB 12 gr/dl, Tb 230.000 mm<sup>3</sup>, leukocite 100.000 mm<sup>3</sup>, Formula: Limfocite 97%, segmente 3%. Diagnoza e mundshme

- A) Leukemi limfoblastike akute
- B) Mononukleozë infektive
- C) Leukemi mieloblastike akute
- D) Leukemi limfoide kronike

### Pyetja 4

Grua 50 vjeçe, pas një udhëtimi vjen në urgjencë me dhimbje të fortë gjoksi, dispne, hemoptizi. Ekzaminimi radiologjik normal. ECG takikardi sinusale. Diagnoza e mundshme:

- A) Pneumotoraks spontan
- B) Infarkt akut i miokardit
- C) Mediastinit
- D) Trombemboli pulmonare

### Pyetja 5

Burrë 50 vjeç, duke vrapuar i filloi një dhimbje e fortë gjoksi që u shoqërua edhe me marrje fryme. Pacienti ndaloj vrapin dhe dhimbja u qetësua. ECG në qetësi normal, TA 130/80mmHg. Diagnoza e mundshme:

- A) Refluks gastro-esofagal
- B) Pleurizi
- C) Angina pectoris
- D) Kostokondritis

### Pyetja 6

Mashkull 60 vjeç, alkolist, paraqitet me hematemezë masive dhe gjendje shoku. Ka ascit dhe yje vaskulare. Shkaku i hematemezës:

- A) Varicet e esofagut
- B) Ulçer peptike kronike
- C) Cancer i stomakut
- D) Sindroma Mallory- Weiss

Pyetja 7

Mashkull 40 vjeç, paraqitet me melenë, nuk ka dhimbje barku, nuk ka rënë në peshë. Në ekzaminim anusi dhe rektumi janë normal. Është alkolist dhe pi duhan. Shkaku i melenës:

- A) Ulçera peptike
- B) Carcinoma e rektumit
- C) Hemorroidet
- D) Sëmundja divertikulare

Pyetja 8

Pacient 34 vjeç, hera e katërt që vjen me kolika biliare si pasojë e kalkulozës së kolecistës. Cili është mjekimi i zgjedhur për të sëmurin:

- A) Kolecistectomia
- B) Përdorimi i gurë shkrirësve
- C) Përdorimi i analgjezikëve
- D) Përdorimi i spazmolitikëve

Pyetja 9

Femër 60 vjeçe, ka dhimbje koke bitemporale, turbullim të shikimit në një sy, dhimbje të kokës kur kreh flokët. Eritrosedimenti është i lartë. Shkaku i dhimbjes së kokës:

- A) Meningitis
- B) Hemoragji suaraknoidale
- C) Arterit me qeliza gjigante
- D) Spondilozë cervikale

Pyetja 10

Grua multipare, paraqitet me hemoragji uterine në javën e 9 të shtatzanisë. Ostiumi intern nuk është i dilatuar. Cerviksi është normal. Diagnoza e mundëshme

- A) Missed abortion
- B) Abort inkomplet
- C) Rrezik aborti
- D) Abort habitual

Pyetja 11

Gravide 30 javë, ka disuri, temperaturë 38, dhimbje mesi. Analiza e urinës, leukocite me shumicë si dhe bakterie. Urokultura jep antibiotikët sensibil si më poshtë. Zgjidh mjekimin e përshtatshëm

- A) Ceporine
- B) Doksacillini
- C) Rifampicine
- D) Chloramphenicol

Pyetja 12

Grua hipertonike, është shtatzanë. Zgjidh mjekimin më të përshtatshëm për hipertininë.

- A) Adalat
- B) aldomet
- C) Enalapril
- D) Lasix

Pyetja 13

Nulipare në javën e 20 të shtatzanisë, ka dhimbje koke, dhe dhimbje epigastrike. Tensioni arterial është 159/100 dhe ka tendencë të rritet. Diagnoza e mundëshme

- A) Shkollitje placentë
- B) Hydramnios
- C) Pyelonefrit
- D) Pre-ecalampsi fulminante
- E) Inseficiencën mitrale

Pyetja 14

Diabetike 40 vjeçare. Gravide në muajin e 7 të shtatzanisë. Zgjidh mjekimin për diabetin.

- A) Metforminë +dietë
- B) Daonil+dietë
- C) Insulinë+ dietë
- D) Metforminë +daonil

Pyetja 15

Femër 35 vjeç, ka kollë, temperaturë, faringitis. Radiografi pulmoni (Ro):zona të përhapura konsolidimi bilaterale, në trajtë njollash. Testi për aglutinina të ftohta+. Diagnoza e mundëshme

- A) mykoplazma pneumonie
- B) pneumonia atipike
- C) Grip
- D) metastaza karcinomatose

Pyetja 16

Mashkull 65 vjeç, me kollë kronike produktive, vjen në urgjencë me dispne, dhe i përgjumur. Pulmone me rale bronkiale, sibilanca, ulje e lëvizshmërisë së pulmoneve. Diagnoza e mundëshme

- A) astma bronkiale
- B) pneumonia atipike
- C) edemë pulmonare akute
- D) acarim i bronkitit kronik

Pyetja 17

Mashkull 55 vjeç, zgjohet me dispne, kollë me pështymë me shkurë, ka kaluar infarkt akut të miokardit 3 javë më parë. Ka takipne, cianotik, rale krepitante në pulmone. Diagnoza e mundëshme

- A) astma bronkiale
- B) embolia pulmonare

- C) edema pulmonare akute
- D) acarim i bronkitit kronik

Pyetja 18

Fëmijë 1.5 vjeç që shkon në cerdhe, ka kollë, wheezing. Ai ka lëvizje të flegrave të hundës dhe sibilanca bilaterale në auskultim. Diagnozat e mundëshme

- A) astma bronkiale
- B) pneumoni bakteriale
- C) pneumoni atipike
- D) bronkiolitis

Pyetja 19

Djalë 10 vjeç, vjen në ambulancë sepse në fiskulturë pati gjendje "të fikti" me dridhje. Në eksaminim ka zhurmë të lartë sistolike të ejectionit që shoqërohet me trill (dridhje). Cila është diagnoza më e mundëshme

- A) Ethe rheumatizmale akute
- B) myokardit
- C) Stenozë e aortës
- D) Insuficienca kardiake kongestive

Pyetja 20

Cila nga karakteristikat e poshtë shënuara nuk u përket konvulsioneve febrile të thjeshta:

- A) Shfaqen në temperaturën >38 gradë celsius
- B) Janë toniko klonike
- C) Shfaqen në moshën mbi 6 vjeç
- D) Nuk lënë deficite neurologjike

Pyetja 21

Cili nga antibiotikët e poshtëshënuar është zgjedhja e parë për mjekimin e anginave streptokoksike, nëse pacienti ka alergji nga antibiotikët betalaktamidë:

- A) ampicilina
- B) eritromicina
- C) amikacina
- D) gentamicina

Pyetja 22

Cili nga ushqimet e mëposhtme nuk absorbohet në sëmundjen celiake:

- A) Kosi
- B) Buka e grurit
- C) Orizi
- D) Mishi

Pyetja 23



Sëmundja reumatike shfaqet në përgjithësi :

- A) Pas një infeksioni stafilokoksik
- B) Disa jave pas një infeksioni streptokoksik
- C) Menjëherë pas difterisë
- D) Pas një infeksioni nga fruthi

Pyetja 24

HTA në radhë të parë dëmton:

- A) arteriet cerbrale
- B) arteriet koronare
- C) arteriet veshkore
- D) arteriet periferike

Pyetja 25

Kush nuk është ndërlikim madhor i HTA?

- A) infarkti I miokardit
- B) tromboembolizmi sistemik
- C) insuficienca kardiake
- D) insulti cerebral

Pyetja 26

Në astmën bronkiale të formës së mesme nuk nevojitet për mjekim:

- A) Korticosteroidë parenteral
- B) B2 mimetikë inhalatorë
- C) Kromoloine
- D) Ksantina

Pyetja 27

Cili nga medikamentet e më poshtëme antihipertensive jep me shpesh konstipacion:

- A) propranololi
- B) lasiksi
- C) aldometi
- D) izoptina

Pyetja 28

Femër 30 vjeçe, paraqitet me dhimbje shpine, në regjionin gluteal dhe në anesinë e poshtme. Ajo ishte duke ngritur objekte të rënda në shtëpi. Ajo qëndron e përkulur në njëren anë dhe ngritja e këmbës së shtrirë është e kufizuar dhe e dhimbëshme. Diagnoza

- A) Mialgji
- B) Spondilozë lumbare

- C) Stenozë spinale
- D) Prolaps i diskut lumbar

Pyetja 29

Mashkull 20 vjeç, paraqitet me dhimbje kolike periumbelike, që zhvendosen drejt fosës iliake të djathtë, temperaturë, humbje oreksi. Diagnoza e mundshme është :

- A) Kolecistit akut
- B) Divertikulit akut
- C) Ulçer peptike e perforuar
- D) Appendicitis akut

Pyetja 30

Grua 47 vjeçe, astmatike dhe hipertionike për të cilin merr methyldopa, ankon për anoreksi, dhimbje barku dhe ikter që po theksohet. Diagnoza e mundshme është :

- A) Hepatit kronik aktiv
- B) Kolecistit akut
- C) Pankreatit akut
- D) Hepatit viral akut

Pyetja 31

Grua 78 vjeçe me me anginë të qëndrueshme, 10 ditë pas një operacioni për frakturë të qafës së femorit ankon për distension masiv të barkut. Diagnoza e mundshme është:

- A) Aneurisma e aortës abdominale
- B) Ulçer peptike e perforuar
- C) Pseudo- obstrukcion
- D) Kolit Ulçeros

Pyetja 32

Burrë 60 vjeç, kohët e fundit është trajtuar për tuberkuloz të veshkës, paraqet rënie në peshë, diarhe, anoreksi, hypotension. Ai paraqet hiperpigmentim të mukozës së gojës dhe vijave të pëllëmbëve të duarve. Cilin eksaminim do të kërkoni për vendosjen e

- A) Glicemi
- B) ACTH dhe kortizolin plazmatik
- C) ECHO abdominale
- D) Testet e funksionit të tyroides

Pyetja 33

Grua 50 vjeçe, ankon për rënie në peshë, oreks të shtuar, djersitje, palpitatione, preferencë për mot të ftohtë, ka vapë, duar të djersira si dhe tremor. Cilin eksaminim do të kërkoni për vendosjen e diagnozës:

- A) ACTH dhe kortizolin plazmatik
- B) Testet e funksionit të tyroides

- C) ECHO abdominale
- D) Hemokulturë

Pyetja 34

Burrë 65 vjeç, ka fillim të menjëhershëm të diabetit, anoreksi, rënie në peshë, dhimbje epigastrike dhe shpine. Cilin eksaminim do të kërkoni për vendosjen e diagnozës:

- A) Gjak komplet
- B) Glicemi
- C) Testet e funksionit të tyroides
- D) ECHO abdominale

Pyetja 35

Grua 70 vjeçe, ankon për rënie në peshë, disfagi progresive, dhe ndjenjën se ushqimet i ngecin në fyt. Cilin ekzaminim do të kërkoni për vendosjen e diagnozës:

- A) Skopi me barium
- B) Gjak komplet
- C) ECHO abdominale
- D) Testet e funksionit të tyroides

Pyetja 36

Djalë 17 vjeç, ankon për temperaturë të lartë që dy javë, dhimbje fyti, zmadhim të gjëndrave në qafë. Në ekzaminim objektiv ka ndjeshmëri në kuadratin e sipërm abdominal të djathtë, subikter në sklera, SGOT dhe SGPT, lehtësisht të rritura. Cilin ekzaminim

- A) Hemokulturë
- B) Mantoux
- C) Monospot (gjak për MI)
- D) ECHO abdominale

Pyetja 37

Burrë 54 vjeç, ka 2 muaj që ka zmadhim të tonsilës së majtë, temperaturë fluktuante, kryesisht mbas dite ,si dhe zmadhim të limfonodujve në qafë. Cilin ekzaminim do të kërkoni për vendosjen e diagnozës:

- A) Gjak komplet
- B) Biopsi e limfonodulit
- C) Mantoux
- D) CT toraksi

Pyetja 38

Femër 25 vjeçe, ndihet sëmurë, ka ethe, poliartalgji, eritemë nodoze. Radiografia e thoraxit tregon lymphadenopathy mediastinale hilare. Cilin ekzaminim do të kërkoni për vendosjen e diagnozës:

- A) Testi Kvein
- B) Monospot

- C) HIV 1+2
- D) Mantoux

Pyetja 39

Mashkull 29 vjeç, përdorues droge iv, paraqet temperaturë, adenopati cervikale që rrjedh një substancë të bardhë si gjizë. Cilin eksaminim do të kërkoni për vendosjen e diagnozës:

- A) Testi Kvein
- B) Monospot
- C) HIV 1+2
- D) Mantoux

Pyetja 40

M 35 vjeç, ka kollë, hemoptizi. Ro: masë në hilusin dex. dhe një zonë konsolidimi në lobin superior të djathtë, lateralisht. Diagnoza e mundëshme:

- A) Tbc
- B) Metastazë karcinomatoze
- C) Sarkoidozë
- D) Granuloma e Wegener

Pyetja 41

M 65 vjeç, ka kollë, dispne. Pulmone me reale bronkiale, subkrepitante, sibilanca. Ro: fibrozë pulmonare difuze, trashje dhe kalcifikime pleurale bilaterale. Diagnoza e mundëshme:

- A) Pneumokoniozë
- B) Ca bronkial
- C) Bronshit kronik
- D) Astmë bronkiale

Pyetja 42

M 14 vjeç, ka kollë dhe infeksione të përsëritura pulmonare, gishta tamburi, rënie në peshë, steatorhe. Rodiografi : trashje të mureve bronkiale, hije në formë rrethi të bronhektazisë si dhe hije të shpërndara në pulmone. Diagnoza e mundëshme:

- A) Bronshit kronik
- B) Pneumoni atipike
- C) Astmë bronkiale
- D) Fibroza kistike

Pyetja 43

Stjuardesë 34 vjeçe, ka 7 ditë me temperaturë, kollë të thatë , dispne, takipne. Në auskultim respiracion i pastër. Diagnoza e mundëshme:

- A) grip
- B) Mykoplazma pneumonie
- C) Pneumoni atipike
- D) Astme bronkiale

Pyetja 44

M 65 vjeç me kollë kronike produktive, vjen në urgjencë me dispne, dhe i përgjumur. Pulmone me rale bronkiale, sibilanca, ulje e lëvizshmërisë së pulmoneve. Diagnoza e mundëshme:

- A) Ca bronkial
- B) Bronshit kronik
- C) Pneumokoniozë
- D) Astme bronkiale

Pyetja 45

M 55 vjeç zgjohet me dispne, kollë me pështymë me shkumë, ka kaluar IAM 2 javë më parë. Ka takipne, cianotik, rale krepitante në pulmone. Diagnoza e mundëshme:

- A) Pneumoni atipike
- B) Trombemboli pulmonare
- C) Edemë pulmonare akute
- D) Astme bronkiale

Pyetja 46

F 25 vjeç, ka adenopati në qafë, temperaturë, djersë natën, rënie në peshë. Biopsia e limfonodulit : ka qeliza të mëdha me dy bërthama, imazhi i pasqyrës, qelizat e Reed- Sternberg. Diagnoza e mundëshme

- A) Mononukleoza infektive
- B) Morbus Hodgkin
- C) Leukemi akute
- D) Sarkoidoze

Pyetja 47

M 70 vjeç, përdor omnik për adenomën e prostatës. Ka dhimbje mesi dhe kockash, anemi, insuficiencë renale. Mielograma ka qeliza plazmatike 38 %. Diagnoza e mundëshme

- A) Mielome multiple
- B) Leukemi akute
- C) Metastaza kockore nga ca prostate
- D) Leukemi mieloide kronike

Pyetja 48

M 18 vjeç, ka dobësi, zbehje, zverdhje të syve, urinim me ngjyrë të errët dhe anemi. Lienit preket 10cm. Gjaku periferik ,Hb 7 gr/dl. Në serinë e kuqe: hypokromi dhe mikrocitozë e shprehur, ka qeliza target, anizocitosis dhe poikilocitosis të shprehur s

- A) Thalasemi major
- B) Leukemi akute
- C) Hepatit viral akut
- D) Drepanocitosis

Pyetja 49

F 35 vjeçe, ka anemi, rënie të flokëve, ragade në këndet e buzëve. Gjaku periferik: hipokromi, mikrocitozë e eritrociteve.

Diagnoza e mundëshme

- A) Anemi nga mungesa e acidit folik

- B) Anemi nga mungesa e vit.B12
- C) Anemi hemolitike
- D) Anemi nga mungesa e hekurit

Pyetja 50

Burrë 75 vjeç, ka dhimbje kockash. Preken, Shpretka 14 cm, hepari 7cm. Gjaku periferik: er 4000000, HB 13 gr/dl, Tb 730.000 mm<sup>3</sup>, leukocite 300.000 mm<sup>3</sup>, Formula: ( bl 3%, PM 10%, MC 17%, MM 20%, SH 10%, Seg 20%, eo7%, Ba 3%, Limfocite 10%. Diagnoza e mun

- A) Leukemi limfoblastike akute
- B) Leukemi mieloide kronike
- C) Mononukleoze infektivi
- D) Leukemi mieloblastike akute

Pyetja 51

Mashkull 23 vjeç, ankon për temperaturë 38 gradë, dhimbje kockash, vështirësi në gëlltitje. Ka anginë Ulçero-nekrotike, lieni 4 cm. Gjaku periferik anemi, trombocitopeni, leukociti 26.000, ka 34% blaste. Në disa blaste ka trupza Auer. Diagnoza e mundshme

- A) Leukemi limfoblastike akute
- B) Leukemi myeloide kronike
- C) Leukemi myeloblastike akute
- D) Mononukleoze infektive

Pyetja 52

M 55 vjeç, ka dhimbje të fortë në sternum dhe marrje fryme. Frekuenca kardiale 40/ min., ECG: dhëmbë Q dhe rritje të ST në D III, DII, AVF. Mjekimi i mundshëm:

- A) Adalat
- B) Lanatosid c
- C) Atropine
- D) Atenolol

Pyetja 53

M 20 vjeç, kthehet nga udhëtimi jashtë shtetit. Ka dispne dhe shqetësim në gjoks në anën e majtë. Radiografia : ka një zonë të vogël në apexin e pulmonit të majtë pa ind pulmonar. Diagnoza e mundshme

- A) Aneurizëm disecante e aortës
- B) Emboli pulmonare
- C) Tbc
- D) Pneumotoraks nga tensionimi
- E) Ineficiencën mitrale

Pyetja 54

Grua 60 vjeçe ,pasi ngrihet nga banja pati marrje fryme shumë të theksuar, dhimbje të fortë gjoksi, hemoptizi. ECG takikardi sinusale. Diagnoza e mundshme:

- A) Pneumotoraks spontan
- B) Trombemboli pulmonare
- C) Infarkt akut i miokardit

D) Mediastinit

Pyetja 55

Grua 60 vjeçe me artrit rheumatoid ka splenomegali. Në gjakun periferik leukociti 1500 mm<sup>3</sup>. Diagnoza e mundëshme:

- A) Sindroma Felty
- B) LMC
- C) Lymphomë malinje
- D) Cirozë e heparit

Pyetja 56

M 60 vjeç. Para 15 vitesh ka kaluar hepatit viral B. Paraqitet me hematemezë masive dhe gjendje shoku. Ka ascit. Shkaku i hematemezës:

- A) Ulçer peptike kronike
- B) Cancer i stomakut
- C) Varicet e esofagut
- D) Sindroma Mallory- Weiss

Pyetja 57

Grua 50 vjeçe, njihet se vuan nga karcinoma e gjirit. Ajo paraqet të përziera dhe të vjella akute, polidipsi, konfuzion, përgjumësi. Cilin është eksaminimi më dallues për diagnozë:

- A) Calcemi
- B) Glicemi
- C) Azotemi, kreatinine, elektolitë
- D) Testet e tyroides

Pyetja 58

Mashkull 30 vjeç, ka vite që në pranverë dhe vjeshtë ka dhimbje barku sidomos nga mesi i natës që e zgjojnë nga gjumi. Aktualisht ka dhimbje epigastrike shumë të fortë, të menjëhershme, dhimbje në shpatullën e majtë dhe të vjella. Nuk dëgjohen zhurma per

- A) Azotemi, kreatinine, elektolitë
- B) Gjak komplet
- C) ECHO abdominale
- D) Eksaminim radiologjik i toraksi në pozicion vertikal

Pyetja 59

Djalë 25 vjeç, ankon për dhimbje anale, shkarkime me gjak dhe mukus. Në eksaminimin objektiv ka cikatrice të shumta punktiforme rreth anusit. Cila është diagnoza më e mundëshme:

- A) Fistula në sëmundjen e Chron's
- B) Fisura në anus
- C) Koliti Ulçeros
- D) Karcinoma e rektumit

Pyetja 60

Burrë 70 vjeç, paraqet hemoragji rektale të pa dhimbëshme. Gjaku është në formën e rremave në fece. Ai ankon për tënesma. Në tushe rektale palpohej një masë e butë, e fiksuar, e pa dhimbëshme. Nuk preken limfonoduj inguinalë. Cila është diagnoza më e mund

- A) Karcinoma e kolonit
- B) Karcinoma e rektumit
- C) Hemorroidet
- D) Karcinoma e anusit

Pyetja 61

Burrë 75 vjeç, ankon për dhimbje epigastrike dhe defekim me ngjyrë të zezë (melenë) me fece pothuajse të formuara, ka rënë në peshë. Ka një lifonodul të zmadhuar në regionin supraklavikular të majtë. Cila është diagnoza më e mundëshme:

- A) Karcinoma e kolonit
- B) Ulçer e stomakut
- C) Ulçer e duodenit
- D) Karcinoma e stomakut

Pyetja 62

Femër 30 vjeçe, ankon për dhimbje shumë të fortë të menjëherëshme të shpinës. Ajo udhëton me skoliozë kompesatore. Në eksaminim, ajo ka dhimbje nga gluteusi tek kyçi i këmbës, humbje të ndjeshmërisë së shtrirës, dhe pulpës së këmbës së majtë. Cila është

- A) Prolaps lumbar dhe sciatica
- B) Stenoza spinale
- C) Mieloma multiple
- D) Spondilolistesis

Pyetja 63

Burrë 50 vjeç, ankon për dhimbje të shpinës që përhapet drejt të dy anësive. Dhimbja përkeqësohet nga ecja dhe qetësohet nga pushimi dhe përkulja përpara. Në eksaminim, ai ka kufizim të ngritjes lart të këmbës së shtrirë dhe mungesë të reflekseve të kyceve

- A) Stenoza spinale
- B) Osteoartrit
- C) Prolaps lumbar dhe sciatica
- D) Spondiliti ankilozant

Pyetja 64

Grua 50 vjeçe, ankon për dhimbje shpine. Ajo ka anemi normokrome, normocitare me sediment shumë të lartë. Proteina totale 11 gr/dl. Cila është diagnoza më e mundëshme:

- A) Stenoza spinale
- B) Mieloma multiple
- C) Prolaps lumbar dhe sciatica
- D) Spondilarthrosis

Pyetja 65

Burrë 67 vjeç, ka dhimbje mesi sidomos gjatë ecjes. Është i zbehtë, ka azotemi të lartë. Proteinuria Bence-Jones pozitiv. Cila është diagnoza më e mundëshme:



- A) Prolaps lumbar dhe sciatica
- B) Stenoza spinale
- C) Mieloma multiple
- D) Metastaza kockore

Pyetja 66

M 60 vjeç, ankon për dhimbje të kockave, të shpinës në regionin lumbar dhe në kofshët e tij. Fosfataza alkaline serike 1000 u/L. Calciumi dhe phosphori janë normal. Pacienti ka vështirësi me dëgjimin. Cila është diagnoza më e mundëshme:

- A) Sëmundja e Paget
- B) Stenoza spinale
- C) Prolaps lumbar dhe sciatica
- D) Mieloma multiple

Pyetja 67

M 50 vjeç, ankon për dhimbje të forta të kockave sidomos të shpinës që e zgjojnë nga gjumi. Ka të përziera, të vjella. Objektivisht, në palpim epigastri duket i zënë. Në eksaminimin radiologjik duke dëmtime osteolitike të vertebrave. Fosfataza alkaline

- A) Mieloma Multiple
- B) Metastaza në kocka
- C) Stenoza spinale
- D) Spondilolistesis

Pyetja 68

M 68 vjeç, ankon për dhimbje shpine dhe kockash. Ka djegie gjatë urinimit dhe vështirësi në urinim. Urina komplet nuk ka shenja të infeksionit. Fosfataza alkaline e lartë. PSA e rritur. Gjaku komplet: leuko-eritroblastik, seddiment i lartë. Cila është di

- A) Sëmundja e Paget
- B) Mielomë multiple
- C) Prolaps lumbar dhe sciatica
- D) Metastaza kockore nga ca prostate

Pyetja 69

Burrë 60 vjeç, paraqet tremor, djersë, dhe gjendje të fikti në mëngjes. Zgjidh eksaminimin më dallues për diagnozë:

- A) Tensioni arterial
- B) ECG me 12 lidhje
- C) glicemi
- D) CT e kokës

Pyetja 70

F 65 vjeç, me insuficiencë renale kronike, paraqet kriza tetanie dhe të fikët. Ajo ankon për krampe në anësi dhe mpirje rreth gojës. Zgjidh eksaminimin më dallues për diagnozë:

- A) glicemi
- B) gjak komplet

- C) kalcemi
- D) urinë komplet

Pyetja 71

F 40 vjeçe, ka fibromë të ovarit, hidrotoraks të djathtë dhe ascites. Cila është diagnoza më e mundshme:

- A) Sindromi Budd-Chiari
- B) Pseudomiksoma peritoneale
- C) Sindromi Meig's
- D) Peritonit tuberkular

Pyetja 72

F 25 vjeçe, ka të përziera, të vjella, dhimbje abdominale. Objektivisht ka hepatomegali të dhimbëshme dhe ascit. Kohët e fundit ajo ka filluar përdorimin e kontraktivëve oralë.

Cila është diagnoza më e mundshme:

- A) Sindromi Meig's
- B) Sindromi Budd-Chiari
- C) Trombozë e venës porta
- D) Peritonit tuberkular

Pyetja 73

M 30 vjeç, zhvillon ascites dhe dhimbje kolike në kuadrantin e djathtë të poshtëm. Likidi ascitik ka natyrë viskoze dhe mukoide. Cila është diagnoza më e mundshme:

- A) Pseudomiksoma peritoneale
- B) Shtypja e venës porta nga limfonodujt
- C) Pamjaftueshmëri e zemrës së djathtë
- D) Peritonit tuberkular

Pyetja 74

F 40 vjeçe, ka ascit. Në anamnezë, ka kaluar ethe reumatizmale. Në auskultim, ka një ton të dytë pulmonar të lartë. Volumi i pulsit në arteriet periferike i ulët. Cila është diagnoza më e mundshme:

- A) Cirrhosis
- B) Shtypja e venës porta nga limfonodujt
- C) Pamjaftueshmëri e zemrës së djathtë si pasojë e stenoze mitrale
- D) Peritonit tuberkular

Pyetja 75

F 50 vjeçe, ka ascites, dobësi. Ajo ka puls të crregullt, të shpejtë, me volum të vogël. Eksaminimi radiologjik tregon zemër të vogël me calcifikime që duken në projeksionin lateral. ECG demonstroi QRS me voltazh të ulët dhe valë T të invertuara. Cila është

- A) Pamjaftueshmëri e zemrës së djathtë si pasojë e stenoze mitrale
- B) Cirrhosis
- C) Perikarditi konstriktiv
- D) Peritonit tuberkular

#### Pyetja 76

F 40 vjeçe, pas lëvizjes së një tavoline të rëndë ka dhimbje të shpinës; ajo nuk ka shenja të prekje së rrënjës nervore. Cili është trajtimi më i përshtatshëm:

- A) Referim urgjent te ortopedi/ neurukirurgu
- B) Dy ditë pushim + analgjezikë
- C) Regjim shtrati për dy javë
- D) Radiografi toraksi

#### Pyetja 77

F 50 vjeçe, ankon për dhimbje shpine që 2 muaj, që përkeqësohen natën. Radiografia tregon frakturë kompresive të dy vertebrave pa shkak traumatik. Cila është trajtimi më i përshtatshëm:

- A) Eksaminime të mëtejshme për tumor apo patologji të tjera kockore
- B) Referim urgjent te ortopedi për dekomrimin nervi
- C) Regjim shtrati për dy javë
- D) Fizioterapi

#### Pyetja 78

M 60 vjeç, ka dhimbje shpine që përhapet poshtë të dy gjunjëve bilateralisht. Në eksaminim, ka anestesi të "shalës", inkontinencë urine dhe humbje të tonusit anal. Cili është trajtimi më i përshtatshëm:

- A) ECHO abdominale
- B) Eksaminime të mëtejshme për tumor apo patologji të tjera kockore
- C) Referim rutinë te neurokirurgu/ ortopedi
- D) Referim urgjent tek neurokirurgu për dekomprim kirurgjikal urgjent

#### Pyetja 79

F 50 vjeçe, ankon për dhimbje kronike mesi që përhapen drejt gluteuseve. Vjen shpesh në ambulancë për dhimjen e mesit. Nuk ka prekje të rrënjës nervore. Cila është trajtimi më i përshtatshëm:

- A) Fizioterapi
- B) Eksaminime të mëtejshme për tumor apo patologji të tjera kockore
- C) Referim rutinë te neurokirurgu/ ortopedi
- D) Referim urgjent tek neurokirurgu

#### Pyetja 80

M 30 vjeç, ankon për dhimbje shpine që përhapet poshtë gjurit. Në eksaminim ka humbje të ndjeshmërisë lateralisht pulpës së djathtë dhe medialisht këmbës së djathtë. Nuk bën dot dorsifleksionin e gishtit të madh. Ai ka qëndruar regjim shtrati për 6 javë.

- A) Referim urgjent tek neurokirurgu
- B) Referim rutinë te neurokirurgu/ ortopedi
- C) Eksaminime të mëtejshme për tumor apo patologji të tjera kockore
- D) Fizioterapi

#### Pyetja 81

M 26 vjeç, ka një fryrje (xhungë) të pa dhimbëshme që 6 javë në testin e majtë. Nuk ka adenopathi inguinale. Alfa fetoproteina është e lartë. Cila është diagnoza më e mundëshme

- A) Torsion i testit
- B) Hydrocele
- C) Epididimo-orkit akut
- D) Tumor i testit

Pyetja 82

Fëmijë 6 vjeç, ka hematuri të padhimbëshme, afebril, dhe edemë skrotale që 2 ditë. Porcioni i mesit të urinës ka mbetje granulare. Cila është diagnoza më e mundëshme

- A) Nekrozë tubulare akute
- B) Pielonefrit akut
- C) Isuficiencë renale kronike
- D) Epididimo-orkit akut

Pyetja 83

M 70 vjeç, ka pakësim të urinimit, urinim natën, është i zbehtë, ka edema në anesi, ascit, TA 170/100 mmHg. Cila është diagnoza më e mundëshme

- A) Karcinomë e prostatës
- B) Isuficiencë renale kronike
- C) Nekrozë tubulare akute
- D) Karcinomë e veshkës

Pyetja 84

M 75 vjeç, ankon për urinim të shpeshtë natën, dhimbje shpine. Preket glob vezikal, dhe në tushe rektale prostatë e zmadhuar. Fosfataza alkaline dhe acide në serum janë të rritura. Cila është diagnoza më e mundëshme

- A) Insuficiencë renale kronike
- B) Karcinomë e prostatës
- C) Karcinomë e veshkës
- D) Karcinome e vezikes

Pyetja 85

Fëmijë 12 vjeç paraqet ënjtje, skuqje, dhimbje të skrotumit. Porcioni i mesit të urinës është normal. Cila është diagnoza më e mundëshme

- A) Tumor i testit
- B) Hydrocele
- C) Torsion i testit
- D) Epididimo-orkit akut

Pyetja 86

Fëmijë 10 vjeç, ka stridor. Ai ka histori të ënjtjes së duarve dhe këmbëve si dhe diarhe. Të njëjtën histori e ka edhe e motra. Cila është diagnoza më e mundëshme

- A) Ethe rheumatizmale akute
- B) Angioedema hereditare
- C) Sindrom nefrotik kongenital
- D) Insuficiencia kardiake kongestive

Pyetja 87

Vajzë 6 vjeçe, ka temperaturë që ngrihet e ulet (temp. me majë), enjtje të artikulacioneve të gishtave. Gishtat e fryrë kanë marrë formë boshti. Cila është diagnoza më e mundëshme

- A) Ethe rheumatizmale akute
- B) Artrit rheumatoid juvenil
- C) Angioedema hereditare
- D) Sinovit toksik

Pyetja 88

Djalë 12 vjeç, paraqet poliartrit dhe dhimbje abdominale. Ai kishte bajamet e sëmura rreth 2 javë para. Në buzën e anës së majtë të sternumit dëgjohet zhurmë e hershme diastoloke shfryrëse. Cila është diagnoza më e mundëshme

- A) Sindrom nefrotik kongenital
- B) Ethe rheumatizmale akute
- C) Arthrit rheumatoid forma juvenilde
- D) Insuficienca kardiake kongestive

Pyetja 89

Vajzë 12 vjeçe, ka zbehje, dispne, puls 190/1'. Ajo ka hepatomegali dhe cardiomegali, edema në anësi. Cila është diagnoza më e mundëshme

- A) Perikardit
- B) Insuficienca kardiake kongestive
- C) Myokardit
- D) Sindrom nefrotik kongenital

Pyetja 90

Femër 18 vjeçe, nulipare, 12 javëshe; do të përfundojë shtatzaninë. Zgjidh trajtimin më të mirë:

- A) hysterectomi e thjeshtë
- B) Kolposkopi
- C) Antibiotikë iv
- D) Dilatacion dhe kyretazh

Pyetja 91

Plakë 70 vjeçe, ka 3 muaj me hemoragji vaginale. Histeroskopia dhe biopsia e endometrit konfirmojnë adenokarcinomë. Zgjidh trajtimin më të mirë:

- A) hysterectomi e thjeshtë
- B) Kolposkopi
- C) Histerektomi totale abdominale, salpingo- oophoroectomy bilaterale
- D) Dilatacion dhe kyretazh

Pyetja 92

Grua 30 vjeçe, vjen në ambulancë më dhimbje të fortë në anën e majtë të barkut dhe shpatullës së majtë. Para dy muajsh ka ndaluar kontrceptivët dhe ka dy muaj pa cikël menstrual. TA 90/50 mmHg, puls 120/1'. Zgjidh trajtimin më të mirë:

- A) hysterectomi e thjeshtë

- B) Histerektomi totale abdominale, salpingo- oophoroectomy bilaterale.
- C) Dilatacion dhe kyretazh
- D) Reanimim urgjent dhe loperatomi.

Pyetja 93

Grua 30 vjeçe, nulipare, ankon për infertilitet. Ajo ka perioda të rregullta, zgjatin 8 ditë e me sasi të shtuar. Ajo dhe bashkëshorti kanë një vit që tentojnë për shtatëzani. Burri ka bërë vizitë te urologu dhe nuk ka probleme dhe ajo kërkon të dijë në

- A) Dilatacion dhe kyretazh
- B) Reanimim urgjent dhe loperatomi.
- C) Laparaskopi
- D) Testi Papanicolou

Pyetja 94

Grua 28 vjeçe, ka eksaminim jo normal të qafës së mitrës. Ajo ka condilomë dhe displazi të moderuar. Zgjidh trajtimin më të mirë:

- A) Antibiotikë iv+ flagyl ovul
- B) Colposkopi e ndjekur nga krem 5- Fluouroucil apo excizion me diatermi
- C) Dilatacion dhe kyretazh
- D) Cone biopsi

Pyetja 95

Fëmijë dy vjeç, ka anemi, dhimbje barku. Nëna thotë se e ka parë të gërvishtë muret dhe ka frikë se ha gelqere nga suvaja. Diagnoza më e mundëshme

- A) Skizofreni
- B) Delirium
- C) Pica clorotica
- D) Fuga

Pyetja 96

Grua 23 vjeçe, ka frikë të lërë shtëpinë e vet. Ajo funksionon (sillet) normalisht vec mos daljes jashtë shtëpisë së saj. Diagnoza më e mundëshme

- A) Skizofreni
- B) Algophobia
- C) Delirium
- D) Agaraphobia

Pyetja 97

M 18 vjeç, ka diarhe, djersitje, të përziera, pupila të zgjeruara, ngritje të TA. Ai ka qënë përdorues dhe ka pasur vartësi nga drogat. Diagnoza më e mundëshme

- A) Intoksikim nga cocaina
- B) Lënia e opioidëve (krizë abstinence)
- C) Delirium
- D) Intoksikim nga drogat

Pyetja 98

F 30 vjeçe, është gjetur në një gjendje amnesie. Burri i saj referon se ka disa ditë që ka humbur, që kur mori letrën e divorcit. Diagnoza më e mundëshme

- A) Skizofreni
- B) Intoksikim nga alkoli
- C) Delirium
- D) Fuga

Pyetja 99

M 30 vjeç, me crregullime bipolare nën mjekim me litium. Kohët e fundit mjeku i familjes i ka nisur hydrochlorthiasid për një tension arterial të moderuar. Aktualisht ai është konfus, me ataxi, mjegullim të pamjes, tremor jo fin. Diagnoza më e mundëshme

- A) Intoksikacion nga cocaina
- B) Intoksikacion medikamentos
- C) Perdorim opiatesh
- D) Lënia e alkolit

Pyetja 100

F 28 vjeçe, ankon për dhimbje të fundit të barkut. Objektivisht ka shumë cikatrikse kirurgjikale në abdomen. Objektivisht, abdomeni dhe pelvisi normal. Ajo këmbëngul se ka nevojë për laparaskopi. Diagnoza më e mundëshme

- A) Sindromi Munchausen
- B) Skizofreni
- C) Delirium
- D) Neurozë hysterike

Pyetja 101

M 54 vjeç, skizofrenik, ka nisur haloperidol. Një muaj pas fillimit ai ka jargë, ecën duke hequr këmbët zvarrë. Ai vuan gjithashtu nga lëvizje përtypëse të pa vullnetshme. Diagnoza më e mundshme

- A) Efekte anësore autonome të medikamentit
- B) Efekte extrapiramidale të meddikamentit
- C) Efekte anësore antikolonergjike të med.
- D) Neurosis

Pyetja 102

F 40 vjeçe, ankon për tharje të gojës, turbullime të pamjes, konstipacion. Objektivisht ka zgjerim të pupilave. Ajo ka nisur amitiptilinë për depresion madhor. Diagnoza më e mundëshme

- A) Efekte anësore autonome të medikamentit
- B) Neurosis
- C) Efekte extrapiramidale të meddikamentit
- D) Efekte anësore antikolonergjike të med.

Pyetja 103

M 45 vjeç, ka dhimbje koke, etje të theksuar, urinim të shpeshtë. Ai ka pucrra (akne të theksuara), lëkurë të ashpër, strumë. Diagnoza më e mundëshme

- A) Hypothyroidism
- B) Sindrom Cushing
- C) Neurosis
- D) Akromegali

Pyetja 104

M 30 vjeç, paraqitet tek mjeku i familjes se ka nxjerrë shpatullën. Në eksaminim, shpatulla është në rregull. Nuk ka dislokacion të saj, por pacienti këmbëngul se e ka të nxjerrë. Diagnoza më e mundëshme

- A) Depresion
- B) Skizofreni
- C) Simulant
- D) Neurosis

Pyetja 105

M 25 vjeç, ka 5 ditë me temperaturë të lartë, dhimbje koke sidomos në regionet temporale, diarhe, njolla rozë në trunks. Ju dyshoni për tifo. Cilin eksaminim do të kërkoni për diagnozë:

- A) Paul Bunnell
- B) ELISA
- C) Weil-Felix
- D) Widal

Pyetja 106

Blegtor nga Saranda, ka 12 ditë me temperaturë ondulante, djersë të shtuara, me erë të rëndë, dhimbje kockash. Lieni 2 cm, hepari 2 cm. Gjaku periferik leukocite 3800 mm<sup>3</sup>, deviacion i majtë, lifo-monocitosis relative. Cilin eksaminim do të kërkoni për

- A) Wright
- B) Widal
- C) Weil-Felix
- D) Paul Bunnell

Pyetja 107

M 23 vjeç, paraqet rash makulopapular në shputat e këmbëve dhe papula anale.

Cilin eksaminim do të kërkoni për diagnozë:

- A) VDRL (Slide test i laboratorit të sëmundjeve veneriane)
- B) Wright
- C) Widal
- D) Paul Bunnell

Pyetja 108

M 30 vjeç, ankon për ethe, zverdhje, dhimbje të pulpave. Ai është i apasionuar pas notit. Ju dyshoni për sëmundjen e Weil. Cilin eksaminim do të kërkoni për diagnozë:

- A) Widal
- B) Wright
- C) ASO
- D) Testi i aglutinimit Schuffner



Pyetja 109

F 20 vjeç, ankon për dhimbje fyti, temperaturë, adenopati në qafë, petikie në palatum.

Cilin eksaminim do të kërkoni për diagnozë:

- A) Widal
- B) Wright
- C) Paul Bunnell
- D) Weil-Felix

Pyetja 110

M 60 vjeç, ka dhimbje gjoksi, dispne. ECG: bradikardi sinusale, 45 rrahje/1min. Zgjidh trajtimin më të përshtatshëm:

- A) Pacemaker transvenos
- B) Pacemaker extern
- C) Atropinë IV
- D) Oksigjeno terapi

Pyetja 111

M 60 vjeç, pëson kolaps në rrugë. Nuk e ka parë njeri si ndodhi. Aktualisht ai nuk ka puls.

Zgjidh trajtimin më të përshtatshëm:

- A) Atropinë iv
- B) CRP (Ringjallje zemër- mushkëri), adrenalinë iv 1:1000 push
- C) Oksigjeno terapi
- D) CRP (Ringjallje zemër- mushkëri) derisa të jetë gati defribilatori.

Pyetja 112

F 55 vjeçe, ka ritëm të ngadaltë, por është asimptomatike. ECG tregon mos përputhje midis ritmit atrial dhe ventrikular. Ritmi ventrikular është 40 rrahje/ min. Komplekset QRS janë të zgjeruara. Zgjidh trajtimin më të përshtatshëm:

- A) Pacemaker transvenos
- B) Godditje me grusht në sternum
- C) Atropinë iv
- D) Defibilim me 200 Joules

Pyetja 113

M 30 vjeç që praktikon numra shpejtësie, është gjetur pa koshiençë në skenë. Në ambulancë ai bën frymëmarrje në mënyrë spontane. Monitori ECG tregon ritëm të crregullt ku nuk dallohen valët P,QRS, ST, T. Ritmi është i shpejtë. Zgjidh trajtimin më të për

- A) CRP (Ringjallje zemër- mushkëri) derisa të jetë gati defribilatori.
- B) CRP (Ringjallje zemër- mushkëri), adrenalinë iv 1:1000 push
- C) Atropinë 1mg iv push
- D) Oksigjeno terapi

Pyetja 114

M 53 vjeç, vjen në ambulancë me dhimbje shumë të fortë gjoksi. Ai ka pasur histori të anginës. Dhimbja nuk qetësohet nga trinitrina. TA 120/70mmHg, ritmi 100 rrahje 1/min. ECG: ritëm sinusal. Zgjidh trajtimin më të përshtatshëm:

- A) Morfinë im + Oksigjeno terapi 4 LPM
- B) Atropinë 1mg iv bolus
- C) CRP (Ringjallje zemër- mushkëri), adrenalinë iv 1:1000 push
- D) Lignocaine iv

Pyetja 115

M 50 vjeç, vjen në ambulancë se ka infarkt akut të miokardit. Pa prituri, TA bie 70/45mmHg. Në të dy bazat pulmonare dëgjohen rale. Zgjidh trajtimin më të përshtatshëm:

- A) Infuzion Dopaminë
- B) Morfinë im + Oksigjeno terapi 4 LPM
- C) CRP (Ringjallje zemër- mushkëri), adrenalinë iv 1:1000 push
- D) Atropinë 1mg iv bolus

Pyetja 116

M 50 vjeç, në ECG (monitor)ka takikardi paroksismale supraventrikulare. Zgjidh trajtimin më të përshtatshëm:

- A) Lignocainë
- B) Trinitrinë
- C) Masazh i sinusit carotid
- D) Adrenalinë

Pyetja 117

M 50 vjeç, vjen me dispne. Puls i është i crregullt në frekuencë dhe ritëm. Skopia tregon cardiomegali dhe zmadhim të atriumit të majtë. ECG: fibrilacion atrial me frekuencë 180/min. Zgjidh trajtimin më të përshtatshëm:

- A) Atropine
- B) propranolol
- C) Antikoagulim + digitalizim
- D) Lignocaine iv

Pyetja 118

M 75 vjeç, humb pa prituri koshiençën në ambulancë. ECG tregon takikardi ventrikulare. Zgjidh trajtimin më të përshtatshëm:

- A) Atropinë 1mg iv bolus
- B) Morfinë im + Oksigjeno terapi 4 LPM
- C) Convertim cardiac me Defibrilator me 200 joules
- D) Zgjidh trajtimin më të përshtatshëm:

Pyetja 119

F 20 vjeçe, ka diarre rekurente me gjak dhe krampe abdominale. Sigmoidoskopia dhe biopsia konfirmojnë diagnozën: kolit Ulçeros. Zgjidh mjekimin më specifik

- A) Subtotal colectomy, fistul mukozale dhe ileostomi permanente
- B) likide iv, antibiotikë iv dhe analgjezikë

- C) Panproctocolectomy
- D) Mesalazinë

Pyetja 120

M 25 vjeç, gjatë bërjes të një numri shpejtësie ka pësuar një traumë të topitur në pjesën e sipërme të abdomenit. Ai ka dhimbje në shpatullën e majtë dhe dhimbje abdominale difuze. Ai paraqet takikardi në rritje, hypotension dhe shfaqen shenja peritonea

- A) Panproctocolectomy
- B) Likide iv, antibiotikë iv dhe analgjezikë
- C) Laparatomi
- D) Cholecystectomy me laparoskop

Pyetja 121

F 40 vjeçe, obeze ankon për dhimbje në kuadratin e sipërm të djathtë, temperaturë të lartë. Leukocite 14 000mm<sup>3</sup> me deviacion të majtë e neutrofilozë. Eksaminimi radiologjik i pulmonit dhe abdomenit është negativ. Zgjidh mjekimin më specifik

- A) Likide IV, antibiotikë IV dhe analgjezikë
- B) Laparatomi
- C) Panproctocolectomy
- D) Cholecystectomy me laparoskop

Pyetja 122

F 50 vjeçe, ka ethe, dhimbje në kuadratin e sipërm të djathtë të abdomenit, ikter. ECHO: dilatacion i duktusit biliar komun. Zgjidh mjekimin më specifik

- A) Likide iv, antibiotikë iv dhe analgjezikë
- B) ERCP dhe sfinkterotomi endoskopike
- C) Panproctocolectomy
- D) Cholecystectomy me laparoskop

Pyetja 123

M 30 vjeç, ka dhimbje shumë të forta abdominale të pa dominuara. Ai ka temperaturë, takikardi dhe distension të shprehur të barkut. Në eksaminimin radiologjik koloni transvers ka diametër 7 cm.

(Megakolon toksik). Zgjidh mjekimin më specifik

- A) Mesalazinë
- B) likide iv, antibiotikë iv dhe analgjezikë
- C) Subtotal colonectomy, fistul mukozale dhe ileostomi permanente
- D) Panproctocolectomy

Pyetja 124

M 40 vjeç, ankon për dhimbje të penisit. Objektivisht, lafsha është e tërhequr pas glans penis dhe ka enjtje glandulare. Diagnoza më e mundëshme:

- A) Sëmundja Peroni ( Peyronie's)
- B) Kondiloma
- C) Paraphimosis
- D) Priapism

Pyetja 125

Fëmijë 12 vjeç, me histori të infeksioneve urinare të përsëritura, aktualisht ka vështirësi në urinim. Objektivist, hapja e lafshës është e ngushtë dhe e skuqur. Diagnoza më e mundshme:

- A) Sëmundja Peroni ( Peyronie´s)
- B) Priapism
- C) Kondiloma
- D) Phimosi

Pyetja 126

M 50 vjeç me insuficiencë renale kronike, trajtohet me dializë; vjen tek mjeku i familjes se ka dhimbje të penisit. Objektivist penisi është në ereksion: trupat kavernoze janë erektë, corpus spongios është i flashkët. Diagnoza më e mundshme:

- A) Sëmundja Peroni ( Peyronie´s)
- B) Paraphimosi
- C) Priapism
- D) Balanitis xerotica obliterans

Pyetja 127

M 40 vjeç, me tyroidit Reidel, ankon se kontakti seksual është i dhimbshëm. Ai ka sjellë një foto ku duket curvatura e penisit në ereksion. Diagnoza më e mundshme:

- A) Kondiloma
- B) Paraphimosi
- C) Sëmundja Peroni ( Peyronie´s)
- D) Priapism

Pyetja 128

M 52 vjeç, vjen tek mjeku sepse nuk arrin dot ereksion. Kohët e fundit ai ka bërë prostat ectomi totale. Diagnoza më e mundshme:

- A) Sëmundja Peroni ( Peyronie´s)
- B) Paraphimosi
- C) Priapism
- D) Impotencë

Pyetja 129

F 30 vjeçe, paraqet një masë 3 cm, të fortë, të lëmuar, të pa adderuar me lëkurën. Citologjia realizuar me citopunkcion të drejtuar nuk ka qeliza malinje. Diagnoza më e mundshme

- A) Fibroadenoma
- B) Abces i gjirit
- C) Displazia mamare beninje
- D) Dukt ektasia

Pyetja 130

F 20 vjeçe, ankon se para ciklit ka gjëndra në gjinj dhe ka dhimbje të gjoksit. Në eksaminim gjokset janë të ndjeshëm në kuadratet e jashtëme me disa nodularitete. Citologjia me punkcion të drejtuar tregoi fibrosis, adenosis dhe ndryshime cistike. Diagnoz

- A) Displazia mamare beninje
- B) Fibroadenoma
- C) Sëmundja cistike
- D) Dukt ektasia

Pyetja 131

F 50 vjeçe, paraqet nodozitete të vogla të lëmuara diskrete të gjirit. Në aspirim doli lëng i verdhë. Citologjia nga Citopunksioni i drejtuarnuk ka qeliza malinje. Diagnoza më e mundshme

- A) Fibroadenoma
- B) Sëmundja cistike
- C) Displazia mamare beninje
- D) Duktektasia

Pyetja 132

F 50 vjeçe, ankon për rrjedhje të vazhdueshme si gjizë nga thithi. Ajo ka vënë re tërheqje të thithit por nuk ka kokërr. Mamografia tregon ntrashje të duktusit. Diagnoza më e mundëshme

- A) Sëmundja cistike
- B) Dukt ektasia
- C) Displazia mamare beninje
- D) Fibroadenoma

Pyetja 133

F 65 vjeçe, ka karcinomë të gjirit; herë mbas here ka dhimbje barku. Ajo eleminon sasi të mëdha urine dhe pi ujë më shumë se zakonisht. Diagnoza më e mundëshme:

- A) Fibrozë post raddioterapie
- B) Diabetes mellitus
- C) Ankth
- D) Hypercalcemi

Pyetja 134

M 26 vjeç, vjen në urgjencë me dhimbje shumë të forta në ije që kanë 3 orë. Eksaminimi i urinës tregon hematuri. Diagnoza më e mundëshme:

- A) Kolikë renale
- B) cistitis
- C) Pielonefrit
- D) Hypercalcemi

Pyetja 135

F 33 vjeçe, kërkon vizitë shtëpie. Ajo flet për disuri për disa ditë, kurse tani ka ethe, dhimbje në ijen e djathtë. Diagnoza më e mundëshme:

- A) Hypercalcemi
- B) cistitis
- C) Kolikë renale
- D) Pielonefrit

Pyetja 136

M 38 vjeç, vjen për kontroll të zakonshëm. Ai ndihet mirë. BMI e tij është 24. TA 124/80 mmHg. Ai përmend se nëna e tij u diagnostikua si diabetike kur ishte 76 vjeç. Zgjidh trajtimin më të përshtatshëm:

- A) Të fillojë Metforminë
- B) Të fillojë hydrochlorthiasid
- C) Këshillim dietetik
- D) Të fillojë prep. të sulphanyluresë

Pyetja 137

M 60 vjeç, vjen se ka një glicemi të rastësishme 170mg/ dl dhe është i shqetësuar nëse është apo jo diabetik. Zgjidh trajtimin opsionin më të përshtatshëm:

- A) Të fillojë hydrochlorthiasid
- B) Testi i tolerancës së glukozës.
- C) Të fillojë sulphanylurenë
- D) Këshillim djetetik

Pyetja 138

Diabetik 60 vjeç; mer metformine 3x 0.5 në ditë. HbA1c vjetore është 8.8 dhe ju vini re se vitin e kaluar, në kohën kur nisi metforminën, ajo ishte 8.5. Pacienti referon se zakonisht nuk harron të marrë mjekimin. Zgjidh trajtimin më të përshtatshëm:

- A) Të fillojë insulinën
- B) Të fillojë hydrochlorthiasidin
- C) Këshillim djetetik
- D) Të fillojë prep. të sulphanyluresë (daonil)

Pyetja 139

Diabetik 58 vjeç. Ai e ka diabetin nën kontroll me djetë. Aktualisht paraqet TA 155/94 mmHg. Zgjidh trajtimin më të përshtatshëm:

- A) Të fillojë Metforminë
- B) Të fillojë glitazon
- C) Të fillojë preparate të sulphanyluresë
- D) Të fillojë hydrochlorthiasid

Pyetja 140

M 56 vjeç jo insulinovartës, trajtohet me glibenclamid. Ai ka rritje të moderuar të transaminazave si pasojë e përdorimit kronik abuziv të alkoolit, por aktualisht e ka lënë dhe hepari është stabël. HbA1c është duke u ngritur lart, (9,2) megjithëse mer

- A) Këshillim djetetik
- B) Të fillojë hydrochlorthiasidit
- C) Të fillojë sulphanylurenë (daonil)
- D) Të fillojë insulinën

Pyetja 141

Vajzë astmatike 5 vjeçe ,ndihet mirë duke përdorur 100µg beclomethason bd dhe salbutamol. Ajo ka një infektion të sipërm respirator, por rrjedha kulmore e ajrit të saj( peak flow) vazhdon të jetë 80% e normales. Zgjidh trajtimin më të përshtatshëm

- A) Të fillojë beta2- agonistët me veprim të zgjatur
- B) Të vazhdojë të njëjtin trajtim
- C) Kërkohet të fillojë beta2- agonistët
- D) Të fillojë steroidët oralë

Pyetja 142

M 25 vjeç, përdor 200µg beclomethason bd dhe salbutamol sipas nevojës për të kontrolluar astmën. Muajt e fundit ai e ka përdorur salbutamolin ditën dhe natën e ka zgjuar nga gjumi kolla e thatë. Zgjidh trajtimin më të përshtatshëm

- A) Të vazhdojë të njëjtin trajtim
- B) Kërkohet të fillojë beta2- agonistët sipas nevojës
- C) Të fillojë beta2- agonistët me veprim të zgjatur
- D) Të fillojë steroidët oralë

Pyetja 143

Vajzë 15 vjeçe, është trajtuar për astmën e provokuar nga ushtrimet me terbutalinë sipas nevojës. Ajo e përdor atë mesatarisht 4 herë në javë. Zgjidh trajtimin më të përshtatshëm

- A) Kërkohet të fillojë beta2- agonistët
- B) Të fillojë beta2- agonistët me veprim të zgjatur
- C) Të vazhdojë të njëjtin trajtim
- D) Të fillojë steroidët oralë

Pyetja 144

M 51 vjeç, përdor 800µg beclomethason dita dhe eformoterol bd ai vjen te mjeku sepse ka kollë produktive me sputum mukopurulent, për të cilën ka nisur antibiotikë, si dhe dispne në sforcim të vogël.Rrjedha kulmore e ajrit ( peak flow i tij) është 50% e vl

- A) Të vazhdojë të njëjtin trajtim
- B) Të fillojë steroidët oralë
- C) Kërkohet të fillojë beta2- agonistët
- D) Të fillojë beta2- agonistët me veprim të zgjatur

Pyetja 145

Djalë 14 vjeç, ka filluar të ketë pak "Weezing"(frymëmarrje me fishkëllima) kur ai merr pjesë në gara sportive. Ai ka kollë të zgjatur pas virozave në dimër, por sidoqoftë ai ndihet mirë. Zgjidh trajtimin më të përshtatshëm

- A) Të vazhdojë të njëjtin trajtim
- B) Të fillojë beta2- agonistët me veprim të zgjatur
- C) Të fillojë steroidët oralë
- D) Kërkohet të fillojë të përdorë beta2- agonistët sipas nevojës

Pyetja 146

Fëmijë 3 vjeç, vetëm nga njëra vrimë e hundës ka rrjedhje me erë të keqe e të gjakosura. Cila është diagnoza më e mundëshme

- A) Hematomë septale
- B) Rinit alergjik
- C) Trup i huaj
- D) Rinit medikamentos

Pyetja 147

M 19 vjeç, është goditur në hundë duke lozur si portier. Ai i ka të dy hundët e bllokuara. Në eksaminim ka një fryrje të kuqe të celur në linjën mediane që dallohet nga të dy vrimat e hundës. Cila është diagnoza më e mundëshme

- A) Trup i huaj
- B) Hematomë septale
- C) Rinit alergjik
- D) Rinit medikamentos

Pyetja 148

M 43 vjeç, vuan nga bllokimi kronik i hundëve dhe rrjedhje. Ai ka përdorur shumë medikamente spray për muaj të tërë, por sheh që gjëndja është duke u përkeqësuar. Cila është diagnoza më e mundshme

- A) Rinit medikamentos
- B) Rinit alergjik
- C) Hematomë septale
- D) Trup i huaj

Pyetja 149

M 78 vjeç, ka disa muaj me bllokim vetëm të anës së djathtë të hundës të shoqëruar me rrjedhje të gjakosura. Cila është diagnoza më e mundëshme

- A) Trup i huaj
- B) Rinit alergjik
- C) Carcinoma
- D) Hematomë septale

Pyetja 150

M 21 vjeç, ankon se cdo vit, në të njëjtën periudhë të vitit ka bllokim të hundëve shoqëruar me rrjedhje të ujshme të shumta. Cila është diagnoza më e mundëshme

- A) Rinit vazomotor
- B) Hematomë septale
- C) Rinit alergjik
- D) Rinit medikamentos

Pyetja 151

F 30 vjeçe, ankon për lodhje që ka ardhur duke u shtuar. Ajo ka 6 muaj me menstruacione të shtuara që kur lindi fëmijën e dytë. Cili është shkaku më i mundshëm

- A) Malinjitet
- B) Pamjaftueshmëria e zemrës
- C) Dobësia akute post virale
- D) Anemia



Pyetja 152

Grua 82 vjeçe, ka 6 javë me dobësi, rënie në peshë, diarhe. Cili është shkaku më i mundshëm

- A) Hypotyroidism
- B) Pamjaftueshmëria e zemrës
- C) Malinjitet
- D) Dobësia akute post virale

Pyetja 153

F 73 vjeçe, obeze, ka 2-3 muaj me lodhje, marrje fryme në sforcim. Ajo ka edema të lehta rreth kyceve të këmbëve si dhe rale inspiratore krepitante në të dy bazat e pulmonit. Cili është shkaku më i mundshëm

- A) Isuficienca renale
- B) Cirozë hepatike
- C) Pamjaftueshmëria e zemrës
- D) Miksedema

Pyetja 154

F 23 vjeçe, ankon për fryrjë barku dhe dhimbje që qetësohen pas defekimit. Pacientja defekon vetëm ditën. Nuk ka rënë në peshë. Cila është diagnoza më e mundëshme:

- A) Sëmundja inflamatore e zorrës
- B) Sëmundja e Celiakisë
- C) Hiperthroidizmi
- D) Sindromi i zorrës së iritushme

Pyetja 155

F 25 vjeçe, ankon për diarhe që 4 muaj, ka rënë në peshë, ndjen vapë, ka pagjumësi, tremor. Cila është diagnoza më e mundëshme:

- A) Sëmundja inflamatore e zorrës
- B) Sindromi i zorrës së iritushme
- C) Sëmundja e Celiakisë
- D) Hiperthroidizmi

Pyetja 156

F 23 vjeçe, ka dirhe, rënie në peshë për pak muaj. Ajo ka një rash pruriginoz në të dy bërrylat. Cila është diagnoza më e mundëshme:

- A) Sëmundja e Celiakisë
- B) Sindromi i zorrës së iritushme
- C) Hiperthroidizmi
- D) Malinjitet colo-rectal

Pyetja 157

M 80 vjeç, ka një javë me diarhe dhe krampe abdominale. Të njëjtën histori pati dhe gruaja, por asaj shqetësimet i zgjatën vetëm 2 ditë. Cila është diagnoza më e mundëshme:

- A) Gastreterit infeksioz
- B) Sindromi i zorrës së iritushme

- C) Hiperthroidizmi
- D) Sëmundja inflamatore e zorrës

Pyetja 158

M 67 vjeç, paraqet letargji të përgjithëshme, rënie në peshë, shpeshtim të defekimit që 4 muaj. Ka erithrosediment të lartë. Cila është diagnoza më e mundëshme:

- A) Sindromi i zorrës së irritushme
- B) Malinjitet kolorectal
- C) Hiperthroidizmi
- D) Sëmundja e Celiakisë

Pyetja 159

M 67 vjeç, ka 2 muaj që është kaps, megjithëse përdor ushqime me fibra. Ka rënë në peshë. Nuk përdor medikamente që bëjnë kaps. Fece për gjak ocult rezultoj pozitiv. Cila është diagnoza më e mundëshme:

- A) Sindromi i zorrës së irritushme
- B) Malinjitet colo-rectal
- C) Hiperthroidizmi
- D) Sëmundja e Celiakisë

Pyetja 160

Cili mund të jetë efekti anësor fatal nga mbidoza e ferri sulphatit:

- A) Insuficiencë hepatike
- B) Konvulsione
- C) Insuficiencë respiratore
- D) Aritmi

Pyetja 161

Cili mund të jetë efekti anësor fatal nga mbidoza e paracetamolit

- A) Aritmi
- B) Insuficiencë hepatike
- C) Insuficiencë respiratore
- D) Insuficiencë kardiake

Pyetja 162

Cili mund të jetë efekti anësor fatal nga mbidoza e Diamorfinës

- A) Aritmi
- B) Insuficiencë respiratore
- C) Konvulsione
- D) Insuficiencë hepatike

Pyetja 163

Cili mund të jetë efekti anësor fatal nga mbidoza e acidit mefenamic (ponstanit):

- A) Aritmi
- B) Insuficiencë hepatike
- C) Insuficiencë respiratore

D) Konvulsione

Pyetja 164

Cila është diagnoza më e mundëshme në qoftë se pacienti ka këto analiza:

Biluribinë(N: <0.9) 5mg/dl

ALT ( N: 5-35) 1250 U/L

FAL(fosfataza alkaline) (N: 30-300u/L) 500 U/L

Albumina g/l : normal

HB: normal

Retikulociti: normal

A) Anemia hemolitike autoimune

B) Ikter kolestatik

C) Sëmundje kronikë e mëlçisë nga alkoli

D) Hepatit viral akut

Pyetja 165

Cila është diagnoza më e mundëshme në qoftë se pacienti ka këto analiza:

Biluribinë(N: <0.9) 10 mg/dl

ALT ( N: 5-35) 195 U/L

FAL(fosfataza alkaline) (N: 30-300u/L) 900 U/L

Albumina g/l : normal

HB: normal

Retikulociti: normal

A) Hepatit viral akut

B) Anemia hemolitike autoimune

C) Sëmundje kronikë e mëlçisë nga alkoli

D) Ikter kolestatik

Pyetja 166

Cila është diagnoza më e mundëshme në qoftë se pacienti ka këto analiza:

Biluribinë(N: <0.9) 4.5mg/dl

ALT ( N: 5-35) 50 U/L

FAL(fosfataza alkaline) (N: 30-300u/L) 200 U/L

Albumina g/l: normal

HB (N 12-17 gr/dl): 8 gr/dl

Retikulociti( N: 8-20%)

A) Hepatit viral akut

B) Anemia hemolitike autoimune

C) Sëmundje kronikë e mëlçisë nga alkoli

D) Ikter kolestatik

Pyetja 167

Cila është diagnoza më e mundëshme në qoftë se pacienti ka këto analiza:

Biluribinë(N: <0.9) 1.5mg/dl

ALT ( N: 5-35) 80 U/L

FAL(fosfataza alkaline) (N: 30-300u/L) 400 U/L

Albumina( 35-50 g/l) 28g/l

HB (12-17gr/dl) 10.5 gr/dl

Retikulociti: norm

A) Hepatit viral akut

B) Ikter kolestatik

C) Anemia hemolitike autoimune

D) Dëmtim kronik i mëlcisë nga alkoli

Pyetja 168

Sa është mesatarish sasia më minimale e gjakut të humbur në hemoragjitë e sipërme GI që të ngjyrosen fecja në të zi, pra të shfaqet melena:

A) 50 ml

B) 100 ml

C) 70 ml

D) 30ml

Pyetja 169

Vetëm një nga kushtet e më poshtëme nuk ndikon në falls pozitivitetin e ekzaminimit të feceve për gjak ocult:

A) Dietë pa mish 3 ditë rresht

B) Ndalimi i terapisë me preparate Hekuri

C) Fecja të merret 3 ditë rresht kur eksamini del negativ.

D) Të përzihet fecja para marrjes së mostërs

Pyetja 170

Mbas një hemoragjie të vetme gastro- intestinale dhe për sa ditë fecja do të jetë e errët :

A) Deri 1 ditë

B) Deri 3 ditë

C) Deri 2 ditë

D) Deri 7 ditë

Pyetja 171

Mbas një hemoragjie të vetme gastro- intestinale dhe për sa ditë fece për gjak ocult do të jetë pozitive :

A) Deri 1 ditë

B) Deri 7 ditë

C) Deri 3 ditë

D) Deri 2 ditë

Pyetja 172

Ekzaminimi fece për gjak ocult mund të rezultojë falls pozitiv nga:

A) Marrja e hekurit

B) Marrja e bismuthit

C) Konsumi i spinaqit

D) Konsumi i mishit

Pyetja 173

Vendi i gjakrrjedhjes në melena mund të jetë në:

- A) Proksimalisht colon transvers
- B) Sigmë
- C) Ampula rectale
- D) Coloni zbritës

Pyetja 174

Kur kundërintikohet sildenafil (grup me viagrën):

- A) Personi është mbi 68 vjeç
- B) Pacienti ka histori të sëmundjes ishemike të zemrës
- C) Personi ka deformime të penisit
- D) Pacienti merr nitrate

Pyetja 175

Kur mund të kundër indikohet sildenafil ( grup me viagrën):

- A) Personi është mbi 68 vjeç
- B) Pacienti ka histori të sëmundjes ishemike të zemrës
- C) Personi ka deformime të penisit
- D) Pacienti ka bërë prostatat ectomi totale.

Pyetja 176

Vetëm një nga medikamentet e më poshtëme nuk bën pjesë në mjekimin e anafilaksisë

- A) Adrenalina
- B) Chlorpheniramina 10 mg iv
- C) Lanatosid c
- D) Hydrocortison 100-200 mg iv

Pyetja 177

Cila është doza korrekte e adrenalinës në mjekimin e anafilaksisë.

- A) 1 ml të 1:1000 im
- B) 1ml të 1:1000 iv
- C) 10 ml të 1:1000 im
- D) 10 ml të 1:1000 im

Pyetja 178

Sa është sasia e gjakut që duhet të humbasë për tu bërë diagnoza objektive e Menorhagjisë

- A) 100 ml
- B) 40 ml
- C) 80 ml
- D) 20ml

Pyetja 179

Cili nga medikamentet e më poshtëme përdoret me sukses në profilaksinë sekondare të insultit(TIA).

- A) Aspirina me dozë të lartë
- B) Warfarina edhe pa fibrilacion atrial
- C) Heparina
- D) Aspirina me dozë të ulët

Pyetja 180

Cili nga medikamentet e më poshtëme përdoret me sukses në profilaksinë sekondare të insultit (TIA) .

- A) Aspirina me dozë të lartë
- B) ACE inhibitorët për të pasur një TA më të ulët
- C) Sintron
- D) Warfarina edhe pa fibrilacion atrial

Pyetja 181

Cili nga medikamentet e më poshtëme mund të përdoret me sukses në profilaksinë sekondare të insultit (TIA) .

- A) Aspirina me dozë të lartë
- B) Warfarina edhe pa fibrilacion atrial
- C) Heparina
- D) Statinat

Pyetja 182

Në qoftë se për profilaksinë sekondare të insultit përdorim njërin nga medikamentet e më poshtëme, rreziqet kalojnë përfitimet:

- A) ACE inhibitorët për TA më të ulët
- B) Statina
- C) Aspirina me dozë të ulëta
- D) Aspirina me dozë të lartë

Pyetja 183

Në qoftë se për profilaksinë sekondare të insultit, përdorim njërin nga medikamentet e më poshtëme, rreziqet kalojnë përfitimet:

- A) Përdorimi i Warfarinës pa fibrilacion atrial
- B) Aspirina me dozë të ulëta
- C) Një statinë
- D) ACE inhibitor për TA më të ulët

Pyetja 184

Pacienti 63 vjeçar, del nga spitali pasi u trajtua për IAM( infarkt akut miokardi). Cili nga 4 medikamentet e më poshtëme është pranuar të jetë esencial në profilaksinë sekondare të IAM:

- A) Acidi folik
- B) Diltiazeni
- C) Aspirina
- D) Isosorbide mononitrate

Pyetja 185

Pacienti 63 vjeçar del nga spitali pasi u trajtua për IAM( infarkt akut miokardi). Cili nga 4 medikamentet e më poshtëme është pranuar të jetë esencjal në profilaksinë sekondare të IAM:

- A) Doxazosin
- B) Diltiazeni
- C) Isosorbide mononitrate
- D) Atenololi

Pyetja 186

Pacienti 63 vjeçar del nga spitali pasi u trajtua për IAM( infarkt akut miokardi). Cili nga 4 medikamentet e më poshtëme është pranuar të jetë esencjal në profilaksinë sekondare të IAM:

- A) Diltiazeni
- B) Ramipril
- C) Acidi folik
- D) Isosorbide mononitrate

Pyetja 187

Paciente 67 vjeçare del nga spitali pasi u trajtua për IAM( infarkt akut miokardi). Cili nga 4 medikamentet e më poshtëme është pranuar të jetë esencjal në profilaksinë sekondare të IAM:

- A) Trinitrina
- B) Diltiazeni
- C) Simvastatina
- D) Acidi folik

Pyetja 188

Nga 4 mundësi, zgjidh antitruhin më specifik për vendosjen e diagnozës në aneminë pernicioze:

- A) ANCA
- B) Anti cardiolipinë
- C) dsDNA
- D) Anti qeliza parietale gastrike

Pyetja 189

Nga 4 mundësi, zgjidh antitruhin më specifik për vendosjen e diagnozës të lupusit eritematos sistemik :

- A) ANCA
- B) Anti cardiolipinë
- C) dsDNA
- D) Scl 70

Pyetja 190

Nga 4 mundësi, zgjidh antitruhin më specifik për vendosjen e diagnozës të sëmundjes së Celiakisë :

- A) dsDNA
- B) Anti cardiolipinë
- C) RhF
- D) Anti- retikulinë

Pyetja 191

Nga 4 mundësi, zgjidh antitrupin më specifik në rastin e aborteve të përsëritura :

- A) ANCA
- B) RhF
- C) Anti cardiolipinë
- D) dsDN

## 05.Neurologji dhe Psikiatri

Pyetja 1

Mënyra e transmetimit hereditar në distrofinë muskulare tipi Duchenne është si më poshtë:

- A) e lidhur me X-in
- B) autosomale recisive
- C) autosomale dominante
- D) e tipit mitokondrial
- E) recesive sporadike

Pyetja 2

Episodet e migrenës pa aura kanë një kohëzgjatje prej:

- A) 2-10 minutash
- B) mbi 4 orë deri në 7 orë
- C) deri në 4 orë
- D) 10-60 minutash
- E) më shumë se një javë

Pyetja 3

Një lezion ishemic në territorin e arteries cerebri media është përgjegjës për:

- A) hemiplegji dhe hemianestezi kontrolaterale me paralizë të shikimit drejt anës së kundërt
- B) hemiplegji homolaterale me preonim në anësinë e poshtme
- C) deficit të nervave kraniale homolaterale
- D) deficit të nervave kraniale homolaterale dhe shenja motore, sensitive e cerebelare kontrolaterale
- E) dizartri

Pyetja 4

Aksidenti ishemic tranzitor me përkufizim ka një kohëzgjatje prej:

- A) < 1 orë
- B) < 12 orë
- C) < 1 muaj
- D) < 1 javë
- E) < 24 orë

Pyetja 5

Cili është shkaku më i shpeshtë i AVC-ve?

- A) diabeti
- B) trombo-embolia
- C) hipertensioni arterial



- D) aneurisma
- E) ateroskleroza

Pyetja 6

Një pacient pati një dhimbje të fortë mesi ndërkohë që po punonte me trupin në fleksion. Ditën tjetër, ai u zgjua me dhimbje të fortë dhe mpirje të gishtit të l-rë të këmbës së majtë. Ka shumë mundësi që ai të ketë hernie të diskut inter-vertebral:

- A) L1-L2
- B) S1-S2
- C) L5-S1
- D) L4-L5
- E) S2-S3

Pyetja 7

Cikli nga ekzaminimet e mëposhtme është më i indikuar në hetimin e një pacienti me skleroze multiple:

- A) Tomografia aksiale e kompjuterizuar
- B) angiografia digitale
- C) angiografia e arterieve karotide
- D) shintigrafia cerebrale
- E) rezonanca magnetike

Pyetja 8

Të gjitha nga pohimet e mëposhtme në lidhje me sëmundjen e Parkinson janë të vërteta përvec:

- A) sëmundja shkaktohet nga një deficit i dopaminës
- B) tremori ka një frekuencë të shpejtë rreth 10-12Hz
- C) instabiliteti postural është një shkak i rëndësishëm i invaliditetit
- D) sëmundja mund të trajtohet me amantadinë
- E) sëmundja është më pak e shpeshtë se demenca Alzheimer

Pyetja 9

Në një pacient skaneri (TAK) vuri në dukje një lezion ekspansiv cerebral (neoplazi, abces, lezion inflamator apo malformacion vaskular). Studimi i mëtejshëm diagnostik i lezionit (natyra, shtrirja, vaskularizimi) do të bëhet me cilin nga ekzaminimet e mëp

- A) skaner (TAK) me kontrast intra-venoz
- B) rezonancë magnetike me kontrast intra-venoz
- C) angiografia digitale arteriale
- D) rezonancë magnetike me kontrast intra-venoz dhe angio-rezonance
- E) radiografi crani

Pyetja 10

Në cilën nga gjendjet e mëposhtme EEG-ja është më e dobishme?

- A) demenca
- B) koma
- C) ictus

- D) vertigo
- E) cefale

Pyetja 11

Cilat valë karakterizojnë "ritmin bazë" të elektroencefalogramës?

- A) teta
- B) beta
- C) alfa
- D) delta
- E) ritmi Mu

Pyetja 12

Në këtë listë me crregullime neurologjike me instalim akut dhe kohëzgjatje prej pak minutash apo orësh vetëm njëra paraqet një TIA (AIT):

- A) hypoestesia dhe parestezia në një hemikorp
- B) cefalea
- C) sinkopi
- D) deficit i sensibilitetit që instalohet dhe zhduket me karakteristikat e ecjes
- E) inkontinenca urinare

Pyetja 13

Sindromi Guillain-Barre prek:

- A) vetëm adultët, pavarësisht seksit
- B) pa dallim fëmijë apo adulte, në të dy sekset
- C) në mënyrë predominante subjektet e moshuar
- D) më tepër meshkujt
- E) më tepër femrat

Pyetja 14

Hidrocefalia që nuk provokon hipertension intrakranial është hidrocefali:

- A) nga atrofia cerebrale
- B) nga tumor i nervit akustik
- C) nga obstrukcioni i ventrikulit të tretë
- D) nga obstrukcioni i foraminave të çatisë së ventrikulit të katërt
- E) nga malformacioni i Arnold-Chiari

Pyetja 15

MMSE (Mini-Mental State Examination) është:

- A) një ekzaminim klinik me rëndësi të pakët klinike
- B) një tregues për të vlerësuar gravitetin e një traume kraniale
- C) një test, të cilin pacienti mund ta kryej vetë
- D) një ekzaminim i nevojshëm për të gjithë pacientët me shenja të alterimit konjitiv-komportamental, të dizorientimit në kohë e hapësirë

Pyetja 16

Nga cili burim infeksioni rrjedh varianti anglez i sëmundjes së Creutzfeldt-Jacob?

- A) nga njeriu
- B) nga dhia
- C) nga delja
- D) nga lopa
- E) nga majmuni

Pyetja 17

Një grua në muajin e tetë të shtatzanisë ka paraqitur në javën e fundit një shtim diskret në peshë të lidhur pjesërisht me një retension të likideve: Gjatë natës, ajo ankohej për dhimbje në dorën e djathtë si "pickime gjilpërash" në pjesën palmare dhe n

- A) sklerozë multiple
- B) kompresion i nervit ulnar në berryl
- C) kompresion i nervit radial në 1/3 e mesme të humerusit
- D) rheumatalgia (dhimbje reumatologjike)
- E) sindrom i tunelit karpal

Pyetja 18

Tremori i qetesise:

- A) shtohet gjatë gjumit
- B) shtohet gjatë lëvizjeve të vullnetshme
- C) takohet në disa patologji të sistemit piramidial
- D) takohet në disa patologji të cerebelumit
- E) takohet në disa patologji të sistemit ekstrapiramidal

Pyetja 19

Çfarë nenkuptohet me spasticitet:

- A) një dobësi muskulare, sidomos distale, me origjinë nervore centrale
- B) një defekt në koordinimin muskular
- C) një rritje e tonusit muskular me hiperrefleksi
- D) një gjendje dekontraktimi muskular tonik me spasma
- E) një crregullim të ecjes që rëndohet nga mbyllja e syve

Pyetja 20

Cili nga përshkrimet e mëposhtme e përkufizon më mirë dhimbjen migrenoze?

- A) është pulsatile, nga 4-72 ore, intensitet e moderuar-e rëndë, unilaterale, ndonjëherë e shoqëruar me nauzea e të vjella
- B) dhimbje e vazhdueshme, e tipit rëndues që rëndohet me aktivitetin fizik
- C) dhimbje me intensitet të ulët-të moderuar, vetëm bilaterale, që zgjat > 12 orë
- D) dhimbje pulsatile e tipit migrant dhe karakter paroksistik
- E) dhimbje e tipit të vazhdueshëm, vetëm të paraprirë nga aura, shpesh induktuar nga stimuj odorantë, vizivë, auditivë

Pyetja 21

Në një pacient që paraqet status epileptik të gjeneralizuar, për të garantuar funksionet vitale cila terapi do të praktikohet?

- A) barbiturikë me rrugë orale
- B) anti-depresivë tre-ciklike me rrugë endovenoze
- C) benzodiazepinë me rrugë orale
- D) neuroleptikë me rrugë endovenoze
- E) benzodiazepinë me rrugë endovenoze

Pyetja 22

Shenja më e qëndrueshme dhe më e rëndësishme e disfunksionit cerebelar është:

- A) oshilacione të mëdha me mbylljen e syve
- B) instabiliteti në ecje
- C) nistagmus
- D) hypostenia
- E) tremori

Pyetja 23

Paraliza periodike familjare është një dobësi muskulare e rëndë pseudoparalitike e lidhur me:

- A) furnizimin e pakët me O<sub>2</sub> në muskuj
- B) çrregullim të transmetimit të impulsit nervor në muskul
- C) alterimin e pllakës motore
- D) pakësimin e K<sup>+</sup> serik
- E) hypofunksionin kortiko-surenalien

Pyetja 24

Një lezion komplet i palcës spinale mund të përfshijë të gjitha përvec njëres:

- A) anestezi poshtë nivelit të lezionit
- B) paraplegjia
- C) ataksi në ecje
- D) atrofi dhe fashikulacione të muskujve në anësitë e poshtme
- E) çrregullime sfinkteriane

Pyetja 25

Përkufizohet TIK një lëvizje që ka karakteristikat e mëposhtme përvec:

- A) zgjat pak
- B) e thjeshtë apo komplekse
- C) stereotipe
- D) e vullnetshme
- E) përsëritëse

Pyetja 26

Ne sindromin e kembeve pa pushim gjate nates janë te shpeshta:

- A) zgjime te zgjatura nga dispnea
- B) zgjime konfuzionale nga gjume i thelle
- C) miokloni hipnoike ne fazen e dremitjes

- D) levizje periodike te anesive te poshtme
- E) ushqyerje kompulsive

Pyetja 27

Cili nga simptomat e mëposhtme është tregues për një polineuropati në fazë fillestare?

- A) cefalea
- B) retensioni urinar
- C) konvulsionet
- D) krampet
- E) dizartria

Pyetja 28

Cila nga shenjat e mëposhtme nuk është e pranishme në poliradikuloneuritit Guillain-Barre?

- A) hypoestezia
- B) deficit motor
- C) dhimbje muskulare
- D) hypertonia
- E) reduktim i refleksve osteo-tendinoze

Pyetja 29

Në paralizën e nervit të gjashtë kranial, syri është:

- A) i rrotulluar nga jashtë
- B) aksi okular nuk është i ndryshuar
- C) i rrotulluar nga brenda
- D) i rrotulluar lart
- E) i rrotulluar poshtë

Pyetja 30

Neuralgjia trigeminale është më e shpeshtë:

- A) në fëmijë dhe në gra
- B) në gra dhe në subjekte të moshuar
- C) në meshkuj dhe në të moshuar
- D) në fëmijë dhe në meshkuj
- E) në gra dhe në adoleshencë

Pyetja 31

Ndërprerja e plotë e traktit optik të djathtë do të provokojë:

- A) hemianopsi bitemporale
- B) hemianopsi homonime sinistra
- C) hemianopsi homonime dextra
- D) kuadrantanopsia dextra
- E) kuadrantanopsia sinistra

Pyetja 32

Në isheminë cerebrale të territorit karotidien të djathtë, trajtimi kirurgjikal (trombendarterektomia) është i indikuar:

- A) në mungesë të pllakave karotidiene
- B) në prani të pllakës karotidiene sin pavarësisht nga grada e stenozés
- C) në prani të pllakës karotidiene dex me stenozé > 70%
- D) në prani të pllakës karotidiene dex me stenozé < 30%
- E) në prani të pllakës karotidiene dex pavarësisht nga grada e stenozés

Pyetja 33

A është e mundur të ndërpriten medikamentet anti-epileptike?

- A) jo, nëqse EEG mbetet e alteruar edhe pse pa kriza
- B) jo, në asnjë rast
- C) po, pas të paktën 2 vjet pa kriza
- D) po, pas gjashtë muajsh pa kriza
- E) jo nëqse epilepsia është sekondare nga një traume kraniale

Pyetja 34

Shkaku më i shpeshtë i hemorragjisë subaraknoidale përfaqësohet nga:

- A) tumori cerebral
- B) malformacioni arterio-venoz cerebral
- C) aneurizma cerebrale
- D) trauma kraniale
- E) koagulopatitë

Pyetja 35

Menjëherë pas një seksioni (prerjeje) transversal të palcës spinale pritet të gjendet më shpesh:

- A) retensioni urinar
- B) inkontinenca urinare
- C) paraplegjia spastike
- D) shenja e Babinskit
- E) rritje e reflekseve osteo-tendinoze

Pyetja 36

Manifestimet inaugurale më të shpeshta të miastenia gravis janë:

- A) disfagia dhe disfonia
- B) ptoza palpebrale dhe diplopia
- C) lodhja kronike
- D) çrregullimet respiratore
- E) hypostenia proksimale

Pyetja 37

Cili nga ekzaminimet e mëposhtme duhet për të konfirmuar një patologji hipofizare?

- A) Rezonanca cerebrale
- B) TAK (skaner) i hipofizës
- C) Radiografia e sella turcica
- D) Kateterizimi i sinuseve petroze

E) TAK (skaner) cerebral

Pyetja 38

Regjistrimi elektroencefalografik bazal i një neonati 3 muajsh:

- A) është i njëjtë me atë të një adulti
- B) është praktikisht i parregjistrueshëm për shkak të kompliancës së dobët të pacientit
- C) nuk paraqet fazat e gjumit REM nokturn
- D) është i ndryshëm nga ai i adultit
- E) asnjera

Pyetja 39

Mielografia:

- A) lejon evidentimin e anomalive të kanalit vertebral
- B) lejon evidentimin e anomalive të konduksionit të fibrave nervore
- C) është një ekzaminim që prek pjesët kaudale të cerebelumit
- D) është një ekzaminim biptik i aksoneve nervore
- E) është një ekzaminim që nuk parashikon përdorimin e mjeteve të kontrastit

Pyetja 40

Neuralgjia trigeminale lokalizohet në mënyrë preferenciale:

- A) në nivel të degës së II-të dhe të III-të të trigeminalit
- B) në nivel të degës së I-rë të trigeminalit
- C) në nivel fronto-okular
- D) në nivel oksipital
- E) në nivel temporo-parietal

Pyetja 41

Cila nga shenjat e mëposhtme nuk i referohet një lezionit të neuronit të parë motor ?

- A) shtimi i reflekseve osteo-tendinoze
- B) fashikulacionet
- C) shenja e Babinskit
- D) hipertonia muskulare
- E) defiçiti motor

Pyetja 42

Polineuriti infeksioz i tipit të Guillain-Barre ka të gjitha karakteristikat e mëposhtme përveç njëjës. Cilës?

- A) shoqërohet shpesh me çrregullime sensitive në shtrirje të madhe
- B) është e lidhur probablisht me Cytomegalovirus
- C) proteinat likuorale janë veçanërisht të shtuara
- D) në likuor janë të pranishme IgG oligoklonale
- E) është shpesh pasojë e një infeksioni viral të aparatit respirator

Pyetja 43

Territori muskular më shpesh i prekur nga miastenia gravis është:

- A) muskulatura proksimale e anësive të sipërme
- B) muskulatura distale e anësive të sipërme
- C) muskulatura faringo-laringeale
- D) muskulatura okulare ekstrinseke
- E) muskulatura proksimale e anësive të poshtme

Pyetja 44

Një burrë 68 vjeçar me një histori hipertensioni arterial paraqitet për instalimin akut të një defiqiti motor e sensitiv në anësitë e poshtme të shoqëruara me inkontinencë të dyfishtë. Ekzaminimi neurologjik evidenton një paraplegji flaske, tonusi sfinkte

- A) mieliti transvers
- B) infarkti bulbar
- C) abcesi spinal
- D) infarkti medular
- E) sindroma Guillain-Barre

Pyetja 45

Një rënie e menjëhershme e forcës në anësitë e poshtme me arefleksi osteo-tendinoze dhe me mungesë të shenjave piramidale ka si shkaqe të mundshme :

- A) leziona demielinizante spinale
- B) sindromën Guillain-Barre
- C) tumor medular
- D) siringomielinë
- E) araknoiditin spinal

Pyetja 46

Sëmundja neurologjike e karakterizuar nga zona të përhapura demielinizimi me integritet relativ të cilindrakseve është:

- A) sifilizi
- B) poliomieliti
- C) anemia pernicioze
- D) skleroza multiple
- E) skleroza laterale amiotrofike

Pyetja 47

Cila nga karakteristikat e mëposhtme klinike nuk përkufizojnë një aksident ishemik tranzitor?

- A) fillim i papritur
- B) përhapje progresive e simptomave në një anësi apo hemikorp
- C) simptomatologji neurologjike fokale
- D) zhdukje e shpejtë brenda 24 orëve
- E) mungesa e shenjave neurologjike pas 24 orësh

Pyetja 48

Cili nga medikamentet e mëposhtëm përdoret në trajtimin e epilepsisë temporale?

- A) fenotiazinë



- B) levodopa
- C) butirofenoni
- D) triciklikët
- E) carbamazepina

Pyetja 49

Në malformacionin e Arnold-Chiari:

- A) manifestohen shenja dhe simptoma si të lezioneve cerebelare, bulbare dhe të nervave kraniale
- B) klinika mund të simulojë një tumor të fosa crani posterior, por jo një sklerozë multiple
- C) klinika mund të simulojë siringomielinë, por jo platibazine
- D) simptomat në përgjithësi nuk manifestohen deri në moshë adulte
- E) shfaqja e hidrocefalisë është e pazakonshme

Pyetja 50

Mekanizmi i veprimit të toksinës botulinike është:

- A) inhibimi i konduksionit të kalçiumit
- B) inhibimi i lidhjes post-sinaptike acetilkolinë-receptor
- C) shtim i degradimit të acetilkolinës
- D) inhibimi i çlirimit të acetilkolinës nga elementi pre-sinaptik
- E) inhibim i konduksionit të natriumit

Pyetja 51

Cila nga këto situata nuk është faktor deklanshant (nxitës) i një krizë epileptike?

- A) abuzimi i alkoolit
- B) deprivimi i gjumit të natës
- C) ethe (temperaturë) e zgjatur
- D) pirja e duhanit
- E) dehidratim apo hyponatremi e thellë

Pyetja 52

Episodet e cefaleve të tipit cluster kanë një kohëzgjatje prej:

- A) pak sekondash
- B) 2-3 minutash
- C) 24-72 orësh
- D) 4-24 orësh
- E) 15-180 minutash

Pyetja 53

Tremori parkinsonian është i tipit:

- A) postural
- B) të qetësisë
- C) kinetik
- D) ortostatik
- E) sinkron

Pyetja 54

Shenja e parë më e shpeshtë e një patologjie të nervit të VII-të kranial është:

- A) ptoza palpebrale kontrolaterale
- B) pakësim i refleksit orbital të anës kontrolaterale
- C) pakësimi i refleksit orbital të anës së prekur
- D) devijimi kontrolateral i gjuhës
- E) fashikulacione të rima labiale

Pyetja 55

Me miotoni nënkuptohet:

- A) një gjendje persistente e kontrakturës muskulare me krampe
- B) një rritje persistente e tonusit muskular e tipit elastik, me rritje të reflekseve tendinoze
- C) një rritje e tonusit muskular e tipit elastik, me spazma muskulare
- D) një çrregullim motor central me lëvizje përsëritëse të vazhdueshme dhe posturë anormale
- E) një deficiet i relaksimit muskular nga kontraksioni persistent edhe pse stimuli ka mbaruar

Pyetja 56

Një burrë 50 vjeçar paraqet prej rreth 15 muajsh një simptomatologji me rëndim progresiv të shpejtë të karakterizuar nga parapareza spastike, hiperrefleksia osteo-tendinoze difuze, shenja Babinski bilaterale, fashikulacione, atrofi të moderuar në muskujt

- A) skleroza multiple
- B) siringomielia
- C) sëmundja e Friedreich
- D) sëmundja e Tay-Sachs
- E) skleroza laterale amiotrofike

Pyetja 57

Për trajtimin e atakut të cefalesë migrenoze rekurente preferohet të përdoret:

- A) ergotamina ose dihidroergotamina per os
- B) acidi acetilsalicilik me dozë mbi 1000mg per os
- C) triptanët
- D) AIJS
- E) nuk ka diferenca sinjifikative ndërmjet medikamenteve të përmendura

Pyetja 58

Çrregullimet neurogjene të kontrollit të vezikës urinare të lidhura me lezime të medullës spinale provokojnë shpesh:

- A) nekrozë tubulare akute
- B) polipozë vezikale
- C) hidronefroze bilaterale
- D) divertikulozë vezikale
- E) hidrocelë

Pyetja 59

Në cilën nga këto patologji dyshohet për një fizio-patologji autoimune?

- A) meningiti aseptik
- B) panencefaliti subakut sklerotizant
- C) tuberkuloma cerebrale
- D) hemorragjia subaraknoidale
- E) sklerozë multiple

Pyetja 60

Dhimbja e migrenës është veçanërisht:

- A) migruese
- B) therëse
- C) pulsatile
- D) konstrikive
- E) shpuese

Pyetja 61

Numri normal i limfociteve në lëngun cerebro-spinal normal është:

- A) deri në 100 celula/mm<sup>3</sup>
- B) deri në 10 celula/mm<sup>3</sup>
- C) deri në 2-3 celula/mm<sup>3</sup>
- D) nuk duhet të jenë celula të asnjë tipi
- E) varet nga formula e gjakut periferik

Pyetja 62

Cila nga etiologjitë e mëposhtme të meningitit ka prognozën më të keqe?

- A) meningiti nga meningokoku
- B) meningiti nga Coxsakia
- C) meningiti nga Hemofilus influenze
- D) meningiti nga pneumokoku
- E) meningiti nga Listeria monocitogenes

Pyetja 63

Cili sistem apo strukturë preket në sklerozën laterale amiotrofike?

- A) motoneuroni i I-rë dhe i II-të
- B) medula spinale
- C) motoneuroni i poshtëm
- D) cerebelum
- E) sistemi sensitiv

Pyetja 64

Kujt i korrespondojnë krizat e gjeneralizuara të njohura si "grand mal"?

- A) krizave epileptike që zgjasin më shumë se 2 minuta
- B) vetëm krizave të njëpasnjëshme që paraprijnë statusin epileptik
- C) vetëm krizave që kanë një gjeneralizim sekondar
- D) krizave konvulsive toniko-klonike
- E) vetëm krizave që shoqërohen me inkontinencë sfinkteriane

Pyetja 65

Një hemiparezë brakio-faciale që regredon në pak orë mund të konstatohet me shpesh në:

- A) hemorragjinë subaraknoidale
- B) TIA (AIT) karotidiene
- C) krizën miastenike
- D) pusë-në e një sëmundjeje demielinizante
- E) trombozën e arteries cerebrale media

Pyetja 66

Encefaliti akut nekrotizant dyshohet në:

- A) infeksionin nga herpes simplex virus
- B) përhapjen e një meningiti tuberkular
- C) infeksionin nga neiseria meningitis
- D) përhapjen e një neurosifilizi
- E) infeksionin nga bacili Coli

Pyetja 67

Cilat janë shkaqet më të shpeshta të shfaqjes së epilepsisë tek të moshuarit?

- A) traumat kraniale
- B) sëmundjet cerebro-vaskulare
- C) çrregullimet metabolike
- D) tumoret cerebrale
- E) encefalitet

Pyetja 68

Në miastenia gravis, dobësia muskulare është rezultat i një insuficience të transmetimit kolinergjik në junksionin neuro-muskular; dobësia muskulare mund të shfaqet edhe për shkak të një mbidozimi të medikamenteve kolino-mimetike të përdorur në trajtimin

- A) reflekset osteo-tendinoze normale
- B) ptoza palpebrale bilaterale
- C) diplopia
- D) insuficienca respiratore akute
- E) fashikulacionet muskulare

Pyetja 69

Në trajtimin e sëmundjes së Parkinson në fazën fillestare të saj, zgjedhja e preferuar aktuale është:

- A) administrimi i dozave të larta të Levodopa-s
- B) administrimi i domperidon
- C) dhënia e një bashkëshoqërimit të dopaminergjikëve dhe levodopas
- D) tentimi i medikamenteve dopamino-agoniste
- E) administrimi antikolinergjik

Pyetja 70

Faktorët e riskut për zhvillimin e sëmundjes së Alzheimer përfshijnë të gjitha të mëposhtmet përveç njëjës:

- A) trauma kraniale
- B) mosha e avancuar
- C) duhani
- D) një vëlla i prekur nga sëmundja e Alzheimer
- E) sindromi Down

Pyetja 71

Lokalizimi më i shpeshtë i hemorragjive cerebrale është:

- A) cerebelum
- B) kapsula interna
- C) truncus cerebri
- D) cauda
- E) nucleus ruber

Pyetja 72

Një komplikacion i rëndë i korigjimit të shpejtë të një hipernatremie është:

- A) hemorragjia subdurale
- B) mielinoliza pontine centrale
- C) hemorragjia subaraknoidale
- D) edema cerebrale
- E) hemorragjia intracerebrale

Pyetja 73

Koma që instalohet shpejt me ndjenjën e urisë, dobësisë ekstreme, djersitjes profuze dhe modifikimeve të respiracionit është në përgjithësi një:

- A) komë hepatike
- B) komë diabetike
- C) komë uremike
- D) komë hypoglicemike
- E) komë cerebrale

Pyetja 74

Pacient 32 vjeç, traumë nga aksident automobilistik. Nuk lëviz mirë anësitë e poshtme dhe nuk kontrollon sfinkterat. Dyshohet një lezion traumatik i medullës spinale. Cfarë ekzaminimi kërkon të parin?

- A) radiografi e tërë kolonës
- B) TAK (skaner) i tërë kolonës spinale
- C) Rezonancë spinale
- D) elektromiografi dhe potenciale të evokuara të palcës
- E) stratigrafia e kolonës vertebrale

Pyetja 75

Terapia antikoagulante është zgjedhje e parë:

- A) në ictus-et ishemike sekondare nga fibrilacioni arterial
- B) në të gjitha ictus-et ishemike

- C) në ictus-et ishemike sekondare nga ateromatozat karotide
- D) në ictus-et hemorragjike
- E) në ictus-et kriptogenike

Pyetja 76

Arteriti temporal (ose arteriti Horton) është i shoqëruar në mënyrë tipike me:

- A) një rritje të hematokritit
- B) një rritje të sedimentit
- C) një rritje të hemoglobinës
- D) një rritje të trombociteve
- E) një reduktim të glukozës

Pyetja 77

Cila nga sëmundjet e mëposhtme kardio-vaskulare konsiderohet si më shumë risk për emboli cerebrale?

- A) persistenca e foramen ovale apertum
- B) fibrilacioni atrial rheumatik apo valvular
- C) prolapsi i valvulës mitrale
- D) fibroza e anulum të valvës mitrale
- E) ateromat e harkut të aortës < 4 mm

Pyetja 78

Cefalea e tipit tensiv është veçanërisht:

- A) vetëm frontale
- B) unilaterale
- C) bilaterale
- D) vetëm oksipitale
- E) gjithnjë okulare

Pyetja 79

Halucinacionet janë përkufizuar si:

- A) bindje false që mund të eliminohen me kritikën
- B) perceptime sensoriale të gabuara të pabazuara në stimulimin natyral të receptorëve
- C) perceptime sensoriale të gabuara të bazuara në stimulimin natyral të receptorëve
- D) bindje false që nuk mund të eliminohen me kritikën
- E) sensacione anormale çfarëdo të lidhura me një lezion neurologjik

Pyetja 80

Një hemianopsi homonime e djathtë mund të jetë e shkaktuar nga një lezion:

- A) i nervit optik
- B) i kiazmës optike
- C) në traktin optik te majtë
- D) në korteksin oksipital të djathtë
- E) në retinën e djathtë

Pyetja 81

Një vertigo rotatore pozicionale është shumë probabilisht e lidhur me:

- A) atakun ishemic vertebro-bazilar
- B) disfunkcionimit labirintik
- C) intoksikimin nga opioidet
- D) lezion demielinizant
- E) epilepsinë

Pyetja 82

Cili nga ekzaminimet e mëposhtme instrumentale konsiderohet zgjedhja e parë në rastin e një humbjeje të papritur dhe tranzitore të vetëdijes me rrëzim në tokë në një subjekt të moshuar, të pashoqëruar me manifestime epileptike?

- A) elektrokardiograma
- B) elektroencefalograma
- C) TAK (skaner) i kokës
- D) echo doppler i karotideve
- E) radiografia e craniumit

Pyetja 83

Pacient 75 vjeç, kardiopat, nën terapi me antikoagulante, me një traume të lehtë kraniale disa ditë përpara konsultës klinike. Janë prezente një instabilitet postural dhe hemiparezë e lehtë sinistra. Cilin ekzaminim do të kërkonit dhe pse?

- A) TAK (skaner) cerebral për dyshim stenoze të arteries silviane
- B) TAK (skaner) cerebral për dyshim të hematomës subdurale dhe dyshim ishemie
- C) TAK (skaner) cerebral për dyshim neoplazie
- D) Rezonancë cerebrale për dyshim sëmundjeje degjenerative
- E) Angiografi për dyshim hematomë cerebrale

Pyetja 84

Statusi (etat de mal) epileptik:

- A) është një urgjencë mjekësore
- B) kërkon një vlerësim anesteziologjik si qëndrimi i parë terapeutik
- C) mund të shprehet vetëm me kriza konvulsive të gjeneralizuara
- D) është një gjendje kronike mbi të cilën duhet të ndërhyhet me modifikime të vogla në terapi
- E) ka fenitoinën si terapinë e vetme të mundshme

Pyetja 85

Një lezion i ganglioneve bazale mund të japë këto shenja përveç:

- A) lëvizje të pavullnetshme
- B) rigiditet
- C) tremor
- D) humbje e lëvizjeve automatike shoqëruese
- E) paraliz flaccida

Pyetja 86

Të dhënat e lëngut cerebro-spinal në sklerozën multiple:

- A) janë përgjithësisht patognomonike
- B) përfshijnë vetëm një rritje të proteinave totale
- C) jo rrallë përfshijnë një pleocitozë të shprehur
- D) përfshijnë vetëm një hypoglukoraki
- E) nuk janë përgjithësisht patognomonike

Pyetja 87

Cili nga elementet e mëposhtme klinike NUK bën pjesë në karakteristikat universalisht të pranura të atakeve ishemike cerebrale tranzitore (TIA/AIT)?

- A) prekje neurologjike objektive akoma pozitive pas 24 orësh
- B) zgjatje e simptomatologjisë jo më shumë se 24 orë
- C) shenja neurologjike të tipit fokal
- D) tendenca për të recidivuar
- E) fillim akut

Pyetja 88

Cila e dhënë kontribuon në mënyrë vendimtare diagnozën e epilepsisë?

- A) EKG
- B) ekzaminimi objektiv i pacientit
- C) anamneza
- D) TAK (skaner) i kokës
- E) hetimi gjenetik

Pyetja 89

Cili është shkaku kryesor i vdekjes në SLA?

- A) infarkti i miokardit
- B) bronkopneumonia
- C) pneumonia respirative
- D) insuficienca respiratore
- E) demenca

Pyetja 90

Quhet ndryshe edhe cefalea e vetëvrasjes:

- A) migrena me aura
- B) neuralgjia e n. Occipitalis major
- C) neuroalgjia odontogjene
- D) cefalea cluster
- E) hemikrania paroksistike kronike

Pyetja 91

Në cilën nga këto situata vërehet rritja më e madhe e proteinave në likuor?

- A) meningo-encefaliti akut viral
- B) hemorragjinë subaraknoidale
- C) sklerozë multiple
- D) bllokun e plotë medular
- E) paralizën progresive



Pyetja 92

Migrena pa aura është më e shpeshtë:

- A) në moshën infantile
- B) në të moshuarit
- C) gjatë shtatzanisë
- D) gjatë menopauzës
- E) në adultët e rinj

Pyetja 93

Refleksi i akomodimit apo i afrimit drejt syve konsiston në:

- A) miozë, konvergencë dhe rritje e kurbaturës së kristalinit
- B) midriazë, rrotullim intern dhe rritje e kurbaturës së kristalinit
- C) miozë, divergjencë dhe rritje e kurbaturës së kristalinit
- D) midriazë, konvergencë dhe rritje e kurbaturës së kristalinit
- E) miozë, konvergencë dhe ptozë

Pyetja 94

Me epilepsi "petit mal" nënkuptohet:

- A) një formë e dobësuar e "grand mal"
- B) një kuadër epileptik me aspekte klinike dhe elektroencefalografike specifike
- C) një alterim i gjendjes së koshiencës jo mbi bazë organike
- D) epilepsia e fëmijërisë së hershme
- E) epilepsia psikomotore

Pyetja 95

Midis formave të cefaleve të cituara, takohet më shpesh në burrat se në gratë:

- A) migrena pa aura
- B) migrena me aura
- C) cefalea e tipit tensiv
- D) hemikrania kronike paroksistike
- E) cefalea cluster

Pyetja 96

Një krizë epileptike parciale motore e djathtë mund të shkaktohet nga një fokus epileptik i lokalizuar në:

- A) lobin frontal të djathtë
- B) lobin frontal të majtë
- C) lobin oksipital të majtë
- D) talamusin e djathtë
- E) lobin parietal të majtë

Pyetja 97

Në një pacient me çrregullime të ecjes, çrregullime sfinkteriane dhe humbje të sensibilitetit nga umbilikusi e poshtë, ekzaminimi që kryhet në rend të parë është:

- A) rezonanca magnetike e kokës
- B) angiografia medulare
- C) rakicentezeë
- D) rezonanca magnetike e kolonës torakale
- E) TAK (skaner) spinal

Pyetja 98

Një grua 32 vjeçe sheh dysh prej një muaji. Ky çrregullim është intermitent, por duket të jetë më evident në mbrëmje ; prej disa ditësh ka vënë re " të ketë lodhje " në përtypjen e mishit; në ekzaminim objektiv evidentohet një ptozë palpebrale sinistra që

- A) TIA/AIT (atak ishemic tranzitor) në territorin vertebro-bazilar
- B) miastenia gravis
- C) tumor pontin
- D) histeri
- E) tumor mesenfalik

Pyetja 99

Diseminimi (metastazimi) cerebro-spinal vërehet me probabilitet të lartë në :

- A) kraniofaringeoma
- B) adenoma hypofizare
- C) astrocitoma grada IV (glioblastoma)
- D) oligodendroglioma
- E) meduloblastoma

Pyetja 100

Cila nga terapitë e mëposhtme është ajo e zgjedhura në trajtimin e trombozës venoze cerebrale?

- A) antibiotikët
- B) antiedematozët
- C) heparina
- D) antiepileptikët
- E) steroidet

Pyetja 101

Paraliza periodike është e karakterizuar nga nivele intermitente:

- A) të rritura të fosfatazes acide
- B) të ulëta të kaliumit
- C) të rritura të aminoacideve
- D) të rritura të fosforemisë
- E) të ulëta të kreatininës

Pyetja 102

Cili nga alterimet e mëposhtme të studimit elektrofiziologjik të konduksionit nervor janë karakteristike për neuropatitë demielinizante?

- A) amplitudë e ulët e potencialit sensitiv
- B) reduktim në shpejtesinë e konduksionit motor e sensitiv

- C) dekrement në stimulimin e përsëritur
- D) prezenca e fibrilacioneve në ekzaminimin me gjilpërë të muskullit
- E) rritje e shpejtësisë së konduksionit

Pyetja 103

Në SLA, alterimet e para motore që takohen janë:

- A) paraliza flakside
- B) tetania
- C) mioklonus
- D) fashikulacionet
- E) paraliza spastike

Pyetja 104

Semundja e Alzheimer është familjare ne:

- A) 0-5% te rasteve
- B) Nuk është asnjehere e tipit familjar
- C) 56-60% te rasteve
- D) 100% 5 te rasteve
- E) 15-20% te rasteve

Pyetja 105

Diskinezia tardive:

- A) simptomë e skizofrenisë
- B) simptomë e alkolizmit
- C) simptomë e efektit të neuroleptikëve
- D) simptomë e demencës
- E) simptomë e depresionit

Pyetja 106

Abuzimi me kokainë mund të çojë drejt:

- A) tolerancës
- B) psikozës
- C) neurozës
- D) vartësisë
- E) abstinencës

Pyetja 107

Frika është:

- A) një çrregullim i personalitetit
- B) një simptomë e depresionit
- C) një simptomë e sëmundjeve me natyrë psikiatrike
- D) një çrregullim i perceptimit
- E) një çrregullim në mënyrën e të menduarit

Pyetja 108

Haluçinacionet në skizofreni janë kryesisht me natyrë:

- A) vizive
- B) olfaktive
- C) taktile
- D) degjimore
- E) nuk ka haluçinacione

Pyetja 109

Depresioni bën pjesë:

- A) të gjitha më lart janë të sakta
- B) vetëm në çrregullimet me natyrë psikotike
- C) në alterimet e gjendjes të vetëdijes
- D) çrregullimet e perceptimit
- E) në çrregullimet e humorit

Pyetja 110

Depresioni madhor përcaktohet si:

- A) të gjitha përgjigjet janë të sakta
- B) prania e dy apo më shumë episodeve depresive me intervale dy mujore përmirësimi
- C) shfaqja e depresionit në periudha të caktuara të vitit, veçanërisht në pranverë dhe vjeshtë
- D) prania e të paktën tri episodeve depresive për tri vite në vazhdim
- E) asnjë përgjigje nuk është e saktë

Pyetja 111

Barnat antidepresiv veprojnë në:

- A) veprojnë si endorfina
- B) në nivel intraqelizor
- C) lidhen me monoaminat në hapësirën post sinaptike
- D) membranat e neuroneve pre dhe post sinaptik
- E) asnjë nga përgjigjet më lart

Pyetja 112

Personaliteti histroinik (histerik) karakterizohet nga të gjitha ndryshimet më poshtë me përjashtim të:

- A) paqëndrueshmëria emocionale
- B) sjellja në mënyrë racionale
- C) kërkesa për vëmendje
- D) vartësia
- E) sjelljet joshëse

Pyetja 113

Per te mbajtur nje qendrim korrekt perballe pacienteve do te duhet:

- A) te frenohet cdo reaksion emotiv
- B) te evitohet shprehja e opinionave personale
- C) te evitohet ironia, sarkazma dhe jokonformizmi
- D) te kritohet hapur cdo sjellje

E) asnje nga pergjigjet e permendura

Pyetja 114

Per t'u konsideruar i pandehur kerkohet:

- A) aftesia e vullnetshme per te vepruar
- B) paaftesia per te vepruar dhe gjykuar
- C) te mos jete nen veprimin e alkoolit
- D) te kete mbushur moshen 21 vjec
- E) te mos kete vuajtur nga crregullime psikotike

Pyetja 115

Bindja qe nje tjetër person mund te lexoje mendimin tone tregon:

- A) deluzion
- B) obsesion
- C) idene e referimit
- D) depersonalizim
- E) crregullime te kujteses

Pyetja 116

Cili nga te meposhtmet nuk paraqet nje mekanizem psikik mbrojtës:

- A) Projeksioni
- B) Shmangia
- C) Regresioni
- D) Mohimi
- E) Konfabulacioni

Pyetja 117

Perballe nje pacienti ansioz mjeku psikiater nuk duhet:

- A) te shikojë pacientin drejt ne sy, te shkruaje te dhenat, te mate parametrat vitale
- B) te minimizojë apo banalizojë situaten
- C) te jete autoritar
- D) te jete pergjithesues ne vleresime
- E) te preokupohet per mjedisin qe rrethon pacientin

Pyetja 118

Diskinezia tardive:

- A) eshte nje sindrom anesor i neuroleptikeve
- B) eshte nje sinonim i alkoolizmit
- C) eshte nje sinonim i skizofrenise
- D) eshte nje sinonim i sifilizit terciar
- E) eshte nje sinonim i demences

Pyetja 119

Abuzimi kronik i alkoolit mund te coje ne:

- A) demence
- B) crregullime te ankthit
- C) skizofreni
- D) crregullim personaliteti
- E) asnje nga pergjigjet

Pyetja 120

Sasia e gjumit:

- A) pakesohet me shtimin e moshes
- B) mbetet e pandryshueshme ne cdo moshe
- C) pakesohet nga lindja deri ne dhjete vjec dhe pastaj nuk ndryshon
- D) pakesohet nga lindja deri ne tre vjec dhe pastaj nuk ndryshon
- E) pakesohet nga lindja deri ne nje vjec dhe pastaj nuk ndryshon

Pyetja 121

DSM-IV eshte nje sistem klasifikimi i crregullimeve psikiatrike:

- A) hierarkik multi-aksial
- B) dimensional
- C) kategorial
- D) hierarkik
- E) kategorial multiaksial

Pyetja 122

Trajtimi psikiatrik i detyrueshem:

- A) kerkohet dhe realizohet kur te semuret jane te rrezikshem per veten dhe te tjeret
- B) eshte nje nga menyrat e shtrimit ne sherbimet psikiatrike
- C) eshte nje trajtim shendetesor i jashtezakonshem per t'u kryer ne te semuret qe nuk kane vetedijen e semundjes dhe qe refuzojne shtrimet e nevojshme
- D) eshte nje vendim i gjykates
- E) te gjitha pergjigjet e permendura

Pyetja 123

Nje subjekt i prekur nga kleptomania:

- A) zakonisht ka para per te paguar ato qe ai vjedh
- B) eshte i paafte t'i rezistojte impulsit per te vjedhur objekte te pavlera
- C) per me teper nuk i perdor objektet qe vjedh
- D) per me teper nuk ka bashkefajtores
- E) te gjitha pergjigjet e mesiperme

Pyetja 124

Nga cfare karakterizohet onirizmi?

- A) konfuzioni, hiperaktiviteti, crregullime afektive
- B) kthjelltesia, hipermnazia, eufori e lehte
- C) disforia, kompulsioni, crregullime te gjumit
- D) deliri i madheshtise, insomnia, bulimia, hipermnazia
- E) amnezia retrograde, racionaliteti, represioni

Pyetja 125

Delirium tremens shoqerohet nder te tjera me me simptomat e meposhtme:

- A) bradikardi
- B) tremor
- C) halucinacione te fuqishme vizive
- D) dizorientim ne kohe e hapesire
- E) dekurs prej 3-7 ditesh

Pyetja 126

Deluzioni i somatik mund te shfaqet ne tema te ndryshme midis te cilave:

- A) te gjitha te meposhtmet
- B) bindja e te pasurit lekuren e infektuar nga parazite ose nje parazit i brendshem
- C) bindja e te pasurit pjese te trupit te deformuara
- D) bindja e te pasurit te organeve qe nuk funksionojne
- E) bindja e nxjerrjes se nje ere te keqe nga disa pjese te trupit

Pyetja 127

Cfare eshte iluzioni?

- A) nje perceptim pa objekt
- B) nje crregullim i perceptimit
- C) nje perceptim pa karkter sensorial
- D) nje anomali i te menduarit
- E) nje crregullim i inteligjences

Pyetja 128

Cfare mund te sjellje toksikomania ne kokaine?

- A) tolerance
- B) vartesi
- C) neuroze
- D) psikoze
- E) abstinence

Pyetja 129

Ne prapambetjen mendore te rende koeficienti i inteligjences (I.Q) eshte midis:

- A) 0 - 20/25
- B) 25 - 40/50
- C) 40/50 - 70
- D) 80/90 - 100
- E) 100 - 110/120

Pyetja 130

Ne nje pacient dement qe paraqet axhitim psiko-motor eshte i indikuar perdorimi i:

- A) benzodiazepines
- B) barbiturikeve ne doza te uleta
- C) substancave placebo
- D) haloperidoli ne doza te uleta
- E) chlomipramina

Pyetja 131

Per te percaktuar nje crregullim depresiv madhor si rekurent nevojitet:

- A) prezenca e te pakten tre episodeve depresive ne tre vite rresht
- B) shfaqja e dy ose me shume episodeve depresive me interval remisioni prej te pakten 2 muaj rresht
- C) shfaqja e depresionit ne periudha te percaktuara te vitit, vecanerisht ne pranvere dhe ne vjeshte
- D) prezenca e episodeve depresive te alternuara me periudha hypomanie
- E) asgje nga pergjigjet e mesiperme

Pyetja 132

Me shendetin mendor nenkuptohet aftesia e individit:

- A) per t'u pershtatur apo gjetur zgjidhje ndajkonflikteve te jashtme apo ngjarjeve te jashtme negative
- B) per te kanalizuar impulset ne produkte sociale
- C) per te krijuar marredhenie te pershtatshme nderpersonale
- D) per t'u pershtatur me ambientin
- E) te gjitha pergjigjet jane te sakta

Pyetja 133

Prevalenca ne epidemiologji mat:

- A) numrin e rasteve te nje semundjeje qe ekzistojne ne nje moment te caktuar ne nje popullate
- B) simptomat me te zakonshme te nje semundjeje
- C) semundje me shpeshtesi te madhe
- D) etnocentrizmin dhe trajtimin e nje semundjeje te dhene
- E) grupmoshen me vulnerabilitetin

Pyetja 134



Me fobi nenkuptohet:

- A) nje crregullim i personalitetit
- B) nje crregullim i te menduarit
- C) nje sindrom tipik psikotik
- D) nje crregullim i perceptimit
- E) nje simptom i depresionit

Pyetja 135

Ne trajtimin e nje gjendjeje konfuzionale do te nevojitej:

- A) t'i siguronim pacientit nje presence e vazhdueshme
- B) te mbanim pacientin ne kushte erresire dhe izolimi
- C) te perdornim sasi te madhe sedativesh
- D) te perdornim antidepresive triciklike
- E) te mbanim pacientin zgjuar me cdo menyre

Pyetja 136

Nje gjendje krepuskulare mund te jete pasoje e:

- A) krize epilepsie temporale
- B) insomnie persistente
- C) pakesimit te vizus-it
- D) reaksionit fobik teper te rende
- E) dozave te medha te medikamenteve antidepresive

Pyetja 137

Me depression te maskuar nenkuptojme:

- A) nje depression me simptoma kompensatore te kunderta me ato depressive (ilaritet)
- B) extra-version
- C) nje depression qe paraqitet me depression te qarte somatic ne mungese te semundjes fizike
- D) nje depression me component te qarte reactive mbi nje strukture neurotike te personalitetit
- E) asnje nga pergjigjet e permendura

Pyetja 138

Cila eshte perqindja e pacienteve onkologjike qe zhvillojne nje episod depresiv?

- A) 10%
- B) 25%
- C) 50%
- D) 80%
- E) 100%

Pyetja 139

Cili eshte tipi i pare i imobilizimit qe perdoret ne pacientin maniakal?

- A) kufizim relacional
- B) farmakologjik
- C) fizik
- D) asnje nga pergjigjet
- E) te gjitha pergjigjet e permendura

Pyetja 140

Ne cilen nga keto disiplina specialistike personeli ndihmes mund te veproje direkt pa nderhyrjen e Mjekut te pergjithshem?

- A) higjena
- B) mjekesi interne
- C) psikiatri
- D) dermatologji
- E) mjekesi ligjore

Pyetja 141

Si quhet nje ankth i forte refraktar dhe i pamotivuar nga rrethanat, veprimet dhe objektet?

- A) frike
- B) fobi
- C) obsesion
- D) pseudo-halucinacion
- E) delirium

Pyetja 142

Medikamentet antidepresive:

- A) veprojne ne membranen e neuroneve pre- dhe post-sinaptike
- B) veprojne ne nivel intraqelizor
- C) lidhen me monoaminat ne hapesiren inter-sinaptike
- D) veprojne si endorfinat
- E) asnje nga pergjigjet e mesiperme

Pyetja 143

Karbonati i litiumit eshte medikamenti i zgjedhur ne trajtimin e:

- A) komes uremike
- B) atrofise cerbrale
- C) psikozes maniako-depresive
- D) amebiazes hepatike
- E) ulceres duodenale

Pyetja 144

Ankthi tek femijet manifestohet:

- A) ne psikoze
- B) ne neuroze
- C) ne crregullimet e stresit post-traumatik
- D) ne mungese te crregullimeve psikiatrike
- E) ne te gjitha situatat e permendura

Pyetja 145

Cili eshte mekanizmi mbrojtës me i shpeshte ne paranoje?

- A) konversioni
- B) shmangia
- C) projekcioni
- D) supresioni
- E) regresioni

Pyetja 146

Me axhitim nenkuptohet:

- A) nje tremor i pakontrollueshem
- B) nje gjendje e tensionit te forte emocional
- C) nje gjendje shqetesimi psikologjik dhe motor
- D) nje gjendje shoqeruese e skizofrenise
- E) nje gjendje e shkaktuar nga mania

Pyetja 147

Disa antidepressive quhen treciklike sepse:

- A) perdoren ne format ciklike
- B) duhet te administrohen ne tre cikle te njepasnjeshme
- C) nga karakteristikat e struktures kimike
- D) i eshte dhene atyre nje emer imagjinar
- E) jane zbuluar ne ciklin e trete te periudhes psiko-farmakologjike

Pyetja 148

Delirium tremens:

- A) behet fjale per nje manifestim paroksistik te alkoolizmit akut
- B) shoqerohet me polineuropati ne anesite e poshtme
- C) shoqerohet me nje encefalopati porta-cava
- D) behet fjale per nje manifestim paroksistik te alkoolizmit kronik
- E) behet fjale per nje semundje aktualisht teper te perhapur

Pyetja 149

Deliri eshte:

- A) gjithnje i fragmentuar dhe bizzar

- B) nje crregullim te formes se mendimit
- C) nje crregullim i permbajtjes se mendimit
- D) gjithnje i organizuar dhe i mire-strukturuar
- E) nje crregullim i perceptimit

Pyetja 150

Cili eshte efekti anesor endokrin me i shpeshte i medikamenteve anti-psikotike?

- A) hipertiroidizmi
- B) dekomensimi i diabetit
- C) hypogonadotropizmi
- D) hypopituitarizmi
- E) hiperprolaktinemia

Pyetja 151

Konfabulacioni eshte nje simptom karakteristik per:

- A) gjendjen maniakale
- B) sindromin afazik
- C) sindromin Korsakov
- D) delirin mistik
- E) neurozen obsesive

Pyetja 152

Pavetedija kolektive eshte formuluar nga:

- A) Jung
- B) Mead
- C) Freud
- D) Kardiner
- E) Ey

Pyetja 153

Vuajtja melankolike eshte:

- A) gjithnje e patrajtuar
- B) me intensive gjate pasdites
- C) me intensive gjate nates
- D) ne dite te alternuara
- E) me intensive gjate mengjesit

Pyetja 154

Me "kujdestari" nenkuptohet:

- A) marrja ne ngarkim totalisht nga ekipi mjekesor i jetes se pacientit

- B) marrja ne ngarkim e pergjegjesise se trajtimit dhe perditesimit te strategjise terapeutike
- C) sherimi i pacientit ne nje strukture te mbrojtur
- D) marrja ne ngarkim e problemeve familjare
- E) marrja ne ngarkim e problemeve sociale

Pyetja 155

Heqja e imobilizimit fizik duhet te ndodhe :

- A) ne vijim te nje observacioni infermieristik
- B) pas nje rekomandimi mjekesor
- C) nen indikacionin e koordinatorin
- D) pas nderhyrjes se Drejtorit te Pergjithshem
- E) pas nderhyrjes se gjykatesit

Pyetja 156

Nje mimike diskordante me fjalet dhe rrethanen ne te cilen ndodhet nje person eshte karakteristike e:

- A) histerise
- B) demences
- C) manise
- D) skizofrenise
- E) melankolise

Pyetja 157

Sjelljet obsesive jane:

- A) qendrimet e perseritura per te sulmuar personat perreth
- B) halucinacione rekurente auditive me aspekt ritual
- C) stereotipi pa fund
- D) sjellje anormale, rituale te perseritura ne mbrojtje te obsesionit dhe te ankthit
- E) rituale te sjelljes seksuale

Pyetja 158

Abstinenca eshte:

- A) dëshire e pakontrollueshme me dëshirën e vetme për të konsumuar alkool
- B) nevoja për të shtuar përdorimin e alkoolit për të kënaqur dëshirën
- C) shfaqja e tremorit, takikardisë, ankthit, djersitjes pas një periudhe abstinence
- D) një manifestim i vartësisë fizike
- E) një prurit i gjeneralizuar

Pyetja 159

"Fuga ideorum " eshte tipike e:

- A) gjendjes se eksitimit maniakal
- B) gjendjes se eksitimit konfuzional

- C) gjendjes melankolike stuporoze
- D) histerise
- E) hemorragjise subaraknoidale

Pyetja 160

Mendimi ne konfuzionin mental eshte:

- A) i kthjellet dhe koherent
- B) inkoherent dhe i fragmentuar
- C) i persheptuar por koherent
- D) e invaduar nga idete obsesive
- E) qartesisht delirante

Pyetja 161

Halucinacionet ne skizofreni jane me shume:

- A) auditive
- B) olfaktive
- C) taktile
- D) vizive
- E) cenestezike

Pyetja 162

Cila nga keto semundje mund te induktoje klinike te ngjashme me skizofrenine?

- A) te gjitha te meposhtmet
- B) tumoret cerebrale
- C) infeksionet cerebrale
- D) semundjet degjenerative
- E) epilepsia

Pyetja 163

Medikamentet psikiatrike mund te japin efekte anesore?

- A) gjithnje, pa marre parasysh tipin dhe dozen
- B) pothuajse kurre
- C) jo, por shpesh minimizohen nga pacientet
- D) po
- E) jo

Pyetja 164

Sherbimi i shendetit mendor komunitar:

- A) ka funksionim autonom dhe kontrolli
- B) nuk ndermerr aktivitet terapeutik
- C) ndermerr aktivitet ambulator, ne shtepi dhe te urgjences psikiatrike
- D) merret vetem me aktivitet ambulator

E) ndermerr detyren e koordinimit me repartet psikiatrike

Pyetja 165

Kujt mund t'i atribuohet shkaku i psikozes konfuzionale?

- A) shkaqeve toksike
- B) nje aspekti reaksional histerik
- C) evolucionit te nje forme depresive
- D) somatizimit te nje gjendjeje te shprehur anksioze
- E) evolucionit te nje forme skizofrenike kronike

Pyetja 166

Perdorimi i mjeteve te imobilizimit fizik eshte i pranueshem:

- A) ne te gjitha rastet nen autoritetin e infermiereve
- B) ne te gjitha rastet nen autoritetin e koordinatorit
- C) ne te gjitha rastet nen rekomandimin mjekesor
- D) kurre
- E) ne asnje nga pergjigjet e permendura

Pyetja 167

Lezionet meningo-encefalike, te marra si shembull pe te demonstruar se semundjet mendore jane shprehje te semundjeve organike te trurit, jane te shkaktuar nga:

- A) sifilizi
- B) lia e dhenge
- C) lepra
- D) arterioskleroza
- E) asnje

Pyetja 168

Ne cilin tip personaliteti takohen instabiliteti afektiv, sjellje te shpeshta autolitike, disforia dhe krizat e instabilitetit dhe terbimit?

- A) borderline
- B) narcistik
- C) kompulsiv
- D) paranoiak
- E) pasiv-agresiv

Pyetja 169

Nje deluzim i mire-organizuar perkufizohet si:

- A) i sistematizuar
- B) i kthjellet
- C) paranoid

- D) sekondar
- E) asnje nga pergjigjet e permendura

Pyetja 170

Autizmi infantil ben pjese ne crregullimet:

- A) pervasive te zhvillimit
- B) e ankthit
- C) te humorit
- D) psikike
- E) te personalitetit

Pyetja 171

Cila nga te meposhtmet nuk eshte nje karakteristike e anoreksise nervoze:

- A) histori e meparshme obeziteti
- B) amenorrea
- C) menjanim social
- D) sjellje auto-ndeshkuese
- E) raport i veshtire me prinderit

Pyetja 172

Cili prej te meposhtmeve eshte tipik per skizofrenise?

- A) perseritja e ideve
- B) fuga e ideve
- C) perceptimi delirant
- D) konfabulacioni
- E) idea obsesive

Pyetja 173

Perjashtimi i personave me probleme te shendetit mendor neper institucione te vecuara nga shoqeria eshte motivuar ne te shkuaren nga:

- A) probleme shendetesore
- B) ndjenja humanitare
- C) problemet sociale
- D) ndjenja religjioze
- E) deshira per sherim

Pyetja 174

Venlafaxina i perket ciles klase te antidepressiveve?

- A) SNRI (serotonine-norepinephrin reuptake inhibitor)
- B) NASSA (noradrenergic and serotonergic specific antidepressiv)
- C) Ticiklike



- D) SSRI (selective serotonin reuptake inhibitor)
- E) NARI (Noradrenaline reuptake inhibitor)

Pyetja 175

Tik-u eshte:

- A) nje levizje koreiforme
- B) nje levizje e pavullnetshme dhe rekurente jo ritmike
- C) nje levizje distonike
- D) nje levizje mioklonike
- E) nje levizje e vullnetshme

Pyetja 176

Si perkufizohet nje teresi idesh te gabuara per shkak te nje alterimi te koshiences nga realiteti?

- A) iluzion
- B) deluzion
- C) gabime gjykimi
- D) dobesi mentale
- E) Mendime te kushtezuara (partikularizem)

Pyetja 177

Si perkufizohet idea qe persiston edhe pse subjekti deshiron ta eleminoje ate?

- A) ide obsesive
- B) ide prevalente
- C) ide te vecanta
- D) ide inkoherente
- E) ide delirante

Pyetja 178

Ne anoreksine nervore takohet:

- A) Amenorrea
- B) frika per t'u shendoshur
- C) te vjella te auto-induktuara
- D) reduktim i konsumimit te ushqimit
- E) te gjitha pergjigjet e permendura

Pyetja 179

Forma me e shpeshte e "demences" sekondare eshte ajo e induktuar nga:

- A) leukodistrofia cerebrale
- B) panencefaliti subakut sklerotizant
- C) reduktimi difuz senil i parenkimes cerebrale
- D) demtimi encefalik nga arteriopatia kronike

E) semundja Wilson

Pyetja 180

Cfare nenkupton rehabilitimi psikosocial?

- A) trajnimi per ekzekutimin korrekt te detyrave praktike
- B) zgjidhja e simptomave produktive
- C) fitimi i cilesive komportamentale me theks te vecante ndaj aftesive relacionale e te socializimit
- D) zgjidhja e simptomave negative
- E) te gjitha pergjigjet e mesiperme

Pyetja 181

Ne paranoje takohet:

- A) deluzioni i sistematizuar
- B) asnje deluzion
- C) nje perzierje e deluzioneve te sistemuar me ato konfuze
- D) deluzioni i meritjes
- E) deluzioni i varferise

Pyetja 182

Kufiri i maksimal i pademshem i konsumimit te pijeve alkoolike eshte:

- A) 40 gr/dite per meshkujt dhe 20 gr/dite per femrat
- B) 20 gr/dite per meshkujt dhe 10 gr/dite per femrat
- C) 50 gr/dite per meshkujt dhe 30 gr/dite per femrat
- D) 80 gr/dite per meshkujt dhe 60 gr/dite per femrat
- E) 100 gr/dite per meshkujt dhe 80 gr/dite per femrat

Pyetja 183

Per sa kohe mund te qendroje nje pacient i shtruar jashte vullnetit te tij ne nje institucion psikiatrik me vendim vetem te mjekeve:

- A) deri sa te permiresohet dhe te jape miratimin
- B) 24 ore
- C) 72 ore
- D) aq sa i duhet gjendjes shendetesore
- E) 3 muaj

Pyetja 184

Cfare eshte terapia familjare?

- A) eshte nje psikoterapi qe nderhyn ne komunikimin e familjes, e kuptuar si "sistem" qe ka si objektiv ndryshimin e modeleve te komunikimit
- B) eshte nje terapi qe niset nga presupozimi se pergjegjesia e vuajtjes eshte e familjareve dhe jo e pacienteve

- C) është një terapi që propozon, si objektiv integrimin e pacientit në një shtepi familjare
- D) është një tip i terapise psikoanalitike
- E) është një formë e terapise që shoqëron terapine relacionale me ato psikoanalitike

Pyetja 185

Karakteri i pacientit:

- A) është një parameter i ekzaminimit psikik
- B) influencon në vlerësimin psikik
- C) varion sipas klases shoqërore
- D) është i lidhur vetëm me të veshurin
- E) asnjë nga përgjigjet e mësipërme

Pyetja 186

Si do të duhej të ishte permanenca e një të shtruarit në struktura rezidenciale?

- A) me kohezgjatje të shkurtra dhe për të përballuar periudhën e krizës
- B) me afat të paracaktuar dhe të drejtuar në realizimin e objektivave të riintegritimit shoqëror
- C) me afat të pacaktuar me qëllim mbrojtjen e pacientit nga presionet e mjedisit
- D) me afat të pacaktuar për problemin e asistencës
- E) asnjë nga përgjigjet e mësipërme

Pyetja 187

Një fobi është:

- A) një simptomë ankthi që manifestohet duke nisur nga adoleshenca
- B) ankthi klinikisht i rëndësishëm e provokuar nga ekspozimi ndaj një objekti apo një rrethë të caktuar
- C) një levizje perseritese që shoqërohet me ankth
- D) impulsi për të evituar një objekt që shkakton ankth
- E) bindja e pajustificuar që është kontaminuar nga një sëmundje

Pyetja 188

Impulset patologjike janë:

- A) impulset agresive të drejtuar nga shkatërimi i të gjitha objekteve rrethuese
- B) impulset masturbuese
- C) reaksionet ankioze me tendencë shmangien
- D) impulset e tipit obsesiv kontradiktore
- E) impulset me sfond mistik të bazuar në bashkëpunimin me hyjnitë

Pyetja 189

Trajtimi shëndetësor i detyrueshëm është një vendim :

- A) i leshuar nga kryetari i bashkisë mbi bazën e certifikimeve medikale
- B) i leshuar nga një mjek territori

- C) i leshuar nga nje mjek territori dhe nga nje mjek tjeter spitalor
- D) i leshuar nga kryetari i bashkise
- E) i leshuar nga gjykatesi

Pyetja 190

Gjate nje nje bashkebisedimi me pacientin psikiatrik duhet :

- A) te analizohen pyetjet
- B) te privilegjohet komunikimi direkt
- C) te sigurohet gjithnje pacienti
- D) te mbahet distance
- E) te gjykohej pacienti

Pyetja 191

Cili nga me poshte eshte efekti anesor me i shpeshte i antidepressive triciklike ?

- A) shtimi ne peshe
- B) crregullime te ciklit kardiak
- C) reduktimi i pragut konvulsiv
- D) efekte muskarinike (tharje mukozale, retension urinar)
- E) te gjitha pergjigjet e mesiperme

Pyetja 192

Crregullimet e personalitetit:

- A) jane crregullime me alterime te shprehura te sjelljes
- B) jane te koduar ne aksin II te ICD-10
- C) jane crregullime te sferes psikotike
- D) jane gjithnje te shoqeruara nga crregullime te perceptimit
- E) asnje nga pergjigjet e mesiperme

Pyetja 193

Mania eshte:

- A) crregullim i te menduarit
- B) nje forme skizofrenie
- C) nje crregullim i humorit
- D) nje qendrim provokator i pacientit
- E) nje crregullim i perceptimit

Pyetja 194

Kufizimi Fizik mund te kryhet:

- A) vetem nga policia
- B) i rekomanduar nga nje mjek ose infermier
- C) vetem ne kushte spitalore
- D) nga familjaret
- E) asnje nga te mesipermet

Pyetja 195

Vonesa mendore eshte:

- A) nje situatë disavantazhi socio-kulturor
- B) nje dobësim intelektual mbi baze emotive
- C) nje reduktim i rëndësishëm i efikasitetit intelektual me rregullime të sjelljes adaptive
- D) nje sëmundje gjenetike
- E) nje situatë e frenimit intelektual

Pyetja 196

Depresioni eshte:

- A) nje rregullim i humorit
- B) nje rregullim ekskluziv i natyrës psikotike
- C) nje alterim i gjendjes së koshijes
- D) nje rritje e tonusit të humorit
- E) nje rregullim i perceptimit

Pyetja 197

Cila nga gjendjet e mëposhtme është e karakterizuar nga dizorientimi temporo-spaciale?

- A) gjendja krepuskulare
- B) alienizimi
- C) rregullimi deluzional
- D) neuroze obsesive kompulsive
- E) asnjë nga përçigjet e përmendura

Pyetja 198

Cili nga organet e mëposhtme rezulton lehtësisht me i prekuri nga proceset psikosomatike?

- A) colon
- B) veshi i mesëm
- C) veshkat
- D) hepari
- E) testikuli

Pyetja 199

Lobet temporale cerebrale përpunojnë:

- A) njohjen vizive
- B) perceptimin auditiv
- C) memorjen
- D) afeksionin
- E) të gjitha

Pyetja 200

Eshtë një formë idiopatike e cefale-së:

- A) cefalea nga monoksidi i carbonit
- B) cluster headache
- C) cefalea nga hiperpireksia (febrile)
- D) cefalea nga abuzimi me medikamente
- E) asnjëra

Pyetja 201

Prekja e sistemit nervor periferik në terren të AIDS (SID

A) karakterizohet nga shfaqja e:

- A) neuropatisë demielinizante akute, e tipit Guillain-Barre
- B) neuropatisë sensitive distale simetrike, me disestezi doloroze
- C) neuropatisë autonome
- D) multineuropatisë kraniale, radikulopatisë progresive doloroze me çrregullime sfinkteriane
- E) të gjitha

Pyetja 202

Të gjitha pohimet e mëposhtme në lidhje me një episod migrene janë të gabuara përveç:

- A) zakonisht fillojnë papritur
- B) mund të zgjasë me javë
- C) shpesh paraprihet nga skotoma
- D) shoqërohet me spazma të masseterit
- E) Campylobacter jejuni

Pyetja 203

Në afazinë Wernicke:

- A) të folurit nuk është fluent
- B) pacienti është i pavetëdijshëm për atë që e rrethon
- C) të folurit është i pakuptueshëm
- D) është i pranishëm fenomeni i agramatizmit
- E) të gjitha

Pyetja 204

Terapia anti-agregante është e indikuar:

- A) në parandalimin sekondar të ishemisë cerebrale
- B) në hemorragjinë subaraknoidale
- C) në të gjithë subjektet mbi 50 vjeç, edhe pse në mungesë të faktorëve të riskut vaskular
- D) në parandalimin sekondar të hemorragjisë cerebrale intraparenkimale
- E) asnjëra

Pyetja 205

Hemtomielia ndodh më shpesh në ecurinë e një:

- A) diskrazie hematologjike

- B) rupturë të një malformacioni arterio-venoz
- C) rupturë e një arterieje arteriosklerotike
- D) traumë
- E) asnjëra

Pyetja 206

Një pacienti me krizë epileptike toniko-klonike duhet:

- A) t'i bllokohen lëvizjet duke e imobilizuar atë
- B) t'i vendoset diçka midis dhëmbëve për të parandaluar dëmtime të gjuhës
- C) të pritët përfundimi i krizës dhe më pas të vendoset në pozicion të sigurtë
- D) t'i inspektohet kaviteti i gojës me gishta, nga e djathta në të majtë, për të eliminuar trupa të huaj eventuale
- E) të gjitha

Pyetja 207

Shkaku më i shpeshtë i paralizës akute bilaterale të nervit të VII-të kraniale është:

- A) paraliza e Bell
- B) infeksioni nga HIV
- C) sindromi i Guillan-Barre
- D) neuroborreliozë
- E) paraliza e Bell dhe sindromi i Guillan-Barre

Pyetja 208

Në sferën cerebro-vaskulare, ekzaminimi i lëngut cerebro-spinal mund të përbëjë një mjet mbështetës diagnostik:

- A) në trombozën e bazilare
- B) në hemorragjinë sub-araknoidale
- C) në disekimin karotien ose vertebral
- D) asnjëra
- E) asnjëra

Pyetja 209

Simptomat neurologjike të hiperparatiroidizmit mund të jenë:

- A) hiperaktiviteti
- B) dizorientimi temporo-spacial
- C) letargjia
- D) amnezia
- E) të gjitha

## **06.Obstetrikë-Gjinekologji**

Pyetja 1

Zgjidhni testin më të mirë të screening diagnostik për zbulimin e diagnozës së anemisë falciforme të fetusit:

- A) kultura e qelizave të likidit amniotik

- B) ekografia
- C) alfafetoproteina e likidit amniotik
- D) përqendrimi kimik i urines materne
- E) kampionet e gjakut fetal

Pyetja 2

Një grua 32-vjeçare me anamneze për infertilitet prej 4 vitesh është inductuar që të ovulojë me klomifen. Pas 16 javësh gestacioni është vënë re se fundi i uterusit ndodhet në nivelin e umbilikut.

Një ekografi ka treguar një gravidancë binjakësh në dy s

- A) infeksion të rrugëve urinare
- B) moniliaze vaginale
- C) diabet gestacional
- D) nivele materne të ulëta të alfa-fetoproteines serike
- E) hipertension të inductuar nga gestacioni

Pyetja 3

Incidenca e ciles prej patologjive të mëposhtme bëhet më e shpeshta pas menopauzes?

- A) tumoret fibroide
- B) adenomioza
- C) endometrioza
- D) kistët e korpusit luteal
- E) relaksimi pelvik

Pyetja 4

Kundraindikacion për përdorimin e pilulës anticoncepcion është:

- A) endometrioza
- B) mastopatia fibrokistike
- C) karcinoma mamare e operuar prej më shumë se 3 vitesh
- D) kisti ovarian seroz
- E) nulipariteti

Pyetja 5

Në ekzaminimin mikroskopik të një sekrecioni uretral, neisseria gonorreae paraqitet si:

- A) streptokok grampozitiv jashtëqelizor
- B) diplokok grampozitiv jashtëqelizor
- C) diplokok gramnegativ jashtëqelizor
- D) diplokok gramnegativ brendaqelizor
- E) diplokok grampozitiv brendaqelizor

Pyetja 6

Gjatë vlerësimit për infertilitet të një gruaje 25-vjeçare, kryhet një histerosalpingografi që tregon shenja të sindromës Asherman. Cilën prej simptomave të mëposhtme priten të verëhen të kjo paciente:

- A) dismenorre
- B) menorragji
- C) hipomenorre
- D) metrorragji



E) oligomenorre

Pyetja 7

Cili prej tumoreve malinjë të mëposhtëm jep më shpesh metastaza në placente dhe në fetus?

- A) karcinoma e cerviksit
- B) leucemia
- C) karcinoma mamare
- D) melanoma
- E) karcinoma uterine

Pyetja 8

Rritja fiziologjike e VES gjatë gravidancës shkaktohet nga:

- A) reduktimi i gamaglobulinave
- B) rritja e betaglobulinave
- C) rritja e transferrinës
- D) rritja e fibrinogjenit plazmatik
- E) rritja e prolaktinës

Pyetja 9

Gjatë procesit të lindjes thuhet se dilatacioni i qafës së uterusit është i plotë kur arrijnë permasën:

- A) 2-3 cm
- B) 6 cm
- C) 5 cm
- D) 12 cm
- E) 10 cm

Pyetja 10

Në cilën ditë arrijnë LH nivelin më të lartë të një gruaje që normalisht ka menstruacione çdo 30 ditë?

- A) ditën e 12-të
- B) ditën e 16-të
- C) ditën e 14-të
- D) ditën e 18-të
- E) ditën e 27-të

Pyetja 11

Cila prej patologjive të mëposhtme është shkak më i mundshëm i gjakrrjedhjes uterine disfunktionale të një gruaje 28-vjeçare me ekzaminim objektiv negativ dhe pa asnjë problem tjetër?

- A) karcinoma vagjinale me qeliza skuamoze
- B) kondiloma lato
- C) kondiloma akuminata
- D) kankroidi
- E) herpesi gjenital

Pyetja 12

Me termin ektropion kuptohet:

- A) një eversion i mukozes endocervikale
- B) një lezion inflamator i cerviksit
- C) një prolaps i uterusit
- D) prania e endometrit ne lokalizim ektopik
- E) një fistule rekto-vaginale

Pyetja 13

Cila klase e Ig mbizoteron ne kulloshter:

- A) IgM
- B) IgA
- C) IgG
- D) IgD
- E) IgE

Pyetja 14

Cila prej te mëposhtmeve nuk është shkak i lubrifikimit vaginal te reduktuar:

- A) menopauza
- B) sindroma Cushing
- C) sindroma Sjögren
- D) skleroza multiple
- E) hipotiroidizmi

Pyetja 15

Cili është medikamenti me i pershtatshem per terapine e haemophilus vaginalis:

- A) sulfisoksazoli
- B) mikonazoli
- C) dienestrolit
- D) metronidazoli
- E) deosiciklina

Pyetja 16

Placente previa quhet:

- A) shkolitja e placentes ne muajin e gjashte
- B) placenta e primipareve
- C) placenta qe nxirret perpara fetusit
- D) placenta e inseruar pjeserisht ose totalisht ne segmentin uterin inferior
- E) është një term obsolet qe nuk ka domethenie klinike

Pyetja 17

Trajtimi elektiv i prezantimit me shpatull është:

- A) oksitocine me doze te larte
- B) ventuza obstetrike
- C) sectio cesareo
- D) forcepsi
- E) nuk është i nevojshem asnjë intervent sepse është një prezantim fiziologjik

Pyetja 18

Cili prej te mëposhtmeve nuk është shkak amenorreje:

- A) diabeti mellitus
- B) sindroma Turner
- C) sindroma e ovarit polikistik
- D) hiperplazia surrenaliene kongjenitale
- E) hiperprolaktinemia

Pyetja 19

Një grua e prekur nga endometrioza mund te kete te tera ankesat e mëposhtme, perveç se:

- A) dispareuni
- B) sterilitet
- C) dhembje gjate defekimit
- D) mastodini
- E) dhembje abdominale periodike

Pyetja 20

Cili është termi me i pershtatshem per te treguar humbjen fillimisht hematike, e me pas seroze, qe është karakteristike per puerperen:

- A) menorragjia
- B) lokiacioni
- C) menometrorragjia
- D) metrorragjia
- E) eklampsia

Pyetja 21

Endrometrioza mund te provokojë:

- A) inkontinence
- B) amenorre
- C) leukorre
- D) anemi
- E) dispareuni

Pyetja 22

Cili prej prezantimeve fetale te mëposhtme nuk lejon lindjen spontane nese fetusi është zhvilluar normalisht ne terme:

- A) prezantimi me bregme
- B) prezantimi frontal
- C) prezantimi podalik
- D) prezantimi me fytyre
- E) prezantimi me verteks

Pyetja 23

Anomalia kromozomike qe ndeshet me shpesh gjate aborteve ne trimestrin e pare është:

- A) sindroma Turner

- B) trizomia autozomike
- C) monozomia autozomale
- D) poliploidia
- E) translokimi i pabilancuar

Pyetja 24

Per Cilën prej sëmundjeve kromozomike të mëposhtme është karakteristik pterigium colli:

- A) sindroma Down
- B) sindroma Turner
- C) sindroma Klinefelter
- D) sindroma Patau
- E) sindroma cri du chat

Pyetja 25

Shkaku më i shpësthtë i ambiguitetit gjenital të femijëve është:

- A) mosndarja kromozomike
- B) sindroma andrenogjenitale
- C) disgenezia gonadike
- D) mozaicizmi
- E) feminilizimi testikular

Pyetja 26

Te tërë simptomat e mëposhtme tregojnë vdekje fetale intrauterine, me përjashtim të njëjës:

- A) mungesa e ndjerjes së levizjeve fetale aktive nga nëna
- B) rritja e peshës maternë
- C) mungesa e rritjes së vëllimit të uterusit
- D) regresioni i simptomave të gravidancës
- E) mungesa e rrahjes kardiake fetale gjatë ekzaminimit ekografik

Pyetja 27

Lokalizimi më i shpeshtë i endometriozës është:

- A) sipërfaqja peritoneale e zorrës së hollë
- B) omentumi
- C) peritoneumi i zonës Douglas
- D) vezika urinare
- E) apendiksi

Pyetja 28

Cili është shkaku më i shpësthtë i sterilitetit femeror:

- A) kongjenital
- B) tubarik
- C) uterin
- D) hormonal (anovulacioni)
- E) vaginal

Pyetja 29

Një vajzë 18-vjeçare në javën e 8-të të shtatzënisë, ankohet për nauze dhe të vjellat të përditshme gjatë javës së fundit. Nauzeja dhe të vjellat janë simptoma të shpeshta të fazës fillestare të shtatzënisë. Cili prej problemeve të mëposhtme do të tregonte më së shumti për këtë gjendje?

- A) hipotiroidizmi
- B) shtimi në peshë
- C) hipokalemi
- D) proteinuria
- E) diarrea

Pyetja 30

Të tëra patologjitë e mëposhtme shoqërohen me rritje të nivelit të prolaktinës në qarkullim, me përjashtim të:

- A) stresit
- B) hipotiroidizmit
- C) shtatzënisë
- D) akromegalisë
- E) anoreksisë nervore

Pyetja 31

Ndarja e dytë maturuese e ovocitit ndodh:

- A) në uterus
- B) në tubë
- C) në peritoneum
- D) në vaginë
- E) në vezore

Pyetja 32

Cili është tumori më i mundshëm në prani të niveleve të larta të beta HCG:

- A) tumori i sinusit endodermal
- B) tumori i granulozës-tekës së vezores
- C) kistadenokarcinoma seroze
- D) koriokarcinoma
- E) tumori i qelizave Sertoli-Leydig

Pyetja 33

Hemopoieza ekstramedulare është shumë e zakonshme në fetusin human. Cili është lokalizimi më i rëndësishëm i hemopoiezes në muajin e tetë të shtatzënisë:

- A) sakusi vitelin
- B) shpretka
- C) melçia
- D) palca e kockave
- E) limfonodujt

Pyetja 34

Sindroma Klinefelter karakterizohet nga modeli kromozomik anormal:

- A) XO
- B) trizomia e kromozomit 15
- C) XXY
- D) delecioni i krahut te shkurter te kromozomit 18
- E) XYY

Pyetja 35

Cili është medikamenti me i pershtatshem per trajtimin e një vaginiti te shkaktuar nga moniliaza:

- A) metronidazoli
- B) dienestrolit
- C) mikonazoli
- D) sulfisoksazoli
- E) deoksiciklina

Pyetja 36

Shkaku me i shpështë i deshtimit te kontraceptiveve orale, qe si pasoje shkakton një shtatzeni te padeshiruar, është:

- A) perdorimi i pasakte i kontraceptiveve orale
- B) frekuenca e marredhenieve seksuale
- C) ovulacioni qe fillon ne mes te ciklit
- D) keqperthithja gastrointestinale
- E) krijimi i antitropave

Pyetja 37

Te tera patologjite e mëposhtme shoqerohen me defekte te septumit interventrikular, me perjashtim te:

- A) sindromes fetu-alkoolike
- B) tetralogjise Fallot
- C) infeksionet intrauterine TORCH
- D) sindromes Down
- E) duhanpirjes gjate shtatzenise

Pyetja 38

Gjate vleresimit te një amenorreje dytesore te një grua 24-vjeçare diagnostikohet hiperprolaktinemia. Cila prej problemeve te mëposhtme mund te rrise perqendrimin e prolaktines ne qarkullim dhe amenorrene te kjo paciente:

- A) hiperplazia kongjenitale e surrenaleve
- B) hipertiroidizmi paresor
- C) anoreksia nervore
- D) stresi
- E) semundja e ovarit polikistik

Pyetja 39

Cili është risku i zhvillimit te një rritjeje dhe zhvillimi jonormal te fetusit pas kryerjes se amniocentezes:

- A) 5%

- B) 3.5%
- C) 0%
- D) 10%
- E) 25%

Pyetja 40

Cili prej trajtimeve te mëposhtme duhet të përdoret rutine per trajtimin e preeklampsise:

- A) sulfati i magnezit
- B) kufizimi i perdorimit te natriumit
- C) propanololi
- D) diuretiket
- E) deambulimi

Pyetja 41

Shkaku me i shpështë i inkontinences urinare te një paciente ne menopauze është:

- A) inkontinenca urinare nga stresi
- B) prania e divertikujve uretrale
- C) vezika e paqendrueshme
- D) inkontinenca nga grumbullimi i urines
- E) fistula

Pyetja 42

Shkaku me i shpështë i abdomenit akut ne periudhen puerperale është:

- A) volvulusi
- B) apendisiti
- C) sepsisi puerperal
- D) divertikuli i Meckel
- E) kolecistiti

Pyetja 43

Cila prej substancave te marra nga nena gjate shtatzenise shoqerohet me anomali fetale dhe neonatale me demtime vaskulare:

- A) duhani
- B) alkooli
- C) kokaina
- D) anfetaminat
- E) substancat narkotike

Pyetja 44

Defekti me i shpështë ne sindrome adrenogjenitale është:

- A) deficioni i 21-hidroksilazes
- B) deficioni i 11-hidroksilazes
- C) deficioni i 17-hidroksilazes
- D) idiopatik
- E) deficioni i 3 $\beta$ -dehidrogjenazes

Pyetja 45

Te tera medikamentet e mëposhtme shoqerohen me anomali fetale kongjenitale, me perjashtim te njeres:

- A) tetraciklina
- B) talidomidi
- C) sulfamidet
- D) litiumi
- E) kumarina

Pyetja 46

Plakja gjenitale femerore:

- A) mund te shkaktojne involucion deri ne 50% te muskulatures se lemuar te trupave kavernoze
- B) ekzalton kapacitetin orgazmik te gruas
- C) nuk modifikon kapacitetin orgazmik te gruas
- D) perkeqesohet nga mungesa e hormoneve te tiroides
- E) pershpejtohet nga dietat drastike

Pyetja 47

Cili prej tumoreve te mëposhtëm është përgjegjës për numrin më të madh të vdekjeve në vit:

- A) pulmonar
- B) mamar
- C) endometrial
- D) intestinal (koloni)
- E) cervikal

Pyetja 48

Terapia e rrezikut të abortit bazohet normalisht mbi përdorimin e terapive të mëposhtme, me përjashtim të:

- A) progesteronikeve
- B) antibiotikoterapise
- C) beta-stimulueseve
- D) antispastikeve
- E) regjimit të shtratit

Pyetja 49

Cila prej ekzaminimeve diagnostike të mëposhtme është më e besueshme për diagnostikimin e gravidancës ektopike:

- A) kuldocenteza
- B) biospia endometriale
- C) roentgenografia direkte e rajonit pelvik
- D) dozimet seriale të hCG
- E) laparoscopia

Pyetja 50



Nivelet materne jonormale te alfafetoproteines lidhen me te tera patologjite e mëposhtme, me perjashtim te:

- A) sëmundjes hepatike materne
- B) gravidances multiple
- C) vdekjes fetale intrauterine
- D) hidrocefalise fetale
- E) nefrozes kongjenitale fetale

Pyetja 51

Një grua 30-vjeçare shkon te mjeku pasi ka frike se mos zhvillon një neoplazi ovariane. Gjyshja e saj 70-vjeçare ka vdekur gjate koheve te fundit si pasoje e një karcinome ovariane. Diskutohen faktoret e riskut dhe parandalimin e neoplazise se ovarit.

- A) menopauza pas moshes 55-vjeçare
- B) perdorimi i një terapie te kombinuar me kontraceptive orale
- C) perdorimi i medikamenteve antiinflamatore josteroide
- D) nullipariteti
- E) perdorimi i medikamenteve qe induktojne ovulacionin

Pyetja 52

Te tera vlerat e mëposhtme fiziologjike ose laboratorike reduktohen ne trimestrin e dyte te një shtatzenie normale, me perjashtim te:

- A) frekuences kardiake
- B) shpejtesise se eritrosedimentimit
- C) hematokritit
- D) natremise
- E) vellimit respirator te imet

Pyetja 53

Trajtimi i hipertensionit gestacional kryhet me te tera terapite e mëposhtme, me perjashtim te njerit:

- A) antagonisteve te kalciumit
- B) antikonvulsivanteve
- C) diuretikeve
- D) sulfatit te magnezit
- E) induktimit te lindjes ose sectio cesareo

Pyetja 54

Cila është simptoma specifike e periudhes klimaterike:

- A) renia ne peshe
- B) pagjumesia
- C) djersitjet nokturne
- D) frakturat
- E) rritja ne peshe

Pyetja 55

Te tera prezantimet e mëposhtme janë prezantime cefalike, me perjashtim te prezantimit me:

- A) verteks
- B) bregme
- C) akromion
- D) balle
- E) fytyre

Pyetja 56

Pasi te jete identifikuar një fetus ne risk ne një shtatzeni qe e ka kaluar termen, trajtimi me i sakte është:

- A) amniocenteza per vleresimin e pjekurise pulmonare
- B) perseritja e vleresimit te mirëqenies fetale pas një jave
- C) vleresimi i pH nga skalpi fetal
- D) matja e somatomotropines korionike humane
- E) lindja, pavaresisht nga gjendja e cerviksit

Pyetja 57

Te një grua shtatzene, diagnoza e hepatitit mund te vertetohet nga prania e nivelit te rritur te:

- A) VES
- B) SGOT
- C) leukocitozes
- D) fosfatazes alkaline
- E) BUN

Pyetja 58

Cila prej pohimeve te mëposhtme mbi leiomimat uterine është e sakte:

- A) kanë prirje te regredojne gjate shtatzenise
- B) transformimi malinj ndodh ne rreth 20% te rasteve
- C) janë indikacioni me i shpështë per kryerjen e histerektomise
- D) nuk shkaktojne infertilitet
- E) kontraceptivet orale perfaqesojne linjen e pare te trajtimit per reduktimin e madhesis se tyre

Pyetja 59

Cila prej te mëposhtmeve nuk është karakteristike e hiperemesis gravidarum:

- A) hipokalemia
- B) acidoza metabolike
- C) këtonemia
- D) nauzeja dhe te vjellat
- E) renia ne peshe

Pyetja 60

Një grua ka nauze dhe te vjella te patrajtueshme gjate trimestrit te pare te shtatzenise, qe shkakton renie te lehte ne peshe dhe kerkon një shtrim ne spital per shkak te anomalive elektrolitike dhe te paaftesise per ta mbajtur ushqimin. Cili prej pohimev

- A) gruaja është mbi 35 vjeç
- B) gruaja ka shumë probleme te tjera sociale
- C) gruaja ka fëmijëte tjere

- D) gruaja nuk i pergjigjet kriterëve të ngushta të hiperemesis gravidarum
- E) gruaja ka koriokarcinome malinje

Pyetja 61

Një primigravide 24-vjeçare, shtatzene me 2 binjake në javën e 11-të të shtatzënise, ankohet për nauze dhe të vjella me intensitet modest, që janë më të forta në mëngjes. Ka tentuar terapi jofarmakologjike, të cilat kanë pasur efikasitet të pakët. Ka tëntu

- A) trombocitopeni
- B) alkalozë
- C) anemi
- D) hiperkalemi
- E) reaksion leukomoid

Pyetja 62

Shtimi mesatar matern në peshë gjatë shtatzënise fiziologjike është:

- A) 12.5 kg
- B) 6 kg
- C) 8.0 kg
- D) 20 kg
- E) 16 kg

Pyetja 63

Për Cilënprij sëmundjeve të mëposhtme është karakteristik transformimi mikropolikistik i vezores:

- A) sindroma Morris
- B) sëmundja Stein-Leventhal
- C) skleroza tuberoze
- D) sëmundja Turner
- E) pseudohermafroditizmi femëror

Pyetja 64

Një gruaje 27-vjeçare i është marrë gjak në javën e 16-të të shtatzënise. Gjaku dërgohet për kontroll të alfa-fetoproteines në gjakun matern. Rezulton një nivel i ulët pozitiv. Me Cilënprij diagnozave të mëposhtme lidhet ky rezultat:

- A) spina bifida
- B) anencefali
- C) trimozia e kromozomit 21
- D) 45X
- E) omfalocela

Pyetja 65

Ndodhja e ciklit menstrual varet nga:

- A) sekretimi i prolaktines nga hipofiza anteriore
- B) nga sekretimi ovarian i estrogjeneve
- C) nga kohezgjatja e luhatshme e fazës folikulare
- D) nga sinteza e progesteronit në korpus luteum
- E) sekretimi pulsues i hormonit stimulues të sekretimit të gonadotropinave (GnRH)

Pyetja 66

Cili është medikamenti me i pershtatshem per një vaginit nga trikomonasi:

- A) dienestrol
- B) mikonazoli
- C) metronidazoli
- D) sulfisoksazoli
- E) deoksiciklina

Pyetja 67

Një grua 25-vjeçare, primipare ne javen e 13-te te shtatzenise, ankohet per hemorragji vaginale. Gjate ekzaminimit objektiv ka një presion arterial 160/95 mmHg, proteinuri 3+ dhe një fundus uteri ne nivelin e umbilikusit. Cila prej te mëposhtmeve është di

- A) diabet gestacional
- B) gravidanza gemelare
- C) gravidance molare
- D) abort i paevitueshem
- E) anencefali fetale

Pyetja 68

Maturimi i spermatozoideve ndodh ne:

- A) tubujt seminifere
- B) epididimus
- C) kanal in vaginal
- D) duktusin deferent
- E) kontakt me ovocitin

Pyetja 69

Rruga me e shpështë e difuzionit te neoplazive ovariane është/janë:

- A) diseminimi endoperitoneal
- B) enet limfatike te venes ovariane
- C) enet limfatike pelvike
- D) ekstensionin lokal
- E) venat ovariane

Pyetja 70

Pilula estro-progestinike vepron kryesisht (me qellim kontrceptiv) ne:

- A) vezore
- B) tube
- C) collus uteri
- D) hipofize
- E) mbiveshkore

Pyetja 71

Te tera pohimet e mëposhtme mbi karcinomen in situ te cerviksit janë te sakta me perjashtim te njerës:

- A) ka prekje te te tere trashesise se epitelit skuamoz
- B) ka shenjë per invazion stromal
- C) ka qeliza qe ngjasojne me ato te një karcinome invazive
- D) ka humbje te plote te stratifikimit
- E) ka regresioni dhe zhdukje okazionale

Pyetja 72

Metoda me e mirë per te identifikuar placenten previa është:

- A) arteriografia selektive e arterieve uterine
- B) amniografia
- C) ekzaminimi gjinekologjik
- D) ekografia
- E) radiografia e pelvisit

Pyetja 73

Çrregullimet neurologjike, alterimet okulare, hidrocefalia dhe kalcifikimet cerebrale karakterizojne formen kongjenitale te:

- A) gonorrese
- B) leishmaniozes
- C) sëmundjes nga citomegalovirusi
- D) sifilizit
- E) toksoplazmozes

Pyetja 74

Cila prej karakteristikave te mëposhtme nuk është element i treguesit te Apgar:

- A) ngjyra e lekures
- B) tonusi muskolor
- C) impenjimi respirator
- D) frekuenca kardiake
- E) temperatura trupore

Pyetja 75

Hormoni hipokalcemiant është:

- A) MSH
- B) parathormoni
- C) kortizoni
- D) TSH
- E) kalcitonina

Pyetja 76

Indikacioni me i rendesishem per kirurgjine rindertuese te uterusit dopio është:

- A) menometrorragjia
- B) dismenorrea
- C) aborti abitual

- D) dispareunia
- E) lindja e parakohshme

Pyetja 77

Cila prej patologjive të mëposhtme shoqërohet më shpesh me oligohidramnios:

- A) anencefalia
- B) atrezia duodenale
- C) hidropsi fetal
- D) agenezia renale
- E) gravidanza multiple

Pyetja 78

Dismenorrea primare shkaktohet nga kontraktimet uterine që lindin nga sekretimi i prostaglandinave në endometër. Masat farmakologjike për kontrollin e dhembjes përfshijnë të tjerë medikamentet e mëposhtme, përveç:

- A) ibuprofenit
- B) bromkriptinës
- C) etenil estradiolit me noretindron
- D) indometacines
- E) acidit mefenamik

Pyetja 79

Përqendrimi i fibrinogjenit në gjakun matern gjatë shtatzënise:

- A) ulet shumë
- B) rritet shumë
- C) mbetet i pandryshuar
- D) ulet në mënyrë të moderuar
- E) rritet në mënyrë të moderuar

Pyetja 80

Çfarë kuptohet me impenjim të pjesës së prezantuar:

- A) koha gjatë së cilës koka e fetusit kalon planin e ngushtices superiore
- B) kalimi i pjesës së prezantuar të ngushtices superiore
- C) kalimi i kokës përtej planit të ngushtices superiore
- D) koha gjatë së cilës ndodh kalimi i perimetrit më të madh të pjesës së prezantuar përmes planit të ngushtices superiore
- E) kalimi i pjesës së prezantuar përtej ngushtices inferiore

Pyetja 81

Një grua 24-vjeçare ka amenorre dytesore dhe një test shtatzënie negativ. Nëse administrimi i progjesteronit nuk provokon gjakosje uterine, cila prej të mëposhtmeve mund të jetë një mundësi e logjikshme diagnostike:

- A) sindroma e ovarit polikistik
- B) gravidanca ektopike
- C) insuficienca ovariane premature
- D) sindroma Turner

E) hipertiroidizmi

Pyetja 82

Çfare është "Testi Post Koital":

A) testi i sieropozitivitetit postkoital

B) percaktimi i perqendrimit te spermatozoideve me levizshmeri lineare normale ne mukusin cervikal postkoital

C) testi i shtatzenise qe kryhet nepermjet vleresimit te niveleve te hCG

D) elektromiografia postorgazmike

E) nuk ekziston

Pyetja 83

Cili hormon stimulon maturimin e folikut ovarian:

A) LH

B) FSH

C) estrogjeni

D) progesteroni

E) testosteroni

Pyetja 84

Çfare është onfalocela:

A) hernie cerebrale

B) hernie krurale

C) hernie inguinale kongjenitale

D) divertikul

E) aplazi e paretit abdominal te rajonit umbilikal

Pyetja 85

Per cilin tumor është me i pershtatshem markuesi serik CA 125:

A) kistadenokarcinomen seroze

B) tumorin e granulozes-tekes se ovarit

C) tumorin e sinusit endometrial

D) tumorin e qelizave Sertoli-Leydig

E) koriokarcinomen

Pyetja 86

Cili është diametri me i madh i kokes se fetusit:

A) diametri biparietal

B) diametri bitemporal

C) diametri verteks-mjeker

D) diametri suboksipito-bregmatik

E) diametri oksipito-frontal

Pyetja 87

Shkaku me i shpështë i vdekjes se grave qe shfaqin eklampsi është:

- A) ruptura e heparit
- B) insuficienca renale akute
- C) embolia pulmonare
- D) hemorragjia cerebrale
- E) shoku septik

Pyetja 88

Te një grua 23-vjeçare e martuar pak kohe me pare është gjetur në mënyrë të përsëritur një presion arterial 145/95 mmHg. Anamneza tregon qe pin një pakete cigare ne dite, por nuk ka anamneze familjare per hipertension. Ekzaminimi objektiv është negativ. Ë

- A) hipertensioni esencial
- B) sindroma Turner
- C) etiologjia jatrogjene
- D) feokromocitoma
- E) hiperplazia fibromuskulore e arteries renale

Pyetja 89

Ne rast perforimi te uterusit gjate ekzaminimit instrumental te kavitetit uterin duhet:

- A) te vazhdohet manovra diagnostike
- B) te vazhdohet me histerektomi te menjehershme
- C) te kryhet një laparotomi eksplorative
- D) te nderpritet ekzaminimi dhe te fillohet terapia antibiotike
- E) te kryhet ekografia urgjente

Pyetja 90

Cila prej pohimeve te mëposhtme mbi fibroadenomen e gjirit është i sakte:

- A) kthehet ne malinjë ne 5% te rasteve
- B) është e forte dhe e levizshme
- C) pergjithesisht është e lokalizuar ne pjesen inferiore te gjirit
- D) zakonisht paraqet calcifikime ne mamografi
- E) është e dhembshme perpara menstruacioneve

Pyetja 91

Cili prej agjenteve infektive te mëposhtëm nuk shkakton keqformime embrio-fetale:

- A) gardnerella vaginalis
- B) herpesvirusi
- C) toxoplasma gondii
- D) virusi i rozolise
- E) citomegalovirusi

Pyetja 92

Cili prej te mëposhtmeve nuk është një test i zakonshem kontrolli ne një shtatzeni fillestare pa nderlikime:

- A) Pap-testi
- B) hemoglobina
- C) testet imunologjike



- D) dozimet seriale te hCG
- E) grupi i gjakut dhe faktori RH

Pyetja 93

Vena ovariane dextra derdhet ne venen:

- A) renale dextra
- B) mezenterike inferiore
- C) hipogastrike dextra
- D) iliake komune dextra
- E) kava inferiore

Pyetja 94

Cila prej te mëposhtmeve nuk është një pasoje e mundshme e diabetit ne shtatzeni:

- A) aborti i trimestrit te pare
- B) placenta previa
- C) polihidramniosi
- D) prapambetja e rritjes intrauterine
- E) makrosomia fetale

Pyetja 95

Te tera informacionet e mëposhtme mbi endometriozen janë të vërteta me perjashtim te njeres:

- A) transformimet malinjë janë te rralla
- B) provokon insuficiene renale
- C) është me e shpështë në moshën fertile
- D) grate e semura mund te paraqesin infertilitet
- E) organi me i prekur është vezorja

Pyetja 96

Gjate shtatzenise, fibromat uterine kanëprirje qe:

- A) te zvogelohen
- B) te kryejne transformim malinj
- C) te mos ndryshojne
- D) te kolikuojne
- E) te rriten

Pyetja 97

Cili prej hormoneve te mëposhtëm nuk derivon nga sinteza ose prodhimi placentar:

- A) prolaktina
- B) hormoni laktogjen placentar
- C) gonadotropina korionike humane
- D) progesteroni
- E) estrioli

Pyetja 98

Cili është trajtimi me i mirë per inkontinencen urinare nga paqendrueshmeria e detrusorit:

- A) kolporrafia anteriore
- B) farmakoterapia
- C) nderhyrja fionde
- D) te tera pergjigjet
- E) rehabilitimi muskolor i dyshemese pelvike

Pyetja 99

Një vajzë 18-vjeçare (G2P1), qe ditën e pare te ciklit te fundit menstrual e ka pasur me date 7 maj, vjen per viziten e saj te pare obstetrike pas 10 javësh. Cila mund te jete data e mundshme e lindjes:

- A) 28 janari i vitit tjetër
- B) 14 shkurti i vitit tjetër
- C) 7 shkurti i vitit tjetër
- D) 21 shkurti i vitit tjetër
- E) 28 shkurti i vitit tjetër

Pyetja 100

Qelizat intersticiale te Leydig prodhojne:

- A) spermatogjene
- B) estrogjene
- C) glukokortikoide
- D) mineralkortikoide
- E) testosteron

Pyetja 101

IVG brenda 90 diteve mund te kerkohet nga: (NVB)

- A) mjeku kurues
- B) partneri
- C) gruaja
- D) mjeku gjinekolog
- E) komiteti etik i struktures sanitare

Pyetja 102

Nese një homozigot normal çiftohet me një homozigot per një gjen recesiv, fëmijët do të jenë :

- A) 50% normale
- B) te tere te semure
- C) te tere normale
- D) 75% normale
- E) 25% normale

Pyetja 103

Te tera patologjite e mëposhtme kanë një incidence me te madhe gjate shtatzenise multiple, me perjashtim te njerës:

- A) mikrosomia fetale
- B) preeklampsia materne
- C) atonia uterine postpartum
- D) vasa previa

E) morbiditeti perinatal

Pyetja 104

Me përjashtim të njerit, të tere faktorët e mëposhtëm janë prognostike për karcinomen e endometrit:

- A) citologjia peritoneale
- B) thellesia e invazionit miometrial
- C) metastazat limfonodulare
- D) diferencimi histologjik
- E) mosha e pacientes

Pyetja 105

Cili është estrogeni më i përdorur në kontrëceptionin hormonal:

- A) estradioli
- B) estron sulfati
- C) estrioli
- D) etinilestradioli
- E) raloksifeni

Pyetja 106

Eklampsia karakterizohet nga:

- A) cefale të lehta dhe tranzitore
- B) hiperrefleksi
- C) konvulsione të tipit të lehte
- D) konvulsione të tipit gran mal
- E) skotoma

Pyetja 107

Cili prej të mëposhtmeve nuk është shkak amënorreje:

- A) sindroma Turner
- B) hiperprolaktinemia
- C) sindroma e ovarit polikistik
- D) hiperplazia surrenaliene kongjenitale
- E) diabeti mellitus

Pyetja 108

Cila prej patologjive të mëposhtme nuk mund të diagnostikohet në periudhën prenatale me teknikat e gjenetikës molekulare:

- A) fenilkëtonuria
- B) fibroza kistike
- C) defektet e tubit neural
- D) fibroza muskulare Duchenne
- E) beta-talasemia

Pyetja 109

Disfunzionet seksuale femërore prekin popullatën me prevalencë:

- A) 5%
- B) 25%
- C) 10%
- D) 45%
- E) nuk ekzistojne studime klinike dhe si rrjedhoje prevalenca nuk njihet

Pyetja 110

Zhvillimi i klitorisit dhe i labra major te vagines mundesohet nga veprimi i:

- A) estrogjeneve
- B) androgjeneve
- C) progesteronikeve
- D) gonadotropinave
- E) prolaktines

Pyetja 111

Një balerine 16-vjeçare, shumë e dobet, ankohet për 6 muaj amenorre dhe ndjesi fryrje abdominale. Cila prej të mëposhtmeve është diagnoza më e mundshme:

- A) shtatzënia
- B) anoreksia nervore
- C) depresioni
- D) sindroma premenstruale
- E) hipotiroidizmi

Pyetja 112

Galaktocela është:

- A) një formë mastiti kronik
- B) një granulom lipofagik
- C) një ektazi e duktuseve
- D) një kist me retension qumështi
- E) një nekrozë mamare

Pyetja 113

Cili është rezervuari natyror i toksoplazmes:

- A) fëmijët në mosha shkollore
- B) ekskrementet e zogjve
- C) macet
- D) peshqit e kontaminuar
- E) gjaku

Pyetja 114

Cili prej risqeve materno të mëposhtme rritet gjatë gravidancës multiple:

- A) infeksionet e rrugëve urinare
- B) diabeti gestacional
- C) hipertensioni i induktuar nga shtatzënia
- D) nivelet e uletë të alfa-fetoproteines serike të nënës
- E) moniliaza vaginale

Pyetja 115

Kisti Bartolini me absces duhet:

- A) te asportohe me rruge kirurgjikale
- B) te kurohet me antibiotike
- C) te kurohet me bursa te ngrohta e te lageshta
- D) te drenohet duket kryer një marsupializim
- E) te kontrollohet shpesh, pa kryer nderhyrje kirurgjikale

Pyetja 116

Arborizimi si fier i mukosit endocervikal verehet:

- A) ne shtatzeni
- B) ne menopauze
- C) ne periudhen mestruale
- D) ne fazen ovulatore
- E) ne rastet me hiperestrinizem

Pyetja 117

Gjatë javësë pare te puerperiumit, ne Cilënperqindjen uterusi e humbet peshen e tij ne raport me periudhen menjehere postpartum:

- A) 50%
- B) 20%
- C) 5%
- D) 80%
- E) 90%

Pyetja 118

Cilin aspekt histologjik merr me shpesh karcinoma e cerviksit uterin:

- A) karcinome epidermoidale
- B) karcinome mukoepidermoidale
- C) adenokarcinome
- D) koriokarcinome
- E) kistosarkome filoide

Pyetja 119

Cili është lokalizimi me i shpështë i implantimit te embrionit ne gravidancen ektopike:

- A) tuba
- B) fundus uteri
- C) peritoneumi
- D) vezorja
- E) cerviksi uterin

Pyetja 120

Miomat shoqerohen me te te tera patologjite klinike te mëposhtme, perveç se me:

- A) amenorre

- B) pielonefrit
- C) poliakiuri
- D) dismenorre
- E) anemi

Pyetja 121

Te tera vlerat e mëposhtme fiziologjike ose laboratorike pesojne luhatje ne trimestrin e dyte te një shtatzenis normale, me perjashtim te:

- A) frekuences kardiake
- B) hematokritit
- C) natremise
- D) shpejtesise se eritrosedimentimit
- E) vellimit respirator te imet

Pyetja 122

Hiperplazia glandulare kistike e endometrit shkaktohet nga:

- A) një karcinome e portionit uterin
- B) një stimulim progestinik i zgjatur
- C) një endometrit
- D) një endometrioze
- E) një stimulim estrogenik i zgjatur

Pyetja 123

Dismenorrea primare duket se shkaktohet nga kontraktimet uterine nga sekretimi i prostaglandinave nga ana e endometrit. Masat farmakologjike per kontrollin e dhembjes perfshijne perdorimin e te tera substancave te mëposhtme, me perjashtim te:

- A) ibuprofenit
- B) bromkriptines
- C) etinil estraiolit me noretindron
- D) indometacines
- E) acidit mefanamik

Pyetja 124

Cili hormon korrelohet shumë me trofizmin e organeve gjenitale femerore:

- A) testosteroni
- B) estradioli
- C) DHEAS
- D) delta4-androstenedioni
- E) hormoni i rritjes

Pyetja 125

Një grua 24-vjeçare ankohet per sekrecione vaginale te bezdisshme dhe me prurit. Një strisho e sekrecioneve vaginale tregon një protozoo shumë te levizshem. Cilet prej agjenteve farmakologjike te mëposhtëm do te ishte trajtimi me i pershtatshem:

- A) spektinomicina
- B) klotrimazoli

- C) mikonazoli
- D) acikloviri
- E) metronidazoli

Pyetja 126

Ne Cilënmoshe gestacionale (te perlloritur nga cikli i fundit menstrual) është me i ndjeshem ndaj efekteve teratogjene fruti i konceptonit:

- A) ditet 1-14
- B) ditet 29-72
- C) ditet 15-28
- D) ditet 73-90
- E) ditet 91-120

Pyetja 127

Cila prej pohimeve te mëposhtme mbi hepatitin B dhe shtatzenine është i sakte:

- A) shtatzenia pershpejton dekursin e hepatitit B akut matern
- B) menyra e lindjes nuk ka asnjë ndikim mbi transmetimin nene-neonat
- C) ushqyerja me gji nuk e rrit riskun neonatal per te marre hepatitin B
- D) shpejtesia e perparimit te sëmundjes është e njejte te nena dhe te neonati
- E) te porsalindurit mund te mbrohen nga hepatiti B duke marre imunizim pasiv ne ditën e pare te lindjes

Pyetja 128

Perqindja e aborteve te shkaktuara nga amniocenteza e kryer ne trimestrin e dyte është rreth:

- A) >5%
- B) 3%
- C) 4%
- D) 5%
- E) 1%

Pyetja 129

Nga cili hormon induktohet "plasja" e folikulit ovarian:

- A) prolaktina
- B) LH
- C) GH
- D) estradioli
- E) FSH

Pyetja 130

Cila është shenja me e shpështë e hapjes iminente te një plage kirurgjikale:

- A) drenimi serik
- B) drenimi i gjakut
- C) dhembja abdominale pa drenim
- D) drenimi sero-hematik
- E) prania e permbajtjeve abdominale ne plage

Pyetja 131

Një grua 20-vjeçare paraqet hemorragji të tepert vaginale 1 orë pas lindjes vaginale spontane të një neonati mashkull (femija i tretë) me peshe 4400 g. Lindja ka zgjatur 7 orë me administrim oksitocine gjatë 2 orëve të fundit. Cili është shpjegimi më i mu

- A) retensioni i indit placentar
- B) trauma e traktit gjenital
- C) inversioni uterin
- D) atonia uterine
- E) çrregullimi i koagulimit

Pyetja 132

Humbja mesatare e gjakut nga menstruacioni është:

- A) 10-15 ml
- B) 130-150 ml
- C) 75-100 ml
- D) 101-125 ml
- E) 25-50 ml

Pyetja 133

Trajtimi paresor i karcinomes endometriale të kufizuar në korpus uteri konsiston në:

- A) histerektomi
- B) radium intrakavitar
- C) terapia rrezatimi ekstern
- D) kemioterapi
- E) terapi progestinike

Pyetja 134

Cila prej simptomave të mëposhtme nuk ndeshet në rastin e gravidances tubarike:

- A) dhembje në kuadrantet inferiore abdominale
- B) humbje hematike vaginale ose spotting
- C) amenorre
- D) dhembje në shpatull
- E) proktorragji

Pyetja 135

Cili prej të mëposhtmeve nuk është indikacion absolut për sectio cesareo:

- A) sectio cesareo i mëparshëm
- B) placenta previa centrale
- C) vuajtja fetale akute në fillim të procesit të lindjes
- D) prolapsi i funikulit
- E) prezantimi frontal

Pyetja 136

Cili është treguesi fetal i prezantimit podalik:

- A) tibia



- B) sakrumi
- C) perineumi
- D) iskiumi
- E) vertebra e 5-te lumbare

Pyetja 137

Cila prej metodave të mëposhtme të diagnozës prenatale kryhet në periudhën e hershme gjatë shtatzërisë:

- A) fetoskopia
- B) amniocenteza
- C) funikulocenteza
- D) marrja e vileve korionike
- E) biopsia fetale

Pyetja 138

Ciklofosfamidi mund të shkaktojë tërë efektet e mëposhtme kolaterale, me përjashtim të:

- A) nauzese dhe të vjellave
- B) stomatitit
- C) inhibimit medular
- D) cistitit hemorragjik
- E) alopecisë

Pyetja 139

Vaginizmi është shkak i femërorit kryesor i:

- A) dispareunisë
- B) ejakulacionit të parakohshëm
- C) moskonsumimit të martesës
- D) krizës bashkeshortore
- E) uljes së dëshirës seksuale të femrës

Pyetja 140

Të një grua me cikël të rregullt 28-ditore, periudha fertile presupozohet të jetë:

- A) ditët 2-5
- B) ditët 7-11
- C) ditët 20-29
- D) ditët 18-26
- E) ditët 10-16

Pyetja 141

Gjinekomastia e vertetë shfaqet gjatë:

- A) trizomisë së kromozomit 21
- B) sindromës Turner
- C) adenomës Plummer
- D) morbus Addison
- E) sindromës Klinefelter

Pyetja 142

Cila është diagnoza më e mundshme të një grua 24-vjeçare, që paraqet në gjirin e djathtë një masë të levizshme, të izoluar, të kufizuar mirë, me konsistencë si gome dhe të padhembshme:

- A) karcinome mamare
- B) sëmundje fibrokistike të mameles
- C) absces mamar
- D) fibroadenome
- E) nekroze dhjimore të mameles

Pyetja 143

Një vajzë 19-vjeçare shkon te mjeku sepse nuk ka pasur kurrë menstruacione. Ekzaminimi objektiv ve në dukje praninë e gjinjve normale, por nuk arrihet të individualizohet uterus i as me palpim dhe as gjatë ekzaminimit pelvik. Cili prej ekzaminimeve të mëposhtme:

- A) LH dhe FSH
- B) prolaktina
- C) testosteroni
- D) progesteroni
- E) estrogeni

Pyetja 144

Te një paciente në moshe pediatrike me rrjedhje vaginale të vazhdueshme fillimisht duhet të kërkohet:

- A) lacerimet vaginale
- B) oksuria
- C) abuzimi i medikamenteve
- D) trupi i huaj
- E) ureteri ektopik

Pyetja 145

A ndërhyrje statusi i infertilitetit në marrëdhënien seksuale të një çifti të qëndrueshëm:

- A) shumë shpesh
- B) vetëm nëse është i prekur burri
- C) vetëm nëse është e prekur gruaja
- D) kurrë
- E) ndonjëherë

Pyetja 146

Shkaku më i shpësthtë i dispareunise së thellë është:

- A) endometrioza
- B) sëmundja inflamatorë pelvike (PID)
- C) sindroma Master Allen
- D) varikocela
- E) sindroma e bllokimit të nervave abdominale (ACNES)

Pyetja 147

Një vajzë 15-vjeçare paraqet dhimbje abdominale te papritur. Ekzaminimi objektiv ve ne dukje një mase te dhembshme ne aneksin e majte. Testi i shtatzenise është negativ. Radiografia tregon një mase ne vezoren e majte me zona kalficikimi fokal. Cila është

- A) kist folikular
- B) teratome kistike
- C) kistadenome mucinoze
- D) tumor Brenner
- E) kistadenome seroze

Pyetja 148

Mastiti akut ndodh me shpesh gjate:

- A) pubertetit
- B) ciklit menstrual normal
- C) laktacionit
- D) shtatzenise
- E) menopauzes

Pyetja 149

Te tera pohimet e mëposhtme mbi kancerin e vezores janë te sakta, me perjashtim te njeres:

- A) ka perqindjen me te larte te vdekshmerire nder tumoret me te shpeshta te aparatit gjenital femeror
- B) është kanceri me i shpështë i aparatit gjenital femeror
- C) ka prirje qe te jete asimptomatik deri sa arrin stadin e perparuar
- D) zhvillimi i tij mund te ndikohet nga faktore ambientale, kulturore, socioekonomike
- E) strishot e Papanicolau (Pap test) nuk janë te efektshme per kontrollin diagnostik rutine

Pyetja 150

Një primigravide 18-vjeçare është ne javen e 26-te te shtatzenise. Kultura e cerviksit është pozitive per Chlamydia trachomatis. Cili prej antibiotikeve te mëposhtme është me i pershtatshem për këtëpaciente:

- A) dikloksacilina
- B) ampicilina
- C) cefuroksamidi
- D) eritromicina
- E) vankomicina

Pyetja 151

Kater prej patologjive te mëposhtme janë kundraindikacione absolute per perdorimin e kontraceptiveve hormonale te kombinuar. Cila prej patologjive perben te vetmin kundraindikacion relativ:

- A) hipertrigliceridemia dhe hiperkolesterolemia
- B) diabete mellitus me probleme vaskulare
- C) anamneza pozitive per tromboflebit
- D) hemikrania me aura
- E) duhanpirja mbi 35 vjet

Pyetja 152

Një grua 33-vjeçare (G1P1), që ka lindur fëmijën e saj të parë 5 javë më parë, telefonon në ambulator. Referon se ndjehet shumë e lodhur dhe anksoze. Ndjen se nuk është në gjendje të bëjë asgjë në mënyrën e duhur dhe se ndihet shumë e trishtuar gjatë të

- A) psikoza postpartum
- B) çrregullimi i ankthit
- C) depresioni postpartum
- D) sëmundja bipolare
- E) pagjumësia

Pyetja 153

Një paciente diagnostikohet me karcinome mamare. Cili është faktori prognostik më i rëndësishëm për trajtimin e kësaj patologjie:

- A) metastazat në limfonodujt akselare (axilare)
- B) madhësia e tumorit
- C) moshë e pacientes
- D) prania në tumor të receptorëve për estrogenet
- E) prania në tumor të receptorëve për progesteronin

Pyetja 154

Një grua 38-vjeçare (G3P3) fillon të ushqejë me gjiri fëmijën e saj 5-ditësh. Femija kapet mirë pas gjirit dhe fillon të thithë. Cila prej përgjigjeve ndaj thithjes ndodh të gruaja:

- A) reduktimi i oksitocinës
- B) rritja e PIF (faktori inhibues i prolaktinës)
- C) rritja e faktorit të çlirimit të LH dhe të FSH
- D) rritja e dopaminës hipotalamike
- E) rritja e prolaktinës hipotalamike

Pyetja 155

Një grua 33-vjeçare (G2P1) sapo ka lindur me lindje vaginale spontane. Nuk është ndjekur mirë në periudhën prenatale dhe, duke qenë se nuk ka kryer asnjë ekografi gjatë shtatzënise, është anksoze për të ditur seksin e fëmijës. Në pamje të parë vërehen or

- A) analiza kromozomike
- B) ekzaminimi pelvik i plotë
- C) ekografia pelvike
- D) rivlerësimi në moshën 1-mujore
- E) laparotomia për kryerjen e gonadektomisë

Pyetja 156

Gjatë vizitës së një gruaje 30-vjeçare për infertilitet, vendoset diagnoza e uterusit bikorn. Gruas i shpjegohet se nevojiten ekzaminime të mëtejshme, pasi ekziston një risk më i madh për anomali kongjenital në njërin prej sistemeve organike të mëposhtme:

- A) urinar
- B) hematopoietik
- C) skeletik
- D) sistemi nervor qendror
- E) gastrointestinal

Pyetja 157

Një grua 74-vjeçare paraqitet ne ambulator per një vizite kontrolli. Pap testi dhe mamografia e fundit e saj janë te 3 viteve me pare. Ajo ka hipertension, nivele te larta te kolesterolit dhe osteoartrit. Ka nderprere pirjen e duhanit 15 vite me pare dhe

- A) semundja Alzheimer
- B) neoplazia mamare
- C) semundja cerebrovaskulare
- D) tumori pulmonar
- E) semundja kardiake

Pyetja 158

Një grua 50-vjeçare diagnostikohet me kancer te cerviksit. Cili prej grupeve te limfonodujve është i pari qe perfshihet pas diseminimit metastazik te kesaj sëmundjeje, perveç cerviksit dhe uterusit:

- A) limfonodujt iliake komune
- B) limfonodujt paracervikale ose ureterale
- C) limfonodujt iliake eksterne
- D) limfonodujt parametriaie
- E) limfonodujt paraaortale

Pyetja 159

Një grua 24-vjeçare i kerkon mjekut te saj mundesine e një kontrolli gjenetik per një mutacion te BRCA1. Nena e saj ka vdekur si pasoje e karcinomes mamare në moshën 44-vjeçare dhe një moter e saj është diagnostikuar me karcinome duktaie in situ në moshën

- A) shpjegohet se mutacionet e BRCA1 nuk janë te lidhura me një risk me te larte per karcinome mamare
- B) rekomandohet kryerja e kontrollit vetem nese është pasardhese e hebrenjve Ashkenazi
- C) sugjerohet qe ti nenshtrohet një interventi profilaktik mastektomie bilaterale ne vend te kontrollit gjenetik
- D) rekomandohet një keshillim gjenetik perpara se te kryhet kontrolli gjenetik
- E) rekomandohet kryerja e një biopsie mamare bilaterale

Pyetja 160

Një grua 24-vjeçare sapo është diagnostikuar me toksoplazmoze. Mundoheni te percaktoni se cilet mund te kene qene faktoret e saj te riskut. Cili prej tyre perben riskun me te larte:

- A) fakti qe ka pasur një infeksion viral te parakohshem gjate shtatzenise
- B) konsumimi i peshkut te pagatuar
- C) prania e një qeni ne shtepi
- D) kombesia angleze
- E) konsumimi i mishit te pagatuar

Pyetja 161

Një shtatzene 35-vjeçare ndodhet nen risk shumë te larte per te zhvilluar njekoheisht neoplazi malinjë te:

- A) kolonit
- B) vezores
- C) gjirit

- D) vagines
- E) cerviksit

Pyetja 162

Një grua 23-vjeçare (G1P0) sapo ka pasur një lindje vaginale spontane. Nderkohe që nxirrej placenta, verehet një mase e mishte e kuqe, që protrudon nga prapa placentes. Cili është hapi pasues me i mirë për t'u hedhur te kjo paciente:

- A) fillimi i infuzionit endovenoz të oksitocines
- B) shtyhet placenta brenda uterusit
- C) vazhdohet heqja manuale e placentes
- D) i indikohet anestezistit që të administrojë sulfat magnezi
- E) kerkohet me shumë personel mjekesor për një asistencë të menjehershme

Pyetja 163

Pas një shtatzënie të parë, që rezultoi në një humbje spontane në trimeshterin e parë, pacientja është e shqetësuar nga mundësia që kjo gjë të ndodhë serish. Cila është përgjigja më e përshtatshme në lidhje me mundësinë e një rekurrence:

- A) mundësia varet nga përberja gjenetike e frutit të abortit të mëparshëm
- B) mundësia është rritur rreth 50%
- C) mundësia nuk ndryshon nga mundësia që kishte aborti i parë
- D) mundësia është rritur mbi 50%
- E) mundësia varet nga seksi i frutit të abortit të parë

Pyetja 164

Një grua 33-vjeçare (G3P2) në javën e 30-të të shtatzënisë merr një infektion. Cili prej të mëposhtmeve është një riaktivizim dhe si rrjedhojë nuk përben risk për fetusin:

- A) coxsackievirus grupi B
- B) virusi i rozolise
- C) virusi i variceles
- D) herpesvirusi tip 2
- E) zjarri i Shen Andonit

Pyetja 165

Një grua 30-vjeçare me një patologji gjenetike të karakterizuar nga një mungesë e fenilalaninës hidroksilazës, po mendon një shtatzëni për herë të parë. Mjeku i saj i shpjegon riskun me të lartë të femijes së saj për prapambetje mendore dhe për sëmundje ka

- A) të porsalindurit duhet t'i jepet vitamina B12 menjëherë pas lindjes
- B) rekomandohet një suplement me glicinë në diete
- C) rekomandohet një suplement me L-karnitinë në diete
- D) nuk ka nevojë për kontroll dietetik nëse nivelet e fenilalaninës janë lehtësisht të rritura
- E) përpara konceptimit duhet të fillohet një diete me nivele të ulëta të fenilalaninës

Pyetja 166

Diten pas një marrëdhënieje seksuale rastësore me një burrë heteroseksual, i cili sapo është diagnostikuar me antikorpe pozitive ndaj HIV, pacientja juaj është e shqetësuar dhe do të dije nëse mund të jetë e infektuar. Rezulton një titer antikorpal negativ

- A) 1-2 jave
- B) 3-4 jave
- C) 26-52 jave
- D) 12-15 jave
- E) 4-10 jave

Pyetja 167

Një grua 27-vjeçare sapo ka pasur një gravidance ektopike. Cila prej ngjarjeve të mëposhtme është më e mundshme që të predispozohet për një gravidance ektopike:

- A) një konizim cervikal i mëparshëm
- B) përdorimi i mjeteve kontraktive intrauterine (DIU)
- C) sëmundja inflamatorë pelvike (PID)
- D) induktimi i ovulacionit
- E) ekspozimi in utero ndaj dietilstilbisterolit (DES)

Pyetja 168

Zgjidhni teknikën e përshtatshme të përdorur për diagnostikimin e anemisë drepanocitare në një fetus:

- A) kulturë e qelizave të lëngut amniotik
- B) kampione të gjakut fetal
- C) alfafetoproteina e likidit amniotik
- D) përqëndrimi i substancave kimike në urinën e nënës
- E) ekografi

Pyetja 169

Në një grua 32 vjeç me histori për infertilitet prej 4 vitesh, induktohet ovulimi me klomifen. Në javën e 16 të shtatzanisë evidentohet pozicionimi i fundusit të uterusit në nivel të kërthizës. Ekografia tregon për barrë binjake me dy placenta ( anterior

- A) infeksione të rrugëve urinare
- B) hipertension të induktuar nga barra
- C) diabet gestacional
- D) ulje të nivelit të alfa-fetoproteinës
- E) candida

Pyetja 170

Kundërintikohet përdorimi i pilulave kontraktive në:

- A) endometriozë
- B) mastopati fibrocistike
- C) cist ovari
- D) karcinoma mamare e operuar prej më shumë se 3 vjetësh
- E) nuliparita

Pyetja 171

Në ekzaminimin mikroskopik të sekrecioneve uretrale Neisseria gonorrea paraqitet si:

- A) streptokok grampozitiv jashtë qelizor
- B) diplokok grampozitiv jashtë qelizor
- C) diplokok gramnegativ jashtë qelizor
- D) diplokok grampozitiv brenda qelizor
- E) diplokok gramnegativ brenda qelizor

Pyetja 172

Prania e indit endometrial jashtë kavitetit njihet si:

- A) endometriozë
- B) endoskopi
- C) miomatozë
- D) mola hidatiforme
- E) ovar polikistik

Pyetja 173

Cili prej tumoreve të poshtë shënuar metastazon më shpesh në fetus?

- A) melanoma
- B) leuçemia
- C) karcinoma mamare
- D) karcinoma e cerviksit
- E) karcinoma uterine

Pyetja 174

Gjatë lindjes, dilatimi i qafës të uterusit do të konsiderohej i plotë kur ka arritur:

- A) 2-3 cm
- B) 6 cm
- C) 5 cm
- D) 10 cm
- E) 12 cm

Pyetja 175

Në cilën ditë LH arrin nivelin më të lartë në një grua që ka cikël menstrual të rregullt çdo 30 ditë?

- A) ditën e 12-të
- B) ditën e 14-të
- C) ditën e 16-të
- D) ditën e 18-të
- E) ditën e 27-të

Pyetja 176



Cili është shkaku më i mundshëm i hemorragjisë vaginale disfunktionale në një grua 28 vjeç e cila në ekzaminim objektiv nuk paraqet asnjë problem?

- A) sindromi i ovarit polikistik
- B) përdorimi i kontraktivëve oral
- C) dismenorrea fiziologjike
- D) neoplazia gjinekologjike
- E) hipotiroidizmi

Pyetja 177

Me ektopron kuptojmë:

- A) praninë e endometrit me vendosje ektopike
- B) një lezion inflamator të cerviksit
- C) prolaps të uterusit
- D) eversioni i mukozës endocervikale
- E) fistul rekto-vaginale

Pyetja 178

Cila situatë nuk shoqërohet me ulje të lubrifikimit vaginal?

- A) menopauza
- B) sindromi Sjogren
- C) sindromi Cushing
- D) skleroza multiple
- E) hipotiroidizmi

Pyetja 179

Diagnoza e endometrioizës bazohet në:

- A) anamnezë
- B) ekzaminim objektiv
- C) histori për infertilitet
- D) dozim i CA 125
- E) evidentim i lezionit të endometrioizës në biopsi

Pyetja 180

Cila vaksinë kundërrindkohet të kryhet gjatë shtatzanisë:

- A) tetanoz
- B) poliomielit
- C) parotit
- D) gripi
- E) tërbimi

Pyetja 181

Bari më i përshtatshëm në trajtimin e haemofilus vaginalis është:

- A) metronidazoli
- B) mikonazoli
- C) dienestrol
- D) sulfisoxazoli
- E) deoksiciklina

Pyetja 182

Rritja e niveleve të alfa fetoproteinës në javën e 17-të të shtatzanisë i atribuohet:

- A) trisomisë 18
- B) sindromës Down
- C) vonesës të rritjes intrauterine
- D) anencefalisë
- E) gabimit në llogaritje të datës të shtatzanisë që realisht është vetëm në javën e 14-të

Pyetja 183

Një femër e prekur nga endometrioza mund të ankohet për të gjitha këto probleme me përjashtim të:

- A) dispareuni
- B) sterilitet
- C) dhimbje gjatë defekimit
- D) dhimbje të vazhdueshme abdominale
- E) mastodini

Pyetja 184

Tek një grua, shkaku më i shpeshtë i humbjes të dëshirës për të kryer marrdhënie seksuale është:

- A) diabeti melitus
- B) depresioni
- C) hipotiroidizmi
- D) të gjitha përgjigjet janë të sakta
- E) asnjë përgjigje nuk është e saktë

Pyetja 185

Cila nga këto paraqitje e fetusit nuk lejon lindjen natyrale edhe pse fetusi është i zhvilluar normalisht?

- A) paraqitja me bregmë
- B) paraqitja podalike
- C) paraqitja me ballë
- D) paraqitja me fytyrë
- E) asnjë përgjigje nuk është e saktë

Pyetja 186

Pterigum colli është karakteristikë e:

- A) sindromës Down
- B) sindromës Klinefelter
- C) sindromës Turner
- D) sindromës Patau
- E) sindromës cri du chat

Pyetja 187

Simptoma më e shpeshtë e karcinomës endometriale është:

- A) vaginite rekurente
- B) dispareuni
- C) metroragji
- D) amenorre
- E) asnjë pergjigje nuk është e saktë

Pyetja 188

Shkau më i shpeshtë i sterilitetit në femra është:

- A) hormonal (anovulimi)
- B) i lidhur me tubat uterinë
- C) i lidhur me uterusin
- D) kongenital
- E) vaginal

Pyetja 189

Sa është mundësia e zhvillimit anormal të një fetusit pas realizimit të amniocenteza?

- A) 0%
- B) 3.5%
- C) 5%
- D) 10%
- E) 25%

Pyetja 190

Cili nga këto trajtime duhet të aplikohet në trajtimin e preeklampsisë?

- A) diuretik
- B) dieta me pak kripë
- C) propanolol
- D) sulfat magnezi
- E) kalçium

Pyetja 191

Të gjithë barnat e mëposhtëm japin anomali fetale me përjashtim të:

- A) tetraciklinës

- B) talidomidit
- C) litiumit
- D) sulfonamideve
- E) kumarinës

Pyetja 192

Cili prej tumoreve të më poshtme është përgjegjës për numrin më të madh të vdekjeve në çdo vit?

- A) endometrial
- B) mamar
- C) pulmonar
- D) intestinal
- E) cervikal

Pyetja 193

Në rrezik aboti rekomandohet të ndiqet terapia e më poshtme me përjashtim të:

- A) antibiotikoterapi
- B) progesteroni
- C) beta stimulues
- D) antispastik
- E) rregjim shtrati

Pyetja 194

Të gjitha parametrat laboratorik fiziologjik ulen në trimestrin e dytë të një shtatzanie normale me përjashtim të:

- A) frekuencës kardiake
- B) hematokritit
- C) shpejtësisë të eritrosedimentit
- D) natremisë
- E) frekuencës respiratore në minutë

Pyetja 195

Në një shtatzani normale nëna shton në peshë:

- A) 8 kg
- B) 6 kg
- C) 12.5 kg
- D) 20 kg
- E) 16 kg

Pyetja 196

Një grua 25 vjeç, në javën e 13-të të shtatzanisë të parë, ankohet për hemorragji vaginale. Në ekzaminim objektiv evidentohet një TA=160/95 mmHg, proteinuri 3, dhe fundusi uterin në nivel të umbelikut. Cila është diagnoza e mundshme?

- A) diabet gestacional
- B) barrë gemelare
- C) anencefali fetale
- D) abort i paevitueshëm
- E) barrë molare

Pyetja 197

Maturimi i spermatozoideve ndodh në nivel të:

- A) epididimisit
- B) tubujve seminiferë
- C) kanalit vaginal
- D) duktusit deferent
- E) në kontakt me ovarin

Pyetja 198

Shenjat thelbësore të preeklampsisë janë:

- A) hipertensioni
- B) hipertensioni dhe edema
- C) hipertension, cefale, konvulsione
- D) hipertension dhe proteinuri
- E) asnjë nga përgjigjet

Pyetja 199

Gjatë lindjes, dilatimi i qafës të uterusit do të konsiderohej i plotë kur ka arritur:

- A) 2-3 cm
- B) 6 cm
- C) 5 cm
- D) 10 cm
- E) 12 cm

Pyetja 200

Në cilën ditë LH arrin nivelin më të lartë në një grua që ka cikël menstrual të rregullt çdo 30 ditë?

- A) ditën e 12-të
- B) ditën e 14-të
- C) ditën e 16-të
- D) ditën e 18-të
- E) ditën e 27-të

Pyetja 201

Pilula kontraceptive estro-progestinike vepron në nivel të:

- A) hipofizës
- B) tubujve
- C) qafës uterine
- D) ovarit
- E) gjendrës mbiveshkore

Pyetja 202

Metoda më e mirë për identifikimin e placentës previa është:

- A) ekografia
- B) amniografia
- C) ekzaminimi gjinekologjik
- D) arteriografia e aa.uterine
- E) radiografia pelvike

Pyetja 203

Cili nuk bën pjesë në indeksin e Apgar?

- A) ngjyra e lëkurës
- B) tonusi muskular
- C) temperatura trupore
- D) frekuenca kardiake
- E) vlerësimi i frymëmarrjes

Pyetja 204

Cila nga këto situat është e lidhur më shpesh me oligohidraminos?

- A) agenezia renale
- B) atrezia duodenale
- C) hidrops fetal
- D) anencefalia
- E) barrat e shumta

Pyetja 205

Gjatë shtatzanisë, përqëndrimi i fibrogjenit në gjakun e nënës:

- A) ulet në mënyrë sinjifikante
- B) ulet në mënyrë të moderuar
- C) nuk ndryshon
- D) rritet në mënyrë sinjifikante
- E) rritet në mënyrë të moderuar

Pyetja 206

Cili hormon stimulon maturimin e folikuilt ovarial?

- A) FSH
- B) LH
- C) Estrogjen
- D) Progesteron
- E) Testosteron

Pyetja 207

çfarë është onfalocela?

- A) hernie cerebrale
- B) aplazi e murit abdominal në regjionin umbelikal
- C) hernie inguinale kongenital
- D) divertikul
- E) hernie hiatale

Pyetja 208

Shkaku më i shpeshtë i vdekjes në një grua me eklampsi është:

- A) ruptura hepatike
- B) insuficienca renale akute
- C) hemorragjia cerebrale
- D) embolia pulmonare
- E) shoku septik

Pyetja 209

Në rast të perforimit të uterusit gjatë ekzaminimit instrumental duhet:

- A) të vazhdohet ekzaminimi i nisur
- B) të realizohet histerektomia e menjëherëshme
- C) të aplikohet laparoskopji eksplorative
- D) të realizohet me urgjencë ekografia
- E) të ndërpritet ekzaminimi dhe të fillohet antibiotikoterpai

Pyetja 210

Vena ovariale e djathtë derdhet në venën:

- A) renale të djathtë
- B) mesenterike inferiore
- C) cava inferiore
- D) iliake të majtë
- E) femorale të majtë

Pyetja 211

Diabeti në shtatzani mund të shkaktojë:

- A) abort në trimujorin e parë
- B) vonesë në rritjen intrauterine
- C) polihidramnios
- D) placenta previa
- E) makrosomi fetale

#### Pyetja 212

Të gjitha pohimet e më poshtme jnaë të vërteta në lidhje me endometriozen me përjashtim të:

- A) endometrioza shkakton insuficiencë renale
- B) transformimi malinj i saj është i rrallë
- C) endometrioza është me e shpeshtë në periudhën e fertilitetit
- D) gratë e prekura nga endometrioza mund të shfaqin infertilitet
- E) shpesh herë diagnostikohet gjatë një kontrolli të zakonshëm

#### Pyetja 213

Gjatë shtatzanisë fibromat uterine kanë tendencë të:

- A) zvogëlohen
- B) zmadhohen
- C) mos ndryshojnë
- D) kolabohen
- E) malinjizohen

#### Pyetja 214

Qelizat e Leyding marrin pjesë në pordhimin e:

- A) spermatociteve
- B) estrogenit
- C) testosteronit
- D) mineralokortikoideve
- E) glukokortikoideve

#### Pyetja 215

Eklampsia karakterizohet nga:

- A) cefale e moderuar, tranzitore
- B) hiper refleksi
- C) konvulsione të tipit grand mal
- D) konvulsione
- E) skotoma

#### Pyetja 216

Cila nga patologjitë e mëposhtme nuk është shkak i amenorresë?

- A) Sindroma Turner



- B) Diabeti Mellitus
- C) Sindroma e ovarit polikistik
- D) Hiperplazia surenale kongenitale
- E) Hiperprolaktinemia

Pyetja 217

Cila patologji nuk mund të diagnostikohet në periudhën prenatale me teknikat e gjentikës molekulare?

- A) fenilketonuria
- B) fibroza cistike
- C) fibroz muskulare e Duchenne
- D) difektet e tubit neural
- E) beta-talasemia

Pyetja 218

çrregullimet seksuale të femrat hasen në prevalencën :

- A) 45%
- B) 25%
- C) 10%
- D) 5%
- E) ska studime në lidhje me këtë çështje

Pyetja 219

Në analizën e urinës të një paciente me preeklampsi do evidentohet:

- A) proteinuria
- B) hematuri
- C) glukozuria
- D) ketonuria
- E) asnjë nga këto

Pyetja 220

Karcinoma e cerviksit të uteruit nga pikëpamja histologjike paraqitet si një;

- A) adenokarcinome
- B) karcinomë mukoepidermoide
- C) karcinomë epidermoide
- D) korionkarcinoma
- E) cistosakomë

Pyetja 221

Shtatzani ektopike vendoset më shpesh në:

- A) ovar
- B) fundusin uterin

- C) periton
- D) tubat uterin
- E) qafën e uterusit

Pyetja 222

Miomat shoqërohen me të gjithë elementët e më poshtëm, me përjashtim të:

- A) anemi
- B) pielonefrit
- C) polakiuri
- D) dismenore
- E) amenore

Pyetja 223

Amnicenteza për vlerësimin e kariotipit fetal mund të realizohet në:

- A) javën e 8-10
- B) javën 10-12
- C) javën 16-18
- D) javën 22-24
- E) në çdo periudhë të shtatzanisë

Pyetja 224

Cili nga parametrat e më poshtëm nuk ndryshon në trimestrin e dytë të një shtatzanie normale?

- A) frekuenca kardiake
- B) hematokriti
- C) shpejtësia e eritrosedimentit
- D) natremia
- E) vëllimi respirator në minutë

Pyetja 225

Përqindja e aborteve pasoje e realizimit të amniocentezës në trimestrin e dytë është:

- A) 1%
- B) 3%
- C) 4%
- D) 5%
- E) mbi 5%

Pyetja 226

Sa gjak humbet mesatarisht me një menstruacion :

- A) 10-15 ml
- B) 25-50 ml
- C) 75-100 ml

- D) 101-125 ml
- E) 135-150 ml

Pyetja 227

Në një grua me cikël të rregullt menstrual çdo 28 ditë,periudha më e përshtatshme e fekondimit është:

- A) dita 2-5
- B) dita 7-11
- C) dita 10-16
- D) dita 18-26
- E) dita 20-29

Pyetja 228

Placenta prodhon normalisht:

- A) estrogen dhe progesteron
- B) gonadotropinat korionike
- C) substanca të ngjashme me somatotropinat
- D) kortikosteroid
- E) të gjitha elementët e përmendur

Pyetja 229

Mastiti akut, në shumicën e rasteve evidentohet gjatë:

- A) pubertetit
- B) ushqyerjes me gji
- C) ciklit menstrual normal
- D) shtatzanisë
- E) menopauzës

Pyetja 230

Një grua 33 vjeç që ka lindur fëmijën e saj të parë para 5 javësh, paraqitet në ambulator ku të tregon se ndihet vazhdimisht e lodhur dhe në ankth. Ajo referon se ndihet e padobishme, rri gjithëditën kot dhe qan vazhdimisht pa ndonjë arsye specifike si

- A) Depresioni pas lindjes
- B) Çrregullime të ankthit
- C) Psikoza pas lindjes
- D) Sëmundje bipolare
- E) Pagjumsi

Pyetja 231

Pas menopauzës, dispareunia shkaktohet më shpesh nga

- A) tharja e sekrecioneve vaginale
- B) inkontinenca

- C) infeksionet nga kandida
- D) problemet e ereksionit të partnerit
- E) Të gjitha përgjigjet

Pyetja 232

Zgjidhni teknikën e përshtatshme të përdorur për diagnostikimin e anemisë drepanocitare në një fetus:

- A) kulturë e qelizave të lëngut amniotik
- B) kampione të gjakut fetal
- C) alfafetoproteina e likidit amniotik
- D) përqëndrimi i substancave kimike në urinën e nënës
- E) ekografi

Pyetja 233

Në një grua 32 vjeç me histori për infertilitet prej 4 vitesh, induktohet ovulimi me klomifen. Në javën e 16 të shtatzanisë evidentohet pozicionimi i fundusit të uterusit në nivel të kërthizës. Ekografia tregon për barrë binjake me dy placenta ( anterior

- A) infeksione të rrugëve urinare
- B) hipertension të induktuar nga barra
- C) diabet gestacional
- D) ulje të nivelit të alfa-fetoproteinës
- E) candida

Pyetja 234

Kundërindikohet përdorimi i pilulave kontraceptive në:

- A) endometrioze
- B) mastopati fibrocistike
- C) cist ovari
- D) karcinoma mamare e operuar prej më shumë se 3 vjetësh
- E) nuliparita

Pyetja 235

Cilën nga këto neoplazi malinje ka tendencë të zhvillojë një grua shtatzane 35 vjeçare?

- A) Neoplazi të ovarit
- B) Neoplazi të qafës të mitrës
- C) Neoplazi të gjirit
- D) Neoplazi të vaginës
- E) Neoplazi të kolonit

Pyetja 236

Në kullosh tër predominojnë:

- A) IgM

- B) IgG
- C) IgA
- D) IgD
- E) IgE

Pyetja 237

Gjatë vlerësimit për një amenorre dytësore në një femër 24 vjeç, diagnostikohet hiperprolaktinemia. Cila nga këto situat mund të rritin sasinë e prolaktinës qarkulluese dhe të nxitin amenorrenë në këtë paciente?

- A) Stresi
- B) Hipertiroidizmi parësor
- C) Anoreksia nervore
- D) Hiperplazia kongenitale e gjendrave mbiveshkore
- E) Sëmundja e ovarit polikistik

Pyetja 238

Një femër 27 vjeç sapo ka patur një shtatzani ektopike. Cili prej elementëve të mëposhtëm predisopzon zhvillimin e një shtatzanie ektopike?

- A) Malformimi i uterusit
- B) Sëmundja inflamatore pelvike
- C) Përdorimi i mjeteve kontrceptive
- D) Induktimi i ovulacionit
- E) Ekspozimi ndaj dietilstilbisterolit

Pyetja 239

Në rastin kur fetusu paraqitet i pozicionuar me shpatull, trajtimi i zgjedhur është:

- A) Përdorimi i oksitocinës me doza të larta
- B) Përdorimi i kapseve obstetrike ( ventuza obstetrike)
- C) Nuk është e nevojshme të ndërhyet sepse bëhet fjalë për një paraqitje fiziologjike të bebit
- D) Kirurgjia cezariane
- E) Asnjë nga këto nuk përshtatet me këtë situatë.

Pyetja 240

Hormoni folikulostimulues prodhohet nga:

- A) Qelizat kromofobe të adenohipofizës
- B) Qelizat gonadotrope të adenohipofizës
- C) Qelizat acidofile të adenohipofizës
- D) Qelizat thekale interne
- E) Të gjitha përgjigjet janë të sakta

Pyetja 241

Shkaku më i shpeshtë i ambiguiteti gjenital në fëmijë është:

- A) Çrregullimet kromozomike
- B) Disgenezia gonadike
- C) Sindroma adrenogjenitale
- D) Mozaicizmi
- E) Feminizimi testikular

Pyetja 242

Cili nuk bën pjesë në indeksin e Apgar?

- A) ngjyra e lëkurës
- B) tonusi muskular
- C) temperatura trupore
- D) frekuenca kardiake
- E) vlerësimi i frymëmarrjes

Pyetja 243

Të gjitha janë simptoma të vdekjes intrauterine të fetusit me përjashtim të:

- A) mungesa e perceptimit të lëvizjeve fetale nga nëna
- B) mungesa e rritje të vëllimit të uterusit
- C) shtimi në peshë i nënës
- D) regredimi i simptomave të shtatzanisë
- E) mungesa e rrahjeve të zemrës fetale në ekografi

Pyetja 244

Vendlokalizimi më i shpeshtë i endometriozës është:

- A) sipërfaqja peritoneale intestinale
- B) omentumi
- C) apendiksi
- D) vesika urinare
- E) hapsira Douglas

Pyetja 245

Të gjithë elementët e mëposhtëm janë të lidhur me rritjen e nivelit qarkullues të prolaktinës me përjashtim të:

- A) stresi
- B) hipotiroidizmi
- C) anoreksia nervore
- D) akromegalia
- E) shtatzania

Pyetja 246

Rritja e vlerave të beta HCG do të na orientonte për :

- A) tumor të gjirit
- B) tumor të ovarit
- C) cistoadenomë
- D) tumor me qeliza Sertoli-Leyding
- E) koriokarcinomë

Pyetja 247

Klinikisht karcinoma endometriale zakonisht paraqitet me :

- A) rritje të përmasave të uterusit
- B) dhimbje abdominale
- C) hemorragji
- D) leukorre
- E) të gjitha këto

Pyetja 248

Trupi i shkurtër te gratë mund të shoqërohet me;

- A) sindromën Turner
- B) hipotiroidizëm
- C) hiperplazi të gjendrave mbiveshkore
- D) Sëmundja Cushing
- E) Të gjitha këto

Pyetja 249

Cila anomali kromozomike karakterizon sindromën Klinefelter?

- A) XO
- B) Trizomia 15
- C) Delecioni i krahut të shkurtër të kromozomit 18
- D) XXY
- E) XYY

Pyetja 250

Cili bar rekomandohet të përdoret në trajtimin e moniliazës?

- A) Metronidazoli
- B) Mikonazoli
- C) Dinestrol
- D) Sulfisoksazol
- E) Deoksiciklina

Pyetja 251

Shaku më i shpeshtë i dështimit të kontraktivëve oral, duke rezultuar më pas me një shtatzani të padëshiruar është:

- A) Ovulimi në mes të ciklit
- B) Shpeshtësia e raporteve seksuale
- C) Përdorimi i gabuar i kontraktivëve oral
- D) Malabsorbimi gastrointestinal
- E) Prodhimi i antitruapve

Pyetja 252

Terapitë hormonale zëvendësues që merren gjatë menopauzës mund të përmirësojnë:

- A) Sekretionet vaginale
- B) Dispareunië
- C) Dëshirën seksuale
- D) Mardhënien në çift

Pyetja 253

Shkaku më i shpeshtë i inkontinencës urinare në një grua në menopauzë është:

- A) Inkontinenca urinare nga stresi
- B) Prania e divertikujve uretral
- C) Inkontinenca nga grumbullimi i urinës
- D) Paqëndrueshmëria e vezikës urinare
- E) Fistulat

Pyetja 254

Cila nga substancat e më poshtme do të shkaktonin anomali të indit vaskular fetal dhe neonatal, nëse ato do të përdreshin nga nëna gjatë shtatzanisë?

- A) Duhani
- B) Alkooli
- C) Narkotikët
- D) Amfetaminat
- E) Kokaina

Pyetja 255

Në një grua shtatzanë diagnoza e hepatitit mund të konfirmohet nga rritja e vlerave të:

- A) ERS
- B) Fosfatzës alkaline
- C) Leukocitozës
- D) SGOT
- E) Azotemisë dhe kreatinemisë

Pyetja 256



Cikli menstrual varet nga:

- A) Çlirimi i prolaktinës nga hipofiza anteriore
- B) Sekretioni pulsues i hormonit stimulues të sekretimit të gonadotropinave (GnRH)
- C) Zgjatja e fazës folikulare
- D) Prodhimi i progesteronit nga trupi i verdhë
- E) Prodhimi i estrogenit nga ovaret

Pyetja 257

Qelizat e Leyding marrin pjesë në prodhimin e:

- A) spermatociteve
- B) estrogenit
- C) testosteronit
- D) mineralokortikoideve
- E) glukokortikoideve

Pyetja 258

Eklampsia karakterizohet nga:

- A) cefale e moderuar, tranzitore
- B) hiper refleksi
- C) konvulsione të tipit grand mal
- D) konvulsione
- E) skotoma

Pyetja 259

Cila nga patologjitë e mëposhtme nuk është shkak i amenorresë?

- A) Sindroma Turner
- B) Diabeti Mellitus
- C) Sindroma e ovarit polikistik
- D) Hiperplazia surenale kongenitale
- E) Hiperprolaktinemia

Pyetja 260

Cila patologji nuk mund të diagnostikohet në periudhën prenatale me teknikat e gjentikës molekulare?

- A) fenilketonuria
- B) fibroza cistike
- C) fibroz muskulare e Duchenne
- D) difektet e tubit neural
- E) beta-talasemia

Pyetja 261

çrregullimet seksuale të femrat hasen në prevalencën :

- A) 45%
- B) 25%
- C) 10%
- D) 5%
- E) ska studime në lidhje me këtë çështje

Pyetja 262

Në analizën e urinës të një paciente me preeklampsi do evidentohet:

- A) proteinuria
- B) hematuri
- C) glukozuria
- D) ketonuria
- E) asnjë nga këto

Pyetja 263

Karcinoma e cerviksit të uterit nga pikëpamja histologjike paraqitet si një;

- A) adenokarcinome
- B) karcinomë mukoepidermoide
- C) karcinomë epidermoide
- D) korionkarcinoma
- E) cistosakomë

Pyetja 264

Shtatzania ektopike vendoset më shpesh në:

- A) ovar
- B) fundusin uterin
- C) periton
- D) tubat uterin
- E) qafën e uterusit

Pyetja 265

Rritja fiziologjike e ERS në shtatzani vjen si pasojë e:

- A) uljes të gamaglobulinave
- B) rritjes të beta globulinave
- C) rritje të fibrinogjenit plazmatik
- D) rritje të transferinës
- E) rritjes të prolaktinës

Pyetja 266

Cili prej pohimeve të mëposhtme në lidhje me sindromën vulvo-vestibulare, është i sakte:

- A) përfaqëson formën prevalente të vulvodinisë
- B) shoqërohet pothuajse gjithmonë me dispareuni

- C) pergjithesisht mungojne lezionet vulvare ose infeksionet e dukshme vulvu-vaginale
- D) ndonjehere mund te verehet eriteme makulare pergjate sulkusit imenal dhe ne nivelin e hapjes se glandulave vestibulare major dhe minor
- E) te gjitha

Pyetja 267

Frekuenca e infeksionit fetal si pasoje e rozolise materne, eshte me e larte:

- A) nese rozolia materne ndodh ne trimestrin e pare te gravidances
- B) nese rozolia materne ndodh ne trimestrin e dyte te gravidances
- C) nese rozolia materne ndodh ne trimestrin e trete te gravidances
- D) ne rast reinfektimi matern
- E) asnjera

Pyetja 268

Cila prej patologjive te meposhtme shkakton nivele te larta materne te alfafetoproteines, ne javen e 17-te te gravidances:

- A) trizomia e kromozomit 18
- B) sindroma Down
- C) vonesa e rritjes intrauterine
- D) anencefalia

Pyetja 269

Shkaku organik me i shpeshte, qe ndodhet ne baze te çrregullimit te deshires hipoaktive femerore eshte:

- A) diabeti mellitus
- B) sindroma depressive
- C) hipotiroidizmi
- D) asnjera

Pyetja 270

Cila eshte simptome klinike e shpeshte e karcinomes endometriale:

- A) vaginiti rekurrent
- B) dispareunia
- C) metrorragjite
- D) amenorrea
- E) asnjera

Pyetja 271

Cili prej pohimeve te meposhtme eshte i sakte:

- A) kriteri diagnostik kryesor i DSM-IV per vaginizmin eshte prania e "spazmes te pavullnetshme rekurrente ose persistente te muskulatures se nje te tretes se jashtme te vagines, qe nderhyn ne marredheniet seksuale"
- B) ne rastin e sindromes vulvo-vestibulare, vestibulektomia ka si qellim rezekimin e indit qe shkakton shfaqjen e dhembjes se vestibulit vaginal
- C) dispareunia e thelle eshte karakteristike e endometriozes, e PID, e varikocelles pelvike, si edhe e aderencave fibrotike

- D) te gjitha pergjigjet jane te sakta
- E) ndonjehere spazma e vaginizmit pershkruhet si nje spazme aq e gjate dhe e rende sa qe shkakton shfaqjen e dhembjes

Pyetja 272

Cila eshte shenja dhe/ose simptoma me e shpeshte me te cilen paraqitet karcinoma endometriale:

- A) rritja vellimore e uterusit
- B) kolika abdominale
- C) hemorragjia
- D) leukorrea
- E) te gjitha

Pyetja 273

Shkaku endokrin i trupit te shkurter te grave te reja perfshin:

- A) sindroma Turner
- B) hipotiroidizmi
- C) hiperplazia surrenaliene
- D) morbus Cushing
- E) te gjitha

Pyetja 274

Kardiotokografia:

- A) regjistron njekohesisht me dy sensore frekuencen kardiake fetale dhe aktivitetin e kontraktimit te miometrit
- B) regjistron njekohesisht me dy elektroda frekuencen kardiake materne dhe aktivitetin e kontraktimit te miometrit
- C) ben te mundur vleresimin e morfologjise kardiake fetale
- D) regjistron njekohesisht me dy sensore frekuence kardiake fetale dhe aktivitetin e kontraktimit te miometrit dhe ben te mundur vleresimin e morfologjise kardiake fetale
- E) te gjitha

Pyetja 275

Terapite zevendesuese hormonale vaginale per menopauzen mund te permiresojne:

- A) thatesine vaginale
- B) dispareunine
- C) deshiren seksuale
- D) raportin e çiftit
- E) te gjitha

Pyetja 276

Korpusi albikant eshte:

- A) folikul atrezik
- B) folikul i Graaf
- C) folikul primordial
- D) nje rrejdhoje cikatricele e korpusit luteum
- E) asnjera

Pyetja 277

Cila prej situatave te meposhtme perfaqeson nje avantazh te ekzaminimit te vileve korionike mbi amniocentezen, per percaktimin e anomalive fetale:

- A) mund te kryhet me perpara gjate shtatzenise
- B) mund te percaktoje me sakte defektet e tubit neural
- C) ka nje mundesi me te ulet per te provokuar abort
- D) aborti kryhet njekoheisht me ekzaminimin
- E) asnjera

Pyetja 278

Perforacioni i uterusit gjate eksplorimit instrumental te kavitetit uterin ndodh shpesh ne:

- A) retroversofleksionin uterin
- B) antifleksionin rigid
- C) neoplazine malinje te uterusit
- D) nje rast me sectio cesareo gjate koheve te fundit
- E) te gjitha

Pyetja 279

Cilat jane shenjat dhe/ose simptomat themelore te preeklampsise:

- A) hipertensioni dhe skotomat
- B) hipertensioni dhe edemat
- C) hipertensioni, cefalea dhe konvulsionet
- D) hipertensioni dhe proteinuria
- E) asnjera

Pyetja 280

Prolapsi i kordonit umbilikal mund te shkaktohet nga :

- A) prezantimet anormale
- B) disproporcionet fetus-pelvis
- C) gjatesise se madhe (mbi 75 cm)
- D) te gjitha

Pyetja 281

Diagnoza e ovulacionit mund te vendoset duke vezhguar:

- A) modifikimet ciklike te mukusit cervikal
- B) modifikimet ciklike te citologjise vaginale
- C) modifikimet ciklike te temperatures bazale
- D) modifikimet sekretore te endometrit
- E) te gjitha

Pyetja 282

Te nje paciente me preeklampsi, cila prej anomalive te meposhtme ndeshet me shpesh gjate ekzaminimit te urines:

- A) proteinuria
- B) hematuria
- C) glukozuria
- D) ketonuria
- E) asnjera

Pyetja 283

Cili prej tumoreve ovariane te meposhtme, aktiv nga pikepamja endokrinologjike, shoqerohet me shpesh me pubertet te parakohshem te grate:

- A) disgerminoma
- B) ginandoblastoma
- C) fibrotekoma
- D) tumori i qelizave te granulozes-tekes
- E) asnjera

Pyetja 284

Amniocenteza per vleresimin e kariotipit fetal mund te kryhet:

- A) ne javet 8-10
- B) ne javet 10-12
- C) ne javet 16-18
- D) ne javet 22-24
- E) ne çdo periudhe te shtatzenise

Pyetja 285

Numri me i madh i vdekjeve nga karcinoma cervikale shkaktohet nga:

- A) ekstensioni lokal
- B) metastazat ne sistemin nervor qendror
- C) metastazat ne mushkeri
- D) shkaqet jatrogjene
- E) asnjera

Pyetja 286

pH vaginal korrelohet me:

- A) perberjen e ekosistemit vaginal
- B) nivelin e estrogjeneve ne indet vaginale
- C) cenueshmerine e infeksioneve nga bakteret e kolonit
- D) moshen e pacientes
- E) te gjitha

Pyetja 287

Cila nga situatat e mëposhtme, eshte e lidhur me nje rritje te mundesise se hemorragjise postpartum:

- A) procesi i shpejte i lindjes
- B) procesi i gjate i lindjes
- C) stimulimi i lindjes me oksitocine
- D) gravidanza multiple
- E) te gjitha

Pyetja 288

Cila prej formacioneve te mëposhtme anatomike e merr prejardhjen nga duktusi Wolff , te gruaja:

- A) tubat uterine
- B) uterus
- C) vagina
- D) ligamenti i gjere
- E) asnjera

Pyetja 289

Gjate jetes fetale, duktusi arterioz i Botallit, sherben:

- A) si qark i shkurter per qarkullimin pulmonar
- B) per te shkembyer gjakun ndermjet gjymtyreve
- C) si qark i shkurter per heparin ne zhvillim
- D) per te parandaluar koarktacionin
- E) asnjera

## 07.Pediatria

Pyetja 1

Të gjitha pohimet e mëposhtme janë tregues prognostike pozitiv te Leuçemise Limfoblastike akute në moshën pediatrike përveç:

- A) Mosha 3-7 vjeç.
- B) Limfocitozë fillestare  $<10\ 000/\text{mm}^3$
- C) Seksi mashkull
- D) Vlera e hemoglobinës  $< 7\text{g/dL}$
- E) Trombocitet  $>100\ 000\ \text{mm}^3$

Pyetja 2

Kur dyshojmë për një invaginacion intestinal tek fëmija, cili është egzaminimi diagnostik që përjashton diagnozën?

- A) Invertogram
- B) Radiografi e drejtpërdrejtë e abdomenit
- C) Radiografi me kontrast bariumi
- D) Stratigrafi
- E) Klizma opake

Pyetja 3

Cili është simptomi më i shpeshtë me të cilin fillon kraniofaringioma te fëmijët?

- A) Strabizëm
- B) Dhimbje koke
- C) Turbullime të shikimit
- D) Ngadalësim në rritje
- E) Marrje mendsh

#### Pyetja 4

Divertikuli i Meckel-it mund të jetë:

- A) Simptomatik vetëm në seksin mashkull
- B) Simptomatik vetëm në seksin femër
- C) Gjithnjë simptomatik
- D) Përcaktohet vetëm me autopsi
- E) Asimptomatik

#### Pyetja 5

Zhurma e pafajshme është zakonisht:

- A) Diastolike në pozicion të shtrirë
- B) E vazhdueshme
- C) Mezotelesistolike
- D) Protomezosistolike
- E) E pranishme vetëm mbas ushtrimit fizik

#### Pyetja 6

Terapia e krizave astmatike të moderuara:

- A) Parashikon përdorimin e a2 stimulantëve per os dhe në rast se nuk ka përmirsim për 12 orët në vazhdim , përdoret prednisolon.
- B) Parashikon përdorimin e b2 stimulantët në rrugë inhalatore dhe prednizolonit per os.
- C) Kërkon shtrim urgjent në spital.
- D) Parashikon përdorimin e a2 stimulantit ipratropium bromid në rrugë inhalatore dhe n.q.s nuk kemi përmirësim për 4 orë, përdoret prednisolon.
- E) Teofilina

#### Pyetja 7

Një vajzë me moshë 4 vjeç, po luante në një fushë të trajtuar me insekticid.

Prindërit e sjellin në ndihmën e shpejtë në gjëndje letargjike, me sekrecione nga goja, miozë, lotim dhe inkontinencë urine dhe fekale, të vjella, dhe dridhje. Mjeku dyshon për

- A) Atopina
- B) BAL (british antilewisite)
- C) Ca- EDTA
- D) Naloxon
- E) Pralidoxim (2- Pam)

#### Pyetja 8

Në rastin e një fëmije me gastroenterit akut, cili është hapi prioritar?

- A) Prick- test alergjik.
- B) Kërkim i oksiuereve në feçe.
- C) Testi i absorbimit intestinal
- D) Fillimi i terapisë antibiotike.
- E) Vlerësimi i gjendjes së hidratimi dhe ekuilibri acidobazik.

#### Pyetja 9



Cili nuk është komplikacion i parotitit?

- A) Gastriti
- B) Pankreatiti
- C) Orkiti
- D) Adenit supurativ
- E) Meningoencefaliti

Pyetja 10

Cili simptom është tipik për sindromin nefrotik?

- A) Glukozuria
- B) Poliuria
- C) Hematuria
- D) Edema
- E) Hipertensioni

Pyetja 11

Infeksioni me *Mycoplasma pneumoniae* mund të shkaktojë të gjitha patologjitë e mëposhtme, përveç:

- A) Bronkitit
- B) Bronkiolitit
- C) Faringotonsilitit
- D) Konjuktivitit
- E) Otitis media

Pyetja 12

Cili egzaminim përcakton gravitetin në diagnozën klinike të bronkiolitit?

- A) Ekzaminimi hemokromocitometrik.
- B) Rx e Toraksit
- C) Saturacioni O<sub>2</sub>
- D) Temperatura
- E) Presioni arterial sistematik

Pyetja 13

Për cilën sëmundje hematologjike në pediatri rekomandohet heparina + plazma e freskët?

- A) DIC (KID- koagulimi intravazal i diseminuar)
- B) Hemofilia A
- C) Sëmundje von Willebrand
- D) Hemofilia B
- E) Difekt i koagulimit si pasojë e hepatopatisë

Pyetja 14

Një fëmijë 4 vjeç që merr mësimet, shfaqet tek pediatri me dhimbje në veshin e djathtë.

Ekzaminimi objektiv i veshit tregon edemë dhe eritemë të kanalit auditiv me praninë e sekrecioneve me ngjyrë të gjelbër. Dhimbja shtohet me prekje të aurikulës dh

A)

- B) Moraxella catarrhalis
- C) Pseudomonas aeruginosa
- D)
- E) Escherichia coli

Pyetja 15

Një neonat i gjatë për moshën gestionale paraqitet me lëkurë të rrudhur dhe të deskuamuar. Thonjtë janë të gjata dhe të gjelbra. Nuk ka prezencë pushi. Sa është mosha gestionale e këtij fëmije?

- A) 34 javë
- B) 42 javë
- C) 38 javë
- D) 40 javë
- E) 36 javë

Pyetja 16

Cila nga ndërhyrjet e mëposhtme është e detyrueshme dhe prioritare tek një fëmijë me arrest kardiocirkulator?

- A) Ekzaminimi biokimik dhe instrumental.
- B) Administrimi i medikamenteve jetike.
- C) Monitorim i presionit arterial dhe diurezës
- D) Vendosja e vagonit dhe fillimi i serumit endovenoz.
- E) Lirimi i rrugëve të frymëmarrjes, ventilacion dhe masazh kardiak.

Pyetja 17

Intoleranca ndaj proteinave të qumështit mund të manifestohet me të gjitha kuadret klinike të mëposhtme, përveç:

- A) Formë akute me diarre dhe të vjella
- B) Formë kronike me kolit / ose anemi
- C) Diarre me gjak okult në feçe.
- D) Dermatit atopik dhe urtikarie
- E) Të vjella dhe acidozë metabolike.

Pyetja 18

Cila nga patologjitë e mëposhtme të sistemit genital, mund të jetë shkaktar i abdomenit akut tek vajzat?

- A) Hipertrofia e klitorisit
- B) Hipotrofia e klitorisit
- C) Torsion i ovarit
- D) Hipertrofia e buzëve të vogla
- E) Hipertrofia e buzëve të mëdha

Pyetja 19

Sasia e yndyrnave në dietën e fëmijës së vitit të dytë të jetës, këshillohet në një nga opsionet e mëposhtme:

- A) Nën 10% të kalorive ditore.
- B) Jo më tepër se 30% të kalorive ditore

- C) Jo më tepër se 15% të kalorive ditore.
- D) Nën 15% të kalorive ditore.
- E) Më tepër se 40% të kalorive ditore.

Pyetja 20

Cili nga trajtimet e mëposhtme duhet të përdoret si medikament i linjës së parë në rastin e një ataku akut të astmës te fëmijët.

- A) beta2 agonist në rrugë inhalatore
- B) Kortikosteroid per os
- C) beta2 agonist per os
- D) Antihistaminikë per os
- E) beta2 agonist per os dhe bikarbonat natriumi.

Pyetja 21

Të gjitha pohimet e mëposhtme janë tipike për stenozen hipertrofike të pylorit, përveç:

- A) Alkalozës metabolike
- B) Haset më shpesh tek meshkujt
- C) Shfaqet mbas moshës 2-3 javëshe.
- D) Të vjella pa përmbajtje biliare
- E) Të vjella me përmbajtje biliare.

Pyetja 22

Në cilin rast nuk indikohet profilaksia antimeningokoksike?

- A) Kontakte familjare me të sëmurin
- B) Kontakte me të sëmurin në çerdhe gjatë 7 ditëve paraardhëse.
- C) Personeli sanitar që nuk ka pasur ekzpozim të drejtpërdrejt me pacientin.
- D) Subjekte në kontakt të drejtpërdrejt me sekrecionet e pacientit, ose që kanë përdorur objekte të përbashkëta.
- E) Subjekte që kanë fjetur ose ngrënë me pacientin.

Pyetja 23

Hiperplazia gingivale mund të shfaqet tek një pacient i cili merr mjekim me:

- A) Meticilina
- B) Ampicilina
- C) Eritromicina
- D) Diphenylhydantoina
- E) Tetraciklina

Pyetja 24

Cili nga faktorët e mëposhtëm mendohet se lidhet me sindromin e vdekjes së papritur foshnjore (SIDS)?

- A) Luksacionet e lindura
- B) Përdorimi i biberonit
- C) Toksikoza e shtatzanisë
- D) Kardiopatia

E) Pozicioni shtrirë mbi bark

Pyetja 25

Të gjitha sindromat e mëposhtme janë uropati malformative, përveç:

- A) Hipertrofia e klitorisit
- B) Ren polikistik
- C) Hidroureteronefroza
- D) Megaureter obstruktiv primar
- E) Refluksi vezikoureteral

Pyetja 26

Të gjitha komplikacionet e mëposhtme mund të gjenden tek neonati i një mamaje diabetike, përveç:

- A) Ikter
- B) Policitemia
- C) Trauma të lindjes
- D) Anomali kongjenitale
- E) Hernia umbilikale

Pyetja 27

Të gjitha të mëposhtmet janë manifestime ekstraintestinale të alergjive nga ushqimet, përveç:

- A) Dermatit atopik
- B) Onikomikozë
- C) Dhimbjes së kokës
- D) Bronkospazma, kolla e thatë e vazhduar.
- E) Urtikaries

Pyetja 28

Cila është etiopatogjeneza e hernies inguinale te fëmija?

- A) Dobësi e paretit abdominal
- B) Mosmbyllja e processus vaginalis peritonei
- C) Moszbritja e testikutit
- D) Traumë e lindjes
- E) Inflamacion e kanalit inguinal

Pyetja 29

Cili nga markerët e mëposhtëm identifikon pacientin me HBV kronik me risk më të lartë infektimi?

- A) HBeAg
- B) HBsAg
- C) IgM anti- HBc
- D) Antikorpe kundër HBc.
- E) Antikorpe kundër HBs.

Pyetja 30

Cila nga pohimet e mëposhtme është i saktë, për sëmundjen Lyme?

- A) Shkaktohet nga Borrelia vincenti

- B) Shkaktohet nga Adenovirus
- C) Mjekimi kryhet me aminoglikozide.
- D) Artriti është një nga manifestimet e para.
- E) Lëkura është vendndodhja fillestare e infeksionit.

Pyetja 31

N.q.s. një fëmijë ka një gjatësi më të shkurtër se percentili i tretë do të thotë:

- A) Më tepër se 3% e fëmijëve të moshës së tij janë më të shkurtër se ai.
- B) Më pak se 97% e fëmijëve të moshës së tij janë më të gjatë se ai
- C) Më tepër se 97% e fëmijëve të moshës së tij janë më të shkurtër se ai.
- D) Më pak se 3% e fëmijëve të moshës së tij janë më të gjatë se ai.
- E) Më tepër se 97% e fëmijëve të moshës së tij janë më të gjatë se ai.

Pyetja 32

Një vajzë 14 vjeçare, me një histori për hipotireoidizëm ka temperaturë, anoreksi, amenore dhe ikter që persiston prej 4 muajsh. Diagnoza më e mundshme është:

- A) Mononukleozë
- B) Hepatit autoimun
- C) Defiçit i alfa1- antitripsinës
- D) Sëmundje e Wilsonit
- E) Kalkulozë biliare

Pyetja 33

Cila nga sëmundjet e mëposhtme karakterizohet me praninë e petekieve?

- A) Hemofilia klasike
- B) Sëmundja von Willebrand
- C) Purpura thrombocytopenike idiopathike
- D) Mungesë e faktorëve II, VII, IX, X
- E) Mungesa e faktorëve III, VI, VIII

Pyetja 34

Tek latantët me infeksione të rrugëve urinare, manifestimi klinik më i shpeshtë është:

- A) Dizuri
- B) Temperaturë
- C) Polakiuria
- D) Dhimbje të regjionit lumbar
- E) Inkontinenca

Pyetja 35

Të gjitha pohimet e mëposhtme janë të pranishme tek anemia B12 deficitare, përveç:

- A) Ulje e numrit të eritrociteve
- B) MCV e ulur
- C) MCV e rritur
- D) Ulje e Hemoglobinës
- E) Retikulocite të rritura

Pyetja 36

Një fëmijë e moshës 10 muajshe me diarre akute të rëndë dhe dehidratim ka marrë vetëm qumësht të skremuar gjatë dy ditëve të para të diarresë. Cilën është vlera e pritshme e natriemisë?

- A) 102 meq/L
- B) 154 meq/L
- C) 136 meq/L
- D) 142 meq/L
- E) 124 meq/L

Pyetja 37

Infeksioni i rrugëve urinare tek fëmijët është shoqëruar i refluksit vezikoureteral:

- A) 30- 50% të rasteve.
- B) Në 100% të rasteve.
- C) Asnjëherë
- D) Në 98% të rasteve.
- E) Në 2-3 % të rasteve.

Pyetja 38

Cili infeksion tek fëmija nuk shkaktohet nga Streptococcus pneumoniae?

- A) Otiti
- B) Pneumonia
- C) Cistiti
- D) Meningiti
- E) Faringiti

Pyetja 39

Cili nga pohimet e mëposhtme është manifestimi më i shpeshtë i deficitit të alfa1- antitripsinës tek fëmijët?

- A) Kistet pulmonare
- B) Miokarditi
- C) Bronkiti Kronik Obstruktiv
- D) Insuficiencia pankreatike
- E) Cirroza hepatike

Pyetja 40

Cila nga pohimet e mëposhtme është "standarti i artë" për lokalizimin e një testikuli të papalpueshëm në moshën pediatrike?

- A) Eksplorimi laparoskopik
- B) Rx direkte e abdominit
- C) Rezonanca magnetike
- D) TAK (Tomografia Aksiale e kompjuterizuar)
- E) Ekzaminimi objektiv

Pyetja 41

Një fëmijë me sindromën Down, ka rrezik të rritur për:

- A) Malformacione të aparatit urogenital.
- B) Malformacione kardiake
- C) Malformacione të aparatit digjektiv.
- D) Malformacione cerebrale.
- E) Infeksione

Pyetja 42

Të gjitha simptomat dhe shënjat e mëposhtme bëjnë pjesë tek kriteret e madhore te Johns' it për diagnozën e sëmundjes rheumatike, përveç:

- A) Eritema marginatum
- B) Karditi
- C) Korea
- D) Artralgi
- E) Nodule subkutane

Pyetja 43

Apendiciti akut te fëmija është arsyeja më e shpeshtë e abdomenit akut:

- A) Vetëm tek latantët
- B) Jo
- C) Po
- D) Vetëm tek fëmijët nën moshën 12 muajshe
- E) Vetëm tek fëmija në moshën e pubertetit.

Pyetja 44

Cili është shkaktari më i shpeshtë i gastroenteritit akut në moshën pediatrike, në vendet e industrializuara,

- A) E. coli
- B) Rotavirusi
- C) Salmonella spp.
- D) Adenovirusi
- E) Lamblia intestinale

Pyetja 45

Të gjithë të dhënat laboratorike të mëposhtme janë karakteristike për aneminë feriprive, me përjashtim të:

- A) Ulje e nivelit të hekurit në serum
- B) Kapacitet i lidhjes së hekurit i rritur
- C) Ulje e nivele të feritinës në serum.
- D) Eritrocite mikrocitike
- E) Ulje e protoporfirinës eritrocitare të lirë

Pyetja 46

Cila nga thënie e mëposhtme për vaksinën kundër thruthit është e saktë:

- A) Aplikohet te neonati.
- B) Nuk aplikohet te fëmijët e nënave diabetike.
- C) Nuk aplikohet te prematurët.

- D) Nuk aplikohet te subjektet alergjike.
- E) Aplikohet në moshën 15 muaj.

#### Pyetja 47

Një nënë që i jep gji foshnjës së saj 3 muajshe, diagnostikohet me mastit të gjirit të majtë. Gruaja nuk e di nëse duhet të vazhdojë t'i japi gji fëmijës. Cila është këshilla më e mirë që mund t'i jepni kësaj nënë?

- A) Të ndërpresë menjëherë gjirin fëmijës, sepse mund të infektohet.
- B) Të vazhdojë të japi gji duke përdorur të dy gjinjtë.
- C) Të vazhdojë të japi gji vetëm me gjirin e djathtë.
- D) Të ndërpresë menjëherë gjirin fëmijës, sepse ajo do të fillojë të marrë antibiotikë.
- E) Të kalohet në ushqim artificial.

#### Pyetja 48

Cila nga sindromet e mëposhtme nuk manifestohet me shtat të shkurtër:

- A) Sindromi Turner
- B) Akondroplazia
- C) Sindrom Noonan
- D) Hypokondroplazia
- E) Sindrom De Soto

#### Pyetja 49

Cila nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë për vaksinimin antipneumokoksik:

- A) Kryhet mbas moshës 2 vjeç
- B) Kryhet duke filluar nga mosha 2-3 muajshe me vaksinë të konjuguar.
- C) Kryhet duke filluar nga mosha 3 muajshe me cdo tip vaksine.
- D) Nuk rekomandohet.
- E) Kryhet vetëm tek femrat.

#### Pyetja 50

Një fëmijë e moshës 12 vjeç shfaqet me lodhje, dhimbje gryke, dobësi, Temperaturë, hepatosplenomegali, limfadenopati të gjeneralizuar diagnostikohet me një mononukleozë të shkaktuar nga virusi Epstein- Barr. Të gjitha komplikacionet e mëposhtme mund të s

- A) Anemi aplastike
- B) Encefaliti
- C) Hepatit kronik aktiv.
- D) Rupturë e lienit
- E) Mieliti transvers

#### Pyetja 51

Një fëmijë 4 vjeç paraqet fecE)ne sasi të shtuar (abondante), me ere të rënde dhe me përmbajtje yndyrore. Diagnoza më e mundshme është:

- A) Semundja celiaki
- B) Giardiasis
- C) Deficit i laktazes
- D) Fibroze kistike
- E) Hipotiroidizem



Pyetja 52

Cila nga karakteristikat e mëposhtëme është tipike për konvulsionet febrile të thjeshta:

- A) Kriza të gjeneralizuara në rast rritje të Temperaturës trupore në fëmijët e cdo moshë.
- B) Kriza parciale pa humbje të ndergjegjes.
- C) Kriza toniko-klonike të gjeneralizuara në rastet e episodeve febrile në fëmijët nga moshën 6 muaj në 5 vjeç.
- D) Kriza të gjeneralizuara në fëmijët me deficite neurologjike të evidentuara gjatë Temperaturës.
- E) Risk i lartë për të zhvilluar epilepsi në të ardhmen.

Pyetja 53

Te gjitha pohimet e mëposhtëme që lidhen me infeksionin HBV gjatë shtatëzisë dhe periudhës neonatale janë të vërteta, përveç:

- A) Vaksina anti HBV është e kundër indikuar në shtatëzani, pavarësisht gjendjes serologjike të nënës.
- B) Rreth 70-90% e të porsalindurve të infektuar me HBV do të bëhen bartës kronik të HBsAg.
- C) Skema e rekomanduar për vaksinimin dhe profilaksinë pasive për HBV të të porsalindurit ndryshon në varësi të gjendjes serologjike të nënës.
- D) Vaksina kundër hepatitit B është universalisht e rekomanduar për të gjithë të porsalindurit në termë.
- E) Infeksioni paralindës me HBV mund të çojë në të ardhmen në zhvillimin e një carcinome hepatoqelizore.

Pyetja 54

Cila nga diagnozat është më e mundshme në një fëmijë 3 vjeç me të dhëna hematologjike të mëposhtëme: HB 11.5 g/dl, MCV 60, eritrocite  $5,5 \times 10^6$ ?

- A) Sëmundje kronike
- B) Mungesë në vit B12
- C) Mungesë hekuri
- D) Mungesë në acid folik
- E) Profil talasemik

Pyetja 55

Cili test është gjerësisht i përdorur për të monitoruar terapinë me heparinë?

- A) Koha e pjesshme e tromboplastinës (aPTT)
- B) Koha e trombinës (TT)
- C) Dozimi i një faktori specifik
- D) Numrimi i trombociteve
- E) Koha e protrombinës (PT)

Pyetja 56

Cila nga gjendrat limfatike është më shpesh e prekur në limfomën Hodgkin?

- A) Limfonodujt laterocervikal
- B) Limfonodujt inguinal
- C) Limfonodujt aksilar
- D) Limfonodujt ilo-mediastinal
- E) Limfonodujt lumboaortal

Pyetja 57

Cila nga shenjat apo simptomat e mëposhtme mund të mungojë në një të porsalindur me meningit?

- A) Temperaturë
- B) Rigiditeti nukal
- C) Kriza convulsive
- D) Te vjella
- E) PCR e rritur

Pyetja 58

Një latant 7 muajsh që paraqet të qara intermitente, të vjella dhe fece me mucus dhe gjak ka nevojë për:

- A) Koprokulture dhe solucione gluko-elektrolitike
- B) Trajtim me prokinetike
- C) Rx direkte abdomeni dhe barium enema
- D) Rx me kontrast (barium test)
- E) Pozicion antirefluks

Pyetja 59

Parvovirusi B19 shkakton:

- A) Sëmundjen VI
- B) Mononukleozën infektive
- C) Sëmundjen V
- D) Ekzantema subitum
- E) Sëmundja e IV

Pyetja 60

Vlerat e hematokritit në lindje janë :

- A) 25-35%
- B) mbi 85%
- C) 70-85%
- D) 65-85%
- E) 45-65%

Pyetja 61

Hematuria asimptomatike në moshat shkollore është prezente në:

- A) 0,5-2% të femijeve
- B) 0-0.1% të femijeve
- C) 3-5 % të femijeve
- D) 5-10% të femijeve
- E) 8-15% të femijeve

Pyetja 62

Cila nga alternativat e mëposhtme mund të jetë nderlikim i interventit kirurgjikal të hernies inguinale të lindur tek fëmijët ?

- A) Një infeksion i rrugëve urinare

- B) Gastroektazi jatrogjene
- C) Retension urinar
- D) Një kist ne duktusin tireo-gloss
- E) Atrofi testikulare jatrogjene

Pyetja 63

Per te arritur te ashtequajturen Imunitetin ne komunitet ( herd)immunity ) është e nevojshme te vaksinohet:

- A) 50% e popullates receptive
- B) >90% e popullates receptive
- C) 70% e popullates receptive
- D) >80 % e popullates receptive
- E) >60 % e popullates receptive

Pyetja 64

Nga cila prej deficiteve ushqimore te mëposhtëme janë te kercenuar latantet e ushqyer vetem me qumesht dhie ?

- A) Deficit ne folate
- B) Deficit ne vit B6
- C) Deficit ne vit E
- D) Deficit/mungese ne vit A
- E) Deficit ne thiamine

Pyetja 65

Ne diagnozen definitive te sepsis neonatal, cila nga alternativat e mëposhtëme është vendimtare per vendosjen e diagnozes?

- A) Pozitiviteti i hemokultures
- B) Simptomatologjia e organit
- C) Eritrosedimenti
- D) Temperatura
- E) Pergjigjja klinike gjate antibiotiko-terapise

Pyetja 66

Cila nga sëmundjet e trashgueshme ka një kuader klinik qe karakterizohet nga infeksione te shpeshta dhe deficit te aftesisë se neutrofileve per te shkaterruar bakteret e fagocituara?

- A) Semundja granulomatoze kronike
- B) Semundja Wilson
- C) Fibroza kistike
- D) Agamaglobulinemia
- E) Neutropenia kongenitale

Pyetja 67

Një te porsalinduri i behet një ekzaminim objektiv. Cila nga shenjat nuk sugjeron per ndryshime patologjike?

- A) Akrocianoze
- B) Frekuenca respiratore=70/min

- C) Sufel sistolik I lehte 1-2/VI
- D) Hepar 2cm nen harkun brinjor
- E) Zona te pigmentuara ne nivelin lumbosakral

Pyetja 68

Te gjitha pohimet rreth infeksionit te Hemofilus influenza tipi b janë të vërteta përveç:

- A) I identifikueshem ne mikroskop pas ngjyrimit me Gram
- B) Godet kryesisht fëmijët mbi 7 vjeç
- C) Mund te shkaktoje celulit
- D) Toksoidi tetanik sherben si proteine conjuguese per vaksinen.
- E) Është pergjyegjes per epiglottitin

Pyetja 69

Te gjitha pohimet e mëposhtëme janë të vërteta ,përveç:

- A) Fontanela e perparme mbyllet ne vitin e pare te jetes
- B) Fontanela posteriore mbyllet në moshën 3mujore
- C) Fontanela e perparme (anteriore) është e gjere ne rastet me hipotiroidizem
- D) Fontanela e perparme mbyllet me vonese ne rakitizem
- E) Fontanela e perparme mbyllet me shpejt ne hipertiroidizem

Pyetja 70

Një fëmijë 15 muajsh paraqet kolle paroksizmale e shoqëruar me te vjella. Trajtimi me Cilënnga medikamentet e mëposhtëme mund te jape rezultatet terapeutike me te mira?

- A) Ampiciline
- B) Cefaclor
- C) Eritromicine
- D) Kortikosteroid
- E) Rimfapicine

Pyetja 71

Një fëmijë 10 vjeç ka kaluar një infektion te rrugeve te siperme respiratore para 5 ditesh, është trajtuar me aspirine si antipiretik dhe gjendja dukej e permirësuar. Tani shtrohet në urgjencë me Temperaturë, te vjella profuze dhe letargji. Ne ekzaminimin ob

- A) Hepatit A (HAV)
- B) Hepatit I shkaktuar nga barnat
- C) Mononukleoza infective
- D) Sindromi Reye
- E) Sindromi Gilbert

Pyetja 72

Te gjitha shenjat dhe simptomat e mëposhtëme janë tregues te dehidrimit akut ne fëmijë, përveç?

- A) Hipertension
- B) Oliguri
- C) Renie ne peshe >10%
- D) Tharje e mukozave dhe lekures
- E) Somnolence, asteni

Pyetja 73

Cilat nga psindromat e mëposhtme është shkaku kryesor i insuficiences respiratore te fëmijët obeze ?

- A) Pneumotoraksi
- B) Apnea e gjumit
- C) Insuficienca cardiake congestive.
- D) Astma
- E) Refluksi gastroezofageal.

Pyetja 74

Cilat nga etapat e mëposhtme te zhvillimit psikomotor karakterizojnë një fëmijë 10 muajsh?

- A) Te ecurit
- B) Te ulet vetem dhe te ngrihet ne kembe duke e ndihmuar
- C) Te shkarraviturit me një laps
- D) Te folurit
- E) Te ndertoje një kulle me 2-3 kuba

Pyetja 75

Cila nga anomalite e mëposhtme kardiovaskulare është me shpesh e hasur ne sindromin Williams?

- A) Stenoze aortale supravulvulare
- B) Prolaps I valvules mitrale
- C) Difekt ne septumin atrio-ventrikular
- D) Koarktacion aorte
- E) Stenoze e a.pulmonare

Pyetja 76

Ne traumat e heparit, cila nga të dhënate mëposhtme diagnostike mund te perdoret?

- A) Cistografia
- B) Urografia
- C) Klizem me barium.
- D) TAC cerebrale
- E) Ekografia abdominale

Pyetja 77

Te gjitha pohimet e mëposhtme shkojne me diagnozen e sindromit Turner ne një paciente adoleshente, përveç?

- A) Kariotipi 45,X
- B) Stature e shkurter
- C) LH e rritur dhe FSH e ulur
- D) Amenorre primare
- E) Koarktacion I aortes

Pyetja 78

Një adoleshent ve re një mase ne forme qese jo te dhimbshme ne anen e majte te skrotumit. Cila nga diagnozat e mëposhtme është me e mundshme?

- A) Hidrocele
- B) Epididimit
- C) Varikocele
- D) Torsion I testikulit
- E) Torsion I appendix testis (hydatid Morgagni)

Pyetja 79

Cili është "standarti I arte" , per diagnostikimin se sëmundjes se Hirschprung?

- A) Ph-Metria
- B) Klizma opake
- C) Manometria anorektale.
- D) Echografi abdominale
- E) Biopsia rektale

Pyetja 80

Një nene sjell fëmijën 4 vjeçar tek pediatri sepse ka hemorragji nga hundet cdo dite, një gjakederdhje e vazhdueshme ne sasi te paket nga nares dexter.Cila nga mundesite e mëposhtme është shkaku me i shpështë i epistaksit ne popullaten pediatrike?

- A) Rinit alergjik
- B) Semundja Von Willebrand
- C) Zakoni I te futurit te gishtave ne hunde
- D) Purpura trombocitopenike idiopatike
- E) Angiofibrome nasale

Pyetja 81

Nena e një latanti 2 muajsh është e shqetesuar nga një artikull ne gazete qe flet per SIDS (Sindromi I vdekjes se papritur) dhe pyet cilet janë faktoret e riskut për këtëpatologji.Te gjitha indikimet qe i jep nënës janë të vërteta ,përveç?

- A) Ushqyerja artificial
- B) Hipertermia ambientale
- C) Duhanpirja e nënës ne shtatëzani
- D) Anamneze familjare positive per raste te meparshme me SIDS
- E) Qendrim permbyos ose anash jo i sigurte gjate nates

Pyetja 82

Cili është shkaku me i shpështë I hipoglicemise ne një femije<1vjeç?

- A) Malabsorbimi
- B) Hipopituitarizem
- C) Hipoglicemia këtotike
- D) Deficiti enzimatik I neoglukogenezes
- E) Hiperinsulinizem

Pyetja 83

Te gjitha pohimet e mëposhtme mbi renien ne peshe ne ditet e para te jetes janë korrekte ,përveç?

- A) Mund te jete deri ne 15% ne prematuret.

- B) Vjen nga humbja e shprehur e mekoniumit dhe lengjeve
- C) Pësia e lindjes duhet të rrekuperohet brenda ditës së 5 të jetës
- D) Vjen nga mungesat relative kalorike në 2-3 ditët e para
- E) Konsiderohet fiziologjike një humbje rreth 10% të peshës së lindjes

#### Pyetja 84

Diagnoza e sëmundjes Werdnig-Hoffman është shumë e mundshme në një fëmijë me hipotoni të rëndë që manifestohet me Cilën prej shenjave të mëposhtme?

- A) Reflekset tendinoze të thella normale
- B) Fashikulacion (dridhje) e gjuhës
- C) Konvulsione
- D) Temperatura të herëpas'herëshme
- E) Atrofi e nervit optik

#### Pyetja 85

Gjaku komplet i një pacienti tregon ulje të vëllimit korpuskular dhe ulje të numrit të retikulocitëve. Cila nga diagnozat e mëposhtme është më e mundshme?

- A) Anemia ferriprive.
- B) Talasemia major
- C) Anemia në sëmundjet kronike
- D) Profil talasemik
- E) Anemia nga deficit i acidit folik

#### Pyetja 86

Një fëmijë 3-vjeç paraqet temperaturë 39°C, rigiditet nukal prej 3 ditësh. Në ekzaminimin objektiv vëhet re hiperemi e farinksit, shtim të konsistencës së limfonodujve cervical anterior dhe posterior si dhe rritje të rezistencës gjatë fleksionit të qafës. M

- A) Tampon faringeal dhe peniciline për 10 ditë nga goja
- B) Test për anticorpet heterofile
- C) Tampon faringeal dhe peniciline për 7 ditë nga goja
- D) Punksioni lumbar
- E) Tampon faringeal, formulë leukocitare dhe rivleresim pas 24 orësh

#### Pyetja 87

Të gjithë faktorët e mëposhtëm janë të përfshirë në patogenezën e bronkodisplazisë, përveç:

- A) Infeksioni
- B) Infekti i parakohshëm.
- C) Prematuritet
- D) Oksigjenoterapia
- E) Ventilimi mekanik

#### Pyetja 88

Një vajzë 9 vjeçe ishte në gjendje shëndetësore shumë të mirë para 10 orësh, kur filloi të shfaqte letargji, të vjella, të qara intermitente me retraktim të gjymtyrëve të poshtme në nivel të barkut. Në qendrën ambulatorë defekoi fecë me pak gjak dhe xhela

- A) Stenoze pilori
- B) Invaginim intestinal
- C) Infeksion I rrugeve urinare
- D) Apendisitis
- E) Ulçer duodenale

Pyetja 89

Vleresimi klinik per te percaktuar pikezimin Apgar behet ne :

- A) 1min,3min ,6min
- B) 1min,5min,10min
- C) 1min,6min ,8min
- D) 3min,6min,9min
- E) 3min,10min,20min

Pyetja 90

Traumat abdominale mund të jenë shkak i abdomenit akut:

- A) Po, gjithmone
- B) Vetem nese shoqerohen me trauma kraniale
- C) Po, ndonjehere
- D) Vetem nese shoqerohen me trauma torakale
- E) Vetem ne prani te frakturave te gjymtyreve te poshtem

Pyetja 91

Cila nga pohimet e mëposhtme mbi sindromin Berger është korrekte:

- A) Nivelet serike te C3 janë te ulura
- B) Depozitimet mezangiale janë kryesisht te perbera nga IgG
- C) Është me e shpështë ne femra
- D) Proliferimi mezangial është I dokumentuar ne mikroskop optic
- E) Trajtimi nuk mund te behet me imunosupresore

Pyetja 92

Cila nga shenjat e mëposhtme është e nevojshme per te bërë një diagnoze te ADHD (crregullim i hiperaktivitetit dhe deficit i vemendjes):

- A) Impulsivitet
- B) Paaftesi per te mesuar
- C) Shfaqje para moshes 10 vjeç?
- D) Anamneze per trauma ne lindje
- E) Moter/vella me diagnoze te ADHD

Pyetja 93

Një fëmijëme fibroze kistike ka pneumoni te shkaktuar nga Staphylococcus aureus. Femija pa pritur ben një detres respirator, zbehje te zhurmave respiratore ne anen e majte te toraksit dhe devijim te trakese ne te djathte. Cila nga pohimet e mëposhtme është

- A) Emfizeme
- B) Versament pleuritik
- C) Infarkt pulmonar.



- D) Sindrom i detressit respirator tek I rrituri
- E) Rupture e një pneumatocele nën trysni

Pyetja 94

Cili është "shkaku më i shpeshtë në hipotiroidizmin juvènile?

- A) Mungesa në jod
- B) Tiroiditi subakut
- C) Tiroiditi Hashimoto
- D) Struma e thjeshtë
- E) Karcinoma tiroidiene

Pyetja 95

Cili nga barnat e mëposhtëm mund të shkaktojë rash morbiliform në mononukleozën infektive?

- A) Meticilina
- B) Tetraciklina
- C) Eritromicina
- D) Ampicilina
- E) Difenilhydantoina

Pyetja 96

Një fëmijë 3 vjeç paraqet temperaturë, rash kalimtar, artrit, hepatosplenomegali, versament perikardiak, eritrosedimentacion të rritur, leukocitozë, neutrofil. Cila nga alternativat e mëposhtëme është më e mundshme?

- A) Ethe reumatizmale acute
- B) Artrit reumatoid juvènile
- C) Lupus eritematoz sistemik (LES)
- D) Semundja Lyme
- E) Spondiliti ankilozant

Pyetja 97

Cila nga karakteristikat klinike të mëposhtëme është tregues i një urgjence neurologjike-neurokirurgjike në një fëmijë me cefalë akute?

- A) Prania e shenjave neurologjike shoqeruese
- B) Lloji I dhimbjes
- C) Prania e fotofobisë
- D) Intensiteti I dhimbjes
- E) Zgjatja e dhimbjes

Pyetja 98

Cila nga këto crregullime elektrolitike është tipike për fibrozën kistike?

- A) Acidoza metabolike
- B) Alkalozë e kompensuar
- C) Alkalozë hiperkloremike
- D) Alkalozë hipokloremike
- E) Acidozë respiratore

Pyetja 99

Cila nga gjendiet pasuese karakterizon sindromin TURNER?

- A) Hirsutizmi
- B) Vonese mendore
- C) Incidence e larte per sëmundje autozomike
- D) Incidence e larte per hipotiroidizem congenital
- E) Risk I larte per obezitet

Pyetja 100

Një latant tre javësh prezanton mikrocefali, kalcifikime cerebrale ne radiografine e kokes dhe verberi. Cila nga patologjite e mëposhtme është me e mundshme per te shpjeguar këto simptoma?

- A) Hemoragji subdurale bilaterale
- B) Agenezi cerebrale
- C) Eritroblastoze
- D) Infeksion nga citomegalovirusi
- E) Mikrocefali primitive

Pyetja 101

Cila nga anomalite kongenitale te mëposhtme haset me shpesh?

- A) Mielomeningocele
- B) Palatoskizi
- C) Fokomelia
- D) Hipospadia
- E) Deformime te kembeve

Pyetja 102

Cila nga pohimet e mëposhtme duhet ndjekur se pari ne ekzaminimet e femijes me traume te kraniumit?

- A) Inspeksion dhe palpacion te kokes
- B) Anamneze mbi rrethanat e traumes
- C) Kontroll i ekuilibrit acido-bazik
- D) Vlersimi i funksioneve jetesore
- E) Radiografi e kafkes

Pyetja 103

Per një rritje normale ne gjashte muajt e pare te jetes, cila nga vlerat e mëposhtme është me afer marrjes ditore te rekomanduar te proteinave?

- A) 0.2 g/kg
- B) 1.0 g/kg
- C) 10.0 g/kg
- D) 5.0 g/kg
- E) 2.0 g/kg

Pyetja 104

Cila nga manifestimet e mëposhtme do të pritej të gjendej në një fëmijëgjashte muajsh me një defekt të madh të septumit ventricular?

- A) Cianoze
- B) Predominim të hipertrofise së ventrikulit të djathtë në EKG.
- C) Zhurme e vazhdueshme
- D) Ulje të vaskularizimit pulmonar në radiografi
- E) Zemer e zmadhuar

Pyetja 105

Cila është neoplazia malinjë më e shpësthtë tek fëmijët me të vegjel se pesëmbëdhjetë vjeçe?

- A) Leukemia
- B) Neuroblastoma
- C) Morbus HODGKIN
- D) Retinoblastoma
- E) Hepatoblastoma

Pyetja 106

Një bebe mashkull lindi në javën e tridhjetë e nëntë të shtatzanisë me një peshë trupore 4500g. Të gjitha pohimet e mëposhtme mund të jenë shkak, përveç:

- A) Sindromi i Beckwith-Wiedman (hipoglicemia nga hiperinsulinemia, makroglosia etj)
- B) Diabet mellitus i nënës
- C) Pirja e duhanit nga nëna
- D) Hidrops fetal
- E) Predispozite gjenetike

Pyetja 107

Shkaku më i shpësthtë i hipotiroidizmit congenital tek fëmijët është:

- A) Hipotiroidizem sekondar
- B) Deficit hipotalamik i TRH
- C) Defekt në hormonogjenezë
- D) Diskinezia glandular
- E) Mungesa e jodit

Pyetja 108

Të gjitha shkaqet e mëposhtme janë pohime korrekte për anemine megaloblastike përveç:

- A) Malabsorbim intestinal
- B) Rezekcion i gjysmës distale të ileumit
- C) Dieta vegjetariane integrale
- D) Përdorim i zgjatur i trimetoprimës
- E) Hemoragji gastrointestinale

Pyetja 109

Si vihet diagnoza e sëmundjes së Celiakisë?

- A) Dozim i antiorpeve anti-Gliadine
- B) Me biopsi duodenale
- C) Dozimi i antiorpeve anti-Transglutaminaze

- D) Me vleresimin e HLA
- E) Dozimi i antikorpeve anti-muskulature te lemuar

Pyetja 110

Cila nga kombinimet e mëposhtme është me i pershtashem per per një fëmijështate vjeç i diagnostikuar prej një viti me diabet melitus tipi pare ?

- A) Hipoglicemiant oral dhe diete hipokalorike
- B) Insulinoterapi dhe permbajtje e larte fibrave ne diete
- C) Insulinoterapi me diete te balancuar normokalorike
- D) Insulinoterapi dhe perjashtim i sheqernave nga dieta
- E) Insulinoterapi ose antidiabetik oral dhe diete hiperproteinike

Pyetja 111

Ne cilat nga patologjite e mëposhtme indikohet perdorimi i naloksonit:

- A) Sindrome bipolare
- B) Depresion
- C) Abuzimi nga droga
- D) Skizofrenia
- E) Eneurezis

Pyetja 112

Cila nga manifestimet e mëposhtme)karakterizon sindromin e X-te thyeshem

- A) Vonese mentale
- B) Plage qe sherohen me veshitiresi
- C) Fraktura multiple te kockave te gjata
- D) Testikuj te vegjel
- E) Infeksione bakteriale rekurente

Pyetja 113

Terapia kirurgjike ne hernien inguinale tek femija konsiston ne .

- A) Mbyllje te kanalit umbilikal
- B) Vendosje te patchit ne zonen ehernies
- C) Mbyllje te unazes inguinale te jashtme
- D) Mbyllje te kanalit pertoneo-vaginal
- E) Vendosje te patchit ne skrotum

Pyetja 114

Prania e cianozes ne lindje mund te jete pasoje e te gjitha shkaqeve te mëposhtme përveç:

- A) Tetrades Fallot
- B) Transpozicionit te eneve te medha te gjakut
- C) Hipertension pulmonar persistem
- D) Atrezi trikuspidale
- E) Duktus arterioz hapur

Pyetja 115

Ne hernien inguinale te inkarceruar mund te pasohet me nje:

- A) Një splenektomi
- B) Një gastroektomi
- C) Një nefroektomi
- D) Një gonadoektomi
- E) Një vezikostomi

Pyetja 116

Trajtimi këtoacidozes diabetike perfshin te gjitha masat e mëposhtme përveç:

- A) Dhenia e insulines sukutan nese femija ushqehet
- B) Dhenies se insulines ne fazat e para me 0.1 unite per kg ne ore
- C) Infuzionit te glukozes 5% ne rruge intravenoze nese glicemia është me e vogel se 250 mg/dl
- D) Dhenies se parakohshme te kaliumit nese ka acidoze
- E) Dhenies se bikarbonatit nese ph është me i vogel se 7.15

Pyetja 117

Diarreja akute te latantet duhet te trajtohet me:

- A) Antibiotike
- B) Probiotike
- C) Prebiotike
- D) Rehidrim endovenoz
- E) Rehidrim oral

Pyetja 118

Një fëmijë5 vjeç vjen pasi është vizituar per një faringit akut dhe pas marrjes se tamponi faringeal per mbjellje trajtohet me amoksiciline. Ne harkun kohor 24-48 ore,ai zhvillon një egzanteme dhe tamponi faringial rrezulton negative. Cila nga dg e mëpos

- A) Skarlatine
- B) Semundja Kawasaki
- C) Sëmundje e "gjashte"
- D) Mononukleoze
- E) Purpura Schonlein-Henoch

Pyetja 119

Cila nga sëmundjet e mëposhtme është shkaku me i shpështë i malabsorbimit te fëmijët e moshes shkollore?

- A) Divertikuli meckelit
- B) Semundja e crohnit
- C) Fibroza kistike
- D) Celiakia
- E) Koloni irritable

Pyetja 120

Një fëmijë4 javësh paraqitet qe prej 10 ditesh me perkeqesim te te vjellave te cilat janë jobiliare. Ka uri, është aktiv dhe ka renie ne peshe.Cila nga dg e mëposhtme është me e mundshme?

- A) Stenoze hipertrofike e pilorit
- B) Obstruksion i zorres se holle
- C) Gastroenetrir
- D) Invaginacion
- E) Neoplazi cerebrale

Pyetja 121

Komplikacioni me i shpështë i një etheje reumatizmale te patrajtuar ose te trajtuar jo mjaftueshem është:

- A) Kardiopati kronike
- B) Insuficensa renale
- C) Vonese ne stature
- D) Uveitis
- E) Artropati kronike

Pyetja 122

Te gjitha pohimet e mëposhtme janë të vërteta ne lidhje me pneumonine nga Mycoplazma pneumonie, përveç:

- A) Manifestohet me Temperaturë, dhimbje fyti dhe kolle te thate.
- B) Rezultat normal i rruazave te bardha te gjakut qarkulluese
- C) Prezenca e aglutinit ne te ftohte te serumit
- D) Radiografi e toraksit me infiltracion te 1 ose 2 lobeve se bashku
- E) Është me e shpështë në moshën parashkollore

Pyetja 123

Një djale 14 vjeç qe luan shpesh basketboll, sillet ne pediatri per calim dhe dhimbje ne gju. Dhimbja forcohet nga vrapi , kercimet, ngjitja e shkalleve. Tuberoziteti tibial është i enjtur por pa grumbullim te likidit sinovial apo prezenca te trashjes se

- A) Semundja e Pertes
- B) Renie e epifizes se kokes se femurit
- C) Artriti septic i gjurit
- D) Semundja Osgood Schlatter
- E) Kondromalacia e kupes se gjurit

Pyetja 124

Një fëmijë 4 vjeç ka Temperaturë 40 grade celcius prej 4 ditesh. Egzaminimi objektiv paraqet konjuktivit, rash eritematoz, adenopati cervikale dhe edeme te duarve dhe kembeve. Egzaminimet laboratorike tregojne leukocitoze me predominim te leukociteve, tr

- A) Sindromi Kawasaki
- B) Ethe reumatizmale
- C) Periarterit nodoz
- D) Lupus eritematoz i diseminuar
- E) Skarlatina

Pyetja 125

Një djale 8 vjeç me zona multiple alopecie. Ne ekzaminim me llampen e Wood-it shihet një fluoroshence blu ne te verdhe. Cili nga patogjenet është me i mundshem?

- A) Mikrosporom canis
- B) Epidermophyton floccosum
- C) Candida albicans
- D) Tricophyton tonsurans
- E) Aspergillus

Pyetja 126

Femija 1 vjeç peshon:

- A) 13-14 kg
- B) 9-11 kg
- C) 16-17 kg
- D) 19-20 kg
- E) 8-9 kg

Pyetja 127

Një latant qe paraqitet ne gjendje te mirë shendetsore, kohet e fundit ka vuajtur nga një infeksion nga rotavirusi. Pas rehidrimit oral, vazhdon riushqyerjen me formulen standart qe perdorte para fillimit te diarese. Sa here qe merr qumesht prezanton di

- A) Deficit sekondar i laktazes
- B) Insuficienca pankreatike
- C) Deficit primari disaharidases
- D) Sindromi i zorres se shkurter
- E) Alergji ndaj proteinave te qumeshtit te lopes

Pyetja 128

Një fëmijëme tumor te fosa krani posterior, ankohet per dyfishim te pamjes. Egzaminimi i levizjeve te syve tregon strabizmus. Paraliza e cilit muskul është me e mundshme?

- A) Paralize e m oblique superior
- B) Paralize e m rectus superior
- C) Paralize e m oblique inferior
- D) Paraliza e m rectus medialis
- E) Paralize e m rectus lateralis

Pyetja 129

Zgjidh agjentin me te shpështë përgjegjës per sepsisin neonatal:

- A) Streptokoku b-hemolitik I gr A
- B) H. influenzae tipi B
- C) Stafilokoku aureus
- D) Streptokoku b-hemolitik gr-B
- E) N. meningitidis

Pyetja 130

Te gjitha teknikat e mëposhtme përdoren per ekzaminimin e RGE përveç'.

- A) Testi i urese ( Breath test )
- B) Manometria ezofageale
- C) Ph metria ezofageale
- D) Shintigrafia me technecium radioaktiv
- E) Kalueshmerise me Ba

Pyetja 131

Cili është shkaku , me i shpësthtë i hematurise mikroskopike?

- A) Sindromi nefritik
- B) Tu renal
- C) Traume renale
- D) Një koagulopati
- E) Infeksion i rrugeve urinare

Pyetja 132

Cili nga defektet e traktit gastrintestinal shoqerohet me shpesh me malformacione kardiake?

- A) Stenoza e pilorit
- B) Volvulus congenital
- C) Semundja e Hirshprungut
- D) Gastroskiza
- E) Omfalocele

Pyetja 133

Divertikuli i Meckelit është i vendosur.

- A) Ne ileum 20-40 cm nga valvula ileo cekale
- B) Ne rectum
- C) Ne ileum 120cm nga valvula ileo cekale
- D) Ne kolon
- E) Ne ezofag

Pyetja 134

Vleresimi i rritjes dhe zhvillimit është themelor tek femija .Te gjitha pohimet e mëposhtme janë të vërteta, përveç.

- A) Permasat e peshes dhe gjatesise tek neonati janë te lidhura me potencialin gjenetik
- B) Ne një vjeç femija zakonisht trefishon peshen e lindjes
- C) Një fëmijëne 7 muaj mund te qendroje ulur
- D) Cirkumferenca e kraniumit ne 2 vjeç ka arritur 90% te circumferences se te rriturit.
- E) Ne 3 vjeç femija mashkull ka arritur 1/2 e gjatesise se moshes se rritur

Pyetja 135

Zgjidh sëmundjen me te pershtatshme e cila manifestohet me zgjatje te kohes se hemorragjise dhe rritje te kohes se tromboplastines parciale.

- A) Purpura trombocitopenike idiopatike
- B) Mungesa e faktoreve II,VII,IX,X
- C) Hemofilia klasike
- D) Semundja e von Willenbrandit



E) Mungesa e faktoreve III , VI,VIII

Pyetja 136

Hidrocela ne dalje te kanalit peritoneo-vaginal nese nuk zgjidhet spontanisht duhet te operohet.

- A) Ne pubertet
- B) 15 ditet e para te jetes
- C) Pas pubertetit
- D) Pas 5 vjetesh
- E) Rreth 12 muajve

Pyetja 137

Cili nga agjentet e mëposhtëm është shkaku me i shpësthtë i otitit te mesem pas periudhes neonatale?

- A) S.aureus
- B) S. pneumoniae
- C) Mycoplasma pneumoniae
- D) E.coli
- E) Streptococcus gr A

Pyetja 138

Cila nga pohimet e mëposhtme është shkaku me i shpësthtë i hidronefrozes pielike tek femija.

- A) Refluks veziko ureteral
- B) anomali vazale
- C) Kalkuloze
- D) Stenoze ne nivel te bashkimit pieloureterale
- E) Valvules se uretres posteriore

Pyetja 139

Cila nga sëmundjet e mëposhtme kerkon izolimin e femijes .

- A) Ekzanteme kritike
- B) Varicele
- C) Pozitivitet per Hiv
- D) Purpura Schonlein Henoch
- E) Mononukleoze infektive

Pyetja 140

Cila nga pohimet e mëposhtme është e vertete per artritin rheumatoid juvenil?

- A) Forma pauciartikulare e tipit te dyte është elidhur me pranine e genotipi HLAB27
- B) Sëmundje e Still është me e shpësthtë te femrat
- C) Iridocikliti gjendet me shpesh ne formen poliartikulare.
- D) Forma me e shpësthtë është ajo pauciartikulare e tipit te dyte.
- E) Sacro- ileiti gjendet me shpesh ne formen poliartikulare me faktor rheumatoid pozitiv.

Pyetja 141

Te gjitha pohimet më poshtëper sa i perket Luksacionit coxo-femoral kongenital janë të vërteta, përveç:

- A) Ne shumicen e rasteve është e nevojshme korigjimi me nderhyrje kirurgjikale.
- B) Ne ekzaminimin objektiv mund te gjendet disproporcion ne gjatesine e gjymtyreve dhe asimetri e plikes kutane gluteale.
- C) Një shenjë objektive mund te jete ajo e Ortolanit, qe është vleresimi i një kliku i paluar ne rotacionin ekstern dhe abduksionin e kycit.
- D) Diagnoza zakonisht mund te konfirmohet me ekzaminim ultrasonografik
- E) Si faktoret gjenetike dhe ata jo gjenetike janë te rëndesishem ne patogenezen e sëmundjes

Pyetja 142

Një fëmijë3 vjeç, gellitit te pakten 40 kompresa Fe-sulfat 300mg secila qe përmbajnë 60 mg Fe elementar. Cila nga shfaqjet e mëposhtme ështëme pak e mundur?

- A) Vomitus dhe diarre
- B) Acidoza
- C) Kolapsi cirkulator
- D) Insuficienca renale
- E) Insuficienca hepatike

Pyetja 143

Një fëmijë15 muaj ka anemi mikrocitare nga mungesa e hekurit, rezistente ndaj trajtimit me hekur. Fecet e tij janë në mënyrë të përsëritur pozitive per gjak okult. Prinderit e sjellin fëmijën në urgjencë pasi kanëvene re gjak nga rektumi të pashoqëruarme

- A) Invaginacioni
- B) Ulçera duodenale
- C) Divertikuli Meckel
- D) Volvulus
- E) Koliti Ulçeroz

Pyetja 144

Ne traumat e shpretkes, cila nga metodat diagnostike mund te perdoret:

- A) Cistografia
- B) Urografia
- C) Klizma me barium
- D) TAC)i trurit
- E) Ekografia abdominale

Pyetja 145

Cila nga shenjat është shumë e nevojshme ne diferencimin e M. Crohn nga Koliti Ulçeroz?

- A) Hemorragjia rektale
- B) Abseset e kripteve
- C) Eritema nodoze
- D) Perfshirja e ileumit
- E) Kolangiti

Pyetja 146

Një djalë 12 vjeç, paraqet vështirësi progresive në shkolle, me ikter kronik që zgjat prej 6 muajsh. Të dhënalaboratorike tregojnë hipertransaminazemi modeste, anemi hemolitike, glukozuri. Diagnoza më e mundshme është:

- A) Hepatit kronik B
- B) Semundja Wilson
- C) Sindroma Reye
- D) Galaktozemia
- E) Glikogjenozat

Pyetja 147

Cilat prej infeksioneve, ka periudhën e inkubacionit më të gjatë të foshnjës?

- A) Parotiti
- B) Rubeola
- C) Fruthi
- D) Eritema infektive (semundja e 5-të)
- E) Varicela

Pyetja 148

Për të nxitur maturimin e pulmoneve në rastin e lindjeve premature përdoren:

- A) Hormonet e tiroides
- B) Antibiotiket
- C) Surfaktant ekzogjen
- D) Kortizoniket
- E) Growth factor (GH)

Pyetja 149

Limfadenopatia retro-nukale është karakteristike e:

- A) Infeksion nga HIV
- B) Semundja e gervishtësë së macës
- C) Mononukleoza
- D) Adeniti tuberkular
- E) Rubeola

Pyetja 150

Cila nga terapitë do të këshillohej për një fëmijë lindur në term me nivel bilirubine mbi 36 oresh, prej 24mg/dl

- A) Hidratimi
- B) Eksanguinotransfuzion
- C) Fototerapia
- D) Terapitë me barbiturate
- E) Infuzion i albumines

Pyetja 151

Cili nga tumoret takohet me shpesh ne testikulin kriptorkidik?

- A) Teratoma
- B) Embrionalkarcinoma
- C) Seminoma
- D) Tumor i qelizave Sertoli
- E) Tumor i qelizave Leydig

Pyetja 152

Aftesia per te kopjuar forma zhvillohet sipas një rradhe te caktuar. Cila nga këto është rradha e duhur?

- A) Kopjon 1 kuadrat,1 kryq,1 rreth
- B) Kopjon 1kuadrat,1 rreth,1 kryq
- C) Kopjon 1kryq,1 rreth,1 kuadrat
- D) Kopjon 1 rreth,1 kryq,1 kuadrat
- E) Kopjon 1 rreth,1kuadrat,1kryq

Pyetja 153

Hidrocela është:

- A) Një grumbullim pusi ne nivelin skrotal
- B) Një dilatacion i ventrikujve cerebral
- C) Një grumbullim likidi seroz ne vaginen propria te testikutit
- D) Një shfaqje ekzanteme
- E) Një sëmundje infektive

Pyetja 154

Cili nga tumoret solide është me i shpeshti tek foshnjt?

- A) Tumori Wilms
- B) Teratoma
- C) Rabdomiosarkoma
- D) Sarkoma Ewing
- E) Neuroblastoma

Pyetja 155

Nena e Anes një vajzë 3 vjeçare, ju paraqet ekzaminimin rutine te gjakut komplet te vajzës, si me poshte: Hb 12; MCV 75; ERS10; RB 10900; N 37%,L 48%, PLT 200000. Çfarë mendoni?

- A) Ka një infeksion probabilisht viral
- B) Ka parametra hematologjike brenda kufijve te normes per moshen
- C) Ka një leucemi limfoblastike akute (LLA)
- D) Ka një anemi mikrocitare
- E) Ka një infeksion probabel bakterial

Pyetja 156

Te gjitha pohimet e mëposhtme janë të vërteta per sa i perket ekzaminimit objektiv te neonatit, me perjashtim te:

- A) Shenja e Babinski shpesh mund te evidentohet gjate vizites.
- B) Retraksioni i toraksit anterior ne inspirim është i zakonshme

- C) 50% e neonateve japin një imazh i ketrik ne pamje
- D) Refleksi i kapjes është normalisht prezent tek neonati
- E) Frekuenca kardiake mesatare e neonatit është 100-110/min

Pyetja 157

Te gjitha pohimet janë të vërteta)persa i perket hiperbilirubinemise neonatale, përveç:

- A) Te neonati ne term dhe nje mund të përdoret si fototerapia ashtu dhe eksanguinotransfuzioni
- B) Bilirubina është potencialisht toksike per SNQ
- C) Rreth 1,1-2% te femijeve te ushqyer me gji zhvillojne ikter nga qumeshti i nënës
- D) Ka një korelacion te drejte midis nivelit serik te bilirubines dhe ikterit nuklear.
- E) Fototerapia mund te reduktoje nivelet e bilirubines serike te fëmijët me ikter jo hemolitik

Pyetja 158

Cili nga medikamentet është përgjegjës per ritjen e nivelit serik te Teofilines?

- A) Penicillina
- B) Sulfisoxazol
- C) Cefalotina
- D) Eritromicina
- E) Gentamicina

Pyetja 159

Interventi per korigjimin e hernies inguinale duhet te kryhet:

- A) Kur femija arrin peshen trupore 5 kg
- B) Ne varesi te rastit
- C) Kur femija mbush moshen 6 muaj
- D) Kur femija arin peshen trupore 10 kg
- E) Si urgjence ne momentin e paraqitjes

Pyetja 160

Sa është cirkumferenca kraniale e neonatit?

- A) 60 cm
- B) 35 cm
- C) 40 cm
- D) 30 cm
- E) 55 cm

Pyetja 161

Cili organ demtohet vecanerisht ne fenilkëtonuri?

- A) Veshka
- B) Truri
- C) Zemra
- D) Melcia
- E) Mushkeria

Pyetja 162

Pasojat nga infeksioni me Toxoplasma mund të jenë

- A) Kardiopatia
- B) Hidrocefalia
- C) Hepatopatia
- D) Shurdhim
- E) Keqformime te artikulacioneve

Pyetja 163

Ne S. Turner cila nga shenjat ose simptomat mungon?

- A) Gjatesia e shkurter
- B) Steriliteti
- C) Prapambetje mendore
- D) Coxa vara
- E) Pterigium koli

Pyetja 164

Cila është gjatesia e femijes ne lindje

- A) 40 cm
- B) 55 cm
- C) 70 cm
- D) 60 cm
- E) 50 cm

Pyetja 165

Çfarë është semundja e Celiakise

- A) Intolerance permanente ndaj orizit
- B) Intolerance tranzitore ndaj Glutenit
- C) Hipersensibilitet ndaj Glutenit
- D) Intolerance sekondare ndaj Glutenit
- E) Intolerance permanente ndaj Glutenit

Pyetja 166

Ne cilën moshe mund të përdoret vaksina anti-Papillomavirus?

- A) Ne lindje
- B) Në moshën 12 vjeç
- C) Në moshën 8 vjeç
- D) Në moshën 6 vjeç
- E) Në moshën 10 vjeç

Pyetja 167

Cili serotip i meningokokut nuk është ende prezent ne vaksinat qe ndodhen ne treg?

- A) C
- B) A
- C) W-135
- D) B
- E) Y

Pyetja 168

Një fëmijë normal i shëndetshëm në moshën 1 vjeç peshon:

- A) 8-9 kg
- B) 10-11 kg
- C) 7-8 kg
- D) 11-12 kg
- E) 12-13 kg

Pyetja 169

Ne depistimin e hipotiroidizmit congenital çfarë dozojme?

- A) GH
- B) T3 e T4
- C) 17OH Progesteron
- D) FSH e LH
- E) TSH dhe/ose T4

Pyetja 170

Cila mund të jete një nga pasojat e një infeksioni invaziv nga Streptococcus Pneumoniae?

- A) Glomerulonefriti
- B) Encefaliti
- C) Karditi
- D) Meningiti
- E) Artriti

Pyetja 171

Cili është shkaku i sëmundjes hemoragjike të porsalindurit?

- A) Deficienca e vit K
- B) Deficienca e vit E
- C) Deficienca e vit D
- D) Deficienca e vit C
- E) Deficienca e Acidit folik

Pyetja 172

Kur një neonat percaktohet si me peshe sheme të ulet në lindje (VLBW)?

- A) <1000gr
- B) <2000gr
- C) <1500gr
- D) < 2500gr
- E) <500gr

Pyetja 173

Një fëmijë 5 vjeç vuan për her të dyte nga meningiti meningokoksik. Cili është ekzaminimi më i mirë që duhet bërë?

- A) Percaktimi i nivelit të imunoglobulinave

- B) Ekzaminimi i subpopullatave limfocitareT.
- C) Testet e hipersensibilitetit te vonuar kutan
- D) Matja sasiore e testit te NBT ( Clorur Nitroblu tetrazolit)
- E) CH50

Pyetja 174

Një fëmijë8 vjeç shtrohet per shfaqjen e konvulsioneve. Cila nga shfaqjet e mëposhtëme do te mbështëste me shumë një diagnoze te konvulsioneve parciale komplekse (psikomotore)

- A) Statusi mental normal,koshjent dhe pergjigjet gjate konvulsioneve
- B) Një faze e shpejte toniko-klonike
- C) Statusi mental normal,koshjent dhe qe pergjigjet mbas konvulsioneve
- D) Modeli EEG karakterizuar nga trase maje- vale,3/sec
- E) Automatizmat

Pyetja 175

Ne një neonat diagnostikohet Aniridia. Cili nga egzaminimet e mëposhtme duhet te kryhet tek ky femije?

- A) ECHO renale
- B) Matja e alfa fetoproteines
- C) Percaktimi i funksionit renal
- D) Egzaminimi i testikujve
- E) Radiografia torakale

Pyetja 176

Një fëmijë2 vjeç është e plogesht dhe e zbehte. Ju kryeni një gjak komplet dhe zbuloni se femija ka anemi megaloblastike. Cila e dhene ne anamneze shpjegon kete suate?

- A) Ha vetem produkte te ritura organikisht
- B) Ka mare shumë antibiotike per trajtimin e otitis media
- C) Ka mare fototerapi ne periudhen neonatale
- D) Pi vetem qumesht dhie
- E) Është fëmijëe lindur nga një nene diabetike

Pyetja 177

Një fëmijë 5 vjeç me Artrit Juvenil Idiopatik Pauciartikular ka ANA+ (antikorpet anti-nukleare). Cila nga më poshtëdo te ishte gjetja me e mundeshme për këtë rast?

- A) Perikarditi
- B) Nefriti
- C) Linfadenopatia
- D) Splenomegalia
- E) Uveiti

Pyetja 178

Një adoleshente 16 vjeç ka obezitet te shprehur. Cila nga situatat më poshtë përfaqëson shkakun me te shpësthtë te insuficiences respiratore ne adoleshentet obeze?

- A) Apnea e gjumit



- B) Refluksi gastro-ezofageal
- C) Insuficienca kardiake kongjestrive
- D) Astma
- E) Pneumotoraksi

Pyetja 179

Një fëmijë 18 muajsh ka anemi mikrocitare. Cila nga të dhënat anamnestike shpjegon më mirë shkakun e saj?

- A) Pica
- B) Marrja e sasive të mëdha të qumështit të lopes të paholluar.
- C) Futja e pamjaftueshme në diete të lengjeve të frutave
- D) Marrja e sasive të mëdha të vit. C
- E) Mungesa në diete të perimeve të fresketa

Pyetja 180

Një neonat 2-javësh paraqet apne. Fëmija kishte lindur në term pas një shtatzanie të pakomplikuar. Nena e fëmijes kishte rinorhea dhe kolle, të cilat i kishin filluar para 3 javësh dhe tani ka një kolle të shpësthtë e persistente me të vjella pas aksesëve të

- A) Ceftriaxone
- B) Amoxicilline
- C) Amantadine
- D) Vancomicine
- E) Azitromicine

Pyetja 181

Një foshnjë 14-muajsh ka një histori me diarre intermitente për 4 muaj. Shpesh ka defekime shkarkuese që përmbajnë pjesëza ushqimore. Rritet mirë dhe ekzaminimi objektiv është normal. Cili është hapi që duhet ndjekur më tej?

- A) Të përkruhen antidiarretike orale
- B) Koprokulture
- C) Vlerësim cilesor i imunoglobulinave serike
- D) Vlerësim cilesor i yndyrnave në fece
- E) Të qetesohen prinderit

Pyetja 182

Një vajzë 12 muajsh është diagnostikuar me eritroblastopeni tranzitore infantile. Cili nga pohimet është i sakte?

- A) Trajtimi me kortikosteroide zakonisht është i perzgjedhur
- B) Zakonisht nuk ka shërim spontan
- C) Zakonisht është e pranishme hepatosplenomegalia
- D) Mund të jete i nevojshëm transfuzion eritrocitar
- E) Semundja lidhet me infeksionin nga parvovirus

Pyetja 183

Në një latant me hipotoni dyshohet diagnoza Werdnig-Hoffman. Cila nga shenjat e mëposhtme mbështet diagnozën?

- A) Reflekse te thella tendinoze normale
- B) Fashikulacione te gjuhes
- C) Konvulsione
- D) Episode febrile rekurente
- E) Atrofi e nervit optik

Pyetja 184

Një vajzë 12 vjeç ka dobësi muskulare gjatë javës së fundit. Ka një rash eritematoz në fytyrë, krahe, kofshë dhe një rash retikular në palpebrat superiore. Cili do të ishte ekzaminimi më i mirë për t'u kryer?

- A) Matja e kreatinine kinazes serike
- B) Eritrosedimenti
- C) Analize urine
- D) Faktor reumatoid
- E) Antikorp të antinukleare

Pyetja 185

Cilën anomali hematologjike duhet të dyshosh të një neonat me mungesë bilaterale të radiusit?

- A) Limfopenia
- B) Anemia
- C) Neutropenia
- D) Pancitopenia
- E) Trombocitopenia

Pyetja 186

Një djalë 14 muaj paraqet ekzeme grave, një anamnezë me otit rekurent dhe infeksion të gjinjve, trombocitopeni. Cila është mënyra e trashëgimit të kësaj patologjie?

- A) Lidhje me kromozomin X
- B) Autozomike recesive
- C) Autozomike dominante
- D) Mutacion i rastësishëm
- E) Multifaktoriale

Pyetja 187

Një neonat u diagnostikua me hipoparatiroidizëm kongenital. Cila nga më poshtëka mundësi të gjendet më shpesh gjatë vlerësimit të tij?

- A) Mikrocefalia
- B) Hiponatremia
- C) Hiperkalemia
- D) Kandidoza
- E) Gogësia

Pyetja 188

Cili është kriteri i çrregullimit të të mesuarit?

- A) Mungesë lidhjeje mes inteligjencës dhe rendimentit në një apo më shumë fusha.
- B) Ngatërrim i shkrimit të shkronjave.

- C) Mungese e problemeve emocionale apo te sjelljes.
- D) Inteligjence mbi mesatare.
- E) Defiçit ne perceptimin vizual apo auditiv.

Pyetja 189

Një djale 12 vjeç vuan nga artriti migrant, me artikulacione te skuqur, te nxehte, te enjtur. Paraqet serologji per infeksion recent me streptokok gr A. Ne këto kushte artriti karakterizohet:

- A) Sherohet pa shkaktuar deformime
- B) Zakonisht jo i dhimbshem
- C) Shfaqet pasi zhduket temperatura
- D) Shfaqet vetem ne pacientet qe kanë edhe kardit
- E) Perfshin ne te njejtën menyre artikulacionet e medha dhe te vogla

Pyetja 190

Një nene sjell fëmijën 10 vjeç te mjeku sepse është e shqetesuar per zhurmat e përsëritura qe ai ben. Nena zbulon se djali kishte patur episode te tilla disa vite me pare. Djali pershkruhet si hiperaktiv dhe nuk është ne gjendje te kontrolloje impulset e

- A) Paralize.
- B) Zjarrvenie dhe keqtrajtim i kafsheve.
- C) Enureze nokturne.
- D) Refuzon te shkoje ne shkolle nga frika e te qenit i braktisur.
- E) Episode intermitente me fjale te keqjia.

Pyetja 191

Një 4 vjeçar nuk ka zhvillim fizik normal dhe ka Të dhënaper insuficence pankreatike ekzokrine. Cili është shkaku me i mundshem i ketyre shfaqjeve klinike?

- A) Pankreatit akut
- B) Sindroma e Swachman-Diamond
- C) Atrezi biliare
- D) Mungesa kongenitale e pankreasit
- E) Fibroza kistike

Pyetja 192

Ne një vajzë 2 vjeç dyshohet per tumor cerebral. Ajo ka ataksi, ligjerate te ruajtur, te vjella heret ne mengjes. Cili nga pohimet rreth tumoreve cerebrale te fëmijët është i sakte?

- A) Pjesa me e madhe shfaqen ne vitin e pare te jetes.
- B) Tumoret cerebrale paraqesin një forme te rralle te neoplazive te fëmijët .
- C) Hipertensioni endokranial është i rralle nder shenjat e shfaqjes se tumorit.
- D) Konvulsionet paraqesin shenjen me te shpështë te shfaqjes se tumorit ne pjesen me te madhe te rasteve.
- E) Pjesa me e madhe e tyre lokalizohen ne linea mediana dhe/ose poshte tentoriumit.

Pyetja 193

Një 12 vjeçare ka ikter, tremor progresiv dhe labilitet emocional. Cilënnga më poshtëmund te gjesh me shpesh gjate ekzaminimit objektiv?

- A) Cirkumferenca e kokes është mbi percentilin 95

- B) Shurdhim konduktor bilateral
- C) Ngjyrim i kornese ne te verdhe te erret
- D) Limfadenopati e gjeneralizuar
- E) Floke ne fovea sakrale

Pyetja 194

Një neonat 38 javësh lindi nga një nene me diabet gestacional. Peshë e lindjes është 4255g. Çfarë pritet të gjendet më shpesh te ky neonat?

- A) Kardiomegali
- B) Sindroma e kolonit të shkurter të majte.
- C) Difekt i tubit neural
- D) Hidronefroze
- E) Displazi renale

Pyetja 195

Një 2 vjeçar ka një masë abdominale voluminoze dhe pancitopeni. Cila nga diagnozat e mëposhtme mund të vertetohet me mielogramë?

- A) Hepatoblastome
- B) Rabdomiosarkome
- C) Karcinome me qeliza renale
- D) Neuroblastome
- E) Tumori Wilms

Pyetja 196

Një 6 vjeçare ka konjunktivit unilateral jopurulent, jo i dhimbshëm me limfadenit preaurikular. Cili është shaktari më i mundshëm?

- A) Mycobacterium avium
- B) Chlamydia trachomatis
- C) Adenovirus spp.
- D) Staphylococcus aureus
- E) Bartonella henselae

Pyetja 197

Një vajzë me displazi fibrotike të kockave dhe pigmentim jonormal të lekures diagnostikohet me një patologji e cila lidhet edhe me një nga manifestimet e mëposhtme:

- A) Anemia.
- B) Pubertet prekoks.
- C) Shurdhim.
- D) Neurofibrome multiple.
- E) Glomerulonefrit kronik.

Pyetja 198

Një fëmijë normal 6 muajsh paraqet një zhurmë kardiake të vazhdueshme me puls periferik të tensionuar. Cili do ishte hapi i rradhes?

- A) Vleresim i kariotipit.
- B) Qetesimi i prindërve.

- C) Profilaksi kardiake gjate jetes per procedura te caktuara.
- D) Ekzaminim kontrolli në moshën 12 muaj.
- E) Korigjim i defektit permes kirurgjise ose kateterit.

Pyetja 199

Ne qendren shendetsore ku punon, je duke ndjekur një pacient me Kraniosinostoze dhe malformacion te kokes e fytyres. Cilin malformacion tjetër kongenital ka me shumë mundesi te gesh te ky pacient?

- A) Malformacion te trakese dhe ezofagut.
- B) Malformacion kardiak.
- C) Malformacion te traktit genito-urinar.
- D) Malformacion te kolones vertebrale.
- E) Malformacion te ekstremiteteve.

Pyetja 200

Një 14 vjeçare vuan nga cefale progresive. Ne ekzaminim objektiv vihet re edeme papilare bilaterale. CT e kokes rezulton normale. Cili duhet te jete ekzaminimi i rradhes?

- A) CT e orbitave.
- B) Rezonance magnetike e kokes.
- C) Punksion lumbar.
- D) Ekzaminim toksikologjik i urines.
- E) Matja e nivelit te beta-HCG.

Pyetja 201

Një fëmijë 8 muajsh ka te vjella dhe te qara per 12 ore. Ne ekzaminim objektiv vihet re një mase ne forme salcice ne kuadratin superior dekster te abdomenit. Cila nga më poshtëdo ishte me e vlefshme?

- A) Inserimi i një sonde nazo-gastrike.
- B) Ekzaminim i feçeve per parazite.
- C) Ekzaminim me klizme bariumi.
- D) Ekografi abdominale.
- E) Hemokulture.

Pyetja 202

Cili ekzaminim është me i rendesishem per t'u bërë te një 2 vjeçar me sindrom Beckwith-Wiedemann dhe me një mase abdominale?

- A) niveli i alfa-fetoproteinave serike
- B) endoskopi gastrointestinale speriore
- C) niveli i katekolaminave ne urine
- D) shintigrafi hepatobiliare
- E) cistouretrografia miksionale

Pyetja 203

Një i porsalindur ka një vonese ne eleminimin e mekoniumit. Radiografia me barium tregon dilatim te kolonit proksimal dhe obstrukcion te kolonit distal. Cili do ishte ekzaminimi i rradhes?

- A) CT abdominale
- B) Ekzaminim i feçeve
- C) Analize kromozomike

- D) Matja e Cl- ne djerse
- E) Biopsi rektale

Pyetja 204

Një fëmijë 2 muajsh ka dispne te rende dhe cianoze. Radiografia e toraksit paraqet kardiomegali minimale dhe pamje retikulare difuze te fushave pulmonare. Cila nga më poshtëshpjegon më mirë këto rezultate?

- A) Miokardit viral akut.
- B) Drenazh jonormal pulmonar me obstrukcion venoz.
- C) Atrezi e arteries pulmonare.
- D) Sindroma e zemres hipoplastike te majte.
- E) Transpozicion i eneve te medha.

Pyetja 205

Një 7 vjeçare ka enureze nokturne sekondare. Cili është ekzaminimi me i mirë per t'u ndjekur?

- A) Analize urine.
- B) Cistouretrografia miksionale.
- C) Radiografia abdominale.
- D) Ekografia renale.
- E) Klirensi i kreatinines.

Pyetja 206

Prinderit e një fëmijë 8 vje? janë te shqetesuar per shtatin e tij te shkurter. Cili është hapi tjetër me i rendesishem?

- A) Percaktimi i indeksit te mases trupore.
- B) Matja e shpejtesise se rritjes.
- C) Matja emoshes kockore.
- D) Matja e stadit te maturimit genital.
- E) Matja e raportit peshe/gjatesi.

Pyetja 207

Cili nga pohimet e mëposhtme është tipik per një konvulsion febril?

- A) Zgjat maksimalisht 15 min.
- B) Shfaqet ne një femer me moshe me pak se 6 muaj.
- C) Paralize Todd post-konvulsive.
- D) Anamneze familjare pozitive per konvulsione febrile ne 40% te rasteve.
- E) Temperaturë jo >38gradë C ne 24 oret e ardhshme.

Pyetja 208

Kolika te latanti është shumë shqetesuese per prinderit. Cili nga pohimet është i sakte?

- A) Kolika zakonisht është e lidhur me ushqimin artificial.
- B) Kolika shfaqet me shpesh te femrat.
- C) Kolika ka prevalence me te larte te fëmijët kaukaziane.
- D) Kolika tipike fillon ne javen 41-42 gestacionale pavarisht moshes gestacionale ne lindje.
- E) Ka studime qe parashikojne temperamentin e femijeve qe kanëvuajtur nga kolika.

Pyetja 209

Persistenca e reflekseve neonatale është tregues i zhvillimit të vonë. Refleksi Moro duhet të zhduket në moshën:

- A) 1-2 muaj
- B) 3-5 muaj
- C) 10-12 muaj
- D) 6-8 muaj
- E) 14-18 muaj

Pyetja 210

Në cilin prej kushteve të mëposhtme gjendet mioze unilaterale?

- A) Marrje e barbiturateve.
- B) Paralize e nervit të tretë.
- C) Tumor që prek nervin optik.
- D) Sindroma Claude- Bernard- Horner.
- E) Retinopati e prematuritetit.

Pyetja 211

Një 8 vjeçar ka hemipareze pas një konvulsioni fokal. Brenda 24 orëve dobësia dhe deficieti neurologjik zhduken. Cila është diagnoza më e mundshme?

- A) Paraliza Todd
- B) Hemiplegji spastike
- C) Encefalit
- D) Tumor nententorial
- E) Hemiplegji nga hemikraniumi përgjegjës

Pyetja 212

Një fëmijëdergohet te pediatri për një vizite kontrolli. Fëmija kalon një objekt nga një dorë në tjetrën, rri ulur, perserit tingujt e të folurës, paraqet përdorim të mirë të gishtit tëregues. Cila është moshë e fëmijes?

- A) 10 muaj
- B) 4 muaj
- C) 6 muaj
- D) 8 muaj
- E) 2 muaj

Pyetja 213

Të folurit është një matës i zhvillimit konjitiv dhe emocional. Me cilën nga situatat është e lidhur vonësia në të folur?

- A) Sindroma Di George
- B) Keqtrajtimit
- C) Diabet
- D) Sindroma Williams- Beuren
- E) Astma

Pyetja 214

Te gjitha pohimet mbi çrregullimin autike janë te sakta, përveç:

- A) Thuhet se shkaku me i shpësthtë është rubeola kongenitale.
- B) Fillimi është para moshës 3 vjeçare.
- C) Fëmijët e prekur kanë sjellje motore stereotipike.
- D) Shumica kanë prapambetje mendore.
- E) Me i shpësthtë te meshkujt se te femrat.

Pyetja 215

Të gjithë faktorët e më poshtëm janë faktor prognostik favorizues në leuçeminë limfoblastike në moshë pediatrike, me përjashtim të:

- A) moshë midis 3 dhe 7 vjeç
- B) gjinia mashkullore
- C) rruazat e bardha < 10.000/mm<sup>3</sup>
- D) hemoglobina < 7 g/dl
- E) trombocite > 100.000/mm<sup>3</sup>

Pyetja 216

Cila shenjë apo simptomë haset fillimisht në kraniofaringeomën tek një fëmijë?

- A) strabzmi
- B) cefalea
- C) ndërprerja e rritjes
- D) vështirësi shikimi
- E) vertigo

Pyetja 217

Divertikuli i Meckel mund të jetë:

- A) simptomatik vetëm në fëmijë meshkuj
- B) asimptomatik
- C) gjithmonë simptomatik
- D) zbulohet vetëm në autopsi
- E) simptomatik vetëm në fëmijë femra

Pyetja 218

Cili prej përbërësve të më poshtëm është në përqëndrim më të madh në qumshin e nënës se sa në qumshin e lopes?

- A) acidet yndyror të polisaturuar
- B) vitaminat
- C) kazeina
- D) laktoalbumina
- E) kriprat minerale

Pyetja 219

Si realizohet diagnostikimi i refluksit gastroezofageal?

- A) me shintigrafi ezofageale
- B) me pH-metri të 24 orëve



- C) me manometri ezofageale
- D) me gastroskopi
- E) me asnjë nga këto mënyra

Pyetja 220

Në rastin e një fëmije me gastroenterit akut çfarë duhet bërë?

- A) realizimi i testeve të alergjisë
- B) vlerësimi i gjendjes të hidratimit dhe ekuilibrit acido-bazik
- C) realizimi i testeve të përthithjes intestinale
- D) fillimi i antibiotikoterapisë
- E) kërkimi për oksalate në feçe

Pyetja 221

Cili nuk është ndërlikim i parotitit?

- A) adenti purulent
- B) pankreatiti
- C) orkiti
- D) gastriti
- E) meningoencefalia

Pyetja 222

Infeksioni nga Mycoplasma pneumoniae mund të jetë shkaktar i të gjitha patologjive të më poshtme me përjashtim të:

- A) bronkitit
- B) bronkiolitit
- C) konjuktivitit
- D) faringotonsilitit
- E) otitit media

Pyetja 223

Për cilën nga sëmundjet e hematologjike pediatrike rekomandohet përdorimi i heparinës si shoqërues gjatë aplikimit të transfuzionit të masave plazmatike të freskëta?

- A) Hemofilia A
- B) KID me trombozë
- C) Sëmundja Von Willebrand
- D) Hemofilia B
- E) Difekt në koagulim pasojë e një hepatopatie.

Pyetja 224

Cilat janë pasojat e rubeolës kongenitale:

- A) anencefalia
- B) kardiopatia
- C) shurdhimi
- D) verbimi
- E) të gjitha

Pyetja 225

Intoleranca ndaj proteinave të qumështit të lopës mund të manifestohet me të gjitha shenjat klinike të poshtë shënuara me përjashtim të:

- A) forma akute manifestohet me diarre dhe të vjella
- B) forma kronike manifestohet me kolit dhe /ose anemi
- C) të vjella dhe acidozë metabolike
- D) ekzemë atopike dhe urtikarie

Pyetja 226

Cila nga këto patologji mund të jetë shkak i një abdomeni akut në një vajzë?

- A) torsioni ovarit
- B) hipertrofi e klitorit
- C) hipotrofi e klitorit
- D) hipertrofi e buzëve të vogla
- E) hipertrofi e buzëve të mëdha

Pyetja 227

Cili është trajtimi i zgjedhur gjatë një ataku astmatik të menjëhershëm në një fëmijë?

- A) beta2-agonist p.o
- B) kortikosteroid p.o
- C) beta2-agonist me rrugë inhalatore
- D) antihistaminik p.o
- E) beta2 agonist p.o shoqëruar me kromoglikane

Pyetja 228

Të gjithë elementët e poshtë shënuar janë karakteristike të hipertrofisë të pilorit me përjashtim të:

- A) alkalozës metabolike
- B) meshkujt preken më shumë se sa femrat
- C) klinika e saj shfaqet pas 2-3 javë jetë
- D) të vjella biliare
- E) të vjella jo biliare

Pyetja 229

Hiperplazia e gingivave mund të jetë e pranishme në një fëmijë i cili përdor:

- A) meticilinë
- B) ampicilinë
- C) eritromicinë
- D) tetraciklinë
- E) difenilidantoinë

Pyetja 230

Të gjitha patologjitë e poshtë shënuara përfaqësojnë keqformime të aparatit urogenital me përjashtim të:

- A) hidroureteronefrozë
- B) veshka polikistike

- C) hipertrofi klitorisi
- D) megaureter
- E) refluksi veziko-uretral

Pyetja 231

Tek një fëmijë i porsalindur nga një nënë diabetike mund të vihen re të gjitha problemet e shënuara më poshtë me përjashtim të:

- A) ikterit
- B) policitemisë
- C) trauma nga lindja
- D) hernie umbelikale
- E) anomali kongenitale

Pyetja 232

Të gjitha alternativat e poshtë shënuara përfaqësojnë shfaqje ekstraintestinale të alergjisë ushqimore, me përjashtim të;

- A) dermatitit atopik
- B) urtikaries
- C) cefalesë
- D) bronkospazmës, kollës të thatë produktive
- E) onikomiykozës

Pyetja 233

Cila është etiopatogjenza e hernies inguinale të fëmija?

- A) muri abdominal i dobët
- B) kriptokirdia
- C) trauma në lindje
- D) inflamacioni i kanalit inguinal
- E) asnjë nga këto

Pyetja 234

Në latantët me infeksione të rrugëve urinare, manifestimi klinik më i shpeshtë është:

- A) temperatura
- B) dizuria
- C) polakiuria
- D) dhimbja në regjionin lumbar
- E) inkontinenca

Pyetja 235

Sindromi McCune-Albright karakterizohet nga, pubertetet prekoks, njolla ngjyrë kafe-qumshti në lëkurë dhe:

- A) neurofibroma multiple
- B) displazia fibroze një kockore
- C) shurdhimi
- D) displazia fibroze shumë kockore
- E) anemia

Pyetja 236

Infeksionet e rrugëve urinare në fëmijë shoqërohen nga refluksi veziko-uretral:

- A) në 100 % të rasteve
- B) në 30-50 % të rasteve
- C) asnjëherë
- D) në 98% të rasteve
- E) në 2-3 % të rasteve

Pyetja 237

Cili është manifestimi më i shpeshtë i defiçitit të alfa 1 antitripsinës në fëmijë?

- A) Cisti pulmonar
- B) Miokarditit
- C) Cirroza hepatike
- D) Insuficienca pankreatike
- E) SPOK

Pyetja 238

Një fëmijë me sindromin Down ka rrezik të lartë për zhvillim të:

- A) malformimeve të aparatit urogenital
- B) malformimeve cerebrale
- C) malformimeve të aparatit gigjestiv
- D) malformimeve të aparatit kardiak
- E) infeksione

Pyetja 239

Në vendet e industrializuara cili është patogjeni më i shpeshtë që shkakton gastroenterit akut në moshën pediatrike?

- A) E.Coli
- B) Salmonella
- C) Rotavirus
- D) Adenovirus
- E) Guardia lamblia

Pyetja 240

Cila nga thëniet e më poshtme është e vërtetë për vaksinën anti-fruth?

- A) aplikohet tek i porsalinduri
- B) aplikohet në muajin e 15-të pas lindjes
- C) nuk aplikohet tek fëmijët e lindur para kohe
- D) nuk aplikohet tek subjektet alergjik
- E) nuk aplikohet tek fëmijët e lindur nga nëna diabetike

Pyetja 241

Një fëmijë 4 vjeç defekon në mënyrë të bollshme me feçe me erë të rëndë dhe me konsistencë vajore. Diagnoza e mundshme në këtë rast do të ishte:

- A) sëmundje celiake
- B) xhardiazë
- C) fibrozë cistike
- D) defiçit i laktozës
- E) hipotiroidizëm

Pyetja 242

Një fëmijë 3 vjeç ka këto të dhëna laboratorike: Hb 11.5 g/dl, MCV 60, Rruaza të kuqe  $5.5 \times 10^6$ . Cila është diagnoza e mundshme?

- A) Sëmundje kronike
- B) Sindrom talasemik
- C) Mungesë hekuri
- D) Mungesë në acid folik
- E) Mungesë në vitaminë B12

Pyetja 243

Cili parametër është me efikas në monitorimin e terapisë me heparinë?

- A) numri i trombociteve
- B) koha e trombinës
- C) dozimi i faktorit specifik
- D) koha e tromboplastinës parciale
- E) koha e protrombinës

Pyetja 244

Cilët limfonoduj preken më shpesh në limfomën Hodking?

- A) Limfonodujt aksial
- B) Limfonodujt inguinal
- C) Limfonodujt laterocervikal
- D) Limfonodujt iliomediastinal
- E) Limfonodujt lumboaortal

Pyetja 245

Cila nga simptomat e më poshtme mungon të njëjti porsalindur me meningit?

- A) temperatura
- B) të vjellat
- C) krizat konvulsive
- D) rigor nukalis
- E) PCR e rritur

Pyetja 246

Vlerat e hematokritit në lindje janë:

- A) 25-35%
- B) 45-65%
- C) 70-85%
- D) 65-80%
- E) mbi 85%

Pyetja 247

Hematuria asimptomatike në moshën shkollore është e pranishme në:

- A) 0-0.1 % të fëmijëve
- B) 0.5-2 % të fëmijëve
- C) 3-5 % të fëmijëve
- D) 5-10 % të fëmijëve
- E) 8-15 % të fëmijëve

Pyetja 248

Cili mund të jetë një ndërlikim i mundshëm madhor në trajtimin kirurgjikal të hernies inguinale kongenitale tek fëmija?

- A) atrofia testikulare jatrogjenike
- B) gastroektazia jatrogjenike
- C) retensioni urinar
- D) infeksion i rrugëve urinare
- E) ciste testikulare

Pyetja 249

Fëmijët e ushqyer vetëm me qumësht dhie, do të paraqesin mungesë të:

- A) vitaminës A
- B) vitaminës B6
- C) vitaminës E
- D) folateve
- E) tiaminës

Pyetja 250

Cila sëmundje e trashëguar ka një kuadër klinik të karakterizuar nga infeksione të herëpashershme dhe paaftësi e neutrofileve për të shkatëruar bakteret e fagocituar?

- A) Agamaglobulinemia
- B) Sëmundja Wilson
- C) Fibroza cistike
- D) Sëmundja granulomatozës kronike
- E) Neutropenia kongenitale

Pyetja 251

Në një fëmijë 40 javësh realizohet ekzaminimi objektiv. Cila nga problemet e poshtë shënuara mund të konsiderohet si patologjike?

- A) akrocianoza
- B) mëlçia 2 cm nën harkun brinjor
- C) zhurmë sistolike e lehtë
- D) frekuenca respiratore=70/min
- E) zona të pigmentuara në nivel të regjionit lumbosakral

Pyetja 252

Një fëmijë 15 muajsh paraqitet me kollë paroksistike të ndjekur nga të vjella. Me cilin bar duhet bërë trajtimi për të përmirësuar situatën?

- A) ampicilinë
- B) cefaklor
- C) kortikosteroid
- D) eritromicinë
- E) rifampicinë

Pyetja 253

Të gjitha shenjat dhe simptomat e më poshtme janë indikator të dehidrimit akut në fëmijë, me përjashtim të:

- A) mukoza dhe lëkura e thatë
- B) oliguria
- C) rënia në peshë > 10 %
- D) hipertensioni
- E) përgjumja, astenia

Pyetja 254

Cili është shkaku më i shpeshtë i insuficiencës respiratore në fëmijët obez?

- A) pneumotoraksi
- B) refluksi gastro-ezofageal
- C) insuficienca kardiake kongjitive
- D) astma
- E) apnea e gjumit

Pyetja 255

Cila nga etapat e zhvillimit psikomotor është karakteristik në një fëmijë 10 muajsh?

- A) ecja
- B) e folura
- C) zhgaravinat me laps
- D) të ulet lehtësisht dhe të ngrihet me ndihmën e dikujt
- E) të ndërtojë një kullë me 2-3 kuba

Pyetja 256

Cila nga këto anomali kardiake është më e shpeshtë në sindromën Williams?

- A) difekti i septumit atrioventrikular
- B) prolapsi i valvulës mitrale
- C) stenoze aortale supravulvulare
- D) koartacion i aortës
- E) stenoze i valvulës pulmonare

Pyetja 257

Në traumat e mëlçisë cili ekzaminim diagnostik mund të përdoret?

- A) cistografia
- B) urografia
- C) ekografia abdominale

- D) skaner i kokës
- E) skaner i barku

Pyetja 258

Të gjithë elementët e më poshtëm janë karakteristik për sindromën e Turner, me përjashtim të:

- A) kariotipi 45 X
- B) shtati i shkurtër
- C) amenorre primare
- D) LH e rritur dhe FSH e ulët
- E) koartacion i aortës

Pyetja 259

Cili është ekzaminimi kryesor në diagnostikimin e sëmundjes Hirschprung?

- A) Ph-metria
- B) skaneri
- C) biopsia rektale
- D) ekografia abdominale
- E) manometria anorektale

Pyetja 260

Cili është shkaku më i shpeshtë i hipoglicemisë në një fëmijë <1 vjeç:

- A) hiperinsulinemia
- B) hipopituitarizmi
- C) hipoglicemia ketotike
- D) defiqiti enzimatik i neoglukogjenezës
- E) malabsorbimi

Pyetja 261

Të gjithë elementët e më poshtëm janë të përfshirë në patogjenezën e bronkodisplazisë, me përjashtim të:

- A) infeksioneve
- B) prematuritetit
- C) ikterit të parakohshëm
- D) oksigjenoterapisë
- E) ventilimit mekanik

Pyetja 262

Një fëmijë prej 9 muajsh paraqitet me letargji, të vjella, të qara të vazhdueshme, mbledhje të gjymtyrëve të poshtme mbi bark. Prindrit referojnë se fëmija ka 10 orë me këto ankesa. Në ambulator evidentohen feçe xhelatinoze të ngjyrosura në të kuqe. Diagn

- A) stenoze pilorike
- B) apendisit
- C) infeksion i rrugëve urinar
- D) invaginacion intestinal
- E) ulçer duodenale



Pyetja 263

Vlerësimi klinik për të pëcaktuar pikëzimin Apgar duhet realizuar në cilën minutë?

- A) 1 min, 3 min, 6 min pas lindjes
- B) 1 min, 6 min, 8 min pas lindjes
- C) 1 min, 5 min, 10 min pas lindjes
- D) 3 min, 6 min, 9 min pas lindjes
- E) 3 min, 10 min, 20 min pas lindjes

Pyetja 264

Cili është shkaku më i shpeshtë i hipotiroidizmit në moshat e reja?

- A) mungesa e jodit
- B) tiroiditi subakut
- C) gusha endemike
- D) tiroiditi Hashimoto
- E) karcinoma e tiroides

Pyetja 265

Një fëmijë 3 vjeç paraqitet me temperaturë rash kutan, artrite, hepatosplenomegali, versament perikardial, eritrosediment të rritur dhe formulë leukocitare me shumë neutrofile. Cila është diagnoza më e mundshme?

- A) Ethe reumatizmale
- B) Lupus eritematoz sistemik
- C) Artrit reumatoid juvenil
- D) Sëmundja Lyme
- E) Spondilit ankilozant

Pyetja 266

Sa është vizusi i në një të porsalindur

- A) 10/10
- B) 5/10
- C) 8/10
- D) 3/10
- E) 1/10

Pyetja 267

Cila përfaqëson një element të veçantë për sindromën Turner?

- A) Hirsutizmi
- B) Prapambetja mendore
- C) Rritje e rrezikut për obezitet
- D) Rritje e incidencës të hipotiroidizmit kongenital
- E) Rritje të incidencës për aptologji autoimune

Pyetja 268

Një foshnje 3 javshe paraqitet me mikrocefale, kalçifikime cerebrale të evidentuar në radiografi të kraniumit, verbim. Cila nga patologjitë e shënuara i përgjigjet këtyre simptomave?

- A) Hemorragjia subdurale bilaterale
- B) Agenezia cerbrale
- C) Infeksionet nga citomegalovirus
- D) Eritroblastoza
- E) Mikrocefalia primitive

Pyetja 269

Cila është anomalia kongenitale që takohet më shpesh?

- A) Mielomeningocela
- B) Hipospadia
- C) Fokomelia
- D) Palato skizis
- E) Pes equinus

Pyetja 270

Për një rritje optimale sa është saisa e proteinave që duhet të marri në ditë një fëmijë në 6 muajt e parë të jetës?

- A) 0.2 g/kg
- B) 1 g/kg
- C) 2 g/kg
- D) 5 g/kg
- E) 10 g/kg

Pyetja 271

Cila nga këto neoplazi haset më shpesh në moshat nën 15 vjeç:

- A) sëmundja Hodking
- B) neuroblastoma
- C) leuçemia
- D) retinoblastoma
- E) hepatoblastoma

Pyetja 272

Një foshnje lind në javën e 39 të shtatzanisë me një peshë 4500 g. Të gjitha situatat e shënuar më poshtë mund të jenë shkak i kësaj lindje me përjashtim të:

- A) sindromi Beckwith Weidman (hipoglicemia nga hiperinsulinemia, makroglosia etj)
- B) duhanpirja nga nëna gjatë shtatzanisë
- C) dieabeti mellitus i nënës
- D) hidropsi fetal
- E) predispozita gjenetike

Pyetja 273

Shkaku më i shpeshtë i hipotiroidizmit kongenital në fëmijë është:

- A) disgenezi e gjendrës tiroide
- B) defiqiti hipotalamik i TRH
- C) difekti në prodhim të hormoneve
- D) hipotiroidizmi sekondar

E) mungesa në jod

Pyetja 274

Veshka polikistike është një anomali renale:

- A) elindur
- B) e fituar ose e lindur
- C) e fituar
- D) e fituar vetëm në femra
- E) e fituar vetëm në meshkuj

Pyetja 275

Si vendoset diagnoza në sëmundjen e celikaisë?

- A) duke dozuar antitruapat anti-gliadinë
- B) duke dozuar antitruapat anti-IgG
- C) duke dozuar antitruapat anti-transglutaminazë
- D) me vlerësimin e HLA
- E) duke marrë biopsi duodenale

Pyetja 276

Trajtimi i duhur i një fëmije 7 vjeç i diagnostikuar që prej 1 viti me diabet mellitus tip 1 është:

- A) hipogliceminat oral dhe dieta hipokalorike
- B) insulinoterapi dhe dietë normoklaorike e ekuilibruar
- C) insulinoterapi dhe dieta me përmbajtje të lartë të fibrave
- D) insulinoterapi dhe dieta pa sheqer
- E) insulinoterapi ose hipoglicemiant oral

Pyetja 277

Përdorimi i naloxonit indikohet në:

- A) sëmundjet bipolare
- B) depresionin madhor
- C) eneurezën
- D) skizofreni
- E) abuzim me drogën

Pyetja 278

Në trajtimin e hernies inguinale të stranguluar mund të jetë e nevojshme që të realizohet edhe:

- A) gonadektomia
- B) gastroektomia
- C) nefroektomia
- D) vezikëektomia
- E) splenoektomia

Pyetja 279

Diarreja akute në foshnje duhet të trajtohet me:

- A) antibiotikë

- B) antiemetik
- C) antiviral
- D) rehidrim oral
- E) rehidrim endovenoz

Pyetja 280

Cili është shkaku më i shpeshtë i malabsorbimit kronik në një fëmijë në moshë shkollore?

- A) Divertikuli Mekel
- B) Sëmundja Chron
- C) Celiakia
- D) Fibroza cistike
- E) Sindromi i zorrës të irrituar

Pyetja 281

Në fund të vitit të parë të jetës një fëmijë normal duhet të peshojë:

- A) 9-11 kg
- B) 13-14 kg
- C) 16-17 kg
- D) 19-20 kg
- E) 8-9 kg

Pyetja 282

Shkaktari më i shpeshtë i sepsis neonatal është:

- A) streptokoku beta hemolitik i grupit A
- B) streptokoku beta hemolitik i grupit B
- C) stafilokoku aureus
- D) H.Influenzae tip B
- E) N. Meningitis

Pyetja 283

Shkaku më i shpeshtë i hematurisë makroskopike tek fëmija është:

- A) sindroma nefritike
- B) tumori renal
- C) infeksioni i rrugëve urinare
- D) koagulopatia
- E) trauma renale

Pyetja 284

Divertikuli i Mekelit vendoset në:

- A) rektum
- B) në ileus 20-60 cm nga valvula ileocecale
- C) në ileus 120 cm nga valvula ileocecale
- D) në kolon
- E) në ezofag

Pyetja 285

Si parandalohen ndërlikimet me natyrë reumatizmale të fruthit:

- A) me anë të izolimit të fëmijës të infektuar
- B) me përdorimin e penicilinës çdo 10 ditë
- C) me përdorimin e amplicilinës çdo 6 ditë
- D) me anë të vaksinimit në masë
- E) asnjë nga këto

Pyetja 286

Hidrocela duhet të operohet patjetër deri në:

- A) pubertet
- B) 15 ditë pas lindjes
- C) në muajin e 12-të
- D) pas 5 vitesh
- E) pas pubertetit

Pyetja 287

Cili është shkaku më i shpeshtë i otiti pas lindjes?

- A) S.pneumonie
- B) S.aureus
- C) Mycoplasma pneumonie
- D) E.coli
- E) Streptokoku i grupit A

Pyetja 288

Sa është indeksi Apgar në një të porsalindur me frekuncë kardiake 110/min, respiracion të ngadaltë dhe të çrregullt, lëkurë me ngjyrë rozë dhe ekstremitete lehtësisht të ngjyrosura në blu?

- A) 3
- B) 4
- C) 6
- D) 8
- E) 10

Pyetja 289

Cila nga këto sëmundje kërkon që fëmija të mbahet i izoluar ?

- A) varicela
- B) ekzantema
- C) HIV pozitiv
- D) Purpura Schonlein Henoch
- E) Mononukleozë infektive

Pyetja 290

Disleksia është:

- A) vonesë në të folur
- B) vonesë në të kuptuar të fjalëve që diagnostikohet në moshën 6 vjeç
- C) vështirësi specifike në kuptimin e materialit të lexuar në mungesë të një defiçiti konjitiv

- D) problem dëgjimor
- E) problem psikologjik

Pyetja 291

Cila nga këto sëmundje ka periudhën më të gjatë të inkubimit?

- A) Rubeola
- B) Parotiti
- C) Fruthi
- D) Varicela
- E) Mononukleoza

Pyetja 292

Në rastin e lindjes para kohe, induktimi i maturimit të mushkërisë realizohet me;

- A) Kortizonik
- B) Antibiotik
- C) Surfaktant
- D) Hormone tiroide
- E) Growth factor

Pyetja 293

Limfadenopatie retronukale është karakteristikë e:

- A) Rubeolës
- B) Mononukleozës
- C) Adenitit tuberkular
- D) Infeksionit me HIV
- E) Gripit

Pyetja 294

Tumori më i shpeshtë që evidentohet në një testikul kriptokordik është:

- A) Teratoma
- B) Seminoma
- C) Karcinoma embrionale
- D) Tumori me qeliza Sertoli
- E) Tumori me qeliza Leyding

Pyetja 295

Shkaku më i shpeshtë i hematurisë makroskopike tek fëmija është:

- A) sindroma nefritike
- B) tumori renal
- C) infeksioni i rrugëve urinare
- D) koagulopatia
- E) trauma renale

Pyetja 296

Tumori më i shpeshtë në fëmijëri është:

- A) Tumori Wilms
- B) Neuroblastoma
- C) Rhabdomiosarkoma
- D) Sarkoma Ewing
- E) Teratoma

Pyetja 297

Cili nga këto barna mund të rriti nivelin e teofilinës:

- A) Penicilina
- B) Eritromicina
- C) Cefalotina
- D) Sulfisoksazoli
- E) Gentamicina

Pyetja 298

Cila vitaminë këshilohet të jepet tek foshnjët që ushqehen me qumësht gjiri në 6 muajt e parë të jetës?

- A) Vitamina A
- B) Vitamina D
- C) Vitamina E
- D) Vitamina C
- E) Të gjitha

Pyetja 299

Pasojat e një infeksioni nga toksoplazma mund të jenë:

- A) Hidrocefalia
- B) Sëmundjet e zemrës
- C) Sëmundjet e mëlçisë
- D) Shurdhimi
- E) Keqformimi i gjymtyrëve

Pyetja 300

Në sindromën Turner cila nga këto shenja mungon?

- A) Shtati i shkurtës
- B) Steriliteti
- C) Prapambetja mendore
- D) Pterigum colli
- E) Coxa vara

Pyetja 301

Sa i gjatë është një fëni në lindje?

- A) 40 cm
- B) 55 cm
- C) 50 cm
- D) 60 cm
- E) 70 cm

Pyetja 302

Cili është shkaku i sëmundjes hemorragjike të i porsalinduri?

- A) mungesa e vitaminës D
- B) mungesa e vitaminës E
- C) mungesa e vitaminës K
- D) mungesa e vitaminës C
- E) mungesa e acidit folik

Pyetja 303

Kur quhet që një i porsalindur është nën peshë:

- A) kur ai peshon më pak se 2500 gr
- B) kur ai peshon më pak se 2000 gr
- C) kur ai peshon më pak se 1500 gr
- D) kur ai peshon më pak se 1000 gr
- E) kur ai peshon më pak se 500 gr

Pyetja 304

Në një vajzë 7 vjeç që ka enurezë nocturne sekondar cili ekzaminim këshillohet të realizohet fillimisht?

- A) Ekografi renale
- B) Cistoureterografi
- C) Radiografi abdominale
- D) Analizë urine
- E) Klirensi i kreatininës

Pyetja 305

Një vajzë në shkollë të fillore ka aftësinë intelektuale të një nxënëseje të vitit të parë gjatë shkollës të mesme. Me përafërsi sa është koficienti i inteligjencës i kësaj vajze?

- A) 90
- B) 105
- C) 120
- D) 135
- E) 150

Pyetja 306

Një vajzë 12 vjeç ankon për dobësi muskulare që shtohet përgjatë ditëve të javës si dhe për shfaqjen e një rashi eritematoz në fytyrë, krah. Cili ekzaminimi do të ishte më i përshtatshmi në këtë rast?

- A) Matja e faktorit reumatoid
- B) Shpejtësia e eritrosedimentit
- C) Analiza e urinës
- D) Përcaktimi i kreatinë kineazës serike
- E) Antitruapat anti bërthamor (ANA)

Pyetja 307



Në një të porsalindur 38 javsh, ka lindur nga një nënë diabetike. Pesha në lindje ka qenë 4225 kg. Çfarë problemi tjetër mund të ketë ky i porsalindur?

- A) Difekt të tubit neural
- B) Megakolon
- C) Kardiomegali
- D) Hidronefrozë
- E) Displazi renale

Pyetja 308

Diarreja akute në foshnje duhet të trajtohet me:

- A) antibiotikë
- B) antiemetik
- C) antiviral
- D) rehidrim oral
- E) rehidrim endovenoz

Pyetja 309

Cili është shkakun më të shpeshtë të malabsorbimit kronik në një fëmijë në moshë shkollore?

- A) Divertikuli Meckel
- B) Sëmundja Chron
- C) Celiakia
- D) Fibroza cistike
- E) Sindromi i zorrës të irrituar

Pyetja 310

Në fund të vitit të parë të jetës një fëmijë normal duhet të peshojë:

- A) 9-11 kg
- B) 13-14 kg
- C) 16-17 kg
- D) 19-20 kg
- E) 8-9 kg

Pyetja 311

Shkaktari më i shpeshtë i sepsis neonatal është:

- A) streptokoku beta hemolitik i grupit A
- B) streptokoku beta hemolitik i grupit B
- C) stafilokoku aureus
- D) H.Influenzae tip B
- E) N. Meningitis

Pyetja 312

Si përcaktohet diagnoza "refluks gastroezofageal":

- A) Me anë të shinitgrafisë ezofageale
- B) Ph metria 24 orëshe
- C) Manometria ezofageale
- D) Me anë gastroskopisë

E) Asnjëra

Pyetja 313

Hormoni Antidiuretik (Vazopresin) sintetizohet në:

- A) Qelizat acidofile të hipofizës anteriore
- B) Qelizat bazofilike të hipofizës anteriore
- C) Nga qelizat e n. supraopticus dhe n. paraventricularis të hipotalamusit
- D) Nga n. Arcuatus e hipotalamusit
- E) Asnjëra

Pyetja 314

Parandalimi i transmetimit vertikal tek femijet me HIV realizohet me ane te:

- A) Lindjes me rruge natyrale (via vaginale)
- B) Te ushqyerit me gji
- C) Marrja e AZT ne shtatezani
- D) Asnjera
- E) Stokholm

Pyetja 315

Femijet me obezitet te thjeshte prezantohen me shpesh:

- A) Pubertet te persheptuar
- B) Moshe kockore te vonuar
- C) Shtat me i shkurter sesa i moshatareve
- D) Shtat me i larte se i moshatareve
- E) Asnjera

Pyetja 316

Ne 10 ml urine te mbledhura ne kushte te fresketa, te egzaminuara ne terren ushqyes te mire, hematuria mikroskopike perkufizohet si prezenca e te pakten:

- A) 0-1 rruaza te kuqe per fushe
- B) 3-5 rruaza te kuqe per fushe
- C) 3-10 rruaza te kuqe per fushe
- D) >10 rruaza te kuqe per fushe
- E) Asnjera

Pyetja 317

Si parandalohen komplikacionet reumatizmale te Skarlatines?

- A) Me izolimin e femijeve te infektuar
- B) Me penicillin per 10 dite
- C) Me ampicillin per 6 dite
- D) Me vaksinimin masiv
- E) Asnjera

Pyetja 318

Cfare shenje ose simptome duhet kerkuar tek nje latant ne te cilin dyshohet per refluks gastro-efozageal patologjik?

- A) Krizat e apnese
- B) Anemia ferodeficitare
- C) Hemoragjia gastro-intestinale
- D) Vonesa ne rritje dhe anoreksia
- E) Te gjitha

Pyetja 319

Mundesite e infektimit nga Toxoplasma per njeriun jane:

- A) Kontakti me macet
- B) Ngrenja e perimeve jo te lara mire
- C) Ngrenja e mishit te pa gatuar mire ose krudo
- D) Kontakti me delet
- E) Te gjitha

Pyetja 320

Zmadhimi i gjendrave limfatike ne semundjen e gervishtjes se maces regredon menjehere mbas:

- A) 1-2 muaj
- B) 1-2jave
- C) 1-2 dite
- D) 6 muaj
- E) Te gjitha

Pyetja 321

Puberteti prekoks shoqerohet me:

- A) Rritje te nivelit te gonadotropinave
- B) Ulje te nivelit te gonadotropinave
- C) Vonese te moshes kockore
- D) Ritme te ulta rritje
- E) Te gjitha

Pyetja 322

Cila nga vitaminat keshillohet te shtohet ne muajt e pare te femija qe ushqehet me gji?

- A) Vitamina A
- B) Vitamina D
- C) Vitamina E
- D) Vitamina C
- E) Te gjitha

Pyetja 323

Kur ikteri konsiderohet fiziologjik?

- A) Kur shfaqet brenda 24 h
- B) Kur shfaqet mbas 24 h
- C) Kur bilirubina kalon vleren 20mg/dl
- D) Kur dominon bilirubina direkte

E) Asnjera

## 08.Gastrohepatologjia dhe Mjekësia Ligjore, Etika dhe Deontologji

Pyetja 1

Cili është funksioni fiziologjik më i rëndësishëm i acideve biliare?

- A) Favorizon eskretimin e substancave toksike
- B) Favorizon absorbimin e vitaminës B12
- C) Ruan pH e duhur intestinal
- D) Favorizon absorbimin e aminoacideve
- E) Favorizon absorbimin e yndyrnave

Pyetja 2

Në cilin prej rasteve të mëposhtme është transmural lezioni intestinal?

- A) Morbus Crohn
- B) Celiakia
- C) Koliti ulçeroz
- D) Asnjëra prej këtyre
- E) Sëmundja e Whipple

Pyetja 3

Një punëtor 35 vjeçar bën një kontroll ambulator për të vlerësuar gjëndjen me diarre dhe rënië në peshë. Nëpërmjet ezofagogastroduodenoskopisë, që u realizua për marrjen e biopsisë në zorrën e hollë, u vu re eritemë e ezofagut, me disa erozione, dy ulçera

- A) ERCP (Kolangiopankreatografi retrograde endoskopike)
- B) Kolonoskopi
- C) Kërkohen anti-trupat anti-endomisium dhe anti-gliadinë
- D) Gastrinemia
- E) Testin e Schilling

Pyetja 4

Kolangjitet shkaktohen më shpesh nga:

- A) Përdorimi i pijeve të ftohta nga pacientë me litiazë multiple të rrugëve biliare
- B) Bakteret Gram + dhe Gram - që vijnë nga zorrët
- C) Efekti detergjent i acideve biliare
- D) Disfunksioni i sfinterit të Oddit dhe autodigestioni nga enzimat pankreatike që kanë bërë refluks në rrugët biliare
- E) Bakteret Gram + që vijnë më shpesh nga arteria hepatike

Pyetja 5

Të gjitha gjendjet e mëposhtme janë shkaktare të pseudoobstruksionit intestinal kronik, përveç:

- A) Sklerodermia

- B) Hipertiroidizmi
- C) Diabeti melitus
- D) Përdorimi i antidepressivëve triciklikë
- E) Amiloidoza

Pyetja 6

Lezionet e Morbusit Celiac hasen në nivelin e:

- A) Stomakut
- B) Vetëm jejunum
- C) Ileusit
- D) Duodenit dhe jejunumit
- E) Vetëm duodenit

Pyetja 7

Cila prej patologjive mund të shfaqë ascit:

- A) Defiçiti i disakaridazës
- B) Retokoliti ulçeroz
- C) Steatoza hepatike
- D) Sindroma nefrozike
- E) Tireotosikoza

Pyetja 8

Cilët janë parametrat laboratorikë më të përdorshëm për të monitoruar procesin inflamator në hapatitin kronik:

- A) Kriprat biliare totale
- B) Transaminazat dhe gamaglobulinat sierike
- C) Bilirubinemia e fraksionuar
- D) Kohën e protrombinës
- E) Fosfataza alkaline

Pyetja 9

Të gjitha gjendjet e mëposhtme janë faktorë rreziku për kolelitiazën kolesterinike, përveç:

- A) Retokoliti ulçeroz
- B) Terapia me klofibrat
- C) Terapia me estrogjene
- D) Rezekcioni kirurgjikal i ileusit
- E) Obeziteti

Pyetja 10

Simptoma e djegies retrosternale është tregues specifik për:

- A) Ulçer gastrike
- B) Ulçer duodenale
- C) Refluksi ezofageal
- D) Gastriti autoimun
- E) Gastriti nga Helicobacter pylori

Pyetja 11

Një murator 21 vjeçar, ka bilirubineminë totale= 2.3 mg/dl dhe me fraksionin e drejtë= 0.3mg/dl. Nuk ka histori familjare për hepatopati, nga anamneza evidentohet se pi rreth 40 gr alkool në ditë, nuk ka simptoma të tjera ose shenja hepatopatie. Hemokromi,

- A) Sëmundja e Gilbert
- B) Hepatit B në shërim
- C) Hepatit C
- D) Hepatit alkolik
- E) Hepatit B aktiv

Pyetja 12

Mund të shfaqet hipoglicemi pas ushqyerjes (postprandiale):

- A) Morbusi Celiak
- B) Në ulçerën duodenale
- C) Prej një fistule gastro-kolike
- D) Prej lemezës së vazhdueshme
- E) Pas gastrozeksionit subtotal

Pyetja 13

Cila prej sëmundjeve të mëposhtme mund të jetë shkak i komës hepatike?

- A) Hepatiti kronik aktiv me zhvillim cirrotik
- B) Ikteri obstruktiv nga kalkuloza cirrotike
- C) Sëmundja e Gilbert
- D) Cirroza hepatike e dekompenzuar
- E) Cirroza septale jo e plotë

Pyetja 14

Për cilën arsye realizohet testi me ksilozium (xylosio)?

- A) Për verifikimin e funksionalitetit të disakaridazës intestinale
- B) Për verifikimin e funksionalitetit të pankreasit
- C) Për të verifikuar integritetin e sipërfaqes së zorrës së hollë
- D) Për verifikimin e fosforilimit të karbohidrateve në zorrë
- E) Për vlerësimin e absorbimit të glicideve

Pyetja 15

Të gjithë medikamentet e mëposhtëm mund të përdoren në trajtimin e ulçerës peptike, përveç:

- A) Sucralfat
- B) Omeprazol
- C) Salazopirina
- D) Ranitidin
- E) Pirenzepin

Pyetja 16

Zotëria 52-vjeçar ka rreth 2 vite me diarre dhe rënie të theksuar në peshë. Nuk ka histori për gjakderdhje gastroenterike dhe gjaku ocult në feçe në tre kampionë. Rrëfen se në të kaluarën ka qënë përdorues i rregullt i alkolit, por prej disa vitesh refero

- A) ERCP ( kolanxhopankreatolografia retrograde endoskopike)
- B) Dozimi i yndyrave në feçe
- C) Biopsia e jejunumit
- D) Testi i frymëmarrjes për disakaride
- E) Kolonoskopi me biopsi

Pyetja 17

Sëmundja e Crohn përfshin:

- A) Ilesusin, kolonin dhe pjesë të tjera të aparatit tretës
- B) Vetëm ileusin dhe kolonin
- C) Vetëm kolonin
- D) Vetëm ileusin
- E) Ileus, kolon dhe rektum

Pyetja 18

Sindroma e Mallory-Weiss verifikohet në rastin e:

- A) Tumori endokrin i pankreasit
- B) Të vjellat e vazhdueshme
- C) Diarrea sekretore
- D) Tumori hipofizar
- E) Polipoza xhiovanile

Pyetja 19

Në Morbusin Crohn më shpesh litiaza e kolecistës është e lidhur me:

- A) Rritje e absorbimit të kriprave biliare në ileus
- B) Hipovitaminoza
- C) Rritja e absorbimit të kolesterolit nga ileusi
- D) Bashkë shoqërimi me kolecistitin
- E) Reduktim i pool-it të kriprave biliare

Pyetja 20

Në cilën pjesë të traktit intestinal realizohet absorbimi i hekurit?

- A) I gjithë trakti intestinal
- B) Ileus
- C) Kolon
- D) Stomaku
- E) Duodeni

Pyetja 21

Cili është përbërësi kryesor i kalkujve biliarë radiotrasparentë:

- A) Kolesterolit
- B) Kripa biliare
- C) Urobilina
- D) Bilirubina
- E) Lecitina

Pyetja 22

Cili është tumori beninj më i shpeshtë i heparit?

- A) Neurofibroma
- B) Fibroma jaline
- C) Fibroadenoma
- D) Hemangioma kapilare
- E) Adenoma e duktuseve biliare

Pyetja 23

Peritoniti bakterial spontan përfaqëson një komplikancë të cilës prej patologjive të mëposhtme:

- A) Apendisiti akut
- B) Cirroza hepatike
- C) Divertikuloza e kolonit
- D) Sëmundja e Crohn
- E) Kolecistiti

Pyetja 24

Në cilët limfonoduj metastatizon më shpesh karcinoma e junksionit rekto-sigmoidal?

- A) Hipogastrikë
- B) Inguinalë
- C) Tripodit celiak
- D) Mezenterikët e sipërm
- E) Mezenterikët e poshtëm

Pyetja 25

Të gjithë parametrat e mëposhtëm përdoren për klasifikimin Child-Pugh të cirrozës hepatike, përveç:

- A) Kolinesteraza



- B) Asciti
- C) Bilirubina
- D) Albuminemi
- E) Encefalopatia

Pyetja 26

Cilat janë karakteristikat e Sindromës Plummer-Vinson?

- A) Dizfagi me glosit e pa alternime hematike
- B) Odinofagi me anemi sideropenike
- C) Eshtë përfshirja e ezofagut (dizfagi) e shoqëruar me anemi mikrocitike dhe glosit (inflamacion i gjuhës)
- D) Dizfagi paradoksale me anemi sideropenike dhe glosit
- E) Akalazi ezofageale me anemi makrocitike

Pyetja 27

Sindroma e Carolit përkufizohet si:

- A) Patologji neoplazike të rrugëve biliare intrahepatike
- B) Patologji biliare post-inflamatore
- C) Patologji e rrugëve biliare intrahepatike, karakterizuar nga zgjerime cistike multiple të duktuseve biliare segmentare
- D) Litiazë të rrugëve biliare intrahepatike
- E) Litiazë të rrugës principale biliare

Pyetja 28

Sindroma e Reye shoqërohet shpesh me cilën prej gjëndjeve?

- A) Diabeti
- B) Bruceloza
- C) Përdorimi i heparinës
- D) Hemokromatoza
- E) Përdorimi i acidit acetilsalicilik

Pyetja 29

Alternativat rreth sekretimit të acidit nga stomaku në kushtet e ulçerës peptike gastrike janë të gabuara, përveç:

- A) Mungon pas stimulimit maksimal
- B) Si në ulçerën duodenale
- C) Si në gjendjen normale
- D) Më e rritur se normalisht në kushtet e stimulimit bazal
- E) Më e ulët se në gjendjen normale

Pyetja 30

Cili prej alternativave të mëposhtëm është karakteristikë për Sindromën Dubin-Johnson:

- A) Hiperbilirubinemi direkte me kolestazë të rritur
- B) Hiperbilirubinemi direkte me shtim të citolizës dhe kolestazës
- C) Hiperbilirubinemi indirekte me rritje të kolestazës
- D) Hiperbilirubinemi indirekte me shtim të citolizës
- E) Hiperbilirubinemi direkte me kolestazë normale

Pyetja 31

Të gjithë elementët e mëposhtëm janë karakteristikë e kuadrit klinik të Morbusit të Wilson, përveç:

- A) Simptoma dhe shenjat e përfshirjes hepatike
- B) Unaza e Kayser-Fleischer
- C) Manifestime neurologjike
- D) Ulje të nivelit sierik të ceruloplazminës
- E) Ngjyra bronx e lëkurës

Pyetja 32

Cila prej shenjave ose simptomave të mëposhtme mundësojnë diagnozën diferenciale midis ulçerës duodenale të preforuar dhe pankreatitit kronik:

- A) Zhdukja e otuzitetit hepatic
- B) Shok hipovolemik
- C) Dhimbje të forta abdominale
- D) Masë e palpueshme e mezogastrit
- E) Të vjella të vazhdueshme

Pyetja 33

Të gjitha gjendjet e mëposhtme shoqërohen me rritje të incidencës së hepatokarcinomës, përveç:

- A) Infeksioni kronik nga virusi C
- B) Infeksion kronik nga virusi B
- C) Angioma hepatike
- D) Hepatopatia alkolike
- E) Hemokromatoza

Pyetja 34

Koloni absorbon në lidhje me masën që i vjen nga ileusi:

- A) Më pak se 50% të ujit dhe elektrolitëve
- B) Midis 50% dhe 90% të ujit dhe elektrolitëve
- C) Më shumë se 90% të ujit dhe elektrolitëve
- D) Më shumë se 90% të ujit dhe 50% të elektrolitëve
- E) 50% të ujit dhe të gjithë elektrolitet

Pyetja 35

Cila prej karakteristikave të mëposhtme përcakton "early gastric cancer"

- A) Prek të gjithë paretin gastrik
- B) Prek tunikën muskulare
- C) Prek tunikën sieroze
- D) Prek mukozën ose submukozën gastrike
- E) Prek të gjithë stacionet limfonodale satelitare

Pyetja 36

Cila prej gjendjeve shoqërohet me praninë e antitropave anticitoplazminë të neutrofileve (ANCA) ?

- A) Cirroza biliare primare
- B) Hepatiti autoimun tip I
- C) Kolangiti sklerozant primitiv
- D) Hepatiti autoimun tip II
- E) Hepatokarcinoma

Pyetja 37

Cili prej medikamenteve është i përfshirë në zhvillimin e insufiçencës hepatike akute:

- A) Kontraceptivët oralë
- B) FANS
- C) Rifampicina
- D) Tetraciklina
- E) Paracetamoli

Pyetja 38

Qelizat oxintike (parietale) janë të lokalizuara në mukozën e:

- A) Trupit dhe fundusit
- B) Antrumit dhe trupit
- C) Fundusit dhe antrumit
- D) Antrumit dhe pjesës circumkardiale
- E) Zona prepilorike

Pyetja 39

Cila prej alternativave është e vërtetë:

- A) Merkaptanet derivojnë nga metabolizmi intestinal i glutaminës
- B) Aminoacidet aromatike janë: triptofani, fenilalanina, tirozina dhe metionina
- C) Era e një pacienti me cirrozë është sekondare nga hiperamoniemia
- D) Encefalopatia hepatike është çrregullim cerebral me rritje të komponentit neuroinibitor
- E) Terapia diuretike përmirëson encefalopatinë hepatike

Pyetja 40

Simptoma kryesore e pankreatitit akut është:

- A) Ikter
- B) Nauze e të vjella
- C) Diarre
- D) Dhimbja
- E) Temperaturë

Pyetja 41

Pankreatiti akut shkaktohet më shpesh nga:

- A) Litiiza e kolecistës
- B) Kalkuj intrahepatik
- C) Hiperlipidemi
- D) Litiiza e koledokut
- E) Abuzimi me alkolin

Pyetja 42

Të gjitha janë forma të diarresë sekretore, përveç:

- A) Diarrea nga infeksioni me vibrio cholerae
- B) Diarrea nga sindromi karcinoid
- C) Diarrea nga deficiëti i disakaridazës
- D) Diarrea nga VIPoma
- E) Diarrea nga infeksioni me Escherichia coli

Pyetja 43

Të gjithë këta parametra mund të shprehin një kolestazë, përveç njërit:

- A) Fosfataza alkaline
- B) 5-nukleotidaza
- C) Bilirubina
- D) Gamaglutamiltranspeptidaza
- E) Diamino-oksidaza

Pyetja 44

Cili është faktori etiologjik më i rëndësishëm i hipertensionit portal nga cirroza hepatike?

- A) Reduktimi i qarkullimit hepatic
- B) Nekrozë të qelizave hepatike
- C) Infiltrimi limfocitar
- D) Depozitimi biliar
- E) Septe fibrotike

Pyetja 45

Simptomatologjia e dhimbjeve në ulçerën duodenale përmirësohet nga:

- A) Të rrish shtrirë në anën e majtë

- B) Jashtëqitja
- C) Gjumi
- D) Pas ushqimit
- E) Aktiviteti fizik

Pyetja 46

Në insufiçencën hepatike akute të rëndë cili prej ekzaminimeve të mëposhtëm ka rëndësi prognostike?

- A) Transaminazat
- B) Koha e Quick
- C) Latikodeidrogjenaza
- D) Albuminemia
- E) Fosfataza alkaline

Pyetja 47

Kalkujt biliarë prej bilirubinës kalçiumi shfaqen më shpesh tek pacientët e prekur nga:

- A) Morbusi Crohn në ileus
- B) Rezekcioni ileal
- C) Retokoliti ulçeroz
- D) Ulçera peptike
- E) Anemia hemolitike kronike

Pyetja 48

Një pensionist 72 vjeçar (që ka punuar si marangoz) me kardiopati iskemike dhe SPOK, shtrihet në spital për bronkopneumoni dhe i përgjigjet mjekimit empirik me cefotaxime. Në ditën e gjashtë të shtrimit rishfaqet temperatura dhe nis dhimbja abdominale me

- A) Zëvendësimin e cefotaxime me clindamicine
- B) Test imunologjik duke kërkuar toksinat e clostridium difficile
- C) Klizmën e zorrëve të holla
- D) Kërkoni ezofagogastroduodenoskopinë me biopsi të jejunumit
- E) Kolonoskopi

Pyetja 49

Asciti i pa komplikuar tek një pacient cirrotik është gjithnjë i karakterizuar nga:

- A) Albuminemia < 3g/dl
- B) Mungesa totale e qelizave inflamatore
- C) pH < 7
- D) Pamje të turbullt
- E) 250 polimorfonukleatë/cc

Pyetja 50

Të gjitha sëmundjet e mëposhtme shkaktojnë cirrozë, përveç:

- A) Defiçiti i alfa 1-antitripsinës

- B) Skistozomiaza
- C) Sëmundja e Gaucher
- D) Hepatiti nga virusi A
- E) Hepatiti nga virusi C

Pyetja 51

Cila prej alternativave të mëposhtme nuk është shenjë e apendisitit akut:

- A) Stranguri
- B) Anoreksi
- C) Dhimbje në kuadratin iliak të djathtë
- D) Të vjella
- E) Temperaturë

Pyetja 52

Gastrinemia > 1000pg/ml (norma <100 pg/dl) sugjeron më shumë për:

- A) Sindroma e Verner-Morrison
- B) Sindroma Menetrier
- C) Sindroma e Mallory-Wiss
- D) Sindroma e Zollinger-Ellison
- E) Sindroma e antriumit të ngecur

Pyetja 53

Kolestaza prej medikamenteve karakterizohet nga:

- A) Hiperbilirubinemi kryesisht indirekte
- B) Hiperbilirubinemi direkte që zgjat prej kohësh
- C) Mungesë të rritjes së gamaGT
- D) Mungesa e pruritit
- E) Eozinofili e theksuar (>20%)

Pyetja 54

Të gjitha manifestimet janë pjesë e kuadrit klinik të temperaturës mesdhetare familjare, përveç:

- A) Ikter
- B) Dhimbje abdominale
- C) Pleuriti
- D) Temperaturës
- E) Artralgi

Pyetja 55

Në rastin e sëmundjes divertikulare të zorrës së trashë, nuk ka asnjëherë leziona të tilla në:

- A) Ciekum
- B) Koloni ashendent

- C) Rektum
- D) Flesurën hepatike e të lienit
- E) Mund të formohen kudo

Pyetja 56

Një pacient paraqet rritje të kohës së protrombinës me 6 sek më shumë se normalja dhe trombocitet 45,000/cc. Cili prej ekzaminimeve është i kundërindikuar?

- A) Paracenteza për diagnostikim
- B) Pozicionimin e sondës së Sengstaken-Blakemore
- C) Biopsi hepatike perkutane
- D) Kolonoskopia
- E) Gastroskopia

Pyetja 57

Në cilën prej sëmundjeve gjenden më shpesh komplikanca si fistulat (enteroenterike, enterokutane etj.)

- A) Celiakia
- B) Ulçera gastrike
- C) Koliti ulçeroz
- D) Kancer i zorrës së trashë
- E) Morbusi Crohn

Pyetja 58

Stimulimi maksimal i sekretimit të acidit gastrik realizohet me anë të:

- A) Vip
- B) Glukagone
- C) Sekretina
- D) Kolecistokinina
- E) Pentagastrina

Pyetja 59

Alternativat e mëposhtme për sindromën e Zollinger-Ellison janë të sakta, përveç:

- A) Shoqërohet me ulçerën peptike, që shpesh i përgjigjet shumë pak terapisë
- B) Shërohet pas zhdukjes së *Helicobacter pylori*
- C) Shoqërohet me hipergastrinemi të theksuar
- D) Ulçerat peptike mund të jenë të shumta
- E) Shoqërohet me diarre kronike

Pyetja 60

Në retokolitin ulçeroz, cila prej gjendjeve rrit rrezikun për kancer të kolonit?

- A) Rezistencë ndaj terapisë steroide

- B) Histori për megakolon toksik
- C) Prezencë të pseudopolipeve gjatë ekzaminimit endoskopik
- D) Prania e sëmundjes prej shumë kohësh
- E) Zhvillim të ashpër të sëmundjes

Pyetja 61

Nga cila prej gjendjeve të mëposhtme shkaktohet më shpesh obstrukcioni i kolonit?

- A) Aderencat
- B) Volvolusi
- C) Hernia
- D) Divertikuliti
- E) Karcinoma

Pyetja 62

Cila prej alternativave të mëposhtme rreth sindromës së Gilbert është e saktë?

- A) Ikteri spjegohet pjesërisht nga hemoliza
- B) Përdorimi i fenobarbitalit rrit nivelin e bilirubinës
- C) Përdorimi i kortizonit rrit nivelin e bilirubinës në gjak
- D) Biopsia tregon për alternime të kanalikulave biliare
- E) Përdorimi i fenobarbitalit shkakton në 4-8 ditë një ulje të dukshme të bilirubinës në gjak

Pyetja 63

Të gjitha alternativat e mëposhtme rreth sëmundjes së Menetrier janë të sakta, përveç:

- A) Mund të shkaktoj anemi nga gjakderdhja e fshehur
- B) Është patologji e stomakut
- C) Mund të shoqërohet me hipoalbuminemi
- D) Është patologji e zorrës së hollë
- E) Diagnoza bazohet tek ekzaminimi endoskopik ku merret biopsi

Pyetja 64

Sindroma e Crigler-Najjar karakterizohet kryesisht nga rritja në gjak e:

- A) Bilirubinës direkte
- B) Kriprave biliare
- C) Bilirubinës indirekte
- D) Fosfatazës alkaline
- E) Gama-GT

Pyetja 65

Cili prej parametrave të gjetura në likidin e ascitit është tregues për diagnostikimin e peritonitit bakterial spontan:



- A) Pamja si qumësht
- B) Prania e 300 leukociteve totale/mm<sup>3</sup>
- C) Prania e 300 granulociteve neutrofile/mm<sup>3</sup>
- D) Prania e më shumë se 3g% e proteinave
- E) Pamje hemorragjike

Pyetja 66

Të gjitha alternativat e mëposhtme rreth cirrozës biliare primare janë të sakta, përveç:

- A) Shoqërohet shpesh me prurit
- B) Një përqindje e lartë e pacientëve rezultojnë pozitivë për antitruapat antimitokondër
- C) Trajtimi më efikas është ai me D-penicilaminën
- D) Është më e shpeshtë tek femrat
- E) Përdorimi i acideve biliare mund të jetë i dobishëm kontrollin e simptomave

Pyetja 67

Virusi delta është virus difektoz, që për tu replikuar ka nevojë për:

- A) Citomegalovirus
- B) Virus i hepatitit A
- C) Virus i hepatitit B
- D) Virus i Epstein-Barr
- E) Hepatiti G

Pyetja 68

Të gjitha shenjat e mëposhtme gjenden në insufiçencën hepatike si pasojë e hepatitit kronik C, përveç:

- A) Purpura e palpueshme në ekstremitetet e poshtme
- B) Unaza e Kayser-Fleischer
- C) Flapping tremor
- D) Otuzitet që zhvendoset dhe është dekliv gjatë perkusionit të abdomenit
- E) Nishanet arakniformë

Pyetja 69

Hemorragjia nga varicet ezofageale është komplikancë e:

- A) Hipertensionit arterial
- B) Insufiçenca hepatike
- C) Insufiçencës kardiake të djathtë
- D) Kakezia nga neoplazia
- E) Hipertensionit portal

Pyetja 70

Cili është efekti që jep gastrina gjatë aktivitetit të saj fiziologjik:

- A) Stimulon rritjen e cck (kolecistokinina)

- B) Stimulon sekretimin e acidit klorhidrik
- C) Përshpejton zbrazjen gastrike
- D) Stimulon sekretimin e bikarbonateve
- E) Stimulon sekretimin e lëngut biliar

Pyetja 71

Cili prej alternativave hematokimike është më i shpeshtë në morbusin Celiac:

- A) Hiposideremi
- B) Hipolipemi
- C) Hipoalbuminemi
- D) Hipokalçemi
- E) Hipofosforemi

Pyetja 72

Në kushtet e malabsorbimit të gjeneralizuar, cila është alternativa e saktë?

- A) Steatorrea është gjithnjë prezent
- B) Jashtëqitja karakterizohet nga vëllim fekal i ulët dhe numër i lartë i herëve të jashtëqitjes
- C) Në pankreatitin kronik malabsorbimi i gjeneralizuar është paraprakisht prezent
- D) Steatorrea shoqërohet me steatozë hepatike
- E) Feçet janë gjithnjë likide

Pyetja 73

Cila është metodika më e përshtatshme për të diagnostikuar refluksin gastroezofageal acid?

- A) pH-metria ezofageale e 24 orëve
- B) Manometria ezofageale
- C) Ekzaminimi radiologjik i ezofagut
- D) Ezofagogastroduodenoskopia
- E) Testi i Bernstein

Pyetja 74

Të gjitha alternativat e mëposhtme rreth akalazisë janë të sakta, përveç njëjës:

- A) Mund të shkaktojë dizfagi, dhimbje toraksi, regurgitim
- B) Karakterizohet nga alternimet gjatë relaksimit të sfinterit ezofageal të poshtëm
- C) Mund të trajtohet me toksinën e botulinës
- D) Nifedipina kontrollon simptomat tek shumë pacientë
- E) pH-metria ezofageale është ekzaminimi më i domosdoshëm për ta diagnostikuar

Pyetja 75

Të gjitha alternativat e mëposhtme janë shkak i malabsorbimit tek një pacient me sëmundjen e Crohn, përveç njëjës:

- A) Lokalizimi i gjere në jejunum-ileal

- B) Fistula jejunum-kolike
- C) Kontaminimi bakterial i zorrës së hollë
- D) Sëmundja rekto-sigmoide aktive
- E) Mbetje nga rezeksioni intestinal i gjerë

Pyetja 76

Sekretimi gastrik i theksuar dhe ulçerat peptike përsëritëse vërehen në:

- A) Hipoparatiroidizëm
- B) Sindroma Dumping
- C) Sindroma e Mallory-Weiss
- D) Sindroma e Zollinger-Ellison
- E) Sindroma e Verner Morrison

Pyetja 77

Litiazat pigmentare e kolecistës ndodh më shpesh në:

- A) Aneminë hipokromike
- B) Aneminë hemolitike
- C) Hiperkolesteroleminë
- D) Ateroskleroza
- E) Pankretiti kronik

Pyetja 78

Cili prej medikamenteve është më i përshtatshmi për trajtimin e kolitit pseudomembranoz?

- A) Vancomicine
- B) Ceftazidime
- C) Streptomisine
- D) Mesalazine
- E) Lincomicine

Pyetja 79

Në urinë nuk gjendet asnjëherë bilirubina indirekte sepse:

- A) Eliminohet nga veshka
- B) Përbëhet nga molekula të vogla që lejojnë filtrimin e saj glomerular
- C) Absorbohet tërësisht nga tubujt
- D) Nga kontakti me ajrin oksidohet menjëherë
- E) Nuk është hidrosolubil

Pyetja 80

Cila prej patologjive komplikohet më shpesh me megakolon toksik?

- A) Polipoza e përhapur e kolonit
- B) Retokoliti ulçeroz

- C) Megakoloni kongenital
- D) Divertikuliti i kolonit
- E) Koliti granulomatoz

Pyetja 81

Nuk shkakton hipertension portal?

- A) Cirroza biliare primitive
- B) Obstruksioni i fluksit venoz hepatic
- C) Tromboza e venës splenike
- D) Steatoza hepaticke
- E) Cirroza hepaticke post-hepaticke

Pyetja 82

Nuk ka vlerë diagnostikuese realizimi i biopsisë intestinale në cilën prej sëmundjeve?

- A) Kompleksi Mycobacterium avium
- B) Sëmundja e Whipple
- C) Abetalipoproteinemia
- D) Agamaglobulinemia
- E) Defiçiti i folateve

Pyetja 83

Cili prej komplikacioneve nuk i bashkëngjitet sëmundjeve inflamatore intestinale kronike:

- A) Eritema nodoze
- B) Spondiloartroza
- C) Uveiti
- D) Perikolangiti
- E) Ragada (fisura) anale

Pyetja 84

Sa është koha e inkubimit të një toksiinfeksioni ushqimor nga toksina stafilokoksike:

- A) 1 ditë
- B) 3-6 orë
- C) 20-30 minuta
- D) 2 ditë
- E) 5-8 ditë

Pyetja 85

Cili prej alternativave metabolike favorizon neurotoksicitetin nga amoniaku?

- A) Hipersodiemia
- B) Hiperglicemia
- C) Acidoza

- D) Alkalozia
- E) Hiperkalçemia

Pyetja 86

Cili është komplikacioni më i shpeshtë i morbusit Crohn?

- A) Hemorragjia
- B) Obstruksioni
- C) Perforacioni
- D) Peritoniti
- E) Dermatiti herpetiform

Pyetja 87

Në sëmundjen e refluksit gastroezofageal, dizfagia kur është e pranishme mund të jetë:

- A) Vetëm funksionale
- B) Vetëm organike
- C) Dizfagia nuk është asnjëherë e pranishme
- D) As funksionale dhe as organike, duke qënë se dizfagia nuk është simptomë e kësaj sëmundjeje
- E) Funksionale dhe organike

Pyetja 88

Cili prej ekzaminimeve laboratorike është i vlefshëm për vlerësimin e shkallës së aktivitetit inflamator tek hepatiti kronik:

- A) Dozimi i fosfatazemisë alkaline
- B) Dozimi i albuminemisë
- C) Dozimi i bilirubinemisë
- D) Dozimi i imunoglobulinave në gjak
- E) Gama-GT

Pyetja 89

Vitamina B12 orale, absorbohet në:

- A) Ileus
- B) Jejunum
- C) Stomak
- D) Kolon
- E) Duoden

Pyetja 90

Cila prej gjendjeve shoqërohet më shpesh me adenokarcinomën e ezofagut?

- A) Ezofagu i Barrett
- B) Alkolizmi
- C) Tiloza

- D) Akalazia
- E) Duhanpirja

Pyetja 91

Cila prej alternativave rreth hepatitit kronik autoimun të tipit I nuk është e saktë:

- A) Është më i shpeshtë tek femrat
- B) Prek kryesisht të moshuarit
- C) Shoqërohet me praninë e antitropave antinukël
- D) Shoqërohet me hipergamaglobulinemi
- E) Në përgjithësi i përgjigjet terapisë imunosupresive

Pyetja 92

Cfarë do të thotë dizfagi?

- A) Pirrozë
- B) Vështirësi në artikulinin e fjalës
- C) Pamundësi absolute në kalimin e ushqimit në ezofag
- D) Dhimbje krampiforme retrosternale pas deglutimit
- E) Vështirësi në deglutim

Pyetja 93

Kuadri i një koleciste të zmadhuar të palpueshme tek një pacient pa ikter, sugjeron për:

- A) Kalkul në duktusin cistik
- B) Karcinoma e pankreasit
- C) Kalkuli i koledokut
- D) Karcinoma e ampulë së Vater
- E) Kalkulozë e kolecistës

Pyetja 94

Aktualisht cili është ekzaminimi më i dobishëm për diagnostikimin dhe trajtimin e kalkulozës së koledokut?

- A) Kolangio-RMN
- B) ERCP (kolangio pankreatografia retrograde endoskopike)
- C) Kolangiografia e.v
- D) TAC
- E) Ecotomografia e abdomenit superior

Pyetja 95

Kush nuk e karakterizon sëmundjen e heparit të yndyrosur jo alkolik (NAFLD):

- A) Shoqërimi me obezitet, diabet e hipertrigliceridemi
- B) Prevalencë e lartë në popullatën në përgjithësi
- C) Alternime të shpeshta të indekseve të metabolizmit të hekurit

- D) Zhvillim sistematik drejt insufiçencës hepatike
- E) Parenkima hepatike bëhet hiperecogjene

Pyetja 96

Cila prej gjendjeve mund të ndërhyjë duke maskuar rritjen e amilazës në pankretitin akut?

- A) Hiperglicemia
- B) Hipertrigliceridemia
- C) Hipokalçemia
- D) Hiperamoniemia
- E) Hiperkolesterolemia

Pyetja 97

Cili prej medikamenteve nuk sugjerohet në zhdukjen e *Helicobacter pylori*:

- A) Sucralfati
- B) Omeprazoli
- C) Amoxicilina
- D) Claritromicina
- E) Bismuthi koloidal

Pyetja 98

Cili prej ekzaminimeve është më i pranueshëm për të diferencuar ikterin kolestatik prej obstruksionit të rrugëve biliare ekstra-hepatike nga ikteri kolestatik intrahepatik:

- A) Përcaktimi i bilirubinës direkte
- B) Ecografia hepatike
- C) Përcaktimi i fosfatazës alkaline
- D) Përcaktimi i gama-GT
- E) Dozimi i acideve biliare

Pyetja 99

Të gjitha sëmundjet shkaktojnë ascit, përveç njëjës:

- A) Skompensi me stazë
- B) Mixedema
- C) Hipertiroidizmi
- D) Cirroza hepatike
- E) Tuberkuloza intestinale

Pyetja 100

Sindroma e Zollinger-Ellison shoqërohet me të gjitha gjendjet e mëposhtme, përveç njëjës:

- A) Sëmundja ulçeroze e rëndë
- B) Diarrea
- C) Hipersekrecioni acid gastrik, në kushtet bazale

- D) Hipergastrinemi
- E) Reduktimi i gastrinemisë pas stimulimit me sekretinë

Pyetja 101

Kush nuk e shkakton cirrozën hepatike?

- A) Hemokromatoza
- B) Infeksioni nga virusi C
- C) Infamacioni kronik i rrugëve biliare
- D) Infeksioni nga virusi A
- E) Infeksioni nga virusi B

Pyetja 102

Anemia makrocitike shpesh shkaktohet nga:

- A) Gastriti atrofik i trupit gastrik
- B) Polipi rektal
- C) Hipertiroidizmi
- D) Sindroma me humbje të proteinave
- E) Karcinoma e ezofagut

Pyetja 103

Tre studentë kanë ngrënë sëbashku dy ditë më parë (supë, mish me zarzavate dhe ëmbëlsirë me krem kanë paraqitur episodin e gastroenteritit febril. Analizat laboratorike tregojnë për hipopotasemi dhe qeliza inflamatore në feçe. Ky kuadër të bën të mendosh

- A) Kolera
- B) Toksiinfeksion nga clostridium
- C) Toksiinfeksion nga stafilokoku
- D) Salmoneloza
- E) Toksiinfeksion nga Bacillus cereus

Pyetja 104

Si konfermohet diagnoza e infeksionit nga HCV?

- A) Prania e anti-HCV
- B) Transaminazat rriten të paktën 7 herë më shumë se vlera normale
- C) Prania e anti-HBc
- D) Prania e HCV-ARN
- E) Prania e anti-HBs

Pyetja 105

Diarrea e udhëtarit shkaktohet më shpesh nga:

- A) Staphylococcus aureus
- B) Herpes virus
- C) Escherichia coli enterotoksigjene



- D) Mycobacterius bovis
- E) Campylobacter jejuni

Pyetja 106

Infeksioni kronik nga virusi i hepatitis C shoqërohet më shpesh me:

- A) Panarteriti nodoz
- B) Sëmundja e Churg-Strauss
- C) Leucemia me qeliza kapelute
- D) Purpura krioglobulinemike
- E) Polimialgja reumatike

Pyetja 107

Për qëllime anatomopatologjike dhe mjekoligjore, asnjë kufomë nuk mund ti nënshtrohet kryerjes së autopsisë pa kaluar të paktën :

- A) 4 orë nga vdekja
- B) 6 orë nga vdekja
- C) 24 orë nga vdekja
- D) 18 orë nga vdekja
- E) 12 orë nga vdekja

Pyetja 108

Cila nga shënjat e mëposhtme është patognomonike në vërtetimin e saktë dhe me vlerë ligjore të instalimit të vdekjes biologjike:

- A) Shfaqja e njollave hipostazike
- B) Ndalimi i frymëmarrjes dhe të qarkullimit të gjakut
- C) Humbja e ndërgjegjies
- D) Paraliza ndjesore dhe motore
- E) Humbja e refleksit corneal

Pyetja 109

Kush ka të drejtë të plotesojë një skedë vdekjeje, në rast të një vdekje natyrore :

- A) Vetëm mjeku ligjor
- B) Vetëm mjeku kurues
- C) Vetëm mjeku anatomopatolog
- D) Vetëm mjeku i familjes
- E) Çdo mjek i zakonshëm

Pyetja 110

Në plagët e shkaktuara nga armët e zjarrit, vrima e hyrjes ndryshon nga vrima e daljes :

- A) Ka diametër të barabartë me kalibrin e predhës(plumbit)
- B) Paraqet gjithmonë një rreth dërmishtjeje
- C) Paraqet përmasa më të mëdha
- D) Ka gjithmonë pamjen e një ylli

Pyetja 111

Forma e ekimozës :

- A) Varet nga struktura e veçantë anatomike e regjionit dhe sasisë së gjakut të derdhur.
- B) Tregon intensitetin e forcës goditëse
- C) Varet nga mosha e të dëmtuarit
- D) Riprodhon gjithmonë në mënyre të saktë sipërfaqjen e mjetit goditës
- E) Varet nga seksi I të dëmtuarit

Pyetja 112

Njollat kufomore :

- A) Gjenden gjithmonë vetëm në pjesët e poshtme të trupit
- B) Janë tregues të një vdekje nga dhuna
- C) Paraqesin gjithmonë të njëjtën ngjyrë
- D) Janë shënjë e sigurtë e vdekjes biologjike
- E) Janë gjithmonë të domozdoshme për të kuptuar shkakun e vdekjes

Pyetja 113

Asnjë personel mjekësor nuk mund ti nënshtrohet një ndjekje penale, në se veprimi ose mosveprimi I tij në dëm të pacientëve nuk është I parashikuar në :

- A) Kodin e Punës
- B) Kodin Penal
- C) Kodin Deontologjik
- D) Kodin Civil

Pyetja 114

Shenjat e menjëhershme të vdekjes konsiderohen :

- A) Zbehja dhe humbja e elasticitetit të lëkurës.
- B) Njollat kufomore
- C) Shtangësia kufomore
- D) Ftohja kufomore

Pyetja 115

Të ashtëquajturat " plagë mbrojtëse ", janë karakteristike :

- A) Për rastet fatkeqe
- B) Për vetvrasjet.
- C) Për aksidentet.
- D) Për vrasjet.

Pyetja 116

Plaga prerëse karakterizohet nga :

- A) Kënde të gjera.
- B) Buzë të rregullta.
- C) Mbizotërim i thellësisë ndaj përmasave të gjatësisë.
- D) Buzët të kontuzionuara

Pyetja 117

Kufoma dekompozohet më shpejtë kur qëndron :

- A) I zhytur në ujë.
- B) I groposur nën tokë.
- C) Në mjedis të jashtëm në sipërfaqen e tokës.
- D) Lundron në sipërfaqen e ujit

Pyetja 118

Në rastet e vdekjeve të dhunëshme, "Skeda e Vdekjes" plotësohet nga :

- A) Mjeku i familjes.
- B) Mjeku i poliklinikës.
- C) Prokurori.
- D) Mjeku ligjor.

Pyetja 119

Zhvillimi i "proçesit të saponifikimit" të një kufome të varrosur ndodh në mjedise :

- A) Tokë me aciditet të lartë.
- B) Tokë rënore
- C) Tokë argjilore.
- D) Tokë moçalore.

Pyetja 120

Të ashtëquajturat " plagë hezituese ", janë karakteristike :

- A) Për vrasjet
- B) Për aksidentet.
- C) Për vetvrasje
- D) Për rastet fatkeqe

Pyetja 121

Vrima e daljes në qitjet me armë zjarri në largësi, karakterizohet :

- A) Prania e brezit të fshirjes .
- B) Depozitim i faktoreve plotësues të qitjes.
- C) Permasa të mëdha të plagës.
- D) Buzët e plagës janë të përveshura nga brënda

Pyetja 122

E ashtëquajtura " lekura e pates " është shenjë karakteristike që shihet në sipërfaqen e lëkurës së kufomës :

- A) Në rastin e mbytjes në lëngje
- B) Në rastin e djegjes nga zjarri (djegiet)
- C) Në rastin e varrjes në litar
- D) Në rastin e elektrotraumës

Pyetja 123

Vepra penale e mjekimit të pakujdesshëm ka për bazë :

- A) Gabimin mjekësor.
- B) Jatrogjenitë.
- C) Fatkeqsinë mjekësore.
- D) Vetëbesimin e tepruar mjekësor.

Pyetja 124

Prova materiale biologjike është :

- A) Predha
- B) Pështyma .
- C) Gjurmet e gishtërinjve.
- D) Teshat.

Pyetja 125

Sa duhet të jetë përqëndrimi i karboksihemoglobinës në gjak (helmimet nga oksidi karbonit) që të japë vdekje :

- A) deri ne 10%,
- B) deri 20%,
- C) deri 40%
- D) deri 30%,

Pyetja 126

Asifksia mekanike nga varrja haset në praktikë si rast :

- A) Vetëvrasjeje
- B) Vrasjeje
- C) Aksidentale
- D) Fatkeqësi

Pyetja 127

Flokët (qimet) merren si mostra për të përcaktuar llojin e helmit në rastet e helmimeve me :

- A) Arsenik.
- B) Fostoksinë.
- C) Oksid karboni.
- D) Cianide.

Pyetja 128

E ashtuqujtura " Lafsha hemoragjike "është shenjë karakteristike e :

- A) Mbytjes me duar
- B) Mbytjes me lak
- C) Mbytja në lëngje
- D) Varjes

Pyetja 129

Shenja e figurës së Lichtenbergut është karakteristike në vdekjet nga :

- A) Helmimet.
- B) Hipotermia
- C) Mbytja në lëngjet
- D) Rrufeja.

Pyetja 130

Ngjyra e kuqe e çelur e lëkurës së një kufome të helmuar është karakteristike për helmimet nga :

- A) Oksidi karbonit
- B) Heroina
- C) Fostoksina
- D) Zhiva

Pyetja 131

Në varrjen e plotë, fytyra e viktimës paraqitet :

- A) E zbehtë
- B) E mavijosur
- C) E zbehtë me pika hemoragjike,
- D) E mavijosur me pika hemoragjike ?

Pyetja 132

E ashtuquajtura shenjë e " çorapeve dhe dorezave te vdekjes" është karakteristike në vdekjet nga :

- A) Mbytja në lëngjet
- B) Elektriciteti
- C) Helmimi
- D) Rrufeja
- E) Djegja

Pyetja 133

Konsiderohen helmet të gazta që merren me anën e frymëmarrjes :

- A) Arseniku
- B) Fostoksina
- C) Parationi
- D) Mërkuri

Pyetja 134

Termi "bumper fracture", në rastet e aksidenteve automobilistike është shenjë patognomonike në :

- A) Thyerje të eshtrave të kokës.
- B) Thyerje të eshtrave të gjymtyrëve të poshtëm
- C) Thyerje të eshtrave të gjymtyrëve të sipërm .
- D) Thyerje të brinjëve .

Pyetja 135

Në ç'vënd dhe kur është kryer operacioni i parë transplantiv I zezrës:

- A) Në Afrikën e Jugut në vitin 1967
- B) Në Angli në vitin 1970
- C) Në Sh.B.A në vitin 1965
- D) Në Japoni në vitin 1971
- E) Në Francë në vitin 1969

Pyetja 136

"Maska ekimotike" e shkaktuar nga shtrëngimi i qafës krijohet nga shtypja :

- A) Vetëm e arterieve
- B) Arterieve dhe venave njëkohësisht
- C) Vetëm e venave
- D) Tubit të frymëmarrjes

Pyetja 137

Brazda e strangulacionit në qafë në rastin e varrjes është :

- A) Gjysëm rrethore vertikale
- B) Gjysëm rrethore oblike
- C) Gjysëm rrethore horizontale
- D) Rrethore e plotë

Pyetja 138

Sindroma e ashtuquajtur "Vdekja blu" shihet në rastet e vdekjeve nga :

- A) Rrufeja
- B) Hipotermia
- C) Hipertermia
- D) Mbytja në lëngje

Pyetja 139

Diatomet ( planktomet) janë të rëndësishme për të përcaktuar shkakun e vdekjes në rastet :

- A) Të mbytjes në lëngje
- B) E hipotermisë
- C) E helmimit
- D) Djegjes ?

Pyetja 140

Përcaktohet si plagosje e lehte, humbja e aftësisë së përkohshme në punë :

- A) Mbi 9 ditë
- B) Deri në 3 ditë
- C) Deri në 9 ditë.
- D) Mbi 19 ditë

Pyetja 141

E ashtuquajtura " Pozë e boksjerit në mbrojtje" është shenjë karakteristike në vdekjet nga :

- A) Rrufeja
- B) Mbytja në lëngje

- C) Droga
- D) Helmimi
- E) Djegja

Pyetja 142

Dukuria e " metalizimit " në lëkurë është karakteristike në :

- A) Traumat mekanike
- B) Traumat elektrike
- C) Traumat kimike
- D) Traumat asfiktike

Pyetja 143

Cila është detyra më parësore e një mjeku që kryen një autopsi mjekoligjore :

- A) Të leshojë skedën e vdekjes
- B) Të përcaktojë shkakun e vdekjes
- C) Të marrë pjesë në kqyrjen e kufomës në vendin e ngjarjes
- D) Të kryejë procedurë konservuese mbi kufomën
- E) Të përcaktojë natyrën juridike të vdekjes

Pyetja 144

Bazuar në nenin nr.8 të ligjit "Për autopsitë" autopsia e një kufome duhet të kryhet :

- A) Menjëherë pas vdekjes
- B) 2 orë pas vdekjes
- C) 8 orë pas vdekjes
- D) 24 orë pas vdekjes
- E) 12 orë pas vdekjes

Pyetja 145

Cila është pjesa më e rëndësishme e aktit mjekoligjor :

- A) Hyrja
- B) Diskutimi mjekoligjor
- C) Përshkrimi
- D) Konkluzioni

Pyetja 146

Miratimi nga Kuvendi I Shqipërisë për krijimin e Urdhërit të Mjekut është bërë :

- A) Në vitin 2000
- B) Në vitin 1996
- C) Në vitin 2005
- D) Në vitin 2008
- E) Në vitin 1994

Pyetja 147

Etika Mjekësore është shkenca që studion :

- A) Zbatimin e rregullave të protokolleve klinike të trajtimit të pacientit
- B) Parimet dhe normat e moralit mjekësor
- C) Zbatimin e rregullave mjekësore të parandalimit të sëmundjeve
- D) Normat ligjore penale në fushën e mjekësisë.

Pyetja 148

Në cilin dokument ndërkombëtar përcaktohen kriteret lidhur me të Drejtat e Pacientit :

- A) Në Deklaratën e Lisbonës
- B) Në Deklaratën e Helsinkit
- C) Në Deklaratën e Manilës
- D) Në Deklaratën e Tokios

Pyetja 149

Pakujdesia mjekësore e mjekut në trajtimin e pacientit ka për bazë :

- A) Paaftësinë profesionale
- B) Vetëbesimin e tepruar
- C) Infrastrukturën mjekësore të pamjaftueshme
- D) Mungesën e etikës së sjelljes
- E) Mungesën e inisiativës

Pyetja 150

Në cilin rast personeli mjekësor duhet të rruajë sekretin mjekësor të pacientit ndaj opinionit publik:

- A) Në gravidancat ekstrauterine jashtëmartesore
- B) Në sëmundjet tumorale
- C) Në sëmundjet infektive
- D) Në sëmundjet psikike
- E) Në sëmundjet e rënda dhe të pakurueshme

Pyetja 151

Cila konsiderohet vdekje biologjike :

- A) Vdekja klinike
- B) Vdekja celulare
- C) Vdekja letargjike
- D) Vdekja cerebrale

Pyetja 152

Një ikter i lehtë, i cili evidentohet duke parë sklerat e pacientit në dritë natyrale karakterizohet nga cilat vlera të bilirubinës serike:

- A) 1.5-2 mg/dl
- B) 3.5-4.5 mg/dl
- C) 2.5-3 mg/dl
- D) 1-1.5 mg/dl
- E) > 5 mg/dl



Pyetja 153

Në fazat fillestare të ileusit mekanik të kolonit kuadri klinik karakterizohet nga:

- A) të vjella fekaloidë
- B) krampe abdominale
- C) mbrojtje muskulare abdominale
- D) mungesë e peristaltikës
- E) temperaturë subfebrile

Pyetja 154

Një pacient paraqitet në shërbimin ambulator me likid të lirë peritoneal, splenomegali, hemorroide, hiperaldosteronizëm, mungesë e faktorëve të koagulimit dhe hipoalbuminemi. Drejt cilës patologji duhet të orjentohehi në këto raste?

- A) Insuficiencë kardiake kongjenitale
- B) Neoplazi abdominale
- C) Sindromë nefritike
- D) Cirroze hepatike
- E) Sëmundje limfoproliferative

Pyetja 155

Cili prej markuesve të mëposhtëm është tipik për periudhën fillestare të hepatitit B?

- A) HbsAg; HbeAg; anti Hbc-IgM
- B) HbsAg; anti Hbc-IgG
- C) HbsAg; HbcAg; anti HBe
- D) HbsAg; anti HBe
- E) Anti HBS; anti HBc

Pyetja 156

Janë përgjegjës për deficietin e vitaminës B12 të gjithë faktorët e mëposhtëm me përjashtim të:

- A) Dieta ushqimore e papërshtatshme (p.sh. dieta vegjetariane)
- B) Përthithja e pakët
- C) Eliminimi i shtuar
- D) Ulçera e ezofagut
- E) Keqpërdorimi

Pyetja 157

Metoda më e mirë për të vlerësuar një steatorre është:

- A) Testi me sakarozë
- B) Testi me ksilozë
- C) Dozimi i kriprave biliare
- D) Dozimi i yndyrnave fekale
- E) Biopsia e intestinit

Pyetja 158

Të gjitha pohime e më poshtme në lidhje me karcinomën e ezofagut janë të vërteta me përjashtim të:

- A) Incidenca është më e madhe në meshkuj (raporti mashkull/femër 3:1)
- B) Preket më shpesh segmenti i poshtëm i ezofagut

- C) Faktor riskant për zhvillimin e karcinomës është padyshim hernia hiatale
- D) Shpesh herë shoqërohet me fenomene disfagie
- E) Rreziku i sëmundjes është më i madh në njerëzit që pinë duhan se sa te ata që nuk pinë

Pyetja 159

Në urgjencë paraqitet një pacient 35 vjeç, që ka përdorur alkool për një kohë të zgjatur, i cili ankon për një dhimbje të fortë të menjëherëshme në regjionin periumbelikal dhe epigastrik që përhapet në të dy flanket dhe në segmentin e poshtëm torakal të k

- A) Ulçera gastrike
- B) Ulçera duodenale
- C) Sëmundje e kolon trasvers
- D) Pankreatit akut
- E) Sëmundje e kolonit zbritës

Pyetja 160

Pacientët që vuajnë nga refluksi gastro-ezofageal:

- A) Vetëm shqetësime simptomatike pa sekela të rëndësishme
- B) Duhet të konsumojë sai të mëdha të karamelëve me mente dhe çokollata
- C) Kanë rrezik për të zhvilluar astëm, SPOK (Sëmundje Pulmonare Obstruktive Kronike), fibrozë pulmonare
- D) Nuk kanë rrezik për të zhvilluar neoplazi
- E) Të gjitha pohimet janë të vërteta

Pyetja 161

Megakolon toksik paraqitet si ndërlikim i një prej këtyre ssituatave:

- A) Rektokoliti ulçeroz
- B) Sëmundja Crohn
- C) Divertikuloza e kolonit
- D) Enterokliti
- E) Stenozat neoplastike të kolonit

Pyetja 162

Pankreatiti akut mund të shkaktohet nga të gjitha elementët e poshtëshënuar me përshtim të:

- A) Kalkulozës biliare
- B) Abuzimit me alkool
- C) Ndërhyrjeve kirurgjikale në rrugët biliare ose në stomak
- D) Toksina
- E) Hipertrofia e pilorit

Pyetja 163

Shkaku më i shpeshtë i kolestazës ekstraheaptike është:

- A) Kalkuloza e koledokut
- B) Parazitozat
- C) Ligatura aksidentale e koleokut
- D) Pankreatiti akut
- E) Pankreatiti kronik

Pyetja 164

Shkaku i hipertensionit portal presinusoidal ekstrahepatik është:

- A) Parazitozat
- B) Leuçemia mieloide
- C) Cirroza heptike
- D) Tromboza e venës porta
- E) Cirroza heptike

Pyetja 165

Cili është një funksion i rëndësishëm fiziologjik i acideve biliare?

- A) favorizimi i ekskretimit të substancave toksike
- B) favorizimi i absorbimit të vitaminës B12
- C) ruajtja e Ph intestinal në normë
- D) favorizon përthithjen e yndyrnave
- E) favorizon përthithjen e aminoacideve

Pyetja 166

Parametrat laboratorik më të nevojshëm për monitorimin e aktivitetit të një procesi inflamator në hepatitin kronik janë::

- A) kriprat biliare
- B) bilirubina
- C) transaminazat dhe gamaglobulinat
- D) koha e protrombinës
- E) fosfataza alkaline

Pyetja 167

Simptoma e "pirozës retrosternale" është karkateristike për:

- A) ulçerën gastrike
- B) ulçerën duodenale
- C) gastritet autoimune
- D) sëmundjen e refluxit gastro-ezofageal
- E) gastritin nga Helikobakter pilori

Pyetja 168

Cila nga këto sëmundje mund të jetë shkaktare e komës hepatike?

- A) hepatiti kronik që ka evoluar drejt cirrozës
- B) ikteri obstruktiv nga kalkuloza
- C) cirroza hepatike e dekompesuar
- D) sëmundja Gilbert
- E) cirroza nga hepatiti B

Pyetja 169

Të gjithë barnat e poshtëshënuar përdoren në trajtimin e ulçerës peptidike, me përjashtim të:

- A) salazopirinës

- B) omeprazolit
- C) sukralfatit
- D) ranitidinës
- E) pirenzepinës

Pyetja 170

Cili është një element tjetër i rëndësishëm, përveç anamnezës, në vendosjen e diagnozës të pneumokoniozës?

- A) shinitgrafia pulmonare
- B) provat funksionale
- C) lavazhi bronkoalveolar
- D) radiografia torakale
- E) astrupograma

Pyetja 171

Silikoza shkaktohet nga:

- A) bioksidi i lirë i silicit
- B) bioksidi i lidhur i silicit
- C) tetraoksidi i silicit
- D) silici i lirë
- E) asnjë nga përgjigjet

Pyetja 172

Ndërlikimi më i shpeshtë i asbestozës pulmonare është:

- A) pneumotoraksi
- B) mezoltelioma pulmonare
- C) karcinoma spinoqelizore
- D) adenokarcinoma pulmonare
- E) Asnjë nga përgjigjet

Pyetja 173

Prania e kalçifikimit në formën e "lëvozhgës të vezës" e limfonodujve hilar, është tipike e cilës pneumokoniozë?

- A) asbestozës
- B) beriliozës
- C) silikozës
- D) talkozës
- E) asnjë nga përgjigjet

Pyetja 174

Plani Kombëtar i Shëndetësisë përfaqëson:

- A) bashkësinë e ligjeve që rregullojnë aktivitetin mjekësor kombëtar

- B) rregullat për organizimin e shërbimit shëndetësor
- C) rregullat për aplikimin e terapiave mjekësore
- D) bashkësinë e ligjeve, normave, rregullave të nevojshme për realizimin korrekt të veprimtarisë mjekësore në të gjithë vendin
- E) të gjitha pohimet

Pyetja 175

Funksioni kryesor i Institutit të Shëndetit Publik është:

- A) të mbështesi veprimtarinë mjekësore rajonale
- B) të këshilloj qeverinë në lidhje me hartimin e linjave guidë të trajtimit
- C) të këshilloj ministrinë e shëndetësisë në lidhje me mënyrat e përmirësimit të shëndetit të qytetarëve
- D) të realizojë punë kërkimore të vazhdueshme në drejtim të vlerësimit dhe kontrollit të shëndetit publik
- E) të bashkëpunoj me ministrinë në realizimin e kontrollit të barnave

Pyetja 176

Ku është qendra e Organizatës Botërore të Shëndetësisë?

- A) Strasburg
- B) Bruksel
- C) Londër
- D) Gjenevë
- E) Stokholm

Pyetja 177

Faktorët përcaktues të shëndetit përfshijnë:

- A) faktorët biologjik dhe gjenetik
- B) stilin e jetesës
- C) faktorët social-ekonomik
- D) shtrirjen dhe natyrën e shërbimeve shëndetësore
- E) të gjitha pohimet

Pyetja 178

Qëllimi i edukimit shëndetësor është:

- A) të ndryshojë sjelljet shëndetësore
- B) të përmirësojë gjendjen shëndetësore
- C) A dhe B janë të sakta
- D) të informojë në lidhje me shëndetin
- E) të realizojë projekte shëndetësore

Pyetja 179

Mjeku ligjor ka për detyrë të:

- A) realizojë plotësimin e skedës të vdekjes
- B) realizojë verifikimin e rrethanave të ngjarjes

- C) përcaktojë vdekjen
- D) të gjitha janë të vërteta
- E) asnjë nga këto

Pyetja 180

Mumifikimi është:

- A) formë e konservimit të kufomës
- B) faza e fundit e kalbëzimit të kufomës
- C) faza e lëngëzimit të kufomës
- D) faza e ngjyrit të kufomës
- E) njëlloj si sapunifikimi

Pyetja 181

Në ekzaminimin mjeko-ligjor të kufomës bëjnë pjesë:

- A) kqyrja e kufomës në vendin e ngjarjes
- B) autopsia mjekoligjore e kufomës
- C) autopsia e dytë ose e përsëritur
- D) zhvarrosja e kufomës
- E) të gjitha pohimet

Pyetja 182

Marrëdhënia seksuale konsiderohet krim atëhere kur:

- A) kryhet me disa persona njëkohësisht
- B) kryhet me persona të ndryshëm në kohë të ndryshme
- C) kryhet duke përfutur nga pazotësia e të dëmtuarës/it për tu mbrojtur
- D) kur kryhet pa përdorur masa mbrojtëse
- E) asnjë nga këto

Pyetja 183

Ekspertimi mjekoligjor i gjakut merr vlera të mëdha në:

- A) çeshtje civile për zgjidhje të padive për njohje ose kundërshtim të atësisë apo mëmësisë
- B) çështjet e pronësisë
- C) përcaktimin e shkakut të vdekjes të foshnjes
- D) të gjitha alternativat janë të vërteta
- E) asnjë nga alternativat nuk është e vërtetë

## **09. Sëmundje Infektive dhe Alergologji, Immunologji**

Pyetja 1

Cila është vatra infektive më e shpeshtë që shkakton sepsi tek pacientët jo të hospitalizuar:

- A) Infeksion që nis nga rrugët e frymëmarrjes
- B) Infeksion që nis nga trakti gastroenterik
- C) Infeksion i endokardit
- D) Infeksion i aparatit urinar

E) Infeksion/kolonizim i CVC

Pyetja 2

Cila prej sëmundjeve përkufizohet si zoonosë:

- A) Askaridiaza
- B) Ankilostomiaza
- C) Amebiaza
- D) Enterobiaza
- E) Toxoplazmoza

Pyetja 3

Temperaturë 38-39° celsius, prurit të trupit, rash vezikular me prurit të gjeneralizuar me makula, papula, vezikula, flluska e kore, anoreksi, frisione, cefale. Ky kuadër klinik të bën të mendosh për:

- A) Fruthi
- B) Lija e dhenve
- C) Rubeola
- D) Skarlatina
- E) Mononukleoza

Pyetja 4

Profilaksia e pneumonisë nga P. Carinii tek personat me HIV bëhet me:

- A) Cotrimosazol
- B) Meflokine
- C) Amfotericina B
- D) Amoxicilina dhe ac. Clavulanic
- E) Fluconazol

Pyetja 5

Nëpërmjet cilit prej likideve trasmetohet HIV-i:

- A) Djersa
- B) Gjak
- C) Lotë
- D) Urina
- E) Pështyma

Pyetja 6

Polmoniti lobar i mirëfilltë shkaktohet kryesisht nga:

- A) Streptococcus pyogenes
- B) Listeria monocytogenes
- C) Stafilococcus aureus
- D) Streptococcus pneumonie

E) Mycoplasma pneumonie

Pyetja 7

Botulizmi nga ushqimi shkaktohet kryesisht pas konsumimit të:

- A) Ushqim kutie i konservuar në vaj ose i marinuar në kushte shtëpie
- B) Mish i pa bërë ose pak i bërë
- C) Ushqim i konservuar në uthull
- D) Ujë i ndotur
- E) Midhje ose peshk të gjallë

Pyetja 8

Hepatiti akut nga virusi A:

- A) Dyshohet pas përdorimit të ushqimeve të konservuara
- B) Diagnostikohet vetëm nëse ka pozitivitet për antitrukat anti-HAV të klasës IgG
- C) Nuk ka asnjëherë zhvillim fulminant
- D) Shkakton rritje të bilirubinemisë por që nuk shkon më shumë se 25mg/dl
- E) Trasmetohet me rrugë oro-fekale

Pyetja 9

Hepatitet që transmetohet me rrugë oro-fekale janë:

- A) Hepatiti C dhe D
- B) Hepatiti B
- C) Hepatiti A dhe D
- D) Hepatiti A dhe B
- E) Hepatiti A dhe C

Pyetja 10

Në tripanozomiazën amerikanëcilat janë manifestimet më të rënda dhe më të shpeshta të sëmundjes kronike?

- A) Megaezofagu
- B) Megakolon
- C) Insufiçenca hepatike
- D) Insufiçenca reanle
- E) Kardiomiopatia

Pyetja 11

Sepsi karakterizohet nga:

- A) Prezenca tranzitore e bakteve në gjak
- B) Hiporeaktiviteti ndaj një infeksioni
- C) Reaksion i ekzagjeruar i organizmit ndaj një infeksioni
- D) Lokalizim i infeksionit në një ose dy organe



E) Lëshimin apo hedhjen në gjakun qarkullues të bakteleve nga një vatër infektive e lokalizuar

Pyetja 12

Oksiuraza shkaktohet nga:

- A) Echinococcus granulosus
- B) Taenia solium
- C) Necator americanus
- D) Enterobius vermicularis
- E) Hymenolepis nana

Pyetja 13

Cili prej agjentëve etiologjikë është shkaktari më i shpeshtë i osteomielitit akut?

- A) Salmonella tifo
- B) Haemophilus influenzae
- C) Streptococco
- D) Stafilococco aureus
- E) Gonococco

Pyetja 14

Cili prej agjentëve etiologjikë është më shpesh shkaku i miokarditit akut?

- A) Coxackie virus
- B) Stafilococco aureus
- C) EBV
- D) Streptococcus viridans
- E) Lija e dhenve

Pyetja 15

Herpes Zoster:

- A) Shkaktohet nga një enterovirus
- B) Shkaktohet nga një virus i ngjashëm me atë të lisë së dhenve
- C) Shkaktohet nga një rinovirus me ADN
- D) Shkaktohet nga i njëjti virus i lisë së dhenve
- E) Shkaktohet nga coxackie

Pyetja 16

Cili prej këtyre baketeleve shkakton leukopeni?

- A) Klensiella oxitoca
- B) Pseudomonas
- C) Streptococco i grupit A
- D) Enterococco
- E) Salmonella typhi

Pyetja 17

Neoplazia më e shpeshtë gjatë AIDS është:

- A) Adenokarcinoma gastrike
- B) Adenokarcinoma e laringut
- C) Leucemia limfatike kronike
- D) Sarkoma e Kaposit
- E) Adenokarcinoma e pulmonit

Pyetja 18

Gjatë mononukleozës infektive, në ekzaminim hemokromocitometrik vihet re:

- A) Limfopeni
- B) Neutrofili relative
- C) Limfocitozë me prani të limfociteve aktive
- D) Eozinofili
- E) Policitemi

Pyetja 19

Meningiti purulent karakterizohet nga cila gjendje e likidit cerebrospinal:

- A) Hipoproteinorraki, pleiocitozë neutrofile, glikorraki normale
- B) Hiperproteionorraki, pleiocitozë nutrofile, hipoglikorraki
- C) Hiperproteionorraki, pleiocitozë limfocitare, hipoglikorraki
- D) Proteinorraki në normë, mungesë të pleiocitozës, hipoglikorraki
- E) Hiperproteionorraki, pleiocitozë limfocitare, glikorraki normale

Pyetja 20

Një i ri toksikodipendent (per i.v) ka shfaqur prej 4 muajsh hepatitin akut dhe koinfeksionin HBV+HDV. Mjkeu i familjes i keshillon të kryej disa analiza laboratorike për të vlerësuar gjendjen e sëmundjes. Rezultatet janë: transaminazat normal; antitru

- A) Transaminazat në normë
- B) Antitruapat anti HBs pozitive
- C) HBV-ADN plazmatike negative
- D) Antitruapat anti HDV pozitiv
- E) Antitruapat anti HBe pozitive

Pyetja 21

Cilat janë alternimet laboratorike që vihen re gjatë mononukleozës infektive?

- A) Leukopeni dhe piastrinopeni
- B) Leukocitozë neutrofile dhe rritje të transaminazave
- C) Leukopeni dhe rritje të bilirubinës
- D) Leukocitozë limfocite dhe rritje të transaminazave
- E) Anemi dhe piastrinopeni

Pyetja 22

Mbledhja e sekrecioneve për ekzaminimin në kulturë mund të kryhet:

- A) Vetëm në mëngjes, edhe pse pacienti nuk ka kollë
- B) Cdo moment të ditës, mjafton që pacienti të ketë kollë me sekrecione
- C) Preferohet nëse pacienti ka qëndruar gjatë i shtrirë
- D) Vetëm në mëngjes kur je pa ngrënë
- E) Disa herë gjatë ditës në momentet kur ka pikun e temperaturës

Pyetja 23

Vdekja e zezë (peste bubbonica) transmetohet nga:

- A) Miza
- B) Morri
- C) Mushkonja
- D) Pleshti
- E) Grenxa

Pyetja 24

Shfaqja më e shpeshtë e infeksionit të parë nga herpes simlex tip 1 është:

- A) Herpes labial
- B) Hepatit
- C) Ezofagit
- D) Gengivo-stomatit
- E) Encefalit

Pyetja 25

Sepsi karakterizohet nga:

- A) Prania në gjak e bakteve në proces shumimi aktiv
- B) Prania në gjak e antigjeneve bakteriale
- C) Alternimi i termorregullimit në nivelin qendror
- D) Prania në gjak e grimcave virale defektive
- E) Mungesa e një përgjigje inflamatorë sistemike

Pyetja 26

Virusi Ebola ka shkaktuar epidemi në

- A) Europën veriore
- B) Europën lindore
- C) Azi
- D) Amerikën e jugut
- E) Afrikë

Pyetja 27

Cfarë shenjash paraqet një pacient i prekur nga botulizmi?

- A) Shenja të një polmoniti
- B) Shtim të pështymës
- C) Crrregullime sensitive
- D) Diarre persistente
- E) Shenja neurologjike me paralizë

Pyetja 28

Cila prej sëmundjeve shkaktohet nga chlamidie?

- A) Trakoma
- B) Temperatura Q
- C) Myku
- D) Sëmundja e Weil
- E) Sporotrikoza

Pyetja 29

Cili prej viruseve është shkaku më i mundshëm për Sarkomën e Kaposit?

- A) Herpesvirusi human 8
- B) Virus coxackie
- C) Virusi T-limfotrop
- D) Citomegalovirus
- E) Echo-virus

Pyetja 30

Cili është trajtimi i dizanterisë nga ameba:

- A) Cefalosporina
- B) Vancomicina
- C) Albendazoli
- D) Metronidazoli
- E) Fluorokinoloni

Pyetja 31

Tek një pacient të prekur nga kolera, ndërhyrja e parë terapeutike bazohet në:

- A) Dhënien e antibiotikëve
- B) Dhënien e dizinfektantëve intestinalë
- C) Rehidrimin e pacientit me solucione elektrolitike dhe ruajtjen e hidratimit.
- D) Pastrimin me anë të kriprave
- E) Edhe pse nuk ka të vjella pacienti duhet mbajtur pa ngrënë

Pyetja 32

Polmoniti lobar shkaktohet në përgjithësi nga:

- A) Pneumococcu
- B) Enterococcu
- C) Stafilococcu
- D) Virusi respirator sincial
- E) Mycoplasma pneumonie

Pyetja 33

Pacienti me temperaturë, eritemë migruese, cefale dhe dhimbje artikulare me shumë mundësi është prekur nga:

- A) Reumatizmi artikular akut
- B) Ricketsioza
- C) Fruthi
- D) Sëmundja e Lyme
- E) Lija e dhenve

Pyetja 34

Cili ushqim shkakton më lehtësisht intoksikim nga Stafilococcu aureus?

- A) Uji i ndotur
- B) Mishi i zier
- C) Frutat e freskëta
- D) Fruta të thata
- E) Kremi i pastičerisë

Pyetja 35

Meningiti është proces inflamator:

- A) Përfshin parenkimën cerebrale
- B) Përfshin leptomeninget
- C) Përfshin durën
- D) Përfshin vetëm bazën e kranit
- E) Përfshin vetëm pjesën e sipërme të kranit

Pyetja 36

Për cilin prej hepatiteve ekziston vaksinë?

- A) Hepatiti A dhe C
- B) Hepatiti A dhe B
- C) Hepatiti D
- D) Hepatiti C
- E) Hepatiti G, A dhe B

Pyetja 37

Temperaturë 40° celsius, konxhuktivit, fotofobi, rash makulo-papular eritematoz (nga fytyra në trup, në ekstremitete, duar e kembë). Ky kuadër klinik ju bën të mendoni për:

- A) Lija e dhenve
- B) Fruthi
- C) Skarlatina
- D) Rubeola
- E) Mononukleoza

Pyetja 38

Tek bruceloza, temperatura:

- A) Mungon
- B) Ehtë periodike
- C) Ehtë onduluose
- D) Rritet me shkallë gjatë javës së parë të sëmundjes
- E) Kap maksimumin në ditën e tretë të sëmundjes

Pyetja 39

Forma më e rëndë e malaries është ajo që shkaktohet nga:

- A) Plasmodium malaria
- B) Plasmodium vivax
- C) Plasmodium oval
- D) Plasmodium falciparum
- E) Plasmodium oval tek një person që ka vuajtur dhe më parë nga P. Malaria

Pyetja 40

Për cilën nga patologjitë sugjerohet terapi me antibiotikë?

- A) Mononukleoza infektive
- B) Hepatiti B akut
- C) Ethet e verdha
- D) Bruceloza
- E) Ethet tropikale

Pyetja 41

Malaria është e përhapur në:

- A) Në zona tropikale dhe subtropikale
- B) Vetëm në vende bregdetare
- C) Zona në lartësinë mbi 1800 m
- D) Vetëm në disa zona afrikane
- E) Vendet e Mesdheut

Pyetja 42

Për një pacient dyshohet të ketë tifon abdominale. Për të konfirmuar këtë diagnozë kërkojmë:

- A) Reaksionin e Wasserman-it
- B) Sierodiagnozën e Wright
- C) Antitruapat jo të plotë
- D) Reaksionin e Widal-it
- E) Reaksionin e Paul Bunnel

Pyetja 43

Sëmundjet me origjinë virale, në shumicën e rasteve shoqërohen me:

- A) Leukocitozë neutrofile
- B) Leukocitozë limfocite
- C) Leukocitozë bazofile
- D) Trombocitozë
- E) Limfocitozë

Pyetja 44

Hemokultura konsiston në kulturën e gjakut për të kërkuar agjentët patogjenë që shkaktojnë sëmundje që përhapen (si sepsi, endokarditi etj.):

- A) Është i mjaftueshëm marrja e një kampioni gjaku kur pacienti ka temperaturë
- B) Është i mjaftueshëm marrja e kampionit të gjakut në mënyrë rastësore
- C) Marrja e gjakut bëhet vetëm herët në mëngjes dhe pa ngrënë
- D) Shpeshësia e marrjes së kampionëve të gjakut varet dhe nga agjenti patogjen për të cilin dyshojmë
- E) Është e domosdoshme marrja e përsëritur e disa kampionëve të gjakut gjatë 24 orëve, pasi prania e baktereve në gjak nuk është e përherëshme

Pyetja 45

Cila patologji e lëkurës ka rrezik më të lartë për të zhvilluar herpex simlex të rëndë:

- A) Psoriaza
- B) Dermatiti atopik
- C) Ekzema nga kontakti
- D) Dermatiti
- E) Lytha

Pyetja 46

Cila nga alternativat rreth toxoplazmës nuk është e vërtetë:

- A) Në format intrauterine ka shpesh përfshirje të trurit
- B) Macja është mbartësi përfundimtar
- C) Mund të ketë encefalit tek pacientët imunodepres
- D) Macja është mbartësi i ndërmjetëm dhe njeriu ai përfundimtar
- E) Shpesh është asimptomatike

Pyetja 47

Cfarë është influenza aviare?

- A) Transmetohet nga insektet
- B) Sëmundje e kafshëve shkaktuar nga virusët aviar, që normalisht infektojnë vetëm zogjtë
- C) Është sëmundje pandemike
- D) Trasmtohet nga flebotomi
- E) Është sëmundje bakterial

Pyetja 48

Si do të ishte më e saktë të veprohej kur duam të vaksinojmë kundër rubeolës një grua në moshë fertile?

- A) Injektivim të vaksinës në mes të ciklit
- B) Injektivim të vaksinës në ditën 24-26 të ciklit
- C) Injektivim të vaksinës në fund të ciklit
- D) Injektivim i vaksinës gjatë çdo faze të ciklit dhe dhënia e kontraktivëve për gjashtë muaj me rradhë
- E) Injektivim të vaksinës gjatë ciklit menstrual dhe dhënia e kontraktivëve për tre muaj me rradhë

Pyetja 49

Shfaqja kryesore klinike e brucelozës akute e sub-akute është:

- A) Temperatura terciare (e tre ditëve)
- B) Temperatura me stade
- C) Temperatura anfibolike (me luhetje)
- D) Temperatura kuintane (e pesë ditëve)
- E) Temperatura onduluese

Pyetja 50

Si quhen kushtet në të cilat ndalohet kalimi i mikroorganizmave në ambiente sterile?

- A) Antisepsi
- B) Bonifikimi i ambientit
- C) Bakteriofazë
- D) Zona filtër
- E) Asepsi

Pyetja 51

Cili prej infeksioneve nuk mund të përkufizohet si një infektiv oportunist tek pacienti me AIDS?

- A) Meningiti kriptomik
- B) Pneumocistoza pulmonare
- C) Toxoplazmoza cerebrale
- D) Korioretiniti citomegalik
- E) Retokoliti ulçeroz



Pyetja 52

Cila është simptoma më e shpeshtë e mononukleozës infektive:

- A) Faringodini
- B) Anoreksi
- C) Mialgji
- D) Nauze
- E) Kollë

Pyetja 53

Një fëmijë 6 muajsh, pas 3 ditësh me temperaturë të lartë shfaq ekzantemë të kuqërremtë në të gjithë lëkurën dhe ndërkohë temperatura ulet në mënyrë të menjëhershme. Nga se mund të jetë prekur ky fëmijë?

- A) Fruthi
- B) Infeksion kongenital nga citomegalovirus
- C) Rubeola
- D) Toxoplazmoza kongenitale
- E) Ekzantema kritike

Pyetja 54

Në një person të imunizuar kundrejt hepatitit B, infeksioni nga virusi delta (HDV) shfaqet:

- A) Asnjëherë
- B) Më pak se 10% të rasteve
- C) Midis 10-50% të rasteve
- D) Më shumë se 50% të rasteve
- E) Në 10% të rasteve

Pyetja 55

Rast klinik: Rreth 5 orë pas një dasme, disa prej të ftuarve shfaqën dhimbje abdominale, të vjella, diarre. Cila mund të jetë diagnoza?

- A) Gastroenterit viral
- B) Enterit nga campylobacter jejumi
- C) Infeksion nga salmonela
- D) Intoksikim nga stafilococcus aureus
- E) Amebiazë

Pyetja 56

Cilin ekzaminim do të kryenit nëse dyshoni për tenian?

- A) Urinokulturë
- B) Tampon rektal
- C) Koprokulturë
- D) Analizë parazitologjike të feçeve

E) Analizë urine

Pyetja 57

Cila nuk është ndër simptomat e shpeshta të infeksionit primar nga HIV?

- A) Temperaturë
- B) Faringodini
- C) Alopeci
- D) Rash kutan makulo-papular
- E) Artralgi

Pyetja 58

Sterilizim do të thotë:

- A) Shkatërrim të agjentëve patogjenë
- B) Shkatërrim të gjithckaje që mbart një agjent mikrobial
- C) Shkatërrim të agjentëve jo patogjenë
- D) Shkatërrim vetëm të agjentëve bakterialë
- E) Shkatërrim të agjentëve patogjenë e jo patogjenë

Pyetja 59

Në aspektin epidemiologjik, hepatiti A lidhet më shumë me:

- A) Përdorimi i ujit ose frutave të detit të kontaminuara
- B) Përdorimi i hemoderivuesve
- C) Marrëdhëniet heteroseksuale jo të mbrojtura
- D) Shkëmbimi i lugëve që janë përdorur nga persona të sëmurë me HAV
- E) Kontakti i ngushtë respirator me persona të sëmurë

Pyetja 60

Manifestimi më i shpeshtë tek një i rritur imunokompetent është:

- A) Retiniti
- B) Hepatiti akut
- C) Limfadeniti
- D) Hepatiti kronik
- E) Encefaliti

Pyetja 61

Leukopenia është e shpeshtë në rastin e:

- A) Kolera
- B) Etnet tifoide
- C) Shigelozë
- D) Enteriti nga Escherichia coli enterohemorragjik
- E) Leptospiroza

Pyetja 62

Orkiti është komplikim i munshëm i njërës prej sëmundjeve infektive. Cilës prej tyre?

- A) Rubeola
- B) Fruthi
- C) Parotiti (shytat)
- D) Lija e dhenve
- E) Ekzantema kritike

Pyetja 63

Të sapolindurit nga nëna të infektuara me HIV janë:

- A) Gjithnjë HIV-Ab negativ
- B) Gjithnjë HIV-Ab pozitiv
- C) Gjithnjë HIV-ARN negativ
- D) Gjithnjë HIV-ARN pozitiv
- E) HIV-Ab pozitiv në 50% të rasteve

Pyetja 64

Cili prej këtyre agjentëve shkakton më shpesh hepatit fulminant?

- A) Virusi i fruthit
- B) Pneumocysti carini
- C) HIV
- D) HBV
- E) Leishmania donovani

Pyetja 65

Cili prej virusëve nuk shkakton sindromën e mononukleozës?

- A) Koronavirus
- B) Virusi i Epstein-Barr
- C) Herpes virus human tipi 6 (HHV6)
- D) HIV
- E) Virusi i rubeolës

Pyetja 66

Hepatiti nga virusi delta verifikohet vetëm në rast se ekziston njëkohësisht dhe infeksioni nga:

- A) HBV
- B) HAV
- C) Virusi Epstein-Barr
- D) HCV
- E) Citomegalovirus

Pyetja 67

Cila strukturë preket më shpesh nga infeksioni i citomegalovirusit?

- A) Gjëndrat e pështymës
- B) Hepar
- C) Pulmoni
- D) Pulmoni dhe hepar
- E) Gjëndrat e pështymës dhe veshkat

Pyetja 68

Terapia për meningitin tuberkular përfshin 4 medikamente antituberkuale. Cili prej këtyre medikamenteve nuk përfshihet?

- A) Isoniazidi
- B) Claritromicina
- C) Pirazinamidi
- D) Etambutoli
- E) Rifampicina

Pyetja 69

Pneumonitë e komunitetit janë:

- A) Merren pas një episodi gripi (influenca)
- B) Merren në komunitetet e toksikodipendentëve
- C) Merren në spital
- D) Tek të sapolindurit
- E) Merren jashtë spitali, në jetën e përditshme

Pyetja 70

Chikungunya e njohur dhe si "sëmundja e njeriut të përkulur" transmetohet nga:

- A) Ushqimi
- B) Nga insektet
- C) Kontakti seksual
- D) Pickimi i mushkonjës së infektuar, Aedes Albopictus dhe Aedes Aegypti
- E) Inhalimi

Pyetja 71

Cili është agjenti etiologjik i etheve Q?

- A) Clamidia
- B) Legionela
- C) Coxiela burneti
- D) H.influenca
- E) Streptococcu

Pyetja 72

Në cilën shtatë ditësh të etheve tifoide hemokultura është më shpesh pozitive?

- A) Shtatë ditëshi i IV
- B) Shtatë ditëshi i II
- C) Shtatë ditëshi i III
- D) Shtatë ditëshi i I
- E) Shtatë ditëshi i V

Pyetja 73

Kondilomat (lythat) shkaktohen nga:

- A) HSV
- B) HPV
- C) Enterovirus
- D) HIV
- E) Baktere

Pyetja 74

Vaksinimi kundër kolerës jep:

- A) Imunitet për 6 muaj
- B) Imunitet për 5 vjet
- C) Imunitet për 10 vjet
- D) Imunitet për 18 muaj
- E) Imunitet të përhershëm

Pyetja 75

Cili prej markuesve të gjakut mundëson diagnozën etiologjike për hepatitin akut tip B?

- A) HBsAg
- B) IgM anti HBc
- C) AntiHBc
- D) IgG antiHBc
- E) HBeAg

Pyetja 76

Streptocoket viridant shkaktojnë më shpesh:

- A) Meningit
- B) Cistopielit
- C) Endokardit
- D) Kolecistit
- E) Enterit

Pyetja 77

Medikamentet parësore për trajtimin e brucelozës janë:

- A) Antibiotikët glikopeptidikë
- B) Tetraciklina
- C) Cefalosporina të gjeneratës së II
- D) Cefalosporina të gjeneratës së III
- E) Metronidazoli

Pyetja 78

Cila prej sëmundjeve nuk transmetohet nëpërmjet rrugëve seksuale:

- A) Ulçera e butë venere
- B) HBV
- C) Limfogramuloma venere
- D) Limfoma e Lennert
- E) Herpes simplex tip 2

Pyetja 79

Shënja e Koplik është e pranishme në:

- A) Lija e dhenve
- B) Rubeola
- C) Fruthi
- D) Skarlatina
- E) Tifo

Pyetja 80

Endokarditi infektiv tek toksikodipendentët që marrin drogë nga vena shkaktohet më shumë nga:

- A) Gonococu
- B) Streptococu viridans
- C) Escherichia coli
- D) Enterococu
- E) Stafilococu aureus

Pyetja 81

Të gjitha gjendjet e mëposhtme mund të japin fals pozitiv për reaksionin ndaj sifilizit, përveç njëjës:

- A) Mononukleoza infektive
- B) Tripanozomiaza
- C) Bruceloza
- D) Malaria
- E) Lupus eritematoz sistemik

Pyetja 82

Erisipela shkaktohet nga:

- A) Agjenti nuk është identifikuar ende
- B) Stafilococu aureus
- C) Streptococu piogenes
- D) Në shumicën e rasteve izolohet agjent i ngjashëm e prionet
- E) Proteus vulgaris

Pyetja 83

Cili prej alternativave të likidit cerebro-spinal diferencon meningitin bakterial nga ai viral?

- A) Hiperproteinorraki
- B) Pleiocitozë likidi
- C) Prevalencë limfocitare
- D) Hipoglikorraki
- E) Rritje të presionit në likid

Pyetja 84

Flora bakteriale normale e pranishme në organizëm:

- A) Është e pranishme vetëm tek personat që janë shëruar nga një sëmundje infektive
- B) Prania e saj tregon se personi është i sëmurë
- C) Është e pranishme vetëm tek personat imunodepres (AIDS, neoplazi, trapiante etj.)
- D) Është e rëndësishme, sepse ka funksion mbrojtës
- E) Është e pranishme vetëm tek personat me sëmundje infektive kronike

Pyetja 85

Një person i vaksinuar për hepatitin B është:

- A) Anti HBs pozitiv
- B) AntiHBe pozitiv
- C) AntiHBe dhe Anti HBc pozitiv
- D) AntiHBe, antiHBc dhe anti HBs pozitiv
- E) HBsAg pozitiv

Pyetja 86

Cestodet :

- A) Nuk janë patogjen për njeriun
- B) Janë protozoarë
- C) Janë krimba të sheshtë të segmentuar
- D) Janë krimba cilindrikë
- E) Janë krimba të sheshtë jo të segmentuar

Pyetja 87

Cila prej vaksinave përmban virus të gjallë të dobësuar?

- A) Anti ethet e verdha
- B) Antidifteriku
- C) Antipolio tip Salk
- D) Anti hepatiti A
- E) Antitifo

Pyetja 88

Perforimi intestinal është pjesë e komplikimeve të:

- A) Kollitit pseudomembranoz
- B) Enteriti nga *Campylobacter jejunum*
- C) Kolera
- D) Ethet tifoide
- E) Shigeloza

Pyetja 89

Imuniteti pasiv gjatë një infeksioni është ai i fituar nga:

- A) Pasi e hasur infeksionin dhe më pas është shëruar
- B) Pasi e ka hasur infeksionin por pa klinikë
- C) Mamaja
- D) Pasi e ka hasur infeksionin dhe më pas është shëruar, pavarësisht nga kuadri klinik
- E) Pasi është vaksinuar për këtë infeksion

Pyetja 90

Një e re 25 vjeçare shfaq temperaturë, faringodini dhe asteni. Pas 24 orëve ku temperatura rritej, ajo vuri re praninë e disa limfonodujve në qafë. Konsultohet me mjekun dhe vihet re: limfonoduj të zmadhuar në të gjitha stacionet limfatike sipërfaqësore,

- A) *Mycoplasma hominis*
- B) *Streptococcus* gr A
- C) Virusi i Epstein-Barr
- D) *Neisseria gonorrhoea*
- E) *Escherichia coli*

Pyetja 91

Profilaksia ndaj meningitit meningokoksik për ata që janë kontakt të ngushtë me të bëhet me:

- A) Gamaglobulina
- B) Cloramfenikol
- C) Peniciline
- D) Ertromicine
- E) Rifampicine

Pyetja 92

Spiroketet e llojit *Borrelia* mund të shkaktojnë:



- A) Stomatit
- B) Tifon murine
- C) Temperaturën periodike
- D) Gripin
- E) Gastritin

Pyetja 93

Cila është terapia për Morbusin e Hansen, në formën tuberkulare:

- A) Dapsoni
- B) Rifampicina
- C) Clofazimina
- D) Dapsoni+Rifampicina
- E) Claritromicina

Pyetja 94

Skarlatina shkaktohet nga:

- A) Stafilokoku
- B) Streptokoku i gr A
- C) Treponema pallidum
- D) Nuk njihet etiologjia
- E) Pneumokoku

Pyetja 95

Idatidoza shkaktohet nga:

- A) Agjentë të ngjashëm me prionet
- B) Tenia
- C) Hymonelepis nana
- D) Leptospira
- E) Echinokoku

Pyetja 96

Në botulizmin nga ushqimi, sëmundja shkaktohet nga:

- A) Toksina e prodhuar në zorrë
- B) Toksina citotonike
- C) Nga produktet që çlirohen gjatë lizës së bakterit në stomak
- D) Bakteri në fazë replikuese
- E) Toksina e formuar paraprakisht tek ushqimi

Pyetja 97

Në infeksionin nga HIV, niveli i viremisë është i lartë dhe kështu që rreziku për transmetim i sëmundjes është më i madh:

- A) Kur infeksioni merret me rrugë seksuale
- B) Si gjatë fazës akute dhe më vonë, ku niveli i CD4 është shumë i ulët
- C) Gjatë fazës së latëncës klinike
- D) Në 24 orët e para pas kontaktit
- E) Pas trajtimit me zidovudine, lamivudine dhe ndinavir

Pyetja 98

Një pensionist 76 vjeçar, ish minator, me silikozë pulmonare, pas 2 ditësh me temperaturë të lartë e otalgji të djathtë, me delir e i hutuar bie në koma. Në ekzaminimin objektiv evidentohen shenja meningeale, herpes labial dhe membrana timpanike e djathtë

- A) Meningit nga gram negativët
- B) Meningit meningokoksik
- C) Meningit nga echo virus
- D) Meningit tuberkular
- E) Meningit pneumokoksik

Pyetja 99

Tek pacienti me AIDS, trimetoprim/sulfametazolo (cotrimosazolo) përdoret në terapinë e:

- A) Aspergilozës së përhapur
- B) Pneumonisë nga P. Carinii
- C) Tuberkulozit extrapulmonar
- D) Meningiti nga criptokoku
- E) Retiniti nga citomegalovirus

Pyetja 100

Cila prej alternativave nuk është shenjë e amebiazës intestinale nga E. Histolytica?

- A) Feçe me gjak
- B) Temperaturë modeste ose që nuk ka fare
- C) Prania e mukusit në feçe
- D) Dhimbje abdominale
- E) Leukocitozë në gjakun periferik

Pyetja 101

Kuadri hematologjik tek Leshmanioza karakterizohet nga:

- A) Rritje të neutrofileve
- B) Anemi mikrocitike
- C) Leukocitozë
- D) Rritje të trombociteve
- E) Leukopeni

Pyetja 102

Trizmusi (trisma) tek tetanozi është:

- A) Hiperton të muskujve maseter
- B) Spazma të sfintereve
- C) Relaksim muskular të gjeneralizuar
- D) Hiperton i muskujve dorsalë
- E) Hiperton të muskujve sternokleidomastoide

Pyetja 103

Cila mund të trasmetojë sëmundjen nga mbartësi i tifos i shëruar:

- A) Pështyma
- B) Feçet
- C) Lotët
- D) Djersa
- E) Gjaku

Pyetja 104

Cila prej sëmundjeve infektive nuk trasmetohet nga kontakti direkt me të sëmurin?

- A) Lija e dhenve
- B) Bruceloza
- C) Ethet tifoide
- D) HAV
- E) Poliomieliti

Pyetja 105

Gastroenteriti i shkaktuar nga rotavirus është i përhapur në të gjithë botën. Cila është rruga kryesore e transmetimit të virusit?

- A) Hematike
- B) Respiratore
- C) Oro-fekale
- D) Limfatike
- E) Kontakti me sipërfaqe të kontaminuara

Pyetja 106

Një grua e re do të shkojë në Afrikën qendrore për turizëm. Profilaksia kundër malarias me meflokinë:

- A) Nuk duhet bërë pasi efikasiteti i saj është i diskutueshëm
- B) Duhet bërë një javë para se të nisët, të vazhdojë gjatë gjithë qëndrimit në atë vend dhe të përfundojë 4 javë pas kthimit në vendin e saj
- C) Duhet bërë një ditë para se të nisët dhe duhet përfunduar një javë para se të kthehet
- D) Bëhet vetëm nëse do të shkojë në vende endemike për P. Vivax
- E) Nuk bëhet tek gratë shtatzëna, pasi është treguar se rreziku për tu pickuar nga mushkonja Anopheles është mjaft i vogël për këtë gjendje

Pyetja 107

Leishmania është:

- A) Elmint (krimb)
- B) Virus me ARN
- C) Bakter gram +
- D) Micetet (kërpudhë)
- E) Protozoar

Pyetja 108

Simptoma ose shenja pothuajse konstante gjatë sëmundjes së rubeolës është:

- A) Zmadhimi i limfonodujve retronokal
- B) Kolla
- C) Temperaturë >40° celsius
- D) Hopistoton
- E) Diarre sekretore me gjakosje

Pyetja 109

Reaktiviteti imunologjik dhe imunopatologjik, për tu kompletuar kanë nevojë përveç reaksionit antigjen-antitrop dhe për ndërhyrjen e të gjithë elementëve të mëposhtëm, përveç njërit:

- A) Komplementi
- B) Granulocitet
- C) Aminat vazoaktive
- D) Ndërmjetësit e dhimbjes
- E) Limfocitet T

Pyetja 110

Tek purpura e Schonlein-Henoch mund të vihen re mjaft shpesh dëmtime të të gjitha strukturave të mëposhtme, përveç njëres:

- A) Hepar
- B) Artikulacionet
- C) Veshkat
- D) Lëkura
- E) Zorra

Pyetja 111

Cila nga alternativat rreth sëmundjeve nga imunokomplekset është e saktë:

- A) Shfaqjet në lëkurë janë shprehja më e rëndë klinike e këtyre sëmundjeve
- B) Kanë të njëjtën etiologji specifike
- C) Formimi i imunokompleksit qarkullues, përkon me rritjen e nivelit të komplementit në gjak
- D) Hemoderivatët dhe antisieret heterologjike janë shkaku më i shpeshtë i këtyre sëmundjeve
- E) Zhvillohet kur imunokompleksi depozitohet në inde, duke shkaktuar inflamacion dhe dëmtim të indit

Pyetja 112

Ulja e imunitetit të ndërmjetësuar nga qelizat, është zbuluar gjatë sëmundjes:

- A) Fruthi
- B) Tifo andominale
- C) Hepatosteatoza
- D) Gotta
- E) Diabeti melit

Pyetja 113

Komponentët kryesorë të sistemit imunitar, përgjegjës për mbrojtjen e organizmit dhe patogjenezën e sëmundjeve autoimmune janë të gjitha alternativat e mëposhtme, përveç njërës:

- A) Qelizat B dhe imuniteti humoral
- B) Qelizat T, monocitet dhe imuniteti i ndërmjetësuar nga qelizat
- C) Sistemi i kimazave
- D) Komplementi
- E) Qelizat fagocituese dhe sistemi retikulo-endotelial

Pyetja 114

Prania e angioedemës ereditare të bën të mendosh për defiçitin e:

- A) Sistemi fagocitar (Sindroma e Chediak-Higashi)
- B) Sistemit të antittrupave (defiçiti i IgA-ve)
- C) Sistemit komplementar (C1-inibitor)
- D) Funkzioni i timusit
- E) Sistemi i antittrupave dhe sistemi fagocitar

Pyetja 115

Cila është alternativa e saktë rreth agamaglobulinemisë lidhur me gjininë:

- A) Limfocitet B qarkullues janë shumë të reduktuar në numër, ose mungojnë totalisht
- B) Janë të reduktuara të gjitha klasat e imunoglobulinave, përveç IgM
- C) Organet limfoide janë normal
- D) Janë të shpeshta infeksionet urinare
- E) Nuk vërehet kuadër klinik i poliarteritit

Pyetja 116

Cila prej shfaqjeve klinike të mëposhtme është më pak e mundur në gjendjen e imuno-defiçencës?

- A) Infeksioni i rrugëve urinare
- B) Infeksioni meningjeal
- C) Diseminimi (shpërhapja) bakterial
- D) Infeksioni i përsëritur ose kronik i rrugëve respiratore
- E) Manifestimet autoimmune

Pyetja 117

Cila prej alternativave rreth IgE nuk është e saktë?

- A) Shkaktojnë degranulimin e bazofileve dhe mast-cell, duke çliruar ndërmjetësit që shkatërrojnë qelizën
- B) Fiksohen mbi sipërfaqen e bazofileve dhe mast-cell pas kontaktit me antigjenin
- C) Janë përgjegjëse për sëmundjet nga hipersensibiliteti i tipit të menjëhershëm
- D) Janë shumë të rritura tek personat alergjik të rracës së bardhë, kundrejt atyre jo alergjik
- E) Kanë nivele më të larta tek personat atopik që vuajnë nga astma, në krahasim me personat me shfaqje alergjike të një rëndësie shumë më të vogël

Pyetja 118

Cila prej qelizave nuk mund të kryjë aktivitet makrofagik?

- A) Plasmacell (qelizat plazmatike)
- B) Qelizat e Kupffer
- C) Osteoklastet
- D) Qelizat e mikroglis
- E) Istiocitet

Pyetja 119

Në cilën prej sëmundjeve mund të shfaqet shpesh atrofia e lienit tek i rrituri?

- A) Temperatura onduluese
- B) Hemopoieza extramidulare
- C) M. Celiak
- D) Tuberkuloza miliare akute
- E) S.e Banti

Pyetja 120

Cila është alternativa e gabuar rreth rinitit alergjik?

- A) Në sipërfaqen e mukozës nazale janë të pranishme vetëm IgA
- B) Kuadri klinik mund të zgjasë gjithë vitin
- C) Në sipërfaqen e mukozës nazale janë të pranishme IgA dhe IgE
- D) Personat me kuadër klinik të pranishëm gjatë gjithë vitit janë kryesisht të rritur
- E) Imunoterapia (terapia hiposensibilizuese) i drejtohet vetëm formave alergjike sezonale, që nuk i përgjigjen medikamenteve

Pyetja 121

Reaksionet nga medikamenteve anti-inflamatorë jo steroid (FANS) veprojnë me mekanizëm IgE ndërmjetës. Cila është përgjigja e saktë:

- A) Po, në 30% të rasteve
- B) Jo, në 80% të rasteve
- C) Po, nëse është e bashkangjitur me alergjinë nga antibiotikët

- D) Jo
- E) Po, në 100% të rasteve

Pyetja 122

Defiçiti selektiv i IgA paraqet të gjitha karakteristikat e mëposhtme, përveç njërës:

- A) Është forma më e shpeshtë e defiçitit imunologjik primitiv
- B) Ka episode të shpeshta të infeksioneve të rrugëve respiratore
- C) Shesh shoqërohet me sindromën e malabsorbimit
- D) Ka incidencë <20%, në krahasim me gjithë difektet e tjera imunologjike primitive
- E) Shpesh shoqërohet me sëmundje autoimune dhe atopike

Pyetja 123

Cila është alternativa e saktë rreth amiloidozës?

- A) Tek amiloidoza fijet amiloide janë të lokalizuara brenda qelizave
- B) Bazohet në depozitim të jashtë-qelizor të një proteine fibroze (amiloide) në një ose më shumë zona të organizmit
- C) Prekja e organeve endokrine nga substanca amiloide shkakton mosfunksionim të tyre
- D) Në amiloidozën ereditare familjare, përfshirja e sistemit nervor ka prognozë të mirë
- E) Sekuencat aminoacide të proteinës së amiloides primare ka N- mbetje terminale identike me ato të krahëve të rëndë të imunoglobulinave

Pyetja 124

Cila prej patologjive nuk ka karakteristike eozinofilinë?

- A) Astma
- B) Filarioza
- C) Pneumonia lobare
- D) Sindroma e Sezary
- E) Sindroma e Churg-Strauss

Pyetja 125

Amiloidoza nga krahët e lehtë të imunoglobulinave është ajo që zbulohet tek:

- A) Tuberkulozi
- B) Osteiti bakterial kronik
- C) Pielonefriti kronik supurativ (qelbëzuar)
- D) Mieloma multiple
- E) Hodgking

Pyetja 126

Në të ashtuquajturën përgjigje "primare" cilat janë imunoglobulinat e para që sintetizohen plasmacell?

- A) IgE
- B) IgM

- C) IgA
- D) IgD
- E) IgG

Pyetja 127

Cila prej alternativave është e saktë rreth imunodeficiencës sekondare?

- A) Janë më të rralla se format primitive
- B) Janë patologji të rralla e kryesisht me interes pediatrik
- C) Janë më të shpeshta se format primitive
- D) Janë gjithnjë të pa kthyeshme (irreversibel)
- E) Karakterizohen nga rritja e incidencës së faktorëve gjenetikë

Pyetja 128

Cila prej sëmundjeve inflamatore kronike nuk ka karakteristike reaksionin nga hipersensibiliteti:

- A) M. Crohn
- B) Artriti reumatoid
- C) Osteomieliti
- D) Enteriti rajonal
- E) Sarkoidoza

Pyetja 129

Cila prej sëmundjeve të syrit është autoimune?

- A) Retiniti pigmentoz
- B) Iridocikliti
- C) Trakoma
- D) Glaukoma
- E) Kongiuntiviti folikular

Pyetja 130

Cila prej alternativave nuk është e saktë?

- A) Sindroma Down nuk shoqërohet nga imunodeficit
- B) Deficit më i shpeshtë i imunoglobulnave është ai i deficitit të IgA
- C) Timoma shoqërohet me imunodeficit
- D) Infeksionet nga candida albicans shoqërohen nga difekti i imunitetit të ndërmjetësuar nga qeliza
- E) Sindroma e Di George bazohet kryesisht tek deficit i qlizave T

Pyetja 131

Cila alternativë nuk është e saktë rreth sarkoidozës?

- A) Limfocitet T helper dhe fagocitet mononuklear grumbullohen në organet e prekura
- B) Granuloma e sarkoidozës është një strukturë kompakte e përbërë nga qel. Mononukleare, qelizat T dhe B



- C) 90% e personave të prekur shfaq alternime radiologjike të toraksit në një nga fazat e sëmundjes
- D) Intradermoreaksioni i tuberkulinës është gjithnjë pozitiv
- E) Dominimi i qelizave T helper në nivelin e organeve të prekura nga sëmundja është përgjegjës për përgjigjen në lëkurë ndaj tuberkulinës

Pyetja 132

Cila alternativë nuk është e vërtetë rreth Sindromës Sjogren?

- A) Faktori reumatoid është i pranishëm në 80% të rasteve
- B) Diagnoza klinike vendoset disa vite pas shfaqjes së simptomave aspecificke
- C) Ka ulje të funksionit sekretues të gjëndrave të pështymës
- D) Përfshirja hepatike është e pashmangshme
- E) Keratokongiuntiviti i thatë shkaktohet nga shkatërrimi i epitelit kongiuntival bulbar dhe të kornes

Pyetja 133

Defiçiti imunologjik i varjueshëm (agamaglobulinemi komune e varjueshme) paraqet të gjitha karakteristikat e mëposhtme, përveç njëjës:

- A) Shoqërohet me hiperplazi limfoide tonsilare dhe intestinale
- B) Dëmtimi artikular është i pakët ose mungon
- C) Mbizotërojnë infeksionet bronkopneumonike
- D) Sensibiliteti ndaj infeksioneve shfaqet rreth moshës 7 vjeçare
- E) Episodet e diarresë janë të pakta ose mungojnë

Pyetja 134

Të gjithë agjentët patogjen të poshtë shënuar janë shkaktar të shokut septik me përjashtim të:

- A) kokeve gram + ( stafilokok, enterokok)
- B) leptospirës
- C) enterobaktereve
- D) pseudomonas
- E) neisseria meningitis

Pyetja 135

Infeksioni nga HIV shoqërohet me të gjitha alterimet imunologjike të shënuar më poshtë me përjashtim të:

- A) ulje e numrit të limfociteve T4 (helper) qarkullues
- B) raporti i qelizave T4 dhe T8 (supresor) >1
- C) ulje të veprimtarisë të qelizave T citotoksike
- D) rritje të funksionit të beta2 mikroglobulinës
- E) mungesa e antigenëve në lëkurë për të gjithë testet kutane

Pyetja 136

Cila sëmundje infektive transmetohet me rrugë orofekale?

- A) difteria
- B) malaria
- C) sifilisi

- D) herpesi
- E) tifo

Pyetja 137

Për cilin infektion kongenital do të dyshonim në një të porsalindur me mikrocefali, kalçifikime cerebrale, korioretinit?

- A) varicella zoster virus
- B) herpes simplex virus
- C) toksoplazma
- D) citomegalovirus
- E) HIV

Pyetja 138

Në helmimin ushqimor nga Clostridium perfringens simptomat shfaqen :

- A) menjëherë pas ngrënies
- B) 1-6 orë pas përdorimit të ushqimit të kontaminuar
- C) 6-24 orë
- D) 1-2 ditë
- E) 3-4 ditë

Pyetja 139

Parazitozat shoqërohen me:

- A) mungesë të IgM
- B) mungesë të IgG
- C) rritje të IgE
- D) rritje të IgA
- E) mungesë të IgA

Pyetja 140

Cila prej këtyre sëmundjeve është një zoonozë?

- A) askaridoza
- B) shistosomiaza
- C) amebiaza
- D) toksoplazmoza
- E) enterobiaza

Pyetja 141

Sepsis karakterizohet nga:

- A) prania e përkohshme e baktereve në gjak
- B) hiporeaktiviteti ndaj një infeksioni
- C) hedhja e vazhdueshme e baktereve në gjakun qarkullues, nga një vatër e lokalizuar infeksioni
- D) lokalizimi i infeksionit në një apo dy organe
- E) përgjigje e egzagjeruar e organizmit ndaj një infeksioni

Pyetja 142

Herpes Zoster shkaktohet nga:

- A) i njejti virus me atë të varicelës
- B) nga një virus i ngjashëm me atë të varicelës
- C) nga një Rinovirus me ADN
- D) nga një Enterovirus
- E) nga një Koksaki virus

Pyetja 143

Neoplazia më e shpeshtë në AIDS është:

- A) sarkoma e Kaposit
- B) adenokarcinoma e laringut
- C) leuçemia limfatike kronike
- D) adenokarcinoma gastrike
- E) adenokarcinoma pulmonare

Pyetja 144

Diarrea e udhëtarëve shkaktohet më shpesh nga:

- A) Stafilokoku aureus
- B) Herpes virus
- C) Mycobakterium bovis
- D) Eschericia coli enterotoksike
- E) Campylobacter jejuni

Pyetja 145

HIV transmetohet me anë të:

- A) Djersës
- B) Pështymës
- C) Lotëve
- D) Urinës
- E) Gjakut

Pyetja 146

Hepatitet që transmetohen me rrugë oro-fekale janë:

- A) Hepatiti A dhe E
- B) Hepatiti B
- C) Hepatitit C dhe D
- D) Hepatiti a dhe B
- E) Hepatiti A dhe C

Pyetja 147

Manifestimet më të shpeshta që shfaqen nga infeksioni fillestar me Herpes Simplex tip 1 janë:

- A) Herpes labial
- B) Gingivo-stomatite
- C) Ezofagite
- D) Hepatite

E) Encefalite

Pyetja 148

Të gjitha pohimet e mëposhtme në lidhje me astmen bronkiale janë të vërteta, me përjashtim të:

- A) është një sëmundje që karakterizohet nga inflamacioni i mukozës bronkiale
- B) është një sëmundje me natyrë kronike me riakutizime të shkaktuar nga faktorë të ndryshëm
- C) është një sëmundje e karakterizuar nga aksese dispneje dhe ndjesia e shtrëngimit në nivel të toraksit
- D) është një sëmundje e karakterizuar nga bronkospazma reversibile
- E) është një sëmundje që në mënyrë të pashmangshme shoqërohet me pamjaftueshmeri të zemrës për të kryer funksionin e saj

Pyetja 149

Nga barnat e poshtëshënuar rretho ato që ka efekt më të fuqishëm bronkodilatator:

- A) kortikosteroidët inhalator
- B) kortikosteroidët me rrugë orale
- C) beta 2 mimetikët
- D) antihistaminikët
- E) teofilina

Pyetja 150

Cili është kuptimi etimologjik i fjalës "alergji":

- A) një reaksion i zakonshëm i organizmit
- B) një reaksion jo normal i organizmit
- C) një reaksion favorizues i organizmit
- D) një reaksion specifik i organizmit
- E) një reaksion i izoluar i organizmit

Pyetja 151

Polinozat para-pranverore janë pasojë e:

- A) Poleneve të pemëve
- B) Graminetë
- C) Shkurret
- D) Parietaria Judaica
- E) Dermatofagët

Pyetja 152

Polenet janë:

- A) struktura mashkullore riprodhimi të bimës
- B) struktura femërore riprodhimi të bimës
- C) struktura femërore dhe mashkullore riprodhimi të bimës
- D) asnjë nga këto

Pyetja 153

Astma bronkiale:

- A) përpara adoleshencës prek kryesisht femrat
- B) përpara adoleshencës prek kryesisht meshkujt
- C) përpara adoleshencës prek njëlloj të dy gjinitë
- D) është më e shpeshtë pas 40 vjeç
- E) është më e shpeshtë tek duhanpirësit se sa tek joduhanpirësit

Pyetja 154

Gjatë krizës të astmatike:

- A) FEV1 është i rritur
- B) FVC është e rritur
- C) PEF është i ulur në mënyrë të parikthyeshme
- D) FEV1 është i ulur
- E) Raporti FEV1/FVC është normal ose i rritur

Pyetja 155

Hipersensibiliteti i vonuar është karakteristik në të gjitha patologjitë e mëposhtme, me përjashtim të:

- A) Dermatiti i kontaktit
- B) Hipersensibiliteti nga tuberkulina
- C) Riflakja gjatë transplantit
- D) Sëmundja graft-versus-host pas transplantit të palcës kockore
- E) Sëmundja e serumit

Pyetja 156

Shkaku më i shpeshtë i angioedemës të izoluar që vihet re në të rriturit është:

- A) mungesa e inhibitorit të C1
- B) mungesa e funksionit fagocitar
- C) mungesa e IgA
- D) terapia me ACE-inhibitor
- E) Terapia me beta-blokues

Pyetja 157

Rinit alergjik klinikisht karakterizohet nga:

- A) Rrjedhja e sekrecioneve të ujshme nga hundët, dispne ne qetësi, teshtima, bllokim të hundëve
- B) Kruarje hundëve, dispne ne qetësi, teshtima, bllokim të hundëve
- C) Rrjedhja e sekrecioneve të ujshme nga hundët, dhimbje gjoksore, dispne ne qetësi, teshtima
- D) Rrjedhja e sekrecioneve të ujshme nga hundët, teshtima, kruarje të hundëve, bllokim të hundëve
- E) Kruarje të hundëve, dhimbje koke, teshtima , bllokim të hundëve

## 10. Nefrologji dhe Reumatologji

Pyetja 1

Artriti tuberkular është tipik:

- A) Poliartikular
- B) Nuk bën abses

- C) Me zhvillim hiperostozues
- D) Nuk duket radiologjikisht
- E) Monoartikular

Pyetja 2

Cila prej alternativave nuk është e vërtetë rreth artritis psoriazike:

- A) >70% e pacientëve janë të prekur nga psoriaza e lëkurës shumë vite përpara se të zhvillohet artriti
- B) Në pak raste prek artikucionin sakro-iliak
- C) Kolona vertebrale mund të shfaqë entezit që ngjason me artritin
- D) Terapia me metotresat, drejtuar dëmit artikular, përmirëson gjithnjë dhe lezionet e lëkurës
- E) Bën pjesë tek Spondiloartropatitë siero-negative

Pyetja 3

Simptoma më karakteristike e sëmundjes së Horton është:

- A) Nuk ndjehet mirë
- B) Dhimbje artikulare
- C) Cefale intense, parosistike
- D) Amblidipi
- E) Marrje mendsh

Pyetja 4

Në artritin reumatoid cilat janë artikulationet që preken më shpesh?

- A) Të baçinit
- B) Tibio-tarsike
- C) Artikulationet e vogla të duarve
- D) Bërrylit
- E) Temporo-mandibulare

Pyetja 5

Mbi bazën e cilëve prej elementëve laboratorik, spondiloartriti konsiderohet si sieronegativ?

- A) Mungesa e faktorit reumatoid dhe ANA negativ
- B) Indekset aspecifike të inflamacionit negativ
- C) ANCA negativ
- D) ANA negativ
- E) Faktori reumatoid negativ

Pyetja 6

Cili prej antitropave antinukleojanë tipikë për diagnozën e Lupus Eritematoz Sistemik

- A) Antiperinuklearë
- B) Anti RNP
- C) Anti-ADN me helikë teke

- D) Anti mukoza gastrike
- E) Anti-ADN me dopio helikë

Pyetja 7

Në artritin reumatoid, përveç artikulacione, cili organ në përgjithësi nuk është i përfshirë?

- A) Lëkura
- B) Pulmonet
- C) Hepar
- D) Sistemi nervor
- E) Zemra

Pyetja 8

Glikozaminoklikanet janë:

- A) Përbërës normalë të substancës bazë të kartilagjenit artikular
- B) Substanca patologjike që gjenden në likidin sinovial kur ka artritis septik
- C) Përbërës normalë të membranës sinoviale
- D) Produkte të degradimit të fibrave të kolagjenit
- E) Përbërës jo normalë të kartilagjenit tek personat me kodrokalçinozë

Pyetja 9

Cili është kuadri radiologjik tipik i artritis reumatoid?

- A) Osteofite
- B) Mikrofraktura iuxtartikulare
- C) Osteosklerozë subkondriale
- D) Geoide diafizare
- E) Erozione të epifizës

Pyetja 10

Lumbalgjia ose dorsalgjia nokturne, që zgjon personin në orët e vona të natës, të orienton drejt diagnozës së:

- A) Skolioza
- B) Spontiliti ankilozant
- C) Spondilolisteza
- D) Osteoartroza
- E) Artriti reumatoid

Pyetja 11

Pozitiviteti për ANCA (antitropa anti-citoplazëm të neutrofileve) është markues diagnostik për:

- A) Vaskulit sistemik
- B) Sarkoidozë
- C) Artriti reumatoid

- D) Sëmundja mikse e indit lidhor (MCTD)
- E) Lupus Eritemaroz Sistemik

Pyetja 12

Cila prej sëmundjeve artikulare mund të prek traktin cervikal të kolonës vertebrale?

- A) Sindroma fibromialgjike
- B) Sindroma e Reiter
- C) Artriti reumatoid
- D) Osteoporoza
- E) Polimialgjia reumatike

Pyetja 13

Antitruapat anti-nukël (ANA) kërkohen kur dyshohet për?

- A) Artrit reumatoid
- B) Konektiviti
- C) Sarkoidoza
- D) Osteoartroza
- E) Tiroiditi autoimun

Pyetja 14

Cila prej simptomave të sëmundjes reumatike haset më rrallë:

- A) Temperaturë
- B) Endokarditi reumatik
- C) Miokarditi reumatik
- D) Pleuriti reumatik
- E) Takikardi persistuese

Pyetja 15

Kuadri klinik me dhimbje artikulare, të paktën tre artikulacione të enjtura, ngurtësi në mëngjes >30 min, pozitivitet për faktorin reumatoid ose antitruapat anti-CCP të bën të mendosh për:

- A) Artrit gotoz
- B) Artrit reumatoid
- C) Spondiloartrit
- D) Polimialgji
- E) Osteoartrozë

Pyetja 16

Cila nga zonat është tipike që preket nga frakturat e shkaktuara nga osteoporoza e tipit II?

- A) Vertebrat lumbare
- B) Vertebrat dorsale
- C) Radiusi
- D) Qafa e femurit



E) Vertebrat cervikale

Pyetja 17

Sindroma e Sjogren:

- A) Shfaqet kryesisht tek femrat në moshë të mesme
- B) Është patlogji pediatrike
- C) Është më e shpeshtë tek femrat e reja
- D) Nuk shoqërohet asnjëherë me artritin reumatoid
- E) Mund të shkaktojë shtim të lotëve

Pyetja 18

Cila prej sëmundjeve mund të konsiderohet si "artrit reaktiv" sieronegativ?

- A) Gotta (podagra)
- B) M. Crohn
- C) Diabeti
- D) Hepatiti viral
- E) M. Paget

Pyetja 19

Tek artriti reumatoid, dëmtimi artikular fillon nga:

- A) Kartilagjeni artikular
- B) Membrana sinovjale
- C) Kocka nënkondriale
- D) Asnjëra prej përgjigjeve
- E) Kpsula artikulare

Pyetja 20

Cila prej karakteristikave klinike nuk ndodh tek fibromialgja?

- A) Cefalea e tipit tensiv
- B) Emikrania
- C) Vaskuliti
- D) Vështirësitë konjitive
- E) Sindroma e kolonit të irrituar

Pyetja 21

Cfarë është piku i masës kockore?

- A) Vlera e densitetit mineral kockor para menopauzës
- B) Vlera mesatare e densitetit mineral kockor e gjetur gjatë densimetrisë me rreze X
- C) Vlera minimale e densitetit mineral kockor e gjetur në rastin e një frakture
- D) Vlera maksimale e densitetit mineral kockor e gjetur gjatë terapisë për osteoporozën
- E) Vlera e densitetit mineral kockor e arritur në moshën 25 vjeçare

Pyetja 22

Alternimi karakteristik i ezofagut në prani të sklerozës sistemike, është:

- A) Devijimi i saj në disa drejtime
- B) Formimi i divertikujve nga tërheqja
- C) Hipotoni dhe ngurtësi të pareteve dhe zgjerim të saj
- D) Formimi i divertikujve nga pulsimi
- E) Zbrazje e vonuar prej spazmave kardiale

Pyetja 23

Sëmundja reumatike shkaktohet nga:

- A) Streptokoku viridans
- B) Enterokoku
- C) Pneumokoku
- D) Stafilokoku
- E) Streptokoku beta-hemolitik i gr A

Pyetja 24

Cila prej alternativave nuk është karakteristike e spondilitit ankilozant?

- A) Dhimbje të kolonës, që përmirësohen gjatë lëvizjes
- B) Dhimbje akute të orbitës, unilaterale
- C) Fillim i ngadaltë i simptomave
- D) Lezione papulo-skuamoze në pëllëmbën e duarve dhe atë plantare
- E) Oligoartropati periferike asimetrike

Pyetja 25

Lezioni inflamator kronik shkatërrues që prek kërcin nazal është tipike e:

- A) Sklerodermi difuze
- B) M. Behget
- C) Lupus eritematoz sistemik
- D) Morphea
- E) M. Wegener

Pyetja 26

Cila është shfaqje tipike në artritin psoriazik?

- A) Perikarditi
- B) Luksacioni i radiusit
- C) Datiliti
- D) Shfaqja e dhimbjes artikulare pas sforcos fizike
- E) Fenomeni Raynaud

Pyetja 27

Cila patologji është përgjegjëse për përfshirjen poliartikulare nga shkaqe inflamatore?

- A) Osteoartroza
- B) Ethet reumatike
- C) Amiloidoza
- D) Hemokromatoza
- E) Hemofilia

Pyetja 28

Arteriti me qeliza gjigjante (arteriti temporal ose i Horton) është sëmundje e rëndë pasi:

- A) Provokon lehtësisht fraktura kockore
- B) Lehtëson zhvillimin e neoplazive
- C) Nuk ka mundësi kurimi
- D) Provokon lehtësisht insufiçencë renale
- E) Provokon humbje të shikimit në mënyrë të menjëhershme

Pyetja 29

Antigjeni HL-A B27 është i pranishëm në 85% të pacientëve të prekur nga:

- A) Spondiliti ankilozant
- B) Artriti reumatoid
- C) Gotta
- D) Artriti psoriazik
- E) Ethet akute reumatike

Pyetja 30

Cila prej gjendjeve të mëposhtme shoqërohet me praninë e antitropave antinukel:

- A) Sindroma nga lodhja kronike
- B) Sindroma nga antitropa antifosfolipide primitive
- C) Poliarteriti nodoz
- D) Lupusi sistemik
- E) Fibromialgji

Pyetja 31

Cila prej sëmundjeve artikulare nuk është me bazë imunologjike?

- A) Artropatia nga LES
- B) Reumatizmi artikular akut
- C) Artropatia e S. Së Felty
- D) Artropatia gotoze (podagra)
- E) Artriti reumatoid

Pyetja 32

Tek artriti reumatoid cili është deformimi karakteristik i gishtave të duarve?

- A) Në ekstension
- B) Devijim në anën ulnare
- C) Hiperfleksion i gishtit të vogël
- D) Devijim në anën radiale
- E) Hiperfleksion i gishtit të mesit

Pyetja 33

Tek artroza nodujt e gjetur janë:

- A) Nodujt Osler
- B) Nodujt e Heberden
- C) Nodujt Schmorl
- D) Nodujt në nënlëkurë
- E) Nodujt reumatoid

Pyetja 34

Cila prej patologjive nuk bën pjesë tek spondiloartropatitë:

- A) Artriti psoriazik
- B) Polimialgjia reumatike
- C) Sëmundja e Reiter
- D) Artriti reaktiv
- E) Spondiliti ankilozant

Pyetja 35

Cila alternativë rreth ostoporozës nuk është e vërtetë:

- A) Frakturat vertebrale mund të jenë asimptomatike
- B) Frakturat osteoporotike me dhimbje intense dhe të lokalizuar
- C) Zona e prekur më shumë nga frakturat është artikulationi tibio-tasik
- D) Rreziku për fraktura rritet me uljen e densitetit mineral kockor
- E) Këshillohen ushtrimet fizike për forcimin e kolonës vertebrale

Pyetja 36

Antitruapat anti-ENA:

- A) Nuk janë asnjë herë të pranishëm në konektivitin miks
- B) Shfaqen në reumatizmin artikular akut
- C) Janë gjithnjë të pranishme në nefritin nga lupus
- D) Gjenden vetëm në raste të rralla të lupusit
- E) Janë markues të sëmundjes

Pyetja 37

Cila prej alternativave rreth artritis të podagrës (gota) nuk është e vërtetë:

- A) Fillimi është në përgjithësi monoartikular
- B) Terapia hipouricemizante nuk duhet nisur gjatë atakut akut
- C) Shifrat e larta të uricemisë kanë pak vlerë për të vendosur diagnozën
- D) Shfaqjet artikulare radiologjike nuk janë të tipit eroziv
- E) Dieta dhe ndryshimi i stilit të jetesës mund të jenë të dobishme për të ulur shpeshtësinë gotoz dhe evitimit të përdorimit të mjekimeve

Pyetja 38

Tek artriti reumatoid në fazë akute nuk është e këshillueshme:

- A) Terapia me FANS
- B) Terapia me medikamente biologjike
- C) Sinoviektomia
- D) Terapia immunosupresive
- E) Terapia termale

Pyetja 39

Cila prej shenjave radiologjike nuk është karakteristike e osteoporozës vertebrale:

- A) Hipertransparencë e trupave vertebralë dhe rritje e kontrastit të kontureve të strukturës
- B) Pamje konkave e kontureve të strukturës
- C) Rritje e spesorit të kortikales
- D) Deformim në formën e pykës e trupave vertebralë
- E) Rrallim i imazhit trasekular i kockës spongioze

Pyetja 40

Cila prej të dhënave laboratorike është karakteristike për osteomalacinë?

- A) Hiperkalçemi
- B) Rritje të fosfatazës alkaline në gjak
- C) Hiperkalçiuri
- D) Hiposforemi
- E) Hiperfosforemi

Pyetja 41

Eritema nodoze është karakteristike e:

- A) Pneumonia streptokoksike
- B) Skleroza multiple
- C) Fruthi
- D) Sklerodermia
- E) Sarkoidoza

Pyetja 42

Lezioni më karakteristik në kocka shkaktuar nga Lupusi është:

- A) Fraktura spontane
- B) Osteoporozë në formë pullash
- C) Nekroza aseptike
- D) Osteoskleroza
- E) Osteomieliti akut

Pyetja 43

Tek polimioziti është e shpeshtë të hasen të gjitha alternimet e mëposhtme, përveç njëres:

- A) Rritja e CK
- B) Hepatiti
- C) Rritje e AST dhe LDH
- D) Hiposteni/mialgji i muskulaturës së shpatullave
- E) Alternime elektromiografike

Pyetja 44

Alternimi okular karakteristik i sindromës së Sjogren është:

- A) Katarrakta
- B) Rritja e presionit endookular
- C) Keratokongiuntiviti i thatë
- D) Atrofia e nervit optik
- E) Iridocikliti

Pyetja 45

Cili prej alternativave është tipik për artrozën?

- A) Hollimi i kartilagenit (kërcit)
- B) Osteoporozë e përhapur
- C) Lacerimi i kapsulës
- D) Osteoporozë iuxtaartikulare
- E) Hiperplazi e sinoviociteve të tipit A

Pyetja 46

Cila prej formave të artrozës është e trashëgueshme?

- A) Lumboartroza
- B) Gonartroza
- C) Artroza nodoze e gishtave
- D) Artroza e shpatullës
- E) Artroza e bërrylit

Pyetja 47

Në sindromën hepato-renale:

- A) në urinë vihet re hematuri
- B) kolesterolemia është e rritur
- C) diureza i kalon 1500 ml/ditë
- D) diureza është më pak se 300 ml/ditë
- E) glikozuria është e vazhdueshme

Pyetja 48

Insuficiencia renale akut funksionale mund të jetë pasojë e:

- A) gurëve në rrugët urinare
- B) obstrukcionit të rrugëve urinare
- C) abuzimit me aminoglikane
- D) shterimit të vëllimit jashtëqelizor
- E) nekrozës kortikale bilaterale

Pyetja 49

Oliguria hipertonike, acidoza metabolike, hiperkalemia përputhen me kuadrin klinik-laboratorik të:

- A) diabetit mellitus të çekuilibruar
- B) diabetit insipid
- C) insuficiencës renale kronike
- D) fazës funksionale të insuficiences renale akute
- E) fazës me poliuri të insuficiencës reanle akute

Pyetja 50

Fraksioni i ejskcionit të natriumit të filtruar normalisht është :

- A) më pak ose baraz me 1%
- B) 1.5-3%
- C) 3-4.5%
- D) 4.5-6%
- E) 6.5-8%

Pyetja 51

Hipokalçemia në insuficiencën renale kronike vjen si pasojë e:

- A) hiperkalçiuorisë
- B) marrjen e pakët të kalçiumit me dietë
- C) mungesa e formës aktive të vitaminës D
- D) mungesa e PTH
- E) hiperparatiroidizëm

Pyetja 52

Cili prej mikroorganizmave të më poshtëm është shkaktari më i shpeshtë i pielonefritit akut:

- A) klebsiella
- B) klamidia
- C) esherikia
- D) pseudomonas
- E) candida

Pyetja 53

Janë gurë me natyrë radiotransparente:

- A) gurët e përbërë nga fosfati i kalçiumit
- B) gurët e përbërë nga oksalati i kalçiumit
- C) gurët me përbërje të përzjerë
- D) gurët e përbërë nga acidi urik
- E) gurët cistik

Pyetja 54

Në insuficiencen renale akute të tipit funksional pesha specifike e urinës është:

- A) e ulët
- B) e ndryshueshme
- C) e kushtezuar nga prania e cilindrave
- D) e rritur
- E) nuk mund të matet

Pyetja 55

Në poliurinë hipotonike pesha specifike e urinës është:

- A) midis 1020 dhe 1030
- B) më shumë se 1030
- C) më pak se 1006
- D) e barabartë me 1010
- E) midis 1010 dhe 1020

Pyetja 56

Të gjitha pohimet e mëposhtme përfaqësojnë shkaqe të hipokalemisë me përjashtim të:

- A) terapisë me ACE-inhibitor
- B) alkalozës metabolike
- C) sindromës Cushing
- D) të vjellave persistente
- E) terapisë me diuretik

Pyetja 57

Për të realizuar një transplant të veshkës, përputhshmëria sipas sistemit ABO:

- A) e domosdoshme vetëm nëse egziston përputhshmëria HLA
- B) jo e domosdoshme nëse egziston përputhshmëria HLA
- C) e panevojshme
- D) e domosdoshme
- E) e domosdoshme vetëm nëse është realizuar një transplant i mëparshëm

Pyetja 58

Sindroma nefrotike:

- A) përfaqëson një kuadër klinik të karakterizuar nga hipoalbuminemi e rëndë (< 3 g/dl)
- B) paraqitet me një proteinuri mbi 2.5 g/ditë
- C) paraqitet me insuficiencë renale



- D) shoqërohet me gjendje hipokoagulimi dhe tendece për hemorragji
- E) është gjithmonë një sëmundje parësore e veshkave

Pyetja 59

Pielonefrit akut është:

- A) një sëmundje që prek kryesisht meshkujt
- B) prek kryesisht moshat e treta
- C) karakterizohet nga prania e një temperature me natyrë septike
- D) paraqitet me vlera normale të ERS dhe PCR
- E) paraqitet me një neutropeni të theksuar

Pyetja 60

Cila nga këto shenja është patognomonike për glomerulonefritin me leziona minimale:

- A) proteinuria selektive
- B) mikrohematuria
- C) hiperazotemia
- D) leukocituria
- E) cilindruria

Pyetja 61

Të gjitha sëmundjet e më poshtme mund të çojnë drejt insuficiencës renale me përjashtim të:

- A) LES
- B) Diabet mellitus
- C) Amiloidozë
- D) Mielosklerozë
- E) Mieloma multiple

Pyetja 62

Në një paciente me probleme kardiake e cila trajtohet me furosemid, cili elektrolit duhet monitoruar me kujdes?

- A) Natrium
- B) Klor
- C) Kalium
- D) Kalçium
- E) Magnesium

Pyetja 63

Cila nga terapitë e më poshtme konsiderohet si mjekim i zgjedhur në trajtimin mbajtës të një pacienti me artrit reumatoid të diagnostikuar për herë të parë?

- A) AIJS
- B) prednizon 40 mg/ditë
- C) metotraksat (10 mg/javë) + AIJS + kortikosteroid me doza të ulta
- D) AIJS + minociklina
- E) paracetamol sipas nevojës

Pyetja 64

Fenomeni Raynaud mund të shoqërohet me:

- A) erizipelë
- B) sklerodermi
- C) dermatit
- D) tromboflebit
- E) limfadenit

Pyetja 65

Arteriti Horton mund të ndërlikohet me:

- A) aneurizëm të aortës abdominale
- B) disekim të harkut të aortës
- C) bllokim të arteries subklave
- D) klaukacio të përtypjes dhe të kafshimit
- E) të gjitha janë të vërteta

Pyetja 66

Polimialgjia reumatizmale:

- A) është një sinovit jo eroziv i artikulacionit skapulohumeral dhe strukturave përreth
- B) prek kryesisht meshkujt < 40 vjeç
- C) shkaktohet nga infeksione të shpeshta streptokoksise të tonsilave
- D) shoqërohet me purpurën Schonlein-Henoch
- E) karkaterizohet nga antikorpi JO1 pozitiv

Pyetja 67

Cili nga këto barna përdoret në terapinë e podagrës?

- A) penicilamina
- B) klofibratet
- C) kolestiramina
- D) kortizoni
- E) alopurinoli

Pyetja 68

Në cilën patologji vihet re kuadri radiologjik i "shkopit të bambusë"?

- A) Sindroma Reiter
- B) Artriti Reumatoid
- C) Spondilit ankilozant
- D) Enteroartriti
- E) Sindroma Sjogren

Pyetja 69

Në moshat e treta, verbëria mund të jetë pasojë e :

- A) infarkt të miokardit

- B) arteriopative periferike
- C) arteritit Horton
- D) kolitit ulçeroz
- E) hernies hiatale

Pyetja 70

Në artritin reumatoid nuk preket një nga këto artikulacione:

- A) talokrurali
- B) radiokarpali
- C) skapulohumerali
- D) bërryli
- E) sakroiliaku

Pyetja 71

Të gjithë faktorët e më poshtëm janë faktor rreziku për të zhvilluar osteoporozë me përjashtim të:

- A) menopauzës të parakohshme kirurgjikale
- B) duhanpirjes
- C) terapisë me fenobarbital
- D) jetës sedentare
- E) obezitetit

Pyetja 72

Në cilën prej patologjive të mëposhtme janë specifik antitruapat anti-CCP?

- A) Spondilit ankilozant
- B) LES
- C) Artrit reumatoid
- D) Sëmundja Behçet
- E) Artrit psoriatik

Pyetja 73

Manifestimi kryesor i granulomës së Wegener është:

- A) në mushkri
- B) në zorrë
- C) në sy
- D) në lëkurë
- E) në vesh

Pyetja 74

Antitruapat anti-SSA dhe anti-SSB takohen më shpesh në:

- A) artritin reumatoid
- B) polikondrit
- C) sindromën Sjogren
- D) artritin psoriatik
- E) sëmundjen Behçet

Pyetja 76

Kur një proteinuri e 24 orëve përcaktohet si nefrotike:

- A) proteinuria >3g
- B) proteinuria >2g
- C) proteinuria >1g
- D) proteinuria > ose e barabartë me 5g
- E) proteinuria > ose e barabartë me 8g

Pyetja 77

Të gjitha nefropatitë e mëposhtme mund të komplikojnë një shtatëzani, me përjashtim të:

- A) amiloidoza
- B) pielonefriti
- C) nekroza tubulare akute
- D) nekroza kortikale
- E) uremia eklamptike

Pyetja 78

Përcaktuesit e filtracionit glomerular: cili prej këtyre variablave është më i rëndësishmi:

- A) fluksi i gjakut
- B) koeficienti i ultrafiltrimit glomerular
- C) përqëndrimi i proteinave në plazmën e arteries renale
- D) presioni hidrostatik glomerular
- E) presioni arterial

Pyetja 79

Cili prej këtyre medikamenteve hipotensivë shkakton rritje të aktivitetit plazmatik të reninës:

- A) metildopa
- B) propranololi
- C) kaptoprili
- D) klonidina
- E) nifedipina

Pyetja 80

Insuficienca renale akute:

- A) karakterizohet gjithmonë nga prania e oligo-anurisë
- B) paraqet një sediment urinar të pasur me qeliza dhe cilindra hialino-granularë dhe/ose qelizorë
- C) shoqërohet gjithmonë me hipertension arterial
- D) mund të jetë sekondare nga ekzaminimet imazherike me kontrast
- E) lidhet gjithmonë me një dëmtim të strukturës renale

Pyetja 81

Cilët prej gurëve të mëposhtëm janë radiotransparentë:

- A) struvitë
- B) të fosfatit të kalçiumit
- C) të oksalatit të kalçiumit
- D) të acidit urik
- E) të karbonatit të kalçiumit

Pyetja 82

Shkaku më i zakonshëm i sindromit nefrotik tek adultët është:

- A) GN (glomerulonefriti. me lezione minimale
- B) GN (glomerulonefriti. membrano-proliferativ
- C) nefroskleroza malinje
- D) GN membranoz
- E) nefroskleroza beninje

Pyetja 83

Një grua e re paraqiti episodin e parë të një cistiti akut, i cili u trajtua me sukses me anë të antibiotikoterapisë përkatëse. Pacientja ka nevojë për:

- A) profilaksi me antibiotikë për 6 muaj
- B) analizë urine + urokulturë ç'do muaj për 6 muaj
- C) cistouretrografi mikSIONALE
- D) asnjë veprim tjetër diagnostik ose terapeutik
- E) urografi perfuzional

Pyetja 84

Sindroma nefrotike:

- A) është një kuadër klinik që karakterizohet nga hipoalbuminemia e rëndë (<3g/dl.
- B) paraqet një proteinuri më të madhe se 2.5 g/ditë
- C) prezantohet me insuficiencë renale me gravitet të ndryshëm
- D) mund të shoqërohet me kuadër "hipokoagulabiliteti" me prirje për hemorragji spontane
- E) është gjithmonë një sëmundje renale primare

Pyetja 85

Cili është shkaku më i mundshëm i takikardisë së shoqëruar me komplekse QRS të gjerë, në një pacient që i është nënshtruar më parë një bypass-i aorto-koronar:

- A) flater trial me çrregullim të përçimit
- B) fibrilacion atrial
- C) takikardi sinusale me çrregullim të përçimit
- D) sindromi Wolf-Parkinson-Wite
- E) takikardi ventrikulare

Pyetja 86

Cila prej këtyre vlerave paraqet gamën e vlerave normale të kalemisë:

- A) 1-3 mEq/l
- B) 3-4,5 mEq/l
- C) 3,5-5 mEq/l
- D) 5-6 mEq/l
- E) 6-7 mEq/l

Pyetja 87

Në pacientin me anuri rreziku për jetën përfaqësohet nga:

- A) varfërimi sodik
- B) hiponatremia
- C) hipoproteinemia
- D) hiperkalemia
- E) hipertensioni

Pyetja 88

Bakteriuria është sinjifikative kur përqëndrimi urinar është:

- A) 1.000/ml
- B) 10.000/ml
- C) 100.000/ml
- D) 1.000.000/ml
- E) 5.000.000/ml

Pyetja 89

Një sforcim i madh fizik mund të shkaktojë:

- A) hematuri
- B) hemoglobinuri
- C) proteinuri
- D) cilindra eritrocitarë
- E) të gjitha

Pyetja 90

Një burrë 50 vjec arrin në Shërbimin e Urgjencës më temperaturë të lartë ( $T=38.8^{\circ}\text{C}$ ), të dridhura, dhimbje abdominale difuze dhe nauze. Në ekzaminimin objektiv shenja e Giordano-s është prezente. Cilin prej këtyre ekzaminimeve diagnostike të mëposhtme do k

- A) ekografinë e aparatit urinar
- B) TAK
- C) Cistografinë retrograde
- D) RMN
- E) shintigrafinë renale

Pyetja 91

Si manifestohet më shpesh tumori renal:

- A) masë e palpueshme
- B) hematuri
- C) kolikë renale
- D) diagnoza është e rastësishme
- E) oliguria

Pyetja 92

Cila prej këtyre simptomave i paraprin zhvillimit të nefropatisë diabetike:

- A) rritja e natriurisë
- B) mikrohematuria
- C) cilindruria
- D) shtimi i vëllimit renal
- E) reduktimi i filtracionit glomerular

Pyetja 93

Cili është dekursi i glomerulonefritit akut post-streptokoksik:

- A) evoluon drejt insuficiencës renale kronike
- B) shërohet
- C) evoluon drejt sindromit nefrotik
- D) proteinuri reziduale
- E) hipertension arterial

Pyetja 94

Cili prej muskujve të aktivitetit inspirator është më i rëndësishmi:

- A) muskujt interkostalë ekstern
- B) diafragma
- C) muskuli rektus abdominal
- D) muskujt interkostalë intern
- E) muskuli sternokleidomastoid

Pyetja 95

Të gjitha pohimet e mëposhtme mbi diuretikët tiazidikë janë të vërteta me përjashtim të:

- A) mund të shkaktojnë hiperuricemi
- B) përdoren për të nxitur një diurezë të sforcuar në emergjencat toksikologjike
- C) janë diuretikë të zgjedhjes së parë për trajtimin e hipertensionit arterial
- D) ndikohen për trajtimin e edemave që shoqërojnë cirrozën hepatike
- E) inhibojnë transportin e  $\text{Na}^+$ - $\text{Cl}^-$  në tubulin distal të përdredhur

Pyetja 96

Në hemodializë akseset vasculare të përkohshme mund të përftoheshin me anë të inserimit të kateterëve me lumen të vetëm ose të dyfishtë në venat:

- A) subklavia
- B) jugulare interne
- C) femorale
- D) të gjitha përgjigjet e mësipërme
- E) asnjëra

Pyetja 97

Dobësia muskulore në nivel të shpatullave, shoqëruar me rritje të eritrosedimentit gjatë orës së parë, tek një person i moshuar karakterizojnë:

- A) polimiozitin
- B) polimialgjinë reumatike
- C) sëmundjen Still
- D) miopatinë sekondare të hipotiroidizmit
- E) entesopatinë e rotatorëve

Pyetja 98

Zbulimi i proteinurisë së matshme (>3.5g/ditë. dhe cilindruarë është patognomonike për një:

- A) sindrom nefritik
- B) sindrom nefrotik
- C) hipertension arterial
- D) insuficiencë renale akute ishemike
- E) pielonefrit akut

Pyetja 99

Të gjitha pohimet e mëposhtme janë të vërteta me përjashtim të :

- A) angiotenzina II shkakton vazokonstriksion për shkak të efektit të drejtpërdrejtë mbi arteriolat prekapilare
- B) angiotenzina II antagonizon efektet e aldosteronit
- C) angiotenzina II shkakton hipertrofi dhe rimodelim të strukturave kardiovaskulare
- D) receptori AT1 për angiotenzinën II është i atashuar me një proteinë G
- E) lidhja e angiotenzinës II me receptorin AT2 frenohet në mënyrë specifike nga sartanet

Pyetja 100

Cila prej alternativave paraqet një komplikacion renal të rëndë në diabetin mellit:

- A) polakiuria me dizuri
- B) glukozuria persistente
- C) nefrolitiazë
- D) cistiti akut hemorragjik
- E) glomeruloskleroza



Pyetja 101

Ekzaminimet e shkallës së parë për diagnostikimin e karcinomës së prostatës janë:

- A) ekzaminimi rektal, ekografia transrektale + biopsia
- B) shintigrafia kockore, TAK abdominal
- C) ekzaminimi rektal, TAK abdominal
- D) ekzaminimi rektal
- E) Asnjëra

Pyetja 102

Cila prej glomerulopative të mëposhtme paraqitet me sindrom nefrotik:

- A) post-infektive
- B) proliferative mezangiale
- C) proliferative ekstrakapilare
- D) glomerulopatia diabetike
- E) glomeruloskleroza

Pyetja 103

Një obstrukcion urinar që shkakton hidronefroze tek fëmija zakonisht shkaktohet nga:

- A) një keqformim kongjenital i traktit urinar
- B) vaza jonormale që komprimojnë ureterin
- C) gurët
- D) "përdredhja" e një ureteri në terren të një veshke ptozike
- E) një fimozë shumë e rëndë

Pyetja 104

Si duken gurët në ekografi:

- A) imazh hipoebogen me hije akustike konike posteriore
- B) imazh hipoebogen me përforcim posterior
- C) imazh hiperekogen me hije akustike konike posteriore
- D) imazh hiperekogen me përforcim posterior
- E) imazh anekogen

Pyetja 105

Anemia e insuficiencës renale kronike:

- A) është kryesisht e lidhur me një defiçit në thithjen e hekurit
- B) është kryesisht e lidhur me një defiçit në prodhimin e eritropoetinës
- C) trajtohet vetëm me hemotransfuzion
- D) nuk trajtohet sepse kontribuon në ruajtjen e vlerave të pranueshme të presionit të gjakut
- E) prek kryesisht gratë në moshën e fertilitetit

Pyetja 106

Nga ku e merr më shpesh origjinën karcinoma me qeliza renale:

- A) tubuli proksimal i përdredhur
- B) ansa Henle
- C) dukti kolektor
- D) pieloni renal
- E) tubuli distal i përdredhur

Pyetja 107

Cilin veprim respirator predominues kryejnë muskujt abdominalë:

- A) veprim inspirator në qetësi
- B) asnjë veprim
- C) shtim të presionit intrapleural
- D) veprim ekspirator
- E) veprim inspirator gjatë sforcimit

Pyetja 108

Cila prej këtyre teknikave imazherike diagnostikuese nuk është e dobishme në diagnostikimin e stenozeve të arteries renale:

- A) angiografia
- B) eko-kolor-dopler
- C) angiografia me rezonancë magnetike
- D) pielografia retrograde ashendente
- E) shintigrafia renale

Pyetja 109

Një pacient paraqet një gur oksalat kalçiumi më pak se 1cm në pielonin renal që shkakton kolika recidivante. Cila është terapia e zgjedhjes së parë:

- A) pielolitotomia kirurgjikale
- B) ureterorenoskopia
- C) litotripsia ekstrakorpore
- D) terapia hidropike
- E) pielolitotomia perkutane

Pyetja 110

Shkaku më i shpeshtë i sindromit nefrotik në moshën pediatrike është:

- A) glomerulopatia proliferative ekstrakapilare
- B) glomerulopatia me leziona minimale
- C) glomerulopatia membranoze
- D) glomerulopatia proliferative mezangiale
- E) glomerulopatia post-infektive

Pyetja 111

Cila prej këtyre simptomave të insuficiencës renale është më e ndjeshme ndaj korigjimit të hipokalemisë:

- A) nauzea dhe të vjellat
- B) astenia muskulore
- C) diarrea
- D) pruriti
- E) cefalea

Pyetja 112

Pielonefriti akut:

- A) është sëmundje karakteristike për seksin mashkull
- B) prek zakonisht personat në moshë të avancuar
- C) karakterizohet zakonisht nga prania e temperaturës të tipit septike
- D) paraqitet me vlera normale të eritrosedimentit dhe proteinës C reaktive
- E) paraqitet me një neutropeni të shprehur

Pyetja 113

Në cilin tip të emfizemës hiperinflacioni pulmonar merr një rëndësi më të madhe:

- A) emfizema panlobulare
- B) emfizema buloze
- C) emfizema acinare distale
- D) emfizema paraseptale
- E) emfizema cikatriciale

Pyetja 114

Në sindromin nefrotik, cila prej këtyre simptomave/shenjave mund të ndeshet:

- A) urina me shkurë
- B) anoreksia
- C) shndritja e retinës
- D) dhimbja abdominale
- E) të gjitha

Pyetja 115

Me cilat nga këto teknika imazherike nuk mund të vizualizohet ureteri:

- A) urografia
- B) tomografia e kompjuterizuar
- C) urografia gjatë rezonancës magnetike
- D) radiografia direkte e abdomenit
- E) pielografia transnefrostomike deshendente

Pyetja 116

Cila prej sindromave të mëposhtme karakterizohet nga: humbja renale e K, Na dhe Cl, hipokalemia, hiperaldosteronizmi, hiperreninemia dhe presioni arterial normal:

- A) Sindroma e Liddle
- B) Sindroma e Laron
- C) Sindroma e Kawasakit
- D) Sindroma e Bartter
- E) Sindroma e Di George

Pyetja 117

Cilat janë shkaqet më të shpeshta të versamentit pleural:

- A) pneumonia
- B) fibroza pulmonare
- C) tuberkulozi
- D) infeksionet virale
- E) pneumotoraksi

Pyetja 118

Cila prej këtyre shenjave është patognomonike për glomerulonefritin me leziona minimale:

- A) proteinuria selektive
- B) mikrohematuria
- C) hiperazotemia
- D) leukocituria
- E) cilidruria

Pyetja 119

Patogjeneza e hipernatremisë gjatë ushqyerjes parenterale lidhet me:

- A) shtimin e riabsorbimit proksimal të natriumit
- B) diurezën osmotike
- C) reduktimin e sekretimit të hormonit antidiuretik
- D) sekretimin e shtuar të hormonit aldosteron
- E) filtrimin e shtuar glomerular

Pyetja 120

Gjetja e një vlere të rritur të CA-125 shoqërohet në më shumë se 80% të rasteve me diagnozën e:

- A) karcinomës së kolonit
- B) karcinomës mamare
- C) karcinomës së ovareve
- D) seminomës
- E) karcinomës së qafës së mitrës

Pyetja 121

Hipertensioni nefrovaskular (shkak potencialisht i trajtueshëm i hipertensionit arterial. është vlerësuar në popullatë rreth:

- A) mbi 10%
- B) 5-10%
- C) 1-5%
- D) <1%
- E) nuk është kurrë shkak i hipertensionit arterial

Pyetja 122

Bakteri më shpesh i përfshirë në infeksionet e pakomplikuara të rrugëve urinare është:

- A) proteus
- B) stafilokoku
- C) mykoplazma
- D) Escherichia Coli
- E) Streptokoku

Pyetja 123

Të gjitha komplikacionet e mëposhtme klinike ndeshen në IRK terminale me përjashtim të:

- A) neuropatisë periferike
- B) bronkitit astmatiform
- C) perikarditit
- D) anemisë
- E) osteodistrofisë

Pyetja 124

Diagnoza e hipertensionit esencial:

- A) bëhet me siguri
- B) bëhet me anë të përjashtimit
- C) është instrumentale
- D) është histologjike
- E) është serologjike

Pyetja 125

Në fiankun e djathtë të një neonati ndeshet një masë e palpueshme. Urografia evidenton zhvendosje dhe distorsion të pelvisit dhe kaliceve të veshkës së djathtë. Diagnoza më e mundshme është:

- A) neuroblastoma
- B) tumori i Wilms
- C) hidronefroza
- D) tromboza e venës renale
- E) veshka polikistike

Pyetja 126

Me cilat simptoma shoqërohet më shpesh karcinoma me qeliza renale gjatë diagnostikimit:

- A) hematurinë
- B) hematurinë + dhimbjen në flank + masë e palpueshme
- C) asnjë simptomë (diagnozë e rastësishme gjatë një ekzaminimi ekografik.
- D) hipertensionin
- E) insuficiencën renale akute

Pyetja 127

Një grua 30 vjeç shtrohet me sindrom nefrotik. Ekzaminimi i proteinurisë zbulon një humbje të rëndësishme të albuminës dhe mungesë të humbjes urinare të proteinave me peshë molekulare të madhe. Cila prej këtyre situatave është në gjendje të përcaktojë një

- A) nefropatia membranoze
- B) nefropatia membrano-proliferative
- C) nefropatia glomerulare me leziona minimale
- D) glomerulonefriti proliferativ
- E) glomerulonefriti fokal

Pyetja 128

Dializa peritoneale:

- A) kërkon hospitalizim të detyrueshëm
- B) preferohet ndaj HD në pacientët me IRK hemodinamikisht të paqëndrueshëm
- C) lejon një fleksibilitet më të vogël për oraret dhe zhvendosjet, në krahasim me HD
- D) është një teknikë e vjetër
- E) të gjitha

Pyetja 129

Cilat janë vlerat që konsiderohen si shenjë e dëmtimit të veshkave në një pacient hipertensiv të seksit mashkull:

- A) kreatinina plazmatike > 1.5;
- B) kreatinina plazmatike > 1.0;
- C) kreatinina plazmatike > 1.3;
- D) kreatinina plazmatike > 1.0;
- E) kreatinina plazmatike > 1.6;

Pyetja 130

Simptoma fillestare e sindromit nefrotik normalisht është:

- A) edema
- B) hipertensioni
- C) hematuria
- D) stranguria

E) oliguria

Pyetja 131

Të gjitha situatat e mëposhtme patologjike mund të çojnë në IRK me përjashtim të:

- A) glomerulonefritit
- B) pielonefritit
- C) renit polikistik
- D) tubulonekrozës akute nga shoku
- E) nefroangiosklerozës

Pyetja 132

Nefropatia më shpesh shkaktare e IRK është:

- A) nefropatia diabetike
- B) nefropatia intersticiale
- C) nefropatia glomerulare
- D) nefropatia vaskulare
- E) nefropatia tubulare

Pyetja 133

Administrimi i zgjatur i cilit prej këtyre medikamenteve konsiderohet një faktor rreziku për Osteoporozën:

- A) ACE inhibitorët
- B) Diuretikët tiazidikë
- C) Kortikosteroidet
- D) Antagonistët e kalçiumit
- E) Laksativët

Pyetja 134

Reduktimi i izoluar i koeficientit të ultrafiltrimit shkakton një nga këto simptoma:

- A) mikrohematuri
- B) leukocituri
- C) dislipidemi
- D) hipertension
- E) hipoproteinemi

Pyetja 135

Cili prej këtyre medikamenteve indikohet në trajtimin fillestar të pacientit me insuficiencë kardiake pak simptomatike:

- A) hidrokloriazidi
- B) ACE inhibitorët
- C) Digoksina

- D) Amiodaroni
- E) Betablockuesit

Pyetja 136

Tregoni cilët ekzaminime laboratorike janë zakonisht të alteruar në hipertensionin esencial pa komplikacione sekondare:

- A) elektrolitet në gjak
- B) kreatininemia
- C) asnjëri
- D) ekzaminimi i urinës
- E) hormone

Pyetja 137

Një grua 40 vjeç pa ankesa kryen, në terren të një chek-up, një analizë urine me urokulturë pozitive për E. Coli me ngarkesë >100.000 UFC. Gruaja ka:

- A) IVU të rrugëve të poshtme urinare
- B) IVU të rrugëve të sipërme urinare
- C) bakteriuri asimptomatike
- D) dizuri
- E) cistit intersticial

Pyetja 138

Cila prej situatave të mëposhtme shoqërohet me incidencën më të lartë të tumorit të testikut:

- A) varikocela
- B) trauma e testikut
- C) kriptorkidizmi
- D) hidrocela
- E) hipogonadizmi

Pyetja 139

Në glomerulonefritin membranoz tipik janë të pranishme të gjitha shenjat e mëposhtme, me përjashtim të:

- A) hipertensionit
- B) proteinurisë
- C) hipoproteinemisë
- D) hiperkolesterolemisë
- E) edemave

Pyetja 140

Cili është komplikacioni më i frikshëm i sindromit nefrotik:

- A) hipertensioni arterial
- B) insuficienca renale



- C) insuficienca renale akute
- D) tromboza e venës renale
- E) dekompensimi kardio-cirkulator

Pyetja 141

Pielonefriti kronik (nefriti tubulo-intersticial infektiv kronik., shënoni përgjigjen e pasaktë:

- A) shpesh është bilateral
- B) shkakton atrofi dhe deformim të kaliceve
- C) nuk lidhet me anomali anatomike
- D) shpesh lidhet me një refluks veziko ureteral
- E) asnjëra

Pyetja 142

Nefropatia nga IgA karakterizohet nga:

- A) nga një model histologjik variabël, më shpesh e tipit proliferativ-sklerotik mezangial, me depozitime të IgA
- B) prania e IgA në arteriola
- C) prania e IgA në tubula
- D) prania e IgA në lumenin e kapilarëve
- E) glomeruloskleroza

Pyetja 143

Cila nga nefropatitë e mëposhtme karakterizohet nga: proteinuria, hematuria e lehtë, hipertensioni, hiperazotemia:

- A) Sëmundja me leziona minimale tek fëmijët
- B) Glomerulonefriti membranoproliferativ
- C) Glomeruloskleroza fokale segmentare
- D) Kalkuloza renale
- E) Glomerulonefriti mezangioproliferativ

Pyetja 144

Enureza është:

- A) gjithmonë patologjike
- B) fiziologjike gjatë 2-3 viteve të para të jetës
- C) fiziologjike deri në moshën 5 vjeç
- D) nuk mund të shkaktohet kurrë nga infeksionet
- E) normale në moshën e avancuar

Pyetja 145

Komplementemia është e ulur në një nga glomerulopatitë e mëposhtme:

- A) nefropatia diabetike

- B) glomerulonefriti post-infektiv
- C) glomerulonefriti membranoz
- D) nefropatia në terren të amiloidozës
- E) glomerulonefriti me lezione minimale

Pyetja 146

Cila prej këtyre situatave favorizon akumulimin e K<sup>+</sup> në organizëm?

- A) diarrea
- B) të vjellat e vazhdueshme
- C) acidoza diabetike
- D) abuzimi me klortiazidikë
- E) insuficienca kortikorenale

Pyetja 147

Nekroza tubulare akute mund të jetë komplikacion i:

- A) glomerulonefritit akut difuz
- B) sindromit nefrotik
- C) litiazës renale
- D) amiloidozës renale
- E) sindromës së shtypjes

Pyetja 148

Në një pacient, gjatë ecurisë së versamentit pleural masiv, vlerësohen të gjitha shenjat e mëposhtme me përjashtim të:

- A) reduktimit të fremitus vokal taktil
- B) respiracionit vezikular të reduktuar ose që mungon
- C) prekjes së nervave
- D) ekskursionit të reduktuar të hemitoraksit të prekur
- E) tingullit të qartë pulmonar

Pyetja 149

Në personat me moshë të re, heqja e njërës veshkë shkakton tek veshka e mbetur:

- A) hipertrofi
- B) hipertrofi dhe hiperplazi
- C) hiperplazi
- D) hipoplazi
- E) hipoplazi dhe hipotrofi

Pyetja 150

Testi specifik për vlerësimin e fluksit plazmatik renal është:

- A) klirensi i insulinës

- B) klirensi i kreatininës
- C) klirensi i paraaminohipuratit
- D) klirensi i inulinës
- E) të gjitha

Pyetja 151

Janë shkaktarë të inkontinencës tranzitore faktorët e mëposhtëm me përjashtim të:

- A) infeksionit simptomatik të rrugëve urinare
- B) konsumimit të alkoolit
- C) konsumimit të disa substancave mjekësore
- D) fekalomës
- E) konsumimit të sasive të tepërta të lëngjeve

Pyetja 152

CCili prej këtyre medikamenteve përbën terapinë më efikase, për reduktimin e vdekjeve të papritura në pacientë me kardiopati koronare të qëndrueshme me deficiet të funksionit ventrikular:

- A) amlodipina
- B) betablokuesit
- C) nitratet
- D) diuretikët
- E) digoksina

Pyetja 153

Cila prej alternativave të mëposhtme shihet më shpesh në hipokalemi:

- A) kapaciteti i reduktuar për të përqëndruar urinën
- B) reduktimi i filtratit glomerular
- C) humbja e aftësisë së hollimit të urinës
- D) alterimi i klirensit të ujit të lirë
- E) reduktimi i klirensit të acidit para-aminohipurik

Pyetja 154

Prania e eritrociteve me morfologji të ruajtur e kufinj të rregullt, dhe veçanërisht, mungesa e plotë e akantociteve në sedimentin urinar, është tregues i fortë i:

- A) pH alkaline të urinës
- B) hemorragjisë me prejardhje nga rrugët urinare (uretere, vezikë, uretrA)
- C) pranisë së sindromit nefrotik
- D) dëmtimit glomerular
- E) nefropatisë intersticiale

Pyetja 155

Shfaqja e makrohëmaturosisë 15 ditë pas një episodi inflamacioni të rrugëve të sipërme ajrore, për cilën glomerulopati të bën të mendosh:

- A) skleroza fokale dhe segmentare
- B) proliferative mezangiale me depozitime të IgA
- C) membrano-proliferative
- D) membranoze
- E) post-streptokoksike

Pyetja 156

Cili prej ndryshimeve të mëposhtme të stilit të jetesës ka rezultuar më efikas në reduktimin e presionit arterial:

- A) reduktimi i peshës trupore
- B) ndërprerja e duhanpirjes
- C) reduktimi i kripës në dietë
- D) eliminimi i kafeinës në dietë
- E) terapia e pushimit

Pyetja 157

Në pielonefritin akut, faktor favorizues për fillimin e një nekroze papilare është:

- A) bakteriuria
- B) diabeti mellitus
- C) hiperdislipidemia
- D) hipodisproteinemia
- E) bilirubinuria

Pyetja 158

Të gjitha pohimet e mëposhtme lidhur me IRK janë të sakta, me përjashtim të:

- A) bilancit sodik negativ
- B) bilancit sodik pozitiv
- C) bilancit sodik të ekuilibruar
- D) bilancit negativ të fosfateve
- E) bilancit pozitiv të joneve hidrogjen

Pyetja 159

Si prezantohet më shpesh tumori i vezikës urinare:

- A) si urgjencë mikSIONALE
- B) si polakiuri
- C) si makrohematuri
- D) si stranguri
- E) si poliuri

Pyetja 160

Cilën grupmoshë prek më shpesh glomerulonefriti akut post-streptokoksik:

- A) fëmijët
- B) të rinjtë
- C) të moshuarit
- D) adultët
- E) neonatët

Pyetja 161

Cili prej infeksioneve virale të mëposhtme shoqërohet më shpesh me shfaqjen e hepatokarcinomës në një pacient pa cirrozë hepatike:

- A) infeksioni me Virusin e Hepatitit A
- B) infeksioni me Virusin e Hepatitit B
- C) infeksioni me Virusin e Hepatitit C
- D) infeksioni me Virusin e Citomegalovirusit
- E) infeksioni me Virusin Epstein Barr

Pyetja 162

Një djalë 16 vjeç prezanton një kuadër klinik të sindromit nefrotik dhe kryen biopsinë renale; kuadri histologjik statistikisht më i mundshëm do të jetë:

- A) glomerulonefriti post-streptokoksik
- B) glomeruloskleroza segmento-fokale
- C) leziona glomerulare minimale
- D) glomerulonefriti membranoz
- E) nefropatia diabetike

Pyetja 163

Cilat janë shenjat indirekte të një guri urinar në ekografi:

- A) formacion ekogen
- B) hije konike
- C) zgjerim i rrugëve urinare mbi pengesë
- D) radioopacitet
- E) radiotransparencë

Pyetja 164

Glomerulonefriti që vërehet më shpesh në terren të një neoplazie është:

- A) GN(glomerulonefriti. me leziona minimale
- B) GN(glomerulonefriti. membrano-proliferativ
- C) Glomeruloskleroza segmentare fokale
- D) GN(glomerulonefriti. membranoz
- E) GN(glomerulonefriti. proliferativ me trombe

Pyetja 165

Cili prej pohimeve të mëposhtme është i sakte:

- A) nivelet në gjak të kreatininës nuk ndryshojnë me moshën dhe seksin
- B) klirensi i kreatininës nënvlerëson filtracionin real glomerular (i matur me klirensin e inulinës. dhe ky nënvlerësim është më i madh sa më shumë të reduktohet filtracioni
- C) konsumimi i mishit në dietë nuk ndikon nivelet e kreatininës në gjak
- D) nivelet e azotemisë nuk ndikohen vetëm nga filtracioni glomerular, por edhe nga diureza dhe marrja e proteinave në dietë
- E) konsumimi i mishit në dietë nuk ndikon nivelet e azotemisë

Pyetja 166

Çfarë duhet bërë kur kemi prani të mikrohematurisë së izoluar në një skiator:

- A) kryerja e biopsisë renale
- B) moskryerja e biopsisë renale
- C) përcaktimi i klirensit të kreatininës
- D) matja e presionit arterial
- E) kontrollimi i pacientit periodikisht

Pyetja 167

Urinat në glomerulonefrit akut paraqesin të gjitha alterimet e mëposhtme me përjashtim të:

- A) hematuri makroskopike
- B) cilindra eritrocitarë
- C) proteinuri
- D) ngjyrim kafe
- E) koagula

Pyetja 168

Cila prej terapive të mëposhtme përzgjidhet aktualisht në fillim në një pacient me Artrit Reumatoid:

- A) AINS
- B) Prednizon 40mg/ditë
- C) Metotreksat (10mg/javë. + AINS + ndoshta kortikosteroidë me dozë të ulët
- D) AINS + minociklinë (100mg 2 herë në ditë.
- E) Paracetamol sipas nevojës

Pyetja 169

Cila është patologjia më shumë përgjegjëse për hyrjet e reja në dializë për shkak të uremisë terminale:

- A) glomerulonefriti primar
- B) sëmundjet renale kongjenitale
- C) diabeti mellitus
- D) hipertensioni arterial
- E) nefropatitë tubulointerstitiale

Pyetja 170

Cili prej çrregullimeve të mëposhtme të gjumit ka prevalencë më të madhe në pacientët e dializuar në krahasim me popullatën e përgjithshme:

- A) Somnambulizmi
- B) Çrregullim i fazës REM
- C) Sindromi i këmbëve të shqetësuara
- D) Kërcitja e dhëmbëve
- E) Asnjëra

Pyetja 171

Të gjitha nefropatitë e mëposhtme recidivojnë në veshkën e transplantuar, përveç:

- A) glomerulosklerozës segmentare fokale
- B) glomerulonefritit membrano-proliferativ
- C) glomerulonefritit me antikorpe anti membranë bazale glomerulare
- D) nefropatia me depozitime mezangiale të IgA
- E) tubulopatia kongjenitale e Gitelman

Pyetja 172

Në asnjërën prej situatave të mëposhtme nuk vërehet rritja e gap-it anionik, përveç:

- A) nefropatisë intersticiale
- B) mosushqyerjes
- C) ureterosigmoidostomisë
- D) acidozës tubulare proksimale
- E) nefropatisë diabetike

Pyetja 173

Ku e merr origjinën më shpesh tumori i prostatës:

- A) nga zona qendrore
- B) nga zona periferike
- C) nga zona e tranzicionit
- D) nga vezikulat seminale
- E) nga uretra prostatike

Pyetja 174

Vendi më i shpeshtë i metastazave të tumorit të prostatës jashtë limfonodujve është:

- A) kolona lumbo-sakrale
- B) pulmonet
- C) mëlçia
- D) surenalet
- E) truri

Pyetja 175

Cilat janë shkaqet më të zakonshme të dëmtimit të ereksionit me natyrë organike:

- A) vaskulare
- B) nervore
- C) jatrojenike
- D) hormonale
- E) patologji të trupave kavernoze

Pyetja 176

Të gjitha sëmundjet e mëposhtme mund të çojnë në IRK me përjashtim të:

- A) lupusit eritematoz sistematik
- B) diabetit mellitus
- C) amiloidozës
- D) mielosklerozës
- E) mielomës multiple

Pyetja 177

Cila prej këtyre simptomave të IRK është më e ndjeshme ndaj korigjimit të acidozës:

- A) diarrea
- B) nauzea dhe të vjellat
- C) astenia muskulore
- D) anemia
- E) pruriti

Pyetja 178

Gjatë vlerësimit të funksionit renal, parametrat më të përdorshëm janë Azotemia dhe Kreatininemia; vlerat që konsiderohen normale janë:

- A) Azotemia 2.0-4.0 mg/dl; Kreatininemia 0,4-0,8 mg/dl
- B) Azotemia 2.0-7.0 mg/dl; Kreatininemia 0,4-1,5 mg/dl
- C) Azotemia 7.0-20.0 mg/dl; Kreatininemia 0,6-3,5 mg/dl
- D) Azotemia 20.0-60.0 mg/dl; Kreatininemia 0,7-2,5 mg/dl
- E) Azotemia 60.0-70.0 mg/dl; Kreatininemia 0,4-1,5 mg/dl

Pyetja 179

Në një pacient me dekompenzim kardial nën trajtim me furosemid, cili prej elektroliteve të mëposhtëm duhet monitoruar vazhdimisht:

- A) Natriumi
- B) Klori
- C) Kaliumi
- D) Kalçiumi
- E) Magnezi



Pyetja 180

Në një pacient me IRK kryerja e një ekzaminimi koronarografik:

- A) duhet kundëringuar gjithmonë
- B) duhet kundëringuar nëse vlerat e kreatinës janë më të larta se norma
- C) mund të realizohet me përgatitjen e duhur
- D) nuk ka efekte mbi funksionin renal
- E) pas një ekzaminimi të tillë kërkohet kryerja e procedurës së menjëhershme të dializës

Pyetja 181

Një individ i sëmurë me Tuberkuloz, nëse nuk i nënshtrohet kurave të përshtatshme, mund të infektojë për gjatë një viti:

- A) një mesatare prej 10-15 personash
- B) 20-30
- C) mbi 40
- D) mbi 50
- E) mbi 100

Pyetja 182

Për cilën nga manifestimet e mëposhtme të SIDA-s, besohet se luan një rol patogjenetik virusi human herpes tip 8 (HHV-8):

- A) sarkomën Kaposi
- B) limfadenopatinë e gjeneralizuar persistente
- C) angiomatozën bacilare
- D) diarrenë kronike
- E) leukoplakinë orale viloze

## 11.Kirurgjia e Përgjithshme

Pyetja 1

Ne sindromen mediastinale organet e para që influencohen nga rritja e presionit endomediastinal janë:

- A) Trakea
- B) Vena kava superiore dhe dy venat anonime
- C) Ezofagu
- D) Arteriet
- E) Nervat

Pyetja 2

Një pacient operohet sepse dyshohet për apendisit akut. Gjate operacionit vihet re se apendiksi edhe ciekum janë normal. Në ileusin terminal vihet re një pjese prej 30cm e skuqur, edematoze dhe e trashur me rreshqitje të dhjavit mesenterial mbi ileus, e

- A) Mbyllje e abdomenit
- B) Ileo trasversostomi latero-laterale
- C) Ileostomi e traktit të interesuar

- D) Apendicektomi profilaktike
- E) Emikolektomi dx

#### Pyetja 3

Çfarë ekzaminimi është me I keshilluar për të parë një insulinome?

- A) Splenoportografia
- B) Kolangiografia retrograde
- C) Arteriografia selective
- D) Ekografia
- E) Shintigrafia

#### Pyetja 4

Mbas të ngrenit, në një pacient që ka pësuar një rezeksion të stomakut shfaqet ipersudoracion, ndjesi nxehtësie, nausea, lipotimi dhe cefale ,duhet të mendojme për:

- A) Pankreatit akut
- B) Ulçer
- C) Stenoze pilorike
- D) Degjeneracion neoplastik
- E) Sd. Dumping

#### Pyetja 5

Sistemi anastomik portal përfshin të gjitha venat e mëposhtme, përveç:

- A) Gastrika sinistra
- B) Paraombelikale
- C) Hemorroidale superior
- D) Renale sinistra
- E) Mesenterika inferior

#### Pyetja 6

Pankreatiti akut duhet të trajtohet me kirurgji :

- A) Në të gjitha rastet
- B) Në rast nekroze
- C) Në rast iperamilasemie persistente
- D) Kur P.C.R është mbi 20
- E) Në rast nekroze të infektuar

#### Pyetja 7

Një pacient 60 vjeç shfaq në kohë kolle edhe Temperaturë të crregullt, jo sh të lartë. Ekzaminimi I parë që duhet bërë për të vendosur një diagnose është:

- A) Citologjia e espektoratit
- B) Radiografi toraksit

- C) Tine test
- D) Bronkoskopi
- E) Emokromi

#### Pyetja 8

Arteria emorroidale superior është dege e :

- A) Arteries pudenda
- B) Arteries mesenterika inferior
- C) Arteries iliaka sinistra
- D) Arteries sigmoidale
- E) Arteries ipogastrika

#### Pyetja 9

Ne frakturen e colum femorit arti prezantohet klinikisht:

- A) I rrotulluar nga Brenda edhe I zgjatur
- B) I rrotulluar nga jashte edhe I zgjatur
- C) I rrotulluar nga jashte edhe I shkurtuar
- D) I rrotulluar nga Brenda edhe I shkurtuar
- E) I drejte edhe I zgjatur

#### Pyetja 10

Cili nga faktoret më poshtë predisponon lindjen e neoplazise te colon-rectumit?

- A) Tymi I cigares
- B) Diabeti
- C) Alkoli
- D) Ipertensionimi portal
- E) Genet

#### Pyetja 11

Cili prej ekzaminimeve më poshtë është me I pershtatcem per diagnozen e kolecistitit akut?

- A) Gastroskopia
- B) TC
- C) Radiografia e abdomenit
- D) Kolnagiografia retrograde
- E) Ekografia

#### Pyetja 12

Cili prej ekzaminimeve më poshtë është me I pershtatcem per diagnozen e neoplazise te bronkut principal te pulmonit:

- A) Radiografia standarte e toraksit
- B) Bronkoskopia
- C) Stratigrafia

- D) Shintigrafia pulmonare
- E) Bronkografia

Pyetja 13

Nga çfarë shkaktohet Sd. Iperparatiroidizmit primar ne 90% te rasteve?

- A) Adenoma solitare
- B) Adenoma multiple
- C) Iperplazia difuze
- D) Ipertrofia difuze
- E) Adenokarcinoma

Pyetja 14

Cili prej ekzaminimeve më poshtë është më i pershtatcem per diagnozen e Bronkektazise?

- A) Radiografia standarte
- B) Shintigrafia pulmonare
- C) Bronkografia
- D) Bronkoskopia
- E) Stratigrafia

Pyetja 15

Cili prej ekzaminimeve më poshtë është më i pershtatcem per diagnozen e kancerit gastric:

- A) Esofagogastroskopia me biopsi
- B) RX digjестive
- C) TC
- D) Citologji I lengut te stomakut
- E) Ekografi

Pyetja 16

Dilatimi I pleksit pampiniform shkakton:

- A) Spermatocele
- B) Varikocele
- C) Idrocele
- D) Cistocele
- E) Mieloccele

Pyetja 17

Te gjitha karakteristikat objektive te identifikuara gjate eksplorimit dixhital te rectumit ne kancerin e prostates janë të vërteta përveç:

- A) Humbja e simetrisë së gjendres
- B) Rritje konsistences
- C) Mungesa e rrjedhshmerisë së planeve persiper

- D) Kufijte jo te definuara
- E) Konservimi I sulcus median interlobar

#### Pyetja 18

Gangrene gasoze është e shkaktuar me shpesh nga:

- A) S. epidermidis
- B) S. aureus
- C) E.coli
- D) P.mirabilis
- E) C.perfringens

#### Pyetja 19

Ligatura e venes spermatika është e keshilluar per kurimin e:

- A) Induratio penis plastic ( semundja e Peyronie )
- B) Varikocel
- C) Torsionit te funikulit
- D) Kriptokidizmit
- E) Idrocel komunikante

#### Pyetja 20

Simptoma me e shpështë e Kolangiokarcinomes është:

- A) Ikter
- B) Kostipacion
- C) Disfagia
- D) Rritje e peshes
- E) Diare

#### Pyetja 21

Te gjitha sëmundjet më poshtëshkaktojnë litiazi te vezikes urinare, përveç:

- A) Ipertrufise prostates
- B) Prostatit akut
- C) Stenoze uretrale
- D) Vezika neurologjike
- E) Skleroze e colum vezikale

#### Pyetja 22

Dyzet e tete ore mbas një torsioni te testikulit kush prej alternativave më poshtëfutet ne diagnoza diferenciale?

- A) Idrocela
- B) Seminoma
- C) Epididimit tuberkolar

- D) Hernia inguino-skrotal
- E) Orkiepiditimit akut aspecific

Pyetja 23

Cila prej manovrave më poshtëjep dhimbje ne rast kolecistiti?

- A) Mc burney
- B) Blumberg
- C) Giordano
- D) Murphy
- E) Te gjitha pergjigjet

Pyetja 24

Cili është ekzaminimi I zgjedhur per studimin e neoplazive retroperitoneale?

- A) Urografia
- B) Aortografia
- C) CT
- D) Retropneumoperitoneo
- E) Klizma opake

Pyetja 25

Simptoma me frekuente ne karcinomen e colonit është:

- A) Dispepsia
- B) Retorragji
- C) Dhimbje barku
- D) Dhimbje anale
- E) Kostipacion

Pyetja 26

Te gjitha sëmundjet më poshtë mund të jenë shkak per një gjinekomasti sekondare, përveç:

- A) Tumor I testikullit
- B) Insuficiene renale kronike
- C) Cirroze epatike
- D) Tumoret kortiko-surenale
- E) Malnutricion

Pyetja 27

Te gjitha shenjat më poshtëte rreshtuara janë prezente ne insuficencen celiako-mezenterike kronike, përveç:

- A) Dhimbjes post-prandiale
- B) Malabsorbimit
- C) Renja ne peshe

- D) Melenes
- E) Tension abdominal

#### Pyetja 28

Arterite e Hortonit paraprihet me shpesh nga:

- A) Polimiosite
- B) Poliartrite skapolo-omerale
- C) Artrite reumatoide
- D) Artroza lombosakrale
- E) Epikondilite

#### Pyetja 29

Te gjitha simptomat më poshtëjanë karakteristike te inflamacionit te esofagut nga refluksi,përveç

- A) Dhimbje interskapolare
- B) Dhimbje ne pozicion supin
- C) Disfagia
- D) Emoffisi
- E) Gjak okult ne fece

#### Pyetja 30

Sindroma Peutz-Jeghers karakterizohet nga:

- A) Iperpigmentacione muko-kutane edhe ematoma te kanalit digjektiv
- B) Ulçeracione multiple te mukozes te tubit digjervent, kalkoloze biliare edhe splenomegali
- C) Ascit, tumor I orofaringsit edhe ipogonadizem
- D) Alopecia edhe angiodyplazia e colonit
- E) Iper tension nefro-vaskolare edhe esofagit nga refluksi

#### Pyetja 31

Te gjitha frazat më poshtëjanë te sakta per pneumoperitoneon përveç:

- A) Është I shkaktuar nga prezenca e gazit te lire ne kavitetin peritoneal
- B) Tenezem
- C) Mund te shkaktohet nga laparoscopia
- D) Shoqerohet me zhdukjen e aies otuze te heparit
- E) Vihet re gati gjithmone mbas një perforimi te organeve te brendshme ne kavitetit abdominal

#### Pyetja 32

Një grua 24 vjeç I nenshtrohet një interventi me laparoscopi eksplorative sepse dyshohej per apendisit. Gjate operacionit behet diagnoza e një perforimi te një divertikuli, ka dhene inflamacion I cili shtrihet deri ne cekum pa shenja peritoniti. Trajtim

- A) Rezekision e ileusmit terminal edhe e colonit ashendent me ileostomi
- B) Emikolektomia dekstra
- C) Rezekision e ileusit terminal dhe e colonit ashendent me anastomoze ileokolike primare ne një kohe

- D) Drenim I absesit edhe apendicektomia
- E) Mbyllja e abdomenit edhe trajtim me antibiotike

#### Pyetja 33

Te gjitha frazat më poshtëper Sd. Mallory-Weiss janë te sakta, përveç:

- A) Ematemeza mund te verifikohet pa episode te vjellash precedente
- B) Studimi me Bario nga goja është metoda me e mirë per te bërë diagnozen
- C) Ezofagoskopia është e domosdoshme per diagnose
- D) Laceracioni është një I vetem, linear edhe I lokalizuar ne ezofagun distal
- E) Infuzioni intra-arterial I vazopresines controllon hemorragjine

#### Pyetja 34

Rrjedhjet e enzimave nga nekroza e pankreatitit akut diagnostikohen me:

- A) Radiografia e tubit digjerent
- B) Shintigrafia pankretatike
- C) Arteriografia e tripodit celiac
- D) RX abdomen
- E) CT abdomen

#### Pyetja 35

Kush prej patologjive më poshtël bashkangjitet hidrotoraksit?

- A) Komprimimi venoz brachio-cefalik
- B) Komprimimi mbi venen azigos
- C) Komprimim nen venen azigos
- D) Komprimimi ne nivel te venes azigos
- E) Varice esofageale

#### Pyetja 36

Trajtimi imediat I pneumotoraksit ipertensiv jo traumatik konsiston ne:

- A) Torakotomi
- B) Intubim
- C) Terapi me antibiotike
- D) Drenim pleures
- E) Pushim absolute ne krevat

#### Pyetja 37

Një grua 70 vjeç prezanton një kuader klinik I cili perputhet me obstrukcion te zorreve te holla. Pacientja nuk është operuar kurre por vuan prej shumë kohesh nga një kolelitiaze te Cilënnuk e ka trajtuar. Cili prej ekzaminimeve më poshtëduhet bërë per

- A) Klizem opak
- B) Arteriografia



- C) Kolangiografia transeptike
- D) Ekografi e katit abdominal superior te djathte
- E) Radiografia abdomenit pa kontrast

#### Pyetja 38

Te gjitha opsionet më poshtëjanë indikacione per laparoskopine ne urgjence, përveç :

- A) Ruptures se kistit te ovarit
- B) Peritonitit te gjeneralizuar me shok septik
- C) Perforimit intestinal
- D) Ileusit mekanik post-aderencial
- E) Kolecistiti akut

#### Pyetja 39

Një kirurg I pergjithshem viziton një pacient 45 vjeç me gjendje te pergjishme te mirë por me pak gjakderdhje rektale. Gjate rektoskopise vihet re një polip me diameter 2cm, me siperfaqe te lemuar I cili ndodhet 8cm nga margina anale. Biopsia e marre tr

- A) Duhet te bej ne menyre immediate rezeksion-anastomoze te rektumit anteriorisht
- B) Do te bej një klizem opake
- C) Do te bej një sigmoidoskopi fleksibel
- D) Do e koaguloj lezionin me endoskopi
- E) Do e mbaj pacientin ne vezhgim te vazhdueshem edhe do marri biopsi periodikisht

#### Pyetja 40

Cila prej frazave më poshtë është e sakte :

- A) Lokalizimi me I shpësthtë I M. Crohn është rektumi
- B) Incidence e karcinomes është me e larte ne M.Crohn sesa ne retokolitin Ulçeroz
- C) Stenozat intestinale janë me pak frekvente M.Crohn sesa ne retokolitin Ulçeroz
- D) Fistulat janë me te shpeshta ne retokolitin Ulçeroz sesa ne M.Crohn
- E) Hemorragjia rektale është me e shpësthtë ne retokolitin Ulçeroz sesa ne M.Crohn

#### Pyetja 41

Kush janë simptomat me komune ne kancerin e veshikes urinare ?

- A) Infeksionet rikorente edhe persistente
- B) Inkontinenca urinare
- C) Disuria
- D) Polakiuria
- E) Hematuria

#### Pyetja 42

Per hernien krurale, te gjitha frazat më poshtëjanë te sakta përveç :

- A) Është e lokalizuar nen legamentin inguinal

- B) Është me e shpësthtë tek femrat
- C) Ka një incidence të lartë për strangulim
- D) Në të djathtë mund të përmbajë apendiksin
- E) Është thjeshtësisht e reduktueshme

#### Pyetja 43

Në rast diagnoze prenatale të një veshke multicistik, duhet bërë :

- A) Kontroll ekografik të shtatzanise edhe lindje me operacion
- B) Kontroll ekografik të shtatzanise edhe lindje premature me operacion
- C) Kontroll ekografik të shtatzanise edhe induksion për një lindje spontane sapo të ketë arritur maturimin pulmonar
- D) Kontroll ekografik të shtatzanise edhe operacion në muajin e shtatë
- E) Kontroll ekografik të shtatzanise edhe lindje spontane

#### Pyetja 44

Në rast apendisiti akut një tushe rectal edhe/ose një vizite vaginale e dhimbshme tregojnë :

- A) Piosalpingit
- B) Fistul reto-vaginale
- C) Peritonit andopelvik
- D) Cistit
- E) Divertikulum Meckel

#### Pyetja 45

Të gjitha simptomat edhe shenjat poshtë të rreshtuara bëjnë pjesë në klinikën e enteritit segmental ose Morbus Crohn, përveç :

- A) Temperaturë
- B) Kostipacion
- C) Diarë ematike
- D) Diarë me gjak në fecë
- E) Të vjella

#### Pyetja 46

Cilin ekzaminim përdoret për të matur presionin endoluminal të ezofagut ?

- A) Ezofagoskopia
- B) Phmetria
- C) Sonda gastrike
- D) Manometria
- E) Ezofagografia

#### Pyetja 47

Shemja e Trousseau ( dora e obstetrit ) është tipike e kujt prej sëmundjeve më poshtë?

- A) Hipoparatiroidizem
- B) Hiperparatiroidizem

- C) Hipertiroidizem
- D) Hipotiroidizem
- E) Hipogonadizem

Pyetja 48

Një pacient 70 vjeç, I semur me karcinome epidermoide centro-parenkimale te pulmonit ne kondita normale :

- A) Duhet te bej radioterapi
- B) Mund te bej rezeksion te pulmonit
- C) Duhet te bej terapi citostatike edhe kobalt
- D) Duhet te bej cdo terapi përveç asaj kirurgjikale
- E) Duhet te bej cikle imunoterapie

Pyetja 49

Cila prej vlerësimeve te mëposhtme ka prioritet ne pacientin me politraume :

- A) Niveli I koshiences
- B) Frymemarrja
- C) Kontroll I aktivitetit kardiocirkulator
- D) Kontrolli I rrugeve te frymemarrjes
- E) Kontroll I presionit arterioz

Pyetja 50

Ne pneumotoraksin tensiv të gjitha frazat më poshtë janë të paverteta, përveç:

- A) Ka nevojë per dekomprimim te menjehershëm
- B) Shoqerohet me ipertension arterioz
- C) Nuk shoqerohet me ipertension arterioz
- D) Shkaktohet nga versamenti pleurik
- E) Ka nevojë per vendosjen e një sonde nazo-gastrike

Pyetja 51

Karcinoma e gjirit ne T2 është:

- A) Me e madhe se 1 cm, por me e vogel se 2.5 cm
- B) Me e madhe se 2 cm, por me e vogel se 5.1 cm
- C) Me e madhe se 2 cm, por me e vogel se 3.1 cm
- D) Midis 3 edhe 5 cm
- E) Midis 3 edhe 6 cm

Pyetja 52

Te gjitha frazat më poshtë janë shenja te reaksionit gjate një hemotrasfuzioni, përveç :

- A) Hiperkalcemi
- B) Emolize
- C) Ortikarie
- D) Temperaturë

E) Hipokalcemi

Pyetja 53

Kush nga pergjigjet më poshtë është shkaku me frekuent ne ikterin obstruktiv :

- A) Komprimimi ab estrinsek
- B) Lezione iatrogene
- C) Neoplazi e kokës së pankreasit
- D) Neoplazi epatike
- E) Infiamacion e rrugëve biliare

Pyetja 54

Ne çfarë zone ndodh me shpesh kanceri i gjirit:

- A) Mbi areole
- B) Nën areole
- C) Në kadrantin superior intern
- D) Në kadrantin superior ekstern
- E) Në kadrantin inferior ekstern

Pyetja 55

Te gjitha manifestimet më poshtëmund të jenë komplikacione të divertikulit të Meckelit, përveç :

- A) Introfleksioni edhe invaginacioni
- B) Sekretion i acidit klorhidrik
- C) Pankreatiti akut hemorragjik
- D) Hemorragjia e perforimi
- E) Obstruksion i zorrës së hollë

Pyetja 56

Cili prej organeve të mëposhtme demtohet me shpesh në traumat e mbyllura abdominale :

- A) Hepar
- B) Stomaku
- C) Shpretka
- D) Vezika urinare
- E) Pankreasi

Pyetja 57

Ekzaminimi që duhet bërë në një pacient që dyshohet për karcinome të ezofagut është :

- A) RX me barium
- B) Skanet toraksit
- C) Ezofagoskopia
- D) Skaner i abdomenit superior
- E) Studim i motilitetit ezofageal

Pyetja 58

Shenja klinike kryesore e sëmundjes Hashimoto është :

- A) Gusha
- B) Hipertiroidizmi
- C) Keratokonjuktivit i thate
- D) Artralgjia
- E) Ekzoftalmia

Pyetja 59

Një grua 42 vjeç me hipertiroidizem edhe tumefacion te qafes, diagnoza me e mundshme është :

- A) Tiroiditi Hashimoto
- B) Semundja e Plummer
- C) Semundja e Graves
- D) Carcinoma papilifera
- E) Adenoma folikolare

Pyetja 60

Një arterit Horton jo I trajtuar mund te evoluoj ne :

- A) Emboli pulmonare
- B) Shurdhim koklear
- C) Tromboze e arteries temporale superficial
- D) Humbje e shikimit bilateral permanent
- E) Kriza te forta edhe te përsëritura ten je cefale temporal

Pyetja 61

Një pacient 85 vjeç, vjen ne spital me dhimbje te forta barku te cilat shtrihen ne te gjitha kuadrantet, është I axhituar, ka diarre, Temperaturë edhe ndjesi te vjelli. Abdomeni është I bute,pak I dhimbshem, nuk preken masa abdominale dhe ka peristaltik

- A) Okluzion intestinal
- B) Aneurizem e aortes ne faze rapture
- C) Infarkt intestinal
- D) Pankreatit akut
- E) Kolit inflamator

Pyetja 62

Cili prej organeve më poshtë merret nga një donator kadaver multiorgan per transplant :

- A) Gonadet
- B) Mbiveshkorja
- C) Shpretka
- D) Veshka
- E) Medula spinale

Pyetja 63

Trajtimi I pneumotoraksit ipertensiv është :

- A) Drenim ne aspirim
- B) I jepet vetem oksigjen
- C) Mbahet nen vezhgim
- D) Torakotomia eksplorative
- E) Intubim

Pyetja 64

Vena spermatike dekstra derdhet ne :

- A) Venen renale
- B) Venen kava
- C) Venen iliaca komunis
- D) Venen iliaca eksterne
- E) Venen pudenda interne

Pyetja 65

Ne një pacienti me vështirësi ne gëlltitje per shkak te një neoplazie ezofageale, elementi me I rendesishem per ekzaminim e tij është :

- A) Ne nivelin e stenozes
- B) Ulçerimi I lezionit
- C) Kohezgjatja e vështirësise ne gëlltitje
- D) Ezofagografia
- E) Ezofagoskopia me biopsi

Pyetja 66

Një pacient me retorragji diskrete mbas daljes jashte, me defekim te veshtire edhe te dhimbshem e tenezem rektal . Cili prej ekzaminimeve te mëposhtme është I keshillueshem ne kete rast?

- A) Analize kimike edhe parasitologjike te feceve
- B) Pankolonoskopi
- C) Klizem opak me dubel kontrast
- D) Një tushe rektale digitale dhe një ano-retoskopi
- E) Gjak okult ne fece

Pyetja 67

Ne megakolonin toksik duhet :

- A) Një nderhyrje urgjente mbas stabilizimit te ekuilibrit elektroliteve
- B) Një nderhyrje imediate
- C) Vetem stabilizimi I ekuilibrit elektrolit
- D) Trajtimi me kemioterapi edhe elektrolite
- E) Te stabilizojme gjendjen e pacientit perpara operimit

Pyetja 68

Cili prej tumoreve te traktit intestinal më poshtë është me I shpeshti ne moshat e reja ?

- A) Neuroblastoma
- B) Karcinoidi
- C) Carcinoma e kolonit
- D) Linfosarkoma
- E) Rabdomiosarkoma

Pyetja 69

Kush zone e zorres perforohet me shpesh per shkak te stenozes te sigmes ?

- A) Ne colonin desendent
- B) Ne fleksuren lienale
- C) Ne kolon transvers
- D) Ne sigma
- E) Ne cekum

Pyetja 70

Dimensionet e një karcinome te gjirit ne T2 janë :

- A) >1 cm, por <2.5
- B) >2 cm, por <3.1
- C) Midis 3 dhe 6 cm
- D) Midis 3 dhe 5 cm
- E) >2 cm, por <5.1

Pyetja 71

Një pacient 60 vjeç me dhimbje barku te menjehershme ne fosa iliake sinister, Temperaturë, leukocitoze, kontraktim i abdomenit ne zonen iniciale te dhimbjes si edhe arrest te zorreve. Diagnoza është :

- A) Apendisit akut
- B) Kolecistit akut
- C) Tumor I cekumit
- D) Perforacion I divertikulit ne sigem
- E) Kolik renale sinister

Pyetja 72

Kush është trajtimi I "zgjedhur" per polipozen intestinale familiare ?

- A) Mbajtja ne vezhgim te vazhdueshem te pacientit
- B) RezekSION segmentar e pjeses se zorres se interesuar
- C) Bypass intestinal
- D) Kolektomia totale
- E) Kolonoskopi periodike

Pyetja 73

Trajtimi I " zgjedhur " I fibroadenomes se gjirit është :

- A) Kuadrantektomia
- B) Heqja e tumorit
- C) Mastektomia totale
- D) Mastektomia
- E) Radioterapia

Pyetja 74

Cili prej shenjave edhe simptomave te mëposhtme është patognomonike e perforimi te tubit gastro-intestinal?

- A) Leukocitoza
- B) Kontraktimi I muskulatures abdominale
- C) Shtim I frekuences kardiake
- D) Zhdukja e matitetit te heparit
- E) Temperatura

Pyetja 75

Metastazat ne kancerin e prostatës shfaqen me shpesh ne :

- A) Tru
- B) Hepar
- C) Kockat e bacinut edhe vertebrat e fundit lumbare
- D) Pulmon
- E) Ne asnjë nga vendet me siper

Pyetja 76

Ne një pacient 70 vjeç, me gjendje te pergjithshme shendetesore te mirë, zbulohet një aneurizem I aortes abdominale 7 cm nen arterie renale asimptomatik. Faza e pare e terapise është:

- A) Nderhyrja vetem nqs do te shfaqen simptoma
- B) Jepen qetesues edhe presim
- C) Eliminim I aneurizmes
- D) Kufizim total I aktivitetit fizik
- E) Terapi antiipertensive

Pyetja 77

Te gjitha indikacionet per transplantin e heparit më poshtëjanë të vërteta, përveç :

- A) Morbus Wilson
- B) Metastaza epatike
- C) Kolangit sklerozant
- D) Ciroza biliare primare
- E) Ciroze alkolike



Pyetja 78

Si behet një mediastinoskopia?

- A) Trans-orale
- B) Trans-cutane
- C) Nga laringu
- D) Trans- diafragmatike
- E) Trans-ezofageale

Pyetja 79

Një paciente 76 vjeç ka vështirësi ne gëlltitjen e ushqimeve te forta prej disa javësh, janë te mundshme këto diagnoza, përveç :

- A) Divertikuj ne ezofag
- B) Divertikul I Meckel
- C) Tumor I ezofagut
- D) Parkinson
- E) Refluks gastro-ezofageal

Pyetja 80

Një pacient me polipoze familjare te kolonit I eksportojme një polip. Polipi mund te jete :

- A) Adenome viloz
- B) Polip iperplastik
- C) Pseudopolip
- D) Polip ritencional
- E) Polip adenomatoz

Pyetja 81

Ne te gjitha zonat e mëposhtme mund te vihen re kalcifikime ne rezultatet radiologjike, përveç :

- A) Fshikeza e urines
- B) Divertikuli I Meckel
- C) Ileusi renal
- D) Aneurizma aortes
- E) Rruget biliare intraepatike

Pyetja 82

Si pasoje e një traume te mbyllur, një krah I pacientit prezantohet me ngjyre te zbehte edhe I ftohte. Terapia me vazodilatator nuk permirëson gjendjen klinike. Diagnoza me e mundshme është :

- A) Hematome intramurale
- B) Hematome pulsante
- C) Aneurizem post-traumatike
- D) Fistul atero-venoze
- E) Tromboze venoze profunde

Pyetja 83

Ne një pacient me ikter, kruarje, dhimbje ne ipokondrin e djathte edhe dispepsi, cili është ekzaminimi qe duhet bërë I pari?

- A) Kolecistografia orale
- B) Kolangiografia intravenoze
- C) Kolangio rezonca manjetike nukleare
- D) Ekografia epat-bilio-pankreatike, e ndjekur nga një kolangio-pankreatografi retrograde endoskopike
- E) Rx abdomen

Pyetja 84

Mukocela e apendiksit cecal është:

- A) Një tumor malinj
- B) Një patologji me baze allergjike
- C) Një tumor beninj
- D) Një cist
- E) Një patologji infektive

Pyetja 85

Te gjitha sëmundjet më poshtëmund te shkaktojne një infarkt venoz mezenterik, përveç :

- A) Ipertensioni portal
- B) Tumoret pankreasit
- C) Sd. Boerhaave
- D) Kontraceptivet oral
- E) Troboflebitet

Pyetja 86

Nga çfarë karakterizohet Sd. Mallory-Weiss?

- A) Fisure ne mukozen e ezofagut
- B) Stenoze e ezofagut
- C) Akalazi edhe divertikuj te ezofagut
- D) Spazem difuze e ezofagut
- E) Rupture e ezofagut

Pyetja 87

Hernia inguinale direkte është :

- A) Një hernie e cila del poshte legamentit inguinal
- B) Një hernie e cila del lateralisht vazave epigastrike
- C) Një hernie e cila del medialisht vazave epigastrike
- D) Një hernie qe tejkalon kanalin obturator
- E) Një hernie qe tejkalon kanalin inguinal intern

Pyetja 88

Shkaku kryesor i fistules digjestivo-biliare është :

- A) Ulçera gastrike ose duodenale
- B) Karcinome ne kolon transvers
- C) Kalkuloze biliare
- D) Ekinokok i heparit
- E) Karcinome e stomakut

Pyetja 89

Subjektet me risk te larte per shfaqjen e karcinomes se anusit janë:

- A) Sëmundje inflamatore intestinale kronike
- B) Polipe adenomatoze te colonit
- C) Kondilomatosi
- D) Familjaritet per kancerin e anusit
- E) Hemorroidet

Pyetja 90

Terapia kirurgjikale e kardias është e orientuar drejt:

- A) Ezofagotomise parciale
- B) Ezofagotomia totale
- C) Bypass it gastro-ezofageal
- D) Vendosja e një proteze ne një te terten inferiore te ezofagut
- E) Kardiomiomise ekstramukoze

Pyetja 91

Cila prej shenjave më poshtëshfaqet me shpesh ne kancerin e fshikzez urinare?

- A) Recidive e Cistopielitit
- B) Retension urinar akut
- C) Dhimbje gjate urinimit
- D) Urinim i shpeshtë
- E) Gjak ne urine

Pyetja 92

Një burrë 72 vjeç vjen ne spital me ipotension, dhimbje te forta ne kurriz. Gjate ekzaminimit te abdomenit vihet re një mase qe pulson. Diagnoza është :

- A) Infarkt intestinal
- B) Rupture ose fisurim e aneurizmes te aortes abdominale
- C) Aneurizem e aortes se disekuar
- D) Sd. Leriche
- E) Aneurizem e arteries epatike

Pyetja 93

Gastrinoma lokalizohet me shpesh ne :

- A) Shpretka
- B) Duoden
- C) Pankreas
- D) Antrum
- E) Koleciste

Pyetja 94

Mikrorganizmi shkaktar I kolitit pseudomembranoz është :

- A) C. difficile
- B) B. fragilis
- C) C. perfringens
- D) E. coli
- E) C. tetani

Pyetja 95

Perforim diastazik është një perforim I cili ndodh per shkak te një segmenti intestinal te bllokuar. Ne rastin e një stenoze neoplastike te sigmes kush është zona ne te cilën ndodh me shpesh ky perforim?

- A) Kolon descendent
- B) Cekumi
- C) Kolon transvers
- D) Sigma
- E) Fleksura lienale

Pyetja 96

Ne diagnostifikimin e apendisitit akut është e rëndesishme:

- A) Anamneza edhe vizita
- B) Skaneri
- C) Rx e aparatit digjent
- D) Klizma opake
- E) Ekografia abdominale

Pyetja 97

Cili prej ekzaminimeve më poshtë është me I dobishem ne diagnozen e neoplazise periferike te pulmonit?

- A) Radiografia toraksit
- B) Skaneri
- C) Shintigrafia pulmonare
- D) Bronkografi
- E) Bronkoskopi

Pyetja 98

Ne cilat prej neoplazive te mëposhtme ,rezeksioni I metastazave hepatike mund te permirësoje prognozen e tyre:

- A) Ovari
- B) Gjiri
- C) Stomaku
- D) Kolon
- E) Prostata

Pyetja 99

Arteria mesenterike inferior ushqen :

- A) Ampulen rektale te poshtme
- B) Zorren e holle
- C) Colonin e djathte
- D) Kanal in anal
- E) Kolon sinister edhe një pjese te rektumit

Pyetja 100

Ne një pacient me kolika biliare te shpeshta kemi rruge biliare te dilatuara por nuk vihen re gure. Kjo është klinika e :

- A) Tumorit te kokes se pankreasit
- B) Kolangitis sklerozant
- C) Ciroze biliare dytesore
- D) Atoni e rrugeve biliare kryesore
- E) Stenoze nga infiamacioni I papiles Vater

Pyetja 101

Per diagnostifikimin e feokromocitomes behen te gjitha ekzaminimet e mëposhtme përveç :

- A) Rezonanca manjetike
- B) Skaneri
- C) Pielografia asendente
- D) Flebografia retrograde
- E) Aortografia

Pyetja 102

Shenja e Troisier tregon:

- A) Ashit neoplastik
- B) Metastaze te tumorit te ovarit
- C) Një ipokalcemi mbas rezeksionit te stomakut
- D) Metastaze limfonodale supraklaveolare

E) Shenjë që l paraprin një ashiti

Pyetja 103

Ne rast se një tromboflebit migrant është rezistent ndaj terapise me antikoagulante dyshohet për:

- A) Ulçer gastrike
- B) Kolecistit kalkuloz
- C) Ciroze biliare
- D) Karcinome të pankreasit
- E) Perforacion i kolonit

Pyetja 104

Trajtimi kirurgjikal për një neoplazi të colonit ascendent është:

- A) Emikolektomia sinister
- B) Emikolektomia dekstra
- C) RezekSION ileo-cekal
- D) RezekSION segmentit
- E) Kolektomi subtotale

Pyetja 105

Ne një pacient me kancer të bronkeve, me ekzaminim të sputumit edhe bronkoskopi negative. Për të vënë diagnozën citologjike duhet:

- A) Bronkografi
- B) Skaner
- C) Stratigrafi
- D) Shintigrafi
- E) Agoaspirat

Pyetja 106

Për të lokalizuar saktësisht vendodhjen e gurit në rastin e një bllokimi të segmentit pieloureteral, cili është ekzaminimi që duhet bërë?

- A) Urografia intravenoze
- B) Pielografia ascendente
- C) Shintigrafi renale
- D) Radiografi direkte e abdomenit
- E) Skaner

Pyetja 107

Të gjitha sëmundjet më poshtëmund të jenë pasojë e mungesës së mbylljes së urakusit, përveç :

- A) Fistula urinoze umbelike
- B) Gure në duktus
- C) " caput medusa"

- D) Neoplazi
- E) Ciste ose absese

Pyetja 108

Angina abdominis karakterizohet nga:

- A) Ishemi kronike intestinale
- B) Hemorragjia intestinale
- C) Divertikulit
- D) Neoplazia e colonit
- E) Ulçera peptike post-anastomizimit

Pyetja 109

Cili është karcinoma me frekvente e tiroides?

- A) Hemiangiosarkoma
- B) Medulare
- C) Folikulare
- D) Anaplastike
- E) Papilare

Pyetja 110

Hemorragjia rektale quhet ndryshe:

- A) Ematemeza
- B) Melene
- C) Enterorragji
- D) Proktorragji
- E) Menorragji

Pyetja 111

Cili prej ekzaminimeve më poshtëben të mundur një diagnoze diferenciale midis akalazisë kardiake edhe kancerit të ezofagut?

- A) Mediastinoskopia
- B) Ezofagografia
- C) Ezofagoskopia me biopsi
- D) Manometria ezofageale
- E) Phmetria

Pyetja 112

Per diagnostifikimin e refluksit gastro-efofageal :

- A) PHmetria
- B) Manometria
- C) EGDS ( ezofagogastroduodenoskopia )

- D) Rx toraksit
- E) Rx me barium

Pyetja 113

Cili nga parametrat më poshtë është përcaktues i prognozës tek një pacient me refluks veziko-ureteral:

- A) Moshë
- B) Nefropati nga refluksi
- C) Gjenetika
- D) Frekuenca e infeksioneve urinare 12 muajt e fundit
- E) Përhapja e patologjisë në të dy anet

Pyetja 114

Torakotomia në urgjencë është e keshilluar në rast :

- A) Hemotoraksi
- B) Versament bilateral i pleurës
- C) Kontuzioni pulmonar
- D) Pneumotoraks
- E) Empiema

Pyetja 115

Vendi më i zakonshëm i Ulçerës gastrike është:

- A) Fundus i stomakut
- B) Kurvatura minor
- C) Kurvatura manja
- D) Antrum
- E) Cardias

Pyetja 116

Sa cm nga valvula ileo-cekale ndodhet më shpesh divertikuli i Meckel :

- A) 40 cm
- B) 80 cm
- C) 10 cm
- D) 1 m
- E) 1,5 m

Pyetja 117

Në cilën neoplazi të testikut ka rritje të b-HCG?

- A) sertolioma
- B) seminoma
- C) carcinoma anaplastike
- D) leydigioma
- E) coriocarcinoma



Pyetja 118

Ne trombozen venose te gjymtyreve te poshtme, pozitiviteti i shenjes se Homan perfaqesohet nga:

- A) dhimbje e pulpes gjate fleksionit
- B) hemorragji ne inde
- C) hipersensibilitet ne te ftohte
- D) zgjerim i venave siperfaqesore te kembes
- E) mungese e pulsit femoral

Pyetja 119

Trajtimi i një neoplasie te heparit, e limitur ne njerin nga lobet është:

- A) radioterapia dhe kemioterapia
- B) vetem kemioterapia
- C) vetem radioterapia
- D) hepatektomi e ndjekur nga kemioterapi
- E) kemioterapi endoarteriose

Pyetja 120

Lidhja e venes spermatike përdoret ne rast te :

- A) orkite
- B) rritje i numrit te venave te funikul
- C) ne stazin venose te testikutit
- D) varikocele
- E) infiamacion te epididimit

Pyetja 121

Një trup i huaj ne brendesi te bronkeve:

- A) mund te trajtohet me terapi konservative
- B) duhet hequr ne menyre kirurgjikale
- C) duhet hequr me endoskopi
- D) duhet hequr me endoskopi vetem nese është i mpreht
- E) duhet hequr ne menyre kirurgjikale vetem nese është i mprehte

Pyetja 122

Rritja e fonise vokale FVT gjate perkusionit verehet ne rastin e:

- A) empiemes pleurike
- B) versament i pleures
- C) pneumotoraksit
- D) enfisemes pulmonare
- E) rritje e densitetit te parenkimes se pulmonit me bronke te bllokuara

Pyetja 123

Te gjitha pergjigjet më poshtë janë simptoma tipike te tumorit te rektumit përveç:

- A) kostipacion
- B) alterim i kostipacionit me diarene
- C) tenezem
- D) sekrecion
- E) dhimbje hiperperistaltike ne fosen iliake te djathte

Pyetja 124

Te gjitha tumoret më poshtë mund te japin sindrome te Cushing paraneoplastike, përveç:

- A) tumori i timusit
- B) tumori i kockes
- C) tumori i pankreasit
- D) tumori i kolonit
- E) tumori i ovareve

Pyetja 125

Një miokard i demtuar mund te shkoj drejt fibrilacionit atrial ose arrestit kardiak ne te gjitha situatat e mëposhtme përveç:

- A) aspirimit endotrakeal
- B) matjes se presionit arterioz
- C) te vjelles
- D) stimulimit vagal
- E) intubimit naso-gastrik

Pyetja 126

Cila nga patologjite më poshtë mund të jenë shkak kryesor i një tromboflebiti migrator, rezistent ndaj terapise antikoagulante?

- A) kolecistit akut
- B) cirroza e kolecistes
- C) sindroma e Mallory-Weiss
- D) kanceri i pankreasit
- E) Ulçer e perforuar

Pyetja 127

Çfarë nuk perfshihet ne simptomat tipike te mostretjes?

- A) piroza
- B) tension epigastrik mbas te ngrenit
- C) djegie
- D) gogesime
- E) kostipacion

Pyetja 128

Një paciente e prekur nga divertikuj ezofageal, ezofagoskopia është:

- A) te praktikohet me kujdes mbas radiografise
- B) te evitohet
- C) e nevojshme
- D) e keshillueshme
- E) i domosdoshem

Pyetja 129

Një mashkull 48 vjeç ka një mase te bute ne testikul. Skrotumi është skuqur. Kemi Temperaturë dhe pus ne urine. Diagnoza është:

- A) hernie
- B) tuberkuloz i epididimisit?
- C) d.epididimit akut
- D) neoplazi e testikutit
- E) prostatit

Pyetja 130

Te gjitha pergjigjet më poshtëjanë komplikime te kolecistitit aket, përveç:

- A) pankreatit
- B) tromboflebit migrator
- C) fistul ne kolecist
- D) perforim
- E) peritonit

Pyetja 131

Femer 90 vjeç me një neoplazi me diameter 3 cm, e lokalizuar ne kuadrantin e jashtem te gjirit se djathte, pa metastaza. Pacientia ka një shendet te mirë, është autonome dhe jeton me familjen.

Terapia qe duhet ndjekur është:

- A) mastektomi radikale duke ruajtur muskujt pektoral dhe një linfoadenektomi aksilare
- B) mastektomi radikale duke ruajtur muskujt pektoral
- C) nuk operohet
- D) heqje e tumorit me anesthesi lokale
- E) mastektomi nen lekure

Pyetja 132

Semundja e Riedel e tiroides është:

- A) një adenome
- B) iperplazi e thjështë e tiroides
- C) një neoplazi
- D) një sëmundje inflamatore kronike
- E) një cist i komplikuar i tiroides

Pyetja 133

Cila nga pergjigjet më poshtëmund te jete shkak i ileusit paralitik:

- A) hiperkalemi
- B) volvus i sigmes
- C) morbus Crohn
- D) ileus biliar
- E) neoplazi e rektumit

Pyetja 134

Ne një pacient te moshuar te gjitha më poshtëjanë kushte per lindjen e një plage deкупituese, përveç:

- A) kequshqyerjes
- B) qendrimi ne shtrat
- C) diabete
- D) trashegimi
- E) vaskulopatia

Pyetja 135

Cilin test do i benin një pacienti me hematemesis?

- A) bronkoskopi
- B) rx te traktit tretes
- C) klizem opak
- D) rx i adomit
- E) esofago-gastro-duodeno-skopi

Pyetja 136

Sindroma e Pancoast është patologji e:

- A) stomakut
- B) baze se pulmonit
- C) veshkes
- D) gjendres mbiveshkore
- E) C.apeksit te pulmonit

Pyetja 137

Ne rast te një linfogranulomi malinj, cili është ekzaminimi qe përdoret per te vene diagnozen:

- A) Skaneri
- B) Ekografia
- C) Rezonance manjetike
- D) Linfografi
- E) Biopsi linfonodulit

Pyetja 138

Megakoloni toksik mund te jete evoluimi klinik i :

- A) Retokolit Ulçerativ
- B) Divertikuli kronik i kolonit
- C) Megakolon i lindur
- D) Polipozes difuze te kolonit
- E) Tumor i kolonit

Pyetja 139

Çfarë hiqet ne mastektomine radikale:

- A) Gjiri
- B) Gjiri, muskujt pektoralis major dhe minor dhe limfonodulat aksilar
- C) Gjiri dhe muskujt pektoralis major dhe minor
- D) Gjiri dhe limfonodulat aksilar
- E) Gjiri dhe muskuli pektoralis major

Pyetja 140

Ne rastin e traumes se veshkes, cila nga shenjat më poshtë është indikator per nderhyrje kirurgjikale:

- A) Hematuri
- B) Enjtje dhe mavijosje anash
- C) Hidronefroze
- D) Hipertension arterios
- E) Dalja jashte vazave te kontrastit gjate urografise

Pyetja 141

Te gjitha pergjigjet më poshtëmund të jenë shkak i një gjakderdhjeje te fshehur ne aparatit tretes, përveç:

- A) Angiodisplazia kolike
- B) Divertikuloze e kolonit
- C) Retokolit Ulçerativ
- D) Koloni i irrituar
- E) Karcinoma cekumit

Pyetja 142

Një pacient 80 vjeç, vuan nga bronkopatia kronike obstruktive, kardiopati konxhestive, tromboflebit ne gjymtyret e poshtme si edhe raporton shfaqjen e një hernieje inguinokrotale, e cila e bezdis gjate aktiviteteteve te jetes se perditshme. Çfarë terapi

- A) I keshillohet plastike e hernies me proteze, (anestesi lokale)
- B) Asnjë trajtim
- C) Keshillohet venja e një brezi hernial
- D) Terapia kirurgjikale keshillohet vetem ne rast te komplikimit te hernies
- E) Hernioplastike

Pyetja 143

Cili nga ekzaminimet meposhte duhet bërë kur dyshohet për gur në temth?

- A) Radiografi të traktit të sipërm të tretjes
- B) Ekografi e heparit dhe temthit
- C) Manometri të duodenit
- D) Kolecistografi
- E) Radiografi e abdomenit

Pyetja 144

Te gjitha procedurat më poshtë janë indikacione për terapinë kirurgjikale të Morbus Crohn, përveç:

- A) RezekSION ileo-cekal
- B) Miotomi ekstramukoz e Heller
- C) Kolektomia totale me ileo-reto anastomoze
- D) Hemikolektomia e djathtë
- E) Proktokolektomia

Pyetja 145

Terapia në një pacient me strumë multinodulare që komprimon trakene është :

- A) Tiroideektomia subtotale
- B) Trajtim me hormone tiroidale
- C) Terapi jodike
- D) Soministim të radiojodit
- E) Terapi me ilaçe antitiroidei

Pyetja 146

Diagnoza e absesit subfrenik bëhet me :

- A) Skaner
- B) Radiografi të abdomenit
- C) Pneumoperitoneum
- D) Kolangiografi
- E) Test objektiv

Pyetja 147

Kohe e Quick përdoret si parameter në vlerësimin e efektivitetit të terapive antikoagulative me :

- A) Heparina
- B) Heparina me peshë të vogël molekulare
- C) Fibrinolitiket
- D) Dikumaroliket
- E) Sulfati i protamines

Pyetja 148

Diagnoza diferenciale ndërmjet cistëve e tumorëve solide të gjirit bëhet me anë të:

- A) mamografise
- B) termografise
- C) shintigrafise mamare
- D) galaktografise
- E) ekografise

Pyetja 149

Një grua rreth 57 vjeç, pas një fracture të bacinit, paraqet dispne, puls të dobët e të shpësthtë, cianoze, dhimbje gjoksi. Diagnoza më e mundshme është:

- A) embolia pulmonare
- B) tetania
- C) pneumotoraks post-traumatik
- D) hemoragjia akute
- E) sindromi Crush

Pyetja 150

Kush nga diagnozat e mëposhtme mund të përshatet një pacienti 17 vjeçar me temperaturë e dhimbje të lokalizuara në kuadrantin e djathtë të poshtëm pas palpimit në kuadrantin e majtë të poshtëm?

- A) colitis Ulçeroz
- B) sëmundja Crohn
- C) dhimbja psikogjene
- D) sindroma e intenzionit të irrituar
- E) apendiciti akut

Pyetja 151

Në cilin rast splenektomia kryhet më shpesh?

- A) ikteri hemolitik konstitucional
- B) sindromi I hipertensionit portal
- C) morbus Hodgkin
- D) trauma abdominale
- E) Linfoma jo-Hodgkin

Pyetja 152

Strukturat e mëposhtme anatomike mund të jenë vende të abscesit subfrenik, përveç:

- A) subfrenik I majtë
- B) sotomezokolika
- C) sotohepatik
- D) subfrenik I djathtë
- E) retroepiploika

Pyetja 153

Simptomat e shenjave klasike të kolangitit akut janë:

- A) te vjella biliare,dhimbje ne hipokondrin e djathte,ikter
- B) Temperaturë,te vjella biljare,leukocitoze neutrofile
- C) dhimbje ne hipokondrin e djathte,ikter,temberature,Temperaturë
- D) dhimbje ne hipokondrin e djathte,melene,Temperaturë
- E) leukocitoze neutrofile,melene,te vjella ushqimore

Pyetja 154

Cila nga pergjigjet e me poshteme rezulton te shprehe faktorin prognostik me te rendesishem qe ndikon ne perforacionin ezofageal?

- A) intervali ndermjet perforacionit e trajtimit
- B) grada e shokut
- C) mosha e pacientit
- D) etiologjia e perforacionit
- E) tipi I trajtimit te perdorur

Pyetja 155

Çfarë qendrimi duhet te mbaje mjeku praktik perpara një pacienti 70 vjeçar,me risk te larte,qe vuan nga aneurizma e aortes abdominale me diameter prej 4 cm?

- A) ta adresoje pacientin tek kirurgu per intervent
- B) ta ndjeke rastin ne evolucion duke ripërsëritur arterografine cdo 6 muaj
- C) ta qetesojë pacientin duke eskluduar cdo nderhyrje mjekesore
- D) te praktikoje terapi antikoagulante per gjithë jeten

Pyetja 156

Ne hipospadi hapja uretrale :

- A) është e vogel
- B) është e dilatuar
- C) është ne vend jo normal
- D) mungon
- E) është dopio

Pyetja 157

Një pacient 60 vjeç,me një mase mediastinale voluminoze ,paraqet dhimbje retrosternale qe, në mënyrë të vazhdueshme,irradiohet ne shpatull e kurriz.Diagnoza me e mundeshme është:

- A) timoma
- B) morbus Hodgkin
- C) neoplazia pulmonare
- D) strume retrosternale
- E) aneurizem disekant I aortes

Pyetja 158



Metastazat e perhapura me rruge hematogjene nga një karcinome e kolonit kanë lokalizim primar:

- A) trurin
- B) kockat
- C) pankreasin
- D) pulmonin
- E) heparin

Pyetja 159

Prova Perthes shërben për të verifikuar:

- A) egzistencën e një fistule artero-venoze
- B) egzistencën e një aneurizmi
- C) deviacionin e aksit venoz superficial
- D) deviacionin e aksit venoz të thellë e vendndodhjen e venave të perforuara
- E) kontinencën e valvulës safeno-femorale

Pyetja 160

Cila nga këto tipe të anestezisë përcakton incidencën më të madhe të hipotermisë:

- A) anestezia gjenerale
- B) anestezia loko-regionale
- C) kombinimi i anestezisë gjenerale me atë lokoregionale
- D) anestezia lokale
- E) kombinimi i anestezisë gjenerale e lokale

Pyetja 161

Shenja Murphy është më shpesh pozitive në:

- A) kolecistitin kalkuloz
- B) Ulçerën duodenale
- C) Ulçerën gastrike
- D) divertikulin duodenal
- E) tumorin e kokes së pankreasit

Pyetja 162

Të gjitha gjendjet e më poshteme nderhyjnë negativisht në shërimin normal të plagës operative përveç:

- A) mungesa e zinkut
- B) diabeti melit
- C) kortikosteroidet
- D) hipopotasemia
- E) kequshqyerja

Pyetja 163

Një grua 40 vjeçare zbulon me vetegzaminim një mase të forte në gjirin e djathtë. Cila nga procedurat e mëposhtme do të jetë ajo që do të konfirmojë diagnozën?

- A) mamografia
- B) termografia
- C) biopsia eksizionale
- D) citologjia ageaspirative
- E) ekografia

Pyetja 164

Cila nga këto karaktere të ben të dyshosh për natyrën malinjë të një noduli mamar:

- A) shumëvatrore e bilateral
- B) konsistenca tenso-elastike
- C) ndryshon volumnin në vartësi nga cikli menstrual
- D) i fiksuar me indin gjendror
- E) sipërfaqe e lemuar

Pyetja 165

Kush është egzaminimi kryesor që duhet kryer në një pacient, ankesa e të cilit është hematemesis?

- A) arteriografia
- B) egzaminimi radiologjik direct I abdomenit
- C) egzaminimi radiologjik me barium
- D) ezofago-gastro-duodenoskopia
- E) ekografi abdominale

Pyetja 166

Sindromi Peutz-Jeghers është i përbërë nga bashkërendimi i:

- A) polipoza e stomakut dhe guret e kolecistit
- B) polipoza e stomakut dhe epitelioma difuze
- C) carcinoma e zorrës së hollë dhe obliteracioni I sinuseve
- D) leiomioma e intestinit të hollë dhe guret e kolecistit
- E) polipozes së intestinit të hollë dhe pigmentimit melanik të fytyrës

Pyetja 167

Kush është trajtimi kryesor i embolizimit pulmonar:

- A) ligatura e venës cava inferior
- B) antikoagulante dhe fibrinolitike
- C) embolektomia pulmonare
- D) trombektomia
- E) antibiotike

Pyetja 168

Tumori ne colon zhvillohet me shpesh ne:

- A) cekum
- B) sigma
- C) transvers
- D) ascendent
- E) rektum

Pyetja 169

Trajtimi me ideal per empiemen pleurale është:

- A) antibiotikoterapia
- B) antibiotike e torakocenteze
- C) antibiotike e drenim te hapur
- D) antibiotike e drenim te mbyllur
- E) dekortikim prekoks

Pyetja 170

Cila nga këto egzaminime përdoret me shumë per te arritur ne një diagnose sa me te sakte mbi polipet gastrike?

- A) shintigrafia
- B) TAC
- C) gastroskopia
- D) radiografi e rrugëve te sipërme digjестive me contrast te dyfishte
- E) ekografi

Pyetja 171

Me termin alotrapiant ,nenkuptohet trampianti:

- A) ndermjet individeve qe i perkasin specieve te ndryshme
- B) ndermjet individeve qe i perkasin specieve te njejte
- C) ne te njejtin individ
- D) ndermjet binjakeve monocoriale
- E) ndermjet individeve isogrup me cros-match negativ

Pyetja 172

Ne diagnozen e studimin e MRGE (semundja e shkaktuar nga refluksi gastroesofageal) gjejne zbatim te gjitha egzaminimet e me poshteme përveç:

- A) rx I traktit tretes se siperm
- B) ekografia
- C) pH-metria e 24 oreve
- D) manometria ezofageale
- E) EGDS

Pyetja 173

Cili nga argumentet e me poshteme perben faktorin prognostic qe me shpesh shoqeron një prognoze te keqe te karcinomes mamare?

- A) metastazat limfonodulare
- B) vendndodhja e tumorit
- C) perberja diploide e AND-se
- D) receptoret hormonale estrogeno-progestative negative
- E) madhesia e tumorit

Pyetja 174

Te gjitha konfirmimet qe kanëte bejne me divertikulin e Meckel janë korekte, përveç :

- A) perben anomaline me te perhapur kongenitale te intestinit te holle
- B) prek 1.1-3% te popullates
- C) takohet me shpesh ne seksin mashkull
- D) mund te lokalizohet ne te gjithe traktin gastrointestinal
- E) është një divertikul I vertete pasi permban te gjitha shtresat e paretit intestinal

Pyetja 175

Komplikacioni me I shpështë I hemorroideve është:

- A) inkontinenca anale
- B) malinjizimi
- C) flebiti
- D) ngushtimi anal
- E) gjakderdhja

Pyetja 176

Shkaku me I shpështë I okluzionit intestinal tek te rriturit ne nivel te kolonit te majte është:

- A) canceri
- B) volvulusi
- C) divertikuli
- D) recto-coliti Ulçeroz
- E) invaginacioni

Pyetja 177

Te gjitha manifestimet patologjike te me poshteme percaktohen nga hipertensioni portal, përveç:

- A) varice ezofageale
- B) splenomegalia
- C) ascite
- D) varicet e bazes se gjuhes
- E) hemorroide

Pyetja 178

Hemorragjia digjестive ne divertikulin e Meckel provokohet nga:

- A) inflamacioni i divertikulit
- B) okluzioni intestinal I provokuar nga divertikuli
- C) invaginacion I divertikulit
- D) prezenca e divertikulit ne sakusin hernial
- E) Ulçera peptike te ngjitura me ishujt heterotopike te mukozes gastrike

Pyetja 179

Ne hemorragjite e shkaktuara nga raptura e variceve ezofageale indikohet:

- A) aplikimi I një sonde te Le Veen per te realizuar deviacionin peritoneo-venoz
- B) realizimi I një miotomie ezofageale eksramukose sec.Heller
- C) aplikimi injë sonde Dormia
- D) aplikimi I një sonde Blakemore
- E) nderhyrja me urgjence per te realizuar një fundo-plicatio sec.Nissen

Pyetja 180

Ne klasifikimin Child per te percaktuar rrezikun operator per aplikimin e një shunti ne një pacient me hipertension portal te grupit C perfshihen rastet ne te cilat bilirubinemia është:

- A) >3mg/dl
- B) ndermjet 2.1e 2.5mg/dl
- C) ndermjet 2.6e 3mg/dl
- D) ndermjet 1.5e2mg/dl
- E) klasifikimi Child nuk perfshin vleresimin e bilirubinemise

Pyetja 181

Te gjithë argumentet e me poshteme perfaqesojne tumore beninjë te paretit te stomakut , përveç:

- A) adenocarcinoma filloide
- B) carcinoide
- C) lipoma
- D) amartoma pancreatico
- E) leiomioma

Pyetja 182

Kolapsi intern I pulmonit mund te verifikohet ne te gjitha kushtet e mëposhtme përveç:

- A) pneumotoraks
- B) trauma te pulmonit
- C) hemotoraks
- D) plage parietale
- E) obstrukcion te bronkeve

Pyetja 183

Legamenti I Treitz ndodhet:

- A) ne bashkimin ileo-cekal
- B) ne bashkimin ileo-jejunale
- C) ne fleksuren lienale te colonit
- D) ne bashkimin duodeno-jejunal
- E) ne fleksuren epatike te colonit

Pyetja 184

Te gjithë më poshtë janë nerva kraniale, përveç:

- A) glosa-farings
- B) vagus
- C) aksesori spinal
- D) simpatik
- E) ipoglos

Pyetja 185

Te tëra patologjitë e mëposhtme shkaktojnë hemorragji të traktit gastrointestinal inferior, përveç:

- A) sëmundjes divertikulare të kolonit
- B) karcinomes kolo-rektale
- C) kompasit aortomezenterik
- D) angiodisplazisë
- E) kolitit ulçeröz

Pyetja 186

Ne okluzionin intestinal janë prezente të gjitha këto shenja përveç:

- A) Distension abdominal
- B) Peristaltikë metalike
- C) Klapotazh
- D) Kontraktura e parietit
- E) Stop i fecëve dhe gazrave

Pyetja 187

Një mashkull 40 vjeç me rektokolit ulçeröz kronik paraqet distension abdominal dhe temperaturë prej dy ditësh. Sëmundja më e mundshme në këtë pacient është:

- A) Gastroenterit
- B) Perforacioni i kolonit
- C) Megakolon
- D) Perkeqesimi i rektokolitit ulçeröz
- E) Volvulus të sigmes

Pyetja 188

Te gjitha alteracionet e mëposhtme trofike mund të jenë pasojë e vuajtjes iskemike përveç:

- A) Osteoporozë
- B) Distrofi e thonjve
- C) Atrofi e lekures
- D) Renie e qimeve
- E) Ulçerazione

Pyetja 189

Cila prej neoplazive endokrine të mëposhtme është e pranishme në sindromën Whipple?

- A) Glukagonoma
- B) Hipernefroma
- C) Vipoma
- D) Insulinoma
- E) Feokromocitoma

Pyetja 190

Në patologjinë herniare cila se bashku me dhimbjen është shenjë më e rëndësishme dhe më e hershme për të vënë diagnozën e inkarcerimit herniar dhe për ta shtruar me pas pacientin në spital?

- A) Te vjellat
- B) Irreponibiliteti i fryrjes herniare
- C) Stop i feceve dhe gazrave
- D) Temperatura
- E) Hematemeza

Pyetja 191

Testi përthes vlerëson:

- A) Funksionimin e qarkullimit limfatik
- B) Kontinencën e qarkullimit venoz sipërfaqësor
- C) Fluksin e qarkullimit arterioz
- D) Kalueshmërinë e qarkullimit venoz të thellë
- E) Kontinencën e venave perforuese

Pyetja 192

Cila nga manovrat apo shenjat semiologjike të mëposhtme nuk shërben për të vlerësuar variçet e anesise së poshtme?

- A) Manovra e Valsalves
- B) Manovra e përthes
- C) Manovra e Giordanos
- D) Manovra e Trendelenburgut
- E) Shenja e Shvartzit

Pyetja 193

Sindroma e gardnerit është një polipoze adenomatoze familjare (fap) e shoqëruar me :

- A) Mielome multiple, intolerancë ndaj laktozës dhe endokardit bakterial
- B) Absese cerebrale, egzoftalmi dhe hiperkortikozizem
- C) Distrofi muskulore, makroglosi dhe osteomieliti
- D) Osteomatoze, kiste epidermoidale e fibroma të lëkurës
- E) Glomerulonefrit, anemi pernicioze dhe sciallorrea

Pyetja 194

Semundja caroli është një malformacion i lindur i karakterizuar nga:

- A) Atezi e venave suprahepatike
- B) Artezi e legamentit falciforme të heparit
- C) Prezencë e kolecistit dyfishtë
- D) Derdhje anormale e koledokut në porcionin e parë duodenal
- E) Kiste të duktuseve biliare intrahepatike

Pyetja 195

Një burrë 40 vjeçar ankton shfaqjen e një fryrjeje në regionin inguinal të djathtë pas një sforcje fizike intensive, tumefaksioni është i reponueshëm, elastik dhe transmeton impuls në kollitje. Cila hipotezë diagnostike është më e arsyeshme fillimisht?

- A) Hernie inguinale
- B) Aneurizma e arteries femorale të djathtë
- C) Varice të krosit të safenes
- D) Linfoadenopati inguinale
- E) Torsion i funikulit spermatic

Pyetja 196

Pacient asimptomatik, anemik, me epigastralgji dhe meteorizem pas ngrënies të shoqëruara me rënje të oreksit. Fillimisht mëndojmë për një neoplazi gastrike. Cili është ekzaminimi më i përshtatshëm?

- A) CT skan abdominale superiore
- B) Gjak okult në feçe
- C) Fibrogastroskopi me biopsi
- D) Radiografi me kontrast të aparatit tretës të sipërmë me sulfat bariumi
- E) Ekografi hepato-biliare e pankreatike

Pyetja 197

Vendosja më e shpëstëtë dhe thujtë e vetme e tumorit glomik është :

- A) Qafa
- B) Shtrati i thoit
- C) Stomaku
- D) Dura mater



E) Araknoidja

Pyetja 198

Pritja ne kohe ne trajtimin e trupave te huaj ne pemen bronkiale është :

- A) Duhet evituar gjithmone
- B) E pranueshme per objektet me natyre bimore por jo per ato metalike
- C) E pranueshme per objektet metalike por jo per ato me natyre bimore
- D) Me e pershtatshme tek fëmijët se sa tek te rriturit
- E) Faza e pare e trajtimit

Pyetja 199

Cilin vend ze tek neoplazite malinjë te femres kanceri i gjirit ?

- A) Te tetin
- B) Te pestin
- C) Te tretin
- D) Te parin
- E) Te gjashtin

Pyetja 200

Ne melene jashteqitja është :

- A) Fece pleikromike
- B) Fece te perziera me mukus, pus dhe gjak
- C) Fece me gjak te kuq
- D) Fece si leng qershie
- E) Fece te zeza

Pyetja 201

Kur dyshojme per emboli pulmonare fillimisht duhet ti :

- A) Bejme pacientit hemogazanalize (astrup), terapi me oksigjen, grafi toraksi dhe ecg
- B) Japim pacientit vazodilatatore
- C) Bejme pacientit angiografi pulmonare
- D) Japim pacinetit heparine
- E) Studiojme tek pacienti hemodinamiken pulmonare

Pyetja 202

Tumori me i shpështë i testit është:

- A) Koriokarcinoma
- B) Karcinoma embrionale
- C) Seminoma
- D) Teratoma
- E) Gonadoblastoma

Pyetja 203

Cila nga simptomat e mëposhtme është specifike e feokromocitomes:

- A) Hipotensioni arterial
- B) Hipertensioni portal
- C) Hipertensioni endokranial
- D) Hipertensioni arterial
- E) Dhimbja lumbare

Pyetja 204

Vetem ne njerin nga rastet e mëposhtme, saturimi venoz miks nuk ulet poshte 60%

- A) Ulje e sasise se gjakut qe zemra hedh ne qarkullim
- B) Shunt arteriovenoz pulmonar
- C) Shunt djathte - majte
- D) Rritje e nevole se indeve per oksigjenim
- E) Hipoventilim

Pyetja 205

Karcinoma e laringut ne pjesen me te madhe te rasteve është:

- A) Karcinome bazocelulare
- B) Karcinome verrukoze
- C) Adenokarcinome
- D) Karcinome me qeliza gjigante
- E) Karcinome spinoqelizore

Pyetja 206

Te gjitha simptomat dhe shenjat e mëposhtme i perkasin insuficences mezenterialo - celiac perveç:

- A) Dhimbje pas buke
- B) Malabsorbim
- C) Dobesim
- D) Melene
- E) Ndjenjë tensioni abdominal

Pyetja 207

Cili nga bakteret e mëposhtëm është përgjegjës me i shpështë per endokarditet e protezave valvulare

- A) Escherichia coli
- B) Pseudomonas aeruginosa
- C) Streptokoku
- D) Enterokoku
- E) Stafilokoku

Pyetja 208

Te gjitha sëmundjet e mëposhtme mund të shkaktojnë adenopati cervikale tek të rriturit duke e përjashtuar patologjinë e gjendrës tiroide përveç:

- A) Neoplazite malinjë primare
- B) Fenomene infamatore
- C) Metastaza
- D) Sëmundja hodgkin
- E) Patologji kistike

Pyetja 209

Cili nga ekzaminimet e mëposhtme i duhet bërë fillimisht një pacienti 60 vjeç që paraqet ikter prej 4 javësh?

- A) Ct
- B) Ekografia
- C) Kolangiopankreatografia retrograde endoskopike
- D) Colangiografia perkutane transhepatike
- E) Scintigrafia e kolecistes

Pyetja 210

Për një pacient 60 vjeçar që referon proktorragji, kanëindikacion të gjitha ekzaminimet e mëposhtme përveç:

- A) Grafi me kontrast e transitit intestinal
- B) Irrigografia
- C) Kolonskopia
- D) Eksploracioni digital rektal
- E) Irrigo grafi me kontrast të dyfishtë

Pyetja 211

Kur kemi një aneurizem të aortes abdominale si paraqitet disekacioni?

- A) Pulsacion epigastrik
- B) Zhdukje të pulseve epigastrike
- C) Hemoftizi
- D) Dhimbje e forte e menjehershme lumbare
- E) Dridhje të paritit abdominal

Pyetja 212

Ne rastin e një formacioni solid të pjesës anteroire të heparit në ekografi cili është ekzaminimi i mëpasëm që duhet bërë?

- A) Radiografia e tubit tretes
- B) Kolangiografia transhepatike
- C) Kolangiografia retrograde

- D) Radiografia direkte e abdomenit
- E) Laparoscopia

Pyetja 213

Ikteri mekanik karakterizohet nga:

- A) Ulje e fosfatazes alkaline
- B) Rritje e bilirubines se koniuguar
- C) Anemi hemolitike
- D) Steatorre
- E) Feçe hiperkromike

Pyetja 214

Ne sa segmente ndajme heparin?

- A) 2
- B) 8
- C) 6
- D) 4
- E) 10

Pyetja 215

Ne cilin nivel te pankreasit gjenden me shpesh insulinomat?

- A) Koke dhe trup
- B) Koke
- C) Trup
- D) Trup dhe bisht
- E) Bisht

Pyetja 216

Si është kolecista ne një pacient me obstrukcion neoplazik te koledokut ?

- A) Kurre e distenduar
- B) Rralle e distenduar
- C) Është gjithmone pa dhimbje
- D) Shpesh e distenduar
- E) Prognosa është zakonisht e mirë

Pyetja 217

Cili është trajtimi per një pneumotoraks hipertensiv ?

- A) Nderhyrje kirurgjike urgjente
- B) Aspirimi
- C) Asnjë nga këto
- D) Plombazhi ekstrapleural

E) Aspirimi dhe drenimi

Pyetja 218

Cili është komplikacioni me i shpësthtë i një prostatiti kronik?

- A) Inflamacion i vezikave seminale
- B) Orkiti
- C) Cistocele
- D) Steriliteti riprodhues
- E) Epididimiti

Pyetja 219

Ne prani te aneurizmes se aortes abdominale cili nga shenjat e mëposhtëm është karakteristik ne disekacion?

- A) Pulsacion epigastrik
- B) Zhdukje e pulserei femorale
- C) Fremitus abdominal
- D) Dhimbje e forte e menjehershme lumbare
- E) Hemoftizi

Pyetja 220

Cila është arsyeja me e shpësthtë e perforacionit te kolonit?

- A) Infarkti mezenterial
- B) Hipertensioni nga staza fekale
- C) Volvulusi
- D) Gangrena nga hiperdistensioni
- E) Invaginacioni

Pyetja 221

Cili është tipi me i zakonshem i tumorit te pelvit renal dhe te ureterit?

- A) Karcinoma papilare
- B) Kancer me qeliza skuamoze
- C) Papiloma me qeliza tranzicioni
- D) Adenocarcinoma
- E) Sarkoma

Pyetja 222

Si duhet te sillet mjeku i familjes para një pacienti 60 vjeç, me risk te larte dhe me pranine e një aneurizme te aortes abdominale me diameter 4 cm ose me te vogel?

- A) Duhet adresuar gjithesesi tek kirurgu vazal
- B) Duhet ta ndjeke duke i përsëritur ekzaminime jo invazive
- C) Duhet ta ndjeke duke përsëritur arteriografine çdo 6 muaj
- D) Nuk duhet te shqetesohet fare

E) Duhet ti jape terapi antikoaguluese per gjithë jeten

Pyetja 223

Per çfare dyshojme kryesisht ne një pacient qe dikur ka bërë një by pass aorto bifemoral protezik dhe qe tani ben një episod melene?

- A) Një ulçer nga stresi
- B) Një patologji hemorragjike gastro enterike
- C) Infarkt te mezenterit
- D) Një fistul aorto duodenale
- E) Divertikul te Meckelit

Pyetja 224

Një pacient me episode te perse ritura TIA (atak iskemik tranzitor), me amuroze te djathte dhe hemipareze te majte na ben te dyshojme per një lezion ne nivel te:

- A) Bifurkacionit karotid te majte
- B) Cerebrales media
- C) Trungut bazilar
- D) Cerebrales posteriore
- E) Bifurkacionit karotid te djathte

Pyetja 225

Ne trombozat akute veç një nderhyrjeje te rivaskularizimit mund të përdoret ne alternative edhe terapi me :

- A) Antitrombocitare
- B) Vazodilatatore
- C) Antikoagulante orale
- D) Aspirine
- E) Trombolitike

Pyetja 226

Një pacient i detyruar ne shtrat prej disa javësh per një frakturë te femurit ka një dhimbje te papritur torakale therese, dispne dhe insuficiencë respiratore. Cila është diagnoza me e mundshme?

- A) Pneumotoraks
- B) Infarkt i miokardit
- C) Pneumoni
- D) Emboli pulmonare
- E) Pleurit

Pyetja 227

Manovra e Homansit është pozitive ne:

- A) Linfangit tronkular
- B) Linfangit retikular

- C) Variçe te safena magna
- D) Tromboflebit siperfaqësor
- E) Tromboflebit i thelle

Pyetja 228

Ne rast hemorragjie post operatore ne një tiroidektomi, hematoma perhapet pas muskujve te gjate te qafes dhe mund te deformoje trakene duke rrezikuar kalueshmerine e rrugeve te frymemarrjes si per pasoje te komprimimit ashtu dhe per edeme laringale. Ne

- A) Asgje perveç se te observojme pazienti
- B) Te bejme menjehere trakeostomine ne kravatin e pazienti
- C) Te vendosim drenazhet ne aspiracion
- D) Te marrim menjehere pacientin ne salle te operacionit per te eksploruar dhe per te bërë hemostaze
- E) Te heqim suturat e plages kutane

Pyetja 229

Grua 46 vjeç, intelektuale, beqare, një femi 10 vjeç, vuan nga hipertrofia e tiroides me hipertiroidizem qe ne muajt e fundit është bërë i pakontrollueshem me terapi mjeksore, realizon tiroidektomi sub totale. Cili nga te meposhtmit nuk është një risk i

- A) Hemorragji per demtim te venes tiroidea media
- B) Hiperkalemi grave
- C) Demtim i nervit laringeus superior
- D) Demtim ose heqje e paratiroidee
- E) Demtim i nervit rekurrens

Pyetja 230

Një pacient i trajtuar me by pass aorto bifemoral per aneurizwm te aortes abdominale, praqet ne post operator një dhimbje abdominale, meteorizem dhe ileus. Cila është diagnoza me e mundshme?

- A) Infarkt mezenterial
- B) Fistul proteziko intestinale
- C) Perforacion gastrik i një ulçere stresi
- D) Vonese ne kanalizim si pasoje e ileusit normal paralitik post operator
- E) Infeksion i protezes

Pyetja 231

Termi abdomen akut grupon një sere kuadresh klinike te irritimit peritoneal me fillim te shpejte. Zakonisht janë procese inflamatore ose vaskulare akute te kavitetit abdominal qe kerkojne një trajtim te menjehershëm kirurgjik. Cili nga te meposhtmit nuk

- A) Apendicit akut
- B) Perforacion i kolecistes
- C) Perforacion i ulçeres duodenale
- D) Ulçera gastrike
- E) Steatonekroze pankreatike

Pyetja 232

Çfare ndodh ku ne një subjekt normal lidhim arterien mezenterike inferiore ne origjinen e saj?

- A) Një nekroze iskemike e kolonit te majte
- B) Një kolit iskemik kronik
- C) Asgje pasi tolerohet mirë
- D) Një infarkt masiv intestinal
- E) Vdekje e menjehershme

Pyetja 233

Cila nga te mëposhtmet nuk është shkak i një ileusi mekanik?

- A) Pankreatit akut
- B) Stenoze nga infiltrimi i proceseve inflamatore ose neoplazike
- C) Kompresion i jashtem
- D) Invaginacion
- E) Obstruksion endoluminal

Pyetja 234

Divertikuli Meckel është anomalia me e shpështë e zorres se holle. Ne rreth gjysmen e rasteve është asimptomatik. Cili nga te meposhtmit nuk është një komplikacion tipik i kesaj patologjie?

- A) Invaginacioni
- B) Perforacioni
- C) Okluzioni intestinal
- D) Divertikuliti
- E) Hemorragjia

Pyetja 235

Një grua 25 vjeçe shkon ne sherbimin e urgjences pasi i ka rene te fiket. Referon se ne tre ditet e fundit ka pasur një gjakrrjedhje te lehte vaginale të shoqëruarme dhimbje ne pjesen e poshtme te barkut. Referon gjithashtu se ka pasur shtrengime ne fos

- A) Apendicit
- B) Gravidance ektopike
- C) Kancer i vezores se majte
- D) Endometrioze
- E) Kist i ovarit

Pyetja 236

Cila nga te meposhtmit nuk mund te jete komplikacion i një kolecistektomie te pakujdesshme?

- A) Hemorragji nga shtrati i kolecistes
- B) Rrjedhje biliare
- C) Gur ne rruget biliare i pa zbuluar
- D) Perforacion i kolonit trasvers



E) Stenoze biliare pasoje e demtimit të saj

Pyetja 237

Termi abdomen akut përmbledh në sërë kuadresh klinike pasoja të irritimit peritoneal me fillim të shpejtë. Zakonisht bëhet fjalë për procese infamatore ose vaskulare akute të kavitetit abdominal që kërkojnë një ndërhyrje të shpejtë kirurgjike. Cili nga

- A) Ileus mekanik
- B) Divertikuli i Meckel
- C) Okluzion i arteries mezenterike superiore
- D) Torsion i një listi të ovarit
- E) Ileus obstruktiv

Pyetja 238

Ne manovren e Adson-it kemi:

- A) Cianozë të ekstremitetit të interesuar
- B) Ulje të diapazonit të pulsit radial
- C) Zbehje të ekstremitetit të interesuar
- D) Rritje të diapazonit të pulsit të interesuar
- E) Dhimbje të dorës së ekstremitetit të interesuar

Pyetja 239

Cili është komplikacioni më i frikshëm i një arteriti të Horton-it të pa trajtuar?

- A) Verbim i pakthyeshem bilateral
- B) Emboli cerebrale
- C) Tromboze të arteries temporale sipërfaqësore
- D) Shurdhim koklear
- E) Kriza të forta të përsëritura cefalee.

Pyetja 240

Ne cilin nga rastet e mëposhtme shfaqet në mënyrë klasike dhimbja nga angina mezenterike

- A) Esell
- B) Gjate gjumit
- C) Pas të ngrenit
- D) Kur pacienti ngrihet në këmbë
- E) Kur pacienti është ulur

Pyetja 241

Cila nga sëmundjet e aparatit urinar, në kendveshtrimin e diagnozës diferenciale, nuk mund të stimulojë një kuader abdomen akut?

- A) Infarkti renal
- B) Pieliti

- C) Kisti renal
- D) Kolika renale nga kalkuloza
- E) Ipertrofia e prostates

Pyetja 242

Një burrë 55 vjeç me cirroze hepatike alkoolike vjen në urgjencën e spitalit me hematemeze prej 2 orësh. Ai ka një histori 2 mujore me distension abdominale, zgjerim subkutan të venave sipërfaqësore abdominale anteriore dhe hemorroide interne. Cila nga venat

- A) Vena gastrika sinistra
- B) Vena mezenterike inferiore
- C) Vena periumbelikale
- D) Vena emorroidale superiore
- E) Vena kava superiore

Pyetja 243

Cila nga këto nuk është arsye e një ileusi paralitik?

- A) Peritoniti difuz
- B) Ulçera gastroduodenale
- C) Ndryshime metabolike hidroelektrolitike
- D) Mekanizma reflektore të inhibimit
- E) Trauma abdominale

Pyetja 244

Cila nga të mëposhtmet nuk është një masë që merret për të parandaluar trombozën venoze të thellë?

- A) Bandazhi kompresiv
- B) Mobilizimi i hershëm post operator
- C) Ushtrime të frymëmarrjes me tri-flo
- D) Çorape elastike me kompresion të diferencuar
- E) Ushtrime muskulore të këmbëve

Pyetja 245

Në cilin nga rastet e mëposhtme nuk ekziston rreziku i një agravimi të vuajtjes së vaskularizimit të ansës intestinale nëse nuk ndërhyhet menjëherë kirurgjikalisht?

- A) Invaginacion
- B) Volvulus
- C) Hernie inguinale të inkarceruar
- D) Shterngim nga brili aderenciale
- E) Limfadenit mezenterik

Pyetja 246

Ulçera solitare e rektumit është një situatë beninjë me patogjeneze të pa qarte. Ajo godet më shpesh grata në dekadën e tretë - katërt dhe karakterizohet nga vështirësim i jashtëqitjes. Cila nga të mëposhtmet nuk është një simptomë karakteristike e saj?

- A) Disuria
- B) Hemorragjia
- C) Mukorreja
- D) Inkontinenca
- E) Tenezma

Pyetja 247

Cili nga shenjat e mëposhtme bëjnë të dyshojmë për një aneurizëm në mungesë të një mase të palpueshme pulsuese?

- A) Zhurme shfryrëse e vazhdueshme sistole diastolike në fossa iliakë
- B) "trill" i rregullt inguinal
- C) Asinkronizëm i pulsereve femorale
- D) Claudicatio intermitens
- E) Emboli akute të arterieve popliteale

Pyetja 248

Polipet e zorrës së trashë janë formime me pedunkul ose me baze të gjera, me origjinë nga epiteli i mukozës dhe drejtohen në lumenin intestinal. Ato mund të jenë jo neoplazike, pa tendencë për të malinjizuar dhe neoplazike që konsiderohen paraendesi

- A) Hiperplastike
- B) Amartomatoze
- C) Te sindromes Peutz-Jeghers
- D) Infamatore
- E) Adenomatoze

Pyetja 249

Termi abdomen akut përmbledh në sërë kuadresh klinike pasojë të irritimit peritoneal me fillim të shpejtë. Zakonisht bëhet fjalë për procese infamatore ose vaskulare akute të kavitetit abdominal që kërkojnë një ndërhyrje të shpejtë kirurgjike. Cili nga

- A) Ileus paralitik
- B) Trombozë e venës porta
- C) Trombozë e venës mezenterike
- D) Kist renal sinistër
- E) Rupturë e gravidancës tubare

Pyetja 250

Cili nga të mëposhtmet është trajtimi i zgjedhur për emboline arterioze?

- A) Heparinizimi
- B) Simpatetektomia
- C) Tromboendoarterektomia

- D) Terapia trombolitike
- E) Embolektomia me kateter Fogarty

Pyetja 251

Ne kendveshtrimin e diagnozes diferenciale, abdomeni akut mund te simulohet nga disa kuadro ekstra abdominale qe mund te perkeqsohen nga nderhyrja kirurgjike. Cili nga te meposhtmit nuk është nga këto?

- A) Pleuriti
- B) Embolia pulmonare
- C) Struma retro sternale
- D) Angina pectoris dhe infarkti i miokardit
- E) Pericarditi

Pyetja 252

Cila është vendosja me frekvente e tumorit gnomik

- A) Qafa
- B) Shtrati i thoit
- C) Stomaku
- D) Dura mater
- E) Araknoidja

Pyetja 253

Cili nga te meposhtmit nuk jep imazh kalçifikimi abdominal?

- A) Kalkulat vezikale
- B) Kalkulat renale
- C) Kalkuli intrahepatik bilirubinik
- D) Aneurizma e aortes
- E) Divertikuli Meckel

Pyetja 254

Koncentrimi i bikarbonatit ne gjak normalisht është:

- A) 5-7 mm/l
- B) 7 - 10 mm/l
- C) 10 - 15 mm/l
- D) 20 - 25 mm/l
- E) 15 - 20 mm/l

Pyetja 255

Kurba presion - vellim ne aparatit e frymemarrjes na lejon te matim:

- A) Rezistencen e rrugeve ajrore
- B) Kompliancen torako pulmonare

- C) Kapacitetin vital
- D) Kapacitetin funksional mbetes
- E) Vellimin mbylles

Pyetja 256

Oksigjenoterapia sjell rrezikun e komplikacioneve te mëposhtme perveç:

- A) Depression respirator ne bronkopatet kronike
- B) Edema pulmonare lezionale
- C) Fibrodisplazia retrolentikulare
- D) Irritim te mukozave te rrugeve te frymemarrjes
- E) Ulçeracionit korneal

Pyetja 257

Cila nga situatat e mëposhtme është kunderindikacion per manovren heimlich?

- A) Hipoksia akute
- B) Bronkopneumopatia kronike obstruktive
- C) Mosha e thyer
- D) Hernia inguinale
- E) Gravidanza ne muajt e fundit

Pyetja 258

Ne gjakun venoz pjesa me e madhe e CO<sub>2</sub> është ne forme:

- A) Karbonati
- B) Acidi karbonik
- C) CO<sub>2</sub> i lire
- D) Bikarbonati
- E) H<sup>+</sup>

Pyetja 259

Një solucion hipertonic per perdorim endovenoz është ajo qe:

- A) Një perqendrim sheqeri me te larte se ai plazmatik
- B) Një aktivitet ozmotik me te larte se ai plazmatik
- C) Një perqendrim te te treturave qe shkakton një presion onkotik me te madh se ai plazmatik
- D) Një permbajtje proteinike njelloj me ate plazmatike
- E) Një perqendrim NaCl njesoj me ate plazmatik

Pyetja 260

Shocku anafilaktik karakterizohet nga:

- A) Hipotension, bradikardi, presion venoz qendror (PVC) te zvogeluar
- B) Hipotension takikardi presion venoz qendror (PVC) te zvogelua
- C) Hipotension takikardi, presion venoz qendror (PVC) te rritur

- D) Hipotension bradikardi presion venoz qendror (PVC) te rritur
- E) Hipotension, bradikardi oligoanuri

Pyetja 261

Një spostim djathtas i kubes se disocimit te hemoglobines përcakton:?

- A) Rritje te afinitetit te Hb dhe rritje te leshimit te O<sub>2</sub> ne inde
- B) Ulje te afinitetit te Hb dhe ulje te leshimit te O<sub>2</sub> ne inde
- C) Rritje te afinitetit te Hb dhe ulje te leshimit te O<sub>2</sub> ne inde
- D) Ulje te afinitetit te Hb dhe rritje te leshimit te O<sub>2</sub> ne inde
- E) Asnjë ndryshim te afinitetit te Hb dhe te leshimit te O<sub>2</sub> ne inde

Pyetja 262

Stimulimi i vagusit sjell:

- A) Takikardi
- B) Ulje te sekretimit gastrik
- C) Hipertension
- D) Ulje te salivacionit
- E) Rritje te salivacionit

Pyetja 263

Cili nuk është komplikacion i intubimit oro trakeal ne anestezi te pergjithshme?

- A) Zenia bronkiale
- B) Ruptura e trakese
- C) Atelektazia pulmonare
- D) Edema persistuese e glotisit
- E) Ruptura e ezofagut

Pyetja 264

Cili nga pohimet e mëposhtme është i sakte lidhur me konsumi cerebral te oksigjenit?

- A) Ulet me 1% per cdo °C poshte 37,5 °C
- B) Rritet gjate anestezise me barbiturike
- C) Normalisht ulet ose rritet paralelisht me fluksin cerebral
- D) Është ne raport te drejte me kuocientin intelektual
- E) Varet kryesisht nga pa O<sub>2</sub>

Pyetja 265

Cili nga te meposhtmit përcakton gjysemjeten e një analgjeziku?

- A) Koha per te eliminuar gjysmen e ilacit
- B) Koha e pergjysmimit te ilacit ne receptore
- C) Jeta mesatare para skadences se ilacit
- D) Gjysma e kohes nga fillimi i veprimit te ilacit

E) Raporti i kostanteve te ekuilibrit ne kompartmentet e ndryshme

Pyetja 266

Ne cilat raste gjen indikacion perdorimi i opiateve madhore?

- A) Vetem ne dhimbjen onkologjike me prishmeri jete nen tre muaj
- B) Vetem ne dhimbjet akute
- C) Ne çdo dhimbje te pa kontrollueshmë mirë me FANS apo opioide minore
- D) Vetem ne dhimbjet kronike
- E) Vetem ne dhimbjen e paperballueshme

Pyetja 267

Neuropatia diabetike sjell zakonisht:

- A) Një dhimbje somatike
- B) Një dhimbje viscerale
- C) Një dhimbje homeopatike
- D) Një dhimbje neuropatie
- E) Një dhimbje adiabatike

Pyetja 268

Fluksi hematik cerebral i shtuar ndjeshem jep:

- A) Rritje te presionit arterial mesatar
- B) Aktivitet cerebral
- C) Hipoksi
- D) Adrenaline
- E) Hiperkapni

Pyetja 269

Një "volet" brinjor është me i shpësthtë ne traumat e:

- A) Kembesoreve
- B) Skiatoreve
- C) Çiklisteve
- D) Motoçiklisteve
- E) Shofereve

Pyetja 270

Cili është saturimi normal i O<sub>2</sub> ne gjekun venoz te arteries pulmonare:

- A) 92%
- B) 30%
- C) 60%
- D) 75%
- E) 45%

Pyetja 271

Ne një pacient ne koma dhe ne pozicion supin, okluzioni i rrugeve te frymemarrjes mund te kontrollohet duke:

- A) Flektuar koken me 30 °
- B) Ngritur koken 5 cm mbi trungun
- C) Ekstenduar koken ndaj qafes
- D) Vendosur pacientin ndenjur
- E) Ngritur koken 10 cm mbi trungun

Pyetja 272

Solucioni fiziologjik (nacl ne uje) ka një osmolaritet rreth:

- A) 300 mosm/l
- B) 175 mosm/l
- C) 250 mosm/l
- D) 145 mosm/l
- E) 400 mosm/l

Pyetja 273

Një pacient 70 vjeç, ne ditën e tretë post operatore laparotomike, shfaq insuficiencë respiratore me një kuader te qarte te atelektazise pulmonare. Cili nga te meposhtmit është trajtimi i zgjedhur per te zgjidhur situaten?

- A) Aerosolterapia
- B) Bronkoskopi dhe tualet bronkial
- C) Fizioterapi respiratore
- D) Antibiotikoterapi masive
- E) Nderhyrje e dYTE laparotomike

Pyetja 274

Ne rast fibrilacioni ventrikular, defibrilimi elektrik duhet bërë:

- A) Pas një tentative defibrilimi farmakologjik me prokainomid
- B) Pas një tentative defibrilimi farmakologjik me lidokaine
- C) Pasi te kemi vendosur ne j rruge venoze
- D) Pasi te kemi intubuar pacientin
- E) Menjehere

Pyetja 275

Ne fazen e refraktaritetit absolut zemra është:

- A) E eksitueshme
- B) Pjeserisht e eksitueshme
- C) Ne diastole
- D) E pa eksitueshme



E) Ne sistole

Pyetja 276

Cili nga pohimet e mëposhtme njihet se fundmi si perkufizimi i dhimbjes?

- A) Dhimbja është një eksperience objektive
- B) Ndjenjë e identifikueshme kollaj nga operatorët shendetesore
- C) Gjithçka që pacienti referon si dhimbje
- D) Ndjenjë në një apo më shumë pjesë të trupit që percakton një eksperience të pakendeshme
- E) Ndjenjë që shoqëron një demtim indor

Pyetja 277

Nese një arrest kardiak ka ndodhur në uje, kapaciteti i trurit për të rezistuar mungesës së oksigjenit:

- A) Varet nga përqendrimi i kripes
- B) Rritet
- C) Ulet
- D) Nuk ndryshon
- E) Varet nga temperatura e ujit

Pyetja 278

Në diabetin insipid janë tipike:

- A) Oliguria, hipernatremia, hiperosmolariteti plazmatik, hiperosmolariteti urinar
- B) Poliuria, hipernatremia, hiperosmolariteti plazmatik, hipoosmolariteti urinar
- C) Poliuria, hiponatremia, hipoosmolariteti plazmatik, hipoosmolariteti urinar
- D) Poliuria, hipernatremia, hipoosmolariteti plazmatik, hiperosmolariteti urinar
- E) Poliuria, hiponatremia, hiperosmolariteti plazmatik, hiperosmolariteti urinar

Pyetja 279

Një hipokaliemi shoqërohet me:

- A) Rritje të peristaltikës intestinale
- B) Subnivelim të segmentit ST
- C) Rritje të diapazonit të vales T
- D) Nauze
- E) Acidoze

Pyetja 280

Cili nga pohimet e mëposhtme mbi lengun cerebro spinal është i gabuar?

- A) Pësha e tij specifike duhet të jete mes 1010 e 1020
- B) Formose me një shpejtesi prej rreth 450 ml/dite
- C) Vëllimi total është 10 - 150 ml
- D) Është një leng i qarte pa ngjyre
- E) Ndodhet në ventrikujt cerebrale

Pyetja 281

Nepermjet cilit mekanizem FANS et ulin dhimbjen?

- A) Aktivizim te receptoreve te endorfines
- B) Bllokim te fosfolipazes
- C) Bllokim te ciklooksigenazes
- D) Bllokim te receptoreve kolinergjike pre sinaptike
- E) Rritje te prodhimit te leukotrieneve

Pyetja 282

Alkaloza metabolike mund te linde nga:

- A) Diabeti mielit i dekompensuar
- B) Fistul pankreatike
- C) Gjendje shocku
- D) Hipertiroidizem
- E) Te vjella te pakontrollueshme

Pyetja 283

Cili nga pohimet e mëposhtme mbi dikumaroliket nuk është i sakte?

- A) Veprimi kundërshtohet me vitamine C ne doza te larta
- B) Janë antagonize te vitamines K
- C) Veprimi zgjat per disa dite pas dozes se fundit
- D) Inhibojne sintezen hepaticke te faktorit vii
- E) Inhibojne sintezen e protei nave c dhe s

Pyetja 284

Sa oksigjen permban zakonisht ajri i ekspiruar

- A) Rreth 16%
- B) Rreth 10%
- C) Rreth 5%
- D) Rreth 25%
- E) Rreth 35%

Pyetja 285

Barbituriket ne sistemin nervor:

- A) Normalizojne konsumin e O<sub>2</sub>
- B) Rritin konsumin e O<sub>2</sub>
- C) Ulin konsumin e O<sub>2</sub>
- D) Induktojne hipokapni
- E) Lene te pandryshuar konsumin e O<sub>2</sub>

Pyetja 286

Cili nga këto diuretike kursen kaliumin?

- A) Klorotiazidi
- B) Acetazolamidi
- C) Furosemidi
- D) Spironolaktoni
- E) Acidi ektarinik

Pyetja 287

Një pneumotoraks hipertensiv dekomprimohet me një vigon te futur ne:

- A) Hapesira 5° interkostale ne hemiklaveare
- B) Ligamenti interkrikotiroidien
- C) Hapesira 5° interkostale ne aksilaren media
- D) Hapesira 2° -3° interkostale ne aksilaren media
- E) Hapesira 2° - 3° interkostale ne hemiklaveare

Pyetja 288

Një pH arterial > 7,6 me Pa CO<sub>2</sub> > 45 tregon per:

- A) Alkaloze metabolike
- B) Acidoze respiratore
- C) Acidoze metabolike
- D) Alkaloze respiratore
- E) Alkaloze mikse

Pyetja 289

Takikardia parosistike me bllok ne AV 2:1 është tipike ne mbidozen e:

- A) Lidokaines
- B) Verapamilit
- C) Digitalet
- D) Diltiazemit
- E) Adenozines

Pyetja 290

Çfare është kapaciteti funksional rezidual pulmonar?

- A) Vellimi korrent + vellimi rezidual
- B) Vellimi i rezerves inspiratore + vellimi rezidual
- C) Kapaciteti vital + vellimi rezidual
- D) Kapaciteti inspirator + vellimi rezidual
- E) Vellimi i rezerves respiratore + vellimi rezidual

Pyetja 291

Cili nga trajtimet e mëposhtme nuk është i pershtatshem ne hiperkaliemi?

- A) Perfuzion i ngadalte me CaCl<sub>2</sub>
- B) Perfuzion glukoze dhe insuline
- C) Perfuzion albumine
- D) Perfuzion i rezinave me shkembim jonik
- E) Alkalinizim

Pyetja 292

Ne alkaloze respiratore PaCO<sub>2</sub>:

- A) Rritet
- B) Nuk ndryshon
- C) Ulet
- D) Ka levizje te ndryshueshme
- E) Nuk vleresohet dot

Pyetja 293

Suksinilkolina metabolizohet nga:

- A) Kolinesterazat e verteta
- B) Hidroliza alkaline
- C) Katalaza
- D) M.A.O.
- E) Pseudokolinesteraza

Pyetja 294

Cili nga shenjat e mëposhtme mungon ne rast intoksikacioni me monoksid karboni

- A) Krize stenokardike
- B) Cefale
- C) Nauze dhe te vjella
- D) Cianoze
- E) Konvulsione

Pyetja 295

Ne shockun periferik, konstatimi i një rritjeje te shpejte te presionit venoz central tregon:

- A) Rikthim te ekuilibrit hemodinamik
- B) Insuficience kardiake kongjестive
- C) Hapjen e shunteve arterio venoze
- D) Rritje te gjitates kardiake
- E) Venokonstriksion

Pyetja 296

Me një masazh kardiak te jashtëm te kryer mirë arrihen vlera të fluksit koronar rreth:

- A) 5% të normës
- B) 75% të normës
- C) 50 % të normës
- D) 30% të normës
- E) 100% të normës

Pyetja 297

Cilën karakteristike duhet të ketë opiat i ideal?

- A) Prani të shumë metabolitëve aktivë
- B) Interferencë metabolike me ilaçe të tjera
- C) Thjeshtësi titrimi
- D) Akumulim të madh në indet adipoze
- E) Veprim të shkurtër

Pyetja 298

Injektimi intrakardiak i adrenalines:

- A) Është një procedurë e rrezikshme që duhet bërë vetëm në rast të jashtëzakonshme
- B) Duhet bërë bashkë me bikarbonat natriumi
- C) Duhet bërë vetëm në rrugë parasternale
- D) Ka indikacion në pacientë me hipotermi
- E) Është mënyra më e mirë për të rivendosur qarkullimin në një arrest kardiak

Pyetja 299

Me një masazh kardiak te jashtëm te kryer mirë arrihen vlera të gjatës kardiale rreth:

- A) 25% të normës
- B) 75% të normës
- C) 50% të normës
- D) 100% të normës
- E) 10% të normës

Pyetja 300

Në kushte të shocku septik hiperdinamik, reduktimi i menjehershëm i gjatës kardiale të shoqëruar me reduktim të presionit venoz central tregon për:

- A) Mbingarkesë të mikroqarkullimit
- B) Hapje të shuntëve arterio-venoze
- C) Shock hipodinamik si pasojë e reduktimit të masës qarkulluese
- D) Paralizë të arteriolave
- E) Insuficiencë kontraktive të miokardit

Pyetja 301

Vasodilatatori me i fuqishem cerebral është:

- A) Tiopentali
- B) Diazepami
- C) Hiperkapnia
- D) Droperidoli
- E) Hipokapnia

Pyetja 302

Me një masazh kardiak te jashtem te realizuar mirë kemi fluks cerebral rreth:

- A) 20% te normes
- B) 75% te normes
- C) 50% te normes
- D) 100% te normes
- E) 5% te normes

Pyetja 303

Një masazh kardiak i jashtem nevojitet kur:

- A) Pacienti nuk merr fryme
- B) Pacienti pakoshience dhe paraqet njolla cianotike ne ekstremitete
- C) Pacienti është midriatik, cianotik dhe pulsi central mungon
- D) Pulsi radial është zhdukur
- E) Pulsi femoral është zhdukur

Pyetja 304

Cili nga pohimet mbi barrieren hemato encefalike është i sakte:

- A) Është lirisht e pershkueshme nga jonet inorganike
- B) Është relativisht e pershkueshme nga gazet
- C) Është lirisht e pershkueshme nga uji
- D) Është lirisht e pershkueshme nga jonet bikarbonat
- E) Është lirisht e pershkueshme nga jonet e natriumit

Pyetja 305

Fraktura e baze se kafkes shfaqet me:

- A) Otorre dhe/ose otorragji
- B) Emfizeme sub kutane oksipitale
- C) Akufene e skotoma
- D) Ekimozë difuze te qafes dhe te rajonit supraklavear
- E) Hemorragji retinale

Pyetja 306

Ne një te rritur te shëndetshëm ne qetesi hedhja kardiake (litra / minute) është rreth:

- A) 1,2
- B) 2,9
- C) 8
- D) 5
- E) 12

Pyetja 307

Cardioversioni elektrik i sinkronizuar ka indikacion ne:

- A) Ne flutter atrial
- B) Fibrilacion elektrik
- C) Blllok a-v ii° te tipit mobitz ii
- D) Takikardi ventrikulare pa puls
- E) Ne disocimin elektromekanik

Pyetja 308

Sapo te diagnostikojme një takikardi ventrikulare pa puls:

- A) Bejme masazh te sinusit karotid
- B) Sillemi si ne një fibrilacion ventrikular
- C) I injektojme pacientit 10 mg/kg i.v. Ne bolus
- D) Vendosim një kanjule ne një vene te madhe
- E) I injektojme pazienti lidokaine 1,5 mg/kg i.v. Ne bolus

Pyetja 309

Pangopshmeria receptoriale e një ilaçi është:

- A) Kapaciteti i ilaçit per tu lidhur me receptorin e tij
- B) Ne proporcion te zhdrejte me efektin e ilaçit
- C) Shpejtesia me te Cilënlidhet ilaçi me receptorin e tij
- D) "onset" i i shpejte i veprimit
- E) Vështirësia e ilaçit per tu ndare nga receptori i tij

Pyetja 310

Hipoksia nga cianuri ndodh nga:

- A) Hipoventilimi central
- B) Interferimi ne transportin e O<sub>2</sub>
- C) Inibimi i zinxhirit respirator mitokondrial
- D) Ngadalsimi i fluksit kapilar
- E) Atelektazi pulmonare difuze

Pyetja 311

Cianoza shfaqet kur:

- A) Hemoglobinemia < 10 g/dl
- B) CoHb > 5 g/dl
- C) Hemoglobinemia < 7 g/dl
- D) PaO<sub>2</sub> = 70 mm hg
- E) Hb e reduktuar > 5 g/dl

Pyetja 312

Cila nga pohimet e mëposhtme nuk është e sakte ne lidhje me angina pectoris:

- A) Angina stabile induktohet nga ushtrimi fizik dhe ndalon ne pushim
- B) Angina stabel është prezente vazhdimisht me një dhimbje konstante
- C) Angina insta bel shfaqet dhe ne pushim
- D) Angina insta bel është me e vestire ne trajtim se sa ajo stabel
- E) Iskemia miokardiale është ne shumicen e rasteve asimptomatike

Pyetja 313

Ne cilat raste lidokaina përdoret si ilaçi i zgjedhur?

- A) Takikardi supraventrikulare parosistike me hipotension grav
- B) Flatter atrial
- C) Takikardi ventrikulare me torsion te majes
- D) Bllok A-V te grades III
- E) Takikardi ventrikulare me prani pulsi

Pyetja 314

Një pH arterial < 7,3 ma PaCO<sub>2</sub> < 35 flet per:

- A) Alkaloze mikse
- B) Acidoze respiratore
- C) Alkaloze metabolike
- D) Alkaloze respiratore
- E) Acidoze metabolike

Pyetja 315

Cilin nga shenjat apo simptomat e mëposhtme nuk e gjejme ne intoksikacionin nga morfina?

- A) Bradipne
- B) Hiperpireksi
- C) Oliguri
- D) Pupilla si koke gjilpere
- E) Flaciditet muskular

Pyetja 316

Presioni onkotik plazmatik është:

- A) 5 cm H<sub>2</sub>O



- B) 5 mm Hg
- C) 10 cm H<sub>2</sub>O
- D) 25 mm Hg
- E) 25 cm H<sub>2</sub>O

Pyetja 317

Kapaciteti funksional rezidual ne një subjekt normal 70 kg është rreth:

- A) 1 liter
- B) 1,5 liter
- C) 2,5 liter
- D) 2 liter
- E) 3,5 liter

Pyetja 318

Ne një lindje normale vaginale jo te komplikuar, humbja hematike është rreth:

- A) 500 ml
- B) 250 ml
- C) 750 ml
- D) 1000 ml
- E) 1250 ml

Pyetja 319

Ne kushte normale zgjatje e intervalit P-Q ne EKG e një te rrituri është:

- A) 0,24 - 0,30 sekonda
- B) 0,18 - 0,24 sekonda
- C) 0,06 - 0,08 sekonda
- D) 0,10 - 0,12 sekonda
- E) 0,12 - 0,20 sekonda

Pyetja 320

Hipoventilimi i shoqëruar me deprimim te qendres se frymemarrjes shkakton:

- A) Hipoksi dhe hiperkapni
- B) Hipoksi dhe hipokapni
- C) PO<sub>2</sub> normale dhe hiperkapni
- D) Reduktim te saturimit te hemoglobines
- E) Rritje te baze ekseit

Pyetja 321

Cili nga te meposhtmit është një pohim i sakte lidhur me FANS at:

- A) Aspirina inhibon agregimin trombocitar pasi inhibon ciklooksigenazen
- B) Inhibojne agregimin trombocitar pasi ulin nivelet plazmatike te Ca ++

- C) Rikthimi i një funksioni trombocitar normal kërkon të paktën 3 javë nga ndalimi i marrjes së aspirinës
- D) Doza antiagreguese e aspirinës është 20 mg/kg në ditë
- E) Të gjithë FANS at inhibojnë potencialisht agregimin trombocitar

#### Pyetja 322

Ne venat central presioni është zakonisht:

- A) Gjithmone pozitiv
- B) Pozitiv por mund të bëhet negativ gjatë ekspirimit
- C) Gjithmone negativ
- D) Pozitiv por mund të bëhet negativ gjatë inspirimit
- E) Gjithmone poshtë atmosferës

#### Pyetja 323

Me arrest kardiak kuptojmë:

- A) Zhdukjen e pulseve arteriale periferike
- B) Pushimin e aktivitetit mekanik të trurit
- C) Fibrilacionin ventricular
- D) Pushimin e aktivitetit mekanik të zemrës
- E) Disocimin elektromekanik

#### Pyetja 324

Dega interventrikulare posteriore del nga:

- A) Koronarja e majte
- B) Dega interventrikulare posteriore
- C) Arteria cirkumflekse
- D) Koronarja e djathtë
- E) Direkt nga aorta ascendente

#### Pyetja 325

Arsyeja më e shpëstëtë e sindromës kavale superiore mund të jetë:

- A) Karcinoma folikulare e tiroidës
- B) Tumori i timusit
- C) Neoplazia e lobit superior të djathtë pulmonar
- D) Fibroza mediastinike
- E) Struma e zhytur

#### Pyetja 326

Cila nga të mëposhtmet nuk është komponent i tetralogjisë Fallot?

- A) Hipertrofia e ventrikulit të djathtë
- B) Defekti i septumit interventrikular
- C) Dekstro pozimi i aortës
- D) Hipertrofia ventrikulare e majte

E) Stenoza infundibolare e arteries pulmonare

Pyetja 327

Ne një leter dalje nga spitali te një pacienti te operuar me by-pass aorto koronar , termi "on-pump" do te thote:

- A) Pacient i operuar me zemer qe rrihte
- B) Operacion gjate te cilit u nevojiti perdorimi i qarkullimit ekstra korporal
- C) Pacienti nuk ruante funksion te pompes ne fund te operacionit
- D) Qe gjate operacionit u be i nevojshem perdorimi i një kontra pulsatori aortal
- E) Nevoje gjate operacionit per te perdorur ventilim pulmonar me pompe te jashtme

Pyetja 328

Cila nga strukturat e mëposhtme, normalisht nuk është e vaskularizuar nga arteria koronare e djathte apo dege te saj?

- A) Atriumi i djathte
- B) Bordi i theksuar i i ventrikulit te djathte
- C) Pjesa posteriore e ventrikulit te majte
- D) Pjesa posteriore e septumit interventrikular
- E) Pjesa anteriore e septumit interventrikular

Pyetja 329

Per cilat vlera te zones dhe te ndryshimeve te presionit mesatar trans valvular (delta p) vendoset indikacion per trajtim kirurgjik te stenozes se valvole aortale?

- A) Zone < 0,5cm dhe delta P> 50 mmHg
- B) Zone < 1,5cm dhe delta P> 30 mmHg
- C) Zone < 2cm dhe delta P> 30 mmHg
- D) Zone < 1cm dhe delta P> 50 mmHg
- E) Zone < 2,5cm dhe delta P> 25 mmHg

Pyetja 330

Cili nga te meposhtmit nuk është një komplikacion i mundshem i zevendesimit te një valvule aortale

- A) Shfaqja e një blloku dege te majte
- B) Demtim i ostiumeve koronare
- C) Shfaqje e një blloku dege te djathte
- D) Endokardit infektiv
- E) Demtim i lembos anteriore mitrale

Pyetja 331

Sipas protokolleve, cila nga te mëposhtmet nuk është një indikacion per trajtim kirurgjik per sëmundje te valvules aortale.

- A) Ne parandalimin e vdekjes se papritur ne paciente asimptomatike me stenoze aortale grave

- B) Paciente me stenoze grave asimptomatike qe duhet te bejne by pass aorto coronar
- C) Paciente me stenoze grave qe duhet te bejne nderhyrje kirurgjike ne aorte apo ne valvula te tjera
- D) Paciente simptomatike me stenoze grave
- E) Ne paciente me stenoze te lehte por ku verehet një progresion i shpejte i sëmundjes

Pyetja 332

Pas implantimit te një valvule biologjike, terapi nga goja me warfarin:

- A) Nuk ka indikacion
- B) Ka indikacion dhe duhet te vazhdoje gjithë jeten
- C) Duhet marre per tre muaj
- D) Duhet marre per një muaj
- E) Duhet marre per 1 vit

Pyetja 333

Ulçerat diabetike janë kryesisht:

- A) Plantare
- B) Pre maleolare
- C) Dorsale te kembes
- D) Pretibiale
- E) Popliteale

Pyetja 334

Mes shkaqeve te dhimbjes ekstra abdominale qe ngjasojne me abdomenin akut cila është jo e sakte?

- A) Infarkti i miokardit
- B) Embolia pulmonare
- C) Perikarditi
- D) Pulmoniti
- E) Bronkiti azmatik

Pyetja 335

Leukocituria është patognomonike me:

- A) Neoplazi vezikale
- B) Kalkuloze urinare
- C) Trauma te rrugeve urinare
- D) Veshke patkua
- E) Infeksion urinar

Pyetja 336

Tipi me i shpështë i kalkulave urinare është:

- A) Urate
- B) Fosfate-magnezium

- C) Cistina
- D) Oksalate kalciumi
- E) Xantina

Pyetja 337

Flebedema ne fazat e saj fillestare karakterizohet nga:

- A) Edeme premaleolare e bute
- B) Edeme premaleolare e forte
- C) Inflamacion kronik premaleolar
- D) Diskromi premaleolare
- E) Ulçera kutane

Pyetja 338

Vena safena e vogel derdhet ne:

- A) Venen safena e madhe
- B) Venen femorale
- C) Vene iliake interne
- D) Venen poplitea
- E) Venen iliake eksterne

Pyetja 339

Çfare është një cistoskop?

- A) Instrument per te pare prostaten
- B) Instrument per te pare uterusin
- C) Instrument per te pare ureterin
- D) Instrument per te pare fshikezen e urines
- E) Instrument per te pare veshken

Pyetja 340

Ne aneurizmen e aortes abdominale cili nga pohimet e mëposhtme është i sakte?

- A) Vendosja me e shpësthtë e aneurizmes është ne 90 % te rasteve poshte arterieve renale
- B) Vendosja me e shpësthtë e aneurizmes është ne 90% te rasteve mbi arteriet renale.
- C) Ne paziente me rupture te aneurizmes reziku i vedekjes para se te mberrijne ne spital është 70 - 80 %
- D) Bakteret janë përgjegjës per rreth 50 % te aneurizmave
- E) Vdekshmeria ne pazientet qe i nenshtrohen nderhyrjes se menjehershme riparuese është 80 - 90 %.

Pyetja 341

Vena safena e madhe e ka origjine:

- A) Posteriorisht maleolit intern
- B) Anteriorisht maleolit lateral

- C) Anteriorisht maleolit intern
- D) Posteriorisht maleolit lateral
- E) Ne nivelin e perforueses se hunter it.

Pyetja 342

Neoplazia me e shpështë e fshikezes se urines është:

- A) Karcinoma me qeliza te tranzicionit
- B) Adenocarcinoma
- C) Sarkoma
- D) Limfoma
- E) Lejomiosarkoma

Pyetja 343

Arsyeja me e shpështë e një versamenti pleural hemorragjik është:

- A) Tuberkulozi
- B) Pulmoniti
- C) Neoplazia
- D) Mikoza
- E) Azma

Pyetja 344

Cili prej ekzaminimeve diagnostike ndihmon më shumë se të tjerët në vendosjen e diagnozës së kancerit gastrik:

- A) Rx i aparatit tretës
- B) Ezofagogastroskopi me biopsi
- C) TAC
- D) Ekzaminimi citologjik i lëngut gastrik
- E) Echografia

Pyetja 345

Ndërhyrja kirurgjikale, ku lidhet vena spermatike është e sugjeruar në terapinë e:

- A) Sëmundja e La Peyronie (Induratio penis plastica)
- B) Torsioni i funikulit
- C) Varikocele
- D) Criptorchidisis
- E) Hydrocela komunikuese

Pyetja 346

Cila prej këtyre manovrave shkakton dhimbje, kur kemi të bëjmë me kolecistit?

- A) Murphy
- B) Blumberg
- C) Giordano
- D) Mc Burney
- E) Të gjitha përgjigjet

Pyetja 347

Trajtimi i menjëhershëm i pneumotaraksit hipertensiv jo traumatik bazohet në:

- A) Torakotomi
- B) Intubim
- C) Drenimin pleural
- D) Terapi me antibiotikë
- E) Regjim shtrati absolut

Pyetja 348

Cilat janë simptomat më të zakonshme të kancerit të vezikës urinare?

- A) Infeksionet urinare periodike e të vazhdueshme
- B) Inkontinencë urinare
- C) Hematuri
- D) Polakiuri
- E) Dizuri

Pyetja 349

Cili prej vlerësimeve të mëposhtëm është parësor, kur kemi të bëjmë me një pacient të politraumatizuar?

- A) Kontrolli i gjëndjes së ndërgjegjes
- B) Kontrolli i frymëmarrjes
- C) Kontrolli i lirshmërisë së rrugëve ajrore
- D) Kontrolli i aktivitetit kardiocirculator
- E) Kontrolli i presionit arterial

Pyetja 350

Carcinoma e mamelës klasifikohet si T2 nëse dimensionet e saj janë:

- A) më të mëdha se 1 cm, por më të vogla se 2,5 cm
- B) më të mëdha se 2 cm, por më të vogla se 3,1 cm
- C) më të mëdha se 2 cm, por më të vogla se 5,1 cm
- D) midis 3 e 5 cm
- E) midis 3 e 6 cm

Pyetja 351

Konsiderohet si indikacion për trasplant hepari tek të rriturit:

- A) Hepatosteatoza akute e shtatzanisë
- B) Cirroza biliare primitive
- C) Cholangiti sklerozant
- D) Të gjitha përgjigjet
- E) Asnjëra prej përgjigjeve

Pyetja 352

Cili është shkaku më i shpeshtë i ikterit obstruktiv:

- A) Shtypjet e jashtme
- B) Lezionet jatrogjene
- C) Kanceri hepatic
- D) Kanceri i kokës së pankreasit
- E) Inflamacion i rrugëve biliare extrahepatike

Pyetja 353

Cili prej organeve preket më shpesh në traumat e mbyllura të abdomenit?

- A) Hepar
- B) Lien (shpretka)
- C) Stomaku
- D) Vezika urinare
- E) Pankreasi

Pyetja 354

Në një pacient me obstrukcion neoplazik të koledokut,olecista është:

- A) asnjë herë e tendosur
- B) rrallë herë e tendosur
- C) shpesh herë e tendosur
- D) nuk është e palpueshme asnjë herë
- E) e përjashtuar

Pyetja 355

Trajtimi i pneumotoraksit hipertensiv është:

- A) Torakotomia eksploruese
- B) Dhënia e oksigjenit
- C) Pritje
- D) Drenimi në aspirim



E) Intubimi

Pyetja 356

Cili prej tumorëve malinj të traktit intestinal është më i shpeshti te moshat e reja?

- A) Limfosarkoma
- B) Carcinoidi
- C) Carcinoma e kolonit
- D) Neuroblastoma
- E) Rabdomiosarkoma

Pyetja 357

Carcinoma e mamelës klasifikohet si T2 nëse dimensionet e saj janë:

- A) më të mëdha se 1 cm, por më të vogla se 2,5 cm
- B) më të mëdha se 2 cm, por më të vogla se 3,1 cm
- C) më të mëdha se 2 cm, por më të vogla se 5,1 cm
- D) midis 3 e 5 cm
- E) midis 3 e 6 cm

Pyetja 358

Metastazat e kancerit të prostatës prekin më shpesh:

- A) Kockat e baçinit dhe vertebrat e fundit lumbare
- B) Heparin
- C) Trurin
- D) Pulmonet
- E) Në asnjë prej këtyre organeve

Pyetja 359

Pankreatiti akut shpesh herë shoqërohet me:

- A) Ezofagit nga refluksi
- B) Colelitiazë
- C) Diverticulit
- D) Ulçera gastrike
- E) Colangiti sklerozant

Pyetja 360

Cila prej shenjave është më e shpeshta në kancerin e vezikës urinare?

- A) Cistopieliti i përsëritur
- B) Mbajtja akute e urinës (ritension)
- C) Hematuri

- D) Polakiuri
- E) Stranguri

Pyetja 361

Një mashkull 72 vjeç shfaq dhimbje të forta të shpinës, një masë abdominale pulsuese dhe hipotension. Për cilën prej diagnozave mund të dyshojmë:

- A) Infarkt intestinal
- B) Aneurizëm disekante të aortës
- C) Rupturë (çarje) ose fisuracion të aneurizmës së aortës abdominale
- D) Sindroma e Leriche
- E) Aneurizëm e arteries hepatike

Pyetja 362

Për diagnozën e apendisitit akut është më e rëndësishmja:

- A) Echografia abdominale
- B) TC
- C) Rtg e traktit tretës me vlerësim të zorrës së hollë
- D) Clisma opake
- E) Anamneza dhe ekzaminimi objektiv

Pyetja 363

Trajtimi i duhur kirurgjikal për neoplazinë e kolonit ashendent është:

- A) Hemikolektomia e djathtë
- B) Hemikolektomia e majtë
- C) Rezekcioni ileus- ciecal
- D) Rezekcioni segmentar
- E) Kolektomia subtotale

Pyetja 364

Angina abdominale shkaktohet nga:

- A) Neoplazi të kolonit
- B) Hemorragji intestinale
- C) Divertikulit
- D) Iskemia kronike intestinale
- E) Ulçera peptike post- anastomozës

Pyetja 365

Torakotomia urgjente është e indikuar tek:

- A) Kontuzioni (shembja) pulmonare
- B) Versamenti pleural bilateral
- C) Hemotoraksi i furnizuar
- D) Pneumotoraksi si valvul
- E) Empiema

Pyetja 366

Janë komplikanca të kolecistitit, përveç:

- A) Pankreatiti
- B) Peritoniti
- C) Fistula biliare
- D) Perforimi
- E) Tromboflebiti migrues

Pyetja 367

Cilin prej ekzaminimeve do t'i bëjë nje pacienti që ka paraqitur hematemesis?

- A) Bronkoskopi
- B) Rtg të traktit tretës
- C) Ezofago-gastro-duodeno-skopi
- D) Rtg direkt të abdomenit
- E) Clisma opake

Pyetja 368

Tiroidektomia totale është ndërhyrja e përshtatshme në:

- A) Struma multinodulare
- B) Ca midular
- C) Ca folikular
- D) Asnjëra prej këtyre patologjive
- E) Të gjitha patologjitë e përmendura

Pyetja 369

Cilin ekzaminim strumental zgjedh, nëse dyshon për litiazë të kolecistës?

- A) Rtg të rrugëve të para të traktit tretës
- B) Manometri duodenale
- C) Echografi hepato-biliare
- D) Kolecistografi
- E) Rtg direkt të abdomenit

Pyetja 370

Trajtimi parësor i embolisë pulmonare është:

- A) Lidhje të venës kava inferiore
- B) Trombektomi
- C) Embolektomi pulmonare
- D) Antikoagulantë e fibrinolitikë
- E) Antibiotikë

Pyetja 371

Cilët segmentë intestinalë mund të prekë sëmundja e Crohn:

- A) Ileusin
- B) Kolonin
- C) Ezofagun
- D) Stomakun
- E) Te gjithë traktin tretës

Pyetja 372

Cili është trajtimi i pneumotoraksit hipertensiv?

- A) Ndërhyrja kirurgjikale me urgjencë
- B) Aspirimi
- C) Aspirimi dhe drenimi
- D) Plumbimi ekstrapleural
- E) Asnjëra prej përgjigjeve

Pyetja 373

Shoku anafilaktik karakterizohet nga:

- A) Hipotension, bradikardi, Presion venoz central (PVC) të reduktuar
- B) Hipotension, takikardi, Presion venoz central (PVC) të rritur
- C) Hipotension, takikardi, Presion venoz central (PVC) të reduktuar
- D) Hipotension, bradikardi, Presion venoz central (PVC) të rritur
- E) Hipotension, bradikardi, oligoanuri

Pyetja 374

Me dizuri kuptohet:

- A) Vështirësi gjatë urinimit
- B) Dhimbje gjatë urinimit
- C) Rritje të numrit të herëve të urinimit
- D) Prania e leukociteve në urinë
- E) Prania e pusit në urinë

Pyetja 375

Histologjikisht tumoret e prostatës janë:

- A) Carcinoma me qeliza tranzitore
- B) Adenocarcinoma
- C) Carcinoma skuamoqelizore
- D) Leiomiosarkoma
- E) Limfoma

Pyetja 376

Prerja në linjën mediane ombelikale-pubike, nën shtresat e lekurës dhe nënlëkurës përfshin:

- A) Pjesën e brendshme të muskujve abdominalë rektis
- B) Linjën alba
- C) Fashën e muskujve abdominalë rektis
- D) Muskuli rekti, oblik të madh e të vogël
- E) Muskuli i madh e i vogël oblik dhe trasvers

Pyetja 377

Cilët janë receptorët që përfshihen më shumë në hiperplazinë e prostatës:

- A) Alfa 1-adrenergjikë
- B) Beta 2- adrenergjikë
- C) Serotoninergjikë
- D) Kolinergjikët
- E) Dopaminergjikët

Pyetja 378

Cila prej këtyre gjendjeve nuk i shoqërohet nefrolitiazës dhe hiperkalçiuorisë?

- A) Hiperkalçiuuria idiopatike
- B) Hipoparatiroidizmi
- C) Vitamina D me tepicë
- D) Sarkoidoza
- E) Sëmundja e Paget

Pyetja 379

Echografia renale dhe pielografia endovenoze e kryer tek një mashkull 65 vjeç, që u vlerësua për inkontinencën urinare, rezultoi me hidronefrozë bilaterale. Cila prej gjendjeve të mëposhtme është më e mundshme për të shkaktuar këtë komplikim?

- A) Sëmundja e Alzheimer
- B) Ndërhyrje kirurgjikale paraprake
- C) Inkontinencë nga stresi
- D) Hiperplazi e prostatës
- E) Rritje e aktivitetit të muskulit detruzor në varësi të moshës

Pyetja 380

Cila prej gjendjeve të mëposhtme mund të jetë komplikancë e hipertrofisë beninje të prostatës:

- A) Kalkuj në vezikën urinare
- B) Ritencioni akut urinar
- C) Divertikuloza e vezikës urinare
- D) Të gjitha përgjigjet
- E) Stranguri

Pyetja 381

Çfarë është devijimi urinar:

- A) Vendosja në menyrë definitive e ureterëve në lëkurë
- B) Ndërhyrja e kryer për të korigjuar kapacitetin e humbur të vezikës urinare
- C) Anastomoza kirurgjikale uretero-uretrale
- D) Drenimi i vezikës nëpërmjet kateterit
- E) Modifikimi kirurgjikal i rrugëve normale të urinës në mënyrë të përkohshme ose definitive

Pyetja 382

Konsiderohet bakteriuri, nëse numri i mikroorganizmave për ml urine është:

- A) më e madhe se 100.000
- B) më e vogël se 50.000
- C) midis 10.000 dhe 50.000
- D) midis 5.000 dhe 10.000
- E) 1.000

Pyetja 383

Spermatorrea është:

- A) Lëshimi i likidit seminal pa ereksion
- B) Lëshimi i likidit seminal i përzier me gjak
- C) Lëshimi i likidit seminal i përzier me pus
- D) Lëshimi i likidit seminal me ereksion
- E) Asnjëra nga përgjigjet

Pyetja 384

Hidronefrozë do të thotë:

- A) Përthithje të urinës nga tubujt kolektorë
- B) Prania e urinës purulente në kavitetin ampulo-kalicien të zgjeruar
- C) Stazë urinare, me rrjedhje zgjerim të kavitetit ampulo-kaliciene
- D) Stazë urinare vetëm në vezikën urinare

E) Dëmtim i përgjithshëm i parenkimës renale dhe rrugëve ekskretore

Pyetja 385

Carcinoma e prostatës jep metastaza më shpesh në:

- A) Skelet
- B) Gjendra mbiveshkore
- C) Hepar
- D) Pulmon
- E) Tru

Pyetja 386

Cili prej ekzaminimeve klinike është i domosdoshëm për të përcaktuar diagnozën e dizfunktionit erektil?

- A) Arteriografia selektive
- B) Vezikolodeferentografia
- C) Nuk janë të nevojshëm ekzaminimet klinike
- D) Profilin glicemik, lipidik dhe testosteroneminë
- E) Teste psikometrike

Pyetja 387

Sfinteri vezikal i jashtëm është i përbërë nga:

- A) Muskulaturë e vijëzuar
- B) Muskulaturë e lëmuar
- C) Muskulaturë mikse
- D) Ind fibroz
- E) Ind fibro-adipoz

Pyetja 388

Hemorragjia që e ka pikënisjen nga uretra nën diafragmën shkakton:

- A) Uretrorragji
- B) Hematuri totale
- C) Hematuri fillestare
- D) Hematuri terminale
- E) Mikrohematuri

Pyetja 389

Shkaku më i shpeshtë i sindromës kavale superiore mund të jetë:

- A) Neoplazi e lobit superior të djathtë të pulmonit
- B) Tumori i timusit
- C) Carcinoma fulikulare e tiroides

- D) Fibroza e mediastinit
- E) Struma e zhytyr retrosternale

Pyetja 390

Cila valvul kardiake preket më shpesh nga sëmundja reumatike?

- A) Aortale
- B) Mitrale
- C) Pulmonare
- D) Trikuspidale
- E) Të gjitha valvulat preken në menyrë të njëjtë

Pyetja 391

Gjatë ndërhyrjet kardiokirurgjikale të by-passit koronar, perfuzioni me eritrocite të përqëndruara është:

- A) Gjithnjë i nevojshëm
- B) Asnjë herë i nevojshëm
- C) Kryhet gjithnjë nëse pacienti ka probleme me koagulimin e gjakut
- D) Gjithnjë i nevojshëm, në rast ndërhyrjesh ku bëhet qarkullimi ekstrakorpor
- E) Asnjëra prej përgjigjeve

Pyetja 392

Flebo-edema në fazën fillestare karakterizohet nga:

- A) Edema e fortë premaleolare
- B) Edema e butë premaleolare
- C) Inflamim kronik premaleolare
- D) Dizkromi premaleolare
- E) Ulçera të lëkurës

Pyetja 393

Vena e madhe safena e merr origjinën:

- A) Posteriorisht pjesës së brendëshme të maleolit
- B) Anteriorisht pjesës së brendëshme të maleolit
- C) Anteriorisht pjesës laterale të maleolit
- D) Posteriorisht pjesës laterale të maleolit
- E) Në nivelin e depërtueses së Hunter

Pyetja 394

Shkaku më shumë i mundshëm i një versamenti pleural hemorragjik është:

- A) Tuberkulozi
- B) Pulmoniti



- C) Mykoza
- D) Neoplazi
- E) Astma

Pyetja 395

Arteria femurale e ka origjinën nga:

- A) Aorta torakale
- B) Arteria iliake e brendëshme
- C) Arteria iliake e jashtme
- D) Femuralja sipërfaqësore
- E) Femuralja e thellë

Pyetja 396

Çfarë terapie urgjente do të bëje në një bllok A-V të plotë?

- A) Lidokainë bolus
- B) Defibrilim elektrik
- C) Vendosje të pacemaker transcutan
- D) Kardioversionin elektrik
- E) Të gjitha

Pyetja 397

Dega interventrikulare posteriore merr origjinë nga:

- A) Koronaria e majtë
- B) Koronaria e djathtë
- C) Arteria cirkumflekse
- D) Dega interventrikulare posteriore
- E) Direkt nga aorta ashendente

Pyetja 398

Kush nuk është një komplikancë e mundshme gjatë ndërhyrjes për zëvendësimin e valvulës së aortës?

- A) Fillimi i një blloku të degës së majtë
- B) Dëmtim të pjesës fillestare të koronareve
- C) Dëmtim të fletës anteriore mitrale
- D) Endokarditi infektiv
- E) Fillimi i një blloku të degës së djathtë

Pyetja 399

Cila është simptoma më e shpeshtë e hernies diskale lumbare?

- A) Lumbalgjia
- B) Gonalgjia
- C) Skiatalgjia
- D) Cervikalgjia
- E) Brakialgjia

Pyetja 400

Çfarë është sëmundja e Dupuytren?

- A) Tenosinovit stenozues i veshjes së tendinave fleksore të gishtave
- B) Sinostozë kongenitale radioulnare
- C) Retraksion të aponeurozës së pëllëmbës (palmare)
- D) Nekrozë aseptike të skafoidit
- E) Pseudo-artrozë të skafoidit

Pyetja 401

Tek pacientët e moshuar, cila është terapia përzgjedhëse në rastin e frakturave mediale të qafës së femurit?

- A) Me allçi
- B) Osteosintezë
- C) Zëvendësim me protezë
- D) Asnjë trajtim
- E) Heqjen e kokës së femurit

Pyetja 402

Të gjitha janë shenja radiografike të artrozës, përve:

- A) Reduktim të hapësirës artikulare
- B) Prania e osteofiteve
- C) Prania e geoidëve
- D) Profili artikular i çrregullt
- E) Zgjerim të hapësirës artikulare

Pyetja 403

Cili prej ekzaminimeve instrumentale mundëson realizimin e diagnozës së hernies së diskut:

- A) Echografia
- B) Arteriografia
- C) Termografia
- D) TAC/RMN
- E) Radiografia

Pyetja 404

Cila prej tendinave nuk kalon në kanal in karpal (këçit të dorës):

- A) Radiali fleksor i këçit
- B) Fleksor i thellë i gishtave
- C) Fleksor sipërfaqësor i gishtave
- D) Ulnari fleksor i këçit
- E) Fleksor i gjatë i gishtit të madh

Pyetja 405

Manovra e Lasëgue është pozitive kur:

- A) Kur përfshihet nervi skiatik
- B) Neoplazi të kolonës vertebrale
- C) Si rezultat i poliomyelitit
- D) Tek miopati të
- E) Në distorsionin vertebral

Pyetja 406

Morbusi i Paget:

- A) Rrallëherë është polioistik
- B) Prek kryesisht meshkujt
- C) Shfaqet në dekadën e dytë të jetës
- D) Ka një zhvillim të shpejtë
- E) Karakterizohet nga rritja e turn-overit kockor

Pyetja 407

"Mano Cadente" (dora që bie) shkaktohet nga:

- A) Paraliza e nervit radial
- B) Paraliza e nervit median
- C) Paraliza e nervit ulnar
- D) Paraliza e nervit muskulokutan
- E) Paraliza e nervit aksilar

Pyetja 408

Nga cilat vertebra merr origjinën nervi skiatik:

- A) L5-S1
- B) L2-L3

- C) S2-S3
- D) L4-L5-S1-S2
- E) L3-L4-L5-S1

Pyetja 409

Skolioza:

- A) Eshtë devijim i shtyllës kurrizore në planin sagital
- B) Eshtë idiopatik në 70% të rasteve
- C) Eshtë shpesh kongenital
- D) Përcakton eterometri të gjymtyrëve të poshtme
- E) Eshtë shpesh sekondar

Pyetja 410

Komplikimet nervore më të shpeshta në frakturat e olekranit:

- A) Dëmtim të ulnarit
- B) Dëmtim të medianit
- C) Dëmtim të radialit
- D) Dëmtim të aksilarit
- E) Të muskulit kutan

Pyetja 411

Hernia e diskut përbëhet nga:

- A) Unaza fibrotike
- B) Bërthama pulpoze
- C) Nga i gjithë disku
- D) Nga disku+ ligamentin gjatësor anterior
- E) Nga disku, ligamentin gjatësor anterior, ligamentin gjatësor posterior

Pyetja 412

Cila strukturë përfshihet në sindromën e tunelit karpal?

- A) Nervi ulnar
- B) Nervi median
- C) Arteria radiale
- D) Nervi radial
- E) Tendina ekstensore ulnare e kyçit

Pyetja 413

Rakitizmi varet nga:

- A) Mungesa e vitaminës D

- B) Mungesa e vitaminës E
- C) Defiçiti i kalçitoninës
- D) Mungesa e vitaminës A
- E) Asnjëra prej përgjigjeve

Pyetja 414

Cila kockë e pëllëmbës së dorës bën frakturë më shpesh?

- A) Semilunarja
- B) Piramidalja
- C) Trapezoidi
- D) Kapitati
- E) Skafoidi

Pyetja 415

Fraktura bimalolare e paqëndrueshme ka nevojë për:

- A) Bendazh funksional
- B) Stabilizim kirurgjikal
- C) Allçi në formën e kepucës
- D) Allçi nga kofsha deri tek këmba
- E) Manipulime

Pyetja 416

Fraktura e Colles përfshin:

- A) Ekstremitetin distal të tibias
- B) Metafizën radiale distale
- C) Kapitulumin e radialit
- D) Oleokrani
- E) Kokën e omerit

Pyetja 417

Osteoporoza është një faktor rrishtës për:

- A) Artrozë
- B) Infeksione
- C) Tumore të kockës
- D) Fraktura
- E) Insufiçencë renale

Pyetja 418

Artikulationi që përfshihet më shpesh nga luksacioni është:

- A) Anka (kocka e baçinit)
- B) Gjuri

- C) Kavalja
- D) Shpatulla
- E) Radio-karpal

Pyetja 419

Të gjithë janë komponentë të tetralogjisë së Fallot, përveç:

- A) Hipertrofi të ventrikulit të majtë
- B) Difekt të septumit interventrikular
- C) Pozicionim në anë të djathtë të aortës
- D) Hipertrofi të ventrikulit të djathtë
- E) Stenozë infundibulare (hinkore) të arteries pulmonare

Pyetja 420

Cili është shkaku i dizfonisë që shfaqet me zërin bitonal?

- A) Paraliza e një korde vokale
- B) Kollë e vazhdueshme për periudha të gjata
- C) Komprimim të trakesë
- D) Obstruksion të laringut
- E) Devijim të trakesë dhe ezofagut

Pyetja 421

Me spina bifida kuptohet:

- A) Keqformim kongenital i tubit nervor
- B) Agjenezi të trurit të vogël
- C) Mungesxe të trupit kalloz
- D) Mungesë të palcës kurrizore
- E) Tumor temporal

Pyetja 422

Apendisiti akut tek një fëmijë nën 5 vjeç, mund të shfaqë:

- A) Asnjëherë komplikime
- B) Komplikime të shpeshta
- C) Asnjë simptomë
- D) Komplikime vetëm në gjininë femërore
- E) Komplikime vetëm në gjininë mashkullore

Pyetja 423

Cila prej situatave të mëposhtme nuk është shkaku i cianozës tek një i sapolindur:

- A) Policitemia

- B) Sepsi
- C) Vazhdueshmëria e qarkullimit fetal
- D) Kanali atrioventrikular i plotë
- E) Tetralogjia e Fallot

Pyetja 424

Cilat janë rreziqet e kriptorkidizmit të pa operuar?

- A) Dizfunksioni erektil
- B) Degjenerimi neoplastik
- C) Orkiti
- D) Epididimit
- E) Hipogonadizëm hipogonadotrop

Pyetja 425

Një fëmijë 2 vjeçar, shfaq episode periodike e të rënda të dhimbjes së tipit kolik, të shoqëruara dhe me të qara e të vjella. Feçet janë me gjak të kuq. Në palpimin në epigastër vihet re një masë ovale. Cila prej diagnozave është më shumë e mundshme?

- A) Divertikuli i Meckel
- B) Stenoza kongenitale e pilorit
- C) Ileus nga mekonium
- D) Invaginimi
- E) Enterokoliti nekrotizant

Pyetja 426

Konsiderohet si "gold standard" për të diagnostikuar sëmundjen e Hirschsprung:

- A) Biopsia rektale
- B) Manometria anorektale
- C) Klizma opake
- D) Echografia abdominale
- E) Ph-metria

Pyetja 427

Ndërhyrja më e përshtatshme për trajtimin e stenozes kongenitale të pilorit është:

- A) Gatsrodigiunostomia
- B) Gastroduodenostomia
- C) Piloroplastika ekstramukozë
- D) Antrektomia
- E) Rezekcioni gastro-duodenal

Pyetja 428

Tek një i sapolindur me fibrozë cistike, episodi i obstrukcionit intestinal shkaktohet me shumë mundësi nga:

- A) Atrezi e duodenit
- B) Invaginimi
- C) Ileus nga mekonium
- D) Mungesën e perforimit anal
- E) Malrotacionin intestinal

Pyetja 429

Sa është vlera normale e saturimit të O<sub>2</sub> në gjakun venoz të arteries pulmonare?

- A) 92%
- B) 75%
- C) 60%
- D) 30%
- E) 45%

Pyetja 430

Sa është osmolariteti në solucionin fiziologjik (NaCl në ujë):

- A) 145mOsm/l
- B) 175 mOsm/l
- C) 250 mOsm/l
- D) 300 mOsm/l
- E) 400 mOsm/l

Pyetja 431

Në cilën prej gjendjeve të mëposhtme, bëhet ventilimi artificial?

- A) Rritje e PaCO<sub>2</sub>
- B) Ulje i PaO<sub>2</sub>
- C) Rritje e pH
- D) Ulje e pH
- E) Të gjitha gjëndjet

Pyetja 432

Sa oksigjen ka normalisht në ajrin e ekspiruar?

- A) Përafërsisht 5%
- B) Përafërsisht 10%
- C) Përafërsisht 16%
- D) Përafërsisht 25%
- E) Përafërsisht 35%



Pyetja 433

Barbiturët, në nivelin e sistemit nervor qëndror:

- A) Ulin konsumin e O<sub>2</sub>
- B) Rrisin konsumin e O<sub>2</sub>
- C) Normalizojnë konsumin e O<sub>2</sub>
- D) Induktojnë hipokapni
- E) Nuk ndikojnë në konsumin e O<sub>2</sub>

Pyetja 434

Cili prej diuretikëve ruan kaliumin?

- A) Spironolactoni
- B) Acetazolamidi
- C) Furosemidi
- D) Clortiazidi
- E) Acidi etakrinik

Pyetja 435

Cili prej faktorëve ul probabilitetin e suksesit të defibrilimit elektrik:

- A) Hipotermia
- B) Acidoza
- C) Hipoksia
- D) Rezistenca e rritur e toraksit
- E) Të gjitha

Pyetja 436

pH arterial >7,6 dhe PaCO<sub>2</sub> >45 sugjerojnë për:

- A) Acidozë metabolike
- B) Acidozë respiratore
- C) Alkalozë metabolike
- D) Alkalozë respiratore
- E) Alkalozë mikse

Pyetja 437

Takikardia parosistike me bllok AV 2:1 është tipike nga mbidozimi me:

- A) Lidokainë
- B) Digital
- C) Verapamil
- D) Diltiazem
- E) Adenozinë

Pyetja 438

Në alkalozën respiratore, PCO<sub>2</sub>:

- A) Rritet
- B) Ulet
- C) Nuk ndryshon
- D) Varion në kohë
- E) Nuk përcaktohet

Pyetja 439

Tek enfizema senile, insuficienca respiratore shoqërohet me:

- A) Hipersekrecion bronkial
- B) Djersitje
- C) Takikardi dhe hipertension
- D) Kongjestion të lëkurës dhe cianozë
- E) Të gjitha përgjigjet

Pyetja 440

Pneumotoraksi i hapur shkaktohet nga:

- A) Sëmundjet pleuro-pulmonare
- B) Komunikimi i vazhdueshëm midis kavitetit pleural dhe ambientit të jashtëm
- C) Ruptura (çarja) e ndonjë bule subpleurale
- D) Fistulizimi bronkial
- E) Embolia pulmonare

Pyetja 441

Cili është shkaku më i zakonshëm i embolisë arteriale?

- A) Prania e aneurizmës së aortës
- B) Fibrilacioni atrial
- C) Prania e disa pllakave ateromatoze të ulçeruara
- D) Përdorimi i mjekimit me kimioterapikë
- E) Prania e sindromit të antittrupave antifosfolipidë

Pyetja 442

Triada klinike tipike për hipertensionin endokranial është:

- A) Cefale, të vjella, edemë të papilës
- B) Cefale dhe humbje të ndërgjegjes
- C) Dhimbje të qafës dhe marrje mendsh
- D) Temperaturë
- E) Skotoma dhe ulje të shikimit

Pyetja 443

Nje grua 42 vjecare shtrohet ne urgjence me nje dhimbje te forta barku, te vjella, me distension abdominal dhe me arrest te feceve me gaz. Anamneza eshte pergjithesisht normale pervec nje operacioni qe ka bere 12 vjet me pare. I behet radiografi direkte a

- A) Adenokarcinome
- B) Morbus Crohn
- C) Sd aderenciale
- D) Ileus biliar
- E) Kolit ulceroz

Pyetja 444

Trajtimi i metastazave epatike eshte i mundur, vetem kur:

- A) Tumori primitiv eshte < 3 cm
- B) Numri i metastazave eshte < 2
- C) Madhesia e metastazave nuk kalon 3 cm
- D) Te gjitha

Pyetja 445

Linfonodi Sentinella :

- A) Ai qe zbulohet i pari gjate vizites se pacientit
- B) Eshte me afer tumorit
- C) Eshte metastaze
- D) Eshte noduli i pare ku drenohet linfa peritumorale
- E) Asnjera

Pyetja 446

Quhet hernie interne:

- A) Dislokimi abnormal i omentumit ne reces natural ose neoformacione te hapesires peritoneale
- B) Dislokimi abnormal i nje ose me shume organeve ne reces natural ose neoformacione te hapesires peritoneale
- C) Prezenca e hernies ne stad inicial
- D) Prezenca e nje laparoccele ne stad inicial
- E) Asnjera

Pyetja 447

Lobi i Spigelios ose lobi caudate i heparit, korrespondon me:

- A) Segmentin e I
- B) Segmentin e II
- C) Segmentin e VI
- D) Segmentin e VII
- E) Asnjera

Pyetja 448

Konsiderohet indikacion per trapiant te heparit tek te rriturit:

- A) Epatosteatoze akute gjate shtatezanise
- B) Cirroze biliare primitive
- C) Kolangite sklerozante
- D) Te gjitha

Pyetja 449

Konsiderohet kunderindikacion per kateterizimin venoz central:

- A) Enfizema polmonare
- B) Pneumotoraksi
- C) Linfoadenopatia sopraklaveare
- D) Asnjera

Pyetja 450

Cili eshte ilaci kryesor ne trajtimin neoadjuvant te karcinomes se rektumit:

- A) Mitomicina-C
- B) 5-fluoruracili
- C) Adriamicina
- D) VP-16
- E) Asnjera

Pyetja 451

CVL -ja nuk duhet bere kur ka:

- A) Obezitet
- B) Intervente kirurgjikale te meparshme
- C) Hernie epigastrike te zmadhuar
- D) Asnjera

Pyetja 452

Konsiderohet komplikance teknike e ushqyerjes parenterale totale (NPT):

- A) Pneumotoraksi
- B) Pozicionimi i keq i kateterit
- C) Shpimi i arteries suklavia
- D) Pneumotoraksi, pozicionimi i keq i kateterit, shpimi i arteries suklavia
- E) Asnjera

Pyetja 453

Nje femije me veshtiresi ne frymemarrje diagnostikohet me:

- A) Gjak komplet
- B) Emogaz
- C) Ekzaminim i espektoratit
- D) Elektrokardiogram
- E) RX toraksit

Pyetja 454

Konsiderohet pike e dhimbshme e apendiksit të inflamuar:

- A) Pika Mc Burney
- B) Pika Morris
- C) Pika Munro
- D) Pika Lanz
- E) Te gjitha

Pyetja 455

Ekzaminimet e bera per te diagnostikuar nje okluzion intestinal jane:

- A) Ekografi abdomenit
- B) Radiografi direkte e abdomenit
- C) Skaner
- D) Laparoscopi
- E) Asnjera

Pyetja 456

Funksioni i sfinkterit ezofageal inferior, eshte:

- A) Te pengoje refluxin e materialit gastrik ne ezofag
- B) Te ngadalsoje kalimin e ushqimit
- C) Te pershpejtoje kalimin e ushqimit
- D) Te stimuloje gogesimen
- E) Te gjitha

Pyetja 457

Tumori i Klatskin eshte:

- A) Tumor malinj i rrugeve biliare intraepatike
- B) Tumor malinj i duktuseve hepatike te djathte edhe te majte
- C) Tumor malinj i kokes se pankreasit
- D) Tumor malinj i bishtit te pankreasit
- E) Asnjera

Pyetja 458

Akalazia eshte:

- A) Nje alterim motor i karakterizuar vetem nga mungesa e relaksimit te sfinkterit inferior te ezofagut
- B) Nje alterim motor i karakterizuar nga mungesa e relaksimit te sfinkterit superior te ezofagut
- C) Nje alterim motor i karakterizuar nga mungesa e relaksimit te sfinkterit inferior te ezofagut, arrest total ose moskordinim i peristaltikes edhe dilatacion i ezofagut
- D) Nje alterim motor i karakterizuar nga mungesa e relaksimit te sfinkterit superior te ezofagut, arrest total ose moskordinim i peristaltikes edhe dilatacion i ezofagut
- E) Asnjera

Pyetja 459

Cili eshte kuptimi i Xenotrapiantit:

- A) Transplantim mes te afermeve
- B) Transplantim mes njerezve te sekseve te kunderta
- C) Transplantim mes njerezve te racave te ndryshme
- D) Transplatim mes specieve te ndryshme

E) Transplatim te organeve artificiale

Pyetja 460

Ne nje pacienteje me rrjedhje hematike te thithes, eshte e nevojshme:

- A) ekografi mamarie
- B) duktogalaktografia
- C) mamografi
- D) agoaspirim i lezionit
- E) asnjera

Pyetja 461

Ne prezence te nje opaciteti ne mushkerite e nje 40 vjecari, eshte e nevojshme:

- A) te fillohet nje terapi me antibiotik
- B) te nderhyet sa me shpejt ne menyre kirurgjikale
- C) te behet diagnoza e sakte perpara se te filloje terapia
- D) te zhvillohet nje cikël kemioterapie antituberkulare
- E) te gjitha

Pyetja 462

Dhimbje abdominale, rritje te peristaltikes, te vjella dhe arrest i zorres me fece dhe gaz jane karakteristike te:

- A) arrest te zorreve
- B) peritonit
- C) pankreatit
- D) kolecistit
- E) te gjitha

Pyetja 463

Karcinoma kolorektale e trashëguar jo polipoide (sindroma Linch I), karakterizohet nga:

- A) trashëgimi autosomale dominuese
- B) prevalence e kancerit te kolonit proksimal
- C) mosha e re
- D) te gjitha

Pyetja 464

Seminoma e testikut:

- A) eshte tumori me i rralle testikular
- B) rritet shpejt
- C) metastazon ne kocke
- D) asnjera

Pyetja 465

Rezekcioni abdomino-perineal sipas Miles konsiston në:

- A) proktokolektomi totale me anastomoze ileo-anale me cistektomi
- B) amputim i rektumit, anusit, sfinkterit anal dhe kolonostomia definitive

- C) rezeksion anterior i ulur, anastomoze rektale dhe kolonostomi provizore mbrojtese
- D) prokto-kolektomi totale me ileostomi definitive
- E) asnjera

Pyetja 466

Tiroidektomia totale keshillohet ne rast:

- A) Strume multinodulare
- B) Ca midolar
- C) Ca folicolar
- D) Te gjitha

Pyetja 467

Ne pacientet ne te cilet eshte kryer nje splenektomi, eshte gjetur qe jane:

- A) Me rezistente ndaj infeksioneve
- B) Me te ndjeshem ndaj infeksioneve te vazhdushme
- C) Prodhues te nje numri me te madh antikorpesh
- D) Shfaqin eozinofili
- E) Asnjera

Pyetja 468

Nga sa shtresa te bashkuara eshte i perbere muri i nje kisti te ekinokokut:

- A) Dy
- B) Tre
- C) Pese
- D) Dy ose tre, sipas vendodhjes se cistit
- E) Asnjera

Pyetja 469

Volvusi eshte:

- A) Torsion i aksit te nje segmenti te zorres se holle rreth vetes ose rreth mezenterit, i cili shkakton nje bllokim proksimal te lumenit
- B) Torsion i aksit te nje segmenti te colonit rreth vetes ose rreth mezenterit, i cili shkakton nje bllokim proksimal te lumenit
- C) Torsion i aksit te nje segmenti te zorres se holle rreth vetes ose rreth mezenterit, i cili shkakton nje bllokim distal te lumenit
- D) Torsion i aksit te nje segmenti te zorres se holle ose te colonit rreth vetes ose rreth mezenterit, i cili shkakton nje bllokim proksimal e distal te lumenit
- E) Asnjera

Pyetja 470

Cili nga keto tumore te tiroides, eshte me shpesh i lidhur me neoplasi te tjera endokrine:

- A) Adenoma folikulare
- B) Karcinoma medulare
- C) Karcinoma folikulare
- D) Karcinoma papilare
- E) Asnjera

Pyetja 471

Kush nga alternativat e mëposhtme, i korrespondon një neoplazie mamare të klasifikuar në stadin 1:

- A) tumori me madhësi që varion nga 2 në 5 cm
- B) mungesa e limfonodujve homologe të palpueshëm
- C) mungesa e metastazave
- D) të gjitha

Pyetja 472

Në kirurgjinë e colon-rekt, agjenti që shkakton më shpesh infeksionin e plagës operatorë me origjinë anaerobe është:

- A) *C.perfringens*
- B) *C.tetani*
- C) *B.fragilis*
- D) *Fuzobakterium spp.*
- E) asnjëra

Pyetja 473

Lobi kaudat i heparit i korrespondon:

- A) segmentit 1
- B) segmentit 2
- C) segmentit 4
- D) segmentit 8
- E) asnjëra

Pyetja 474

Sarkoidoza me adenopati hilare asimptomatike e pa interesim të parenkimes pulmonare, kërkon:

- A) terapi kortikoidë
- B) terapi me ossifenbutazon
- C) terapi me kolkicine
- D) terapi me klorokine
- E) asnjë terapi

Pyetja 475

Konsiderohet si manifestimi klinik më i shpeshtë në hipertensionin portal:

- A) encefalopatia
- B) hemorragjia gastro-intestinale
- C) asciti
- D) splenomegalia
- E) të gjitha

Pyetja 476

Hidroadeniti është:

- A) pezmatimi akut i një gjendje dhjamore
- B) bashkimi i disa forunkulave



- C) pezmatimi akut i nje gjendre sudoripare
- D) nje limfadenit aksilar
- E) asnjera

Pyetja 477

Ne presence te HCC ne cirrozen hepatiche, ne cilin rast indikohet rezeksioni hepatic:

- A) nodul unik ne cirroze te dekompesuar (child B-C)
- B) nodule multiple ne cirroze te kompensuar (child A)
- C) nodul unik ne cirroze te kompensuar (child A)
- D) nodul unik ne Child A me tromboze portale (trombektomia portale)
- E) asnjera

Pyetja 478

Ne tumoret e pjeses rektale me pT3N2M0, nenkuptohet:

- A) nje vleresim preoperator i shtrirjes se tumorit
- B) tumor qe shtrihet deri ne muskulature dhe intereson dy limfonodula
- C) tumor qe invadon strukturat fqinje
- D) te dhenat intraoperatore te tumorit, ku jane te prekura dhe limfonodulat lokoregionale
- E) asnjera

Pyetja 479

Tumori i apendiksit me shpesh eshte:

- A) adenokarcinome
- B) carcinoid
- C) limfoma
- D) leiomyosarkoma
- E) asnjera

Pyetja 480

Cilet nga ilacet me poshte perdoret ne bashkepunim me radioterapine ne trajtimin neoadjuvant te kancerit rektal:

- A) oxaliplatin
- B) kapecitabina
- C) CPT-11
- D) bevacizumab
- E) te gjitha

Pyetja 481

Ne rastet me kist te ekinokokut ne hepar, radiografia e abdomenit me pacientin ne kembet, mund te tregojte:

- A) Hidronivele
- B) Zhdukje te bules gastrike
- C) Kalcifikacione hepatiche
- D) Spostim te kolonit trasvers
- E) Asnjera

Pyetja 482

Cilat segmente intestinale mund te preke semundja crohn:

- A) Ileum
- B) Kolon
- C) Ezofag
- D) Stomak
- E) Te gjithë traktin tretes

Pyetja 483

Sindroma Mallory Weiss, eshte pasoje e:

- A) Demtimit te ezofagut
- B) Demtimit te mukozes gastrike
- C) Demtimit te junksionit gastro esofageal
- D) Gjakrrjedhjes nga nje polip gastrik
- E) Asnjera

Pyetja 484

Ne cilin nivel ndalojne me shpesh trupat e huaj ne ezofag:

- A) Hiatus i diafragmes
- B) Kardias
- C) Ezofagu cervikal poshte muskulit krikofaringeus
- D) Harku i aortes
- E) Asnjera

Pyetja 485

Me cfare mund te shoqerohet, apo ciles nga keto semundje mund ti shtohet hidrocela:

- A) Tumore testikulare
- B) Epididimiti
- C) Trauma
- D) Idiopatike
- E) Te gjitha

Pyetja 486

Cfare funksioni kryejne benzodiazepinat:

- A) Antikonvulsivant
- B) Ansiolitik
- C) Miorelaksant
- D) Hipnotik
- E) Te gjitha

Pyetja 487

Ne cilin nga keto kushte bejme ventilacion artificial:

- A) Rritje e PaCO<sub>2</sub>
- B) Ulje e PaCO<sub>2</sub>
- C) Rritje e pH

- D) Ulje e pH
- E) Te gjitha

Pyetja 488

Cili nga faktoret e meposhtem, ul shanset e suksesit te defibrilimit elektrik:

- A) Hipotermia
- B) Acidoza
- C) Hipoksia
- D) Impedence torakale e rritur
- E) Te gjitha

Pyetja 489

Kurba e disocimit te hemoglobines spostohej djathtas, si pasoje e:

- A) Rritje e 2,3 DPG
- B) Hipoksi
- C) Acidoze
- D) Rritje e temperatures
- E) Te gjitha

Pyetja 490

Ne nje neonat qe nuk jep shenja jete, ku e kerkojme pulsin central:

- A) Ne arterien temporale
- B) Ne arterien brakiale
- C) Ne arterien radiale
- D) Ne arterien karotide
- E) Asnjera

Pyetja 491

Nje anestetik lokal shtohet ne nje solucion epinefrine 1:200.000, me qellim qe te:

- A) Reduktoje shtrirjen e bllokut sensorial
- B) Rise kohezgjatjen e bllokut sensorial
- C) Potencoje bllokun motor
- D) Ule rrezikun e nje ipotensioni arterial
- E) Te gjitha

Pyetja 492

Histamina shkakton:

- A) Vazokonstriksion te kapilareve
- B) Dilatacion te muskulatures se lemuar bronkiale
- C) Rrit permeabilitetin vaskular
- D) Rrit proliferacionin e limfociteve
- E) Asnjera

Pyetja 493

Ç'duhet bere si terapi urgjence ne nje bllok A-V komplet:

- A) Lidokaine ne bolus
- B) Defibrilacion elektrik
- C) Pacing trans kutan
- D) Kardioversion elektrik
- E) Te gjitha

Pyetja 494

Cili nga te meposhtmit eshte nje kandidat potencial per nje trapiant kardiak:

- A) Pacient 55 vjeç, me kushte insuficience kardiake sekondare nga cardiomiopatia dilatative familjare, qe nuk i pergjigjet me terapise mjekesore
- B) Pacient 60 vjeç, ne kushte insuficience kardiake sekondare nga kardiopati iskemike, qe nuk i pergjigjet terapise mjekesore
- C) Pacient 55 vjeç ne kushte insuficience kardiake sekondare nga kardiopati iskemike, qe nuk i pergjigjet terapise mjekesore me histori te kaluar dhe jo te tashme alkolizmi
- D) Pacient 55 vjeç me insuficience kardiake sekondare nga kardiopati iskemike, qe nuk i pergjigjet me terapise mjekesore me vlera te rritura te rezistences se shtratit vaskular pulmonar, qe nuk i pergjigjet me terapise me vasodilatatore
- E) Asnjera

Pyetja 495

Gjate nje nderhyrjeje kardiokirurgjike by pass aorto koronar, perfuzionimi i qelizave hematike te perqendruara eshte:

- A) Gjithmone i nevojshem
- B) Kurre i nevojshem
- C) Kryhet gjithmone ne paciente me probleme te koagulimit
- D) Gjithmone i nevojshem ne nderhyrje qe kerkojne perdorimin e qarkullimit ekstrakorporal
- E) Asnjera

Pyetja 496

Ne sindromen mediastinale, organet e para qe influencohen nga rritja e presionit endomediastinal jane:

- A) Trakea
- B) Ezofagu
- C) Vena kava superiore dhe dy venat anonime
- D) Arteriet
- E) Nervat

Pyetja 497

Pacient 50 vjeç duhanpires, pas nje sindromi influenzal, paraqet nje insuficience respiratore te rendesishme. Ne torakocenteze aspirohen 1500 ml material sierohematik. Diagnoza me e mundshme eshte:

- A) Mesotelioma
- B) Tumor i pulmonit
- C) Pleurit tuberkular
- D) Empieme metapneumonare
- E) Sarkoidoze

Pyetja 498

Cila nga keto semundje nuk eshte nje indikacion per trapiant pulmoni:

- A) Adenocarcinoma
- B) Linfangiolejomiomatoza
- C) Enfizema
- D) Histocitoza x
- E) Fibroza cistike

Pyetja 499

Ne paciente me "kancer pulmoni me qeliza te vogla" te stadiit iii° b, cili eshte trajtimi qe kryhet me shpesh:

- A) Kemioterapi + kirurgji + radioterapi
- B) Kirurgji + kemioterapi
- C) Radioterapi
- D) Kemio + radioterapi

Pyetja 500

Nje hemoftoe me grafi toraksi ne projekcion antero posterior dhe laterolateral negative, mund te jete shkaktuar nga:

- A) Kaverne tuberkulare
- B) Perforacioin i ezofagut
- C) Pneumotoraks
- D) Karcinome e bronkut principal
- E) Kancer-abses

Pyetja 501

Ne atelektazi kemi:

- A) Reduktim te ajrit ne alveola
- B) Obstruksioni i nje bronku lobar jo gjithmone shkakton atelektazi
- C) Murmuris vescicularis eshte i ruajtur
- D) Zhdukje te te gjithë ajrit nga alveolat
- E) Pulmoni atelektazik i zhytur ne uje nuk shkon ne fund

## 12.Mjekësi Interne

Pyetja 1

Te gjitha gjendjet e mëposhtme mund te sjellin hipoglicemi përveç njerës:

- A) Feokromacitoma
- B) Deficiti i glukozë-6-fosfatases
- C) Morbus Addison
- D) Insulinoma
- E) Administrimi i insulines

Pyetja 2

Te gjitha pohimet e mëposhtme mbi sindromen e dehidrimit janë të sakta përveç njerës:

- A) Te vjellat profuze provokojne hipernatremi me acidoze metabolike
- B) Gjate diarrese mund te verehet dehidrim hipotonik i shoqëruarme hiponatremi
- C) Ne kohen diabetike këtoacidozike,dehidrimi ndodh si pasoje e humbjeve urinare te Na<sup>+</sup> dhe ujit
- D) Abuzimi me diuretike mund te provokojë dehidrim hipernatremik,ose me rralle hiponatremik
- E) Ne diabetin e dekompenuar ka humbje urinare te Na<sup>+</sup>

Pyetja 3

Një ikter i lehte, i zbuluar gjate ekzaminimit te sklerave ne drite natyrale, zakonisht evidentohet kur vlerat e bilirubines plazmatike janë ndermjet :

- A) 1.5-2 mg/dl
- B) 3.5-4.5 mg/dl
- C) 1-1.5 mg/dl
- D) 2.5-3 mg/dl
- E) >5 mg/dl

Pyetja 4

Cili nga pohimet e mëposhtme ben pjese ne rekomandimet e parashikuara nga guide - line Nderkombetare ?

- A) Kryerja e mamografise duke filluar nga mosha 40 vjeç
- B) Kryerja e kolonoskopise cdo 5 vjet duke filluar nga mosha 50 vjeç
- C) Matja e kolesterolemise totale në moshën 35 vjeç
- D) Matja e presionit arterial një here ne vit nga te gjitha moshat
- E) Kryerja e ekzaminimit oftalmologjik cdo vit duke filluar nga mosha 50 vjeç

Pyetja 5

Ne demtimin akut pulmonar raporti PaO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub> ( ku FiO<sub>2</sub> është perqendrimi i O<sub>2</sub> ne ajrin e inspiruar) është :

- A) Me pak se 100
- B) Midis 200-300
- C) Midis 150-200
- D) Me pak se 200
- E) Midis 100-150

Pyetja 6

Si paraqitet dispnea ?

- A) Gjithmone inspiratore

- B) Pavaresisht neqoftese është inspiratore ose ekspiratore
- C) Gjithmone inspiratore dhe ekspiratore
- D) Varet nga presionet ne qarkullimin e vogel
- E) Gjithmone ekspiratore

Pyetja 7

Cila nga patologjite e mëposhtme mund te jete shkak i insuficences renale akute postrenale ?

- A) Pielonefrit
- B) Hipertrofi e prostatës
- C) Obstruksion i arterieve renale
- D) Diureze e shtuar
- E) Kalkuloze vezikale jo obstruktive

Pyetja 8

Cianoza, është e zakonshme ne te gjitha gjendjet e mëposhtme përveç :

- A) Poliglobuli
- B) Emboli pulmonare masive
- C) Anemia grave
- D) Ekspozimi i zgjatur ne lartesi te medha mbi nivelin e detit
- E) Methemoglobinemia

Pyetja 9

Etiologjia e anoreksise nervore është pasoje e :

- A) Reduktimit te nivelit te LH-RH
- B) Reduktim te nivelit te LH
- C) Crregullim i sjelljes se ushqyerjes mbi baze psikike
- D) Ulje e funksionit te tiroides
- E) Reduktim te nivelit te IGF-I (somatomedina C)

Pyetja 10

Cilat janë alterimet hemodinamike ne shokun hipovolemik ?

- A) Hipotension,bradikardi, rezistenca periferike normale ose te uleta, ulje te presionit venoz qendror
- B) Hipotension, takikardi, rezistenca periferike te reduktuara, presion venoz i ulet
- C) TA normal ose i rritur, frekuence kardiake normale ose te ulur, rezistenca periferike te reduktuara, rritje te presionit venoz qendror
- D) Hipotension, takikardi, rritje te rezistencave periferike, ulje te presionit venoz qendror
- E) Nuk ka alterime hemodinamike se vihen ne funksion mekanizmat kompensatore

Pyetja 11

Cila nga alternativat e mëposhtme ka një funksion fiziologjik të rëndësishëm të kriprave biliare?

- A) Konjugim i tyre me toksinat në mënyrë që të favorizohet ekskretimi i tyre
- B) Lejimin e eliminimit të produkteve si pasojë e shkatërrimit të hemoglobines
- C) Lejon absorbimin e Vit B12
- D) Lehtësimin e absorbimit të yndyrnave ushqimore
- E) Ruajtja e nivelit normal të pH intestinal

Pyetja 12

Versamenti pleural hemoragjik, gjendet në të gjitha situatat e mëposhtme përveç :

- A) Emboli pulmonare
- B) Dekompensim kardiak
- C) Kancer pulmoni
- D) Mezotelioma
- E) Kancer gjiri

Pyetja 13

Të gjitha rastet e mëposhtme janë shkak i hipokalcemise përveçse :

- A) Hipoparatiroidizmi
- B) Hiperparatiroidizmi
- C) Rritje e sekretimit të kalcitonines
- D) Sindroma Cushing
- E) Hipovitaminoza D

Pyetja 14

Embolia gazore nën ujore favorizohet nga :

- A) Hiperventilim nga frymemarrja e drejtuar
- B) Zhytje në ujë në periudha kohore të shkurtra
- C) Hiperventilimi me O<sub>2</sub>
- D) Aktivitet fizik i pamjaftueshëm
- E) Raca kaukaziane

Pyetja 15

Osteoporozë e tipit të I është pasojë e deficitit të hormonit :

- A) Kalcitonine
- B) Estrogjenit
- C) Testosteronit



- D) Parathormonit
- E) Hormonit tireotrop

Pyetja 16

Niveli plazmatik i peptidit natriuretik atrial ne një pacient me dekomensim kardiak kronik është i lidhur me :

- A) Graden e demtimit funksional
- B) Seksin dhe moshën e pacientit
- C) Moshën e pacientit
- D) Vlerat e presioni sistolik
- E) Nivelin e atherosklerozes te arterieve koronare

Pyetja 17

Cila nga barnat e mëposhtme është zgjedhja e pare ne parandalimin e fibrilacionit ventrikular gjate infarktut akut te miokardit ?

- A) Digoksina
- B) Lidokina
- C) Kinidina
- D) Flekainidi
- E) Propanololi

Pyetja 18

Gjate polisonografise mund te vleresohen te gjithë parametrat e mëposhtëm përveç nje:

- A) Elektroencefalograma
- B) Elektrokardiograma
- C) Saturimi i O<sub>2</sub>
- D) Elektromiografia tibiale
- E) Diureza

Pyetja 19

Si konstatohet prania e edemes ne një gjymtyre ?

- A) Palpimi sipërfaqësor i zones se dyshuar
- B) Manovra e Perth
- C) Vleresimi manual i Temperaturës lokale
- D) Kompresioni digital mbi zonen kockore
- E) Palpimi i pulsit arterial

Pyetja 20

Cila nga anomalite elektrolitike te mëposhtme vihen re me shpesh ne morbus Addison ?

- A) Hiperglicemi
- B) Hipokalcemi
- C) Hipokalemi
- D) Hiponatremi dhe hiperkalemi
- E) Hipernatremi dhe hipokalemi

Pyetja 21

IgA prodhohen nga :

- A) Pneumocitet e tipit te I
- B) Pneumocitet e tipit te 2
- C) Qelizat endoteliale
- D) Makrofaget alveolare
- E) Qelizat e epitelit bronkial

Pyetja 22

Acidoza respiratore e dekompesuar, ne hemogazanalize, karakterizohet nga :

- A) Rritje e Ph, rritje PaO<sub>2</sub>, ulja e PaCO<sub>2</sub>
- B) Rritje e Ph, ulja PaCO<sub>2</sub>, BE negative
- C) Ulja e Ph, ulja e PaCO<sub>2</sub>
- D) Ulja e Ph, rritje e PaCO<sub>2</sub>
- E) Ph normal, ulje e PaCO<sub>2</sub>, BE negative

Pyetja 23

Cila nga shenjat e mëposhtme nuk është tipike e arrestit cirkulator ?

- A) Frymemarrje agonike (gaspings)
- B) Mungese te toneve kardiake ne askultim
- C) Midriaza
- D) Kriza mioklonike
- E) Mungese e pulsit arterial periferik

Pyetja 24

Rreziku kardiovaskular rritet mbi te gjitha kur :

- A) Rritet e indit adipoz subkutan
- B) Rritet e indit adipoz kaf
- C) Rritet e indit adipoz visceral
- D) Ulja e indit adipoz te bardhe
- E) Ne asnje nga rastet e alternativave

Pyetja 25

Ne cilën nga rastet e mëposhtme, ka me shumë probabilitet, shfaqja e edemes vetem ne një nga gjymtyret inferiore ?

- A) Arteriopatia kronike obliterante
- B) Hipoproteinemia
- C) Nefriti
- D) Insuficenca kardiake
- E) Flebiti

Pyetja 26

Te gjitha pohimet e mëposhtme rreth sëmundjes së Alzheimer janë të vërteta, përveç :

- A) Gjetjet patologjike perfshijne nderthurjen neurofibrilare dhe degjenerimin neuronal
- B) Simptomat fillestare shpesh stimulojne depresionin
- C) Aktiviteti kortikal cerebral i colin-acetiltransferazes, është i reduktuar
- D) Pjesa me e madhe e rasteve janë familjare
- E) Nuk ka hetime specifike laboratorike patologjike

Pyetja 27

Ne sindromen hepatorenale:

- A) Diureza është me pak se 300 ml ne dite
- B) Kolesterolemia është e rritur
- C) Diureza i kalon 1500ml ne dite
- D) Urina është padyshim hematurike
- E) Glukozuria është gjithmone e pranishme

Pyetja 28

Ne oftalmopatine Bazedoviane te gjitha pohimet e mëposhtme janë të vërteta përveç :

- A) Mund te paraprije ose te ndjeke disfunktionin e tiroides
- B) TSH është i ulur ne morbus Graves
- C) Prek me shpesh femrat se sa meshkujt
- D) Fibroblastet prodhojne acid hialuronik dhe si rezultat kemi trashje ne indit retrobulbar
- E) Normalizimi i funksionit te tiroides ka si rezultat permirësimin e oftalmopatise Bazedoviene

Pyetja 29

Ne fazen paraprirese te okluzionit intestinal mekanik te kolonik kuadri klinik karakterizohet nga :

- A) Dhimbje abdominale ne forme krampesh
- B) Te vjella fekaloide
- C) Mbrojtje abdominale e gjeneralizuar

- D) Mungese e peristatikes
- E) Temperaturë e larte

#### Pyetja 30

Te gjitha shkaqet e mëposhtme janë shkaktare te arrestit kardiak, përveç :

- A) Takikardi ventrikulare
- B) Disfunskion elektrik
- C) Asistoli
- D) Blloku atrio-ventrikular i grades III-te
- E) Shoku kardiogjen

#### Pyetja 31

Te gjitha indikimet e mëposhtme ne terapine e flebotrombozes se thelle ne një grua shtatzane janë te gabuara përveç:

- A) Heparina me peshe molekulare te ulet është e kunderindikuar ne tremujorin e trete te shtatzanise
- B) Terapia me warfarine është e kunderindikuar gjate gjithë shtatzanise, por jo gjate periudhes se laktacionit
- C) Terapia me warfarine është e kunderindikuar vetem ne tremujorin e pare te shtatzanise
- D) Terapia me warfarine është e kunderindikuar si ne periudhen pre-partum dhe ne ate post-partum
- E) Te gjitha masat terapeutike qe aplikohen ne një grua jo shtatzane përdoren dhe ne një grua shtatzane

#### Pyetja 32

Cili nga te mëposhtmit, është një faktor risku per kancerin e vesikes urinare ?

- A) Trajtim i zgjatur me ciklofosamid
- B) Ekspozimi kronik ndaj alkoolit
- C) Karcinome renale ne antecedent
- D) Histori familjare per karcinomen vesikale
- E) Infeksion nga Schistosoma Mansoni

#### Pyetja 33

Një pacient paraqitet me likid te lire peritonal ,splenomegali, hemoroide, hiperaldosteronizem, deficit te faktoreve te koagulacionit dhe hipoalbuminemi. Rreth ciles prej patologjive te mëposhtme duhet te orientoheni ?

- A) Dekompesim kardiak kongjestiv
- B) Neoplazi abdominale
- C) Sindromi nefritik
- D) Sëmundje limfoproliferative
- E) Cirroze hepatike

Pyetja 34

Një grua e re 33-vjeç është diagnostikuar me anemi hipokrome mikrocitare (me Hb 7,3 g/dl, hipoferritinemi), pas dy shtatzanive ne tre vitet e fundit dhe menstruacione ne sasi te madhe prej dhjete muajsh. Ne dy muajt e fundit mjekohet per os me 40 mg Fe t

- A) Prania e humbjeve te tjera hematike
- B) Doze e pamjaftueshme e hekurit te dhene.
- C) Absorbim i demtuar intestinal i hekurit
- D) Formula kimike e hekurit te dhene
- E) Indikimi terapeutik i gabuar

Pyetja 35

Cila është menyra me korrekte ne menaxhimin e shokut ?

- A) Mbajtja nen vezhgim e pacientit deri sa te shfaqen komplikacionet e para per te cilat duhet trajtuar menjehere
- B) Te mos nderhyhet me asnjë trajtim terapeutik, pa u identifikuar shkaku primar
- C) Njohja e shpejte e simptomave te para- ruajtja e funksioneve vitale- identifikimi i menjehershem i shkakut primar- korrigjimi i shkakut- menaxhimi i komplikacioneve
- D) Kufizimi ne një trajtim simptomatik per te evituar demtimet e hipoperfuzionit
- E) Transferimi i menjehershem ne reanimacion

Pyetja 36

Insuficenca renale akute funksionale mund te jete pasoje e :

- A) Kalkulozes se rrugeve urinare
- B) Obstruksion i rrugeve urinare
- C) Ulja e volumit ekstra qelizor
- D) Abuzim me aminoglukozidik
- E) Nekroze kortikale bilaterale

Pyetja 37

Granulomatoza e Inflamuar është karakteristike e :

- A) Lupusi eritematoz sistemik (LES)
- B) Arteriti Takayasu
- C) Panarteriti nodoz
- D) Sklerodermia
- E) Sindromi Sjogren

Pyetja 38

Ne pacientet me emfizeme pulmonare nga SPOK gjate spirometrise verehen alterimet e mëposhtme, përveç:

- A) Rritja e kapacitetit pulmonar total
- B) Rritja e kapacitetit vital
- C) Rritja e volumit residual
- D) Reduktim i FEV 1
- E) Demtim i difuzionit gazor

Pyetja 39

Një pacient 41 vjeçar i shëndetshëm deri 5 dite me parë kur iu shfaq një dhimbje therese në 1/3 e poshtme të hemitoraksit të djathtë, që forcohet me teper nga inspirimi i thellë, kollë dhe temperaturë. Ritmi dhe frekuenca kard

- A) Pneumotoraks
- B) Versament pleural
- C) Empieme pleurale
- D) Emboli pulmonare
- E) Bronkopneumoni

Pyetja 40

Te gjithë faktorët e mëposhtëm favorizojnë formimin e edemave, përveç:

- A) Rritja e presionit arterial
- B) Rregjim shtrati i zgjatur
- C) Rritja e presionit venoz
- D) Clirimi lokal i kininave
- E) Staza limfatike

Pyetja 41

Në rastet me angina pectoris të paqendrueshme, cila duhet konsideruar terapia baze, përveç atyre që janë të nevojshme për të kontrolluar simptomat e angines?

- A) Aspirin 100 mg/dite
- B) Verapamil 240 mg + nifedipine 40 mg/ dite
- C) Diltiazem 360 mg/ dite
- D) Aspirin 325 mg/dite + kalciparina 0,5 mg/ dy here në dite
- E) Trinitrine sublingual sipas nevojës

Pyetja 42

Cila nga teknikat e mëposhtme shërben për ekzaminimin invaziv të aparatit kardiovaskular ?

- A) RMI
- B) Angiokardiografia
- C) Ekokardiografia
- D) EKG

E) CT me 64 shtresa

Pyetja 43

Te gjitha klasat e mëposhtme përdoren ne trajtimin e angina pectoris te paqendrueshme, përveç :

- A) Nitrateve
- B) Beta bllokuesve
- C) Digoksina
- D) O2 terapi
- E) Kalci bllokuesit

Pyetja 44

Një grua 52 vjeç paraqitet me psoriazis te gjeneralizuar. Kesaj shtuate mund t'i bashkangjiten te gjitha patologjite e mëposhtme, përveç :

- A) Pleurit
- B) Artrit
- C) Uveit anterior
- D) Hiperuricemi
- E) Carje e thonjve

Pyetja 45

Janë shkaqe te shpeshta te temperaturës, interpretuar ne fillim si temperaturë ne rastet e mëposhtme, përveç :

- A) Tiroidit subakut
- B) Limfoma Hodgkin
- C) Granulomatoza Vegener
- D) Hepatit viral akut i tipit B
- E) AIDS

Pyetja 46

Oligouria hipertionike, acidoza metabolike, hiperkalemia, konfigurojne kuadrin klinik-laboratorik te:

- A) Diabetit mellitus te dekompesuar
- B) Diabetit insipid
- C) Fazes funksionale te insuficences renale akute
- D) Insuficences renale kronike
- E) Faza poliurike e insuficences renale akute

Pyetja 47

Cila nga pohimet e mëposhtme prezanton informacionin me te sakte mbi prognozen e fazes malinjë te hipertensionit?

- A) Niveli presionit sistolik
- B) Alterimet e funksionit renal
- C) Ndryshimet ne ekzaminimin e fundus okulit
- D) Niveli i presionit diastolik
- E) Dimensionet kardiake

Pyetja 48

Fraksioni i eskretimit te natriumit te filtruar normalisht është :

- A) 1,5-3%
- B) Me i vogel ose e barabarte me 1%
- C) 3-4,5%
- D) 4,5-6%
- E) 6,5-8%

Pyetja 49

Prej disa muajsh pacienti ankon per dispne nga sforcimet fizike te moderuara fillimisht te toleruara mire por qe me pas agravohen. Prej disa javesh zgjohet shpesh naten me ndjesine e mungeses se ajrit.

Prej disa kohesh fle me dy

- A) Insuficence e arterieve koronare
- B) Dekompesim kardiak i djathe
- C) Kriza paniku
- D) Astma bronkiale
- E) Insuficence ventrikulare e majte

Pyetja 50

Ne shokun hipovolemik, ne baze te fispatologjise te tij, cilat nga parashikimet e mëposhtme është jo i sakte ?

- A) Administrimi i vazokonstriktoreve per mbajtjen e presionit arterial
- B) Vendosja e pacientit ne pozion me koken poshte
- C) Administrim i oksigjenit
- D) Administrimi i solucioneve koloidale endovenoze
- E) Monitorimi i presionit venoz qendror

Pyetja 51

Cili do te ishte menaxhimi korrekt ndaj një subjekti qe ekspozohet aksidentalisht ndaj virusit te hepatitisit viral B, i cili nuk është i vaksinuar ?

- A) Administrimi i një doze te imunoglobulinave specifike
- B) Fillimi i vaksinimit
- C) Administrimi vetem i një doze te vaksinimit



- D) Administrimi i një doze antibiotiku
- E) Administrimi si i një doze te vaksinimit dhe i një doze te imunoglobulinave specifike

Pyetja 52

Cili është vendi më i zakonshëm i tumorit gjigando-qelizor të kockës (osteoklastoma) ?

- A) Ekstremiteti distal i femurit
- B) Mandibula
- C) Kafka
- D) Kolona vertebrale
- E) Falanget e gjymtyreve te siperme

Pyetja 53

Cila nga variantet e mëposhtmet do te ishte procedura me urgjente ndaj një subjekti 21 vjeçar me astme bronkiale, i trajtuar ambulatorisht me beta agonist, teofiline, steroid i/v, simptomatik prej disa orësh, që prezantohet në urgjencëme djerse profuze,

- A) Trajtimi sistematik me kortikosteroid
- B) Përgatitje për intubim endotrakeal
- C) Kontakt telefonik me mjekun personal mbi ndryshimet e fundit ne anamneze
- D) Kromoglikat te natriumit me rruge inhalatore
- E) Ipratropium bromidi ne rruge inhalatore

Pyetja 54

Për vendosjen e diagnoses te Aspergilozes bronkopulmonare alergjike, ne një person me astme bronkiale dhe infiltrat pulmonar rekurent, cilet nga testet e mëposhtëm do te ishte me i pershtatshem ?

- A) Testi kutan i vonuar ( i ngjashem me tuberkulinen) Aspergillus Fumigatus
- B) Reaksion kutan i shpejte i Aspergillus fumigatus
- C) Prania e eozinofileve
- D) ANA-pozitive
- E) Prania e neutrofileve ne lavazhin bronko-alveolar

Pyetja 55

Cilat nga grupet e markuesve është tipik ne periudhen fillestare te hepatit B ?

- A) HBsAg, HBcAg; anti HBe
- B) HBsAg; anti HBc IgG
- C) HBsAg, HBeAg ;anti HBc-IgM
- D) HBsAg; anti HBe
- E) Anti HBs; anti HBc

Pyetja 56

Tamponada kardiake është emergjence mjeksore qe ndodh si pasoje:

- A) Nga një goditje e forte torakale
- B) Nga një stenoze mitrale severe
- C) Aksident rrugor
- D) Nga akumulimi i likidit nen presion, ne kavitetin perikardial
- E) Stenoze aortale severe

Pyetja 57

Ne mungese te antibiogrames, cilin nga keta antibiotike do te zgjidhni si me efektiv kunder stafilokokut ?

- A) Amoksiciline + Ac. Klavulonik
- B) Piperacilline
- C) Ceftazidime
- D) Klaritromicine
- E) Metronidazol

Pyetja 58

Feokromocitoma është një neoplazi e ciles prej strukturave te mëposhtme :

- A) Korteksit surrenal
- B) Medules renale
- C) Timus
- D) Hipofizes
- E) Medules surrenale

Pyetja 59

Fenomeni Raynaud mund te lidhet me :

- A) Erisipelen
- B) Dermatitin
- C) Sklerodermine
- D) Tromboflebitin
- E) Limfadenitin

Pyetja 60

Nga zbulimi ne një analize rutine i rritjes se perqendrimit plazmatik te CPK-se, cila nga gjendjet e mëposhtme duhet te konsiderohet ne plan te pare?

- A) Praktimi i body building
- B) Konstipacion te rende

- C) Diete hiperproteinemike
- D) Atak paniku
- E) Kolelitiaza

Pyetja 61

Hipertiroidizmi subklinik lidhet me :

- A) Nivel te ulet te TSH-se dhe nivel normal te FT4
- B) Nivel te ulet te rT3
- C) Nivel te larta te TSH-se
- D) Nivel te ulet te TSH-se dhe nivle te larte te FT4
- E) Rrritje te titrit te antikorpeve

Pyetja 62

Cilat nga te mëposhtmet, nuk është shkak i drejtperdrejte i anemise ?

- A) Hemoragjia
- B) Dekompesimi kardiak
- C) Insuficence e eritropoezes
- D) Gastrektomia totale
- E) Hemoliza e shtuar

Pyetja 63

Cili nga hormonet e mëposhtme mund te jape hiponatremi ne qofte se është shtuar sekretimi tij?

- A) Vazopresina
- B) ANP ( peptidi natriuretik atrial)
- C) Angiotensina II
- D) Aldosteroni
- E) Testosteroni

Pyetja 64

Cili nga faktoret e riskut per sëmundje kardiovaskulare është edhe faktor risku per disfunksion erektil:

- A) Duhanpirja
- B) Dislipidemia
- C) Diabeti Melitus
- D) Jeta sedentare.
- E) Te gjitha pergjigjet

Pyetja 65

Cila nga demtimet e mëposhtme karakterizon cor-in pulmonar?

- A) Sindromi Claude-Bernard-Horner
- B) Dilatacion i ventrikulit te majte
- C) Shunti interventrikular nga e majta ne te djathte
- D) Persistenca e Ductus Botali apertum
- E) Hipertrofi e ventrikulit te djathte

Pyetja 66

Shkaku kryesor i obstrukcionit te rrugeve te frymemarrjes ne pacientin pa koshience është:

- A) Obstruksioni i peshtymes
- B) Fleksioni i epiglotisit
- C) Bronkospazma
- D) Renia e gjuhes
- E) Kolapsi i trakese

Pyetja 67

Cila nga pohimet e mëposhtme ne lidhje me interesimin renal ne dekursin e LES është i sakte:

- A) Semundja renale klinikisht e rendesishme prek gati 90% te pacienteve me LES
- B) Biopsia renale mund te mos jete e nevojshme ne pacientet me sediment te rritur dhe me perkeqesim progresiv te funksionit renal
- C) Nefriti është një gjetje e rralle ne biopsine renale
- D) Interesimi renal është i rralle ne pacientet me titer te larte te antitropave anti ADN me helike dyfishe
- E) Ekzaminimi urines ne LES zakonisht zbulon proteinuri por jo hematuri ose crregullime te tjera te sedimentit urinar

Pyetja 68

Ne insuficiencen respiratore te obezit:

- A) Demtimi funksional është kryesisht gjate fazes inspiratore
- B) Demtimi funksional është kryesisht gjate fazes ekspiratore
- C) Është i demtuar shkembimi alveolo-kapilar i gazeve
- D) Te dyja fazat e ventilimit janë te kompromentuara
- E) Rritet volumi rezidual

Pyetja 69

Hipokalcemia ne insuficiencen renale kronike shkaktohet nga:

- A) Mungesa e vitamines D aktive
- B) Marrjet e pakta te kalciumit nga ushqimi
- C) Hiperkalciuria
- D) Mungesa e PTH

E) Hiperparatiroidizmi

Pyetja 70

Te gjithë antihipertensivet e mëposhtëm janë te kunderindikuar ne shtatzani me perjashtim te:

- A) Beta-blokues
- B) Frenuesit e enzimes se konversionit
- C) Diuretiket
- D) Nitrattet
- E) Calci antagonistet

Pyetja 71

Hipertensioni arterial ne insuficencen renale kronike shkaktohet nga:

- A) Stenoza e arteries renale unilaterale
- B) Rritja e volumit jashteqelizor nga retensioni Na
- C) Stenoza e e arterieve renale bilaterale
- D) Hiperaldosteronizmi primar
- E) Sindromi Barter

Pyetja 72

Balloni aortik:

- A) Te gjitha pergjigjet
- B) Permirëson perfuzionin coronar gjate diastoles
- C) Redukton pasngarkesen ne sistol
- D) Vendoset ne aorten torakale
- E) Është një pajisje qe mban qarkullimin ne kushtet e debitit te ulur

Pyetja 73

Pasojat klinike me te shpeshta te Tiroiditit te Hashimotos:

- A) Hipertiroidizmi subklinik
- B) Galaktorrea
- C) Hipoparatiroidizmi
- D) Sëmundje te tjera autoimune
- E) Hipertiroidizem ne fazen e pare dhe hipotiroidizem me pas

Pyetja 74

Te gjitha pohimet e mëposhtme janë karakteristike te detresit respirator te te rriturit me perjashtim te:

- A) Reduktimi i pO<sub>2</sub> me rritje pCO<sub>2</sub>
- B) Demtimi alveolar

- C) Takikardia
- D) Rritja e debitit kardiak
- E) Dilatacioni rrugeve te frymemarrjes

Pyetja 75

Te gjitha shkaqet infektive janë shkaqe te mundshme per hemoptizi vec:

- A) Murtaja
- B) Abcesi pulmonar
- C) Bronkoekatzine
- D) TBC miliar
- E) Pneumonia stafilokoksike

Pyetja 76

Një djale 23 vjeç ka patur hematuri te përsëritura vitin e fundit. Cdo episod është paraprire nga infeksion i rrugeve te sipërme te frymemarrjes. Egzaminimi objektiv dhe ai i funksionit renal janë normal. Egzaminimi i urines tregon hematuri e gjurme prot

- A) Proliferim ekstrakapilar te gjere
- B) Proliferim mezangial difuz
- C) Sëmundje polikistike renale
- D) Depozitim ne kapilar te C3 ne imunofluoreshence
- E) Depozitim difuz te IgA ne imunofluoreshence

Pyetja 77

"Semundja nga djegja" percaktohet nga prania e

- A) Perfshirje ne masen mbi 5% te trupit te femijes
- B) Perfshirje ne masen mbi 20% te trupit te adultit
- C) Shoku septik
- D) Hemoragjia gastrike
- E) Komplikacione Pulmonare

Pyetja 78

Cili nga ptogenet e mëposhtëm është me shpesh përgjegjës per Pyelonephritin Acut?

- A) Escherikja Coli
- B) Chlamidia
- C) Klebsiella
- D) Pseudomona
- E) Candida

Pyetja 79

Edemat e gjymtyreve manifestohen ne te gjitha këto raste klinike me perjashtim te:

- A) Insuficiencia venoze e ekstremiteteve inferiore
- B) Cirhosis Heparit
- C) Insuficiencia Kardiake
- D) Sindroma nefrotike
- E) Hepatit alkoolik

Pyetja 80

Një mase pulmonare e zbuluar nga Ra-Grafia Torakale mund te jete shprehje e një prej ketyre patologjive, përveç:

- A) Tuberkulozi post-primar
- B) Mycetoma
- C) Pneumonia nga stafilokoku
- D) Pneumoniti nga pneumocisti carini
- E) Pneumonia nga mycoplasma pneumonie

Pyetja 81

Ateroskleroza është:

- A) Një ngjarje me etiologji multifaktoriale
- B) Një patologji ne proporcion te drejte me rritjen e nivelit te kolesterolit ne gjak
- C) Një fenomen fiziologjik i lidhur me moshen e pacientit
- D) Ka ne menyre ekskluzive si moment te pare, fenomene te tipit infeksioz ne dem te arterieve me kaliber te mesem e te madh.
- E) Një patologji qe nuk lidhet me diabetin e cregullimet metabolike

Pyetja 82

Te gjitha agjentet patogene te mëposhtëm janë shkak i shpështë per shock septik përveç:

- A) Koket gram pozitive (Stafilokok Enterokok)
- B) Pseudomonas spp
- C) Enterobacteret
- D) Leptospiroza
- E) Neisseria meningitis

Pyetja 83

Cili nga cregullimet elektrolitike te mëposhtme jep shfaqjen e një zgjatje te QT dhe pranine e vales U ne EKG.

- A) Hiperkalemia

- B) Alkalozia
- C) Hiperkalcemia
- D) Hipokalemia
- E) Hiponatremia

Pyetja 84

Cila nga klasat farmakologjike të mëposhtme nuk i jepet pacienti me bllok A-V me të madhe se grada e I ose me Sindrom të Sinusit të Semurë

- A) ACE-Inhibitorët
- B) Diuretike të Anses
- C) ARB
- D) Beta- bllokuesit
- E) Calci-bllokuesit

Pyetja 85

Cistet granulare provokojnë lezionet e mukozës:

- A) Orofaringeale
- B) Nazale
- C) Ezofageale
- D) Auricolare
- E) Rectale

Pyetja 86

Arteriti i Hortonit mund të ketë komplikacione shfaqjen e:

- A) Aneurizem të aortës abdominale
- B) Të gjitha janë të vërteta
- C) Obstruksion të Arteries Subclavia
- D) Amaurozis
- E) Disekacion të harkut të aortës

Pyetja 87

Me Eritemë kuptojmë:

- A) Skuqje të lekures me vezikula
- B) Skuqje të lekures që nuk zhduket nga presioni dixhital
- C) Skuqje të lekures që zhduket nga presioni dixhital
- D) Ngritjes të një zone të lekures e rrethuar me edemë
- E) Skuqje të lekures me prurit të shprehur

Pyetja 88



Dieta Hipo sodike pershkruhet:

- A) Ne te gjithë pacientet me IRK me terapi konservative
- B) Vetem ne pacientet uremike ne Hemodialize
- C) Vetem ne pacientet me IRK si pasoje e GNK
- D) Vetem ne pacientet me IRK nga Pyelonefriti Chronik
- E) Vetem ne pacientet me IRK, Hipertension Arterial e Edema

Pyetja 89

Te gjithë pohimet e mëposhtme per limphomen Hodgkiane janë te sakta përveç:

- A) Semundja cfaqet ne disa paciente vetem me prurit te gjeneralizuar
- B) Është karakteristike limphoadenomegalia e vetme ose e shumfishte jo dhimbshme
- C) Lymphoma e Hodgkinit është zakonisht rezistente ndaj Radioterapise
- D) Trajtimi e prognoza varen nga stadi klinik
- E) Ethe, djersitje dhe humbje te peshes mbi 10%, te pranishme njekohesisht, keqesojne dukshem prognozen

Pyetja 90

Polimialgja Rheumatizmale:

- A) Shoqerohet me pozitivitetin e anitikorpit JO1
- B) Prek me shumë burrat nen 40 vjeç
- C) Shkaktohet nga infeksionet e përsëritura streptokoksike te Tonsilave
- D) Shoqeron purpuren Schonlejn-Henoch
- E) Është një sinovit jo-eroziv i artikulacioneve te shpatullave e te strukturave periartikulare

Pyetja 91

Te gjitha anomalite imunologjike te mëposhtme lidhe me infeksioni nga HIV me perjashtim te:

- A) Ulje e numurit qarkullues te limfociteve T4
- B) Rritje te funksionit te beta2- microglobulines
- C) Alergjia Kutane ndaj antigeneve te zakonshem per teste Kutane
- D) Ulje e funksionit te qelizave T citotoksike
- E) Raporti i limfociteve T4 e T8 (supresor) >1

Pyetja 92

Cili nga diuretiket e mëposhtëm nuk është një Kalikursyes

- A) Acidi Etacrinik
- B) Spironolactoni
- C) Triamtereni

- D) Amiloridi
- E) Metoprololi

Pyetja 93

Te gjithë kushtet e mëposhtme janë shkaqe tipike të Insuficiences Kardiake Diastolike përveç:

- A) Hipertensioni Arterial me hipertrofi të ventrikulit të majte
- B) Miokarditi Viral
- C) Hipertireoza
- D) Takiaritmia
- E) Fibroza e Miokardit

Pyetja 94

Çfarë shenjë nuk gjendet në Stenozen Mitrale:

- A) Zhurme diastolike me theksim presistolik
- B) Theksim të tonit të dytë në majë
- C) Puls i shpejtë
- D) Theksim të tonit të dytë në bazë
- E) Toni i fortë i hapjes

Pyetja 95

Cili nga të mëposhtmet është shkaku më i shpësthtë i Embolise Pulmonare

- A) Tromboze e venave sipërfaqesore të gjymtyreve inferiore
- B) Tromboze e atriumit të djathtë
- C) Endokarditi bakterial
- D) Tromboze e venave të thella të gjymtyreve të poshtme
- E) Emboli gazore nga frakturat

Pyetja 96

Cila nga barnat e poshteshenuara janë të indicuar në terapinë e krize së guthes ?

- A) Allopurinol
- B) Klofibratet
- C) Kolestiramina
- D) Kortizoni
- E) Penicilina

Pyetja 97

Cili nga barnat e mëposhtme është kundërindikuar në një pacient të diagnostikuar rishtaz, rastesisht me ane të një EKG-je me fibrilacion atrial ?

- A) Beta bllokues +ACE inhibitor
- B) Digoxina
- C) Kalci-antagonistet
- D) Acenokumaroli
- E) Beta stimulues

Pyetja 98

Janë te gjitha shkaqe te deficitit te Vit 12 përveç :

- A) Ulçer ezofageale
- B) Absorbim i pamjaftueshem
- C) Ekskretimi rritur
- D) Diete e papershtatshme ( psh vegjetarizmi)
- E) Perdorimi i pamjaftueshem

Pyetja 99

Cila nga sëmundjet infektive te mëposhtme kanë transmetim orofekal

- A) Difteria
- B) Tifo
- C) Varicela
- D) Sifilizi
- E) Malaria

Pyetja 100

Te gjitha pohimet e mëposhtme rreth astmes bronkiale janë korrekte, përveç:

- A) Është një sëmundje inflamatore e mukozes bronkiale
- B) Është një sëmundje kronike me shperthime riakutizuese nga faktore te ndryshem
- C) Është një sëmundje qe shoqerohet me dekompensim kardiak
- D) Është një sëmundje e karakterizohet nga bronkospazma reversibile
- E) Është një sëmundje qe karakterizohet nga dispne dhe ndjesia e mbytjes torakale

Pyetja 101

Ne hiperaldosteronizmin primitiv verehet:

- A) Rritje e renines dhe aldosteronit plazmatik
- B) Hipokalemi dhe acidoze metabolike
- C) Rritje e ekskretimit urinar te Na dhe Cl
- D) Ulje e renines dhe rritje e aldosteronit plazmatik
- E) Ulje e ekskretimit te K dhe Cl

Pyetja 102

Cila nga opsionet e mëposhtme të ben të mendosh se nuk kemi të bejme me një sinkop , por me krize epileptike ?

- A) Zgjatja mbi 10 sekonda
- B) Një plage ne skalpin e kokes
- C) Parandjenja e episodit
- D) Pergjumja ne momentin e berjes koshient
- E) Urinimi i pavullnetshem

Pyetja 103

Nivelet e larta te prolaktines mund:

- A) Te bllokojne sekretimin pulsatil te GnRH
- B) Te gjitha janë te sakta
- C) Shkakton ulje te libidos
- D) Te shkaktoje ulje te nivelit te testosteronit
- E) Te provokojë amenorre

Pyetja 104

Pacientet me trauma (kontuzion) kardiake mund te trajtohen me te gjitha medikamentet e mëposhtme përveç se me :

- A) Antiaritmike
- B) Antikoagulante
- C) Anksiolitike
- D) Analgjezike
- E) Antibiotike

Pyetja 105

Ne pacientet me këtoacidoze diabetike është me e rendesishme te normalizohet:

- A) Niveli i fosfatit
- B) Bikarbonatet
- C) Kaliumi
- D) Kalciumi
- E) Magneziumi

Pyetja 106

Pacientia 73 vjeç, me diabet tip II, qe trajtohet me insuline, gjendet nga familjaret pa ndjenja para TV dhe dergohet ne urgjence. Aty regjistrohen këto te dhena: pacientja ne gjendje kome, qe i pergjigjet vetem stimujve te dhimbshem, TA 90/70 mmHg, puls

- A) Intubimi i pacientes dhe ventilimi mekanik
- B) Infuzioni venoz i 50ml glukoze 20%

- C) Infuzioni me solucion NaCl 0.9%, 2l/ore
- D) Vendosja e një pace-maker te perkohshem ne pritje te atij perfundimtar
- E) Infuzioni i dopamines 7mcg/kg/min

Pyetja 107

Cili nga elementet e mëposhtëm perben kunderindikacion relative ne terapine me digitalike ?

- A) Terapia me kortikosteroide
- B) Hemibloku anterior i majte
- C) Hipertireoza
- D) Hipokalemia
- E) Terapia me spironolakton

Pyetja 108

Pulsi i dobët është karakteristike e të gjitha sëmundjeve të mëposhtme përveç:

- A) Shokut kardiogjen
- B) Stenozes se aortes
- C) Hipertensionit arterial sistolo-diastolik
- D) Perikarditit
- E) Infarktut akut të miokardit

Pyetja 109

Ne klasifikimin NYHA ne dekompsimin kardiak janë të vërteta te gjitha theniet e mëposhtme përveç njerës:

- A) Ne shkallen e pare nuk ka kufizim te aktivitetit fizik
- B) Prania e dhimbjeve anginoze rrit shkallen NYHA nga III ne IV
- C) Edema e kaviljeve nuk perben kriter klasifikimi
- D) Ne shkallen IV shenjat e dekompsimit kardiak janë te pranishme edhe ne qetesi
- E) Ne shkallen II pacientet janë asimptomatik ne qetesi

Pyetja 110

Metoda me e mirë per te diagnostikuar steatorrene është:

- A) Testi i sakarozes
- B) Testi i ksilozes
- C) Dozimi i kriperave biliare
- D) Biopsia intestinale
- E) Dozimi i yndyrnave ne fece

Pyetja 111

Diabeti tip I karakterizohet nga te gjitha theniet e mëposhtme përveç:

- A) Rritja ne peshe
- B) Polifagi
- C) Poliuri
- D) Polidipsia
- E) Dhimbje abdominale

Pyetja 112

Akromegalia është :

- A) Një osteopati e artikulacioneve
- B) Hipersekrecion kronik i GH, pas pubertetit
- C) Një organomegali ne lartesi te medha
- D) Një forme e rende hipomaniakale
- E) Policitemia e aviatoreve

Pyetja 113

Një burrë 75 vjeç , vdes nga dekompenimi i insuficiences kardiake kongjестive. Ne anamneze ka histori te hipertensionit arterial per një kohe te gjate dhe ndonjë episodi anginoz ne efort. Ne autopsi u vu re hipertrofi koncentrike e ventrikulit te majte,

- A) Perfundimi ciktricial i një infarkti te miokardit
- B) Prolapsi mitral
- C) Kardiomiopatia aritmogjene
- D) Kardiomiopatia e dilatuar
- E) Kardiopatia iskemike kronike

Pyetja 114

Ne cilën nga patologjite e mëposhtme vihet re dyfishium i toneve kardiake ?

- A) Ne hipertensionin pulmonar
- B) Ne stenozen e aortes
- C) Ne stenozen mitrale
- D) Ne prezence te bllokut te deges se djathte
- E) Ne aneurizmen e aortes ascendente

Pyetja 115

Ne cilën nga patologjite e mëposhtme vihet re ne kuadrin radiologjik te kolones vertebrale, imazhi tipik i shkopit te bambuse ?

- A) Sindromin Reiter
- B) Spondilitin ankilozant
- C) Artritin rheumatoid
- D) Enteroartritin
- E) Sindromi Sjogren

Pyetja 116

Ne cilën nga këto sëmundje vihen re eritrocite ne formen e tabeles se qitjes ?

- A) Anemia hemolitike autoimmune
- B) Morbus Addison
- C) Leukemia akute
- D) Limfoma non Hodgkin
- E) Talasemia

Pyetja 117

Tek një burrë 35 vjeç, alkolist kronik , me diabet mellitus, me hepatosplenomegali, hiperpigmentim kutan dhe insuficiencë kardiake, cila nga këto diagnoza është më e mundshme?

- A) Pankreatiti akut
- B) Hemokromatoza
- C) Morbus Addison
- D) Cirroza biliare primare
- E) Neoplazia endokrine multiple tip I (MEN I)

Pyetja 118

Specifiteti i një testi diagnostik do të thotë:

- A) Te japi të njëjtin rezultat në kampione të ndryshëm
- B) Mosdhenia e rezultateve fals negative
- C) Mosdhenia e rezultateve fals pozitive dhe negative
- D) Mosdhenia e rezultateve fals positive
- E) Te qenit specifik për atë lloj dyshimi

Pyetja 119

Ekzaminimi i cili përdoret për konfirmimin e angines së qendrueshme është :

- A) EKG
- B) Koronarografia
- C) Kateterizimi i arterive koronare
- D) Ventrikulografia
- E) Testi i efortit

Pyetja 120

Te gjitha theniet e mëposhtme janë të vërteta për karcinomen e ezofagut përveç:

- A) Hernia hiatale përben qartë një faktor risku
- B) Prek më shpesh segmentin inferior të ezofagut

- C) Incidence me e madhe është tek meshkujt (raporti mashkull/femer - 3/1)
- D) Disfagia progressive është shpesh prezente
- E) Risku me i larte per tu prekur është tek fumatoret se sa tek jofumatoret

#### Pyetja 121

Një burrë 39 vjeç referon një dhimbje në fjanë të majtë pak orë pas një trauma në hipokondrin e majtë. Ekzaminimi objektiv rezulton normal. TA 100/65 mmHg, Frekuenca kardiale 86/min, në analizat e urines vëhet re prania e eritrociteve 6-7/fushe. Cila nga

- A) Qëndrimi në pritje
- B) Urografia
- C) Ekografia renale
- D) CT
- E) Shintigrafia

#### Pyetja 122

Pacienti 35 vjeç, alkolist paraqitet në urgjencë me dhimbje të forta periumbilikale dhe epigastrike e cila irradionet deri në nivelin e 1/3 të poshtme të toraksit. Cila nga diagnozat hipotetike është më e mundshme:

- A) Ulçera gastrike
- B) Sëmundje e kolonit transvers
- C) Ulçera duodenale
- D) Sëmundje të kolonit descendente
- E) Pankretiti akut

#### Pyetja 123

Në anemine të shkaktuara nga mungesa e hekurit cila nga ekzaminimet vlerëson gjendjen e depozitës së hekurit në organizëm:

- A) Ferritinemia serike
- B) Hemoglobinemia
- C) Hemoglobina korpuskulare e mesme
- D) MCV
- E) Transferina serike

#### Pyetja 124

Në të moshuarit mund të shkaktojnë ulje të degjimit:

- A) Infarkti i miokardit
- B) Arteropatia obliterante e anësive inferiore
- C) Hernia hiatale
- D) Koliti ulçeroz
- E) Arteriti i Hortonit



Pyetja 125

Tek policitemia vera vihet re:

- A) Ulje e nivelit te hemoglobines dhe nr. te eritrociteve
- B) Rritja ose ulja e nivelit te hemoglobines dhe zvogelim i mases se eritrociteve
- C) Ulja e nivelit te hemoglobines dhe zvogelim i mases se eritrociteve
- D) Rritja e nivelit te hemoglobines dhe zvogelim i mases se eritrociteve
- E) Rritja e nivelit te hemoglobines dhe nr. te eritrociteve

Pyetja 126

Ne diagnozen etiologjike te hipotiroidizmit është e nevojshme te vleresohet:

- A) Estradioli
- B) Tireoglobulina
- C) Autoantikorpset antitireoglobuline e anti TPO
- D) fT3
- E) rT3

Pyetja 127

Ne me te shumten e rasteve këto acidoza shfaqet si komplikacion i:

- A) Diabetit insipid
- B) Diabetit tip 2
- C) HTA
- D) Diabetit tip 1
- E) Hipertiroidizmit

Pyetja 128

Një femer 23 vjeçare diagnostikohet me anemi mikrocitare. Cilat nga shkaqet e mëposhtme është me e mundshme ?

- A) Alfa talasemia
- B) Beta talasemia major
- C) Hemoragjia kronike
- D) Deficit i folateve
- E) Deficit i vit B12

Pyetja 129

Përveç PaO<sub>2</sub> qe është faktor determinant ne saturimin e Hb ne nivel te gjakut arterial, cili është faktor tjetër determinant ?

- A) Perqendrimi i O<sub>2</sub> ne ajrin e inspiruar (FiO<sub>2</sub>)
- B) pH, glicemia, perqendrimi i 2,3 DPG ne rruazat e kuqe
- C) pH, Pa CO<sub>2</sub>, Temperaturë, perqendrimi i 2,3 DPG ne rruazat e kuqe

- D) FiO<sub>2</sub>, ventilimi, difuzioni dhe perfuzioni
- E) FiO<sub>2</sub>, ventilimi, raporti ventilim- perfusion

Pyetja 130

Te gjitha situatat e mëposhtme mund te shkaktojne hipernatremi, përveç:

- A) Ushqimi me sonde
- B) Diabeti insipid
- C) Diuretiket e tepert
- D) Hipokortikosurenaloma
- E) Polidipsia e te moshuarit

Pyetja 131

Ne insuficiencen renale akute te tipit funksional pesha specifike e urines është:

- A) E ulet
- B) E ndryshueshme
- C) E rritur
- D) Kushtezohet nga prania e cilindrave
- E) E pamatshme

Pyetja 132

Ne leucemine limfatike kronike gamaglobulinat janë :

- A) Normale
- B) Mungojne
- C) Te ulura
- D) Te rritura
- E) Shumë te rritura

Pyetja 133

Një grua 52 vjeç , alkoliste prej shumë vitesh, ankon per dhimbje abdominale rekurente këto muajt e fundit.CT tregon pranine e një mase kistike me diameter 7-8cm ne bishtin e pankreasit. Cila është diagnoza me e mundshme ?

- A) Pankreatit akut
- B) Karcinoma metastatike
- C) Adenokarcinoma e pankreasit
- D) Pseudokiste pankreatike
- E) Adenoma insulare

Pyetja 134

Një burrë 30 vjeç, paraqitet në urgjencë me shenjat e abstinencës nga heroina ose opiate të tjera. Ka të gjitha shenjat e mëposhtme përveç njëra:

- A) Diarre
- B) Dhimbje muskulare
- C) Rinorea
- D) Hipertermi
- E) Mioze

Pyetja 135

Cili nga komplikacionet renale mund të shfaqet gjatë dekursit të amiloidozes ?

- A) Insuficiencia renale
- B) Ptoza renale
- C) Kalkuloza renale
- D) Karcinoma renale
- E) Sindromi nefrotik

Pyetja 136

Cili nga infeksionet kongenitale mund të dyshohet tek një i porsalindur me mikrocefali, kalcifikime cerebrale, korioretinit ?

- A) Toksoplazmoza
- B) Herpes simplex virus
- C) Varicella zoster virus
- D) Rubeola
- E) Citomegalovirusi

Pyetja 137

Cili nga parametrat laboratorike duhet monitoruar në mënyrë strikte në fund të terapise farmakologjike të encefalopatisë hepatike ?

- A) Kalemia
- B) Uremia
- C) Glicemia
- D) Transaminazat
- E) Kreatinemia

Pyetja 138

Cila nga shenjat elektrokardiografike është karakteristike e fibrilacionit atrial ?

- A) Q-T e gjatë

- B) Subdenivelim e segmentit ST
- C) Mungesa e vales P
- D) Interval PR>0.20 msc
- E) QRS e ngushte

Pyetja 139

Fremitus vokalis është i dobësuar në të gjitha rastet përveç

- A) Kondesamenti i pulmonit me bronket e vogla
- B) Versamenti pleural
- C) Pneumotoraksit
- D) Obstruksioni i bronkeve
- E) Emfizema

Pyetja 140

Frederiku është një 19 vjeçar ushtar. Perpara një jave ka patur dhimbje fyti dhe Temperaturë 38-38,5C, për 3-4 dite. Mjeku i batalionit i ka rekomanduar vetëm antipiretike. Dje ka vënë re disa limfonodula laterocervikal dhe subcervikal bilateral, pak të

- A) Patologji sistematike infektive
- B) Infeksion kronik
- C) Metastaza të një neoplazie solide
- D) Limfoma malinje
- E) Reaksion adenopatik të një patologjie me lokalizim akut (psh abscess)

Pyetja 141

Cila nga këto sëmundje shoqërohet më shpesh me aneurizem të koronareve ?

- A) Skarlatina
- B) Sëmundja Kawasaki
- C) Sëmundje reumatizmale
- D) Artriti reumatoid
- E) Endokarditi bakterial

Pyetja 142

Hipokalcemia është një komplikacion i pashmangshëm :

- A) Pas efortit fizik
- B) Hipogonadizem
- C) Pas menopauzes jatrogjene
- D) Pas tiroidektomise totale
- E) Gjate trajtimit me anksiolitike

Pyetja 143

Cila nga enzimata merr pjese ne procesin vaskular te ereksionit ?

- A) NO sintetaza + fosfodiesteraza
- B) Hidroksilaza
- C) Peroksidaza
- D) Aromataza + hidroksilaza
- E) Transferaza

Pyetja 144

Te gjitha janë shkaktare te dekompensimit kardiak përveç:

- A) Anemia
- B) Terapia insulinike
- C) Marrja e medikamenteve inhibitore te prostaglandines
- D) Aritmia me frekuence te larte
- E) Pneumonia

Pyetja 145

Vala T e rritur, me ST te subdeniveluar, me zvogelim dhe largim te vales P, bllok A-V, deformim i QRS, bradikardi, ritëm nodal, fibrilacion ventrikular janë te gjitha shenjë te:

- A) Hipokalemise
- B) Hiperkalcemise
- C) Hipertiroidizmit
- D) Hiperkalemise
- E) Hipomagnezemise

Pyetja 146

Tek një pacient ne gjendje kome indikohet ushqimi:

- A) Parenteral periferik
- B) Parenteral qendror
- C) Nga goja gjysem te forta
- D) Enteral me sonde
- E) Ushqim i lengshem nga goja

Pyetja 147

Cila nga shkaqet e mëposhtme te isuficiences renale akute do te klasifikohet si postrenale?

- A) Insuficiencia kardiake
- B) Kalkulat

- C) Septicemia
- D) Rabdomioliza
- E) Glomerulonefriti akut

Pyetja 148

Skorbuti është një gjendje e:

- A) Deficit i Vit C
- B) Malnutricioni proteinik
- C) Malnutricioni proteinik-energjitik
- D) Deficit i Vit D
- E) Deficit i fosfateve

Pyetja 149

Cili nga parametrat e mëposhtme është me sensitiv ne nefropatine diabetike ?

- A) Kreatinemia
- B) Albuminuria
- C) Klirenci i kreatinines
- D) Testi i tolerances se glukozes
- E) Ekografia renale

Pyetja 150

Cili nga medikamentet e mëposhtme nuk shkakton hipnoze ne anestezi total ?

- A) Ketamina
- B) Propofoli
- C) Midazolami
- D) Tiopentali ne trajte kripte
- E) Mivacurium

Pyetja 151

Një 21 vjeçar ankon per cefale, polidipsi dhe poliuri, ka hipokalemi dhe vlera te larta te renines plazmatike. CT abdominale tregon per pranine e një mase 2cm ne polin superior te veshkes se djathte. Veshka e majte është normal. Diagnoza me e mundshme është

- A) Tumor i qelizave juksta-glomerulare
- B) Feokromocitoma
- C) Karcinoma e korteksit surenalien
- D) Aldosteroma
- E) Karcinoma me qeliza te qarta

Pyetja 152

Ne një pacient me episode sinkopale, bllok atrio-ventrikular i plote dhe kriza te shpeshta te takikardise atriale është e nevojshme:

- A) Implantimi i një pace-maker ventrikular
- B) Dhenia e beta-blokuesit
- C) Dhenia e verapamilit
- D) Dhenia e digitalikut
- E) Dhenia e amiodaronit

Pyetja 153

Ne poliurine hipotonike pesha specifike e urines është :

- A) 1020-1030
- B) Mbi 1030
- C) 1010-1020
- D) 1010
- E) Me pak se 1006

Pyetja 154

Cili nga pohimet e mëposhtme është i vertete ne një pacient me hiperkalcemi nga sarkoidoza ?

- A) Rg e toraksit është gjithmone normale
- B) Kalciuria është normale
- C) Perthithja intestinale e kalciumit është e rritur
- D) Niveli i PTH serik është i rritur
- E) Shpesh është e pranishme hipogamaglobulinemia

Pyetja 155

Te gjitha theniet e mëposhtme per insuficiencen renale akute janë të vërteta përveç:

- A) Ne fazen funksionale prerrenale ekskretimi i Na dhe pesha specifike e urines janë te ruajtura
- B) Nekrotizimi i epitelit tubular është me i shpejte ne format toksike dhe me i ngadalte ne ato iskemike
- C) Ne fazen funksionale prerrenale shfaqet një vazokonstriksion i zones kortikale
- D) Ne fazen akute është e pranishme hipokalemia
- E) Ne urine vihet re prania e cilindrave granuloz dhe tubular

Pyetja 156

Një nder komplikacionet me te shpeshta te divertikulozes se kolonit është:

- A) Okluzioni intestinal nga perdredhja
- B) Fistula colo-vezikale
- C) Fistula enterokutane

- D) Fistula anale
- E) Koliti iskemik

Pyetja 157

Ne patologjite obstruktive te rrugeve respiratore me FEV dhe CV ndodh:

- A) Rritet FEV , ulet CV
- B) Te dyja ulen
- C) Rriten te dyja
- D) Ulet FEV, rritet CV
- E) Nuk alterohen

Pyetja 158

Cili nga veset kardiake mund te shkaktoje me shpesh hemoptoe ?

- A) Insuficiencia trikuspidale
- B) Duktus Botali apertus
- C) Insuficiencia aortale
- D) Stenoza mitrale
- E) Koarktacioni i aortes

Pyetja 159

Perparesite e aktivitetit fizik te kontrolluar vihen re me teper:

- A) Ne pacientet me HTA
- B) Tek diabetiket
- C) Ne obeze
- D) Ne dislipidemi
- E) Ne te gjitha pergjigjet

Pyetja 160

Ne artritin reumatoid nuk preket:

- A) Kavalja
- B) Kyci
- C) Shpatulla
- D) Artikulacioni sakro-iliak
- E) Berryli

Pyetja 161

Ushtrimet fizike te zgjatura dhe te perseritura:



- A) Rrisin HDL- kolesterolin
- B) Ulin kolesterolemine
- C) Kanë te gjitha efektet e treguara
- D) Permirësojne tolerancën glucidike
- E) Permirësojne BMI ( body mass index)

Pyetja 162

Cili është shkaku më i zakonshëm i disfunkcionit eréctil ?

- A) Depresioni
- B) Edukimi,eksperienca,fobite
- C) Patologjite endokrine
- D) Patologjite vaskulare
- E) Patologjite neurologjike

Pyetja 163

Trajtimi i zgjedhur i mikrocitomës është:

- A) Radioterapia mbi mediastinin
- B) Hormonoterapia
- C) Polikimioterapia
- D) Terapia biologjike
- E) Kirurgjia

Pyetja 164

Cili nga kriteret e mëposhtme diferencon insuficiencën kardiake të majte nga ajo e djathtë?

- A) Enzimata hepatike të larta
- B) Edema periferike
- C) Asciti
- D) Edema pulmonare
- E) Distensioni i jugulareve

Pyetja 165

Metastazat cerebrale mund të shfaqen më shpesh në rastet e:

- A) Karcinomës pulmonare
- B) Karcinomës së pankreasit
- C) Karcinomës së vezikës
- D) Karcinomës së ovarit
- E) Karcinoma e kolonit

Pyetja 166

Cili medikament duhet të përdoret i pari tek pacientet me hiperkalemi dhe QRS të zgjeruar në EKG:

- A) Bikarbonati i natriumit
- B) Oksalate
- C) Digoksina
- D) Furasemidi
- E) Klorur kalciumi

Pyetja 167

Perqendrimi i Na<sup>+</sup> në urine në insuficiencën renale kronike në fazën stacionare është:

- A) Me pak se 20mEq/L
- B) Me e vogël se sasia e kripes së marrë me ushqim
- C) Me e madhe se sasia e marrë me ushqim
- D) E barabartë me sasinë e kripes së marrë me ushqim
- E) Konstante, mbi 300mEq/L

Pyetja 168

Cila është etiologjia më e shpëstët e insuficiencës surrenale akute ?

- A) Sindromi Sheehan
- B) Sindromi Schmidt
- C) Insuficienca sekondare e surrenales nga kortikoterapia
- D) Sindromi Friderichsen - Waterhouse
- E) Insuficienca primare e surrenales me etiologji tuberkulare

Pyetja 169

Në intoksikacionin ushqimor nga Clostridium perfringens simptomat shfaqen :

- A) Menjehere pas marrjes së ushqimit të kontaminuar
- B) 6-24 ore pas marrjes së ushqimit të kontaminuar
- C) 1-6 ore pas marrjes së ushqimit të kontaminuar
- D) 1 -2 dite me pas
- E) 93-94 dite

Pyetja 170

Sa duhet të mbahet niveli i LDL-Cholesterolit në të semuret që kanë kaluar Infarkt Miokardi?

- A) Deri në 200mg/dl
- B) Deri në 130 mg/dl
- C) Deri në 160 mg/dl

- D) Deri ne 190 mg/dl
- E) Deri ne 100 mg/dl

#### Pyetja 171

Një djale i moshes 18 vjeç ka Temperaturë, dhimbje faringeale, asteni dhe limfadenopati latero-cervikale. Ne ekzaminimin objektiv paraqet: faringo-tonsililit, petekie palatine, limfadenopati cervikale, ne rajonin axillar dhe inguinal, hepatosplenomegali. Ne ekz

- A) Streptokoku i grupit A
- B) Neisseria Gonorrhoeae
- C) CMV
- D) Mikoplazma hominis
- E) Virusi Epstein-Barr

#### Pyetja 172

Një burrë 49 vjeç shkon te mjeku i tij për shkak të një cefale mengjezore prej disa muajsh, që i pergjigjet pjesërisht terapive rastësore me AIJS. Peshë 105 kg, gjatësia 174 cm, pi 35-40 cigare në ditë, 5-6 kanace birre dhe pije alkoolike të forta çdo ditë

- A) Duhet rikontrolluar TA pas një periudhe pushimi në ambulator
- B) Nuk duhet filluar terapi antihipertensive në këtë moment
- C) Konsumi i alkoolit tek ky person ndikon në mënyrë të konsiderueshme në HTA
- D) Personi duhet të kthehet pas 1 jave për të rivilësuar TA
- E) Një hasje e vetme e tensionit diastolik 110 mmHg është e mjaftueshme për vendosjen e diagnozës

#### Pyetja 173

Rritja akute ose kronike e presionit arterial si pasojë e okluzionit të pjesës së plote të njërës ose të dyja arterieve renale ose të degëve të saj quhet:

- A) Hipertension esencial
- B) Hipertension renoparenkimatoz
- C) Hipertension okluziv
- D) Hipertension renovaskular
- E) Hipertension jatrogjen

#### Pyetja 174

Cila prej metodave të mëposhtme terapeutike nuk është shumë e keshillueshme në një të semurë obez me sindromën apne obstruktive nokturne:

- A) Rënia në peshe
- B) Shina mandibulare
- C) Kontrolli farmakologjik i vlerave të glicemise
- D) Përdorimi i CPAP
- E) Terapi kirurgjikale

Pyetja 175

Ne mungese te një rruge venoze gjate një arresti kardiak adrenalina administrohet ne rruge :

- A) Intrakardiake
- B) Intramuskulare
- C) Endotrakeale
- D) Intradermale
- E) Subkutane

Pyetja 176

Cilat janë kriteret kryesore te intubimit endotrakeal:

- A) Nxitja e ventilimit mekanik,administrimi i ushqimit parenteral,lejimi i aspirimit trakeobronkial,parandalimi i te vjellave
- B) Mbajtja hapur e rrugeve ajrore,parandalimi i inhalacionit,mbajtja e ventilimit spontan,nxitja e ekpektoratit
- C) Mbajtja hapur e rrugeve ajrore, parandalimi i inhalacionit,lejimi i ventilimit,lejimi i aspirimit trakeobronkial
- D) Parandalimi i te vjellave,administrimi i ushqimit parenteral,evitimi i distensionit gastrik,evitimi i kequshqyerjes
- E) Mbajtja hapur e rrugeve ajrore,nxitja e ventilimit dhe ekspektoratit

Pyetja 177

Sasia ditore e rekomanduar per proteinat është :

- A) 0.8 gr/kg peshe
- B) 30-40% te energjise
- C) 40-50% te energjise
- D) 1.5 gr/kg peshe
- E) 2 gr/kg peshe

Pyetja 178

Cila prej te mëposhtmeve është shenja klinike me e shpështë ne stenozen mitrale:

- A) Dhimbja prekordiale
- B) Dispne
- C) Hemoptizi
- D) Iktus
- E) Ngjirje e zerit

Pyetja 179

Te gjitha te mëposhtmet janë shkaqe te hipokalemise përveç.

- A) Alkalozia metabolike
- B) Terapia me frenues te sistemit renine-angiotenzine
- C) Sindroma Cushing
- D) Te vjella te vazhdueshme
- E) Terapia me diuretike

Pyetja 180

Një gjendje hipertensioni portal te rende perfshin te gjitha situatat e mëposhtme përveç:

- A) Splenomegali
- B) Ascit
- C) Varice ezofageale
- D) Poliglobuli dhe trombocitoze
- E) Qarkullim kolateral

Pyetja 181

Cila prej vlerave te BMI duhet te merret ne konsiderate qe një grua te quhet mbi peshe:

- A) 20-25
- B) Mbi 30
- C) 30-35
- D) Mbi 27.5
- E) 25-30

Pyetja 182

Te gjitha pohimet e mëposhtme rreth apnese obstruktive nokturne janë të vërteta përveç :

- A) Nxitet nga konsumi i alkolit
- B) Perfshin periudha te gjata hipoksie dhe hiperkapnie
- C) Janë karakteristike te obezitetit te rende
- D) Shkaktojne depresion te sistemit simpatik
- E) Faringu kolabohet lehtesisht

Pyetja 183

Trombocitopenia është një kriter i vlefshem per diagnostikimin e :

- A) Artritit rheumatoid
- B) Vaskuliti nekrotizant
- C) Mikropoliangiti nekrotizant
- D) Panarteriti nodoz
- E) Lupus eritematoz sistemik

Pyetja 184

Cila prej klasave të mëposhtme nuk është e indikuar në isheminë kardiake:

- A) Teofilina
- B) ACE-inhibitorët
- C) Antiagregantët
- D) B-blokuesit
- E) Diuretikët

Pyetja 185

Përdorimi ioterapeutik i anabolizantëve steroid mund të shkaktojë:

- A) Infertilitet
- B) Tumore hepatike beninjë dhe hepatokarcinoma
- C) Psikoza maniako-depresive
- D) Të gjitha alternativat
- E) Iktus

Pyetja 186

Me cilën prej patologjive të mëposhtme është i lidhur deficioni i Vitaminës D:

- A) Skorbuti
- B) Anemia hemolitike
- C) Anemia pernicioze
- D) Rakitizmi
- E) Kwashiorkor

Pyetja 187

Të gjitha të mëposhtmet janë faktorë rreziku për osteoporozën përveç:

- A) Menopauza e parakohshme kirurgjikale
- B) Obeziteti
- C) Terapija me fenobarbital
- D) Jeta sedentare
- E) Duhanpirja

Pyetja 188

Në cilën prej patologjive të mëposhtme kemi një rënie të peshës specifike urinare:

- A) Diabet Mellitus
- B) Diabet insipid
- C) Cirroze hepatike
- D) Hiperaldosteronizmi
- E) Hipertensioni arterial

Pyetja 189

Cila prej te dhenave te mëposhtme nuk është e pranishme ne sëmundjen e Addison:

- A) Rritja e azotemise
- B) Rritja e Kalemise
- C) Rritja e Natremise
- D) Hollimi i urines
- E) Rritja e hematokritit

Pyetja 190

Ne cilën prej sëmundjeve te mëposhtme është e pranishme hiperkalemia:

- A) Tireotoksikoza
- B) Diabet Mellitus
- C) Sindroma Gilbert
- D) Cirroze hepatike
- E) Semundja e Addisonit

Pyetja 191

Listerioza është:

- A) Sëmundje infektive e adultit immunosupresiv i shkaktuar nga një bakter gram negativ
- B) Një sëmundje ekzentematike virale
- C) Një variant klinik i mononukleozes infektive
- D) Intoksikacion kronik nga esteret fosforoorganike
- E) Sëmundje infektive tek i porsalinduri qe shkakton sepsis dhe meningit

Pyetja 192

Ne një transplant veshke perputhshmeria ABO është kusht :

- A) I domosdoshem vetem nese ka perputhshmeri te HLA
- B) Jo i domosdoshem vetem nese ka perputhshmeri te HLA
- C) I domosdoshem
- D) I pavarur
- E) I domosdoshem vetem nese ka një transplant te meparshem

Pyetja 193

Cili prej medikamenteve te mëposhtme nuk shkakton hipokalemi:

- A) Antagonistet e kalciumit
- B) Teofilina
- C) Agonistet B-adrenergjik

- D) Diuretiket
- E) Amphotericina

Pyetja 194

Cila prej patologjive shoqerohet me shpesh me HTA esencial.

- A) Fibrilacioni atrial
- B) Reduktimi i tolerances se glukozes
- C) Guta
- D) Astma bronkiale
- E) Prolapsi i valvules mitrale

Pyetja 195

Ndryshe nga shoku kardiogjen dhe shoku hemoragjik te gjitha situatat e mëposhtme hasen ne shokun septik përveç:

- A) Diureza ruhet nga vazodilatacioni renal
- B) Lekura është shumë shpesh e nxehte
- C) Shok pulmonar
- D) Është shpesh si komplikacion i KID-it
- E) Lekura është shumë shpesh e ftohte

Pyetja 196

Hipotensioni ortostatik është (zgjidh pergjigjen e gabuar):

- A) Quhet kur diferenca e TA nga shtrire-ulur është mbi 20-30 mmHg
- B) E perkufizuar normalisht si një grumbullim gjaku ne sistemin venoz periferik te ekstremiteteve inferiore dhe te trungut
- C) E shkaktuar nga një reduktim transistor i rikthimit venoz dhe per pasoje te debitit kardiak
- D) Rezulton normalisht nga aktivizimi i baroreceptoreve te harkut te aortes dhe sinuseve karotide qe aktivizojne reflekset autonome duke induktuar një takikardi provizore me normalizim te metejshem te vlerave te tensionit arterial
- E) Është ulja e TA qe verehet gjate kalimit nga pozicioni shtrire ne ulur

Pyetja 197

Cili prej ushtrimeve fizike është me i indikuar ne parandalimin dhe rehabilitimin e sëmundjeve kardiovaskulare:

- A) Anaerobike
- B) Izokinetike
- C) Aerobike
- D) Ushtrime force
- E) Ushtrime fuqie



Pyetja 198

Ne rastet e fatkeqesive natyrale duhet ti jepet prioritet:

- A) Femijeve
- B) Te gjithë atyre qe me aktivitetin e tyre mund të jenë te nevojshem ne shpetimin e njerezve te tjere
- C) Grave
- D) Njerezve te rendesishem nga pikpamja shoqerore
- E) Pleqve

Pyetja 199

Pulsi arterial qe palpohet me shpesh gjate procedurave te Basic Life Support është:

- A) Radial
- B) Popliteal
- C) Carotid
- D) Temporal
- E) Brachial

Pyetja 200

Terapia e dekompsimit kardiak perfshin perdorimin e te gjithë medikamenteve përveç:

- A) B-Blokues
- B) ACE-inhibitore
- C) Eritropoetine
- D) Statina
- E) Diuretike

Pyetja 201

Ne SPOK te riakutizuar observohet:

- A) Acidoze metabolike
- B) Hiperkalemi grave
- C) Hiperkapni pa hipoksemi
- D) Alkaloze respiratore
- E) Hipoksi dhe hiperkapni

Pyetja 202

Kuadri i repolarizimit ne EKG qe verehet tek sportivet:

- A) Konsiston ne ngritje te traktit ST

- B) Konsiston ne një rritje te nivelit te traktit ST dhe konkavitete ne pjesen e sipërme
- C) Është tregues i një miokardiopatie
- D) Është tregues i kardiopatie ishemike
- E) Është me i shpështë ne paciente me hiperkolesterolemi

Pyetja 203

Hiperparatiroidizmi sekondar ne insuficiencen renale kronike vjen si rezultat i :

- A) Rritja e fosforemise dhe ulja e kalcemise
- B) Tumor malinj i paratiroides
- C) Hipertiroidizmi
- D) Hipotiroidizmi
- E) Tumor beninj i paratiroides

Pyetja 204

Te gjitha pohimet e mëposhtme ne lidhje me ACE inhibitoret janë të vërteta, përveç:

- A) Nuk ndikojne ne gjendjen metabolike te pacientit
- B) Nuk duhen te përdoren ne paciente me terapi trombolitike
- C) Mund te pershejtojnë ecurine e insuficiences renale
- D) Ulin proteinurine e lidhur me nefropatine diabetike
- E) Duhet te përdoren me kujdes ne paciente qe marrin diuretike

Pyetja 205

Cili nga medikamentet e mëposhtme ka efekt me te madh bronkodilatator:

- A) Kortikosteroidet inhalatore
- B) Kortikosteroidet orale
- C) Teofillina
- D) Antihistaminiket
- E) Beta 2mimetiket

Pyetja 206

Ne sinkopin vazo vagal te gjithe simptomat e mëposhtme janë të vërteta përveç:

- A) Vazokonstriksion kutan
- B) Djersitje
- C) Hiperstaltike
- D) Bradikardi
- E) Dhimbja e gjoksit

Pyetja 207

Megakoloni toksik rendon një nga gjendjet e mëposhtme:

- A) Një stenoze neoplazike te kolonit
- B) Morbus Crohn
- C) Divertikulozen e kolonit
- D) Enterokolitin
- E) Rektokolitin Ulçeroz

Pyetja 208

Te gjitha pohimet e mëposhtme ne lidhje me insuficiencen respiratore janë të vërteta, përveç:

- A) Raporti ventilim\perfuzion alterohet ne SPOK dhe ne emfizeme
- B) Hipoksia është gjithmone e pranishme
- C) Kapaciteti vital ulet ne rastin e insuficiences respiratore te tipit restriktiv
- D) Difuzioni alveolar i oksigjenit është me i madh se i dioksidit te karbonit
- E) Hiperkapnia nuk është gjithmone prezente

Pyetja 209

Per diagnozen e hipogonadizmit mashkullor është e rendesishme te percaktohet:

- A) LH, testosterone dhe SHBG
- B) Perqendrimi plazmatik I testosteronit total
- C) Perqendrimi plazmatik I testosteronit te lire
- D) FSH, PRL dhe estradioli
- E) Testi i hCG per testosteronin

Pyetja 210

Karcinoma e tiroides pergjithesisht karakterizohet;

- A) Hipotiroidizem me rritje te titrit te antitropave
- B) Hipertiroidizmi
- C) Hipotiroidizmi
- D) Eutiroidizmi
- E) Ekzoftalmi

Pyetja 211

Te gjitha te mëposhtmet janë shkaqe te hiperkalemise grave, përveç:

- A) Insuficienca renale acute
- B) Alkalozia metabolike
- C) Acidoza metabolike
- D) Insuficienca renale kronike
- E) Morbus Addison

Pyetja 212

Një burrë 47 vjeç ka Temperaturë,atralgji,renie ne peshe,dhimbje abdominal,dhimbje pleuritike prej 2muajsh.Prej një jave ka vene re vështirësi ne dorsofleksion te gishtit te madh te djathte. Mjeku ka vene re një rritje te presionit arterial (150\95mmHg)

- A) Arterit gjigando-qelizor
- B) Granulomatoze alergjike
- C) Poliarteriti nodoz
- D) Granulomatoza Wegener
- E) Vaskuliti nga hipersensibiliteti

Pyetja 213

Kush percakton ne menyre me te thjeshtë dhe te besueshme ndryshimet e retensionit hidrik ne një pacient me edema?

- A) Hematokriti
- B) Pesha trupore
- C) Pesha e feceve
- D) Diureza
- E) Presioni venoz qendror

Pyetja 214

Ne insuficiencen kronike te zemres se djathte;

- A) Ulet presioni parcial i oksigjenit
- B) Volume ekstraqelizor mbetet i pandryshuar
- C) Rritet kthimi venoz
- D) Rritet shpejtesia e fluksit te gjakut venoz
- E) Ulet presioni diastolik i ventrikulit te djathte

Pyetja 215

Një pacient shtrohet per te percaktuar renien e tij ne peshe dhe ne analizen laboratorike verehet një hematokrit 30% dhe trombocitet  $1.300.000\text{mm}^3$ .Cila nga shkaqet e mëposhtme është me e shpështë ne trombocitoze?

- A) Sëmundje malinje
- B) Sëmundje mieloproliferative
- C) Sëmundje vaskulare e kolagjenit
- D) Infeksion
- E) Humbja kronike e gjakut

Pyetja 216

Cilet nga grupet e mëposhtme te medikamenteve antihipertensive duhen perdorur ne fillim ne një pacient burrë,45vjeç,qe nuk ka sëmundje te tjera shoqeruese?

- A) Nuk ka rendesi lloji i medikamenteve te zgjedhura kur arrihet te mbahet nen kontroll presioni
- B) ACE inhibitoret
- C) Diuretiket
- D) Beta bllokuesit
- E) Kalcium antagoniste

Pyetja 217

Cilet medikamente duhen perdorur ne kriza te gutes akute:

- A) Antibakteriale
- B) Alopurinoli
- C) Kortikosteroide
- D) AIJS
- E) Diuretike

Pyetja 218

Aksese kolle gjate nates,dhimbje te forta torakale dhe ngjirje zeri janë simptomat me te shpeshta qe shoqerojne:

- A) Gastritin atrofik kronik
- B) Gastritin akut
- C) Hernie hiatale
- D) Infarktin e miokardit
- E) Ulçeren gastrike

Pyetja 219

Osteomalacia karakterizohet nga:

- A) Mineralizim i pamjaftueshem i matriksit kockor
- B) Hipokalcemia
- C) Mineralizim i tepert i matriksit kockor
- D) Sasi e pamjaftueshme e materialit kockor te sintetizuar nga qelizat kockore
- E) Rritje te aktivitetit te osteoklasteve

Pyetja 220

Cili është shkaku me i shpështë i embolise pulmonare:

- A) Fibrilacioni atrial
- B) Endokarditi bakterial
- C) Abuzimi me droge
- D) Tromboza e venes cava

E) Tromboza e venave te thella te ekstremiteteve te poshtme

Pyetja 221

Një pacient i ri vjen në urgjencë me një dhimbje akute në ijën e djathtë që i përhapet në regjionin inguinal të djathtë, pacienti është shumë i axhituar, dhe nuk gjen një pozicion për të qetësuar, cila është diagnoza më e mundshme:

- A) Apendisiti akut
- B) Kolecistiti akut
- C) Kalkuloza renale
- D) Disekacioni i aortës
- E) Hernia diskale L5-S1

Pyetja 222

Cila nga pohimet e mëposhtme që lidhen me diabetin tip 2 nuk është e sakte:

- A) Shpesh lidhet me obezitetin
- B) Ndikon predispozicioni familjar
- C) Nuk trajtohet kurrë me insuline
- D) Ben pjese në sindromin metabolik
- E) Shfaqet gati gjithmonë në moshat e mëdha

Pyetja 223

Një burrë rreth 40 vjeç vuan nga diabeti mellitus, hepatomegali, dekompesim kardial dhe hiperpigmentim të lekures. Cila është sëmundja më e mundshme:

- A) Pankreatit kronik
- B) Morbus Addison
- C) Cirroze biliare primare
- D) Hemokromatoze
- E) Hipotiroidizem

Pyetja 224

Në rastin e një procedure dentare në Cilënga gjendjet e mëposhtme duhet përdorur profilaksi për endokarditin bakterial;

- A) Në të gjithë pacientët që përdorin terapi me antikoagulante
- B) Në pacientë me prolaps të valvulës mitrale
- C) Në pacientë që kanë bërë by-pass koronar
- D) Në pacientë me insuficiencë kardiakë kronike
- E) Në pacientë me ektazi të bulbit të aortës

Pyetja 225

Cili është niveli i LDL-kolesterolit që duhet mbajtur tek pacientet risk të infarktimit të miokardit:

- A) <130mg/dL
- B) <200mg/dL
- C) <110mg/dL
- D) <180mg/dL
- E) <100mg/dL

Pyetja 226

Një grua rreth 65vjeç e shtruar pas një ndërhyrje kardiokirurgjikale për zëvendësimin e valvulës mitrale, në anamnezën e saj ka një histori për sëmundje reumatizmale në moshë të re, SPOK dhe tiroidektomi të shoqëruar me terapi zëvendësuese; pacientja ka një

- A) Atak ishëmiq tranzitor
- B) Shfaqja e hipokalcemisë
- C) Shfaqja e hiperkalcemisë
- D) Shfaqja e hiperkaliemisë
- E) Shfaqja e hipokaliemisë

Pyetja 227

Te gjitha gjendjet e mëposhtme karakterizohen nga hiperkalcemia, përveç:

- A) Mieloma multiple
- B) Sarkoidoza
- C) Rritja e rezinës gjatë shkëmbimit jonik
- D) Hiperparatiroidizmi
- E) Intoksikimi me vitamina

Pyetja 228

Pankreatiti akut mund të shkaktohet nga të gjitha të mëposhtmet, përveç:

- A) Kalkuloza biliare
- B) Abuzimi me alkool
- C) Hipertrofia e pilorit
- D) Toksina si klorotiazide
- E) Nderhyrje kirurgjikale në rruget biliare ose në stomak

Pyetja 229

Sindroma e Leriche karakterizohet nga:

- A) Obstruksion i bifurkacionit të aortës
- B) Obstruksion i vena cava inferior

- C) Obstruksion i vena porta
- D) Obstruksion i vena cava superior
- E) Obstruksion i venava suprahepatike

Pyetja 230

Ne intoksikimin me monoksid karboni cila nga shfaqjet kutane është me karakteristike:

- A) Cianoze e buzeve dhe thonjve
- B) Lezione kutane eritematoze
- C) Ikter
- D) Zbehje te lekures dhe djersitje
- E) Lekure si mermer

Pyetja 231

Dhimbja anginoze është me shpesh e lokalizuar ne:

- A) Regjionin retrosternal
- B) Regjionin nen gjendren mamare te majte
- C) Hemitoraksin e djathte
- D) Epigaster
- E) Fyt

Pyetja 232

Simptomatologjia e hematomes ekstradurale shfaqet me shpesh:

- A) Menjehere mbas traumes
- B) Papritmas
- C) Mbas 48 oreve
- D) Ne faze kronike (ne distance)
- E) Mbas një periudhe qartesisie te shkurter

Pyetja 233

Te gjitha situatat e mëposhtme janë shkaktare te hiperkalemise, përveç njerës:

- A) Hemolize e kampionit te marre te gjakut
- B) Intoksikimi me digitalike
- C) Insuficienca renale akute
- D) Alkalozia metabolike
- E) Rabdomioliza

Pyetja 234



Ne sindromin e shtypjes insuficienca renale akute vjen si pasoje e:

- A) Mioglobinemise me mioglobinurise
- B) Shokut septik
- C) KID-it
- D) Shokut hipovolemik relativ
- E) Shokut hipovolemik absolut

Pyetja 235

Ne traumat e shkaktuara nga frenimi, cila është zona e aortes torakale qe preket me shpesh ?

- A) Aorta ashendente
- B) Rrenja e aortes
- C) Aorta deshendente
- D) Harku i aortes
- E) Deget supra-aortike

Pyetja 236

Cila nga situatat klinike te mëposhtme shkakton insuficienca akute te ventrikulit te djathte?

- A) Stenoza e aortes
- B) Stenoza mitrale
- C) Hipertensioni pulmonar
- D) Insuficienca e ventrikulit te majte
- E) Embolia pulmonare

Pyetja 237

Incidenca e invaginacionit intestinal është me e larte tek:

- A) I sapolinduri
- B) Midis 5-9 muajve
- C) Midis 2-3 muajve te pare
- D) Mbas vitit te pare te jetes
- E) Midis vitit te pare dhe te dyte te jetes

Pyetja 238

Cila është rruga e fillimit terapeutik tek një pacient 53 vjeçar, shtruar per angine qe ben në mënyrë të papritur humbje te koshiences, me puls qe nuk kapet dhe ne monitor shihet fibrilacion ventrikular:

- A) Nitroglicerine dhe heparine
- B) Intubim dhe ventilim me ambu
- C) Lidocaine 100 mg bolus iv
- D) Defibrilim 200 J

E) Adrenaline 1 mg bolus iv

Pyetja 239

Gjate anesteze se pergjithshme, hiperventilimi i zgjatur mund te shkaktoje:

- A) Vazodilatacion cerebral
- B) Hipertermi malinje
- C) Hiperkapni
- D) Acidoze respiratore
- E) Hipokapni

Pyetja 240

Ne një pacient te traumatizuar, me fraktura te brinjëve X-XI majtas, duhet te dyshojme per prekje te:

- A) Shpretkes
- B) Pankreasit
- C) Melcise
- D) Veshkes
- E) Vezikes

Pyetja 241

Cila nuk mund te jete shenja e menjehershme e gellitjes se një acidi:

- A) Mediastinit akut
- B) Perforacion i stomakut
- C) Perforacion i ezofagut
- D) Stenoze cikatrizale
- E) Hematemeze

Pyetja 242

Dermatomykoza furfuraca shkaktohet nga:

- A) Trikofiton mentagrofisis
- B) Kandida Albikans
- C) Pitirosporum orbikular
- D) Mikrospori audouini
- E) Chlamidia pneumonie

Pyetja 243

Recetat 'e bardha 'mbi letren drejtuar mjekut janë te vlefshme:

- A) Per një muaj, i përdorshëm jo më shumë se 3 here
- B) Per një periudhë 3 mujore, pa limit përdorimi
- C) Per një periudhë jo më shumë se 3 muaj, të përdorshme jo më shumë se 5 here
- D) Vetëm një here të vetme brenda një jave nga data e shkruar
- E) Per 6 muaj, por të përdorshme vetëm një here

Pyetja 244

Recetat speciale përdoren për përshkrimin e :

- A) Substanca dhe preparate narkotike dhe psikotrope që shënohen në tabelat e veçanta
- B) Medikamente të ciluara nga SSN për të cilat pacienti gëzon një çlirim
- C) Cdo medikament për të cilin është i detyruar përshkrimi nga mjeku
- D) Klasa e veçanta antibiotikesh
- E) Medikamente të ciluara nga SSN, veçanërisht të shtrenjta

Pyetja 245

Periudha mesatare e inkubacionit të frutitit është:

- A) 1-3 dite
- B) 5-7 dite
- C) 10-14 dite
- D) Mund të jete më shumë se 30 dite
- E) 14-21 dite

Pyetja 246

Përshkrimi i medikamenteve për indikacione të paparashikuara në skedën teknike është e mundur?

- A) Kurrë
- B) Është e lejuar pasi efikasiteti dhe toleranca janë shkencërisht të dokumentara dhe vetëm pasi është siguruar konsensusi i shkruar i pacientit, i cili është paraprakisht i informuar
- C) Gjithmone
- D) Është e lejuar pasi efikasiteti dhe toleranca janë shkencërisht të dokumentara
- E) Ndonjëherë

Pyetja 247

Dermatiti nga qëndrimi është kryesisht i lidhur me

- A) Infeksionet mykotike të lekures
- B) Infeksione bakteriale
- C) Insuficiencia arteriale
- D) Insuficiencia kardiake kronike
- E) Insuficiencia venoze

Pyetja 248

Mikrocitoma pulmonare është një neoplazi që mjekohet me:

- A) Radiokirurgji
- B) Kirurgji
- C) Radioterapi
- D) Kimioterapi
- E) Kimioradioterapi

Pyetja 249

Cilat nga te mëposhtmet nuk janë karakteristike e suindromit të apneze të gjumit ?

- A) Zgjime të shpeshta gjatë gjumit me ndjesinë e "urisë për ajër"
- B) Gerhitje
- C) Pergjumje gjatë ditës
- D) Ulje e saturimit arterial të O<sub>2</sub>
- E) Apne qendrore

Pyetja 250

Gjatë zëvendësimit të një mjeku të Mjekësisë së përgjithshme ju telefonon një pacient 68 vjeçar, me një histori të njohur për angine, që ju referon për një shtim të dhimbjes prekordiale, që i ka filluar mbas një sforcimi fizik të moderuar, që prej 30 m

- A) Të marrë vetë nitratin dhe të thoni të telefonojë, për t'u transferuar në urgjencën me të afert për ekzaminime të tjera
- B) Të thoni të paraqitet në studion tuaj për një ekzaminim objektiv me të kujdesshem
- C) Të qetesoni, duke këmbëngulur mbi patologjinë bazë, dhe të thoni të presë zhdukjen e shenjave
- D) Të thoni që të presë vizitën tuaj në banesë në fund të ditës
- E) Të marrë vetë nitratin, në pritje të zhdukjes së shenjave

Pyetja 251

Osteomieliti mund të shkaktohet nga:

- A) Vetëm nga mikroba anaerobe
- B) Nga mikroba aerobe dhe anaerobe, mykobaktere dhe funge
- C) Vetëm nga mikobaktere të vecante
- D) Vetëm nga mikroba dhe funge anaerobe
- E) Vetëm nga mikroba aerobe

Pyetja 252

Mjeku mund t'i refuzojë një dokument shëndetësor një qytetari?

- A) Po
- B) Ndonjehere
- C) Po nese është pediater
- D) Po nese është MMG
- E) Jo, nuk mund te refuzoje t'i leshoje direkt një qytetari dokumente qe flasin per gjendjen e tij shendetesore dhe duhet te perpiloje dokumentat duke vleresuar dhe garantuar vetem Të dhënaklinike qe i ka konstatuar vete.

Pyetja 253

Ne demencen primare (tipi degjerenativ), demtimi i kujteses është:

- A) Njesoj per memorien e vone dhe te larget
- B) E limituar per ngjarje vecanerisht traumatike
- C) Me pak per memorien e vone se ate te larget
- D) Me teper per memorien e vone se ate te larget
- E) Mund te paraqise karakteristika te perbashketa me te gjitha pershkrimet e mesiperme

Pyetja 254

Gjate zevendesimit te një mjeku te Mjekesise se pergjithshme ju telefonon një pacient 54 vjeçar, i cili iu referon qe është rrezuar nga një shkalle ne shtepi pak ore me pare. Gjate renies ka goditur koken me një mobilje dhe refero

- A) I kerkoni informacione te tjera pacientit dhe e siguroni per gjendjen e tij klinike, meqe nuk ka tani shenja te tjera.
- B) I kerkoni te paraqitet ne studion tuaj per një ekzaminim objektiv me te kujdesshem.
- C) I kerkoni te prese ne banesen e tij shfaqjen e mundshme te shenjave te tjera dhe t'ju ritefonoje mbas disa oresh.
- D) I keshilloni te marre 118 dhe te cohet me urgjence në urgjencëper ekzaminime te tjera dhe per një periudhe observimi.
- E) E keshilloni te shkoje me mundesite e tij tek urgjenca per një vizite neurologjike nga specialisti i turnit.

Pyetja 255

Cilet nga markuesit molekulare te mëposhtëm është i lidhur me trashegueshmerine per zhvillimin e kancerit te gjirit dhe ovarit ?

- A) Tel-2
- B) C-myc
- C) BRCA-1
- D) APC
- E) TNF

Pyetja 256

Tumori i kolonit, jep metastaza kryesisht tek:

- A) Kockat e skeletit
- B) Melci
- C) Truri
- D) Peritoneum
- E) Indet e buta

Pyetja 257

Tumori renal me i shpështë është:

- A) Tumori Wilms
- B) Adenoma
- C) Karcinoma me qeliza renale
- D) Leiomioma
- E) Leiomiosarkoma

Pyetja 258

Per ke nga neoplazite e mëposhtme nuk ekziston një procedure "screening" e miratuar?

- A) Karcinoma e prostates
- B) Karcinoma e gl. mamme
- C) Karcinoma e qafes se mitres
- D) Karcinoma e pulmonit
- E) Karcinoma e rektumit

Pyetja 259

Cili nga gjenet e mëposhtme, nese ben mutacion, është përgjegjës per sindromin kongenital te Li-Fraumeni, karakterizuar nga një rritje e sensibilitetit per zhvillimin e leukemise, limfomes, sarkomes dhe tumorit te gjirit:

- A) p53
- B) ras
- C) BRCA-1
- D) c-myc
- E) abl

Pyetja 260

Karcinoma e prostates pergjithesisht metastazon me:

- A) Pulmonin
- B) Kocka
- C) Trurin
- D) Kolonin

E) Heparin

Pyetja 261

Tumori malinj me i shpësthtë qe kap heparin është:

- A) Hepatoma
- B) Karcinoma metastatike
- C) Neuroblastoma
- D) Adenokarcinoma
- E) Kolangiokarcinoma

Pyetja 262

Cila nga këto është neoplazia malinjë me e shpësthtë e trupit te uterusit?

- A) Adenoakantoma
- B) Adenokarcinoma
- C) Koriokarcinoma
- D) Sarkoma
- E) Karcinoma me qeliza skuamoze

Pyetja 263

Cila nga këto neoplazi te orofaringut është konsideruar e lidhur me virusin Epstein-Barr?

- A) Hemangioma nazale
- B) Papilloma squamoze vestibulare
- C) Angiofibroma e re e rinofaringut
- D) Granuloma malinjë e hundes
- E) Karcinoma rinofaringeale

Pyetja 264

Sistemi TNM:

- A) Tregon gjendjen e pergjithshme te pacientit
- B) Tregon shkallen histologjike te malinjitetit
- C) Tregon shtrirjen e sëmundjes
- D) Tregon efikasitetin e mundshem te trajtimit
- E) Tregon aktivitetin proliferativ te neoplazise

Pyetja 265

Tipike është shoqërimi i akantozes nigricans me një paraneoplazi te:

- A) Leukoza akute mieloide

- B) Mastocitoza sistemike
- C) Sarkoma Ewing
- D) Karcinoma e qafes te uterusit
- E) Adenokarcinoma gastrike

Pyetja 266

Ne cilën nga këto neoplazi mund të clirohet një sekretim hormonal i papershtatshem i gonadotropinave që kon në një pubertet prekoks tek mashkulli?

- A) Hepatoma
- B) Karcinoma bronkiale
- C) Karcinoma e ezofagut
- D) Karcinoma renale
- E) Feokromocitoma

Pyetja 267

Cili nga kushtet e mëposhtme është i lidhur në mënyrë tipike me lizen tumorale ?

- A) Hipokalemia
- B) Hipertrigliceridemia
- C) Hiperuricemia
- D) Hipokalcemia
- E) Hipofosforemia

Pyetja 268

Kush nga pohimet e mëposhtme është i sakte lidhur me seminomen e testikutit ?

- A) Tregon shumë shpesh markues tumorale
- B) Është radiosensibile por jo kimiosensibile
- C) Është kimiosensibile por jo radiosensibile
- D) Është e nevojshme siguria histologjike para kryerjes së inguinitomisë
- E) Është radio-kimio sensibile

Pyetja 269

Te gjitha pohimet e mëposhtme për trajtimin kimioterapeutik si linjë e parë në karcinomen ovariale të avancuar janë të gabuara përveç njëres:

- A) Kemi përgjigje në më pak se 20% të rasteve
- B) Është shumë aktive në pjesën më të madhe të pacientëve
- C) Mund të përdorim ilaçe të tilla si metotrexate dhe bleomicine
- D) Ka të njëjtin efikasitet si radioterapia
- E) Është e indicuar në pacientë me receptore estrogenike negative

Pyetja 270



Hiperkalcemia ne pacientet me neoplazi:

- A) Është rrjedhoje e clirimit paraneoplazik te një molekule te ngjashme me parathormoni
- B) Është crregullim metabolik jashtezakonisht irrallë
- C) Është gjithmone asimptomatike
- D) Është rrjedhoje e prodhimit paraneoplazik te një molekule te ngjashme me kalcitoninen
- E) Është e rrallë ne kancerin e gjirit

Pyetja 271

Cili tumor i traktit intestinal ka prognozen me te keqe ?

- A) Karcinoidi i apendixit
- B) Karcinoma e kolonit
- C) Karcinoma e intestinit
- D) Karcinoidi i intestint
- E) Karcinoma e ezofagut

Pyetja 272

Metastazat kockore gjenden kryesisht ne:

- A) Karcinomen e ovarit
- B) Karcinome e gl. mamare
- C) Sarkoma e Ewing
- D) Karcinome e prostates
- E) Seminoma

Pyetja 273

Te gjitha te mëposhtmet janë medikamente imunosupresore me shpesh te perdorura përveç:

- A) Ciklofosfamide
- B) 6-merkaptourina
- C) Metotrexate
- D) Azatioprina
- E) 5-hidroksitriptamina

Pyetja 274

Cili nga indikatorët klinike te mëposhtëm perben risk relativ madhor per te zhvilluar karcinome te gl mamare?

- A) Menarke e hershme
- B) Me pak se tre gravidanca ne terme
- C) Anamneze familjare per karcinome te gl mamare

- D) Me shumë se tre gravidanca te perfunduara
- E) Mosushqyerje me gji

Pyetja 275

Cili është faktori kryesor prognostik në karcinomën e gjirit të operuar në mënyrë radikale?

- A) Moshë
- B) Mutacioni i BRCA 1 (breast cancer)
- C) Prekja e limfonodjeve
- D) Përdorimi i estroprogesterinikëve
- E) Dimensionet e tumorit

Pyetja 276

Simptoma e hershme më e shpeshtë e një tumori të ezofagut është:

- A) Rektorragjia
- B) Disfonia
- C) Hematemeza masive
- D) Disfagia
- E) Ethe e shtuar

Pyetja 277

Asbesti është përgjegjës për cilin tumor profesional ?

- A) Kanceri i vezikës
- B) Mezotelioma
- C) Hepatokarcinoma primitive
- D) Karcinoma e prostatës
- E) Karcinoma e veshkës

Pyetja 278

Kompresioni medular është:

- A) Kompresioni i palcës kockore
- B) Një efekt jatrogjen i terapisë hormonale
- C) Një komplikacion i trajtimeve kimioterapeutike
- D) Kompresioni medulës spinale
- E) I shpeshtë në leukeminë akute

Pyetja 279

Hetimet e depistimit

- A) Kërkojnë praninë e një neoplazie specifike në një popullatë të shëndetshme me risk për atë neoplazi
- B) Vlerësojnë përhapjen e një neoplazie pas një ndërhyrjeje kirurgjikale
- C) Kërkojnë metastaza eventuale përpara një ndërhyrjeje kirurgjikale
- D) Kërkojnë praninë e një neoplazie specifike në subjekte me simptoma për atë neoplazi
- E) Bëjnë pjesë në parandalimin primar të tumoreve

Pyetja 280

Cili prej këtyre është një tumor lidhor benignj?

- A) Cistoadenoma
- B) Fibroma
- C) Liposarkoma me qeliza të rrumbullakta
- D) Neurofibrosarkoma
- E) Adenokarcinoma

Pyetja 281

Në onkologji, terapia ndihmëse (adjuvante) është:

- A) Administrohet për të përmirësuar cilësinë e jetës së pacientit onkologjik
- B) Administrohet pas trajtimit loko-regjional për të ulur rrezikun e metastazave
- C) Përdoret për të reduktuar nauzenë e shkaktuar nga kimioterapia
- D) Përdoret për të reduktuar toksicitetin e terapisë onkologjike
- E) Përdoret për të ulur masën tumorale

Pyetja 282

Cili nga ekzaminimet instrumentale të mëposhtme nuk përdoret për karakterizimin e metastazave kockore ?

- A) Shintigrafia kockore
- B) Ekografia
- C) Radiografia
- D) TAC
- E) RMN

Pyetja 283

Cili nga pohimet e mëposhtme që kanë të bëjnë me adenokarcinomën e pankreasit është i gabuar?

- A) Simptoma fillestare më e shpeshtë është një ikter obstruktiv
- B) Pjesa më e madhe e tumoreve është e lokalizuar në kokën e pankreasit
- C) Moshë mesatare e pacientëve të prekur është ndërmjet 60 dhe 70 vjet
- D) Pjesa më e madhe e pacientëve ka një masë tumorale të trajtueshme kirurgjikisht
- E) Mbijetesa përtej dy viteve që nga diagnostikimi është e pazakontë

Pyetja 284

Sarkomat metastazojnë më shumë me rrugë:

- A) Limfatike
- B) Intraperitoneale
- C) Per continuitatem
- D) Likid cerebrospinal
- E) Hematologjike

Pyetja 285

Karcinoma e qafës së uterusit shoqërohet në më shumë se 95% të rasteve me infeksione nga:

- A) Virusi Epstein-Barr (EBV)
- B) Papilomavirus humane (HPV)
- C) Virusi herpetik i tetë (HHV8)
- D) Nesseria gonorrea
- E) Candida albicans

Pyetja 286

Rruga më e përdorshme për administrimin trajtimeve citostatike është:

- A) Rektale
- B) Orale
- C) Subkutane
- D) Endovenoze
- E) Loko-regionale

Pyetja 287

Cila nga simptomat e mëposhtme është zakonisht e pranishme në kancerin e collon ascendens ?

- A) Inkontinenca
- B) Tenezma
- C) Dhimbja abdominale e tipit peristaltik
- D) Malabsorbimi
- E) Diarrea ose pseudodiarrea

Pyetja 288

Cila nga këto neoplazi është e karakterizuar nga sekretimi i shtuar i gonadotropinës korionike humane ?

- A) Hemangioma
- B) Cistoadenoma seroze
- C) Adenokarcinoma e endometrit
- D) Leiomioma
- E) Korionkarcinoma

Pyetja 289

Stadifikimi i tumorit të pulmonit:

- A) Nuk mund të përcaktohet nga vlerësimi i markuesve tumoralë
- B) Kërkon shpesh TAC dhe bronkoskopi
- C) Është e indikuar vetëm në pacientët duhanpirës
- D) Ka nevojë për një laparotomi dhe një proces kompleks
- E) Nuk përfshin shintigrafinë kockore

Pyetja 290

Markuesit tumoralë janë:

- A) Faktorë parashikues të përgjigjes ndaj kimioterapisë
- B) Tregues prognostikë në neoplazi të veçanta
- C) Tregues pak a shumë specifikë të pranisë së një neoplazie
- D) Tregues të aktivitetit proliferues
- E) Tregues të masës tumorale

Pyetja 291

Cila nga pjesët e mëposhtme të traktit gastroenterik është vendi më i zakonshëm i limfomave malinjë ?

- A) Rektumi
- B) Duodeni
- C) Stomaku
- D) Apendiksi
- E) Cekumi

Pyetja 292

Cili nga faktorët etiologjikë të mëposhtëm është i përfshirë në fillimin e kancerit të collon rectum ?

- A) Tymi i duhanit
- B) Dietë e pasur me acide yndyrore
- C) Dietë e pasur me ushqime të gjalla
- D) Ushqyerje hipokalorike
- E) Ushqyerje shumë e pasur me fruta dhe perime

Pyetja 293

Anemia e shoqëruar me karcinomën e prostatës në fazë të avancuar i detyrohet:

- A) Mungesa e hekurit
- B) Metastazave kockore të përhapura
- C) Mungesa e folateve
- D) Terapia antiandrogjenike
- E) Terapia anabolizante

Pyetja 294

Markuesi tumoral më i përdorshëm në neoplazitë e collon rectum është:

- A) PSA
- B) CA 125
- C) CA 15-3
- D) CEA
- E) Kromogranina

Pyetja 295

Një burrë i prekur prej 10 vitesh nga koliti ulçeroz i rektumit, ka një probabilitet të shprehur në përqindje për të zhvilluar kancer të barabartë me:

- A) 20%
- B) 4%
- C) 40%
- D) 0%
- E) 10%

Pyetja 296

Toksiciteti dozë-grumbullues më i shpeshtë shoqërues i terapisë me antraciklinë është;

- A) Retinik
- B) Kardiak
- C) Neurologjik
- D) Nefrologjik
- E) Hepatik

Pyetja 297

Në një karcinomë të kuadrantit supra ekstern të gjirit dx (cT1NO), cili prej interveneteve të mëposhtëm nuk i përgjigjet kriterëve të radikalitetit ?

- A) Mastektomia sipas Patey

- B) Mastektomia sipas Halstead
- C) Lumpektomia me heqje të limfonodulit "roje" dhe radioterapi mbi mamelën dx të mbetur
- D) Nodulektomia me 2 cm margo, limfadenektomia aksilare dhe radioterapia mbi mamelën e mbetur
- E) Kuadrantektomia supra eksterne

Pyetja 298

Cila nga neoplazitë e mëposhtme të sferës gjenitale femërore ka incidencë më të madhe në shkallë botërore ?

- A) Karcinoma e vaginës
- B) Kanceri i endometrit
- C) Karcinoma e vulvës
- D) Kanceri i qafës së uterusit
- E) Tumori i ovarit

Pyetja 299

Cila është neoplazia solide më e shpeshtë tek subjektet meshkuj ndërmjet 20 dhe 35 vjeç ?

- A) Karcinoma
- B) Sarkoma e Ewing
- C) Melanoma
- D) Tumori me qeliza germinale
- E) Glioblastoma

Pyetja 300

Cila prej këtyre neoplazive mund të japë një sekretim të papërshtatshëm të ADH ?

- A) Fibrosarkoma retroperitoneale
- B) Karcinoma surenaliene
- C) Karcinoma bronkiale me qeliza në formë "të kokrrës së tërshërës"
- D) Feokromocitoma
- E) Hepatoma

Pyetja 301

Efektet anësore më të zakonshme të trajtimeve citostatike janë:

- A) Takikardia, hipertensioni, ekstrasistola, kollë, konstipacion
- B) Sterilitet, dermatit
- C) Cistit, neuropati periferike, paralizë e ileumit
- D) Otagjia, rinorhea, konjuktivit
- E) Alopecia, nauzea, të vjella, diarrea, leukopenia

Pyetja 302

Mikrocitoma pulmonare është një neoplazi që mjekohet me:

- A) Kirurgji
- B) Kimioradioterapi
- C) Radioterapi
- D) Kimioterapi
- E) Radiokirurgji

Pyetja 303

Një person i prekur nga kleptomania:

- A) zakonisht ka para për të paguar atë që vjedh
- B) e ka të pamundur ti rezistojë vjedhjes të objekteve me pak vlerë monetare
- C) nuk i përdor objektet e vjedhura
- D) të gjitha
- E) nuk ka bashkëpunorë

Pyetja 304

Gjate sinkopit vaso-vagal, vihet re:

- A) Hipertoni vagale akute
- B) Stimulum i refleksit simpatik
- C) Reduktim i prurjes kardiake
- D) Te gjitha

Pyetja 305

Morbus Graves:

- A) Eshte nje forme e hiperfunksionimit surrenalien
- B) Eshte nje forme e hipotiroidizmit me etiologji autoimune
- C) Eshte nje forme e hipertiroidizmit
- D) Eshte nje forme e hipotiroidizmit me etiologji infektive

Pyetja 306

Pankreatiti akut me nekroze te infektuar:

- A) Ka prognoze te njejte me pankreatitin infeksioz
- B) Nuk kerkon mjekim me nderhyrje kirurgjikale
- C) Eshte rasti qe kerkon vetem mjekim me inhibitore te proteazes
- D) Eshte rasti qe lejon ushqyerjen normale
- E) Asnjera

Pyetja 307

Ne cilin nga rastet e meposhtme me insuficience respiratore, eshte gjithnje i rritur PaCO<sub>2</sub>:



- A) Ne insuficiencen ventilatore te pompes
- B) Ne insuficiencen e shkembimit te gazeve ne mushkeri
- C) Ne papershtatshmerine e arritjes, transportit, perdorimit te oksigjenit
- D) Te gjitha

Pyetja 308

Demtmet qe mund te shfaqen nga nje radio terapi jane:

- A) Proporcionalisht me dozen e administruar
- B) Proporcionale me llojin e fraksioneve
- C) Proporcionale me zgjatjen e radio terapise
- D) Proporcionale me siperfaqen e rezatuar te indit
- E) Te gjitha

Pyetja 309

Ne cilen nga alternativat, shtrimi ne spital i nje pacienti me anemi kronike eshte i justifikuar:

- A) Pacient me angina pectoris
- B) Pacient me alterim te gjendjes mendore
- C) Pacient me nivel te Hb < 7 g/dl
- D) Pacient me pancitopeni te sapo diagnostikuar
- E) Te gjitha

Pyetja 310

Per te trajtuar disfunktionin erektil ne pacientet me hipogonadizem, perdoret fillimisht:

- A) Inhibitori i 5-fosfodiesterazes (sildenafil)
- B) Inhibitori i 5-fosfodiesterazes pas testosteronit transdermik
- C) Testosteron me rruge orale + Inhibitori i 5-fosfodiesterazes
- D) Psikoterapi
- E) Asnjera

Pyetja 311

Te semuret me reflux gastro ezofageal:

- A) Kane vetem shqetesime simptomatike
- B) Duhet te konsumojne sasi te medha karamelje me mente dhe cokollata
- C) Kane nje risk te dyfishuar per astma, SPOK, fibroze pulmonare
- D) Nuk kane risk te larte per neoplazi
- E) Te gjitha

Pyetja 312

Tek nje person me Diabet mellitus tip 2 mbi peshe, nje diete hipokalorike:

- A) Rrit riskun per hipoglicemi
- B) Permireson kontrollin glukometabolik

- C) Duhet te jete edhe hipoproteinike
- D) Rrit nivelin plazmatik te lipideve
- E) Asnjera

Pyetja 313

Krioglobulinemia mikse eshte e shoqeruar me pozitivitet te HCV ne:

- A) 1-10% te rasteve
- B) 11-20% te rasteve
- C) 21-30% te rasteve
- D) Me shume se ne 80% te rasteve
- E) Asnjera

Pyetja 314

Prokalcitonina:

- A) Eshte nje tregues inflamator ne infeksionet bakteriale sistemike
- B) Eshte nje neurotransmetues i SNQ
- C) Eshte nje hormon i prodhuar nga corpus luteo
- D) Eshte nje tregues i inflamacioneve virale
- E) Asnjera

Pyetja 315

Ne hipoaldosteronizem, hiponatremia shoqerohet me:

- A) Hipokalcemi
- B) Hipokalemi
- C) Hiperkalemi
- D) Hiperkalcemi
- E) Asnjera

Pyetja 316

Eozinofilet jane te pranishme ne:

- A) Infeksionet parazitare
- B) Infeksionet bakteriale
- C) Reaksionet alergjike
- D) Infeksionet parazitare dhe reaksionet alergjike
- E) Asnjera

Pyetja 317

Per nje burre rreth 55vjec, obez dhe hipertensiv me vlera te pakontrolluara te presionit nga terapia qe perdor, cilin nga ekzaminimet diagnostikuese do perdornit ne fillim:

- A) Ekografi abdominale
- B) Polisonografi dinamike

- C) Monitorim te presionit per 24ore
- D) Ekografi abdominale dhe ekografi abdominale
- E) Te gjitha

Pyetja 318

Ne kushtet e nje sindrome endokrine multiple MEN1, cili nga organet e meposhtme preket me pak:

- A) Paratiroidja
- B) Pankreasi
- C) Hipofiza
- D) Mbiveshkorja
- E) Te gjitha

Pyetja 319

Pershtatja klinike eshte:

- A) Masa ne te cilen nje nderhyrje e vecante eshte po aq efikase dhe e indikuar per personin qe e merr
- B) Matja e dite qendrimit ne spital
- C) Koha qe i kushtohet nje performance
- D) Te gjitha

Pyetja 320

Ne trajtimin e kancerit te gjirit, nuk jane indikacion hormonet e meposhtme:

- A) Estrogjeni
- B) Progesteroni
- C) Frenusit e aromatazes
- D) Antiestrogeni
- E) Te gjitha

Pyetja 321

Cili nga faktoret e meposhtem ka rendesi prognostike, ne pjesen me te madhe te neoplazive:

- A) Histopatologjia
- B) Gjendja
- C) Masa tumorale
- D) Prekja e limfonodujve
- E) Te gjitha

Pyetja 322

CEA rritet tek personat me:

- A) Tumor te kolonit
- B) Tumor te melcise
- C) Tumor te pankreasit
- D) Fumatores

E) Te gjitha

Pyetja 323

Inoperimi i nje tumori te stomakut eshte i pritshem, nese ka:

- A) Ascit
- B) Metastaza ne limfonodujt supraklavikulare
- C) Infiltrim ne omentum dhe perhapje ne melci dhe shpretke
- D) Te gjitha

Pyetja 324

Prognoza e kancerit te gjirit te operuar, eshte e lidhur me:

- A) Limfonodujt aksilare pozitive
- B) Formen histologjike te tumorit
- C) Prezenca e receptoreve hormonale
- D) Dimensionet e tumorit
- E) Te gjitha

Pyetja 325

Termi permiresim i pjesshem, mund te perdoret ne onkologji ne nje nga situatat e meposhtme:

- A) Permiresim i shenjave klinike
- B) Reduktim i permasave tumorale > 50%
- C) Zhdukja e tumorit primar edhe pse persistojne metastazat
- D) Prezenca e tumorit por normalizimi i markuesve tumorale
- E) Te gjitha

Pyetja 326

Cila nga sindromat e poshteshenuara, mund te jete e lidhur me kancerin bronkopulmonar:

- A) Hiperkalcemia
- B) Osteopatia hipertrofike e Pierre Marie
- C) Sindroma Cushing
- D) Polineuriti
- E) Te gjitha

Pyetja 327

Kush eshte trajtimi i zgjedhur ne kancerin pulmonar me qeliza te vogla, ne stadin e IV:

- A) Kirurgjia
- B) Kimioterapia
- C) Radioterapia
- D) Imunoterapia
- E) Te gjitha

Pyetja 328

Në sistemin e stadifikimit TNM, M-ja tregon:

- A) Receptorët hormonalë
- B) Metastazat në distancë
- C) Tumorin primitiv
- D) Limfonodujt
- E) Asnjëra

Pyetja 329

Treguesi i efikasitetit të depistimit mamografik, është:

- A) Zgjatja e jetëgjatësisë
- B) Reduktimi i vdekshmërisë
- C) Reduktimi i numrit të tumoreve të avancuar
- D) Reduktimi i rasteve simptomatike
- E) Të gjitha

Pyetja 330

Një trajtim përfundimtar aktiv:

- A) Zgjat mbijetesën, por nuk redukton dimensionet e tumorit
- B) Redukton dimensionet e tumorit
- C) Ka efekte anësore të kufizuara
- D) Ka efekte të ndjeshme anësore
- E) Të gjitha

Pyetja 331

Terapia e zgjedhur e limfomave jo Hodgkiniane agresive, është:

- A) Radioterapia
- B) Polikimioterapia
- C) Monokimioterapia
- D) Imunoterapia
- E) Asnjëra

Pyetja 332

Cila nga këto substanca, është faktor rritjeje hematopoetik:

- A) Interleukina 2
- B) Eritropoetina
- C) GM-CSF
- D) G-CSF
- E) Të gjitha

Pyetja 333

Prevalenca e një neoplazie rritet për shkak se:

- A) Rritet incidenca dhe rritet vdekshmëria
- B) Ulet incidenca dhe ulet vdekshmëria
- C) Rritet incidenca dhe ulet vdekshmëria
- D) Ulet incidenca dhe rritet vdekshmëria
- E) Asnjëra

Pyetja 334

Kriteri i vlerësimit të efikasitetit të terapisë ndihmëse, është:

- A) Zgjatja e jetëgjatësisë
- B) Arritja e remisionit komplet
- C) Reduktimi i masës tumorale
- D) Reduktimi i simptomave të lidhura me sëmundjen
- E) Asnjëra

Pyetja 335

Një ndërlikim i zakonshëm i korionepiteliomës, është:

- A) Okluzioni intestinal
- B) Vdekje e papritur
- C) Perforacion i uterusit dhe hemorragji e bollshme
- D) Tromboflebit
- E) Asnjëra

Pyetja 336

Cilat janë mënyrat dhe qëllimet për të cilat kryhet kimioterapia:

- A) Ndihmëse
- B) Neondihmëse
- C) Paliative
- D) Shpëtuese
- E) Të gjitha

Pyetja 337

Si përkufizohet mbijetesja e lirë e një sëmundjeje:

- A) Intervali kohor ndërmjet datës së terapisë primare dhe datës së recidivës
- B) Intervali kohor ndërmjet datës së terapisë primare dhe datës së vdekjes
- C) Intervali kohor ndërmjet datës së recidivës dhe datës së vdekjes
- D) Intervali kohor ndërmjet datës së diagnozës dhe datës së terapisë
- E) Asnjëra

Pyetja 338

Cili bar duhet konsideruar si pikë referimi në terapinë ndihmëse në karcinomën e rektumit:

- A) 5-fluorouracili
- B) Metotreksati
- C) Irinotekani
- D) Oksaliplatini
- E) Të gjitha

### 13.Diagnozë dhe Imazheri

Pyetja 1

Në një pacient që dyshohet se vuan nga tuberkulozi, bacilli i Kochut vihet në dukje me anë të:

- A) ngjyrimin me PAS
- B) ngjyrimin me Ziehl-Nielsen
- C) ngjyrimin me hematoksiline-eozine
- D) ngjyrimin me blu metilen
- E) ngjyrimin me Giemsa

Pyetja 2

Cilët parametra alterohen në anemine sideropenike?

- A) rritje e ferritinemisë serike dhe ulje e rruazave të kuqe në qarkullim
- B) rritje e transferinës serike dhe ulje e ferritinemisë serike
- C) rritje e rruazave të kuqe në qarkullim dhe ulje e MHC (median haemoglobin concentration)
- D) rritje e hematokritit (HCT) dhe ulje e përqëndrimit të MCHC
- E) asnjë nga këto përgjigje

Pyetja 3

Cila enzimë mbetet më gjatë në vlera të rritura pas infarktut akut të miokardit?

- A) CK
- B) Troponina I
- C) GOT/AST
- D) Mioglobina
- E) CK-MB

Pyetja 4

Cili parametër laboratorik është gjithmonë i rritur në sindromën Cushing?

- A) kortizoli urinar
- B) transaminazat
- C) leukocitet
- D) ACTH plazmatik
- E) DHEA-sulfat plazmatik

Pyetja 5

Cili nga shënjesit tumoral mund të gjendet në vlera të rritura gjatë një tumori neuroendokrin?

- A) antigjeni karcino embrional (CEA)
- B) alfafetoproteina (AFT)
- C) kromogranina A
- D) antigjeni polipeptidik indor (TPA)
- E) CA 15-3

Pyetja 6

Cili nga këto parametra laboratorik të alteruar mund të tregojë për egzistencën e një çrregullimi në gjendrën tiroide?

- A) Sideremia
- B) Kreatininemia
- C) Kolesterolemia
- D) Azotemia
- E) LDH

Pyetja 7

Cili është testi diagnostik i fibrozës cistike?

- A) heliko tomografia me rezolucion të lartë e toraksit
- B) bronkoskopia
- C) spirometria
- D) testi i djersës
- E) shintigrafia pulmonare

Pyetja 8

Cili bakter haset me shpesh në flogozën supurative?

- A) Stafilokoku epidermeitis
- B) Diplokoku
- C) Stafilokoku aureus
- D) Streptokoku fekal
- E) Streptokoku viridans

Pyetja 9

Me cilën rrugë eliminohen nga organizmi lëndët e kontrastit organik jodik hidrosolubil?

- A) rektale
- B) hepatike
- C) pulmonare
- D) me pështymë
- E) renale

Pyetja 10



Cila shenjë radiologjike konfirmon shenjat patognomotike të një okluzioni intestinal të dyshuar?

- A) nivele aeriike mbi diafragëm
- B) nivele aeriike nën diafragëm
- C) nivele hidro aeriike intestinale
- D) opacitet difuz abdominal
- E) radiotransparenzë difuze abdominale

Pyetja 11

Në rastin e një traume muskulare ku dyshohet edhe për një hematomë post-traumatike, teknika diagnostike më e përshtatshme është:

- A) CT
- B) Radiografi zonale
- C) Xeroradiografi
- D) Shintigrafi
- E) Ekografia

Pyetja 12

Nëse në një pacient dyshohet për perforacion intestinal, cili ekzaminimi instrumental duhet kërkuar urgjentisht?

- A) Ekografia abdominale
- B) Radiografi me barium e aparatit tretës
- C) Klizëm me kontrast hidrosolubël
- D) Klizëm me dopio kontrast
- E) Radiografi abdominale

Pyetja 13

Ekografikisht një cistit renal i thjeshtë do të paraqitet:

- A) Anekogen
- B) Hiperekogen
- C) Hipoekogen
- D) Izoekogen
- E) Mikse

Pyetja 14

Cili ekzaminimi është më i përshtatshëm në ndjekjen e ecurisë të sëmundjes së një pacienti me pankreatit akut?

- A) ERCP
- B) Kolangio-RM
- C) Kolangiografia
- D) RM abdominale
- E) Ekografia

Pyetja 15

Cili është ekzaminimi i përzgjedhur në studimin e palcës kockore?

- A) Radiografia
- B) Angiografia
- C) TC
- D) Ekografia
- E) RM

Pyetja 16

Në stadifikimin e tumorit pulmonar cila e dhënë radiologjike është me e përdorshme?

- A) Shintigrafia pulmonare
- B) TC torakale pa kontrast
- C) Bronkoskopia
- D) Radiografia e toraksit
- E) TC torakale me mjete kontrasti

Pyetja 17

Pacient 50 vjeç, me episode hematurie dhe ekografi negative për kalkulozën renale. Cili ekzaminim instrumental është dytësor?

- A) Radiografi e aparatit urinar
- B) Ekografi
- C) Pielo-RM
- D) Urografi
- E) Uro-TC

Pyetja 18

Kur dyshohen klinikisht për fraktura të meniskut post-traumatike, cili ekzaminim instrumenta është më i indikuari?

- A) Radiografia konvencionale
- B) RM
- C) Ekografia
- D) Artro-RM
- E) Artro-TC

Pyetja 19

Një grua diagnostikohet në mamografi me mikro kalçifikime parenkimale. Çfarë ekzaminimi do të kërkonit më tej?

- A) Galaktografi
- B) Galakto-RM
- C) Biopsi e drejtuar ekografikisht
- D) Biopsi stereotaksike
- E) Ekografi

Pyetja 20

Kur dyshohet për ikter obstruktiv cili ekzaminim instrumental kërkohet fillimisht?

- A) Kolangio-RM
- B) ERCP (endoscopic retrograde colangio-pancreatography)
- C) CT abdominale
- D) Ekografi abdominale
- E) CT abdominale me kontrast

Pyetja 21

Gadolina (lëndë kontrasti) kalon barrirrën hemato-encefalike në cilën situatë?

- A) vetëm në rast të patologjive neoplazike
- B) vetëm në rast të patologjive neoplazike malinje
- C) kur dëmtohet barriera hemato-encefalike
- D) asnjëherë

Pyetja 22

Cili ekzaminim radiologjik është më i përshtatshmi për vlerësimin e ndërlikimeve të pankreatitit akut?

- A) Ekografia abdominale
- B) Radiografi abdominale
- C) Kolangio-RM
- D) CT
- E) CT bazale

Pyetja 23

Një i sëmurë 70 vjeç vlerësohet si pozitiv për praninë e gjakut në feçe. Nëse mbi bazë të kësaj të dhëne dhe të dydhonit për një lezion neoplazik intestinale cili ekzaminim do të duhej për vendosjen e një diagnoze të sigurt?

- A) Klizma
- B) Kolonoskopia e CT
- C) CT abdominale
- D) Klizma me dopio kontrast
- E) Kolonsigmoidoskopia

Pyetja 24

Cili është burimi energjistik që përdoret në RMN?

- A) Rrezet infra të kuqe
- B) Fushat megnetike
- C) Radiacioni i jonizuar
- D) Valët G
- E) Ultratingulli

Pyetja 25

Cili është aspekti radiologjik tipik i versamentit pleural?

- A) Opaciteti nodular
- B) Zona të radiotransparencës apikale
- C) Zona të radiotransparencës bazale
- D) Opacitet bazal me buzën e sipërme konkave
- E) Opacitet bazal me buzën e sipërme konvekse

Pyetja 26

Proceset e ndryshme patologjike që zhvillohen në kocka dhe në kyçe radiologjikisht shoqërohen me:

- A) Ndryshime të densitetit kockor
- B) Ndryshime të strukturës kockore
- C) Ndryshime të formës
- D) Të gjitha këto më lart

Pyetja 27

Në frakturën e degës të gjelbër (subperiostale) radiologjikisht:

- A) Periosti mbetet i pandryshuar
- B) Periosti destruktohet
- C) Vija e thyerjes kalon në femur
- D) Evidentohet hipertrofi kockore
- E) Asnjë

Pyetja 28

Një pacient me arteriopati obliterante periferike diagnoza vendoset me:

- A) Angio RM
- B) Angio CT
- C) Ekocolor-Doppler
- D) Angiografi
- E) TC bazale

Pyetja 29

Në një pacient me trauma kraniale cili është ekzaminimi bazë?

- A) Radiografi kraniale
- B) RM encefalike
- C) CT koke
- D) RM trupit
- E) Asnjë

Pyetja 30

Nëse një pacient dyshohet për një sëmundje inflamatore kronike intestinale me anë të cilit ekzaminim vendoset diagnoza?

- A) Entero-RM
- B) Radiografi e aparatit tretës
- C) Entero-CT
- D) Colonsigmoidoskopia
- E) Ekografi

Pyetja 31

Nëse dyshoni për emboli pulmonare cili ekzaminim instrumental lejon të vendosni diagnozën?

- A) Radiografia
- B) CT torakale
- C) Angio CT torakale
- D) Ekografia trans-ezofageale
- E) Ekokardiografia

Pyetja 32

Cila është prerja optimale e përdorur në HRCT?

- A) 1-2 mm
- B) 2-3 mm
- C) 1 cm
- D) nm
- E) 4-5 mm

Pyetja 33

Rentgenoskopia në projeksionin anësor dhe të pjerrët shërben:

- A) për të saktësuar vendndodhjen e procesit patologjik brenda ose jashtë mushkrive
- B) për të parë hapjen dhe mbylljen e sinuseve freniko-kostale
- C) për të zbuluar sasisë të vogla të lëngut në zgavrën pleurale
- D) për të zbuluar praninë e ngjitjeve pleurale (aderenca)
- E) të gjitha

Pyetja 34

Sqarimet e përhapura pulmonare në rastin e emfizemës pulmonare karakterizohen nga:

- A) shtim të qartësisë të dy fushave pulmonare
- B) diafragma e ulur dhe e sheshuar
- C) rrallim të vizatimit mushkëror në periferi
- D) Të gjitha

Pyetja 35

Errësimet në formë vijash ( si shinat e trenit) janë karakteristikë e:

- A) bronhektazisë
- B) atelektazës
- C) astmës bronkiale
- D) pneumopative
- E) abcesit

Pyetja 36

Figura hidroerike e rrumbullakët me strukturë jo të njëtrajtshme e përbërë nga një errësim nga ana e poshtme me formë gjysmëhënë dhe një pjesë e tejdukshme nga ana e sipërme i korrespondon shfaqjes radiologjike pulmonare të një:

- A) abcesi pulmonar
- B) ekinokoku pulmonar
- C) pneumopatie
- D) hernie diafragmale
- E) bronhektazie

Pyetja 37

Kriter radiologjik që shkon në favor të një noduli pulmonar malinj janë:

- A) forma jo e rregullt
- B) buzët jo të rregullta
- C) mungesa e kalçifikimeve ose kalçifikimet ekscentrike
- D) të gjitha përgjigjet më lartë

Pyetja 38

Për vlerësimin e retroperitoneumit, mënyra e zgjedhur është:

- A) urografia
- B) CT
- C) Ekografia
- D) Retropneumoperitonuemi
- E) RM

Pyetja 39

Cili ind është më rezistent ndaj rrezatimit:

- A) Testikuli
- B) Lëkura
- C) Muskuli i strijuar
- D) Ovari
- E) Epiteli

Pyetja 40

Cili ekzaminim realizohet për vlerësimin e tendinopative Akiliene:

- A) Ekografia
- B) Radiografia
- C) RM
- D) CT
- E) Xerografia

Pyetja 41

Në cilin rast kërkohet që të realizohet një kolangiografi perkutane:

- A) Kolecistit kronik
- B) Ikter obstruktiv
- C) Kolelitizaë
- D) Cirrozë biliare
- E) Hepatokarcinome

Pyetja 42

Ekografia transvaginale në studimin e patologjive të uterusit është:

- A) Një metodë që përdoret rrallë herë
- B) Një metodë që nuk përdoret më në ditët e sotme
- C) Një metodë që bën një vlerësim të kujdesshëm edhe në rast të neoplazive uterine
- D) Një metodë e vlefshme në vlerësimin e malformimeve uterine
- E) Asnjë

Pyetja 43

Në një pacient me hematemezë duhet realizuar:

- A) Radiografi e aparatit tretës me contrast me barium
- B) Radiografi e thjeshtë e aparatit tretës
- C) Radiografi kur pacienti është esëll
- D) Ekografi e pjesës të sipërme abdominale
- E) Endoskopi

Pyetja 44

Kur dyshohet për një karcinomë pulmonare ekzaminimi i këshilluar është:

- A) Ekotomografia me color-Doppler
- B) RM
- C) Arteriografia
- D) CT
- E) Të gjitha këto

Pyetja 45

Mbi bazë të studimeve të randomizuara përmendet se depistimi nëpërmjet mamografisë është mjaft i rëndësishëm në uljen e vdekshmërisë nga kanceri i gjirit në gratë e moshës:

- A) 30-39 vjeç

- B) 40-49 vjeç
- C) 50-69 vjeç
- D) 70 vjeç
- E) asnjë nga këto përgjigje

Pyetja 46

Në rastin e një hematome muskulare post- traumatike në nivel të kofshës, cila është teknika imazherike më e përshtatshme?

- A) Ekotomografia
- B) Xerografia
- C) Endoskopia
- D) CT
- E) Radiografia

Pyetja 47

Në vlerësimin e frakturave kockore cila teknikë diagnostike imazherike përbën zgjedhjen e parë?

- A) Radiografia direkte
- B) Shintigrafia kockore
- C) RM
- D) CT
- E) Ekografia

Pyetja 48

Në rast të embolisë pulmonare ekzaminimi imazherik më i përshtatshëm është:

- A) CT spirale
- B) Radiografi
- C) RM
- D) Ekocolor Doppler
- E) PET

Pyetja 49

Shenja radiologjike e "këpucës prej druri" është karakteristikë e:

- A) Tetrads Fallot
- B) Stenoza e arteries pulmonare
- C) Defekti interventrikular
- D) Ductus botalli apertus
- E) Koartacion i aortës

Pyetja 50

Karcinoma e ezofagut karakterizohet radiologjikisht nga:

- A) Mungesa e peristaltikës
- B) Ndërprerja e palve të mukozës



- C) Defekti i mbushjes
- D) të gjitha

Pyetja 51

"Nisha" është shenjë radiologjike diagnostike e:

- A) Ulçerës peptike të stomakut
- B) Ulçerës duodenale
- C) Kancerit të stomakut
- D) Stenozën e duodenit
- E) Kancerin e ezofagut

Pyetja 52

Cila lëndë përdoret si lëndë kontrasti e injektuar i.v gjatë realizimit të CT?

- A) Sulfati i bariumit
- B) Gadolina
- C) Jodi hidrosolubël
- D) Uji
- E) Metilceluloza

Pyetja 53

Në vlerësimin e veshit të mesëm metoda e zgjedhur është:

- A) CT
- B) RM
- C) Radiografi
- D) Tomografi
- E) CT me rezolucion të lartë

Pyetja 54

Cila nga këto qeliza është më e ndjeshme ndaj rrezatimit?

- A) Limfocitet
- B) Astroцитet
- C) Hepatocitet
- D) Miocitet
- E) Neuronet

Pyetja 55

Ultratingulli është:

- A) Energji mekanike
- B) Mënyrë e transferimit të energjisë në hapsira boshe
- C) Njësi elementare e energjisë
- D) Dritë e dukshme
- E) Valë me radiofrekuencë

Pyetja 56

Cila është metoda më e përdorur në drejtimin e punkcionit perkutan të rrugëve biliare?

- A) Ekografia
- B) RM
- C) CT
- D) Kolangiografia endovenoze
- E) ERCP

Pyetja 57

Cila është metoda imazherike e zgjedhur në studimin e bifurkacionit karotid?

- A) Angiografi
- B) Angio-RM
- C) RM
- D) Eko-dopler
- E) CT

Pyetja 58

Radiondjeshmëria indore varion në përputhje me:

- A) Aktivitetin mitotik
- B) Oksigjenimin
- C) Asbestozën
- D) Silikozën
- E) Indin adipoz

Pyetja 59

Dozimetria vlerëson:

- A) Sasinë e rrezatimit të përthithur nga organizmi dhe qelizat e tij
- B) Sasinë e rrezatimit të aftë të shkatërrojë qelizat e organizmit
- C) Një disiplinë unike
- D) Lidhjen midis sasisë të rrezatuar dhe llojeve të ndryshme të radiacionit
- E) Shpeshësinë e tumoreve në raport me dozat e rrezatimit

Pyetja 60

Në rast osteopenie ekzaminimi radiografik standart:

- A) Përcakton diagnozën në faza të avancuara
- B) Zëvendëson metodat vlerësuese mineralo-densitometrike
- C) Përcakton diagnozën në fazat e hershme
- D) Vlerëson humbjen kockore
- E) Nuk ka vlerë

Pyetja 61

Osteodensitometria (DEX)

A) :

- A) Përcakton diagnozën në faza të avancuara
- B) Zëvendëson metodat vlerësuese mineralo-densitometrike
- C) Përcakton diagnozën në fazat e hershme
- D) Vlerëson humbjen kockore
- E) Nuk ka vlerë

#### Pyetja 62

Cilat teknika imazhrike përdoren në studimin e vazave:

- A) Ekotomografia
- B) Doppler
- C) Color-Doppler
- D) Ekografi intravaskulare
- E) Të gjitha këto

#### Pyetja 63

Cili është ndryshimi midis CT dhe RM:

- A) Nuk ka asnjë ndryshimi midis CT dhe RM
- B) CT është një metodë vlerësimi multiparametrike që varet nga denistet
- C) RM është një metodë vlerësimi multi parametrike që nuk përdor rrezatimin e jonizuar
- D) Në RM nuk përdoren lëndë kontrasti
- E) RM është një metodë monoparametrike

#### Pyetja 64

Një formacion me përmbajtje likidi në ekzaminim me ultratingull paraqitet si:

- A) Hipoekogene
- B) Anekogene
- C) Hiperekogene
- D) Nuk duket
- E) Asnjë nga këto

#### Pyetja 65

Tofet janë karakteristikë e:

- A) Artriti psoriatik
- B) Sklerodermisë
- C) Artritit akut gutoz
- D) Artropatisë kronike nga guta
- E) Osteoartrozës reozive

#### Pyetja 66

Avantazh i RM:

- A) Është një ekzaminim monoparametrik
- B) Është shumëplanshe

- C) Ka kosto të ulët
- D) Ka kohë të shkurtër ekzaminim
- E) Nuk ka kundërindikacione

Pyetja 67

Në vlerësimin e surrenaleve ekzaminimi imazherik i zgjedhur është:

- A) RM
- B) CT
- C) Ekografia
- D) Angiografia
- E) Urografia

Pyetja 68

Cili burim energjistik përdoret në ekografi?

- A) Rrezatimi jonizues
- B) Valët mekanike
- C) Rrezet infra të kuqe
- D) Rrezatimi elektromagnetik
- E) Rrezet gama

Pyetja 69

Në cilën nga këto sëmundje të mëlçisë diagnoza me imazhe nuk ka vlerë?

- A) Hepatit akut
- B) Steatozë
- C) Cirrozë
- D) Abces
- E) Hipertension portal

Pyetja 70

RM përdor:

- A) Radiofrekuencën
- B) Rrezatim jonizues
- C) Ultratinguj
- D) Rreze infra të kuqe
- E) Rreze X

Pyetja 71

Kundërindikacion absolut i RM në patologjitë kardio-vaskulare është:

- A) Pace-maker
- B) Klaustrofobia
- C) Klipse metalike kirurgjikale
- D) Proteza

E) Obeziteti

Pyetja 72

Vlerësimi i menisqeve realizohet me:

- A) Radiografi
- B) Ekografi
- C) Shintigrafi
- D) Radiografi+shintigrafi
- E) RM

Pyetja 73

Cili lloj rrezatimi përdoret në CT?

- A) Ultravjollcë
- B) Ultratingull
- C) Rreze X
- D) Valë elektromagnetike
- E) Infra të kuqe

Pyetja 74

Nëse dyshohet për një litiazë të rrugëve biliare cila është teknika diagnostike e zgjedhur në vënie të diagnozës?

- A) Ekografia
- B) Ekokolor-Doppler
- C) Shintigrafia
- D) RM
- E) CT

Pyetja 75

Në vlerësimin e një neoplazie të dyshuar në prostatë cila teknikë diagnostike do të ishte më e përdorshme?

- A) CT
- B) Angiografia
- C) RM
- D) Ekotomografia me sondë endorektale
- E) Radiografi abdominale me infusion me barium

Pyetja 76

PET është:

- A) Tomografi elektromagnetike pozitronike
- B) Tomografi elicoidale pozitronike
- C) Tomografi me emision të pozitroneve
- D) Tomografi me emision të protoneve
- E) Asnjë

Pyetja 77

Në osteoporozë:

- A) Masa kockore zvogëlohet dhe reduktohet përmbajtja minerale e matriksit kockor
- B) Masa kockore ruhet
- C) Masa kockore zvogëlohet dhe ruhet përmbajtja minerale e matriksit kockor
- D) Masa kockore rritet
- E) Vërtetohet përthithje kockore

Pyetja 78

Radiologjikisht gurët biliarë janë:

- A) Vetëm radiopakë
- B) Vetëm radiotransparent
- C) Miks
- D) Radiopak dhe miks
- E) Radiopakë, radiotransparent, miks

Pyetja 79

Cila nga këto patologji mund të japi metastaza kockore?

- A) Karcinoma e prostatës
- B) Karcinoma e ovarit
- C) Melanoma
- D) Karcinoma pulmonare
- E) Karcinoma kolonit

Pyetja 80

Vlerësimi optimal i prostatës realizohet me:

- A) Ekografi me rrugë suprapubike
- B) Ekografi me rrugë transrektale
- C) CT
- D) RM
- E) Cistografi

Pyetja 81

Në vlerësimin e pankreatitit akut është i rëndësishëm:

- A) Ekografia
- B) RM
- C) CT
- D) Radiografia
- E) Shintigrafia

Pyetja 82

Për ndjekjen e ecurisë të transplantit reanl përdoret:

- A) CT
- B) RM
- C) Urografia
- D) Ekografia+ekocolor-Doppler
- E) Radiografi abdominale

Pyetja 83

Spondilolisteza karkaterizohet nga:

- A) Rrëshqitje nga prapa e trupit të vertebrës
- B) Rrëshqitje laterale e trupit të vertebrës
- C) Frakturë e trupit të vertebrës
- D) Rrëshqitje nga përpara e trupit të vertebrës
- E) Asnjë

Pyetja 84

Cila është metoda e përzgjedhur në studimin e mamellave:

- A) Mammografia
- B) Ekografia
- C) Xerodiografia
- D) RMN
- E) Termografia

Pyetja 85

Nëse dyshohet për veshkë polikistike, urografia është një ekzaminim:

- A) Dytësor
- B) Thelbësor në vendosje diagnoze
- C) Bashkëshoqërues i shintigrafisë
- D) Qe nuk ka asnjë vlerë
- E) I pa zëvendësueshëm

Pyetja 86

Sa lobe ka mushkëria e djathtë?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

Pyetja 87

Në rastin e një pankreatiti kronik cili ekzaminim mund të japi të dhëna më të plota?

- A) Wirsungografia retrograde
- B) Shintigrafia
- C) CT
- D) Radiografia abdominale
- E) Angiografia

Pyetja 88

Një grua diagnostikohet në mamografi me mikro kalçifikime parenkimale. Çfarë ekzaminimi do të kërkonit më tej?

- A) Galaktografi
- B) Galakto-RM
- C) Biopsi e drejtuar ekografikisht
- D) Biopsi stereotaksike
- E) Ekografi

Pyetja 89

Kur dyshohet për ikter obstruktiv cili ekzaminim instrumental kërkohet fillimisht?

- A) Kolangio-RM
- B) ERCP (endoscopic retrograde colangio-pancreatography)
- C) CT abdominale
- D) Ekografi abdominale
- E) CT abdominale me kontrast

Pyetja 90

Cili ekzaminim radiologjik është më i përshtatshmi për vlerësimin e ndërlikimeve të pankreatitit akut?

- A) Ekografia abdominale
- B) Radiografi abdominale
- C) Kolangio-RM
- D) CT
- E) CT bazale

Pyetja 91

Një i sëmurë 70 vjeç vlerësohet si pozitiv për praninë e gjakut në feçe. Nëse mbi bazë të kësaj të dhënë të dydhonit për një lezion neoplazik intestinale cili ekzaminim do të duhej për vendosjen e një diagnoze të sigurt?

- A) Klizma
- B) Kolonoskopia e TC
- C) CT abdominale
- D) Klizma me dopio kontrast
- E) Kolonsigmoidoskopia

Pyetja 92



Cili është burimi energjistik që përdoret në RMN?

- A) Rrezet infra të kuqe
- B) Fushat magnetike
- C) Radiacioni i jonizuar
- D) Valët G
- E) Ultratingulli

Pyetja 93

Cili është aspekti radiologjik tipik i versamentit pleural?

- A) Opaciteti nodular
- B) Zona të radiotransparencës apikale
- C) Zona të radiotransparencës bazale
- D) Opacitet bazal me buzën e sipërme konkave
- E) Opacitet bazal me buzën e sipërme konvekse

Pyetja 94

Proceset e ndryshme patologjike që zhvillohen në kocka dhe në kyçe radiologjikisht shoqërohen me:

- A) Ndryshime të densitetit kockor
- B) Ndryshime të strukturës kockore
- C) Ndryshime të formës
- D) Të gjitha këto më lart

Pyetja 95

Në frakturën e degës të gjelbër (subperiostale) radiologjikisht:

- A) Periosti mbetet i pandryshuar
- B) Periosti destruktohet
- C) Vija e thyerjes kalon në femur
- D) Evidentohet hipertrofi kockore
- E) Asnjë

Pyetja 96

Në një pacient me trauma kraniale cili është ekzaminimi bazë?

- A) Radiografi kraniale
- B) RM encefalike
- C) CT koke
- D) RM trupit
- E) Asnjë

Pyetja 97

Cila është prerja optimale e përdorur në HRCT?

- A) 1-2 mm
- B) 2-3 mm
- C) 1 cm
- D) 0.1 nm
- E) 4-5 mm

Pyetja 98

Rentgenoskopia në projeksionin anësor dhe të pjerrët shërben:

- A) për të saktësuar vendndodhjen e procesit patologjik brenda ose jashtë mushkrive
- B) për të parë hapjen dhe mbylljen e sinuseve freniko-kostale
- C) për të zbuluar sasi të vogla të lëngut në zgavrën pleurale
- D) për të zbuluar praninë e ngjitjeve pleurale (aderenca)
- E) të gjitha

Pyetja 99

Sqarimet e përhapura pulmonare në rastin e emfizemës pulmonare karakterizohen nga:

- A) shtim të qartësisë të dy fushave pulmonare
- B) diafragma e ulur dhe e sheshuar
- C) rrallim të vizatimit mushkëror në periferi
- D) asnjë

Pyetja 100

Erësimet në formë vijash (si shinat e trenit) janë karakteristike të:

- A) bronhektazisë
- B) atelektazës
- C) astmës bronkiale
- D) pneumopative
- E) abcesit

Pyetja 101

Figura hidroerike e rrumbullakët me strukturë jo të njëtrajtshme e përbërë nga një errësim nga ana e poshtme me formë gjysmëhëne dhe një pjesë e tejdukshme nga ana e sipërme i korrespondon shfaqjes radiologjike pulmonare të një:

- A) abcesi pulmonar
- B) ekinokoku pulmonar
- C) pneumopatie
- D) hernie diafragmale
- E) bronhektazie

Pyetja 102

Kriter radiologjik që shkon në favor të një noduli pulmonar malinj janë:

- A) forma jo e rregullt
- B) buzët jo të rregullta
- C) mungesa e kalçifikimeve ose kalçifikimet ekscentrike

D) të gjitha përgjigjet më lartë

Pyetja 103

Për vlerësimin e retroperitoneumit, mënyra e zgjedhur është:

- A) urografia
- B) CT
- C) Ekografia
- D) Retropneumoperitonuemi
- E) RM

Pyetja 104

Cili ind është më rezistent ndaj rrezatimit:

- A) Testikuli
- B) Lëkura
- C) Muskli i strijuar
- D) Ovari
- E) Epiteli

Pyetja 105

Cili ekzaminim realizohet për vlerësimin e tendinopative Akiliene:

- A) Ekografia
- B) Radiografia
- C) RM
- D) CT
- E) Xerografia

Pyetja 106

Në cilin rast kërkohet që të realizohet një kolangiografi perkutane:

- A) Kolecistit kronik
- B) Ikter obstruktiv
- C) Kolelitizaë
- D) Cirrozë biliare
- E) Hepatokarcinome

Pyetja 107

Ekografia transvaginale në studimin e patologjive të uterusit është:

- A) Një metodë që përdoret rrallë herë
- B) Një metodë që nuk përdoret më në ditët e sotme
- C) Një metodë që bën një vlerësim të kujdesshëm edhe në rast të neoplazive uterine
- D) Një metodë e vlefshme në vlerësimin e malformimeve uterine
- E) Asnjë

Pyetja 108

Në një pacient me hematemezë duhet realizuar:

- A) Radiografi e aparatit tretës me kontrast me barium
- B) Radiografi e thjeshtë e aparatit tretës
- C) Radiografi kur pacienti është esëll
- D) Ekografi e pjesës të sipërme abdominale
- E) Endoskopi

Pyetja 109

Kur dyshohet për një karcinomë pulmonare ekzaminimi i këshilluar është:

- A) Ekotomografia me color-Doppler
- B) RM
- C) Arteriografia
- D) CT
- E) Të gjitha këto

Pyetja 110

Mbi bazë të studimeve të randomizuara përmendet se depistimi nëpërmjet mamografisë është mjaft i rëndësishëm në uljen e vdekshmërisë nga kanceri i gjirit në gratë e moshës:

- A) 30-39 vjeç
- B) 40-49 vjeç
- C) 50-69 vjeç
- D) > 70 vjeç
- E) asnjë nga këto përgjigje

Pyetja 111

Në rastin e një hematome muskulare post- traumatike në nivel të kofshës, cila është teknika imazherike më e përshtatshme?

- A) Ekotomografia
- B) Xerografia
- C) Endoskopia
- D) CT
- E) Radiografia

Pyetja 112

Në vlerësimin e frakturave kockore cila teknikë diagnostike imazherike përbën zgjedhjen e parë?

- A) Radiografia direkte
- B) Shintigrafia kockore
- C) RM
- D) CT
- E) Ekografia

Pyetja 113

Në rast të embolisë pulmonare ekzaminimi imazherik më i përshtatshëm është:

- A) CT spirale
- B) Radiografi
- C) RM
- D) Ekocolor Doppler
- E) PET

Pyetja 114

Patologjia nodulare e tiroides studiohet fillimisht me:

- A) Padiografi e qafës për indet e buta
- B) CT
- C) RM
- D) Shintigrafi
- E) Ekografia

Pyetja 115

Në vlerësimin e tubujve uterin luan rol të rëndësishëm:

- A) Radiografia
- B) Ekotomografia
- C) CT
- D) Histersalpingografia
- E) RM

Pyetja 116

Rrezatimi jonizues ka efekte anësore:

- A) Somatike
- B) Gjenetike
- C) Somatike dhe gjenetike
- D) Ulje të eritrosedimentit
- E) Asnjë

Pyetja 117

Një nodul tiroidien që paraqitet i ngrohtë në shintigrafi mund të jetë:

- A) Gushë endemike
- B) Adenoma Plummer
- C) Karcionoma e padiferencuar
- D) Karcionoma oksifile
- E) Adenoma embrionale

Pyetja 118

Nëse dyshohet klinikisht për emboli pulmonare, radiografia e toraksit:

- A) Nuk realizohet asnjëherë
- B) Ka vlerë diagnostike
- C) Duhet të realizohet gjithmonë
- D) Realizohet pas vlerësimit shintigrafik ventilim-perfuzion
- E) Ka ndjeshmeri më të madhe se CT

Pyetja 119

Cilat janë karakteristikat ekografike të një strukture homogjene?

- A) Prania e ekos me intensitet të njejtë të shpërndarë në mënyrë uniforme
- B) Prania e ekos me intensitet të dobët
- C) Hije akustike laterale
- D) Anekogenicitet
- E) Përforcim i murit të pasëm

Pyetja 120

Në vlerësimin e traumave të fytyrës realizohet gjithmonë një:

- A) Radiografi e kokës
- B) Vetëm CT
- C) Vetëm RM
- D) Radiografi dhe CT e kokës
- E) Radiografi dhe RM e kokës

Pyetja 121

Qafa vlerësohet me anë të:

- A) CT
- B) RM
- C) Ekografisë
- D) Angiografisë
- E) Sialografisë

Pyetja 122

Në radiografinë torakale radiopaciteti është i ulur në kushtet të:

- A) Pneumonisë nga aerobët
- B) Versamentit pleural
- C) Pneumotoraksit
- D) Cisteve
- E) Pneumonisë nga anaerobët

Pyetja 123

Shisurat pleurale evidentohen në:

- A) Radiografi dhe CT
- B) Vetëm në radiografi
- C) Vetëm në CT
- D) Në ekografi
- E) Vetëm në raste të patologjisë pleurale

Pyetja 124

Kundërindikacionet parësore për realizimin e RM janë:

- A) Pace-maker në trupin e pacientit
- B) Fragmente metalike në trupin e pacientit
- C) Klipse aneurizmale në trupin e pacientit
- D) Proteza valvulare në trupin e pacientit
- E) Të gjitha përgjigjet janë të sakta

Pyetja 125

Çfarë kuptoni me efekt Doppler?

- A) Modifikim i frekuencës të tufës të ultratingullit kur kjo e fundit emetohet nga një trup në lëvizje
- B) Modifikim i drejtimit të tufës të ultratingullit kur kjo e fundit emetohet nga një trup në lëvizje
- C) Modifikim i tufës të ultratingullit kur kjo e fundit emetohet nga një trup në lëvizje
- D) Pasqyrim direkt i tufës të ultratingullit
- E) Pasqyrim me difuzion i tufës të ultratingullit

Pyetja 126

Lëndët e kontrastit në CT:

- A) Jepen me rrugë orale dhe endovenoze
- B) Nuk përdoren fare
- C) Përdoren vetëm në disa raste
- D) Në CT e aparatit tretës përdoret sulfat bariumi
- E) Në CT abdominale jepen si perfuzion me pika

Pyetja 127

Cila nga këto patologji kërkon përdorimin e një angiografie cerbrale?

- A) Iktus ishemik
- B) Hematoma epidurale
- C) Gjendja epileptike
- D) Disekimi i karotides
- E) Hemorragjia intracerebrale

Pyetja 128

Në fazën akute (10 orë) të një aksidenti cerebro vaskular (AVC) reperti më i shpeshtë në CT është:

- A) Edema difuze
- B) Hiperdensiteti pas administrimit të lëndëve të kontrastit intravenë

- C) Negativiteti
- D) Hipodensiteti fokal
- E) Hiperdensiteti fokal

Pyetja 129

Për të vendosur diagnozën e dhimbjes të kokës duhet domosdoshmërisht të realizohet:

- A) EEG
- B) RMN cerebrale
- C) TAC cerebrale
- D) Ekocolor-Doppler
- E) Asnjë ekzaminim

Pyetja 130

Në një pacient që dyshohet për iktus a duhet të realizohet urgjentisht TAC?

- A) Po, gjithmonë
- B) Vetëm kur dyshohet për hemorragji
- C) Në pacientët të rinj në moshë < 45 vjeç
- D) Në pacientët në koma

Pyetja 131

Cili ekzaminim na lejon të ndjekim ecurinë e një vatre hemorragjike në parenkimën cerebrale:

- A) CT
- B) Angiografi
- C) CT
- D) Angio-RM
- E) RM pa kontrast

Pyetja 132

Cili ind është më rezistent ndaj rrezatimit:

- A) Testikuli
- B) Lëkura
- C) Muskli i strijuar
- D) Ovari
- E) Epiteli

Pyetja 133

Cili ekzaminim realizohet për vlerësimin e tendinopative Akiliene:

- A) Ekografia
- B) Radiografia
- C) RM
- D) CT



E) Xerografia

Pyetja 134

Në cilin rast kërkohet që të realizohet një kolangiografi perkutane:

- A) Kolecistit kronik
- B) Ikter obstruktiv
- C) Kolelitizaë
- D) Cirrozë biliare
- E) Hepatokarcinome

Pyetja 135

Në fazën akute (10 orë) të një aksidenti cerebro vaskular (AVC) reperti më i shpeshtë në CT është:

- A) Edema difuze
- B) Hiperdensiteti pas administrimit të lëndët të kontrastit intravenë
- C) Negativiteti
- D) Hipodensiteti fokal
- E) Hiperdensiteti fokal

Pyetja 136

Ekografia transvaginale në studimin e patologjive të uterusit është:

- A) Një metodë që përdoret rrallë herë
- B) Një metodë që nuk përdoret më në ditët e sotme
- C) Një metodë që bën një vlerësim të kujdesshëm edhe në rast të neoplazive uterine
- D) Një metodë e vlefshme në vlerësimin e malformimeve uterine
- E) Asnjë

Pyetja 137

Në një pacient me hematemezë duhet realizuar:

- A) Radiografi e aparatit tretës me kontrast me barium
- B) Radiografi e thjeshtë e aparatit tretës
- C) Radiografi kur pacienti është esëll
- D) Ekografi e pjesës të sipërme abdominale
- E) Endoskopi

Pyetja 138

Kur dyshohet për një karcinomë pulmonare ekzaminimi i këshilluar është:

- A) Ekotomografia me color-Doppler
- B) RM
- C) Arteriografia
- D) CT
- E) Të gjitha këto

Pyetja 139

Mbi bazë të studimeve të randomizuara përmendet se depistimi nëpërmjet mamografisë është mjaft i rëndësishëm në uljen e vdekshmërisë nga kanceri i gjirit në gratë e moshës:

- A) 30-39 vjeç
- B) 40-49 vjeç
- C) 50-69 vjeç
- D) < 70 vjeç
- E) asnjë nga këto përgjigje

Pyetja 140

Në rastin e një hematome muskulare post- traumatike në nivel të kofshës, cila është teknika imazherike më e përshtatshme?

- A) Ekotomografia
- B) Xerografia
- C) Endoskopia
- D) CT
- E) Radiografia

Pyetja 141

Në vlerësimin e frakturave kockore cila teknikë diagnostike imazherike përbën zgjedhjen e parë?

- A) Radiografia direkte
- B) Shintigrafia kockore
- C) RM
- D) CT
- E) Ekografia

Pyetja 142

Në rast të embolisë pulmonare ekzaminimi imazherik më i përshtatshëm është:

- A) CT spirale
- B) Radiografi
- C) RM
- D) Ekocolor Doppler
- E) PET

Pyetja 143

Shenja radiologjike e "këpucës prej druri" është karakteristikë e:

- A) Tetradës Fallot
- B) Stenoza e arteries pulmonare
- C) Defekti interventrikular
- D) Ductus botalli apertus
- E) Koartacion i aortës

Pyetja 144

Karcinoma e ezofagut karakterizohet radiologjikisht nga:

- A) Mungesa e peristaltikës
- B) Ndërprerja e palve të mukozës
- C) Defekti i mbushjes
- D) Të gjitha

Pyetja 145

"Nisha" është shenjë radiologjike diagnostike e:

- A) Ulçerës peptike të stomakut
- B) Ulçerës duodenale
- C) Kancerit të stomakut
- D) Stenozën e duodenit
- E) Kancerin e ezofagut

Pyetja 146

Cila lëndë përdoret si lëndë kontrasti e injektuar i.v gjatë realizimit të CT?

- A) Sulfati i bariumit
- B) Gadoliniumi
- C) Jodi hidrosolubël
- D) Uji
- E) Metilceluloza

Pyetja 147

Në vlerësimin e veshit të mesëm metoda e zgjedhur është:

- A) CT
- B) RM
- C) Radiografi
- D) Tomografi
- E) CT me rezolucion të lartë

Pyetja 148

Cila nga këto qeliza është më e ndjeshme ndaj rrezatimit?

- A) Limfocitet
- B) Astroцитet
- C) Hepatocitet
- D) Miocitet
- E) Neuronet

Pyetja 149

Ultratingulli është:

- A) Energji mekanike
- B) Mënyrë e transferimit të energjisë në hapsira boshe
- C) Njësi elementare e energjisë
- D) Dritë e dukshme
- E) Valë me radiofrekuencë

Pyetja 150

Cila është metoda më e përdorur në drejtimin e punkcionit perkutan të rrugëve biliare?

- A) Ekografia
- B) RM
- C) CT
- D) Kolangiografia endovenoze
- E) ERCP

Pyetja 151

Cila është metoda imazherike e zgjedhur në studimin e bifurkacionit karotid?

- A) Angiografi
- B) Angio-RM
- C) RM
- D) Eko-dopler
- E) CT

Pyetja 152

Radiondjeshmëria indore varion në përputhje me:

- A) Aktivitetin mitotik
- B) Oksigjenimin
- C) Asbestozën
- D) Silikozën
- E) Indin adipoz

Pyetja 153

Dozimetria vlerëson:

- A) Sasinë e rrezatimit të përthithur nga organizmi dhe qelizat e tij
- B) Sasinë e rrezatimit të aftë të shkatërrojë qelizat e organizmit
- C) Një disiplinë unike
- D) Lidhjen midis sasisë të rrezatuar dhe llojeve të ndryshme të radiacionit
- E) Shpeshhtësinë e tumoreve në raport me dozat e rrezatimit

Pyetja 154

Në rast osteopenie ekzaminimi radiografik standart:

- A) Përcakton diagnozën në faza të avancuara
- B) Zëvendëson metodat vlerësuese mineralo-densitometrike
- C) Përcakton diagnozën në fazat e hershme

- D) Vlerëson humbjen kockore
- E) Nuk ka vlerë

Pyetja 155

Osteodensitometria (DEXA) :

- A) Përcakton diagnozën në faza të avancuara
- B) Zëvendëson metodat vlerësuese mineralo-densitometrike
- C) Përcakton diagnozën në fazat e hershme
- D) Vlerëson humbjen kockore

Pyetja 156

Cilat teknika imazhrike përdoren në studimin e vazave:

- A) Ekotomografia
- B) Doppler
- C) Color-Doppler
- D) Ekografi intravaskulare
- E) Të gjitha këto

Pyetja 157

Cili është ndryshimi midis CT dhe RM:

- A) Nuk ka asnjë ndryshimi midis CT dhe RM
- B) CT është një metodë vlerësimi multiparametrike që varet nga denistet
- C) RM është një metodë vlerësimi multi parametrike që nuk përdor rrezatimin e jonizuar
- D) Në RM nuk përdoren lëndë kontrasti
- E) RM është një metodë monoparametrike

Pyetja 158

Një formacion me përmbajtje likidi në ekzaminim me ultratingull paraqitet si:

- A) Hipoekogene
- B) Anekogene
- C) Hiperekogene
- D) Nuk duket
- E) Asnjë nga këto

Pyetja 159

Tofet janë karakteristikë e:

- A) Artriti psoriatik
- B) Sklerodermisë
- C) Artritit akut gutoz
- D) Artropatisë kronike nga guta
- E) Osteoartrozës reozive

Pyetja 160

Avantazh i RM:

- A) Është një ekzaminim monoparametrik
- B) Është shumëplanshe
- C) Ka kosto të ulët
- D) Ka kohë të shkurtër ekzaminim
- E) Nuk ka kundërindikacione

Pyetja 161

Në vlerësimin e surrenaleve ekzaminimi imazherik i zgjedhur është:

- A) RM
- B) CT
- C) Ekografia
- D) Angiografia
- E) Urografia

Pyetja 162

Cili burim energjistik përdoret në ekografi?

- A) Rrezatimi jonizues
- B) Valët mekanike
- C) Rrezet infra të kuqe
- D) Rrezatimi elektromagnetik
- E) Rrezet gama

Pyetja 163

Në cilën nga këto sëmundje të mëlçisë diagnoza me imazhe nuk ka vlerë?

- A) Hepatit akut
- B) Steatozë
- C) Cirrozë
- D) Abces
- E) Hipertension portal

Pyetja 164

RM përdor:

- A) Radiofrekuencën
- B) Rrezatim jonizues
- C) Ultratinguj
- D) Rreze infra të kuqe
- E) Rreze X

Pyetja 165

Kundërindikacion absolut i RM në patologjitë kardio-vaskulare është:

- A) Pace-maker
- B) Kalustrofobia
- C) Klipse metalike kirurgjikale
- D) Proteza
- E) Obeziteti

Pyetja 166

Vlerësimi i menisqeve realizohet me:

- A) Radiografi
- B) Ekografi
- C) Shintigrafi
- D) Radiografi+shintigrafi
- E) RM

Pyetja 167

Cili lloj rrezatimi përdoret në CT?

- A) Ultravjollcë
- B) Ultratingull
- C) Rreza X
- D) Valë elektromagnetike
- E) Infra të kuqe

Pyetja 168

Nëse dyshohet për një litiazë të rrugëve biliare cila është teknika diagnostike e zgjedhur në vënie të diagnozës?

- A) Ekografia
- B) Ekokolor-Doppler
- C) Shintigrafia
- D) RM
- E) CT

Pyetja 169

Në vlerësimin e një neoplazie të dyshuar në prostatë cila teknikë diagnostike do të ishte më e përdorshme?

- A) CT
- B) Angiografia
- C) RM
- D) Ekotomografia me sondë endorektale
- E) Radiografi abdominale me infusion me barium

Pyetja 170

Në një radiografi antero-posteriore të toraksit, sinusi frenik ndodhet:

- A) Në hapësirën retrokardiakë
- B) Ndërmjet brinjëve dhe sternumit
- C) Midis trakesë dhe harkut pulmonar
- D) Në bazat e mushkërive, në anën laterale
- E) Nuk ekziston

Pyetja 171

Flebografia është një ekzaminim imazherik që studion:

- A) Arteriet
- B) Venat
- C) Artikulacionet
- D) Zemrën e majtë (atrium+ventrikul)
- E) Zemrën e djathtë (atrium + ventrikul)

Pyetja 172

Për vendosjen e diagnozës të hidronefrozës është e nevojshme:

- A) RM
- B) CT
- C) Urografia
- D) Ekografia
- E) Radiografi direkte renale

Pyetja 173

PET është:

- A) Tomografi elektromagnetike pozitronike
- B) Tomografi elicoidale pozitronike
- C) Tomografi me emision të pozitronëve
- D) Tomografi me emision të protoneve
- E) Asnjë

Pyetja 174

Në fazën akute (10 orë) të një aksidenti cerebro vaskular (AVC) reperti më i shpeshtë në CT është:

- A) Edema difuze
- B) Hiperdensiteti pas administrimit të lëndët të kontrastit intravenë
- C) Negativiteti
- D) Hipodensiteti fokal
- E) Hiperdensiteti fokal

Pyetja 175

Në osteoporozë:

- A) Masa kockore zvogëlohet dhe reduktohet përmbajtja minerale e matriksit kockor
- B) Masa kockore ruhet



- C) Masa kockore zvogëlohet dhe ruhet përmbajtja minerale e matriksit kockor
- D) Masa kockore rritet
- E) Vërtetohet përthithje kockore

Pyetja 176

Radiologjikisht gurët biliarë janë:

- A) Vetëm radiopakë
- B) Vetëm radiotransparent
- C) Miks
- D) Radiopak dhe miks
- E) Radiopakë, radiotransparent, miks

Pyetja 177

Cila nga këto patologji mund të japi metastaza kockore?

- A) Karcinoma e prostatës
- B) Karcinoma e ovarit
- C) Melanoma
- D) Karcinoma pulmonare
- E) Karcinoma kolonit

Pyetja 178

Vlerësimi optimal i prostatës realizohet me:

- A) Ekografi me rrugë suprapubike
- B) Ekografi me rrugë transrektale
- C) CT
- D) RM
- E) Cistografi

Pyetja 179

Në vlerësimin e pankreatitit akut është i rëndësishëm:

- A) Ekografia
- B) RM
- C) CT
- D) Radiografia
- E) Shintigrafia

Pyetja 180

Për ndjekjen e ecurisë të transplantit reanl përdoret:

- A) CT
- B) RM
- C) Urografia
- D) Ekografia+ekocolor-Doppler
- E) Radiografi abdominale

Pyetja 181

Spondilolisteza karakterizohet nga:

- A) Rrëshqitje nga prapa e trupit të vertebrës
- B) Rrëshqitje laterale e trupit të vertebrës
- C) Frakturë e trupit të vertebrës
- D) Rrëshqitje nga përpara e trupit të vertebrës
- E) Asnjë

Pyetja 182

Cila është metoda e përzgjedhur në studimin e mamellave:

- A) Mammografia
- B) Ekografia
- C) Xerodiagrafia
- D) RMN
- E) Termografia

Pyetja 183

Nëse dyshohet për veshkë polikistike, urografia është një ekzaminim:

- A) Dytësor
- B) Thelbësor në vendosje diagnoze
- C) Bashkëshoqërues i shintigrafisë
- D) Që nuk ka asnjë vlerë
- E) I pa zëvendësueshëm

Pyetja 184

Në fazën akute (10 orë) të një aksidenti cerebro vaskular (AVC) reperti më i shpeshtë në CT është:

- A) Edema difuze
- B) Hiperdensiteti pas administrimit të lëndët të kontrastit intravenë
- C) Negativiteti
- D) Hipodensiteti fokal
- E) Hiperdensiteti fokal

Pyetja 185

Në rastin e një pankreatiti kronik cili ekzaminim mund të japi të dhëna më të plota?

- A) Wirsungografia retrograde
- B) Shintigrafia
- C) CT
- D) Radiografia abdominale
- E) Angiografia

Pyetja 186

Një grua diagnostikohet në mamografi me mikro kalçifikime parenkimale. Çfarë ekzaminimi do të kërkonit më tej?

- A) Galaktografi
- B) Galakto-RM
- C) Biopsi e drejtuar ekografikisht
- D) Biopsi stereotaksike
- E) Ekografi

Pyetja 187

Kur dyshohet për ikter obstruktiv cili ekzaminim instrumental kërkohet fillimisht?

- A) Kolangio-RM
- B) ERCP (endoscopic retrograde colangio-pancreatography)
- C) CT abdominale
- D) Ekografi abdominale
- E) CT abdominale me kontrast

Pyetja 188

Gadolina (lëndë kontrasti) kalon barrierrën hemato-encefalike në cilën situatë?

- A) vetëm në rast të patologjive neoplazike
- B) vetëm në rast të patologjive neoplazike malinje
- C) kur dëmtohet barriera hemato-encefalike
- D) asnjëherë

Pyetja 189

Cili ekzaminim radiologjik është më i përshtatshmi për vlerësimin e ndërlikimeve të pankreatitit akut?

- A) Ekografia abdominale
- B) Radiografi abdominale
- C) Kolangio-RM
- D) TC
- E) TC bazale

Pyetja 190

Një i sëmurë 70 vjeç vlerësohet si pozitiv për praninë e gjakut në feçe. Nëse mbi bazë të kësaj të dhëne dhe të dydhonit për një lezion neoplazik intestinale cili ekzaminim do të duhej për vendosjen e një diagnoze të sigurt?

- A) Klizma
- B) Kolonoskopia e CT
- C) CT abdominale
- D) Klizma me dopio kontrast
- E) Kolonsigmoidoskopia

Pyetja 191

Cili është burimi energjistik që përdoret në RMN?

- A) Rrezet infra të kuqe
- B) Fushat magnetike
- C) Radiacioni i jonizuar
- D) Valët G
- E) Ultratingulli

Pyetja 192

Cili është aspekti radiologjik tipik i versamentit pleural?

- A) Opaciteti nodular
- B) Zona të radiotransparencës apikale
- C) Zona të radiotransparencës bazale
- D) Opacitet bazal me buzën e sipërme konkave
- E) Opacitet bazal me buzën e sipërme konvekse

Pyetja 193

Flebografia është një ekzaminim imazherik që studion:

- A) Arteriet
- B) Venat
- C) Artikulacionet
- D) Zemrën e majtë (atrium+ventrikul)
- E) Zemrën e djathtë (atrium + ventrikul)

Pyetja 194

Për vendosjen e diagnozës të hidronefrozës është e nevojshme:

- A) RM
- B) CT
- C) Urografia
- D) Ekografia
- E) Radiografi direkte renale

Pyetja 195

Në një pacient me trauma kraniale cili është ekzaminimi bazë?

- A) Radiografi kraniale
- B) RM encefalike
- C) CT koke
- D) RM trupit
- E) Asnjë

Pyetja 196

Nëse një pacient dyshohet për një sëmundje inflamatore kronike intestinale me anë të cilit ekzaminim vendoset diagnoza?

- A) Entero-RM
- B) Radiografi e aparatit tretës
- C) Entero-TC
- D) Colonsigmoidoskopia
- E) Ekografi

Pyetja 197

Nëse dyshoni për emboli pulmonare cili ekzaminim instrumental lejon të vendosni diagnozën?

- A) Radiografia
- B) TC torakale
- C) Angio TC torakale
- D) Ekografia trans-ezofageale
- E) Ekokardiografia

Pyetja 198

Cila është prerja optimale e përdorur në HRCT?

- A) 1-2 mm
- B) 2-3 mm
- C) 1 cm
- D) 0.1 mm
- E) 4-5 mm

Pyetja 199

Rentgenoskopia në projeksionin anësor dhe të pjerrët shërben:

- A) për të saktësuar vendndodhjen e procesit patologjik brenda ose jashtë mushkrive
- B) për të parë hapjen dhe mbylljen e sinuseve freniko-kostale
- C) për të zbuluar sasisë të vogla të lëngut në zgavrën pleurale
- D) për të zbuluar praninë e ngjitjeve pleurale (aderenca)
- E) të gjitha

Pyetja 200

Sqarimet e përhapura pulmonare në rastin e emfizemës pulmonare karakterizohen nga:

- A) shtim të qartësisë të dy fushave pulmonare
- B) diafragma e ulur dhe e sheshuar
- C) rrallim të vizatimit mushkëror në periferi
- D) të gjitha

Pyetja 201

Errësimet në formë vijash ( si shinat e trenit) janë karakteristikë e:

- A) bronhektazisë
- B) atelektazës
- C) astmës bronkiale

- D) pneumopatie
- E) abcesit

#### Pyetja 202

Figura hidroaerike e rrumbullakët me strukturë jo të njëtrajtshme e përbërë nga një errësim nga ana e poshtme me formë gjysmëhënë dhe një pjesë e tejdukshme nga ana e sipërme i korrespondon shfaqjes radiologjike pulmonare të një:

- A) abcesi pulmonar
- B) ekinokoku pulmonar
- C) pneumopatie
- D) hernie diafragmale
- E) bronhektazie

#### Pyetja 203

Kriter radiologjik që shkon në favor të një noduli pulmonar malinj janë:

- A) forma jo e rregullt
- B) buzët jo të rregullta
- C) mungesa e kalçifikimeve ose kalçifikimet ekscentrike
- D) të gjitha përgjigjet

#### Pyetja 204

Për vlerësimin e retroperitoneumit, mënyra e zgjedhur është:

- A) urografia
- B) CT
- C) Ekografia
- D) Retropneumoperitonuemi
- E) RM

#### Pyetja 205

Cili ind është më rezistent ndaj rrezatimit:

- A) Testikuli
- B) Lëkura
- C) Muskuli i strijuar
- D) Ovari
- E) Epiteli

#### Pyetja 206

Cili ekzaminim realizohet për vlerësimin e tendinopative Akiliene:

- A) Ekografia
- B) Radiografia
- C) RM

- D) CT
- E) Xerografia

#### Pyetja 207

Në cilin rast kërkohet që të realizohet një kolangiografi perkutane:

- A) Kolecistit kronik
- B) Ikter obstruktiv
- C) Kolelitizaë
- D) Cirrozë biliare
- E) Hepatokarcinome

#### Pyetja 208

Ekografia transvaginale në studimin e patologjive të uterusit është:

- A) Një metodë që përdoret rrallë herë
- B) Një metodë që nuk përdoret më në ditët e sotme
- C) Një metodë që bën një vlerësim të kujdesshëm edhe në rast të neoplazive uterine
- D) Një metodë e vlefshme në vlerësimin e malformimeve uterine
- E) Asnjë

#### Pyetja 209

Në një pacient me hematemezë duhet realizuar:

- A) Radiografi e aparatit tretës me kontrast me barium
- B) Radiografi e thjeshtë e aparatit tretës
- C) Radiografi kur pacienti është esëll
- D) Ekografi e pjesës të sipërme abdominale
- E) Endoskopi

#### Pyetja 210

Kur dyshohet për një karcinomë pulmonare ekzaminimi i këshilluar është:

- A) Ekotomografia me color-Doppler
- B) RM
- C) Arteriografia
- D) CT
- E) Të gjitha këto

#### Pyetja 211

Mbi bazë të studimeve të randomizuara përmendet se depistimi nëpërmjet mamografisë është mjaft i rëndësishëm në uljen e vdekshmërisë nga kanceri i gjirit në gratë e moshës:

- A) 30-39 vjeç
- B) 40-49 vjeç
- C) 50-69 vjeç
- D) <70 vjeç

E) asnjë nga këto përgjigje

Pyetja 212

Në rastin e një hematome muskulare post- traumatike në nivel të kofshës, cila është teknika imazherike më e përshtatshme?

- A) Ekotomografia
- B) Xerografia
- C) Endoskopia
- D) CT
- E) Radiografia

Pyetja 213

Në vlerësimin e frakturave kockore cila teknikë diagnostike imazherike përbën zgjedhjen e parë?

- A) Radiografia direkte
- B) Shintigrafia kockore
- C) RM
- D) CT
- E) Ekografia

Pyetja 214

Në rast të embolisë pulmonare ekzaminimi imazherik më i përshtatshëm është:

- A) CT spirale
- B) Radiografi
- C) RM
- D) Ekocolor Doppler
- E) PET

Pyetja 215

Cili nga strukturat më poshtë është më i ndjeshëm ndaj rrezatimit?

- A) Kolageni
- B) Tiroidja
- C) Mëlçia
- D) Veshka
- E) Palca kockore

Pyetja 216

Patologjia nodulare e tiroides studiohet fillimisht me:

- A) Radiografi e qafës për indet e buta
- B) CT
- C) RM
- D) Shintigrafi
- E) Ekografi



Pyetja 217

Në vlerësimin e tubujve uterin luan rol të rëndësishëm:

- A) Radiografia
- B) Ekotomografia
- C) CT
- D) Histersalpingografia
- E) RM

Pyetja 218

Rrezatimi jonizues ka efekte anësore:

- A) Somatike
- B) Gjenetike
- C) Somatike dhe gjenetike
- D) Ulje të eritrosedimentit
- E) Asnjë

Pyetja 219

Një nodul tiroidien që paraqitet i ngrohtë në shintigrafi mund të jetë:

- A) Gushë endemike
- B) Adenoma Plummer
- C) Karcionoma e padiferencuar
- D) Karcionoma oksifile
- E) Adenoma embrionale

Pyetja 220

Nëse dyshohet klinikisht për emboli pulmonare, radiografia e toraksit:

- A) Nuk realizohet asnjëherë
- B) Ka vlerë diagnostike
- C) Duhet të realizohet gjithmonë
- D) Realizohet pas vlerësimit shintigrafik ventilim-perfuzion
- E) Ka ndjeshmeri më të madhe se CT

Pyetja 221

Cilat janë karakteristikat ekografike të një strukture homogjene?

- A) Prania e ekos me intensitet të njejtë të shpërndarë në mënyrë uniforme
- B) Prania e ekos me intensitet të dobët
- C) Hije akustike laterale
- D) Anekogenicitet
- E) Përforcim i murit të pasëm

Pyetja 222

Në vlerësimin e traumave të fytyrës realizohet gjithmonë një:

- A) Radiografi e kokës
- B) Vetëm CT
- C) Vetëm RM
- D) Radiografi dhe CT e kokës
- E) Radiografi dhe RM e kokës

Pyetja 223

Qafa vlerësohet me anë të:

- A) CT
- B) RM
- C) Ekografisë
- D) Angiografisë
- E) Sialografisë

Pyetja 224

Në radiografinë torakale radiopaciteti është i ulur në kushtet të:

- A) Pnemonisë nga aerobët
- B) Versamentit pleural
- C) Pneumotoraksit
- D) Cisteve
- E) Pnemonisë nga anaerobët

Pyetja 225

Shisurat pleurale evidentohen në:

- A) Radiografi dhe CT
- B) Vetëm në radiografi
- C) Vetëm në CT
- D) Në ekografi
- E) Vetëm në raste të patologjisë pleurale

Pyetja 226

Kundërindikacionet parësore për realizimin e RM janë:

- A) Pace-maker në trupin e pacientit
- B) Fragmente metalike në trupin e pacientit
- C) Klipse aneurizmale në trupin e pacientit
- D) Proteza valvulare në trupin e pacientit
- E) Të gjitha përgjigjet janë të sakta

Pyetja 227

Çfarë kuptoni me efekt Doppler?

- A) Modifikim i frekuencës të tufës të ultratingullit kur kjo e fundit emetohet nga një trup në lëvizje
- B) Modifikim i drejtimit të tufës të ultratingullit kur kjo e fundit emetohet nga një trup në lëvizje
- C) Modifikim i tufës të ultratingullit kur kjo e fundit emetohet nga një trup në lëvizje
- D) Pasqyrim direkt i tufës të ultratingullit
- E) Pasqyrim me difuzion i tufës të ultratingullit

Pyetja 228

Lëndët e kontrastit në CT:

- A) Jepen me rrugë orale dhe endovenoze
- B) Nuk përdoren fare
- C) Përdoren vetëm në disa raste
- D) Në CT e aparatit tretës përdoret sulfat bariumi
- E) Në CT abdominale jepen si perfuzion me pika

Pyetja 229

Cila nga këto patologji kërkon përdorimin e një angiografie cerbrale?

- A) Iktus ishemic
- B) Hematoma epidurale
- C) Gjendja epileptike
- D) Disekimi i karotides
- E) Hemorragjia intracerebrale

## 14. Okulistikë dhe ORL

Pyetja 1

Një diplopi e papritur e shoqëruar me strabizem konvergjent shkaktohet nga:

- A) paraliza e nervit të VI kranial
- B) paraliza e nervit të III kranial
- C) neuriti retrobulbar akut
- D) okluzioni i arteries qendrore të retines
- E) neuralgjia e trigeminusit

Pyetja 2

Te dhjetat dhe dioptrite:

- A) janë e njejta gje
- B) nuk kanë asnjë lidhje ndermet tyre
- C) janë të lidhura në mënyrë të drejteperdrejte
- D) janë të barabarta me 10 të një subjekti normal
- E) shprehin mprehtesine vizive dhe luhaten nga 1 deri në 10

Pyetja 3

Përdorimi i zgjatur i kolireve me kortizon të subjektet e predispozuar mund të provokojë:

- A) opacitet korneal

- B) katarakt
- C) turbullim te vitrozit
- D) konjuktivit kronik
- E) glaukome dytesore

Pyetja 4

Një hemianopsi bitemporale pergjithesisht shkaktohet nga nje:

- A) lezion komprimues ne nervat optike
- B) lezion ne korteksin cerebral oksipital
- C) lezion ekspansiv ne hipofize
- D) hemorragji subaraknoidale
- E) lezion ne rrezatimet optike

Pyetja 5

Ne rast diplopie me fillim akut është e nevojshme qe:

- A) te pritet qe simptomat te regredojne
- B) te mbyllet me bende syri i devijuar
- C) te kerkohet një konsulte neurologjike urgjente
- D) te jepen kapilaroprotektore
- E) te kryhet një monitorim i presionit arterial

Pyetja 6

Nderlikimi me i rrezikshem i arteritit Horton te patrajtuar është:

- A) embolia cerebrale
- B) verberia bilaterale e parikthyeshme
- C) tromboza e arteries temporale siperfaqesore
- D) shurdhesia kokleare
- E) atake te forta e te përsëritura cefaleje

Pyetja 7

Ne rastin e një syri te kuq, te dhembshem, me ulje te moderuar te vizusit dhe me mioze pupilare, diagnoza me e mundshme është:

- A) glaukoma akute
- B) iridocikliti akut
- C) konjuktiviti akut
- D) neuriti optik akut
- E) okluzioni i venes qendrore te retines

Pyetja 8

Presioni endokular i një subjekti normal:

- A) është i lidhur drejteperdrejte me presionin arterial
- B) luhetet nga 10 deri ne 20 mmHg
- C) ulet ne pozicion supin
- D) ulet me rritjen e moshes
- E) luhetet nga 20 deri ne 30 mmHg

Pyetja 9

Një ekzoftalmi e shoqëruar me retraksion të palpebrës superiore shoqërohet shpesh me:

- A) byc
- B) paralize të nervit të III kranial
- C) morbus Basedow
- D) mielome multiple
- E) sarkoidoze

Pyetja 10

Një diplopi e papritur e shoqëruar me strabizem konvergjent shkaktohet nga:

- A) paraliza e nervit të VI kranial
- B) paraliza e nervit të III kranial
- C) neuriti retrobulbar akut
- D) okluzioni i arteries qendrore të retines
- E) neuralgjia e trigeminusit

Pyetja 11

Një ulje e pamjes nën kushtet e dritës së muzgut (emeralopia) është një simptomë tipike e:

- A) glaukomes kronike të thjeshtë
- B) neuritit optik toksik
- C) makulopatise degjenerative
- D) retinitit pigmentoz
- E) kataraktit

Pyetja 12

Glaukoma:

- A) presioni intraokular normal i të rriturit duhet të jetë  $20 \pm 3$  mmHg
- B) manifestohet vetëm te personat me miopi
- C) glaukoma kronike e thjeshtë me kënd të hapur karakterizohet nga rritja e presionit intraokular, alterime të nervit optik dhe nga deficioni pasues i kampusit viziv
- D) demtimi i nervit optik shoqërohet gjithmonë me një rritje patologjike të presionit intraokular
- E) në patologjete ka një rritje primitive të prodhimit të korpusit vitroz

Pyetja 13

Një ulje monolaterale e papritur e vizusit pa dhembje mund të shkaktohet nga:

- A) shkollitja e retines
- B) glaukoma akute
- C) iridocikliti akut
- D) okluzioni i arteries qendrore të retines
- E) keratiti herpetik

Pyetja 14

Te një i porsalindur me fotofobi të spikatur dhe me lotim të vazhdueshme duhet të përjashtohet mundësia e pranisë së:

- A) glaukomes kongjenitale

- B) okluzionit të kanaleve lakrimale
- C) keratitit herpetik
- D) konjuktivitit gonokoksik
- E) kataraktit kongjenital

Pyetja 15

Përgjegjës për shfaqjen e papritur të bliceve luminoze (fosfenet) dhe të mizave fluturuese është:

- A) ataku i glaukomes akute
- B) neuriti optik
- C) makulopatia eksudative
- D) okluzioni i arteries qendrore të retines
- E) shkollitja posteriore e vitrozit

Pyetja 16

Cila prej simptomave të mëposhtme nuk shkaktohet kurrë nga një katarakt:

- A) ulja progresive e vizusit
- B) miopia me rendim gradual
- C) ulja e ndjeshmerisë ndaj kontrastit
- D) diplopia monokulare
- E) reduktimi koncentrik i kampusit viziv

Pyetja 17

Një hemorragji subkonjuktivale spontane:

- A) është gjithmone tregues i një patologjie vaskulare të rënde
- B) kërkon kryerjen e vizites okulistike urgjente
- C) mund të jetë shenjë e një glaukome incipiente
- D) duhet të trajtohet me kolire vazokonstriktore
- E) nuk ka nevojë për asnjë lloj terapie

Pyetja 18

Gjate një krize glaukome akute:

- A) pupila ndodhet në mioze
- B) është i pranishëm pruriti
- C) ka sekrecion mukopurulent
- D) vizusi mbetet i mirë
- E) është e pranishme një dhembje intense e vetullave

Pyetja 19

Retinopatia diabetike:

- A) është e pranishme në 40% të pacientëve të sëmurë prej më shumë se 15 vjet
- B) patogjeneza përbehet nga alterime të paretëve vazale, të fluksit të gjakut dhe të agregacionit trombocitar
- C) demtimi ishemi, nëse nuk trajtohet, me kalimin e kohës çon drejt një neovaskulogjeneze vetëm në disa zona retinike
- D) terapia është gjithmone dhe vetëm kirurgjia (vitrektomia)

E) retinopatia është demtimi i vetem okular i diabetit

Pyetja 20

Simptomat karakteristike te shkolitjes se retines janë:

- A) amauroza e papritur
- B) blice luminoze te ndjekura nga reduktimi progresiv i kampusit viziv ne një sektor
- C) dhembja akute dhe ulja graduale e vizusit
- D) reduktimi i madh i ndjeshmerise ndaj kontrastit
- E) diplopia

Pyetja 21

Abuzimi i alkoolit dhe i duhanit mund te provokojë:

- A) katarakt
- B) glaukome kronike
- C) neurit optik retrobulbar
- D) paralize te nervit te III kranial
- E) makulopati degjenerative

Pyetja 22

Shfaqja e papritur e fotofobise, lotimit dhe e dhembjes monokulare shkaktohet shpeshhere nga:

- A) iridocikliti
- B) konjuktiviti kataral
- C) trupi i huaj korneal
- D) kalatio
- E) glaukoma akute

Pyetja 23

Ne rast dyshimi per keratit herpetik, gabimi qe duhet te shmanget është:

- A) mbyllja e syrit me bende
- B) dhenia e kolireve me kortizon
- C) dhenia e kolireve me antibiotik
- D) te pritet 2-3 dite perpara se te referohet pacienti tek okulisti
- E) te fillohet menjehere një trajtim antiviral

Pyetja 24

Një edeme palpebrale me dhembje akute ne digitopresion zakonisht shkaktohet nga:

- A) neuriti optik akut
- B) glaukoma akute
- C) ekzoftalmusi tireotoksik
- D) kalatio
- E) byci

Pyetja 25

Cila prej shenjave te mëposhtme nuk është karakteristike per konjuktivitin kataral akut?

- A) hiperemia konjuktivale

- B) sekrecioni mukopurulent
- C) ulja e madhe e mprehtesise se pamjes
- D) edema palpebrale
- E) fotofobia

Pyetja 26

Një trajtim i zgjatur me kortizonike sistemike mund te shkaktoje:

- A) glaukome
- B) opacitet te vitrozit
- C) makulopati degjenerative
- D) katarakt
- E) depozitime korneale

Pyetja 27

Rabdomiosarkoma:

- A) është një tumor benign i orbites
- B) është tumori malinj orbital me i shpësthtë gjate femijerise
- C) simptomatologjia fillon në mënyrë të fshehte dhe shumë ngadale
- D) terapia e vetme është exenteratio orbitae
- E) duhet te kryhet diagnoza diferenciale me retinoblastomen

Pyetja 28

Katarakta:

- A) është një opacitet i lenteve dioptrike
- B) shfaqet te te tere personat mbi moshen 65-vjeçare
- C) kataraktat kongjenitale nuk duhet te operohen kurre perpara moshes 3 vjeç
- D) aktualisht interventi i zgjedhur është fakoemulsifikimi me implant te lentes intraokulare (IOL)
- E) Katarakte dytesore është një opacifikim i lentes intraokulare te implantuar

Pyetja 29

Mukocela e sinuseve paranazale provokon:

- A) rritje te trashesise kockore
- B) opacizim te sinusit
- C) obliterim te duktusit nazolakrimal
- D) erozion te pareteve kockore
- E) bllokim te ostiumit te sinusit

Pyetja 30

Zona vizive (optike) ndodhet ne lobin:

- A) parietal
- B) temporal
- C) limbik
- D) frontal
- E) oksipital



Pyetja 31

Vertigo paroksistike pozicionale beninje shkaktohet nga:

- A) litiata utrikulare
- B) litiata sakulare
- C) litiata kokleare
- D) kupulokanalolitiata laterale ose posteriore
- E) kupulokanalolitiata laterale ose superiore

Pyetja 32

Nje simptome konstante e dermatiteve aurikulare eshte:

- A) pruriti
- B) otorragjia
- C) otodinia
- D) hipoakusia
- E) akufeni

Pyetja 33

Ne cilen prej semundjeve te meposhtme te veshit ka rrezik per nderlikime endokraniale?

- A) otiti kataral kronik
- B) otiti kronik i thjeshte
- C) kolesteatoma
- D) otoskleroza
- E) otiti ekstern mikotik

Pyetja 34

Stapedioplastika eshte nje nderhyrje qe ka si qellim zgjidhjen e hipoakusise perçuese te:

- A) otitit kataral kronik
- B) perforacionit te membranës timpanike
- C) otosklerozes stapedio-ovalare
- D) kolesteatomes se veshit te mesem
- E) otitit kronik skleroadeziv

Pyetja 35

Mobiliteti i kordave vokale (abduksion/adduksion) sigurohet nga funksioni i:

- A) nervave glosofaringeale
- B) nervave laringeale superiore
- C) nervave laringeale inferiore (rekurente)
- D) nervave hipoglosike
- E) te tera pergjigjet e mesiperme jane te sakta

Pyetja 36

Ne cilen prej semundjeve te meposhtme indikohet injektimi intratimpanik i gentamicines?

- A) ne otitin sieromukoz
- B) ne otitin akut si alternative e antibiotikut per os

- C) ne akufene
- D) ne semundjen Meniere
- E) ne vertigot pozicionale

Pyetja 37

Nje dispne obstruktive laringeale kerkon:

- A) terapi antibiotike, qendrim ne pozicion ulur/gjysme ulur, shtrim ne spital
- B) terapi antibiotike, qendrim ne pozicion klinostatik, shtrim ne spital
- C) terapi me kortikosteroide, qendrim ne pozicion klinostatik, shtrim ne spital
- D) terapi me kortikosteroide, qendrim ne pozicion ulur/gjysme ulur, shtrim ne spital
- E) terapi me kortikosteroide, qendrim ne pozicion ulur/gjysme ulur, ndjekje ambulate

Pyetja 38

Furunkuli i alae nasi kerkon:

- A) terapi kunder dhimbjes
- B) terapi antibiotike
- C) terapia aereosolike me kortikosteroide
- D) terapi kirurgjikale
- E) indikohen te tera keto terapi

Pyetja 39

Nje tumefaksion retroaurikular shume i dhembshem ne prekje duhet te beje te linde dyshimi per:

- A) parotit akut
- B) mastoidit akut
- C) absces cerebral
- D) otit kronik kolesteatomatoz
- E) otit i mesem akut kataral

Pyetja 40

Me emertimin hipoakusi perçuese nenkuptohet nje ulje e degjimit e shkaktuar nga patologjia:

- A) e veshit jashtem dhe/ose te mesem
- B) e veshit te mesem dhe te brendshem
- C) vetem e veshit te jashtem
- D) vetem e veshit te mesem
- E) vetem e veshit te brendshem

Pyetja 41

Nga cila prej problemeve te meposhtme shkactohet hipoakusia perçuese otosklerotike?

- A) nga nje ngushtim subtotal i perçimit uditiv nga ezostoza masive
- B) nga nje demtim koklear si rrjedhoje e nje vaskulopatie aterosklerotike
- C) nga nje degjenerim me baze gjenetike te organit te Corti
- D) nga nje bllokim cikatricial i artikulacionit incus-malleus
- E) nga nje mobilitet i reduktuar i stapesit si rrjedhoje e nje vatre otospongiotike

Pyetja 42

Cila prej pohimeve te meposhtme identifikon hiperreaktivitetin nazal?

- A) Eshte sinonim i rinitit alergjik
- B) Eshte tendence per te vuajtur nga epistaksis te shpeshta
- C) Eshte nje prurit me baze ekzematoza i lekures se piramides nazale
- D) Eshte reaksion jonormal i mukozes nazale ndaj stimujve te ndryshem fizike, kimike ose farmakologjike
- E) Eshte nje rinorre profuze qe shfaqet te subjektet alergjike ndaj poleneve

Pyetja 43

Trajtimi i epistaksisit:

- A) kerkon gjithmone nderhyrjen e specialistit ORL
- B) kerkon perdorimin e pambikut hemostatik (me perklorur hekuri)
- C) kerkon shpeshhere ligatura vaskulare
- D) te tera pergjigjet
- E) asnje prej pergjigjeve

Pyetja 44

Gjate kryerjes se parotidektomise eshte e nevojshme qe te identifikohet me pare nervi facial ne pozicionin e daljes se tij nga kraniumi nepermjet:

- A) foramenit oval
- B) foramenit stilomastoid
- C) foramenit oksipital
- D) foramenit rotund
- E) foramenit spinoz

Pyetja 45

Cila prej laringopative te meposhtme nuk korrelohet kurre me refluksin gastroezofageal:

- A) kistet epidermoide intrakordale
- B) granuloma laringeale posteriore
- C) laringiti posterior
- D) pseudosulkusi
- E) hiperemia e aritenoideve

Pyetja 46

Hipoakusia, akufenet dhe vertigot objektive jane triada simptomatologjike karakteristike e:

- A) otitit te mesem akut
- B) otitit kronik purulent
- C) semundjes Menière
- D) otosklerozes
- E) otitit kronik timpanosklerotik

Pyetja 47

Nje stenoze e kanalit te jashtem te degjimit me dhembje te forte lokale dhe mungese otorreje duhet te beje te linde dyshimi per:

- A) otit ekstern akut furunkular
- B) otit te mesem akut kataral

- C) otit te mesem akut purulent
- D) neoplazi te veshit
- E) asnje prej pergjigjeve

Pyetja 48

Nje vertigo "objektive" eshte karakteristike per:

- A) patologji periferike te veshit (veshi i mesem dhe i brendshem)
- B) patologji e sistemit nervor qendror
- C) patologji te trungut encefalik
- D) patologji te rakidit cervikal
- E) patologji vizive

Pyetja 49

Nje tumefaksion hiperemik, duro-elastik, i dhembshem i piramides nazale ben te linde dyshimi per:

- A) TBC nazale
- B) sinusit akut
- C) furunkul te hundes
- D) karcinome te hundes
- E) asnje prej pergjigjeve

Pyetja 50

Me termin hipoakusi perceptive nenkuptohet nje ulje e degjimit e lidhur me patologjine e:

- A) veshit te jashtem dhe/ose te mesem
- B) veshit te mesem dhe te brendshem
- C) vetem te veshit te jashtem
- D) vetem te veshit te mesem
- E) vetem te veshit te brendshem

Pyetja 51

Nje tumefaksion monolateral i tonsiles, me dhembje lokale te forte, disfagi dhe hiperpireksi, ben te linde dyshimi per:

- A) tonsilit akut purulent
- B) mononukleoze infektive
- C) absces peritonsilar
- D) karcinome tonsilare
- E) limfome tonsilare

Pyetja 52

Kistadenolimfoma eshte:

- A) nje tumor malinj i veshit te mesem
- B) nje tumor beninj i gjendrave salivare
- C) nje infiltrat limfocitar difuz i parotides
- D) kuadri histologjik karakteristik i gjendrave salivare minore ne sindromen e Sjögren
- E) nje tip i veçante limfome qe prek tonsilen palatine

Pyetja 53

Nje disfoni qe zgjat per me shume se 15 dite kerkon:

- A) terapi antibiotike
- B) terapi me kortikosteroide
- C) terapi termale sulfure
- D) kontroll laringoskopik
- E) CT te qafes dhe te laringut

Pyetja 54

Ne cilen prej situatave te meposhtme indikohet injektimi i toksines botulinike ne kordat vokale?

- A) ne presbifoni
- B) ne disfoninen disfunktionale hiperkinetike
- C) ne disfonine spazmodike
- D) ne nodujt kordale
- E) ne afonine psikogjene

Pyetja 55

Kur kerkohet vleresimi nga specialisti per kryerjen e nje laringoskopie ne rast disfonie persistente?

- A) pas disa cikleve mujore te perseritura me terapi mjekesore te pergjithshme dhe inhalatore
- B) vetem nese shoqerohet me disfagi
- C) vetem nese pacienti eshte duhanpires
- D) nese lind gjate nje episodi flogjistik te rrugeve te siperme respiratore
- E) nese nuk zgjidhet brenda 15 diteve

Pyetja 56

Hipertrofia adenoidale e spikatur tek femijet tregon:

- A) hipoakusi perçuese
- B) dispne nazale
- C) rinolali te mbyllur posteriore
- D) te tera pergjigjet jane te sakta
- E) asnjera

Pyetja 57

Nje tumefaksion i vetem, i forte, i padhembshem, i levizshem ose pak i levizshem, ne pozicion nen kendin e mandibules, ben te linde dyshimi per:

- A) limfoadenit supurativ
- B) limfoadenit reaktiv
- C) lokalizim limfomatoz
- D) adenopati metastazike nga karcinoma e rrugeve te siperme respiratore-digjестive
- E) limfoadenit tuberkular

Pyetja 58

Te nje pacient i moshuar, pa dhembe, nje disfagi e rende dhe e menjehershme duhet te beje te mendoje per nje:

- A) karcinome ezofageale
- B) trup te huaj ne ezofag

- C) bolus alimentar ne ezofag
- D) ezofagit akut
- E) ezofagit nga refluksi

Pyetja 59

Nje tonsilit kronik, hipertrofik, jo i riakutizuar, te femijet eshte indikacion per tonsilektomi:

- A) po, gjithmone
- B) jo, asnjehere
- C) vetem nese hipertrofia shkaktom komprometim te funksioneve te fonise/gellititjes/respirimit
- D) vetem te pacientet me moshe mbi gjashte vjeç
- E) vetem te pacientet me moshe nen gjashte vjeç

Pyetja 60

Nje tumefaksion i dhembshem, me fillim te menjehershem, ne nje gjender te vetme submandibulare kerkon:

- A) terapi antibiotike te menjehershme
- B) terapi kortizonike
- C) hidratim te kujdesshem te pacientit
- D) kontroll per kalkula salivare me teknikat e "imazherise" (rreze x, ekografi)
- E) ndjekje ne kohe

Pyetja 61

Cila nga te meposhtmet eshte manifestimi me i shpeshte otorinolaringoiatrik i morbus Rendu-Osler?

- A) hematemeza
- B) hemoptoe
- C) epistaksis
- D) otorragjia
- E) hemorragjia intrakordale

Pyetja 62

Nje hipoakusi ekskluzivisht neurosensoriale verehet vetem ne nje prej patologjive te meposhtme:

- A) otoskleroza stapedio-ovalare
- B) otiti kronik kolesteatomatoz
- C) otiti kataral kronik
- D) hipoakusia e papritur
- E) shkeputja e zinxhirit

Pyetja 63

Tek nje femije me otit sieromukoz, pergjegjes per hipoakusi te rendesishme dhe te vazhdueshme, qe nuk zgjidhet pas terapise se pershtatshme medikamentoze, termale ose logopedike (riedukimi tubarik), cili eshte indikacion terapeutik kryesor nder mundesite

- A) adenoidektomia
- B) tonsilektomia bilaterale
- C) vendosja e tubit te ventilimit
- D) adenotonsilektomia
- E) adenoidektomia dhe vendosja e tubit te ventilimit

Pyetja 64

Otorea, hipoakusia, otalgjia bejne te linde dyshimi per:

- A) otit te mesem akut
- B) otit kronik kolesteatomatoz
- C) semundjes Menière
- D) otoskleroze
- E) otit kronik timpanosklerotik

Pyetja 65

Vertigo "objektive" korrespondon me simptomatologjine e meposhtme:

- A) ndjesi rrotullimi te ambientit perreth subjektit
- B) ndjesi rrotullimi te subjektit ne ambient
- C) ndjesi rrezimi
- D) ndjesi "te renit te te fikeve"
- E) halucinacione vizive me pamje te "objekteve" qe nuk ekzistojne

Pyetja 66

Simptoma e pare e nje karcinome fillestare te nje korde vokale eshte:

- A) disfagia
- B) disfonia
- C) dispnea
- D) dhembja lokale
- E) kolla produktive

Pyetja 67

"Fungus ball" eshte nje:

- A) forme e veçante sinusiti mikotik
- B) polipoze nazale masive te nje pacient me alergji nga funget
- C) kist i epiglotisit qe permban hife fungale
- D) otit ekstern mikotik me obstrukcion masiv te kanalit te degjimit
- E) ezofagit nga kandida, pergjegjes per disfagi te rende

Pyetja 68

Nje traume nazale direkte shkakton pergjithesisht:

- A) frakture te kockave nazale
- B) frakture te septumit nazal
- C) frakture te kartilagove alare
- D) frakture te vomerit
- E) frakture komplekse qe i perfshin te tera strukturat e permendura

Pyetja 69

Presbiakusia (degjimi i te moshuarit) shkakton:

- A) hipoakusi per tonet akute
- B) hipoakusi per tonet e mesme

- C) anakusi (shurdhesi totale)
- D) hipoakusi me vertigo objektive
- E) hipoakusi me vertigo subjektive

Pyetja 70

Cila prej zonave te meposhtme te formimit te kancerit te laringut ben pergjithesisht te mundur nje diagnoze me te hershme?

- A) epiglotisi
- B) plani i glotisit
- C) vestibuli laringeal
- D) plika ari-epiglotike
- E) rajoni subglotik

Pyetja 71

Rinorea sieroze, teshtitjet e perseritura, stenoza nazale, lotimi bejne te linde dyshimi per:

- A) rinopati alergjike
- B) polipoze nazale
- C) rinit infektiv nga koke Gram+
- D) sinusit frontal purulent
- E) trup i huaj ne hunde