



PROVIMI I MATURËS SHTETËRORE 2022

SKEMA E VLERËSIMIT TË TESTIT

Matematikë (Gjimnaz)

Varianti A

*Shënim:*

- Vlerësuesit e testeve janë trajnuar, që të vlerësojnë çdo përpjekje të nxënësit dhe të jenë të kujdesshëm, sidomos në pyetjet me zhvillim dhe arsyetim, që kanë më shumë se një mundësi zgjidhjeje.
- Çdo zgjidhje e dhënë nga nxënësit ndryshe nga skema e vlerësimit, por që komisioni i vlerësimit e gjykon si të saktë, do të marrë pikët përkatëse.
- Përgjigjet e sakta për pyetjet me alternativa vlerësohen me 1 pikë.

*Përgjigjet e sakta për pyetjet me alternativa*

|                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Pyetja              | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| Alternativa e saktë | C  | A  | D  | D  | B  | A  | D  | B  | C  | C  |
| Pyetja              | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Alternativa e saktë | B  | D  | C  | C  | C  | A  | D  | C  | A  | A  |

Pyetjet me zhvillim dhe arsyetim

Pyetja 21 (a)                      1 pikë

Përgjigje e plotë:

$$a_n = 5 - 2n$$

$$a_7 = 5 - 2 \times 7$$

$$a_7 = 5 - 14$$

$$a_7 = -9$$

1 pikë                      Nëse nxënësi gjen vlerën e saktë të kufizës së shtatë të vargut:  $a_7 = -9$ .

0 pikë                      Nëse nxënësi nuk ka shkruar fare OSE ka bërë zgjidhje të gabuar.

**Pyetja 21 (b) 1 pikë**

Përgjigje e plotë:

$$a_n = -345$$

$$5 - 2n = -345$$

$$2n = 345 + 5$$

$$2n = 350$$

$$n = \frac{350}{2}$$

$$n = 175 \in N$$

Pra, numri -345 është kufiza e 175-të:  $a_{175} = -345$

**1 pikë** Nëse nxënësi provon që numri  $-375$  është  $a_{175}$ .

**0 pikë** Nëse nxënësi nuk ka shkruar fare **OSE** ka bërë zgjidhje të gabuar.

**Pyetja 22 (a) 2 pikë**

Përgjigje e plotë:

$$\frac{\log 25 + \log 4}{\log_3 9 - \log_3 27} = \frac{\log(25 \times 4)}{\log_3 \frac{9}{27}} = \frac{\log 100}{\log_3 \frac{1}{3}}$$

$$\frac{\log 10^2}{\log_3 3^{-1}} = \frac{2 \log 10}{-\log_3 3} = \frac{2}{-1} = -2$$

**2 pikë** Nëse nxënësi zbaton vetitë e logaritmeve në numërues dhe emërues, duke gjetur vlerën e thjeshtuar të shprehjes.

**1 pikë** Nëse nxënësi zbaton një nga vetitë e shumës/diferencës së dy logaritmeve me bazë të njëjtë **OSE** vlerëson vetëm dy logaritmet e njehsueshme në emërues:  $\log_3 9 = 2$  ose  $\log_3 27 = 3$ .

**0 pikë** Nëse nxënësi nuk ka shkruar fare **OSE** ka bërë zgjidhje të gabuar.

**Pyetja 22 (b) 3 pikë**

Përgjigje e plotë:

Për  $x \neq 1$ , kemi:  $\frac{(2-x)^2 - 3(x+1) + 7x - 2}{x-1} =$  Zbërthejmë katrorin e binomit.

Kryejmë veprimet brenda kllapës në mbledhorin e dytë në numërues, thjeshtojmë numëruesin:

$\frac{4 - 4x + x^2 - 3x - 3 + 7x - 2}{x-1}$  Kryejmë veprimet mes mbledhorëve të ngjashëm:

$$= \frac{x^2 - 1}{x-1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1 \text{ (Formula e diferencës së katrorëve)}$$

**3 pikë** Nëse nxënësi shndërron dhe thjeshton plotësisht dhe saktë thyesën racionale, duke demonstruar me shkrim hap pas hapi veprimet e kryera.

**2 pikë** Nëse nxënësi kryen saktë veprimet përgjatë thjeshtimit në numërues, duke e sjellë atë deri në trajtën  $\frac{x^2 - 1}{x-1}$


**1 pikë** Nëse nxënësi zbërthen saktë vetëm katrorin e binomit në numëruesin e thyesës **OSE** shumëzon saktë me  $-3$  kllapën e dytë në numërues.

**0 pikë** Nëse nxënësi nuk ka shkruar fare **OSE** ka bërë zgjidhje të gabuar.

**Pyetja 23 (a) 2 pikë**

Përgjigje e plotë:

Formula e njehsimit të syprinës së trekëndëshit:  $S = \frac{1}{2} a \times b \times \sin \gamma$



$$S = \frac{1}{2} AB \times AC \times \sin 60^\circ \Leftrightarrow 2\sqrt{3} = \frac{1}{2} \times x \times 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ kryejmë thjeshtimet e nevojshme dhe } x = 2\text{cm}$$

**2 pikë** Nëse nxënësi gjen saktë gjatësinë e panjohur  $x$  të brinjës  $AB$  përmes formulës  $S = \frac{1}{2} a \times b \times \sin \gamma$

**1 pikë** Nëse nxënësi shkruan formulën e njehsimit të syprinës së trekëndëshit, por kryen gabim veprimet që çojnë në gjetjen e vlerës së  $x$ .

**0 pikë** Nëse nxënësi nuk ka shkruar fare **OSE** ka bërë zgjidhje të gabuar.

**Pyetja 23 (b) 2 pikë**

**Përgjigje e plotë:**

Zbatojmë teoremën e kosinuit për trekëndëshin e dhënë  $\triangle ABC$ :  $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos \alpha$

$$BC^2 = 4 + 16 - 8 = 12$$

$$BC = \sqrt{12} \quad (\cos 60^\circ = \frac{1}{2})$$

$$BC = 2\sqrt{3}cm$$

**2 pikë** Nëse nxënësi gjen saktë gjatësinë e brinjës  $BC$  nëpërmjet formulës së Teoremës së kosinuit  $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos \alpha$ , duke vlerësuar gjatësinë e  $BC = 2\sqrt{3}cm$

**1 pikë** Nëse nxënësi shkruan formulën ( $a^2 = b^2 + c^2 - 2 \times a \times b \times \cos \alpha$ ) më sipër, por kryen njehsimet jo saktë.

**0 pikë** Nëse nxënësi nuk ka shkruar fare **OSE** ka bërë zgjidhje të gabuar.

**Pyetja 24 3 pikë**

**Përgjigje e plotë:**

$\triangle ADF \cong \triangle GDC$  sepse:

$$\begin{cases} \widehat{A} = \widehat{D} = 90^\circ \\ AD = DC = a \text{-brinja e katrorit:} \\ AF = DG \end{cases}$$

(Konditë e mjaftueshme e kongruencës së trekëndëshave kënddrejtë)

Në një çift trekëndëshash kongruentë:


Përballë brinjëve kongruente, ndodhen kënde me masë të njëjtë. Ndaj:  $\widehat{CGD} = \widehat{AFD} = 57^\circ$

Për  $\triangle ADF$ , këndi  $\widehat{ADF}$  është plotësues i këndit  $57^\circ$ , prandaj  $\widehat{ADF} = 90^\circ - 57^\circ = 33^\circ$ ,

nga ana tjetër këndi  $x$  është plotësues i  $\widehat{ADF}$ , pra  $\widehat{x} = 90^\circ - 33^\circ = 57^\circ$

**OSE**

$\widehat{AFD}$  dhe  $x$  janë kënde ndërrues të brendshëm caktuar nga çifti i brinjëve paralele  $AB$  dhe  $DC$  prerë nga  $DF$ , pra  $\widehat{x} = 90^\circ - 33^\circ = 57^\circ$



**3 pikë** Nëse nxënësi provon kongruencën e trekëndëshave dhe  $\widehat{CGD} = \widehat{AFD} = 57^\circ$ ,  $\widehat{ADF}$  dhe  $x$  janë kënde ndërrues të brendshëm caktuar nga çifti i brinjëve paralele  $AB$  dhe  $DC$  prerë nga  $DF$ , pra  $\widehat{x} = 90^\circ - 33^\circ = 57^\circ$

**2 pikë** Nëse nxënësi provon kongruencën  $\triangle ADF \cong \triangle GDF$  dhe tregon se  $\widehat{CGD} = \widehat{AFD} = 57^\circ$  **OSE** nxënësi shkruan vetëm " $x=57^\circ$ " pa arsyetim, pasi ka provuar kongruencën  $\triangle ADF \cong \triangle GDF$


**1 pikë** Nëse nxënësi nuk provon saktë kongruencën  $\triangle ADF \cong \triangle GDF$ , por tregon (ose shënon në figurë) se  $\widehat{CGD} = \widehat{AFD} = 57^\circ$  **OSE** nxënësi shkruan vetëm:  $x = 57^\circ$ , pa bërë arsyetimet e nevojshme **OSE** nxënësi gjen saktë një nga masat e këndeve:  $\widehat{AFD}$ ,  $\widehat{GCD}$ ,  $\widehat{GDE}$ ,  $\widehat{GED}$

**0 pikë** Nëse nxënësi nuk ka shkruar fare **OSE** ka bërë zgjidhje të gabuar.  
**Pyetja 25** **3 pikë**

Përgjigje e plotë:

$$V = \frac{8\pi}{3} \text{ cm}^2 \text{ ku } V = \frac{1}{3} S_b h, \text{ meqenëse } R = h$$

$$\Rightarrow \frac{\pi R^2 h}{3} = \frac{8\pi}{3} \Leftrightarrow \frac{\pi R^3}{3} = \frac{8\pi}{3} \Leftrightarrow R^3 = 8 \Leftrightarrow R = 2 \text{ cm}$$



Në  $\triangle SOB$  (kënddrejtë në  $O$ ) zbatohet Teoremi i Pitagorës:  $l^2 = R^2 + R^2 \Leftrightarrow l^2 = 8 \Leftrightarrow l = 2\sqrt{2} \text{ cm}$

**3 pikë** Nëse nxënësi ka vizatuar skicën e konit rrethor të drejtë (edhe nëse gjatësitë e rrezes dhe lartësisë nuk janë të barabarta), ka shfrytëzuar relacionin  $V = \frac{1}{3} S_b h \Rightarrow \frac{\pi R^2 h}{3} = \frac{8\pi}{3}$  dhe  $R = h$  duke gjetur saktë gjatësinë e rrezes:  $R = 2 \text{ cm}$  dhe ka zbatuar teoremën e Pitagorës duke gjetur saktë gjatësinë e përfutueses:  $l^2 = R^2 + R^2 \Leftrightarrow l^2 = 8 \Leftrightarrow l = 2\sqrt{2} \text{ cm}$ .

**2 pikë** Nxënësi ka vizatuar skicën e konit rrethor të drejtë (edhe pse gjatësitë e rrezes dhe lartësisë nuk janë të barabarta, si dhe relacionin  $\Rightarrow \frac{\pi R^2 h}{3} = \frac{8\pi}{3}$  **OSE** nxënësi ka vizatuar skicën e konit rrethor të drejtë (edhe pse gjatësitë e rrezes dhe lartësisë nuk janë të barabarta), si dhe shkruan marrëdhënien mes  $R, h, l$  sipas Teoremës së Pitagorës:  $l^2 = R^2 + R^2$  **OSE** nxënësi shkruan formulën e njehsimit të vëllimit të konit rrethor të drejtë  $V = \frac{1}{3} S_b h$  dhe e barazon me vlerën e dhënë të tij duke gjetur saktë  $R$ , pa bërë skemën **OSE** nxënësi ka vizatuar skicën e konit rrethor të drejtë si dhe shkruan marrëdhënien  $R, h, l$  sipas Teoremës së Pitagorës, duke marrë parasysh se  $R = l$ .

**1 pikë** Nxënësi vetëm ka vizatuar skicën e konit rrethor të drejtë (edhe pse gjatësitë e rrezes dhe lartësisë nuk janë të barabarta) **OSE** nxënësi vetëm shkruan formulën e njehsimit të vëllimit të konit rrethor të drejtë  $V = \frac{1}{3} S_b h \Rightarrow \frac{\pi R^2 h}{3} = \frac{8\pi}{3}$

**0 pikë** Nëse nxënësi nuk ka shkruar fare **OSE** ka bërë zgjidhje të gabuar.

**Pyetja 26(a) 2 pikë****Përgjigje e plotë:**

Ekuacioni i thjeshtuar i drejtëzës:  $y = mx + c$ , ku  $m$  – koeficienti këndor i drejtëzës dhe  $c$  – ordinata në origjinë e saj.

Koeficienti këndor (pjerrësia) i drejtëzës që kalon nëpër dy pika:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-2 - 0}{0 - 1} = 2$$

$$m = 2$$

Ordinata e pikës së dytë të dhënë  $(0; -2)$  është ordinata në origjinë e drejtëzës, pra  $c = -2$

Ekuacioni i drejtëzës është:  $y = 2x - 2$

(Nxënësi mund të zgjidhë situatën duke punuar me trajtën e ekuacionit:  $y - y_0 = m(x - x_0)$ , trajtën kanonike të saj)

**2 pikë** Nxënësi ka gjetur saktë ekuacionin e drejtëzës:  $y = 2x - 2$ , duke arsyetuar me shkrim mbi gjetjen e  $m$  dhe  $c$  **OSE** gjen ekuacionin e drejtëzës në formë të përgjithshme:  $2x - y - 2 = 0$

**1 pikë** Nxënësi gjen saktë vetëm koeficientin këndor të drejtëzës që kalon nëpër dy pikat e dhëna **OSE** nxënësi gjen saktë vetëm ordinatën në origjinë të drejtëzës që kalon nëpër dy pikat e dhëna.

**0 pikë** Nëse nxënësi nuk ka shkruar fare **OSE** ka bërë zgjidhje të gabuar.

**Pyetja 26(b) 2 pikë****Përgjigje e plotë:**

Që vija me ekuacion  $y = ax^2$  të jetë tangjent me drejtëzën  $y = 2x - 2$ , duhet (gjeometrikisht) dhe mjafton që ato të kenë vetëm një pikë të përbashkët. Analitikisht kjo do të thotë që sistemi i ekuacioneve të vijave në fjalë,

$$\begin{cases} y = ax^2 \\ y = 2x - 2 \end{cases} \text{ të ketë një zgjidhje të vetme} \Leftrightarrow ax^2 - 2x + 2 = 0 \text{ të ketë një zgjidhje.}$$

$$ax^2 - 2x + 2 = 0 \text{ ka një zgjidhje} \Leftrightarrow D = 0, \text{ ku } D = b^2 - 4ac \Leftrightarrow 4 - 8a = 0 \Leftrightarrow 8a = 4 \Leftrightarrow a = \frac{1}{2}$$

**2 pikë** Nxënësi ka formuluar saktë argumentin për tangjencën e drejtëzës  $y = 2x - 2$  me parabolën  $y = ax^2$ , si dhe ka gjetur vlerën e saktë të  $a$  me kushtin analitik përkatës.

**1 pikë** Nxënësi shprehet me shkrim, se kushti që kërkohet për vlerën e  $a$ -së, përmbushet kur sistemi  $\begin{cases} y = ax^2 \\ y = 2x - 2 \end{cases}$  ka një zgjidhje të vetme **OSE** e shpreh me fjalë: "Parabola dhe drejtëza duhet të kenë

një pikë të përbashkët" **OSE** nxënësi vetëm shtron ekuacionin  $ax^2 = 2x - 2$

**0 pikë** Nëse nxënësi nuk ka shkruar fare **OSE** ka bërë zgjidhje të gabuar.

**Pyetja 27**                      **2 pikë****Përgjigje e plotë:** $A$  - Numri i arrave në enë. $B$  - Numri i bajameve në enë. $L$  - Numri i lajthive në enë. $x$  - Numri i frutave të thata në enë.

Është dhënë se  $A = \frac{2}{3}x$  dhe  $A + B + L = x$ , dhe  $\frac{L}{2} = \frac{B}{5} = k$ , nga ku:

$L + B = 7k = x - A = \frac{1}{3}x$ , pra  $7k = \frac{1}{3}x$ , nga ku koeficienti i përpjesëtueshmërisë së lajthive me bajamet

$k = \frac{1}{21}x$ , rrjedhimisht pjesa që zënë lajthitë në enë shprehet me raportin:  $\frac{L}{x} = \frac{2k}{x} = \frac{2 \cdot \frac{x}{21}}{x} = \frac{2}{21}$ .

Pra  $\frac{L}{x} = \frac{2}{21}$

**2 pikë**                      Nxënësi bën një skemë të raporteve të dhëna Arra  $= \frac{2}{3}x$  dhe Lajthi  $= \frac{2B}{5}$ , gjen saktë raportin  $L : x$

**1 pikë**                      Nxënësi bën një skemë të raporteve të dhëna Arra  $= \frac{2}{3}x$  dhe Lajthi  $= \frac{2B}{5}$     **OSE** shkruan raportin

që zënë lajthitë dhe bajamet së bashku në enë  $\frac{1}{3}x$  (ose  $\frac{1}{3}$  e frutave).

**0 pikë**                      Nëse nxënësi nuk ka shkruar fare **OSE** ka bërë zgjidhje të gabuar.

**Pyetja 28(a)**                      **1 pikë****Përgjigje e plotë:**

Kemi funksionet  $f(x) = x + 2$  dhe  $g(x) = 2x^2$ , kërkohet përbërja e tyre  $y = f[g(x)]$ .

$f[g(x)] = g(x) + 2 = 2x^2 + 2$ , pra  $y = f[g(x)] = 2x^2 + 2$

**1 pikë**                      Nxënësi gjen saktë formulën e  $y = f[g(x)]$ .

**0 pikë**                      Nëse nxënësi nuk ka shkruar fare **OSE** ka bërë zgjidhje të gabuar.

**Pyetja 28(b) 2 pikë**

Përgjigje e plotë:

$$f[g(x)] = f(x) + 3 \Leftrightarrow 2x^2 + 2 = x + 2 + 3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 - x - 3 = 0 \Leftrightarrow (2x - 3)(x + 1) = 0 \Leftrightarrow x_1 = \frac{3}{2}, x_2 = -1$$

Zgjidhim ekuacionin kuadratik me mënyrën më të përshtatshme (me formulë kuadratike, faktorizim, katror të plotë)

$$D=25 \text{ dhe } x_1 = \frac{3}{2} \text{ ose } x_2 = -1$$

**2 pikë** Nxënësi shtron dhe zgjidh saktë:  $f[g(x)] = f(x) + 3 \Leftrightarrow (2x - 3)(x + 1) = 0 \Leftrightarrow x_1 = \frac{3}{2}, x_2 = -1$

**1 pikë** Nxënësi shkruan barazimin  $2x^2 + 2 = x + 2 + 3$  **OSE** nxënësi gjen saktë vetëm një nga rrënjët që vërtetojnë barazimin e kërkuar.

**0 pikë** Nëse nxënësi nuk ka shkruar fare **OSE** ka bërë zgjidhje të gabuar.

**Pyetja 29 2 pikë**

Përgjigje e plotë:

$$P(x) = x^3 + 5x^2 + 4x$$

$$x^3 + 5x^2 + 4x = x(x^2 + 5x + 4)$$

$$x(x^2 + 5x + 4) = x(x^2 + x + 4x + 4) = x[x(x+1) + 4(x+1)] =$$

$$= x(x+1)(x+4)$$

Pra, polinomi i faktorizuar:  $P(x) = x(x+1)(x+4)$ 

**2 pikë** Nxënësi faktorizon plotësisht polinomin:  $P(x) = x^2(x+1) + 4x(x+1)$

**1 pikë** Nxënësi faktorizon vetëm x-in, nuk e ka faktorizuar plotësisht polinomin **OSE** nxënësi ka bërë përpjekje për të faktorizuar me grupim, por jo plotësisht:

$$P(x) = x^3 + 5x^2 + 4x = x^3 + x^2 + 4x^2 + 4x = x^2(x+1) + 4x(x+1)$$

**0 pikë** Nëse nxënësi nuk ka shkruar fare **OSE** ka bërë zgjidhje të gabuar.



## Pyetja 30

2 pikë

Përgjigje e plotë:


Funksioni  $f(x) = x^3 + 2x^2 - 4x$  është zbritës për  $x \in R / f'(x) < 0$ , ku

$$f'(x) = 3x^2 + 4x - 4 \Rightarrow 3x^2 + 4x - 4 < 0$$

Zgjidhim inekuacionin kuadratik (grafikisht ose me studim shenje), duke gjetur fillimisht rrënjët e tij.

$$3x^2 + 4x - 4 = 0 \Leftrightarrow (3x - 2)(x + 2) = 0 \Leftrightarrow x_1 = \frac{2}{3} \text{ ose } x_2 = -2$$

Funksioni është zbritës për  $x \in \left] -2; \frac{2}{3} \right[$



2 pikë

Nëse nxënësi studion saktë shenjën e derivatit të parë të funksionit dhe përcakton saktë intervalin ku

funksioni i dhënë është zbritës:  $x \in \left] -2; \frac{2}{3} \right[$  OSE e paraqet këtë interval me përshkrim OSE nëse

nxënësi gjen intervalin e kërkuar të vlerave të  $x$  duke projektuar mbi boshtin ( $ox$ ) grafikun e funksionit derivat.

1 pikë

Nëse nxënësi ka gjetur funksionin derivat  $f'(x) = 3x^2 + 4x - 4$  OSE nxënësi shprehet se funksioni është zbritës për  $x$  që bëjnë derivatin e funksionit negativ, në një mënyrë ose tjetër.

0 pikë

Nëse nxënësi nuk ka shkruar fare OSE ka bërë zgjidhje të gabuar.

**Pyetja 31(a) 3 pikë**

**Përgjigje e plotë:**

Përcaktojmë kufijtë të cilët demonstrohen në grafikun e dhënë:  $x_1 = 0, x_2 = 1$


Gjithashtu për  $x \in ]0;1[$  vëmë re se grafiku i drejtëzës ndodhet "sipër" parabolës pra:  $3x > 3x^2$

$$\text{Kështu që: } S = \int_0^1 (3x - 3x^2) dx$$

$$S = \left( 3 \frac{x^2}{2} - x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{3}{2} - 1 - 0$$

$$S = \frac{1}{2} = 0,5$$

Pra  $S = 0,5$  njësi katrore



**3 pikë** Nxënësi përcakton saktë kufijtë e integralit, shtron saktë integralin e njehsimin të syprinës së kërkuar dhe njehson saktë vlerën e syprinës.

**2 pikë** Nxënësi përcakton saktë kufijtë e integralit, shtron saktë integralin e njehsimin të syprinës, por gabon në njehsimin e integralit.

**1 pikë** Nxënësi ka përcaktuar saktë vetëm kufijtë (pikëprerjet e vijave kufizuese)

**0 pikë** Nëse nxënësi nuk ka shkruar fare **OSE** ka bërë zgjidhje të gabuar.

**Pyetja 32(a) 3 pikë**

**Përgjigje e plotë:**

Hapësira e rezultateve  $H = \{ \text{bashkësia e maturantëve} \}, n(H) = 210$

$M = \{ \text{bashkësia e nxënësve që kanë marrë notën 10 në matematikë} \}, n(M) = 40\% \text{ e maturantëve} = 0,4 \cdot 210 = 84$

$A = \{ \text{bashkësia e nxënësve që kanë marrë notën 10 në anglisht} \}, n(A) = 147$

$M$  dhe  $A$  janë dy ngjarje të pajtueshme, pasi ka maturantë që kanë marrë notën 10 në të dyja lëndët.

$$n(A \cap M) = x$$

$$84 - x + x + 18 + 147 - x = 210$$

$$-x + 249 = 210$$


$$x = 249 - 210$$

$$x = 39$$

$$\text{Pra } n(A \cap M) = 39$$

Plotësojmë:

$$n(M \text{ dhe jo } A), n(A \text{ dhe jo } M), n(\text{jo } M \text{ ose jo } A), n(\text{jo } M \text{ dhe jo } A).$$



**3 pikë** Nxënësi ka ndërtuar dhe plotësuar plotësisht, përmes njehsimeve të nevojshme Diagramin e Venit

**2 pikë** Nxënësi ka plotësuar saktë numrin e të paktën tri ngjarjeve të mundshme në këtë hapësirë të Diagrami i Venit që ka vizatuar, duke përfshirë këtu  $n(A \cap M) = 39$

**1 pikë** Nxënësi ka gjetur saktë numrin  $n(M) = 84$  si përqindja e dhënë në situatë **OSE**

nxënësi ka arsyetuar saktë rreth shpërndarjes së dendurive të ngjarjeve në fjalë, por duke konsideruar ngjarjet  $M$  dhe  $A$  të papajtueshme.

**0 pikë** Nëse nxënësi nuk ka shkruar fare **OSE** ka bërë zgjidhje të gabuar.

**Pyetja 32(b) 1 pikë****Përgjigje e plotë:**

Siç demonstrohet në diagramën më sipër:

 $P(M \text{ dhe jo } A) = 84 - x = 84 - 39 = 45$  maturantë kanë marrë notën 10 në matematikë, por jo në anglisht.**1 pikë** Nxënësi ka gjetur saktë numrin  $P(M \text{ dhe jo } A) = 45$ **0 pikë** Nëse nxënësi nuk ka shkruar fare **OSE** ka bërë zgjidhje të gabuar.**Pyetja 33(a) 1 pikë****Përgjigje e plotë:**

| Pikët         | 1    | 2    | 3   | 4   | 5   | 6   |
|---------------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| Probabiliteti | 0,25 | 0,15 | 0,1 | $a$ | 0,1 | 0,2 |

Hapësira e rezultateve të një prove e ka probabilitetin 1, ndaj:

$$P(H) = 1 = P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5) + P(6)$$

$$P(4) = 1 - [P(1) + P(2) + P(3) + P(5) + P(6)]$$

$$P(4) = 1 - 0,8$$

$$P(4) = 0,2$$

$$a = 0,2$$

**Shënim:** Nxënësi merr vlerësimin e plotë edhe nëse është shprehur:  $a = 1 - 0,8$   
 $a = 0,2$ **1 pikë** Nxënësi ka gjetur saktë vlerën e munguar të  $a$ , duke zbatuar vetinë e shpërndarjes së probabiliteteve.**0 pikë** Nëse nxënësi nuk ka shkruar fare **OSE** ka bërë zgjidhje të gabuar.**Pyetja 33(b) 2 pikë****Përgjigje e plotë:** $P(\text{Zari bie numër jo çift}) = P(\text{Zari bie numër tek})$ , pra:  $P(1 \text{ ose } 3 \text{ ose } 5)$ 

$$P(1 \text{ ose } 3 \text{ ose } 5) = 0,25 + 0,1 + 0,1 = 0,45$$

**2 pikë** Nxënësi ka përzgjedhur saktë ngjarjet elementare të provës që favorizojnë ngjarjen: "Zari bie numër jo çift" dhe ka zbatuar drejt njehsimin e probabilitetit të bashkimit të ngjarjeve, por nuk ka vlerësuar saktë probabilitetin e kërkuar.**1 pikë** Nxënësi ka përzgjedhur saktë ngjarjet elementare të provës që favorizojnë ngjarjen: "Zari bie numër jo çift", por nuk ka vlerësuar saktë probabilitetin e kërkuar.**0 pikë** Nëse nxënësi nuk ka shkruar fare **OSE** ka bërë zgjidhje të gabuar.

