



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E ARSIMIT  
DHE SPORTIT

QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE  
DREJTORIA E PROVIMEVE TË SHTETIT

**PROVIMI I SHTETIT**

**FONDI I PYETJEVE PËR PROFESIONIN E  
RREGULLUAR TË FIZIOTERAPISTIT**

**1. Moduli Bazat e Mjekësisë Fizike dhe Rehabilituese**

1. Mjekësia fizike dhe rehabilituese filloi të ngrihej si shkencë e mirëfilltë:

- A) që në kohën e Hipokratit
- B) pas luftës së parë botërore
- C) pas luftës së dytë botërore
- D) pas luftës së ftohtë

2. Fjala deficiente në rehabilitim do të thotë:

- A) mungesë të një gjymtyre
- B) prapambetje mendore
- C) prapambetje në zhvillim psikomotor
- D) mungesë të një strukture anatomike apo funksioni

3. Dokumentimi në rehabilitim:

- A) ruhet vetëm në raste të veçanta
- B) ka vlera etike dhe morale
- C) ka rëndësi në shumë aspekte dhe është detyrueshëm
- D) nuk ka vlera ligjore të mirefillta

4. Handicap në rehabilitim do të thotë:

- A) person me deficiencë trupore
- B) person me deficiencë mendore
- C) person me vështirësi në inserimin social
- D) person i kartelizuar

5. Klasifikimi ndërkombëtar që përdoret sot në rehabilitim është:

- A) I.C.F
- B) U.C.F
- C) I.C.D.I
- D) I.C.D

6. Objektivat e procesit të fizioterapisë duhet të jenë:

- A) reale, funksionale, të pandryshueshme
- B) reale, funksionale, të ndryshueshme
- C) madhore, sekondare, reale
- D) madhore, sekondare, të pandryshueshme

7. Mjekësia fizike dhe rehabilituese gjen aplikim:

- A) në nivel parësor, ambulatorial dhe komunitar të shërbimeve mjekësore
- B) në nivel dytëror, spitalor dhe komunitar të shërbimeve mjekësore
- C) në nivel parësor, dytësor dhe terciar të shërbimeve mjekësore
- D) në nivel dytësor, terciar dhe territorial të shërbimeve mjekësore

8. Nje paraplegjiku nuk i është ofruar një karrocë me rrota, kjo është:

- A) një handicap
- B) një pengese
- C) një defiçit ligjor
- D) një diskriminim racial

9. Fizioterapisti në ushtrimin e profesionit të tij nuk mund të:

- A) kryej ndërhyrje invazive
- B) përdori modalitetet fizike
- C) trajtoj pacient onkologjik
- D) të bëj rehabilitim postkirurgjikal

10. Fizioterapisti gjatë programimin të një protokollit rehabilitimi duhet të bazohet në radhë të parë:

- A) në eksperiencen personale
- B) në studimet shkencore mbi atë sëmundje
- C) në guide lines
- D) tek terapia mjekësore

11. Proçesi i fizioterapisë fillon gjithmonë me:

- A) trajtimin e pacientit
- B) vlerësimin e pacientit
- C) përcaktimin e objektivave
- D) vendosjen e djagnozës

12. Gjatë trajtimit fizioterapisti duhet gjithmonë:

- A) të mos ta lodhi pacientin
- B) të mos tejkalojë asnjëherë orarin e trajtimit
- C) ta bëjë pjesë aktive të trajtimit pacientin sa herë që është e mundur

D) të ketë parasysh që pacienti është një objekt

13. Rehabilitimi i pacientit është:

- A) është punë individuale e fizioterapistit
- B) është proces pasiv
- C) është pjesë e riaftësimit të pacientit
- D) është punë ekipore

14. Mjekësia fizike dhe rehabilituese i bën pacientit një qasje:

- A) biomjekësore pacientit
- B) individuale
- C) olistike
- D) mjekësore

15. Mjekësia fizike dhe rehabilituese ka si objektiv:

- A) integrimin e pacientit
- B) protezimin e pacientit
- C) izolimin e pacientit
- D) heqjen e barrierave arkitektonike

16. Tek një i sëmurë me astem pulmonare fizioterapisti mat frekuencën respiratore:

- A) në fillim të trajtimit rehabilitues
- B) në fund të trajtimit rehabilitues
- C) përpara dhe pas çdo trajtimi
- D) varet nga gjendja e pacientit

17. Në gradën 3 të testigur muskular muskuli është në gjëndje:

- A) të munda rezistencën e terapistit dhe gravitetin
- B) të munda vetëm resistencën
- C) të munda vetëm gravitetin
- D) thjesht të kontraktohet

18. Shkalla E.V.A përdoret:

- A) për vlerësimin e amplitudes artukulare
- B) për vlerësimin subjektiv të dhimbjes
- C) për vlerësimin objektiv të dhimbjes
- D) për vlerësimin e parametrave vitale

19. Forca muskulare e muskulit gluteal maximus vlerësohet:

- A) në pozicion ulur
- B) në pozicion dekubitur lateral
- C) në pozicion pron
- D) në pozicion supin

20. Vlerësimi postural i pacientit bëhet:

- A) në tre plane

- B) në katër plane
- C) në pesë plane
- D) në gjashtë plane

21. Valgjizmi patologjik i gjurit është devijim në planin:

- A) frontal
- B) sagital
- C) horizontal
- D) perpendicular

22. Goniometri shërben për të matur

- A) R.O.M artikular
- B) presionin e gjakut
- C) forcën e muskujve
- D) indin dhjamor subkutan

23. Gjatësia e muskujve matet me:

- A) metër shirit
- B) goniometër
- C) me gradë artikulare
- D) me sy të lirë

24. Forca muskulare matet me testingun muscular që ka:

- A) 2 grade
- B) 3 grade
- C) 4 grade
- D) 5 grade

25. Vlerësimi postural i pacientit:

- A) realizohet vetëm me sy të lirë
- B) realizohet vetëm i kompiuterizuar
- C) me sy të lirë dhe i kompiuterizuar
- D) nuk ka standarte e zgjedh vet pacienti

26. Biometria studion:

- A) ndërtimin morfostatik të trupit të njeriut
- B) ndërtimin morfodinamik të trupit të njeriut
- C) ndërtimin strukturor të trupit të njeriut
- D) ndërtimin muskolor të trupit të njeriut

27. Kineziterapia është terapi:

- A) e zbuluar nga kinezet që në mesjetë
- B) e lëvizjes
- C) zëvendësuese e masoterapisë
- D) që ka shumë kundërindikime në reumatologji

28. Zgjatja muskulare:  
A) duhet bërë gjithmonë në fund të seancës së rehabilitimit  
B) mund të çojë në këputje të fibrave muskulare gjithmone  
C) është teknike rehabilitimi  
D) duhet të zgjasë të paktën 30 min

29. KABAT është teknike:  
A) korrigjimi postural  
B) rehabilitimi kardiak  
C) që nuk përdoret më në rehabilitim  
D) qe përdor gjithmonë skema djagonale

30. Bobath është teknike:  
A) respiratore  
B) korrigjimi postural  
C) neurorehabilitimi  
D) kirurgjikale

31. Frymëmarja me diafragmë është teknike:  
A) drenimi  
B) masazhi  
C) relaksimi  
D) rinfocimi

32. Masazhi klasik ka:  
A) 5 teknika bazë  
B) 7 teknika bazë  
C) 8 teknika bazë  
D) 9 ternika bazë

33. Drenimi postural është:  
A) teknik vlerësimi postural  
B) pjesë e fizioterapise respiratore  
C) teknik trajtimi postural  
D) pjesë e posturalogjise

34. Bëjnë pjesë në teknikat e trajtimit të pacientit:  
A) testing muskular  
B) prova e efortit  
C) frymemarja me diafragme  
D) ROM-I artikular

35. Trajtimi i linfedemes bëhet me:  
A) diuretike  
B) me masazh klasik  
C) me linfoderazh

D) me limfadenektomi

36. Fizioterapist nuk e trajton dhimbjen:

A) me terapi manuale

B) me kineziterapi

C) medikamente

D) me teknika speciale

## 2. Kineziologji

1. Muskujt që sheshojnë lordozën lumbare janë:

A) muskuli iliak dhe psoas

B) muskuj ekstensor të shpinës

C) muskujt abdominal

D) muskujt flektorë lateral të belit

2. Muskujt rrotullues të shpinës gjatë kontraktimit të tyre bazohen:

A) në parimin e çikrikut

B) në parimin e levës

C) në parimin e rrotës

D) në parimin e Arkimedit

3. Tensioni i muskujve skeletikë kontrollohet nga motoneuronet:

A) alfa

B) beta

C) gama

D) delta

4. Muskujt agoniste janë muskujt

A) që pengojnë levizjen

B) që fiksojnë levizjen

C) që kryejnë levizjen

D) që ndihmojnë levizjen

5. Abuksioni është lëvizje që:

A) largon segmentin nga boshti i simetrisë

B) afron segmentin me boshtin e simetrisë së trupit

C) rrotullon segmentin rreth boshtit të simetrisë

D) përkul segmentin rreth boshtit të simetrisë

6. Kompleksi artikular i supit përbehet nga:

A) 3 artikulacione

B) 4 artikulacione

C) 5 artikulacione

D) 6 artikulacione

7. Stabiliteti supit sigurohet nga:

- A) muskujt e shpinës
- B) nga periartikular
- C) nga presioni atmosferik
- D) nga menisqet

8. Artikulacioni skapulo-humeral është artikulacion i tipit:

- A) selar
- B) cilindrik
- C) enartroze
- D) ellipsoid

9. Ekstensioni i parakrahut mbi krahun kryhet nga:

- A) muskuli koroko-brakial
- B) muskuli biceps brachial
- C) muskuli brakial
- D) muskuli triceps brakial

10. Kockat karpale janë të vendosura në

- A) 2 rreshta
- B) 3 rreshta
- C) 4 rreshta
- D) 5 rreshta

11. Tuneli karpal ndodhet

- A) tek bryli
- B) tek parakrahu
- C) tek kyçi i dorës
- D) tek supi

12. Shtylla kurrizore në dorë paraqet

- A) 2 kifoza
- B) 2 hiperkifoza
- C) 3 kifoza
- D) 3 hiperkifoza

13. Artikulacioni kokso-femoral:

- A) është artikulacion shumë stabil
- B) është artikulacion shumë pak stabil
- C) është artikulacion i palevizshëm
- D) është artikulacion gjysëm i levizshëm

14. Hernia diskale është më e shpeshtë në regjionin

- A) sakral
- B) koksigeal
- C) dorsal

D) lombar

15. Frymëmarja tek femrat është:

- A) abdominale
- B) torakale
- C) torako-abdominale
- D) cervikale

16. Disku intervertebral tek nje person 20 vjeç përbehët nga:

- A) 20% uje
- B) 40% uje
- C) 60% uje
- D) 80% uje

17. Disku intervertebral është më i fryre:

- A) në mëngjes
- B) në dreke
- C) mbasdite
- D) në darkë

18. Muskujt që thellojnë lordozën lumbare janë:

- A) muskujt gluteal
- B) muskujt kuadrat lumbar
- C) muskujt ekstensore te shpines
- D) muskujt abdominal

19. Muskujt pelvi trokanterik janë muskuj

- A) muskuj ekstrarrotullues të artikulacionit kokso-femoral
- B) muskuj intrarrotullues të artikulacionit kokso-femoral
- C) muskuj abduktor të artikulacionit kokso-femoral
- D) muskuj aduktor të artikulacionit kokso-femoral

20. Presioni atmosferik ndikon tek artikulacioni kokso-femoral:

- A) në uljen e stabilitetit
- B) në rritjen e stabilitetit
- C) në rrotullimin e kokes femorale
- D) në rritjen e presionit intrartikular

21. Normalisht legeni i njeriut është

- A) fleksion
- B) ekstension
- C) anteroversion
- D) retroversion

22. Legeni përbehët nga

- A) 3 kocka



- B) 4 kocka
- C) 5 kocka
- D) 6 kocka

23. Në grupin e muskujve stabilizues të artikulacionit kokso-femoral futen:

- A) muskujt pelvi-trokanterik
- B) muskujt ischio-krural
- C) muskujt femoral
- D) muskujt tibiale

24. Artikulacioni i gjurit falë prezencës së patelës funksionon si një:

- A) lev e llojit të parë
- B) lev llojit të dytë
- C) si një çikrik
- D) si një rrotë

25. Sheshimi i lordozës lombare bëhet:

- A) duke kontaktuar muskujt inklinues të shpinës
- B) duke kontraktuar muskulin ileopsoas
- C) duke kontraktuar ekstensoret e shpinës
- D) duke kontraktuar muskujt abdominal

26. Neurotranzmetitori i plakes neuro-muskulare është:

- A) adrenalina
- B) noradrenalina
- C) serotonina
- D) acetilkolina

27. Abduksioni i krahut kryhet:

- A) në plan frontal
- B) në plan sagital
- C) në plan horizontal
- D) në plan perpendicular

28. Hiperkifoza torakale është:

- A) përkuļje fiziologjike e shtyllës kurrizore
- B) përkuļje patologjike e shtyllës kurrizore
- C) përkuļje laterale e shtyllës kurrizore
- D) prezente vetem në adoleshence

29. Kendi diafizar i inklinimit të femurit formohet midis:

- A) diafizës femorale dhe asaj tibiale
- B) diafizës femorale dhe qafës femorale
- C) qafës femorale dhe kockave të legenit
- D) diafizës femorale dhe kockave të legenit

30. Këndi i deklinimit femoral formohet midis:
- A) qafës së femurit dhe planit horizontal
  - B) qafës së femurit dhe planit sagital
  - C) qafës së femurit dhe frontal
  - D) diafizës së femurit dhe planit frontal
31. Pozicioni këmbë mbi këmbë është:
- A) pozicion jo stable për artikulacionin skapulo-humoral
  - B) pozicion stable për artikulacionin skapulo-humoral
  - C) pozicion stable për artikulacionin kokso-femoral
  - D) pozicion jo stable për artikulacionin kokso-femoral
32. Disku intervertebral ushqehet:
- A) vetem me proteina
  - B) vetem me aminoacide
  - C) vetem me polisakaride
  - D) me difuzion
33. Mbajtja e stilolapsit në dorë realizohet nëpërmjet një prezë:
- A) pincore
  - B) interdigjitale
  - C) me opozicion suterminal të gishtave
  - D) palmare
34. Mbajtja e shishes realizohet nëpërmjet një preze:
- A) palmare të plotë
  - B) interdigitale
  - C) subtermodigitale
  - D) e vogël
35. Kineziologjia:
- A) është terapi e lëvizjes së tokë
  - B) është terapi e lëvizjes së ujë
  - C) studion lëvizjet e trupit të njeriut
  - D) studion strukturën e trupit të njeriut
36. Muskujt antigravitare që forcohen te paret tek femija janë:
- A) muskujt flektore të qafës
  - B) muskujt ekstensore të qafës
  - C) muskujt flektore të shpinës
  - D) muskujt ekstensore të shpinës
37. Muskujt e gishtit të madh të dorës janë muskujt të:
- A) eminencës hypotenare
  - B) eminencës tenare
  - C) eminencës mediale

D) eminencës laterale

38. Arkitektra normale e shputës së këmbës të njeriut përmban:

- A) 1 hark
- B) 2 harqe
- C) 3 harqe
- D) 4 harqe

39. Muskuli triceps sural:

- A) sheshon harkun medial të këmbës
- B) thellon harkun medial të këmbës
- C) sheshon harkun lateral të këmbës
- D) thellon harkun lateral të këmbës

40. Njeriu ecën në majë të gishtave falë kontaktimit të muskulit:

- A) tibial anterior
- B) tibial posterior
- C) triceps sural
- D) triceps femoral

41. Muskujt aduktorë ndodhen:

- A) në pjesën mediale të kofshës
- B) në pjesën laterale të kofshës
- C) në pjesën anteriore të kofshës
- D) në pjesën posteriore të kofshës

42. Muskujt gluteal janë muskuj:

- A) antigrauitar dhe ekstensor të artikulacionit kokso-femoral
- B) ekstensor dhe flektor të artikulacionit kokso-femoral
- C) flektor dhe intrarrotullues të artikulacionit kokso-femoral
- D) aduktor dhe intrarrotullues të artikulacionit sakro-iliak

43. Kocka kalkaneale:

- A) bën pjesë në kockat karpale
- B) bën pjesë në kockat tarsale
- C) bën pjesë në kockat metakarpale
- D) bën pjesë në kockat metatarsale

44. Ecja e njeriut ka:

- A) 2 faza
- B) 4 faza
- C) 6 faza
- D) 8 faza

45. Shputa e këmbës kur merr kontakt me terrenin:

- A) përshtat formën

- B) e ndryshon formën në mënyrë permanente
- C) pëson riorientim kockor
- D) pëson riorientim muskular

46. Shtylla kurrizore në pjesën lombo-sakrale:

- A) është shumë delikate
- B) është shumë e fortë
- C) paraqet kifoze
- D) paraqet lordoze

47. Përkulja e parë që formon shtylla kurrizore e njeriut gjatë zhvillimit intrauterin është:

- A) kifoza
- B) lordoza
- C) hiperkifoza
- D) hiperlordoza

48. Gjuri është artikulacion me:

- A) me një gradë lirie
- B) me dy gradë lirie
- C) me tre gradë lirie
- D) me katër gradë lirie

49. Muskujt e minencës hypotenare janë muskuj:

- A) motor të gishtit të madh
- B) motor të gishtit të vogël
- C) motor të gishtit të dytë
- D) motor të gishtit të tretë

### **3. Modalitetet e Terapisë Fizike**

1. Terapia me rreze ultraviolette përdoret në pacientët me:

- A) tendinit të muskulit biceps në fazën akute
- B) ne traumat e freskëta
- C) ne limfedemat e komplikuar
- D) ne patologjitë degjenerative në fazën kronike

2. Pas një aksidenti në shtëpi një fëmijë ka pësuar një traum kontuzive në rregonin gluteal. Çfare modaliteti duhet të përdoret menjëherë pas traumës:

- A) termoterapi endogjene
- B) terapi me ultratinguj
- C) krioterapi
- D) markoniterapi

3. Cila frequence e ultratingujve është më penetruese në inde:

- A) 1 MHz
- B) 2 MHz

- C) 3 MHz
- D) 4 MHz

4. Manjeto terapia është:

- A) elektroterapi e kombinuar
- B) elektroterapi direkte
- C) elektroterapi indirekte
- D) elektroterapi me fushë të gjerë

5. Terapi me mikrovale quhet ndryshe:

- A) markoniterapi
- B) terapi ne furë të nxehtë
- C) tekarterapi
- D) radarterapi

6. Modalitetet e terapisë fizike:

- A) janë pjesë e kineziterapisë
- B) janë pjesë e hidrokineziterapisë
- C) janë terapi hyrëse në rehabilitim
- D) janë terapi zëvendësuese të kineziterapisë

7. Elektrostimulimi është terapi fizike që përdoret për të stimuluar:

- A) muskulin e inervuar dhe nervat periferike
- B) muskulin e denervuar dhe nervat periferike
- C) muskulin e inervuar dhe muskulin e denervuar
- D) nervat periferike dhe palcën e kurrizit

8. T.E.N.S është terapi antalgjike që e ul dhimbjen nëpërmjet:

- A) stimulimit të prodhimit të dopamines
- B) nëpërmjet sistemit të kontrollit te portës në palcën e kurrizit
- C) nëpërmjet bllokimit të impulsive në fibrat nervore me kaliber të madh
- D) nëpërmjet shtimit të impulsive në fibrat nervore me kaliber të vogel

9. Lazerterapia në rehabilitim nuk aplikohet:

- A) me kontakt direkt
- B) me skanim
- C) në herpës simpleks
- D) direkt në sy

10. Sipas parimit të Arkimedit trupi i zhytur në një teren ujor

- A) peshon më shumë
- B) peshon më pak
- C) nuk i ndryshon pesha
- D) pëson deformime të formës

11. Në tendinitin e kalçifikuar modaliteti i tepapise fizike më efikas është:

- A) krioterapia
- B) ultratigujt
- C) lazerterapia
- D) T.E.N.S

12. Presoterapia është terapi:

- A) kundër dhimbjes
- B) kundër limfedemes
- C) kundër kalçifikimeve
- D) kundër hemoragjise

13. Hidrokinezi terapia gjen kunderindikacion absolute në:

- A) hemiplegji
- B) paraplegji
- C) spondiloartroze
- D) në dermatitin purulent

14. Thellesia e penetrimit të termoterapise me kontakt direkt është:

- A) 1 cm
- B) 3 cm
- C) 5 cm
- D) 10 cm

15. Përpara fillimit të seances së rehabilitimit me një pacient me hemiplegji rekomandohet:

- A) banjë me ujë të ngrohtë
- B) banjë me parafinë
- C) banjë me ujë të ftohtë
- D) banjë me hidromasazh

16. Terapia me rreze ultraviolete indikohet në:

- A) pelagra
- B) lupusin eritematoz
- C) sarkoidoze
- D) akne

17. Terapia me rreze ultraviolete kunderindikohet në:

- A) mundesën e vitamines D
- B) sinuzit
- C) psoriazis
- D) hipertiroidizem

18. Doza eritematoze minimale mat:

- A) nxirjen e lëkurës
- B) sensibilitetin e lëkurës
- C) nivelin e djegjes së lëkurës
- D) thellësinë e penetrimit të rrezeve ultraviolet.

19. Ultratingujt në rehabilitim përveç efektit antalgjik i përdorim dhe për efektin:

- A) nxirës të lëkurës
- B) termik
- C) masazhues
- D) stimulim të nervave

20. Akulli në qoftë se vendoset direkt në lëkure jep:

- A) vazodilatacion
- B) rritje të permeabilitetit kapilar
- C) zbehje të lëkurës
- D) djegje

21. Modaliteti me efikas i përdorimit të lazerit në fizioterapi është:

- A) me kontakt direkt me lekurën
- B) 20 cm larg trupit
- C) 50 cm larg trupit
- D) me oshilim

22. Në shtatzani mund të përdoren vetëm këto modalitete:

- A) laser dhe jonoforeze
- B) T.E.N.S dhe presoterapi
- C) manjetoterapi dhe mikrovale
- D) diatermi dhe lazer

23. Terapia me ultratinguj gjen indikacion në

- A) tumore
- B) osteoporozë
- C) limfedemen me fibroze
- D) në bursit të kalçifikuar

24. T.E.N.S është shkurtime i fjalës:

- A) stimuli nervor elektrik transkutan
- B) stimuli nervor elektrik me energji
- C) terapi e nervave sipërfaqësor
- D) terapi e nën sipërfaqshme

25. Llampat me rreze ultraviolet bëjnë pjesë në:

- A) termo terapinë me kunduksion
- B) termoterapinë me konveksion
- C) termoterapinë me skanim
- D) termoterapinë me rrezatim

26. Banjot kontraste gjejnë indikacion:

- A) në distrofie muskuale
- B) në infarkt të miokardit

- C) në vaskulopatite periferike
- D) artritin rheumatoid

27. Jonoforeza është modalitet terapeutik që realizon:

- A) përshpejtimin e medikamenteve me anë të fushës manjetike
- B) përshpejtimin e medikamenteve me anë të rrymës elektrike të alternative
- C) përshpejtimin medikamenteve me anë të vibrimeve akustike
- D) përshpejtimin e medikamenteve me anë të rrymës elektrike të vazhduar

28. Lazerterapi nuk gjen kunderidikacion absolute në:

- A) në tre muaj e parë të shtatzanise
- B) në karcinomën mamare
- C) në zonën hemoragjike
- D) në plagët e shtratit

29. Tufa e rrezeve lazer ka keto karakteristika:

- A) njëngjyrëshe, paralele, koherente
- B) njëngjyrëshe, paralele, jokoherente
- C) shumë ngjyrëshe paralele, koherente
- D) shumë ngjyrëshe paralele, jokoherente

30. Drita Lazer nuk perdoret në:

- A) kirurgji
- B) dermatologji
- C) fizioterapi
- D) gjinekologji

31. Aparatet e lazerterapise që përdoren në rehabilitim përdorin si mjet aktiv:

- A) argonin
- B) dioksid karbonin
- C) kriptonin
- D) rubinin

32. Ultratingujt janë vibrime akustike të pa perceptueshme nga veshi i njeriut me frekuence:

- A) nën 16.000 Hz
- B) mbi 16000 Hz
- C) nën 26000 Hz
- D) mbi 26000 Hz

33. Efektet e terapisë me ultratinguj në rehabilitim mund t'i përmbledhin në:

- A) mekanik, infiamator, termik, kavitar
- B) termik, kavitar, shkrirës, antiedematoz
- C) mekanik, termik, kimik, kavitar
- D) antiedematoz, kimik, termik, mekanik

34. Modaliteti më i përdorur dhe efikas i terapisë me ultratinguj është:



- A) me kontakt direkt
- B) me lëvizje rrotulluese të kokës
- C) me lëvizje perpendikulare
- D) me lëvizje gjatesore të kokës

35. Terapia me ultratinguj kunderindikohet në:

- A) çrregullime të sensibilitetit
- B) kalçifikime
- C) tendinite
- D) borsite

36. Sonoforesa është terapi përshpejtimi medikamentesh me anë të:

- A) rrymës elektrike
- B) mikrovaleve
- C) ultratingujve
- D) lazerit

37. Infiamacioni karakterizohet nga këto shenja:

- A) dolor, kalor, tumor, rubor, funksioneza
- B) dolor, rubor, kalor, tumor, nekroza
- C) kalor, tumor, dolor, hiperplazia, nekroza
- D) hiperplazia, nekroza, dolor, funksioneza

38. Terapia antalgjike me korente interferenciale gjen indikacion të gjerë:

- A) në dhimbjen sipërfaqësore
- B) në dhimbjen e fantazëm
- C) në dhimbjen e thellë
- D) në dhimbjen e mprehtë

39. Në dhimbjen e artikulationit tempo-mandibular modalitet terapeutike që përdoren janë:

- A) mikrovalët, lazeri, ultratingujt
- B) TENS, radarterapi, korente interferenciale
- C) presoterapi, radarterapi, korente interferenciale
- D) ultratingujt, TENS, lazer

40. Trigger point janë pika:

- A) të padhimbshme të trupit
- B) të agopunturës
- C) shumë të dhimbshme
- D) ku vendosen elektrodat e TENS

41. Rrymat diadinamike janë:

- A) rryma galvanike
- B) rryma alternative retangolare
- C) rryma sinusoidale me frekuence të ulët
- D) rryma të kombinuara

42. Efektet fiziologjike të rrymave diadinamike nuk lidhen me:
- A) shtimin e vazokonstriksionit
  - B) shtimin e vazodilatacionit
  - C) rritjen e permeabilitetit të membranës qelizore
  - D) rritjen e ngacmueshmerisë së fibrave nervore me kalibër të madh
43. Rrymat diadinamike nuk kunderindikohen:
- A) në hemoragji
  - B) frakturat e pakonsoliduara
  - C) shtatzani
  - D) gonartrozë
44. Reobaza është:
- A) zona e muskulit ku intensiteti është maksimal
  - B) intensiteti minimal i impulsit i aftë të shkaktoj kontraktim muskular.
  - C) intensiteti maksimal i impulsit i aftë të shkaktoj kontraktim muskular
  - D) pjesë e placës neuromotore
45. Elektrodat më komode në përdorim gjatë elektroterapisë janë:
- A) plastike
  - B) metalike
  - C) sfungjerore
  - D) autoaderente
46. Manjeto terapia indikohet:
- A) osteoporoze
  - B) hemiplegji
  - C) paraplegji
  - D) hypotoni
47. Llampat ultraviolet nuk japin:
- A) djersitje
  - B) vazodilatacion
  - C) vazokuksion
  - D) ulje të dhimbjes
48. Terapia fizike:
- A) ka vetëm efekt placebo
  - B) nuk perdoret vitet e fundit ne rehabilitim
  - C) perdoret gjerësisht në rehabilitim
  - D) perdoret gjithmone e kombinuar me terapinë medikamentoze
49. Krioterapia perdoret në:
- A) morth
  - B) në tendinit
  - C) anestezi e lëkurës

D) plagët e hapura

#### 4. Neurologji dhe Rehabilitim në Neurologji

1. Baza teorike e rehabilitimit fizik në sëmundjet neurologjike konsiston në:

- A) Neuroplasticitetin e qelizës nervore.
- B) Aftësinë kontraktuese të muskujve të gjymtyreve.
- C) Regjenerimin e qelizave nervore të dëmtuara.
- D) Të gjitha

2. Në personat që janë diagnostikuar me aksident cerebrovascular procedurat e rehabilitimit fizik duhet të fillojnë:

- A) Tre javë pas instalimit të deficitit neurologjik.
- B) Menjëherë pas diagnostikimit.
- C) Menjëherë pas instalimit të deficitit neurologjik.
- D) Asnjë.

3. Cili nga formacionet e mëposhtme merret me lëvizjet e vullnetshme?

- A) Cerebelliumi.
- B) Sistemi extrapyramidal.
- C) Trakti cortico-spinal.
- D) Trakti radiculo-spono-talamo-cortical.

4. Në cilën nga sëmundjet e mëposhtme janë të kundërlindikuara procedurat e rehabilitimit fizik?

- A) Sëmundjen e Parkinsonit.
- B) Hemorragjinë cerebrale.
- C) Gjendjet pas interventeve për tumor cerebral.
- D) Myasthenia grave.

5. Cilën nga procedurat e mëposhtme do të zgjidhni si më efektive në personat që vuajnë nga Sëmundja e Parkinsonit dhe që janë në stadin II ose III të sëmundjes sipas Klasifikimit Hoehn dhe Yahr?

- A) "Pole Striding Exercises Program"
- B) "Range of Motion"
- C) "Neuro-development Training"
- D) Asnjë.

6. Sa % e pacientëve kanë përmirësim statistikisht të rëndësishëm nga procedurat e rehabilitimit fizik në sëmundjen cerebrovaskulare?

- A) 40%
- B) 8
- C) 100%
- D) asnjë

7. Rehabilitimi konjitiv është statistikisht më i efektshëm në:

- A) Polyradikuloneuritit inflamator akut të tipit Guillain-Barre.

- B) Sëmurdjen e Alzheimer.
- C) Sklerozën multiple.
- D) Demencën vaskulare.

8. Terapia okupacionale mund të përdoret si terapi initiale krahas trajtimit farmakologjik në personat që vuajnë nga:

- A) migrena
- B) hernia discale.
- C) ischemia cerebrale.
- D) sindromet demenciale.

9. Teknikat Bobath nuk përdoren në të sëmurët me:

- A) hernie diskale.
- B) hemorragji cerebrale.
- C) ishemi cerebrale.
- D) sëmundjen e parkinsonit.

10. Në të sëmurët që vuajnë nga skleroza multiple rehabilitimi fizik aplikohet:

- A) Vetëm në fazën fillestare të sëmundjes.
- B) Në momentin kur shfaqen deficitet motore.
- C) Gjatë gjithë evolucionit të sëmundjes.
- D) Asnjë.

11. Në të sëmurët që vuajnë me sëmundjen e parkinsonit procedurat e rehabilitimit fizik aplikohen:

- A) Para fillimit të farmakoterapisë.
- B) Pas ndërprerjes së farmakoterapisë.
- C) Njëkohësisht me farmakoterapinë.
- D) Asnjë

12. Në cilën nga patologjitë e mëposhtme janë të indikuara terapitë fizike në grup?

- A) Sindromet radikulare.
- B) Epilepsitë.
- C) Migrenat hemiplegjike.
- D) Sklerozën multiple.

13. Rehabilitimi i gëlltitjes aplikohet në:

- A) Sindromet bulbare.
- B) Sindromet e këndit ponto-cerebellar.
- C) Polyneuropathine diabetike.
- D) Të gjitha

14. Në të sëmurët që kanë pësuar traumë craniale dhe që paraqesin deficite motore dhe konjitive, rehabilitimi konjitiv duhet të fillohet:

- A) Pas rifitimit të aftësive fizike.
- B) Paralelisht me rehabilitimin fizik.

- C) Para rehabilitimit fizik.
- D) Nuk aplikohet fare.

15. Në cilën nga sëmundjet e mëposhtme rehabilitimi fizik nuk paraqet sinjifikancë statistikore?

- A) Infarkt cerebrale.
- B) Hemorragjine cerebrale.
- C) Sëmundjen e Alzheimer.
- D) Sëmundjen e motoneuronit.

16. Cilën nga terapitë e mëposhtme do të preferonit për një të sëmurë që vuan prej shumë kohësh me epilepsi farmakorezistente?

- A) Kineziterapi.
- B) Psikoterapi.
- C) Hidroterapi.
- D) Terapi konjitive.

17. Në cilën nga patologjitë e mëposhtme ka vlerë trajnimi i familjareve mbi procedurat e rehabilitimit fizik?

- A) Hemiplegjite pas sëmundjes cerebrovaskulare.
- B) Herniet discale lumbare.
- C) Fibromyalgjinë.
- D) Të gjitha

18. Cila nga procedurat e mëposhtme nuk ka sinjifikance statistikore në të sëmurët me fibromyalgi?

- A) Kineziterapia.
- B) Masoterapia.
- C) Hydroterapia.
- D) Asnjë.

19. Hydroterapia është statistikisht sinjifikante në:

- A) Sklerozën amyotrofike laterale.
- B) Myasthenia grave.
- C) Sklerozën multiple.
- D) Sëmundjen e Alzheimer.

20. Masoterapia kundërrindikohet në:

- A) Fazën acute të sindromeve radikulare.
- B) Sëmundjen e parkinsonit.
- C) Polyneuropathitë.
- D) Te gjitha.

21. Në polyradikuloneuritit inflamator akut të tipit gullaun Barre Landry kineziterapia duhet të fillohet:

- A) 2-3 jave pas fillimit të sëmundjes.
- B) Menjëherë pas instalimit të deficitit motor.

- C) 2-3 dite pas fillimit të sëmundjes.
- D) Asnjë.

22. Kur nuk duhet aplikuar kineziterapia në polyneuropathinë diabetike:

- A) Kur dëmtimi aksonal është shumë i rëndë.
- B) Në fazën e dhimbshme.
- C) Pas trajtimit farmakologjik.
- D) Në fazën fillestare.

23. Në fazën terminale të sëmundjes së Duchenne do të sugjeronit:

- A) Kineziterapi.
- B) Masoterapi.
- C) Teknika të rehabilitimit pulmonar.
- D) Terapi okupacionale.

24. Metodat Alpini kanë sinjifikancë statistikore në:

- A) Hemorragjitë cerebrale.
- B) Sëmundjen e Parkinsonit.
- C) Chorea Huntington.
- D) Sindromet vertiginoze.

25. Cila nga procedurat e mëposhtme ka sinjifikancë statistikore të të semuret pas interventit për hernie discale lumbare?

- A) Ushtrimet në pishinë.
- B) Masoterapia.
- C) Ozonoterapia.
- D) Akupunktura.

26. Në cilin nga rastet e mëposhtme kundërintikohet kineziterapia?

- A) Në ishemi cerebellare.
- B) Në stadin akut të hernies discale.
- C) Në hemiparezat pas extirpimit të tumoreve cerebrale.
- D) Në fibromyalgi.

27. Në paralizen cerebrale spastike infantile nuk duhet të aplikohet:

- A) Kineziterapi.
- B) Hidroterapi.
- C) Masoterapia.
- D) Të gjitha.

28. Në Myotonine e tipit Steinert kineziterapia përdoret për:

- A) Të rivendosur motorikën e humbur.
- B) Për të plotësuar farmakoterapinë.
- C) Për të ruajtur funksionin motor të mbetur.
- D) Për të ngadalësuar progresionin e deficitit motor të kompromentuar.

29. Riedukimi i ecjes ka sinjifikance statistikore në:
- A) Hemiparezat post sëmundjes cerebrovasculare.
  - B) Polyneuropathitë axonale motore.
  - C) Myopathitë.
  - D) Distrofite mskulare.
30. Në sklerozën multiple procedura e rehabilitimit fizik ndikojnë në:
- A) Zhdukjen e deficiteve motore.
  - B) Pjesëmarrje më aktive në aktivitetet e jetës së përditshme.
  - C) Uljen e mundësisë së shfaqjes së pllakave demielinizante.
  - D) Asnjë.
31. Elementët e ekzaminimit logopedik:
- A) Marrja e të dhënave të anamnezës.
  - B) Ekzaminimi i të folurit oral.
  - C) Ekzaminimi i strukturës së fjalisë.
  - D) Të gjitha alternativat.
  - E) Asnjëra nga alterntivat.
32. Seanca e rehabilitimit tek i sëmuri me Parkinson duhet të fillojë:
- A) Gjysëm ore pas terapisë medikamentose
  - B) Një orë pas terapisë medikanentose
  - C) Dy orë pas terapisë medikamentose
  - D) Tre orë pas terapisë medikamentose
33. Sipas Meckenzie pacientit me hernie diskale posteriore L5-S1 i duhet përdorur:
- A) parimi i ektensionit të shtyllës kurrizore
  - B) parimi i fleksionit të shtyllës kurrizore
  - C) parimi i inklinimit lateral të shtyllës kurrizore
  - D) parimi i rrotullimit të shtyllës kurrizore
34. Në hemiplejinë e djathtë tek i rrituri është e rëndesishme:
- A) forcimi i muskujve të gjymtyrëve të poshtme
  - B) korrigjimi i skemës patologjike
  - C) linfodrenazhi i gjymtyrës së sipërme
  - D) ecja drejt e pacientit
35. Për përmiresimin e levizshmërisë tek i sëmuri me Parkinson duhen perdorur:
- A) ushtrime me rezistencë
  - B) ushtrime te lira pa rezistencë po me ritëm
  - C) skema ushtimesh mbyllëse pa ritem
  - D) stimuj propioceptiv
36. Në fazën e avancuar të miastenesë grave ka shumë rëndesi:
- A) gjimnastika respiratore
  - B) ruajtja e performances su muskujve skeletikë

- C) bashkëpunimi me psikologun
- D) vlerësimi postural i pacientit

37. Levizja si rrotë e dhëmbëzuar e parakrahut është pasojë:

- A) e hipertonisë piramidale
- B) e hipertonisë ekstrapiramidale
- C) e çrregullimeve të ekujlibrit
- D) e pozicionimit të keq

38. Tek pacienti paraplegjik ka rëndësi të madhe për të dhënë automi:

- A) ushtrimet e ekujlibrit
- B) forcimi i gjymtyrëve të sipërme
- C) forcimi i gjymtyrëve të poshtëme
- D) ushtrimet e kombinuara

39. Në fazën akute të paralizës periferike të nervit facial nuk duhet përdorur:

- A) termoterapia nga faqja e paralizuar
- B) termoterapia nga faqja e shëndoshë
- C) lëndodrenazhi sipas Leduk
- D) trajtimi i përditshëm

40. Parimi kryesor në rehabilitimin e neuropatite periferike është:

- A) rifitimi i forcës muskulare
- B) ulja e tonusit muskular
- C) parandalimi i iperrefleksisë
- D) modifikimi i ROM-it artikular

41. Fizioterapia në distrofinë muskulare Duchenne ka si qëllim:

- A) të sforcoj pacientin për të ruajtur masën muskulare
- B) të shtoj performancën e pacientit
- C) të ruaj sa më gjatë autonominë e pacienti
- D) të përmirësojmë lëvizshmërinë artikulare

42. Hipertonusi i tipit piramidale ulet me:

- A) termoterapi direkte dhe indirekte
- B) krioterapi
- C) rinforsim muskular të gjymtyrëve
- D) terapi posturale

43. Ndrëhyrja kirurgjikale për lirimin e nervit median në sindromin e tunelit karpal indikohet vetëm kur:

- A) pacienti ka alergji nga medikamentet
- B) pacienti refuzon terapitë e tjera
- C) kur trajtimi konservativ ka falimentuar
- D) kur pacienti vazhdon të ketë temperature të dorës



44. Tek pacientët me paraliza të nervave periferikë kemi:

- A) hiperefleksi
- B) hipertonus
- C) hypotonus
- D) hypotension

45. Tek pacientët me patologji cerebelare kanë rëndësi të veçantë:

- A) ushtrimet e ekujlibrit
- B) ushtrimet e forcës
- C) ushtrimet e rezistencës
- D) ushtrimet e zgjatjes

46. Në sëmundjen e Parkinsonit kemi:

- A) ulje të serotoninës
- B) rritje të serotoninës
- C) rritje të dopaminës
- D) ulje të dopaminës

47. Distonia është çrregullim:

- A) piramidal
- B) extrapiramidal
- C) cerebelar
- D) midolar

48. Diplegjia intereson:

- A) gjymtyrët e sipërme
- B) gjymtyrët e poshtëme
- C) të katër gjymtyrët po në mënyrë asimetrike
- D) të katër gjymtyrët në mënyrë simetrike

49. Në ditët e para pas insultit cerebral fizioterapist duhet:

- A) të ruaj forcën e anës plegjike
- B) të pozicionaj mirë anën plegjike që të parandaloj ekuinizmin e
- C) të stimuloj refleksët e anës plegjike
- D) të stimuloj ritjen e tonusit muskular

50. Ndërhyrja kirurgjikale për lirimin e nervit median në sindromin e tunelit karpal indikohet vetëm kur:

- A) pacienti ka alergji nga medikamentet
- B) pacienti refuzon terapitë e tjera
- C) kur trajtimi konservativ ka falimentuar
- D) kur pacienti vazhdon të ketë temperaturë të dorës

51. Pacienti me hipertonus piramidal quhet ndryshe:

- A) tonik
- B) spastik

- C) hemiplegjik
- D) paraplegjik

52. Pacientët që kanë rigiditet:

- A) kanë dhe hypotoni
- B) kanë reaksione ekuilibri shumë skadente
- C) nuk kanë problem me ekuilibrin por janë pak të ngurtesuar
- D) kanë gjithmonë një tendencë për të korigjuar pozicionin e trupit

53. Plani jostabël përdoret tek pacientët me:

- A) spina bifida
- B) tetraplegji
- C) distoni
- D) çrregullime ekuilibri

54. Fizioterapia tek pacienti neurologjik ka si qëllim:

- A) ngritjen në këmbë të pacientit
- B) përmirësimin e cilësisë së jetës së pacientit
- C) rritjen e motivimit të pacientit
- D) mos keqësimin e gjendjes së pacientit

55. Triada që karakterizon sëmundjen e parkinsonit është:

- A) hiperkinezi, parestezi, tremor
- B) hiperkinezi, asteni, tremor
- C) hypokinezi, rigiditet, tremor
- D) hypokinezi, asteni, tremor

56. Shkalla e Glasgow përdoret:

- A) për të vlerësuar gjendjen e neonatit pas lindjes
- B) gjendjen e ndërgjegjes
- C) për të vlerësuar risqet e hipertensionit
- D) për të vlerësuar refleksat e thella

57. Pacienti me afazi të tipit Wernicke:

- A) është në gjendje të dëgjojë të kuptojë por nuk flet dot
- B) nuk është në gjendje as të dëgjojë as të kuptojë
- C) flet rrjedhshëm por biseda e tij është pa sens llogjik
- D) flet rrjedhshëm por nuk dëgjon

58. Në faktorët e riskut për insult cerebral futen

- A) hipertensioni, duhani, alkooli
- B) alkooli duhani, avitaminozat
- C) duhani, aspirina, hipertensioni
- D) alkooli, heparina, duhani

59. Neuropatia periferike nuk mund të shkaktohet nga:

- A) diabeti
- B) avitaminozat
- C) alkooli
- D) hypotensioni

60. C'rregullimet e ekuilibrit nuk varen nga:

- A) patologji te veshit te brendshëm
- B) artroza cervikale
- C) patologjitë e cerebelumit
- D) distrofia muskulare

61. Nistagmushi është një shenjë klinike që i referohet aparatit:

- A) lokomotor
- B) digeent
- C) viziv
- D) ekskretor

62. Paraplegjia intereson:

- A) gjysmën e majtë të trupi
- B) gjysmën e djathtë të trupit
- C) një nga gjymtyrët e poshtëme
- D) gjysmën inferiore të trupit

63. Ataksia është:

- A) çrregullim ekuilibri
- B) sinonim i afazise
- C) çrregullim i të folurit
- D) çrregullim i tonusit muskular

64. Skemat diagonale Kabat nuk përdoren:

- A) në tortikolin spastik
- B) në hemiplegjinë e majtë
- C) në hemiplegjinë e djathtë
- D) komën cerebrale

65. Në patologjitë e sistemit nervor qëndror nuk bën pjesë:

- A) skleroza me plaka
- B) aksidenti vaskulo cerebral
- C) tumori I crebelumit
- D) nevralgjia e nervit trigeminal

66. Përmirësimi i R.O.M-it artikular tek pacienti hemiplegjik duhet të filloj nga pjesa:

- A) proksimale e gjymtyrës
- B) distale e gjymtyrës
- C) mediale e gjymtyrës
- D) laterale e gjymtyrës

67. Distonia është çrregullim i sistemit:

- A) piramidal
- B) ekstrapiramidal
- C) cerebellar
- D) bulbar

68. Atetoza karakterizohet nga lëvizje:

- A) të ngadalta dhe jo ritmike të pjesëve proksimale të gjymtyrëve
- B) të ngadalta dhe jo ritmike të pjesëve distal të gjymtyrëve
- C) të shpejta dhe jo ritmike të pjesëve proksimale të gjymtyrëve
- D) të shpejta dhe jo ritmike të pjesëve distal të gjymtyrëve

69. Nuk bën pjesë në shkaqet e sindromit cerebellar:

- A) neoplazitë
- B) traumat kranio-encefalike
- C) alkoolizmi kronik
- D) hiperkolesterolemia

70. Objektivat rehabilituese në javët e parë pas një traume midolare janë:

- A) parandalimi i dukubituseve, kontrakturave, pneumonisë
- B) rikuperimi funksional i palcës së kurrizit
- C) rritimi i ndërgjegjes së pacientit
- D) riedukimi i ecjes së pacientit

71. Pacienti me hernie diskale duhet të nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale vetëm kur:

- A) hernia është L5-S1
- B) hernia është në më shumë se një disk intervertebral
- C) klinika e pacientit vazhdon të rëndohet dhe pas 4 javësh trajtim konservativ
- D) klinika e pacientit vazhdon të rëndohet dhe pas 8 javësh trajtim konservativ

72. Afazia është:

- A) çrregullim i të folurit me origjinë periferike
- B) çrregullim i të folurit me origjinë qendrore
- C) dëmtim i muskujve fonatore
- D) i kordave të zërit

73. Rikuperimi funksional maksimal i pacientëve me iskemi cerebrale ndodh brenda:

- A) 2 muajve të parë
- B) 4 muajve të parë
- C) 6 muajve të parë
- D) 8 muajve të parë

74. Encefaliti është patologji:

- A) degjenerative e SNQ
- B) inflamtoe e SNQ

- C) traumatike e SNQ
- D) hereditare e SNQ

75. Atrofia muskulare spinale është patologji:

- A) degjenerative e SNQ me bazë karencen e vitamins B1
- B) degjenerative e SNQ me bazë gjenetike
- C) inflamatore e muskujve
- D) degjenerative e muskujve

76. Nuk është teknike e rehabilitimit neuromuskular teknika:

- A) Bobath
- B) Vojta
- C) Kabat
- D) Mezieres

77. Delirium tremens është patologji:

- A) pasoje e alkolizmit kronik së bashku polineuropatine alkolike
- B) pasoje e alkolizmit kronik së bashku me hipertone muskulare
- C) çrregullim humori bipolar
- D) çrregullim i ideve tek pacienti skizofrenik

78. Fizioterapisti përpara fillimit të një seance rehabilitimi tek pacienti komatoz duhet:

- A) t'i bëjë terapinë medikamentoze pacientit
- B) të ketë bërë kateterizimin e pacientit
- C) të informohet mbi gjendjen e pacientit
- D) ta ftojë pacientin për bashkëpunim

## **5. Psikiatri dhe Rehabilitim Psikiatrik**

1. Halucinacionet janë çrregullime të:

- A) mendimit
- B) perceptimeve
- C) humorit
- D) Sjelljes

2. Halucinacioni auditiv është perceptimi i rremë i:

- A) lëvizjeve
- B) sjelljeve
- C) tingujve, zërave, zhurmave
- D) objekteve

3. Halucinacioni viziv është perceptimi i rremë i:

- A) zhurmave
- B) goditjeve
- C) i figurave, sendeve, objekteve
- D) sjelljeve bizare

4. Halucinacioni olfaktiv është perceptimi i remë i:

- A) xhurmave
- B) mendimit
- C) sjelljeve
- D) nuhatjes

5. Iluzionet janë:

- A) perceptime të reme
- B) fantazi
- C) perceptime të gabuara
- D) paradoksalitet

6. Psikoza është:

- A) azhitim psikomotor
- B) paaftësia për të dalluar realitetin nga fantazia
- C) gjendje me humor të lartë
- D) cregullim gjumi

7. Logore është:

- A) inkoherenca e të folurit
- B) shtimi i sasise se te folurit shpejtësisë të të folurit
- C) paradoksalitet
- D) mungesë të foluri

8. Mutizmi është:

- A) ngadalësim i të folurit
- B) i folur me shenja
- C) frenim i të folurit
- D) i folur paradoksal

9. Solilokia është:

- A) cregullim mendimi
- B) i folur me vete
- C) crregullim sjelleje
- D) neologjizëm

10. Tangencialiteti është:

- A) sallata e fjalëve
- B) inkoherencë
- C) përgjigje anash
- D) viskozitet në mendim

11. Të menduarit paradoksal është:

- A) shpeshtësi e të menduarit
- B) të menduar bizar, pa kuptim
- C) tangensialitet

D) Viskozitet mendimi

12. A zbuten deluzionet me anën e:

- A) bindjes dhe argumentit
- B) forcës fizike
- C) halucinacionit
- D) forcës psiqike

13. Deluzionet janë cregullime të:

- A) percpsioneve
- B) mendimit
- C) humorit
- D) Sjelljes

14. Deluzioni është:

- A) të menduar bosh, pa kuptim
- B) besim i gabuar, konkluzion i pasaktë
- C) bindje që bazohet mbi fakte reale
- D) argument shkencor

15. Deluzioni bizar është:

- A) dëmtimi i skemës së trupit
- B) fakt real
- C) argument shkencor
- D) bindje absurde, e paarsyeshme

16. Deluzioni i persekutimit është bindja e gabuar se:

- A) po e tradhëtojnë
- B) se është i sëmure me SIDA
- C) po e ndjekin, mashtrojnë, sulmojnë
- D) ka prejardhje fisnikësh

17. Deluzionet e referencës lidhen me bindjen se:

- A) vjen nga prejardheje e lartë
- B) ka ndjesinë e përndjekjes
- C) është infektuar nga viruse të ralla
- D) TV i dërgon mesazhe dhe ngado i vijnë sinjale

18. Deluzionet e veteakuzimit është bindja e gabuar se:

- A) është mashtruar dhe tradhëtuar
- B) se ka bërë faje të rënda dhe duhet ndëshkuar
- C) organet e trupit janë të deformuar
- D) fytyra është shtrembëruar

19. Obsesionet janë:

- A) persistomi patologjik i një mendimi, impulsi, përfytyrimi

- B) bindje të gabuar
- C) perceptimi remë i tingujve, zhurmave
- D) vështirësi në përqëndrim

20. Fobia është:

- A) mendim bizare
- B) frikë patologjike e ekzagjeruar me objekt real
- C) mendim i imponuar nga jashtë
- D) përfytyrim

21. Paramimia është:

- A) bizaritet
- B) dëshpërim
- C) nivel i lartë humori
- D) mospërputhja e emocionit me reagimin

22. Amnezitë janë cregullime të:

- A) motorikës
- B) kujtesës
- C) folurit
- D) lëvizjeve të vullnetëshme

23. Katatonia është crregullim i:

- A) mendimit
- B) humorit
- C) sjelljes
- D) pamjes

24. Koeficienti i inteligjences (IQ) 40 pikë është prapambetje mendore:

- A) e rëndë
- B) e moderuar
- C) e lehtë
- D) shumë e thellë

25. Disforia është humor:

- A) i lartë
- B) irrituar
- C) Depresiv
- D) i shqetësuar

26. Euforia është gjendje humori:

- A) e lartë
- B) shumë e lartë
- C) e irritushme
- D) Ekspansiv



27. Humori depresiv është:

- A) humor disforik
- B) humor i paqëndrushëm
- C) mërzi dhe dëshpërim
- D) humor i irritushëm

28. Negativizmi është crregullim i:

- A) mendimit
- B) sjelljes
- C) humorit
- D) i perceptioneve

29. Agresiviteti është:

- A) humor i irrituar
- B) shtim i veprimtarisë psikomotore
- C) refuzim mjekimi
- D) psikoze

30. Komunikimi verbal është:

- A) të thuash çfarë ke ndërmend
- B) të jesh i tërthortë
- C) të thuash vetëm të vërtetën
- D) të shkruash mendimin

31. Komunikimi jo verbal është:

- A) të thuash atë që ke ndërmend
- B) shfaqja e jashtme e asaj që ke ndërmend
- C) është komunikim terapeutik
- D) Të thuash të kundërtën e asaj që mendon

32. Komunikimi terapeutik është:

- A) komunikimi mes fizioterapisteve
- B) mjek-mjek
- C) infermier-mjek
- D) infermier -pacient

33. Komunikimi terapeutik është më i rehatshëm kur infermieri dhe pacienti janë larg njeri tjetrit:

- A) 1.5 m
- B) 45 cm
- C) 2.5 m
- D) 50 cm

34. A është komunikim jo terapeutikë:

- A) pranimi
- B) kundërshtimi
- C) miratimi

D) rënia dakord

35. Rehabilitimi psikiatrik përfshin:

- A) institucionalizimin
- B) trajtim me preparate
- C) psikoterapi
- D) trajtimin biologjik

36. Psikoterapitë përdorin teknikat:

- A) biologjike
- B) psikologjike
- C) sociale
- D) kirurgjikale

37. Psikoterapitë trajtojnë:

- A) probleme të rënda shëndetësore
- B) probleme të sjelljes dhe emocioneve
- C) parandalim dhe profilaksi
- D) probleme kozmetike

38. Psikoterapia ndihmon për:

- A) reduktimin e varfërisë
- B) të mëson të flasësh
- C) të mëson të punosh me profesionalizëm
- D) të mësuar mënyra të reja sjelljeje

39. Cfarë nuk është qëllim i rehabilitimit psikiatrik?

- A) përmirësimi i sëmundjes mendore
- B) punësimi
- C) riintegrimi në komunitet
- D) rritja e pavarësisë

## **6. Neurolinguistikë dhe Rehabilitim i të Folurit**

1. Të komunikosh do të thotë:

- A) të përdorësh gjuhën e nënës
- B) të japësh një informacion për të tjerët
- C) të pyesim dikë për dicka
- D) të dish të flasësh

2. Në cilën moshë fëmija e bën të tijën gjuhën?

- A) 12 muajsh
- B) 3 vjec
- C) 6 vjec
- D) 8 vjec

3. Etapa paragjuhësore mbulon moshën:

- A) 0-5 muaj
- B) 0-18 muaj
- C) 2-3 vjec
- D) mbi 6 vjec

4. Logopedistët janë specialistë:

- A) klinik
- B) Biologjik
- C) social
- D) para-klinik

5. Disfazia motore është:

- A) vështirësi në të kuptuar
- B) crregullim i shprehjes verbale
- C) belbëzim
- D) mutizëm

6. Vonesa e lehtë e gjuhës është:

- A) gërmëzimi
- B) surdomutizëm
- C) mutizëm selektiv
- D) vonesa e fjalës së parë

7. Vonesa e gjuhës është:

- A) belbëzim
- B) paaftësia për të vargëzuar tingujt në fjalë
- C) mutizëm selektiv
- D) defekt i dëgjimit

8. Dislalia është:

- A) vonesë në fjalën e parë
- B) defekt në shqiptimin e tingullit
- C) surdomutizëm
- D) paaftësia për të vargëzuar tingujt në fjalë

9. Cilat nga crregullimet gjuhësore është prezent në prapambetjen mendore të moderuar?

- A) vonesa e fjalës së parë
- B) logorea
- C) disfazia
- D) belbëzimi

10. Cili organ është quajtur 'gjenerator i zërit'?

- A) truri
- B) laringu
- C) mushkëritë

D) diafragma

## 7. Neuropsikiatri Infantile dhe Rehabilitim i Saj

1. Fëmija ka kontroll të posturës në:

- A) 3 vjeç
- B) 4 vjeç
- C) 5 vjeç
- D) 6 vjeç

2. Frika dhe tmerret e nates hasen kryesisht tek femijet:

- A) 0-12 muajsh.
- B) 2-3 vjec.
- C) Parashkolloret.
- D) Adoleshence.

3. Fëmija di emrin dhe moshën deri në:

- A) 2 vjeç
- B) 3 vjeç
- C) 4 vjeç
- D) 5 vjeç

4. Refleksi Moro zhvillohet në

- A) 1 muajsh
- B) 4 muajsh
- C) 8 muajsh
- D) 10 muajsh

5. Belbezimi është çrregullim:

- A) I perceptimit.
- B) I rrjedhshmerise ne te folur.
- C) I konjcionit.
- D) afektiv.

6. Gjени pergjigjen e pasakte per autizmin:

- A) Eshte semundje e moshes feminore.
- B) Eshte crregullim pervaziv i zhvillimit
- C) Diagnostikohet per here te pare para moshes 3 vjec.
- D) Mjekim i zgjedhur eshte ai medikamentoz.

7. Gjени pergjigjen e pasakte: Pavemendja e nje femije me crregullim te vemendjes se pamjaftuar konsiston kur shpesh:

- A) nuk u kushton vemendje detajeve ose ben gabime nga pakujdesia.
- B) ka veshtiresi per tu perqendruar tek detyrat apo tek loja.
- C) pret me durim rradhen e tij per te vepruar.
- D) nuk degjon kur i flitet direct.

8. Cila nga patologjite e meposhtme mund te jete e shoqeruar edhe me epilepsi?

- A) Autizmi.
- B) Crregullimi i vemendjes se pamjaftuar me hiperaktivitet.
- C) Depresioni feminor.
- D) Psikozat infantile.

9. Crregullimet e te nxenit karakterizohen nga:

- A) funksionim akademik i ulur ne krahasim me moshen kronologjike te femijes
- B) disfunksion semantico- pragmatic
- C) disfunksion fonologjik
- D) koordinim motor qe eshte shume poshte asaj te llogaritur per moshen kronologjike dhe inteligjences se matur te personit

10. Terapite me te perdorshme ne autizem jane te gjitha pervec njeres:

- A) ABA (Applied Behavioural Analysis)
- B) Terapia e muzikes
- C) Floor-Time
- D) Akupunktura

11. Autizmi infantil është një crregullim pervaziv i zhvillimit i percaktuar nga deficite ne tre fusha kryesore te poshteshenuara pervec njeres:

- A) Aftesite sociale, empatia dhe te kuptuarit e tjetrit
- B) Aspekte karakteristike fizike
- C) Komunikimi verbal dhe joverbal si dhe imagjinata
- D) Fleksibiliteti konjitiv dhe ne sjellje

12. Cila nga shifrat e meposhtme tregon frekuencen e prapambetjes mendore te rende te personat e diagnostikuar me prapambetje mendore?

- A) 1%
- B) 7%
- C) 12%
- D) 80%

13. Cili nga raportimet e meposhtme ne lidhje me hasjen e eneurezes nocturnae sipas grupmoshes është i gabuar?

- A) 1% e femijeve te moshes 5 vjec
- B) 3% e femijeve deri 8 vjec
- C) 4% e femijeve deri 14 vjec
- D) 10% e femijeve deri 18 vjec

14. Fëmijët vërejnë diferencën gjinore rreth moshës deri:

- A) 1 vjeç
- B) 2 vjeç
- C) 3 vjeç
- D) 4 vjeç

15. Pergjigje statistikisht sinjifikante ne depresionin te adoleshentet marrim gjate:
- A) Farmakoterapise
  - B) Psikoterapise
  - C) Kombinimi i te dyja me siper
  - D) Terapia elektrokonvulsive
16. Gjate femijerise simptomat obsessive e compulsive nuk hasen ne:
- A) çrregullimet e ankthit
  - B) çrregullimin depresiv
  - C) sindromin Gilles de la Tourette
  - D) çrregullimet e te nxenit
17. Nje prej simptomave te meposhtme te shfaqura para moshes 15 vjec nuk është pararendese e çrregullimeve te personalitetit:
- A) Ankthi nocturnae
  - B) Abuzimi me substance
  - C) Delikvence juvenile.
  - D) Genjeshtra te shpeshta
18. Sindromi Gilles de la Tourette ndodh per shkak te:
- A) demtimit te traktit kortiko-spinal
  - B) hipersensitivitetit dopaminergjik
  - C) traumes craniale
  - D) tumoreve te lobit frontal
19. Cili nga faktoret e meposhtem nuk ndikon ne shfaqjen e crregullimit te vemendjes se pamjaftueshme me hiperaktivitet?
- A) Faktoret gjenetike
  - B) Intoksikacioni me plumb
  - C) Hiperproteksioni prinderor
  - D) Faktoret social
20. Fëmija shfaq frikë ndaj të huajve:
- A) 0 - 1 muajshe
  - B) 1 - 3 muajshe
  - C) 4 - 8 muajshe
  - D) 9 - 12 muajsh
21. Trajtimi i crregullimeve te sjelljes perfshin te gjitha pervec njeres:
- A) Keshillim per prinderit
  - B) Terapi behavioriste
  - C) Terapi elektrokonvulsive
  - D) Farmakoterapi
22. Ne cilen nga patologjite e meposhtme nuk jane prezente halucinacionet?

- A) Çrregullimet e humorit
- B) Çrregullimet psikotike
- C) Çrregullimi disociativ
- D) Çrregullimi i stresit post- trauma

23. Cila nga çrregullimet e meposhtme nuk ben pjese ne çrregullimet e femijeve parashkollore?

- A) Mekja
- B) Çrregullimet e personalitetit
- C) Çrregullimet e gjumit
- D) Shperthimet e inatit.

24. Cila nga shenjat e meposhtme nuk ben pjese ne çrregullimet gjuhesore?

- A) Paaftesi per te ndjekur udhezimet
- B) Veshitresi ne ritmin, volumin ose cilesine e zerit
- C) Reduktimi i fjalorit
- D) Modele gramatikore te papershtatshme

25. Regresi gjuhesor mund te ndodhe ne:

- A) çrregullimin disintegrative te femijerise
- B) Epilepsi farmakorezistente
- C) çrregullimin obsesiv- kompulsiv
- D) çrregullimet fonologjike

26. Sindromi i ADHD është sëmundje:

- A) Genetike.
- B) Çrregullim metabolik.
- C) Çrregullim biokimik.
- D) hormonal.

27. IQ tek fëmijët me vështirësi në të nxënë është:

- A) Poshtë 59.
- B) 60-80.
- C) Mbi 80.
- D) nuk ka njesi matje.

28. Vështirësia në të nxënë kërkon:

- A) Edukim në qendra rezidenciale.
- B) Integrim në shkollë normale.
- C) Strategji bypass.
- D) Edukim ne izolim.

29. Testi i Denver është:

- A) Depistues.
- B) Vlerësues.
- C) Përcaktues i IQ.
- D) Mjekues.

30. Sindromi Down është çrregullim:  
A) Kromozomik  
B) I trashëguar  
C) I fituar  
D) Sëmundje infektive
31. Fëmija kap objekte në formë pincete në moshën:  
A) 0 - 4 muajshe  
B) 4 - 7 muajshe  
C) 8 - 9 muajshe  
D) 10 - 12 muajsh
32. Ekipi multidisiplinar gjeneron:  
A) Konflikt  
B) Konkurencë  
C) Bashkëpunim  
D) Pavarësi në punë
33. Paraliza cerebrale e tipit atetoze karakterizohet nga:  
A) lëvizje të pavullnetshme  
B) lëvizje normale  
C) lëvizje të vullnetëshme  
D) mungesë e lëvizje.
34. Zhvillimi është proces vetëm:  
A) Biologjik+ Kognitiv  
B) Kognitiv+ Socio-emocional  
C) Socio-emocional+ kognitiv  
D) Biologjik+ Kognitiv+ Socio-emocional
35. Proceset biologjike përfshijnë vetëm:  
A) Bilancin antropometerik +Aftësitë genetike  
B) Bilancin hormonal+ Aftësitë motorike  
C) Aftësitë motorike +Aftësitë genetike  
D) Aftësitë genetike+ motorike+ Bilancin hormonal+ antropometerik
36. Qeshja sociale ndodh në moshën:  
A) 0 - 1 muaj  
B) 1 - 4 muaj  
C) 5 - 6 muaj  
D) 7-12 muaj
37. Fëmija sjell duart në vijën e mesit në moshën:  
A) 0 - 1 muajshe  
B) 1 - 4 muajshe  
C) 5 - 8 muajshe



D) 9-12 muajshe

38. Fëmija kërkon objektin e fshehur në moshën:

A) 0 - 1 muajshe

B) 2 - 3 muajshe

C) 4 - 8 muajshe

D) 9 - 12 muajsh

## 8. Patologjitë e Aparatit Lokomotor dhe Rehabilitimi i Tyre

1. Trajtimi konservativ në coxa valga konsiston në:

A) Përforcimin muskular të muskujve të legenit dhe korigjimin e posturës,

B) Përmirësimin e sensibilitetit;

C) Zvogëlimin e tonusit muskular;

D) Zvogëlimin e këndit cerviko- diafizar të femorit.

2. Objektivi kryesor i trajtimit fizioterapeutik të një skolioze torakale në formë C është:

A) Përmirësimi i koordinimit sy -dorë;

B) Përforcimi i muskujve të gjymtyrëve të sipërme;

C) Zgjatja e muskujve të trungut të anës konkave;

D) Parandalimi i sindromit të piriformit.

3. Në një skoliozë në formë S, kur këndi i "Kobit" është më i vogël se 20 C; trajtimi konsiston në:

A) Gjimnastik

B) Vendosja e një allcie

C) Mbajtja e një orteze "Milwakee"

D) Trajtim kirurgjikal

4. Në rastin e frakturës Pouto-Colle komplikacioni më i shpeshtë është:

A) Periartriti skapularë;

B) Artriti Reumatoid;

C) Algoneurodistrofi e tipit 1 (CRPS 1) në gjymtyrën e sipërme;

D) Algoneurodistrofi e tipit 1 (CRPS 1) në gjymtyrën e poshtme.

5. Trajtimi afat shkurter (në fazën e allcisë) në frakturën Pouto-Colle konsiston:

A) Masazh dhe mobilizim pasiv në distancë, të gishtave dhe skapulës;

B) Masazh dhe mobilizim pasiv i brrylit dhe kyçit të dorës;

C) Përforcim i muskujve të parakrahut;

D) Mobilizim aktiv i kyçit të dorës;

6. Në një distorcion të kaviļjes, në fazën e parë të rehabilitimit janë të lejueshme lëvizjet e:

A) flexionit plantar dhe fleksionit dorsal;

B) Eversionit;

C) Inversionit;

D) Cirkonduksionit

7. Në një endoprotezë kokso-femorale, strukturat që mungojnë janë:

- A) Capsula artikulare;
- B) Ligamenti Capitis femori;
- C) Ligamenti pubo-femoral
- D) Muskuli ilio-ptoas

8. Në një luksacion anterior të supit, gjatë ekzaminimit pacienti ka dhimbje gjatë lëvizjes së:

- A) Fleksionit anterior të krahut deri në 90
- B) Inklinimit të qafes
- C) Fleksionit anterior të qafes
- D) Aduksionit dhe rrotacionit ekstern të krahut

9. Në një endoprotezë kokso-femorale nuk duhet të realizohen lëvizjet e:

- A) fleksion >90; rrotacion intern; adduksion në kokso femoral
- B) fleksion i plotë i gjurit
- C) fleksion dorsal; fleksion plantar i kaviljes
- D) Ekstension; rrotacion ekstern; abduksion në koksofemoral

10. Në një tendinit kemi:

- A) Inflamacion intraartikular
- B) Inflamacion të tendinit
- C) Këputje të tendinit
- D) Hemoragji intraartikulare

11. Fraktura e stresit shkaktohet nga:

- A) Mikrotrauma të përsëritura
- B) Një lëvizje violente
- C) Një aksident rrugor
- D) Një këputje e ligamenteve

12. Në borsitin subakromial:

- A) Koka humerale ka dalë nga fosa glenoidale
- B) Kemi rupturë totale të tendinit të kokës së gjatë të bicepsit
- C) Artrodezë të artikulacionit glenohumeral
- D) Depozitim dhe grumbullim të joneve të kalciumit në nivel të bursës

13. Në frakturat e pakonsoliduara kundërrindikohet absolutisht:

- A) ortezat fiksuese
- B) imobilizimi me allçi
- C) imobilizimi i segmentit të frakturuar
- D) imobilizimi i segmentit në distance

14. Periatriti scapula-homeral nuk shkaktohet nga:

- A) ngushtimi i lindur i hapsirës sub-akromiale
- B) osteoporoza
- C) mbingarkesa funksionale

D) prishja e raporteve artikulare

15. Dy ditet e para pas një distorcioni të kavilies duhet përdorur:

- A) termoterapi, ngritje e këmbës, pushim, funksional
- B) krioterapi, fashim, ngritje e këmbës, pushim funksional
- C) krioterapi, termoterapi, fashim
- D) fashim, ushtrime, akull, biciklete.

16. Distorcioni i gjurit çon në dëmtim të:

- A) palcës së kockës
- B) ligamenteve dhe menisqeve
- C) osteoblasteve
- D) gjurit tjetër

17. Frakturat në moshat pediatrike:

- A) janë gjithnje të komplikuar
- B) janë shumë të shpeshta
- C) janë si dru i njome
- D) konsolidohen brenda javës

18. Një ndër shkaqet e algoneurodistrofi është:

- A) terapia medikamentoze jo e saktë
- B) traumat kockore
- C) ushtrimet me ngarkesë të madhe
- D) masoterapia

19. Protezat janë:

- A) zëvendësues të artikulacioneve të gjurit
- B) ndihmues të jashtëm që përmirësojnë funksionin e një pjese të trupit
- C) korrigjues të amputimeve të gjymtyrëve
- D) aparate për stimulimin e muskujve

20. Protezat janë:

- A) pjesë e një artikulacioni
- B) ndihmues të një artikulacioni
- C) zëvendësues të një strukture anatomike
- D) korrigjues të një strukture anatomike

## **9. Teknika të Rehabilitimit Special**

1. Rehabilitimi kardiak është nje proçes që realizohet nga:

- A) Kardiologu
- B) Fizioterapisti
- C) Psikologu
- D) Staf multidisiplinar

2. Programi i rehabilitimit kardiak ndahet në:

- A) 4 faza
- B) 5 faza
- C) 6 faza
- D) 2 faza

3. Kundërrindikimet për lënien e fizioterapisë gjatë rehabilitimit kardiak është:

- A) Stenoze e aortës
- B) Gastrit
- C) Migrenë
- D) Depresion

4. Angina Pectoris është:

- A) Nekrozë e miokardit
- B) Ishemi e miokardit
- C) Nekrozë endokardit
- D) Ishemi e endokardit

5. Hipertensioni arterial përkufizohet si rritje e presionit të gjakut në shifrat mbi:

- A) 120
- B) 110
- C) 100
- D) 140

6. Ushtrimet që rekomandohen në hipertensionin arterial janë:

- A) Ushtrime relaksuese të muskulaturës së përgjithshme
- B) Ushtrime për rforcim muskular
- C) Ushtrime për ekuilibrin
- D) Streçing

7. Shkaqet me origjinë jo kardiake të hipotensionit janë:

- A) Qëndrimi i zgjatur në regjim shtrati
- B) Duhani
- C) Hiperaktiviteti fizik
- D) Përdorimi i tepruar i kripës

8. Ena më e madhe e sistemit limfatik është:

- A) Vena femorale
- B) Vena lienale
- C) Ductus toracik
- D) Aorta torakale

9. Limfonodulat e sistemit limfatik gjenden në:

- A) Fossa poplitea
- B) Artikulacionin coxo-femoral
- C) Hapsirat intercostae

D) Artikulacionin radio-carpal

10. Vlerësimi kardiovaskular ka të bëjë me:

- A) Testet gjenetike
- B) Testet laboratorike
- C) Testimin muskular
- D) Testimin neurologjik

11. Simptoma tipike për një efort të shtuar gjatë rehabilitimit kardiak është:

- A) Sinkope
- B) Dhimbje abdominale
- C) Nauze
- D) Dispne persistente

12. Faktorë risku në sëmundjet arterosklerotike është:

- A) Dislipidemia
- B) Hiperaktiviteti fizik
- C) Hepatiti B
- D) Cefale

13. Pas fillimit të episodit të angina pectoris pacientët kërkojnë:

- A) Të shtojnë aktivitetin
- B) Të ndalojnë aktivitetin
- C) Të vazhdojnë aktivitetin normalisht
- D) Të kufizojë aktivitetin

14. Anguri tipik i angina pectoris shfaqet klinikisht me dhimbje:

- A) abdominale
- B) torakale
- C) retrosternale
- D) lombare

15. Mjekimi definitiv i kardiomiopative konsiston në:

- A) Transplant të zemrës
- B) Mjekimi me antiaritmikë
- C) Mjekimi me vazodilatatorë
- D) Mjekimi me diuretikë

16. Komplikacion i hipertensionit arterial mund të jetë:

- A) Sinkope
- B) Atak kardiak
- C) Haluçinacione
- D) Takikardi sinusale

17. Sa valvula ka zemra?

- A) 7

- B) 5
- C) 2
- D) 4

18. Etiologjia e valvulopative është:

- A) Kongenitale apo e fituar
- B) Traumatike
- C) Komplikacion i insufiçencës kardiake
- D) Komplikacion i kardiomiopative

19. Përgatitja preoperative në pacientet që i nënshtrohen ndërhyrjeve kirurgjikale konsiston në:

- A) Gjimnastikën respiratore
- B) Sporte si: futbollin, volejbollin
- C) Ushtrime për rirforcim muskular
- D) Përdorimi i biçikletës

20. Objektive në fazën e dytë post transplantit kardiak është:

- A) Reduktimi i ankthit
- B) Përmirësimi i kapacitetit ajror
- C) Zvogëlim të kapacitetit të efortit
- D) Zvogëlim të kapacitetit aerobik

21. Insufiçenca kardiake është një patologji, e cila:

- A) prek vetëm zemrën
- B) është patologji sistemike, përveç zemrës prek edhe sisteme të tjera
- C) prek vetëm enët e gjakut
- D) prek aparatit tretës

22. Shenja klinike tipike e insufiçencës kardiake është:

- A) cianoza
- B) dhimbja e kokës
- C) nauze
- D) dispne e tipeve si: ortopne, dispne e efortit, paroksistike.

23. Dhimbja tipike në infarkt të miokardit zgjat:

- A) 10 min
- B) 30 min
- C) 20 min
- D) 5 min

24. Faktorë riskues i modifikueshëm të IAM është:

- A) Arterioskleroza
- B) Obeziteti
- C) Vaskuliti
- D) Embolia koronare

25. Parandalimi i shfaqjes së venave varikoze realizohet përmes:
- A) përdorimit të corapeve elastike
  - B) qëndrimit për një kohë të gjatë në këmbë
  - C) qëndrimit në dekubitues dorsal, me gjunjtë në ekstension
  - D) qëndrimit për një kohë të gjatë ulur
26. Rehabilitimi fizioterapeutik në afeksionet venoze nënkupton:
- A) Lëvizshmërinë pasive dhe aktive të anësive
  - B) Krioterapi
  - C) Hiperaktivitet
  - D) Sporte si vrap, hedhja e shtizës.
27. Tromboflebiti është një patologji në të cilën:
- A) Trombet shkaktojnë afeksione venoze
  - B) Trombet rrisin përmasat e tyre
  - C) Trombet shkaktojnë inflamacion në vena
  - D) Afektohen strukturat artikulare
28. Angioplastika koronare perkutane transluminale (PTC) përdoret për:
- A) Rivaskularizimin e miokardit e shkaktuar nga insufiçenca e arteries koronare
  - B) Rivaskularizimin e miokardit e shkaktuar nga stenoza e arteries koronare
  - C) Rivaskularizimin e endokardit e shkaktuar nga insufiçenca e arteries koronare
  - D) Rivaskularizimin e perikardit e shkaktuar nga stenoza e arteries koronare
29. Rehabilitimi kinetik pas angioplastikës fillon:
- A) menjëherë pas angioplastikës
  - B) pas 2-5 ditësh
  - C) pas një jave
  - D) pas një muaji
30. Objektivat e fazës post operatore pas ndërhyrjeve kardiake kanë të bëjnë me:
- A) Parandalim të ngurtësimeve të artikulacioneve përmes lëvizjeve pasive me një ritëm prej 2 herë në ditë
  - B) Informim të përgjithshëm mbi ndërhyrjen
  - C) Vlerësim të tipit të frymëmarrjes
  - D) Reduktim të ankthit
31. Faza e 3-të e rehabilitimit të IAM ka të bëjë me:
- A) Periudhën e hospitalizimit
  - B) Periudhën pas daljes nga spitali
  - C) Terapia mbajtëse për gjithë jetën
  - D) Përgatitja për ndërhyrje kardiake
32. Në infarkt akut të miokardit fizioterapia:
- A) ka kundërindikacion absolut
  - B) ka shumë rëndësi për riaftësimin e pacientit

- C) bëhet me aparatura
- D) bëhet me masazh.

33. Rehabilitimi i pacientit me infarkt miokardi zgjat:

- A) 1 muaj
- B) 6 muaj
- C) 12 muaj
- D) gjithë jetën

34. Tek pacienti me djegie deri 50% të trupit rehabilitimi fillon:

- A) pasi pacienti ka dal nga qëndra e djegje plastikës
- B) pasi është formuar cikatriceja e plotë
- C) që në ditët e para pas djegjes
- D) varet nga gjëndja e pacientit

35. Grate shtatezana duhet te bejne gjimnastike ne:

- A) tremujorin e pare
- B) tremujorin e dyte
- C) tremujorin e trete
- D) gjimnastika eshte e kunderindikuar

36. Nje seance fizioterapie te nje grua shtatzane fillon:

- A) me ushtrime respiratore
- B) me zgjatje muskulare
- C) me perforcim muskular
- D) me manjeto terapi

37. Gjate nje shtatezanie normale nuk kemi:

- A) dhimbje mesi
- B) edeme te gjymtyreve te poshtme
- C) hiperlordoze lumbare
- D) hiperlordoze cervicale

38. Pregatitjen per lindje, te nje gruaje shtatzane fizioterapisti e fillon:

- A) ne muajin e gjashte
- B) pas shtate muaj e gjysem
- C) pas muajit te tete
- D) kur nena eshte futur ne muajin e nente

39. Nje nga qellimet e fizioterapise ne grate shtatezana eshte perforcimi i muskujve:

- A) abdominal
- B) te gjymtyreve te poshteme
- C) qe mbajne shpinen drejt
- D) perineal



40. Në seancën e parë të trajtimit të një gruaje shtatezane për herë të parë është shumë e rëndësishme:
- A) shpjegimi i strukturave anatomike, funksionin fiziologjik dhe ndryshimet në shtatezani
  - B) puna në 3 kohe të muskujve perineal
  - C) Punë me muskujt rektus abdominal
  - D) Zgjatja e ishiatikeve
41. Punë me respiracionin të një gruaje shtatezane është një teknikë:
- A) relaksimi
  - B) perforcimi
  - C) zgjatjeje
  - D) është e kundershtuar
42. Të një gruaje në post-partum imediat (4-8 javë pas lindjes) objektivi kryesor i fizioterapisë konsiston në:
- A) perforcimin e muskujve abdominal
  - B) perforcimin e muskujve gluteal
  - C) edukimin dhe parandalimin e inkontinencës urinare dhe fekale
  - D) edukimi se si duhet të ushqejë foshnjën me gjë
43. Një gruaje shtatezane kur testin duhet:
- A) të bllokojë hundet
  - B) të mbyllë glotën
  - C) të fryjë barkun
  - D) të kontraktojë muskujt perineal
44. Pas një lindjeje normale, sakrumi është në pozicion:
- A) anterior
  - B) posterior
  - C) i inklinuar një anë
  - D) në pozicion neutral
45. Rehabilitimi fizioterapeutik i insuficiencës kardiake në fazën akute konsiston në:
- A) Qëndrim në dekubitues dorsal në shtrat shoqëruar me ushtrime të lehta të anësive duke ruajtur ritmet respiratore
  - B) Lëvizje lëkundese të anësive
  - C) Sporte të ndryshme
  - D) Ushtrime aktive me amplitudë të ulët

## **10. Pediatri dhe Rehabilitim në Pediatri**

1. Dhëmbët e qumështit zëvendësohen me dhëmbët e përhershëm rreth moshës:
- A) 3 - 4 vjeç
  - B) 4 - 5 vjeç
  - C) 6 - 7 vjeç
  - D) 8 - 9 vjeç

2. Quhet fëmijë prematur i linduri:
- A) para 37 javësh moshë shtatzënie
  - B) para 37 javësh moshë shtatzënie dhe me peshë nën 2500 g
  - C) pas 42 javësh moshë shtatzënie
  - D) ndërmjet 37 dhe 42 javësh moshë shtatzënie
3. Faktorët e jashtëm që ndikojnë në rritje e zhvillim janë të gjithë me përjashtim të:
- A) kushteve social-ekonomike
  - B) klimes tropikale
  - C) sëmundjeve kronike pas lindjes
  - D) faktorëve gjenetikë
4. Fëmija e dyfishon peshën e lindjes në moshën:
- A) 1 vjeç
  - B) 8 muaj
  - C) 10 muaj
  - D) 5 muaj
5. Vitamina D merr pjesë në:
- A) mineralizimin e kockës
  - B) aktivitetin nervor
  - C) pjekurinë seksuale
  - D) hematopoezë
6. Fëmija e trefishon peshën e tij në moshën:
- A) 1.5 vjeç
  - B) 2 vjeç
  - C) 12 muaj
  - D) 1.8 muaj
7. Për vaksinimin sipas kalendarit të vaksinimit janë të vërteta të gjitha, me përjashtim të:
- A) Eshtë i detyrueshëm për të gjithë fëmijët
  - B) Nuk këshillohet të bëhet për fëmijët e lindur para kohe
  - C) Ndihmon në krijimin e imunitetit të fëmijës
  - D) Për aplikimin e vaksinave duhen respektuar afatet kohore sipas këtij kalendarit
8. Faktorët e brendshëm që ndikojnë në rritje e zhvillim janë të gjithë me përjashtim të:
- A) hormoneve seksuale
  - B) kushteve social-ekonomike
  - C) hormoneve të tiroides
  - D) faktorëve gjenetikë
9. Encefalopatia bilirubinike tek një fëmijë në term shfaqet kur vlera e bilirubinës serike arrin në:
- A)  $\geq 10$  mg/dl
  - B)  $\geq 15$  mg/dl

- C)  $\geq 18$  mg/dl
- D)  $\geq 20$  mg/dl

10. Për kulloshtrën janë të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- A) kulloshtra prodhohet nga gjendrat mamare ditët e para pas lindjes
- B) përmban shumë yndyrma e sheqerna dhe pak proteina
- C) përmban antikorpe të nënës
- D) mbron fëmijën nga infeksionet

11. Për infeksionin nga Rubeola Kongenitale janë të vërteta të gjitha me përjashtim të:

- A) prek fetusin me rrugë transplacentare
- B) shkakton vonesë në rritjen intrauterine dhe anemi tek bebi
- C) nuk kemi në përdorim asnjë mënyrë parandalimi
- D) është një nga shkaqet e prematurancës.

12. Infeksioni neonatal nuk ka të vërtetë:

- A) hipotermi
- B) hipoglicemi
- C) hipobilirubinemi
- D) ulje të frekuencës kardiake

13. Apgari është:

- A) sëmundje ngjitëse e neonatit
- B) sëmundje e sistemit kardiorespirator
- C) sistem vlerësues i shenjave jetësore të neonatit
- D) refleksi arkaik

14. Përbëjnë kundërrindikacion absolut për ushqyerjen me gji të gjitha me përjashtim të:

- A) HIV-it të nënës
- B) Insuficiencës kardiake e dekompesuar të nënës
- C) TBC aktiv të nënës
- D) përdorimit të drogave nga nëna
- E) ragadet e gjirit të nënës

15. Fëmija katërfishon peshën e lindjes në moshën:

- A) 1 vjeç
- B) 1.5 vjeç
- C) 2 vjeç
- D) 5 vjeç

16. Proteina C reaktive është e rritur në të gjitha rastet, me përjashtim të:

- A) meningit
- B) sepsis
- C) pneumoni
- D) hipoksi nga një lindje e vështirë.

17. Tetanosi neonatal ka të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- A) shkakton kontraktura muskulare
- B) shkakton fraktura të kockave
- C) shkakton sepsis
- D) shkakton çrregullime të frymëmarrjes

18. Për fototerapinë janë të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- A) vepron duke zbërthyer bilirubinën kutane
- B) ndihmon në uljen e nivelit të bilirubinës së palidhur
- C) nuk ekziston një vlerë e përcaktuar e nivelit të bilirubinës tek të gjithë neonatët për fillimin e fototerapisë
- D) përdorimi i saj nuk e parandalon shfaqjen e encefalopatisë

19. Quhet fëmijë postmatur i linduri:

- A) me peshë nën 2500 g
- B) përpara 37 javësh moshë shtatzënie
- C) pas javës 42 të shtatzënisë
- D) nga 37 në 42 javë moshë shtatzënie

20. Fëmija i moshës 2 vjeç flet rreth:

- A) 50 fjalë
- B) 100 fjalë
- C) 300 fjalë
- D) 500 fjalë

21. Infeksioni neonatal ka të gjitha shenjat klinike të mëposhtme, me përjashtim të:

- A) temperaturë e lartë
- B) rash kutan (njolla të kuqe në lëkurë)
- C) ikter
- D) hiperglicemi

22. Mekonium quhet:

- A) qumështi i ditëve të para pas lindjes
- B) një keqformim i lindur i traktit gastrointestinal
- C) një sëmundje ngjitëse e transmetuar nga nëna
- D) jashtëqitja e parë e bebit

23. Vlerësimi i Apgarit nuk përfshin:

- A) frekuencën kardiake
- B) tonusin muskular
- C) frekuencën respiratore
- D) përgjigjen ndaj ngacmimit
- E) reflexet primare

24. Shkaktojnë keqformime të lindura të gjitha, me përjashtim të:

- A) rubeola kongenitale

- B) toksoplazmoza kongenitale
- C) CMV kongenital
- D) hepatiti B kongenital

25. Mund të jenë shenja klinike të një infeksioni neonatal të gjitha, me përjashtim të:

- A) hipotermise
- B) hiperglicemise
- C) hepatosplenomegalise
- D) bombim i fontanelës
- E) rash kutan (skuqje)

26. Kern ikteri shkaktohet nga:

- A) fiksimi i bilirubinës së palidhur në bërthamat trunore
- B) fillimi i parakohshëm i ablaktacionit
- C) anemia nga mungesa e hekurit
- D) ikteri nga qumështi i gjirit

27. Ikteri tek neonati bëhet i dukshëm në lëkurë kur niveli serik i bilirubinës është:

- A) 2-4 mg/dl,
- B) 5-7 mg/dl,
- C) 8-9 mg/dl,
- D) 10 mg/dl

28. Terapia rehidruese orale është trajtim i zgjedhur për të gjithë fëmijët e dehidruar, me përjashtim:

- A) të vjella dhe temperaturë e lartë,
- B) koma ose shok
- C) shigeloze
- D) helmim ushqimor
- E) elasticitet i ulur i lëkurës

29. Favorizojnë malnutricionin të gjitha, me përjashtim:

- A) infeksionet kronike,
- B) përdorimi pa kriter i antibiotikëve,
- C) rrezatim i tepruar nga rrezet e diellit,
- D) kushtet e këqija social-ekonomike,
- E) prematuriteti

30. Mjekimi i zgjedhur në Giardiazë është:

- A) amikacina,
- B) mebendazoli,
- C) piperazina,
- D) metronidazoli (Flagyl).

31. Ndërlikimi më i shpeshtë i Salmonelozës është:

- A) prolapsi rektal

- B) anemia
- C) dehidrimet e tipeve të ndryshme
- D) meningiti

32. Cili nga ekzaminimet e mëposhtme nuk ka vlerë në shigelozë?

- A) Koprokultura,
- B) Hemokultura,
- C) Kërkimi për pus e gjak në feçe,
- D) Urinë komplet

33. Cila nga masat e mëposhtme duhet marrë në një fëmijë me shok anafilaktik të rëndë?

- A) Veshja e tij që te mos kete ftohte,
- B) Ushqyerja.
- C) Rehidrimi
- D) Përdorimi i adrenalinës

34. Në dehidrimin hiperton vuan më shumë:

- A) sistemi kardiovaskular
- B) sistemi nervor
- C) trakti tretës
- D) sistemi hemopoetik

35. Doza e Acetaminofenit (Paracetamol) në fëmijë është:

- A) 1 mg/kg për çdo marrje,
- B) 2 mg/kg për çdo marrje,
- C) 5 mg/kg për çdo marrje,
- D) 15 mg/kg për çdo marrje.

36. Infiltrati eozinofilik Löffler në pulmone mund të haset në:

- A) enterobiozë (oksiuriasë)
- B) teniazë
- C) askaridozë
- D) sepsis nga Salmonella

37. Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë për stenozen hipertrofike të pilorit?

- A) të vjella që në lindje,
- B) ekziston një interval pa shenja klinike ndërmjet lindjes dhe çrregullimeve të para,
- C) ka prani të bilës në të vjella,
- D) ka humbje të oreksit,
- E) ka diarre

38. Shkaktojnë çrregullime malabsorbitive të gjitha, me përjashtim:

- A) alergjia nga proteinat e qumështit të lopës,
- B) dermatiti atopik,
- C) malnutricioni proteino-kalorik,
- D) lambliaza,

E) Kwashiorkor-i

39. Sa është sasia e Tresolit që përdoret për rehidrim oral në dehidrimin e lehtë?

- A) 10 mg/kg peshë,
- B) 20 mg/kg peshë,
- C) 50 mg/kg peshë,
- D) 100 mg/kg peshë.

40. Tetania në fëmijët e vegjël është pasojë e:

- A) rritjes së glicemisë,
- B) uljes së kalciumit të jonizuar në gjak,
- C) uljes së glicemisë,
- D) rritjes së kalcemisë.

41. Shkaku më i shpeshtë i urtikarieve është:

- A) alergjia ushqimore,
- B) infeksionet virale,
- C) alergjia medikamentoze,
- D) idiopatik- i pa njohur.

42. Prania e leukociteve në feçe vihet re në diarrenë nga:

- A) shigella
- B) viruset
- C) gabimet në ushqyerje
- D) helmimet ushqimore

43. Provokimi i të vjellave ka kundërindikacion absolut në helmimet:

- A) ushqimore,
- B) nga marrja e lëndëve kaustike
- C) nga paracetamoli,
- D) nga valiumi.

44. Forma e dehidrimit (i lehtë-i mesëm-i rëndë) tek fëmija vlerësohet me të gjitha, me përjashtim të?

- A) matja e presionit arterial,
- B) thellimi i syve,
- C) dhimbja e kokës,
- D) niveli i fontanelës së madhe.

45. Toksina difteritike parapëlqen:

- A) Indin renal
- B) Timusin
- C) Tiroiden
- D) Miokardin

46. Teniat janë:

- A) viruse
- B) baktere
- C) krimba
- D) myke

47. Shenja Trousseau lidhet me:

- A) hipokalceminë
- B) hipovitaminozën A
- C) hipovitaminozën K
- D) shokun anafilaktik

48. Doza e Adrenalinës subkutan për trajtimin e shokut anafilaktik është:

- A) 0.1 mg për çdo 10 kg peshë,
- B) 0.5 mg për çdo 10 kg peshë,
- C) 1 mg për çdo 10 kg peshë,
- D) 10 mg për çdo 10 kg peshë

49. Vlerësimi i moshës kockore bëhet më mirë me radiografinë e:

- A) gjurit
- B) artikulationit radiokarpal
- C) kavaljes
- D) bërrylit

50. Për hipotiroidizmin kongenital janë karakteristike të gjitha, me përjashtim:

- A) fontanela anteriore e posteriore shumë të mëdha
- B) vonesë në pjekurinë skeletike
- C) ikter
- D) hernie umbilikale

51. Një fëmije quhet prematurë kur:

- A) ka lindur para javës së 37 të shtatëzanisë
- B) ka lindur me lindje cezariane
- C) nëna është në moshë të madhe
- D) është femija i parë

52. Fëmijët që lindin në javën e 32 të shtatëzanisë:

- A) kanë peshë të madhe trupore
- B) lindin pa flokë
- C) janë vetëm vajza
- D) organet janë të pa zhvilluara plotësisht

53. Paraliza obstetrikale e të porsalindurit nënkupton:

- A) Prekje të pleksusit brakial
- B) Zvogëlim të sensibilitetit në gjysmën e trupit
- C) Paralizë të gjymtyrëve të poshtme
- D) Dobësi muskulare në gjymtyrët e poshtme



54. Një fëmijë distonik karakterizohet nga:
- A) ndryshime të medha të tonusit muskular
  - B) ndryshime në gjatësi të gjymtyrëve të poshtme
  - C) ç'rregullime të sensibilitetit
  - D) vështirësi në komunikim
55. Qëllimi kryesor i trajtimit fizioterapeutik të fëmijës me prekje të pleksusit brakial është:
- A) funksionaliteti në ecje
  - B) përmirësimi i ekuilibrit në statik dhe dinamik
  - C) funksionaliteti i gjymtyrës së sipërme të prekur
  - D) përforcimi i muskujve të trungut
56. Në deformimin e shputës "pied bot equino varus" kemi:
- A) Fleksion dorsal të theksuar dhe ekstension të gishtave
  - B) Fleksion plantar, inversion dhe aduksion të parashputës
  - C) Sheshim të harkut intern të këmbës
  - D) Ana e prekur ka numër më të madh se tjetra
57. Në një fëmijë spastik, qëllimi kryesor i trajtimit është:
- A) Rritja e tonusit muskular
  - B) Zvogëlimi i tonusit muskular
  - C) Përforcimi muskular
  - D) Puna me ekuilibrin dhe propioceptionin
58. Në rastin e një tortikolis kongenital, mund të kemi:
- A) Deformim të shputës ekuino varus
  - B) Spasticitet
  - C) Prapambetje mendore
  - D) Prezencën e plagiocefalisë
59. Një nga rolet e fizioterapistit në një fëmijë me tortikolis kongenital është:
- A) të këshillojë prindërit për mënyrën e mbajtjes dhe kujdesjen e fëmijës
  - B) të ndërhyjë në politikën qeverisëse
  - C) ta shoqërojë fëmijën çdo ditë në shtëpi
  - D) të kërkojë përkrahje sociale
60. Testi më i shpeshtë që realizohet në fëmijët me luksacion kongenital të kokso-femoralit është:
- A) Testi i "Ortolanit"
  - B) Shkalla "Aushworth"
  - C) Testi "Up and GO"
  - D) Testi i "14 metrave"
61. Në rastin e një luksacioni kongenital të kokso-femoralit, "pozicioni i stabilitetit" ose pozicioni i korrigjimit është:
- A) Ektension

- B) Fleksion; abduksion; rrotacion ekstern
- C) Rrotacion intern
- D) Fleksion i gjurit

62. Hipotonia është:

- A) ulje të tonusit muskular
- B) rritje të tonusit muskular
- C) lëvizje të pavullnetshme
- D) vështirësi respiratore

63. Gjatë një seance të fizioterapisë, stimulimi me lodra i fëmijës bëhet:

- A) në kuadër të terapisë
- B) që fëmija të mos qaj
- C) për të kënaqur prindërit
- D) Nuk duhet të bëhet

64. Një fëmijë hiperaktiv prezanton:

- A) Vështirësi në ecje
- B) Defiçenc auditive
- C) Defiçit të vëmendjes dhe impulsivitet motorik
- D) Probleme të aparatit tretës

65. Në një rast me Spina Bifida mielomeningocele:

- A) Shpesh është asimptomatike
- B) Nuk ka nevojë për trajtim, vetëm mbikqyrje
- C) Nuk prezanton probleme neurologjike
- D) Prezanton probleme neurologjike të rënda

66. Thithja e kalciumit në zorrë varet nga:

- A) hormonet e tiroides
- B) insulina
- C) vitamina D
- D) përqëndrimi në gjak i vitaminës C
- E) testosteroni

67. Dermatiti atopik:

- A) është sëmundje me predipozitë të qartë trashëguese
- B) lidhet me praninë e parazitëve intestinalë
- C) prek kryesisht adoleshentët
- D) mjekohet me barna antimykotikë

68. Njëra nga shenjat e mëposhtme dëshmon për stenoze hipertrofike të pilorit:

- A) të vjella biliare
- B) anoreksia
- C) diarrea
- D) të vjella ushqimore pas ushqyerjes.

69. Çfarë vë në dukje koprokultura?

- A) viruset
- B) myket
- C) parazitet
- D) protozoarët

70. Kwashiorkor:

- A) është sëmundje infektive bakteriale,
- B) shkaktohet nga marrja e pamjaftueshme e yndyrnave,
- C) shkaktohet nga krimbat e rrumbullakët intestinalë,
- D) shkaktohet nga marrja e pamjaftueshme e proteinave, e shoqëruar me marrje disi të mjaftueshme të kalorive

71. Në rakit është karakteristike:

- A) hipokalcemia
- B) proteinuria
- C) anemia
- D) hiperglicemia

72. Sa është sasia e likideve për mbushjen e shtratit vaskular në dehidrimin e mesëm?

- A) 10 ml/kg peshë
- B) 20 ml/kg peshë
- C) 50 ml/kg peshë
- D) 90 ml/kg peshë

73. Hipotiroidizmi kongenital mjekohet me:

- A) hormonin e rritjes
- B) L-tyroksine
- C) kortizonikë
- D) insulinë

74. Për stnozën hipertrofike të pilorit janë të vërteta të gjitha, përveç:

- A) është më e shpeshtë në meshkuj,
- B) fillimisht të vjellat janë gojë-gojë, pastaj presioni shtohet,
- C) të vjellat janë biliare,
- D) rritja e fëmijës dëmtohet nga kjo patologji, zakonisht shfaqet në muajt e parë të jetës.

75. Cili nga çrregullimet e mëposhtme është i pranishëm në shokun hipovolemik?

- A) edema të shprehura
- B) hiperglicemi
- C) hiperalbuminemi
- D) acidozë metabolike.

76. Janë shenja të rakitit të gjitha, me përjashtim të:

- A) kraniotabes
- B) ngadalësim i rritjes

- C) sulkusi i Harrisonit
- D) skorbuti
- E) tespiet rakitike

77. Çrregullimet alergjike mund të mjekohen me sukses me të gjitha mënyrat e mëposhtme, me përjashtim të:

- A) mënjanimin të kontaktit me alergenin
- B) mjekimit adekuat farmakologjik [adrenalinë, anihistaminikë]
- C) përdorimit të barnave antimikrobike
- D) përdorimit të bronkodilatatorëve

78. Karboni aktiv përdoret për trajtimin e:

- A) intoksikacioneve në fëmijë
- B) hipokalcemisë
- C) diarresë dhe/ose të vjellave
- D) hipokalcemisë

79. Sindromi Reye lidhet me përdorimin e:

- A) aspirinës
- B) aminofilinës
- C) amfetaminës
- D) antibiotikëve

80. Doza e paracetamolit për uljen e temperaturës në fëmijë është:

- A) 5 mg/kg në një marrje
- B) 10 mg/kg në një marrje
- C) 15 mg/kg në një marrje
- D) 20 mg/kg në një marrje

81. Serumi antidifteritik:

- A) Lidh toksinën që qarkullon në gjak
- B) Shkrin membranat e formuara në fyt
- C) Pengon shumimin e mikroorganizmit
- D) Përdoret si profilaksi kundër difterisë

82. Për paralizat e poliomielitit njëri nga pohimet nuk është i vërtetë:

- A) Janë flakside
- B) Janë simetrike
- C) Janë të përherëshme
- D) Janë proksimale

83. Paraliza e nervit glosofaringeal, me dalje të lëngjeve nga hunda, mund të vihet re në:

- A) Rubeolë
- B) Sinuzit
- C) Difteri
- D) Askaridozë

84. Ekzantema që shfaqet edhe në lëkurën me flokë flet për:

- A) Rubeolë
- B) Varicelë
- C) Fruth
- D) Skarlatinë

85. Rashi kutan makulo-papulo-vezikular, i shoqëruar me temperaturë të lartë dhe prurit flet për:

- A) Rubeolë
- B) Varicelë
- C) Fruth
- D) Skarlatinë

86. Janë komplikacione të varicelës të gjitha, me përjashtim të:

- A) Qelbëzimi i elementeve kutane
- B) Sindromi Reye
- C) Glomerulonefriti
- D) Herpes Zoster

87. Fenobarbitali (Luminali) përdoret për trajtimin e:

- A) Giardia lamblias
- B) Laringitit akut
- C) Statusit konvulsiv
- D) Skarlatinës

88. Në varicelë nuk duhen përdorur:

- A) Antihistaminikët
- B) Aspirina
- C) Antibiotikët
- D) Solucionet rehidruese
- E) Paracetamoli

89. Shenja madhore e glomerulonefritit akut është:

- A) Proteinuria
- B) Hematuria
- C) Hipertensioni arterial
- D) Anemia

90. Nuk është e dobishme të përdoren për pertusin:

- A) Oksigjenoterapi
- B) Diazepam
- C) Inhalacion me bronkodilatatorë
- D) Antibiotiket

91. Gjuha si manaferra të kuqe është karakteristike e:

- A) Rubeolës
- B) Parotitit

- C) Skarlatinës
- D) Fruthit

92. Njëra nga shenjat e mëposhtme nuk bën pjesë në kriteret madhore të Ethes Reumatizmale Akute:

- A) Carditis
- B) Poliarthritis
- C) Bradikardia
- D) Chorea minor

93. Shkakton anemi ferriprive:

- A) Hemofilia
- B) Talasemia
- C) Papajtueshmëria nga faktori Rh
- D) Nënushqyerja

94. Cila nga shenjat e mëposhtme nuk është karakteristike e Sindromit Nefrotik Idiopatik?

- A) Hipoproteinemia
- B) Edema
- C) Poliuria
- D) Proteinuria

95. Në cilën moshë hasen më shpesh konvulsionet febrile?

- A) Tek i porsalinduri
- B) Nga muaji i parë në muajin e pestë të jetë
- C) 6 muaj - 5 vjeç
- D) Nga 6 në 12 vjeç

96. Bronkioliti nuk ka të vërtetë:

- A) Takipne
- B) Cianoze
- C) Tirazh
- D) Dispne inspiratore

97. Shoku anafilaktik nuk trajtohet me:

- A) Adrenalinë
- B) Inhalacion me bronkodilatatorë
- C) Kortizonikë
- D) Antibiotike

98. Diagnoza etiologjike e faringotonsilitit streptokoksik?-hemolitik të grupit A bëhet me:

- A) Hemokulturë
- B) Kulturë fytë
- C) Urokulturë
- D) Gjak komplet

99. Karakteristikat klinike të infeksionit nga Hepatiti A janë si më poshtë, me përjashtim:

- A) Periudha e inkubacionit është 15-50 ditë
- B) Klinika ka manifestime të shumta ekstrahepatike
- C) Transmetimi është fekal-oral
- D) Infeksioni manifestohet me rritje të transaminazave dhe të bilirubinës

## 11. E Përgjithshme Paraklinike

1. Cila nga brinjët e mëposhtme nuk është atipike?

- A) E parë
- B) E dytë
- C) E tretë
- D) E dymbëdhjetë

2. Mbledhja e muskujve quhet:

- A) Adduksion
- B) Abduksion
- C) Flexion
- D) Extension

3. Pelvisi formohet nga kockat e mëposhtme me përjashtim të:

- A) Oss coxae
- B) Oss sacrum
- C) Oss coccygeum
- D) Vertebra lumbare e pestë

4. Skapula nuk ka Fose:

- A) glenoidale
- B) subskapulare
- C) supraspinale
- D) infraspinale

5. Humerusi nuk ka Fose:

- A) olekrani
- B) kapitis
- C) radiale
- D) koroide

6. Nuk i takon kafkës elemeti:

- A) Calvaria
- B) Promontorium
- C) Glabella
- D) Clivus

7. Procesi zigomatik mungon tek:

- A) Kocka frontale

- B) Kocka zigomatike
- C) Kocka temporal
- D) Maxilla

8. Atlasi nuk ka:

- A) procese artikulare
- B) Foramen transversal
- C) Fovea dentis
- D) dy tuberkulume

9. Proces i skeletit torakal është:

- A) stiloideus
- B) xipfoideus
- C) mamillaris
- D) zygomatikus

10. Tek sacrum nuk gjejmë:

- A) Facies artikularis
- B) Linea transversal
- C) Cornua sacralia
- D) Spina sacralis

11. Cili nga muskujt e mëposhtëm nuk fillon me dy koka?

- A) Rectus femoris
- B) Digastrikus
- C) Pronator teres
- D) Gastrocnemius

12. Artikulacioni temporomandibular është i tipit:

- A) Cilindrik
- B) Sferik
- C) Elipsoid
- D) Enarthrosis

13. Muskujt pektoralë i takojnë:

- A) Abdomenit
- B) Pelvisit
- C) Shpinës
- D) Toraksit

14. Muskujt e mimikës:

- A) Lëvizin manibulën
- B) Inervohen nga n. Facial
- C) Kanë inervime të ndryshme nga njëra -tjetra
- D) Kanë dy pika fiksime në kocka



15. M.deltoideus fiksohet në:

- A) Oss scapula
- B) Oss Clavikula
- C) Oss humerusi
- D) Vertebren e tretë

16. Artikulacioni genu realizohet ndërmjet:

- A) Femurit, tibies, fibules
- B) Femurit, tibies, patelles
- C) Femurit dhe tibies
- D) Femurit fibula dhe patella

17. Në lidhjet e kafkës mbizotërojnë:

- A) Artikulacionet
- B) Suturat
- C) Ligamentet
- D) Sinkondrozat

18. Në cilin prej proceseve, qelizat shpenzojnë rreth 40% të energjisë së tyre ditore?

- A) Ne transportin aktiv
- B) Ne endocitozë
- C) Ne exocytosë
- D) Ne difuzion të lehtësuar

19. Me cilin lloj procesi transportohet glukozja prej proteinës mbartëse nga një zonë me përqendrim më të lartë drejt një zone me përqendrim më të ulët?

- A) Me transportin aktiv
- B) Endocitozën
- C) Difuzionin e lehtësuar
- D) Difuzionin e thjeshtë

20. Pjesa e sistemit nervor që konsiderohet e pavullneshme është:

- A) SN somatic
- B) SN autonom
- C) SN sensor
- D) SN motor

21. Invaginimet e sarkolemës që formojnë zgjatime në formë gishtërinjsh, që depërtojnë në brendësi të fibrës muskulare quhen:

- A) retikulum sarkoplazmik
- B) retikulum endoplazmatik
- C) tubujt T
- D) filamentet e aktines

22. Segmenti i miofibrilit i quajtur sarkomer, gjendet midis:

- A) dy linjave Z

- B) dy bandave A
- C) dy zonave H
- D) dy aktinave

23. Në një sinaps neuro-muskular, neuroni e çliron neurotransmetuesin në:

- A) pllakën motore
- B) citoplazmën e qelizës muskulare
- C) cisternat terminale
- D) hapësirën sinaptike

24. Një njësi motore përbëhet nga:

- A) të gjitha fibrat muskulare brenda një muskuli të caktuar
- B) nga një neuron motor dhe fibrat muskulare që ai kontrakton
- C) të gjitha neuronet që inervojnë një pjesë të caktuar të trupit
- D) një muskul dhe një nerv

25. Të gjitha më poshtë janë shenja të inflamacionit përveç:

- A) dhimbjes
- B) skuqjes
- C) temperatures
- D) hipertensionit arterial

26. Një nga molekulat e mëposhtme bën të mundur që muskuli të sigurojë energjinë e nevojshme për kontraksion duke gjeneruar ATP prej ADP. Cila është ajo?

- A) Creatinë fosfati
- B) Fosfokinaza
- C) Acetilkolinesteraza
- D) Katalaza

27. Cila nga qelizat e mëposhtme prodhon antikorpe?

- A) Limfocitet T
- B) Limfocitet B
- C) Monocitet
- D) Fagocitet

28. Si quhen degëzimet nervore të cilat përcjellin impulsin drejt trupit të neuronit?

- A) Aksone
- B) Dendrite
- C) Trupa Nissl
- D) Neurofibrile

29. Sistemi nervor autonom inervon të gjitha më poshtë përveç:

- A) muskulit kardiak
- B) gjendrave egzokrine
- C) muskulit skeletik
- D) traktit tretës

30. Zgjidhni thënien e pasaktë ndër të mëposhtmet lidhur me përçimin e impulsit nevor:
- A) Përçimi i impulsit nevor bëhet sipas ligjit gjithcka ose asgjë
  - B) Një stimulim me intensitet më të lartë shkakton impulse më të fuqishme
  - C) Përçimi i impulsit në fibrat e mielinizuara bëhet me kërcim nga një nyje Ranvier në tjetrën
  - D) Arritja e potencialit të veprimit rrit përshkueshmërinë e membranësaksonale
31. Neurotransmetuesit të cilët rrisin permeabilitetin e membranës post sinaptike për jonet Na, dhe potencojnë impulsin nevor quhen neurotransmetues:
- A) inhibitorë
  - B) eksitues
  - C) aktive
  - D) neutral
32. Pjesa fillestare e harkut reflektor është:
- A) interneuroni
  - B) fijet efektore
  - C) receptoëet ndijësor
  - D) neuroni motor
33. Aktiviteti elektrik i muskulit vlerësohet me:
- A) EEG
  - B) EMG
  - C) ECG
  - D) MRI
34. Cili është rajoni i retinës që përgjigjet për mprehtësinë e pamjes?
- A) Sclera
  - B) Lëngu qelqor
  - C) Fovea centralis
  - D) Disku optic
35. Hormonet e mëposhtme çlirohen nga antehipofiza, përveç:
- A) FSH
  - B) TSH
  - C) ACTH
  - D) HAD
36. Hormoni i prodhuar në kortexin e gjendrës mbiveshkore që vepron në veshkë duke mbajtur Na e duke eliminuar K, dhe që indirekt ndikon në ruajtjen e presionit arterial është:
- A) Aldosteroni
  - B) Epinefrina
  - C) Kortizoli
  - D) Adrenalina
37. Rritja e nivelit të hormoneve të tiroides në gjak jep efektet e mëposhtme, përveç:

- A) rënie në peshë
- B) rritje të metabolizmit bazal
- C) rritje të debitit kardiak
- D) rënie të metabolizmit të karbohidrateve

38. Cila pjesë (element) i eritrocitit mund të riciklohet në palcën e kockave për prodhimin e eritrociteve të reja?

- A) Globina
- B) I gjithë eritrociti
- C) Biliverdina
- D) Hekuri

39. Cili nga përbërësit ushqimor është më i rëndësishëm për prodhimin e eritrociteve?

- A) Ca
- B) Na
- C) proteinat
- D) vitamina B12 dhe acid Folik

40. Një person që ka bërë infarkt të muskulit të zemrës, probablisht ka një bllokim të:

- A) A. pulmonare
- B) V. cava
- C) Vv. coronare
- D) A. coronare

41. Valvulat atrio ventrikulare (A-V) mbyllen gjatë ciklit kardiak kur:

- A) pace-makeri dërgon një impuls
- B) presioni brenda atriumeve është më i madh se presioni brenda ventrikujve
- C) ventrikujt kontrahohen
- D) presioni në aortë është më i madh se VM

42. Kompleksi QRS në ECG tregon:

- A) depolarizim të atriumeve
- B) depolarizim të ventrikujve para kontraksionit
- C) repolarizim të ventrikujve
- D) zemren në qetësi

43. Mëlçia në digjestion prodhon:

- A) enzima digjестive
- B) lëndë alkaline për të neutralizuar aciditetin e stomakut
- C) bilë për të emulguar yndyrnat në zorrën e hollë
- D) substanca që ndihmojnë zorrën e trashë në absorbimin e ujit

44. Çfarë e inicion reflexin e gëlltitjes?

- A) Frika nga gëlltitja
- B) Gjuha që vërtitet në gojë
- C) Receptorët sensorë që ndiejnë ushqimin në farings

D) Receptorët e shijes

45. Receptorët e dëgjimit vendosen në:

- A) kanalet semicirkulare
- B) koklea
- C) sakula
- D) vestibule

46. Cilat qeliza të stomakut sekretojnë faktorin intrinsek?

- A) Te mukozës
- B) Parietale
- C) Peptike
- D) G

47. Cila nga të mëposhtmet nuk është përbërje e lëngut pankreatik?

- A) Kimotripsina
- B) Amilaza
- C) Bikarbonatet
- D) Acidi klorhidrik

48. Lipoproteina që ul tensionin sipërfaqësor të alveolave dhe i bën ato të mos kolabohen quhet:

- A) Fosfolipid
- B) Lipoproteinë alveolare
- C) Surfactant
- D) Tensinogjen

49. Sasia maksimale e ajrit që një person mund të expirojë pas frymëmarrjes më të thellë të mundshme është:

- A) kapaciteti pulmonar total
- B) vëllimi expirator rezervë
- C) vëllimi residual
- D) vëllimi rezervë inspirator

50. Imuniteti qelizor sigurohet nga:

- A) A.makrofagët
- B) Bazofilet
- C) Qelizat T
- D) Qelizat B

51. Oksigjeni transportohet në gjak kryesisht si:

- A) O<sub>2</sub> i tretur në plazëm
- B) deoksihemoglobinë
- C) oksihemoglobinë
- D) karbaminëhemoglobinë

52. Cili nga të mëposhtmit nuk është funksion i veshkave?

- A) Zbërthen lëndët ushqimore të ardhura me gjakun
- B) Ndihmon në kontrollin e prodhimit të eritrociteve
- C) Ndihmon në rregullimin e p. arterial
- D) Rregullon përberjen, vëllimin, pH e lëngjeve të organizmit

53. Shendeti sipas teorisë Bio-Mjekësore është:

- A) Mireqenie Shpirtërore
- B) Mireqenie Fizike
- C) Mungesë e sëmundjes
- D) Mireqenie mendore

54. Shendeti sipas OBSH është:

- A) Gjendja e mireqenies së plotë
- B) Mireqenie fizike dhe shpirtërore
- C) Mireqenie mendore dhe shoqërore
- D) Mireqenie fizike, mendore dhe shoqërore

55. Epidemiologjia studion:

- A) Statistike
- B) Higjienë
- C) Shpeshësinë e sëmundjeve
- D) Metoda

56. Faktorët demografikë kanë të bëjnë me:

- A) Nivelin e enzimave
- B) Aktivitetin fizik
- C) Grupet etnike
- D) Grupin e gjakut

57. Për ribozomet nuk është e vërtetë që:

- A) Në to kryhet sinteza e proteinave
- B) Përmbajnë arn
- C) Përbëhen nga subuniteti i madh dhe i vogël
- D) S'përmbajnë proteina strukturore

58. Nuk është e vërtetë që bërthama:

- A) ka përmasa të ndryshme në qeliza të ndryshme
- B) ka formë të ndryshme në qeliza të ndryshme
- C) përmban material gjenetik në trajtën e ADN
- D) vendoset gjithmonë në qendër të qelizës

59. Indit epitelial ka:

- A) pozicion kufitar
- B) enë gjaku
- C) veti rigjeneruese
- D) polaritet të theksuar në disa lloje qelizash

60. ADN:

- A) Gjendet vetëm në bërthamë
- B) Shoqërohen nga proteinat histone
- C) Organizohet në kromozome
- D) Organizohet në kromatinë

61. Formimi i njëkohshëm i eritrocitit, trombocitit dhe granulociteve realizohet në:

- A) Nyjen limfatike
- B) Lien
- C) Palcën e kuqe të kockave
- D) Hepar

62. Për neuronin është e gabuar që:

- A) është njësia morfologjike dhe funksionale e indit nervor
- B) nuk kanë aftësi të shumohen
- C) aksonet e tij permbajnë lende tigroide
- D) dentritet janë më të shkurtër se aksoni

63. Në veshkë sintetizohen substancat e mëposhtme, përveç:

- A) Reninës
- B) Eritropoetinës
- C) Aldosteronit
- D) Angiotensinogjenit

64. Epiteli i kavitetit oral është:

- A) më i keratinizuar i trupit të njeriut
- B) pseudo-shumështresor prizmatik
- C) i mbuluar në sipërfaqe nga indi muskolor
- D) shumështresor i sheshtë

65. Cili është pohim i gabuar për kompleksin Golxhi?

- A) Vendoset përballë bërthamës
- B) Është më i shprehur në qelizat sekretore
- C) Në to kryhet trafiku më i madh i makromolekulave
- D) Ndërmjet tij dhe rep-it ka komunikim direkt

66. Gjenerimi i qelizave të gjera lidhet me bërthamën:

- A) Madhësia e saj është e ndryshme në qeliza të ndryshme
- B) Qelizat kanë gjithmonë vetëm një bërthamë
- C) Ajo mund të gjendet në dy gjendje fizike
- D) Kromatina është përbërja kryesore e bërthamës

67. Cila nga qelizat e mëposhtme nuk është autoktone në indin

- A) Fibroblastet
- B) Eozinofilet
- C) Qelizat mezenkimale

D) Mastocitet

68. Për eritrocitet është e gabuar që:

- A) kanë bërthamë
- B) përmbajnë proteinën hemoglobinë
- C) kanë formën e diskut bikonkav
- D) kanë funksion transportin e oksigjenit dhe dioksidit të karbonit

69. Për eozinofilet nuk është e vërtetë që:

- A) bëjnë pjesë në seritë granulocitare
- B) kanë granula specifike me nuancë portokalli
- C) kanë bërthamë të rrumbullakët
- D) rritja e numrit të tyre quhet eozinofili

70. Cili funksion nuk i përket neuroglisë?

- A) Mbështetës
- B) Ushqyes
- C) Përcjellës
- D) Kufizues

71. Cilat qeliza nuk përbëjnë mukozën e kavititetit nazal?

- A) Olfaktore
- B) Parietale
- C) Mbështetëse
- D) Kaliciforme

72. Në lëkurën e hollë mungon shtresa:

- A) bazale
- B) e shndritshme
- C) kokrrizore
- D) e brirëzuar

73. Gjени pohimin e gabuar mbi uterusin:

- A) Përbëhet nga tre shtresa
- B) Është vendi i implantimit të vezës së fekunduar
- C) Epiteli i tij përbëhet nga dy shtresa
- D) Shtresa muskulore është më e holla

74. Fibrocitet kanë tipar karakteristike:

- A) Praninë e zgjatimeve të shumta citoplazmatike
- B) Organelet citoplazmatike të zhvilluara
- C) Formën boshtore të bërthamës
- D) Bërthamën eukromatinike

75. Eritrocitet kanë tipar karakteristike:

- A) gjatësinë 60-80 milimetër



- B) ngjyrën blu të bërthamës
- C) diametrin 7-8 mikrometër
- D) formën bikonvekse

76. Bazofilia:

- A) Është mungesa e qelizave bazale
- B) Nuk ekziston sepse bazofilet përbëjnë më pak se 1% të leukociteve
- C) Është ulja e sasise së bazofileve
- D) Është rritje e numrit të bazofileve

77. Palca e kockave nuk ka funksion:

- A) Hematoklazik
- B) Lokomotor
- C) Retikulo-endotelial
- D) Hemopoetik

78. Fijet muskulare të skeletit në prerje tërthore janë:

- A) me formë poligonale
- B) me pamje të vijëzuar
- C) pa bërthamë
- D) me bërthamë në qendër të qelizës

79. Qelizat e mikroglisë në sistemin nervor qendror janë:

- A) me funksion përcjellës
- B) me origjinë nga indi muskular
- C) me funksion fagocitar
- D) përbërëse të mielinës

80. Mukoza olfaktore në kavitetin nazal mbulon:

- A) gjithë sipërfaqen
- B) pjesën superiore
- C) pjesën më të madhe
- D) pjesën inferiore

81. Gjendrat sublinguale:

- A) prodhojnë sekrecion të përzier
- B) prodhojnë sekrecion vetëm seroz
- C) nuk kanë gjysmehënëza të xhianucit
- D) kanë qeliza centroacinare

82. Në përbërje të acinusit pankreatik marrin pjesë edhe

- A) ishujt e Langerhansit
- B) qelizat Sertoli
- C) qelizat Centroacinare
- D) qelizat Beta

83. Në glomerula:

- A) Përqëndrohet urina
- B) Ka qeliza mezangiale
- C) Nuk ka podocite
- D) Sintetizohet eritropoetina dhe renina

84. Në terrenet qelizore nuk nevojiten:

- A) Kushtet aseptike
- B) Antinflammatorët
- C) Bujonet organike
- D) Antibiotikët

85. Shendeti Publik e ka fokusin ne:

- A) Popullate
- B) Individe
- C) Institucione shendetesore
- D) Politika shendetesore

86. Eutanazia pasive:

- A) Eshte e pranueshme në stadin terminal të një sëmundje të pashërueshme
- B) Kërkon dhënien e një sërë medikamentesh që përshpejtojnë
- C) Zgjat vuajtjen e pacientit
- D) Zbatimi i saj është në kundërshtim me konceptin e së drejtës për të vdekur

87. Ekzaminimi objektiv nga pikëpamja etike:

- A) merr për bazë edhe faktorët psikologjikë, shumë të rëndësishëm për pacientin
- B) është më i rëndësishëm se egzaminimi subjektiv
- C) mund të jetë i barasvlefshëm me egzaminimin subjektiv
- D) duhet të jetë gjithmonë i barasvlefshëm me egzaminimin subjektiv

88. Në gjendjen vegjetative ndërprerja e ushqyerjes nazogastrike është e pranueshme sipas:

- A) parimit të totalitetit
- B) konceptit të cilësisë së jetës
- C) konceptit të shenjtërimit të jetës
- D) parimit të konfidencialitetit

89. Sjellja regressive e pacientit e shfaqur gjatë periudhës kalimtare ose të tranzicionit:

- A) është e pakthyeshme
- B) vonon kohën e shërimit të pacientit
- C) është karakteristike për stadin e tretë ose të konvalishencës
- D) është normale për pacientin

90. Kujdesi mjekësor paliativ:

- A) konsiston në zgjatjen e jetës së pacientit
- B) vepron mbi shkakun e një sëmundjeje
- C) përdoret në stadin terminal të një sëmundjeje të pashërueshme

D) përfshin vetëm terapinë psikologjike të pacientit

91. Eutanazia pasive:

A) zgjat jetën e pacientit

B) kërkon përdorimin e terapisë intensive

C) zbatohet në sëmundje të pashërueshme, pavarësisht stadi të

D) refuzon teprimin terapeutik

92. Konsenti është shprehje e parimit:

A) utilitarist

B) të pavarësisë dhe paprekshmërisë së personit

C) të totalitetit

D) konfidencialitetit

93. Cila nga shprehjet e mëposhtme mbi Moralin është e gabuar?

A) Ka të bëjë drejtpërdrejt me veprimet që pasqyrojnë sjelljet e njerëzve

B) Normat janë të dhëna

C) Ka një domethenie më të gjerë dhe më të thellë sesa Etika

D) Në themel të cdo veprimi moral qëndron fjala "duhet"

94. Në teoritë e jo pasojave veprimi është:

A) i drejtë nëse ai është i bazuar vetëm në ligje apo rregullore

B) korrekt nëse funksionon dhe nëse është mëse i domosdoshëm

C) i mirë për aq kohë sa efektet janë të mira

D) i mirë nëse nga ky përfiton vetë personi

95. Mjekimi paliativ:

A) përdoret te një sëmundje e pakurueshme pavarësisht stadi të sëmundjes

B) përfshin vetëm mjekimin me barna të pacientit

C) ruan dinjitetin dhe pavarësinë e pacientit

D) përdoret tek pacientët që vuajnë nga sëmundje kronike

96. Koncepti i cilësisë së jetës, në rrethanat kur jeta e pacientit mbahet në kushte artificiale:

A) ve theksin tek ekzistenca biologjike e jetës, pavarësisht cilësisë

B) mbështet konceptin e karakterit të shenjtë të jetës

C) thekson se jeta e njeriut nuk duhet të zgjatet

D) mbështet zgjatjen e jetës së pacientit

97. Plotësimi i detyrës së parandalimit të sëmundjeve ka çuar në konflikt me parimin e:

A) universalitetit

B) mirëbërësisë

C) konfidencialitetit

D) barazisë

98. Parimi i pavarësisë së pacientit për të refuzuar mjekimin hyn në konflikt me parimin:

A) utilitarist

- B) barazisë
- C) drejtësisë dhe paanshmërisë
- D) mirëbërësisë

99. Simptoma e hospitalitetit është karakteristike për ata pacientë, te cilët:

- A) nuk e durojnë dot varësinë nga të tjerët
- B) e kanë të vështirë të zbatojnë regjimin e këshilluar
- C) fillojnë të preokupohen për vetveten që të rifillojnë punën sa më
- D) e pelqejnë shumë regresionin dhe duan që ta zgjasin atë pambarim

100. Në cilin rast nuk duhet të respektohet sekretin mjekësor:

- A) Sëmundje të trashëguara
- B) Somnambulizmi
- C) Disa sëmundje të rënda infektive
- D) Enuresis nokturna

101. Cili nga pohimet mbi Fatkeqësinë mjekësore është i gabuar?

- A) Eshtë e lidhur me sëmundje të rënda të pacientit
- B) Vjen si pasojë e veçorive individuale të organizmit
- C) Vjen si pasojë e një gabimi apo pakujdesie të njeriut të
- D) Eshtë pasojë e ndërlikimeve gjatë procedurave të ndryshme

102. Jatrogjenitet mund të njihen ndryshe dhe si:

- A) gabime diagnostike
- B) fatkeqësi mjekësore
- C) sëmundje sugjestionuese në mjekësi
- D) gabime terapeutike

103. Lëvizja "Hospike" iu ofron ndihmë:

- A) të sëmurëve kronikë
- B) pacientëve me nivel të ulët ekonomik
- C) të sëmurëve të pashpresë për jetën
- D) të sëmurëve handikapatë

104. Tek pacientet e moshuar ka:

- A) shtim të perceptimit të dhimbjes
- B) ulje të pragut të dhimbjes
- C) dhimbje atipike
- D) rigjenerim të neuroneve në palcën shpinore

105. Cili nga pohimet e mëposhtme që lidhen me Teprimin terapeutik është i gabuar?

- A) Përdoret tek pacientet në stadin terminal të sëmundjes
- B) Ka për qëllim zgjatjen e jetës së pacientit
- C) Nga pikëpamja etike pranohet në bazë të konceptit të së drejtës për te vdekur
- D) Eshtë në përputhje me konceptin e shenjtërimit të jetës

106. Testamenti i jetës:

- A) i paraprin përdorimit të eutanazisë aktive
- B) shkruhet nga pacienti në momentet e fundit të jetës së tij
- C) hyn në fuqi pas vdekjes së pacientit
- D) mbështetet në zbatimin e konsentit

107. Pranimi zyrtar i Eutanazisë aktive do të rritë mundësitë për:

- A) kërkime në fushën e mjekësisë paliative
- B) zbulimin e ndonjë medikamenti të ri për shpëtimin e pacientit
- C) abuzime të ndryshme me pacientët
- D) përjashtimin e ndonjë diagnoze të gabuar në lidhje me pacientin

108. Gabimet mjekësore të shkaktuara nga vetë njerëzit e shëndetësisë quhen:

- A) gabime diagnostike
- B) jatrogjeni
- C) gabime tekniko- kuruese
- D) gabime taktiko- kuruese

109. Cila nga shprehjet e mëposhtme në lidhje me dashjen kriminale është e gabuar?

- A) Bën pjesë në Shkeljet e Kodit Penal
- B) Quhet krim mjekësor
- C) Bën pjesë në shkeljet e Kodit Deontologjik
- D) Kryhet me qëllim nga njeriu i shëndetësisë

110. Në dhimbjen akute pacienti:

- A) flet për dhimbjen vetëm po të pyetet
- B) është i përqendruar në dhimbje
- C) interesohet më tepër për probleme të tjera sesa për dhimbjen
- D) ka shprehje normale të fytyrës

111. Në dhimbjen kronike pacienti:

- A) shfaq grimasa në fytyrë
- B) flet shumicën e kohës për dhimbjen
- C) qan dhe rënkon gjithë kohën nga dhimbja
- D) ka shenja depresioni

112. Ligji i nje shteti vepron:

- A) në të gjithë territorin e atij shteti,
- B) në atë shtet dhe në shtete afër tij,
- C) vetëm në sipërfaqen tokësore të shtetit,
- D) vetëm në hapësirën ajrore.

113. Tabletat janë:

- A) ekstrakte alkalike
- B) pluhura të komprimuara në makineri të posaçme
- C) forma farmaceutike të buta që përdoren për lyerjen e lëkurës

D) tretësira ujore që përdoren me anë të aparateve të posaçme

114. Rrugë natyrale e marrjes së barit është:

- A) Subkutane
- B) Intramuskulare
- C) Intravenoze
- D) Inhalatore

115. Gjate administrimit të barit me rrugë intravenoze:

- A) efekti i barit është i ngadaltë
- B) efekti i barit është i kontrollueshem
- C) nuk mund të japim sasi të madhe bari
- D) reaksionet anafilaktike janë më të lehta

116. Takifilaksia është:

- A) intolerancë e lindur e organizmit ndaj një bari të caktuar
- B) fenomeni i mbarimit të shpejtë të efektit të një bari ndonëse administrimi i tij vazhdon
- C) formë e veçante e ambientimit
- D) ndjeshmeria e rritur e fituar e organizmit nga marrja e përsëritur e barnave

117. Adrenomimetiket shkaktojnë:

- A) Mioze
- B) Ngushtim të bronkeve
- C) Rritje të levizshmërisë së zorrëve
- D) Nxitje të sistemit nervor qendror

118. Adrenomimetiket nuk duhen dhënë në të sëmurët:

- A) Astmatike
- B) Bradikardike
- C) Me arrest kardial
- D) Hipertonike

119. Adrenalina nuk duhet kombinuar me:

- A) Betablokuesit
- B) Analgjeziket opioide
- C) Benzodiazepinat
- D) Barbiturate

120. Alfa-adrenoblokuesit përdoren për mjekimin e:

- A) Hipotensionit
- B) Takikardisë
- C) Insuficiencës kardiake
- D) Depresionit

121. Efekti anësor kryesor i alfa-adrenoblokuesve është:

- A) Hipotensioni i theksuar postural

- B) Retensioni urinar
- C) Diareja
- D) Dhimbje artikulare

122. Beta-blokuesit perdoren per mjekimin e:

- A) Podagres
- B) Diabetit
- C) Takiaritmive
- D) Bronkitit kronik

123. Beta-blokuesit kunderindikohen ne:

- A) Insuficiencen kardiake
- B) Hypertension
- C) Takikardi
- D) Ne semundjen migrenoze

124. Kolinomimetiket shkaktojne:

- A) Midriaze
- B) Ulin djersitjen
- C) Bradikardi
- D) Bronkodilatacion

125. A.C.E inhibitoret kunderindikohen ne:

- A) Hipertension
- B) Diabet
- C) Hiperkalemi
- D) Insuficience kardiake

126. Kolinomimetiket perdoren per mjekimin e:

- A) Glaukomes
- B) Astmes bronkiale
- C) Bradikardive
- D) Diareve acute

127. M-kolinoblokuesit shkaktojne:

- A) Mioze
- B) Shtim te sekrecioneve bronkiale
- C) Bronkodilatacion
- D) Bradikardi

128. M-kolinoblokuesit perdoren per mjekimin e:

- A) Kolikes renale
- B) Glaukomes
- C) Hipertrofise se prostates
- D) Hipertermise

129. M-kolinoblokuesit kunderindikohen ne:

- A) Ulceren peptike
- B) Parkinson
- C) Bradikardi
- D) Atonite intenstinale

130. Efekti anesor kryesor qe vihet re gjate perdorimit te miorelaksanteve është:

- A) Apnea
- B) Hipertensioni
- C) Hipernatremia
- D) Hipotermia

131. Morfina shkakton:

- A) Midriaze
- B) Frenim te qendres se frymemarrjes
- C) Shton oreksin
- D) Diare

132. Aspirina perdoret per mjekimin e:

- A) Ethes reumatizmale
- B) Per uljen e temperatures ne moshat pediatrike
- C) Insuficiences renale
- D) Parkinsonit

133. Aspirina kunderindikohet ne:

- A) Hipertension
- B) Uljen e temperatures
- C) Dhimbjet e kokes
- D) Ulceren gastro-duodenale

134. Bari i zgjedhur per mjekimin e atakut gutoz është:

- A) Allopurinoli
- B) Probenicidi
- C) Sulfipirazoni
- D) Kolkicina

135. Cili nga keto barna anestezik jep rritje te tensionit arterial?

- A) Tiopentali
- B) Midazolami
- C) Ketamina
- D) Fentanyli

136. Benzodiazepinat shfaqin efekt:

- A) Eksitues
- B) Hipertensiv
- C) Myorelaksant



D) Anksioz

137. Barbiturate kunderindikohen ne:

- A) Epilepsi
- B) Porfiri
- C) Hypertension
- D) Takikardi

138. Bari i zgjedhur per mjekimin e statusit epileptik është:

- A) Acidi Valproik
- B) Karbamazepina
- C) Diazepami
- D) Trimetadioni

139. Antipsikotiket kunderindikohen ne:

- A) Parkinson
- B) Alzheimer
- C) Skizofreni
- D) Ne pacientet me te vjella

140. Kriperat e litiumit perdoren per mjekimin e:

- A) Epilepsise
- B) Parkinsonit
- C) Gjendjes maniakale
- D) Miastenise grave

141. Kofeina perdoret per mjekimin e:

- A) Insuficiences acute cirkulatore
- B) Hipertensionit
- C) Takikardise
- D) Hipertireoze

142. Glukozidet kardiake perdoren per mjekimin e:

- A) Hipertensionit
- B) Insuficiences kardiake
- C) Fibrilacionit ventricular
- D) Perikarditit adeziv

143. Glukozidet kardiake kunderindikohen ne:

- A) Flaterin atrial
- B) Fibrilacionin atrial
- C) Infarktin e miokardit
- D) Takikardine paroksizmale supraventrikulare

144. Kinidina perdoret per mjekimin e:

- A) Aritmive atriale

- B) Astmes bronkiale
- C) Parkinsonit
- D) Epilepsise

145. Bari qe preferohet ne aritmite e shkaktuara nga helmimi me digitalike është:

- A) Verapamili
- B) Amidaroni
- C) Difenidani
- D) Lidokaina

146. Bari qe preferohet ne mjekimin e krizes anginoze eshte:

- A) Propanololi
- B) Kinidina
- C) Digoksina
- D) Trinitrina

147. Cili nga barnat kalçiblokues mund te perdoret edhe si

- A) Nifedipina
- B) Verapamili
- C) Amlodipina
- D) Nikardipina

148. Diuretiket tiazidike kunderindikohen ne:

- A) Hipertoni
- B) Insuficiencen renale
- C) Edemen kardiake
- D) Edemen hepatike

149. Kufizimi i proteinave rekomandohet ne:

- A) shtatzeni
- B) semundjet e veshkave
- C) diabet mellitus
- D) semundjet e tiroides

150. Kufizimi i yndyrnave rekomandohet ne:

- A) steatozen hepatike
- B) diabetin mellitus
- C) cirrozen hepatike
- D) nenpeshe

151. Proteinat duhet te zene ne kalorazhin ditor:

- A) 30%
- B) 50%
- C) 20%
- D) 40%

152. Konstitucioni android karakterizohet nga perimetri:

- A) abdominal = perimetri gluteal
- B) abdominal > perimetri gluteal
- C) torakal > perimetri gluteal
- D) gluteal > perimetri abdominal

153. Obeziteti eshte pjese e:

- A) Sindromit metabolik
- B) Sindromit nefrotik
- C) Sindromit koronar akut
- D) Sindromit radikular

154. Veza permban me teper:

- A) Yndyrna
- B) Fibra
- C) Proteina
- D) Karbohidrate

155. Kalorazhi ditor per nje peshe ideale tek meshkujt varion:

- A) 2000-2500 kal/dite
- B) 1500-2000 kal/dite
- C) 2500-3000 kal/dite
- D) 2000-3000 kal/dite

156. Lipidet duhet te zene ne kalorazhin ditor:

- A) 70%
- B) 20%
- C) 30%
- D) 10%

157. Magneziumi gjendet me shumice tek:

- A) peshku
- B) bulmeti
- C) dritherat
- D) perimet

158. BMI = 23 shpreh:

- A) mbipeshe
- B) obezitet
- C) peshe ideale
- D) nenpeshe

159. Jodi gjendet me pak tek:

- A) portokalli
- B) veza
- C) geshtenja

D) lakra

160. Obeziteti morbid i korrespondon:

- A) BMI = 30
- B) BMI = 25
- C) BMI > 40
- D) BMI > 35

161. Konstipacioni tregon deficit ne:

- A) proteina
- B) yndyrna
- C) vitamina
- D) fibra

162. Obeziteti eshte i shpeshte ne:

- A) diabetin mellitus tip 2
- B) bulimi
- C) HTA
- D) depression

163. Pacientet me kalkuloze renale duhet te kufizojne me teper:

- A) lengjet
- B) proteinat
- C) bulmetin
- D) frutat

164. Grate shtatzena nenpeshe duhet te respektojne kalorazhin ditor:

- A) te njejte me shtatzanat me peshe normale
- B) dyfishin e kalorazhit normal
- C) ne varesi te BMI
- D) ne varesi te gjatesise trupore

165. Acidi folik eshte i domosdoshem ne:

- A) menopauze
- B) pubertet
- C) shtatzani
- D) periudhen pas lindjes

166. Karbohidratet duhet te zene ne kalorazhin ditor:

- A) 50%
- B) 30%
- C) 20%
- D) 10%

167. Vegjetarianet preken me shpesh nga:

- A) semundjet kardio-vaskulare

- B) anemia
- C) obeziteti
- D) diabeti mellitus

168. Kalorazhi ditor per nje peshe ideale tek femrat varion:

- A) 2000-2500 kal/dite
- B) 1500-2000 kal/dite
- C) 2500-3000 kal/dite
- D) 2000-3000 kal/dite

169. Cili frut u rekomandohet me teper personave me mbipeshe?

- A) molla jeshile
- B) manaferrat
- C) banane
- D) kivi

170. Konstitucioni genoid karakterizohet nga:

- A) perimetri abdominal<perimetri gluteal
- B) perimetri abdominal=perimetri gluteal
- C) perimetri torakal>perimetri gluteal
- D) perimetri gluteal<perimetri abdominal

171. Nje person me BMI 35 duhet t`i nenshtrohet nje diete:

- A) hypokalorike me 2400 kalori
- B) hypokalorike me 1400 kalori
- C) hypokalorike me 1000 kalori
- D) hypokalorike me 3000 kalori

172. Personat me hipertension arterial duhet te kufizojne:

- A) proteinat
- B) perimet
- C) mishin
- D) kripten ne ushqim

173. Ngrenia e tepert e karbohidrateve mund te shkaktoje:

- A) diabet te sheqerit
- B) mbipeshe
- C) te vjella
- D) diarre

174. Kalorazh me te madh per njesi grammi kane:

- A) yndyrnat
- B) kriperat minerale
- C) karbohidratet
- D) proteinat

175. Yndyrnat bimore jane te pasura me:

- A) acide yndyrore te pangopura
- B) kolesterol
- C) trigliceride
- D) acide yndyrore te ngopura

176. BMI = 17 shpreh:

- A) mbipeshe
- B) obezitet
- C) peshe ideale
- D) nenpeshe

177. Cili frut u rekomandohet me teper diabetikeve?

- A) rrushi
- B) molla
- C) fiku
- D) portokalli

178. Kalorazhi ditor i grave shtatzana eshte:

- A) i njejte me grate normale
- B) me i vogel se grate normale
- C) me i madh se grate normale
- D) varet nga BMI e gruas ne fillim te shtatzanise

179. Rritja e yndyrnave ne gjak shkaktohet nga konsumimi me teper i:

- A) mishit te vicit
- B) mishit te pules
- C) mishit te qingjit
- D) peshkut te liqenit

180. Konsumimi i tepert i bulmetit mund te shkaktoje:

- A) osteoporoze
- B) rakitizem
- C) gure ne rruget urinare
- D) obezitet

181. Marrja e proteinave zakonisht rekomandohet ne:

- A) semundjet e gjakut
- B) pubertet
- C) semundjet e kockave
- D) semundjet e mushkerive

182. Konsumimi i peshkut kufizohet gjate:

- A) shtatzanise
- B) pubertetit
- C) menopauzes

D) laktacionit

183. Vitamina E rekomandohet ne:

- A) dhimbjet e kokes
- B) renien e flokeve
- C) anemi
- D) osteoporozë

184. Regjimi ushqimor per nje peshe ideale duhet te permbaje:

- A) 3 vakte/dite
- B) 4 vakte/dite
- C) 5-6 vakte te vogla/dite
- D) 3 vakte te medha dhe 3 vakte te vogla/dite

185. Karbohidratet e keqia permbahen me me shumice tek:

- A) buka
- B) perimet
- C) drithert
- D) frutat

186. Studimi deskriptiv:

- A) Ben vetem pershkrimin e gjerave,
- B) Nuk perdoret per studimin e ekspozimeve,
- C) Nuk perdoret per studimin e efekteve,
- D) Perdoret vetem per ekspozimet.

187. Studimet ekologjike:

- A) Njesia e anelizes eshte individi,
- B) Jane te dobishme per gjenerimin e hipotezave,
- C) Vleresohen te plota per percaktimin e shkakesise,
- D) Jane te kushtueshme.

188. Kontrolli i ekspozimit ndaj Faktoreve Demtues ne nivel personi:

- A) Duhet menduar si zgjidhja kryesore,
- B) Lidhet me numrin e personave te ekspozuar,
- C) Nuk ka te beje me rregullimin e kohes se ekspozimit,
- D) Nuk ka te beje me nderrimin e detyrave.

189. Indikatorret per monitorimin e riskut:

- A) Nuk ka vlere besueshmeria,
- B) Nuk eshte e rendesishme lehtesia e matjes,
- C) Nuk duhet te jene te lidhur ngushte me risqet,
- D) Duhet te shfaqen shpejt pas ekspozimit

190. Kalimi i lendeve toksike ne gjak:

- A) Nuk lidhet me perqendrimin,

- B) Varet nga kohezgjatja e ekspozimit,
- C) Nuk lidhet me tretshmerine e l. toksike ne inde,
- D) Nuk varet nga sasia e ajerit te thither.

191. SO<sub>2</sub> si lende ndotese ne ajer:

- A) Efekti kryesor-demtimi i trurit,
- B) Nuk ka lidhje me rreshjet acid,
- C) Ndotesi kryesor me permbajtje squfuri,
- D) Eshte bere problem vetem dekadat e fundit.

192. Fluoruret:

- A) Futen ne organizem kryesisht me ane te ushqimeve,
- B) Merren ma ane te ujit te pishem,
- C) Mungesa e tyre ne uje ul incidencene kariesit,
- D) Flurore me pakice-shfaqeje e flurozes.

193. Pamjaftueshmeria e hekurit:

- A) Risku i anemise nuk eshte madh per grate,
- B) Nuk ndikohet nga parazitozat,
- C) Ndikohet nga dieta,
- D) Haset me shume ne vendet e zhvilluara

194. Efektet shendetesore te pesticideve:

- A) Nuk prekin sistemin imun te organizmit,
- B) Nuk prekin organet e riprodhimit,
- C) Nuk demtojne lekuren,
- D) Kane efekte teratogjenike.

195. Strehimi dhe shendeti:

- A) Strehimi nuk ndikon mbi incidencat semundjeve ngjitese,
- B) Risku per Ca pulm nuk lidhet me strehimin,
- C) Shendeti psikosocial ndikohet nga dendesia e banimit,
- D) Strehimi nuk ka te beje me aksidentet

196. Efektet ekstraauditive te zhurmave:

- A) Nuk lidhen me presionin arterial,
- B) Nuk ka crregullime te gjumit,
- C) Ndikon mbi sistemin imun,
- D) Rritja e irritabilitetit SNQ

197. Programi i nje qyteti te shendetshem:

- A) Zgjedhjet jane multisektoriale,
- B) Rritje e pjesemarrjes ne vendimmarrje,
- C) Roli i publikut i paperfillshem,
- D) Nje akt dhe jo process ne vazhdimesi.



198. Lendet djegese te biomases:

- A) Nuk permbajne pjeseza te respirueshme,
- B) Permbajne (SO)<sub>x</sub>,
- C) Problem ne vendet e varfera,
- D) Nuk permbajne HPA

199. Shendetit mjedisor:

- A) Nuk lidhet me kualitetin e jetes,
- B) Nuk ndikohet nga faktoret sociale,
- C) Ka lidhje me agjentet biologjike,
- D) Jo lidhje me shendetin e gjeneratave pasardhese.

200. Ekspozimi:

- A) Nuk merr ne konsiderate llojin e ndotesit,
- B) Ndikohet nga elementi kohe,
- C) Nuk ka lidhje me sasine e ndotesit,
- D) Nuk merr parasysh futjen e ndotesit

201. Tranzicioni demografik:

- A) Lidhet me numrin e vdekjeve,
- B) Nuk ndikohet nga numri i lindjeve,
- C) Ndikon mbi numrin e popullates,
- D) Nuk ka lidhje me shendetin

202. Problemet e shendetit mjedisor:

- A) Lidhen me migrimin, lindjet, etj,
- B) Nuk ndikohen nga varferia,
- C) Nuk lidhen me konsumin,
- D) Nuk ndikohen nga politikat makroekonomike.

203. Vleresimi i ekspozimit human:

- A) Doza matet me lehtesi,
- B) Me mire matja e perqendrimit,
- C) Doza e marre nuk varet nga vecorite e individit,
- D) Doza eshte ne funksion te kohes se ekspozimit

204. Metodot direkte te vleres se ekspozimit:

- A) Perfshijne metodat matematikore,
- B) Perdoren aparatet vetiake te monitorimit,
- C) Perdoren pyetesoret,
- D) Perdoren ditaret e punetoreve.

205. Varferia:

- A) Nuk ka lidhje me jetegjatesine
- B) Nuk lidhet me vdekshmerine foshnjore
- C) Nuk ndikon mbi incidencen e semundjeve ngjitese

D) Ndikon mbi incidencen e paaftesise

206. Fusha elektromanjetike:

- A) Eshte nje rezatim i llojit jonizues
- B) Nuk haste rreth linjave elektrike
- C) Shkakton kataraktin e syrit
- D) Mund te shkaktoje kancerin

207. Zhiva (Merkuri):

- A) Nxirret ne mjedis nga automjetet
- B) Perdoret si antiseptic/antifungal
- C) Nuk haset ne prodhimin e pasqyrave
- D) Nuk haset ne punimet e veshjes me ar

208. Indikatoret e shendetit mjedisor:

- A) ESH e perdour duhet te shfaqet pas nje kohe te gjate
- B) Te jene te lidhur me risqet dhe ekspozimin
- C) Nuk ka rendesi lehtesia e matjes
- D) Nuk ka vlere besueshmeria

209. Perfitim i drejtperdrejte nga manaxhimi i nje ESHM:

- A) Nuk lidhen me jetet e fituara
- B) Nuk kane te bejne me vitet e fituara te jetes
- C) Nuk lidhen me vdekshmerine
- D) Lidhen me kursimet ne sistemin shendetesor

210. Akumulimi i lendeve ndotese ne ajer:

- A) Nuk lidhet me relievin e tokes
- B) Nuk lidhet me levizjet e ajrit
- C) Lidhet me rezatimin diellor
- D) Nuk lidhet me inversionet temperatore

211. Semundjet qe perhapen me ane te ajrit:

- A) Malarja
- B) Ethet Dengue
- C) Schistosomiaza
- D) Tifoja

212. Efektet toksike te pesticideve:

- A) Nuk lidhet me substancat mbajtese
- B) Lidhen me rrugen e ekspozimit
- C) Nuk lidhen perberes qe permiresojne absorbimin
- D) Nuk lidhet me dozen

213. Vendbanimet humane si ekosisteme:

- A) Nuk lidhen me furnizimin me uje

- B) Nuk ndikohen nga ujerat e hapura
- C) Nuk lidhen me kushtet per jeten e eger
- D) Lidhen me qeverisjen lokale

214. Tranzicioni demografik:

- A) Nr. i vdekjeve eshte i ulet
- B) Nr. i lindjeve eshte i ulet
- C) Perben nje periudhe
- D) Perben nje moment

215. Rreziqet fizike jane ato:

- A) nga mjetet motorrike
- B) nga sportet
- C) nga rrezatimet
- D) demtimet ne vendin e punes

216. Studimet e toksicitetit akut:

- A) Perdoren per matjen toksikite te lendeve
- B) Jane mjaftueshem per karakterizuar nga toksicitet, kimikat
- C) Perdoren per kancerogenet
- D) Nuk perfshijne DL50 dhe PL 50

217. Treguesi i viteve potenciale te humbura te jetes:

- A) Tenton te gjykoje humbjen e jetes humane
- B) Nuk lidhet me nr e viteve produktive te jetes qe humbasin
- C) Perdoret per te pershkruar humbjen e kontributeve
- D) Demtimet shpjegojne nje vogel te VPHJ

218. Indikatorët ne shendetin mjedisor:

- A) Jane te domosdoshem ne monitorimin e riskut
- B) Nuk lidhen me jetegjatesine e prishme
- C) Nuk perfshijne peshen ne lindje
- D) Nuk perfshijne vdekjet e parakohshme

219. Kontrolli i cilesise se ajrit te jashtem:

- A) Lidhet me vendet e ndertimit
- B) Lidhet me kontrollin e emisioneve
- C) Nuk lidhet me transportin
- D) Nuk lidhet me energjine

220. Kerkesat energjitike te organizmit:

- A) Nuk maten me K Joul
- B) Nuk lidhen me permasat trupore
- C) Ndikohen nga klima
- D) Nuk varen nga gjendja fiziologjike

221. Zgjedhja e ushqimeve:

- A) Nuk lidhet me ndikimet kulturore
- B) Nuk varet nga mundësia e sigurimit të ushqimeve
- C) Nuk varet nga shija, era, paraqitja
- D) Varet nga kostoja dhe pershtatshmeria

222. Encefalopatia spongiforme:

- A) Shkaktohet nga nje bakter
- B) Shkaktohet nga nje ameba
- C) Ka si vektor kepushat
- D) Perhapet me ushqimin e gjedhit

223. Energjia dhe efektet direkte mbi shendetin:

- A) Jo rrezik te rendesishem profesional
- B) Jo stres psikologjik
- C) Ndryshime ekologjike
- D) Jo permiresim te vaditjes

## 12. E Përgjithshme Klinike

1. Lupusi Eritematoz Sistemik prek me teper:

- A) femrat me moshen e riprodhimit
- B) meshkujt
- C) grate ne menopauze
- D) meshkujt ne pubertet

2. Lupusi Eritematoz Sistemik prek me teper:

- A) Femrat e bardha
- B) Femrat me ngjyre
- C) Meshkujt e bardhe
- D) Meshkujt me ngjyre

3. Per Lupusin Eritematoz Sistemik jane te gjitha te verteta pervec:

- A) Semundja mund te preki cdo organ apo sistem
- B) Fillon me shenja te pergjithshme: dobesi, temperature subfebrile, lodhje
- C) Semundja ka shfaqje ne lekure
- D) Nuk shoqerohet me alterime hematologjike

4. Lupusi Medikamentoz nuk:

- A) Eshte nje sindrome me shfaqje klinike dhe imunologjike te ngjashme me LES
- B) Shkaktohet nga prokainamidi, hidralazina, izoniazidi, metildopa, klorpromazina
- C) Jane te rralla prekja e SNQ dhe demtimet renale
- D) Demtimet ne organet e brendeshme jane te parikthyeshme

5. Antikorpjet antinuklear:

- A) Perbejne nje shenje laboratorike kryesore ndonese jo specifike per LES

- B) Nuk jane pozitive ne patologji te tjera
- C) Shikohen ne mikroskop te zakonshem
- D) Nuk perbehet nga nentipa antikorpesh

6. Per mjekimin e LES perdoren te gjitha preparatet e meposhtme pervec:

- A) Preparate AIJS
- B) Antimalarike te sintezes
- C) Preparate citotoksike
- D) Levotiroksine

7. Artriti Reumatoid eshte nje semundje per te cilen jane te verteta te gjitha pervec:

- A) Prek afersisht 0.8% te popullates
- B) Femrat preken me shume se meshkujt
- C) Semundja eshte me shpeshte ne dekadene e pare dhe te dyte te jetes
- D) Karakterizohet nga prania e sinoviteve inflamatore persistentete

8. Artralgjia ne Artritin Reumatoid eshte:

- A) Jo simetrike
- B) Pa rritje te ndjeshmerise gjate palpimit dhe enjtje te artikulacioneve te prekura
- C) Preken me shume artikulacionet e vogla te gishtave
- D) Inflamacioni per kohe te gjate nuk shkakton deformim artikulacionesh

9. Shfaqet ekstrartikulare te AR perfshijne te gjitha pervec:

- A) Prekjen pulmonare
- B) Crrregullimet hematologjike
- C) Crrregullimet okulare
- D) Pranine e hiperkeratozes dhe atrofise se lekures

10. Sklerodermia:

- A) Patogjeneza e semundjes eshte e sqaruar plotesisht
- B) Nuk eshte e lidhur me faktore nderveprues gjenetik dhe mjedisor
- C) Karakteristike per semundjen eshte prania e fibrozese se lekures
- D) Semundja prek me teper meshkujt se femrat

11. Dermatomioziti dhe polimioziti:

- A) Nuk jane semundje autoimune
- B) Te semuret nuk ankohen per dobesi dhe dhimbje muskujsh
- C) Keta te semure kane alterime te cpk, sgot, sgpt, cpk
- D) Keta te semure nuk kane autoantikorpe

12. Rashi ngjyre lejla rreth syve eshte tipik per:

- A) Dermatomiozitin
- B) Polimiozitin
- C) Sindromin sjogren
- D) Sklerodermine

13. Te semuret me miopati kane:

- A) Dobesi te muskujve distale
- B) Dobesi te muskujve proksimale
- C) Dobesi te qafes
- D) Nuk kane shqetesime te lokalizuara

14. Ne polimiozit jane te pranishme antikorpet:

- A) ANA
- B) Anti-dsadm
- C) FR
- D) Jo-1

15. Mjekimi ne dermatomiozit:

- A) Efekti i tij vleresohet permes ndryshimit te vlerave te CPK
- B) Perdoret metformina dhe AIJS
- C) Mjekohet me ACE inhibitor dhe beta bllokues
- D) Semundja eshte e perkoheshme dhe nuk ka nevojte per mjekim

16. Klasifikimi i vaskuliteve paresore bazohet ne:

- A) Agresivitetin e semundjes
- B) Permasat e vazave te prekura
- C) Ekzistojne dy klasa vaskulitesh
- D) Nuk ka ndryshuar gjate viteve

17. Granulomatoza Wegener eshte:

- A) Vaskulit i vazave te medha
- B) Eshte vaskulit granulomatoz i aparatit respirator i shoqeruar dhe me glomerulonefrit
- C) Te semuret nuk kane demtime otojatrike
- D) Eshte vaskulit i vazave mesatare

18. Spondiliti ankilozant eshte semundje:

- A) e femrave ne dhjetevjecarin e katert te peste te jetes
- B) e meshkujve ne dhjetevjecarin e dyte dhe te trete te jetes
- C) e grave ne menopauze
- D) infektive

19. Spondiliti ankilozant eshte semundje inflamatore qe prek:

- A) Kryesisht artikulacionet e anesive
- B) Nuk fillon me shenjta e sakroileitit
- C) Prek zakonisht shtyllen kurriore dhe artikulacionet sakroiliake
- D) Dekursi natyror i semundjes nuk perfundon ne invalidizim te plote

20. Ne spondilitin ankilozant FR dhe ANA:

- A) jane negative
- B) eshte pozitive
- C) jane pozitive

D) është pozitive ANA është negative

21. Ankesat e te semurit me spondilit ankilozant:

- A) Rendohen nga aktiviteti fizik
- B) Nuk ndikohen nga aktiviteti fizik
- C) Ngurtesimi mengjezor zgjat 15 min
- D) Ankesat e te semurit rendohen ne mengjes dhe permiresohen gjate aktivitetit fizik

22. Spondiliti ankilozant mjekohet:

- A) Me terapi medikamentoze dhe terapi fizike
- B) Vetem me terapi medikamentoze
- C) Vetem me terapi fizike
- D) Nuk ka nevojë për mjekim shumë të gjatë pothuajse gjithë jetën

23. Acidi urik:

- A) Prodhimi i tij nuk lidhet ngushtë me metabolizmin e purinave
- B) Hiperuricemia është karakteristike e goutes
- C) Në goutacidi urik në plazëm dhe lëngun jashtë qelizor është në vlera normale
- D) Hiperuricemia është rezultat i vetëm një crregullimi

24. Podagra fillon zakonisht në:

- A) Artikulacionin e gjurit
- B) Artikulacionet e gishtave të duarve
- C) Artikulacionin e qafes
- D) Gishtin e madh të kembes

25. Faktore risku për krijimin e infeksioneve të rrugëve urinare janë të gjitha përveç:

- A) Shtatzënia
- B) Diabeti
- C) Aktiviteti seksual
- D) Prania e osteoartritit bashkeshoqerues.

26. Pamja radiologjike e shkëpit të bambuse është tipike për cilën patologji:

- A) LES
- B) AR
- C) Polimiozit
- D) Morbus Bekteriev

27. Sakroileiti është shenjë fillestare e ciles prej këtyre patologjive:

- A) Sklerodermi
- B) Artrit reumatoid
- C) Osteoartrit
- D) Morbus Bekteriev

28. Aspirina nuk ka efekt:

- A) analgjezik

- B) antinflamator
- C) antipiretik
- D) sedativ

29. Guret ne veshka:

- A) Nuk shkaktohen nga hiperkalciuria apo hiperoksaluria
- B) Levizja e gurit ne sistemin ekskretor nuk shkakton dhimbje
- C) Guret e pelvisit renal mund te jene asimptomatike apo te shkaktojne vetem hematuri
- D) Shume pak prej gureve perbehen nga oksalatet e kalciumit

30. Me ane te bronkoskopise realizohen te gjitha pervec:

- A) Vleresimit te anomalive
- B) Vleresimit te rrugeve percjellese te ajrit
- C) Marrjen e biopsise
- D) Ndhimes ne venien e diagnozes se embolise pulmonare

31. Etiopatogjeneza e bronkitit kronik mendohet te lidhet me shkaktohet e meposhtem pervec:

- A) Me tymin e duhanit
- B) Ekspozimi ndaj pluhurave profesionale
- C) Infeksione te shkaktohet nga mykoplazma pneumonie
- D) Ndotja atmosferike

32. Pneumoni shkaktojne te tera pervec:

- A) Shigella dysantheriae
- B) Klamidia
- C) Rikeciet
- D) Mykoplazma

33. Rol te rendesishem ne vendosjen e diagnozes se pneumonise ka:

- A) Radiografia pulmonare
- B) Torakocenteza dhe biopsia e pleures
- C) Shintigrafia
- D) Testet kutane

34. Mjekimi i cirrozës alkolike perfshin te gjitha pervec:

- A) Diete
- B) Nderprerje te marrjes e alkolit
- C) Vitamin terapi
- D) Voltaren ne doze te larte

35. Faktor madhor rrisht per SAK jane te tere pervec:

- A) Dislipidemia
- B) Niveli i larte i kolesterolit
- C) Inaktiviteti fizik
- D) Anamneza familjare



36. Faktor risku per Sak jane te gjitha pervec:

- A) Anamneza familjare
- B) Perdorimi i alkolit
- C) Gjendja social ekonomike
- D) Perdorimi i substancave kozmetike

37. Ne IRA prerrenale demtimi renal eshte rezultat i te gjitha pervec:

- A) Humbje e volumit nga trakti gastrointestinal
- B) Humbje kutaneale e volumit (djegjet)
- C) Humbje e volumit si rezultat i hemoragjise interne dhe ekstrene
- D) Demtimit strukturor i nefroneve

38. Oliguria percaktohet si sekretimi i:

- A) me pak se 400 ml/ urine ne dite
- B) me pak se 200 ml/ urine ne dite
- C) me shume se 3 l/ urine ne dite
- D) me pak se 100 ml/urine ne dite

39. Anuria percaktohet si sekretimi i:

- A) me pak se 300 ml/ urine ne dite
- B) me pak se 400 ml/ urine ne dite
- C) me shume se 2 l/ urine ne dite
- D) me pak se 100 ml/urine ne dite

40. Ne crregullimet e ritmit nuk bën pjesë:

- A) Takikardia sinusale
- B) Bradikardia sinusale
- C) Flateri atrial
- D) Infarkti i miokardit

41. Crregullimet e ritmit sinusal perfshijne te gjitha pervec:

- A) Takikardia sinusal
- B) Bradikardia sinusale
- C) Fibrilacioni atrial
- D) Aritmia sinusale dhe disfunksioni i nyjes sinusale.

42. Polakiuria eshte urinim:

- A) naten
- B) me djegje
- C) i shpeshte
- D) i dhimbshem

43. Enuresis nocturna eshte urinim:

- A) i dhimbshem
- B) me djegje
- C) i shtuar

D) naten

44. Lupusi eritematoz sistemik eshte semundje qe prek:

- A) meshkujt me shpesh se femrat
- B) femrat e bardha me shpesh se ato me ngjyre
- C) me shpesh femrat dhe ka incidence me te madhe ne grate me ngjyre
- D) njelloj si meshkujt dhe femrat

45. Tiroidja normale:

- A) Eshte e palpueshme
- B) Nuk eshte e palpueshme
- C) Eshte e palpueshme vetem tek meshkujt
- D) Eshte e palpueshme vetem tek femrat

46. Per mjekimin e morbus Graves perdoren te gjitha pervec:

- A) Karbimazoli
- B) Metimazoli
- C) Indometacina
- D) Propiltiuracili

47. Shkaktare te hipertiroidizmit jane te gjitha pervec:

- A) Semundjet autoimune
- B) Patologji tumorale
- C) Patologji inflamatore
- D) Atireoza

48. Morbus Basedov:

- A) Prek me shpesh femrat e moshes 30 deri ne 50 vjec
- B) Mungon ekzofthalmia
- C) Funkzioni kardiak eshte normal
- D) Mungon osteoporoza

49. Rreziqet e hipotiroidizmit jane te gjitha pervec:

- A) Koma miksedematoze
- B) Aksidentet kardiake
- C) Prania e astenise
- D) Nervoziteti

50. Eshte i pranishem diabeti kur Glicemia esell ne dy dozime eshte me e larte se:

- A) 1.40 g/l
- B) 2.40 g/l
- C) 0.20 g/l
- D) 0.10 g/l

51. Ne komplikacionet metabolike akute te diabetit hyjen te gjitha pervec:

- A) Acidoketoza

- B) Koma hiperosmolare
- C) Mikroangiopatia diabetike
- D) Hipoglicemite

52. Diabeti i tipit te pare mjekohet me:

- A) Daonil
- B) Metformine
- C) Insuline
- D) Diete hiperkalorike

53. Diabeti i tipit te dyte mjekohet me:

- A) Daonil, metformine
- B) Insuline
- C) Diete hiperkalorike
- D) Kufizim i aktivitetit fizik

54. Tension arterial normal konsiderohen vlerat e meposhtme:

- A) Sistoliku me i vogel se 140 mmhg dhe diastoliku me i vogel se 90
- B) Sistoliku me i madh se 140 mmhg dhe diastolike me i madhe se 90 mmhg
- C) Sistoliku ndermjet 160-180 mmhg dhe diastolike 90-120 mmhg
- D) Sistoliku me i madh se 190 mmhg dhe diastoliku me i madh se 100 mmhg

55. Hipertension pragu konsiderohet:

- A) Me shume se 180 mmhg dhe ose me shume se 105
- B) Sistolike 140-180 mmhg dhe ose diastolike 90-105
- C) Sistoliku 140-180 mmhg dhe ose diastoliku 90-95
- D) Sistoliku me i vogel se 140 mmhg dhe diastoliku me i vogel se 90

56. Faktore ambiental qe favorizojne krijimin e HTA jane te gjitha pervec:

- A) Perdorimi i natriumit
- B) Perdorimi i pakte i kaliumit
- C) Aktiviteti fizik
- D) Obeziteti

57. Faktore ambientale qe favorizojne krijimin e HTA jane te gjitha pervec:

- A) Alkoli
- B) Obeziteti
- C) Dieta e pasur me kalcium
- D) Aktiviteti fizik

58. Mjekimi i HTA perfshin te gjitha pervec:

- A) Aktivitetin fizik
- B) Shtimi ne peshe
- C) Kufizimi i kripes
- D) Lenia e alkoolit

59. Panusi është struktura histologjike që vëhet re tek të sëmurët me:

- A) Lupus Eritematoz Sistemik
- B) Sklerodermi difuze
- C) Artrit reumatoid
- D) Dermatomiozit

60. Një pacient 53 vjeçar i cili mjekohet me ibuprofen 400mg dy herë në ditë për të kuruar dhimbjen kronike të mesit krijon edemë të poshtme. Infermierja që kujdeset për të mendon se edema është rezultat i:

- A) Uljes së funksionit renal
- B) Uljes së nivelit të kreatinines
- C) Rritje të filtrimit glomerular
- D) Rritje të nivelit të proteinave plazmatike

61. Cila prej sëmundjeve muskulo-skeletike karakterizohet nga prania e nyjeve të Heberdenit?

- A) Lupusi eritematoz sistemik
- B) Artriti reumatoid
- C) Sklerodermia
- D) Osteoporoza

62. Terapija e spondilitit ankilozant përfshin:

- A) Vetëm terapi medikamentoze
- B) Terapi medikamentoze dhe fizike
- C) Levotiroskinë dhe deksametazon
- D) Desmopresinë dhe indometacinë

63. Në skleroderminë e lokalizuar ka dëmtime:

- A) Te miokardit
- B) Renale
- C) Gastrointestinale
- D) Anësive

64. Cirroza e mëlçisë mund të shkaktohet nga faktorët e mëposhtëm përveç:

- A) Hepatiti B
- B) Hepatiti C
- C) Alkoholi
- D) Hepatiti A

65. Osteoporoza mjekohet me:

- A) Bifosfonate
- B) Kripër të arit
- C) D-penicilinë
- D) Azotioprinë

66. Steoartriti është sëmundje:

- A) Inflammatorë muskuloskeletike

- B) Degjenerative muskuloskeletike
- C) Endokrine
- D) Genetike

67. Pneumonia atipike karakterizohet nga keto shenja pervec:

- A) Dobesi trupore
- B) Dhimbje koke
- C) Kolle e thate
- D) Melena

68. Termi adenopati i referohet:

- A) Ënjtjes (zmadhimit) të nyjave limfatike
- B) Ënjtjes së zorrëve të mëdha
- C) Ënjtjes së fshikëzës së tëmthit
- D) Ënjtjes së stomakut

69. Defekimi me feçe të gjakosura njihet si:

- A) Gingivitis
- B) Fissurë anale
- C) Hematokezia
- D) Hemorroide

70. Vjellja e gjakut është i njohur si:

- A) Hemorroide
- B) Hemostasis
- C) Hematemesis
- D) Melena

71. Inflamacioni i mëlcisë njihet si:

- A) Cirrozë
- B) Hepatit
- C) Bulimi
- D) Fistul

72. Ndjesia e djegies retrosternale njihet si:

- A) Cardiosis
- B) Pyrosis
- C) Mostretje
- D) Meteorizëm

73. Të vjellat e shtuara njihen si:

- A) Hyperpepsia
- B) Hyperemesis
- C) Hyperamnesia
- D) Hyperfagia

74. Defekimi me feçe në ngjyrë të zezë quhet:

- A) Diarre
- B) Karcinozë
- C) Konstipacion
- D) Melena

75. Inspektimi instrumental i pjesës fundore të zorrës së trashë është i njohur si:

- A) Colostomi
- B) Trakeostomi
- C) Sigmoidoskopi
- D) Tonsilektomi

76. Cila nga të mëposhtmet nuk është patologji e pankreasit?

- A) Pancreatiti akut
- B) Kolecititi akut
- C) Fibroza cistike
- D) Kanceri pankreatik

77. Disfagia është:

- A) Vështirësi në gëlltitje
- B) Vështirësi në tretje
- C) Pamundësi për të përtypur
- D) Vështirësi në defekim

78. Stenoza e lindur e pilorit:

- A) Zakonisht paraqitet që në ditët e para të jetës
- B) Ndodh më shpesh në meshkuj se femra
- C) Paraqitet me të vjella me gjak
- D) Trajtohet me FPP

79. Cirroza është:

- A) Sëmundje kronike degjenerative e mëlçisë
- B) Tumor i gojës
- C) Tumor i stomakut
- D) Prania e gurëve në fshikëzën e tëmthit

80. Një pacient diagnoztkuar me hbs Ag (+), propabikish ka:

- A) Një Hepatit B
- B) Koledokolitiazë
- C) Cirrozë biliare primare
- D) Kolangit sklerotizant primar

81. Cili ekzaminim gjaku do të ishte më i dobishem për të konfirmuar diagnozën e Cirrozës biliare primare?

- A) Antitrupe Antigliadinë
- B) Antitrupe Antimitokondrial (AMA)

- C) Antitrupa Antinuclear
- D) Niveli i amilazes ne gjak

82. Për cilin nga viruset e hepatitit ekziston vaksina?

- A) Për virusin A
- B) Për virusin B
- C) Për virusin C
- D) Për virusin D

83. Neuronet e kanë origjinën në:

- A) Epitelin e tubit neural
- B) Kavitetin e tubit neural
- C) Ektoderme
- D) Endodermë

84. Rrjeta dendritike e një neuroni është:

- A) Pjesa dalëse e informacioneve;
- B) Pjesa receptive e neuronit;
- C) Pjesa ku kryhen proceset metabolike të nevojshme për mbijetesën e neuronit;
- D) Pjesa e përpunimit të informacionit të ardhur në neuron.

85. Neuronet më të mëdha të SNQ janë:

- A) Neuronet e korteksit cerebellar;
- B) Neuronet e mesencefalonit;
- C) Neuronet e medullës oblongata;
- D) Neuronet motore të zonës primare motore.

86. Degjenerimi i korteksit apo sistemeve të tjera neuronale, nënkupton:

- A) Atrofi graduale neuronale që çon në humbje neuronale;
- B) Humbje të qelizave gliale;
- C) Humbje dhe pakësim të zgjatimeve aksonale;
- D) Humbje të mbështjellës mielike.

87. Edema cerebrale vazogjenike shkaktohet nga:

- A) Dalja e gjakut nga vazat cerebrale në hapësirat përreth tyre;
- B) Humbja e lëngut në hapësirën intersticiale për shkak të prishjes së integritetit të barrierës endoteliale;
- C) Dalja e gjakut në hapësirat qarkulluese të likuorit cerebrospinal;
- D) Dalja e gjakut në hapësirën subaraknoidale.

88. Encefalopatia bilirubinike është:

- A) metabolike e fituar e periudhës neonatale;
- B) metabolike e të rriturit;
- C) hypoksike-iskemike;
- D) metabolike e trashëguar.

89. Severiteti i sëmundjeve të depozitimit lizozomal varet nga:

- A) Moshë e shfaqjes;
- B) Mënyra e trashëgimisë;
- C) Sëmundjet shoqëruese;
- D) Aktiviteti residual i enzimës lizozomale.

90. Shenjat klinike të Leukodistrofisë metakromatike shfaqen në fëmijët:

- A) E porsalindur;
- B) 0 - 1 vjeç;
- C) 1 - 2 vjeç;
- D) > 2 vjeç.

91. Infeksionet perinatale dhe kongenitale të SNQ kanë shkaktarët më të shpeshtë:

- A) Infeksionet bakteriale;
- B) Infeksionet mykotike
- C) Infeksionet virale, parazitare dhe spiroketale;
- D) Infeksionet tuberkulare.

92. Shenjat dhe simptomat e tumoreve cerebrale përcaktohen nga:

- A) Moshë e pacientit.
- B) Lloji i qelizave përbërëse të masës tumorale;
- C) Faktorët sistematikë të individit;
- D) Lokalizimi i rritjes së tumorit dhe efekti sekondar e edemës

93. Anencefalia është mungesë e:

- A) septum pellucidum;
- B) korpusit callos;
- C) cerebellumit;
- D) plotë e hemisferave cerebrale apo reduktim i shprehur i përmasave të tyre.

94. Hemisferat cerebrale janë:

- A) Identike me njëra-tjetrën;
- B) Thuajse identike me njëra-tjetrën
- C) Plotësisht të ndryshme nga njëra-tjetra
- D) Të pakrahasueshme

95. Hemisferat dallojnë nga njëra-tjetra nga:

- A) Përmasat e lobit frontal;
- B) Përmasat e lobit temporal;
- C) Lokalizimi i zonës së të folurës;
- D) Përmasat e lobit oksipital

96. Ndarja e hemisferave për arsye didaktike bëhet në:

- A) 2 lobe;
- B) 3 lobe;
- C) 4 lobe;



D) 5 lobe.

97. Korteksi cerebral përbëhet nga:

- A) Kryesisht trupa qelizash nervore;
- B) Kryesisht zgjatimet e qelizave nervore;
- C) Kryesisht qeliza mbështetëse (jo neurone);
- D) Trupa qelizore dhe zgjatime të qelizave nervore në sasi thuajse të barabarta.

98. Vlerësimi i funksioneve të larta konjitive është i rëndësishëm, për:

- A) Kontributin semiologjik në lokalizimin e një lezioni;
- B) Vlerësimin e koeficientit të inteligjencës;
- C) Vlerësimin e funksionit cerebellar të pacientit
- D) Vlerësimin e aftësive motorike të pacientit.

99. Cila nga shenjat e mëposhtme ka të bëjë me çrregullim të vëmendjes?

- A) Afazia;
- B) Apraksia;
- C) Aleksia;
- D) Shpërqëndrimi

100. Afazia, është çrregullim:

- A) i vëmendjes,
- B) i të folurit,
- C) i nuhatjes,
- D) i shikimit.

101. Ç'rregullimet e leximit quhen:

- A) Disleksi;
- B) Afazi;
- C) Anosmi;
- D) Agnozi

102. Apraksia është paaftësi për të:

- A) kryer lëvizje të vullnetshme në mungesë të defiçiteve motore;
- B) folur;
- C) nuhatur;
- D) shkruar.

103. Ç'rregullimet e memories quhen:

- A) Afazi;
- B) Agrafi;
- C) Amnezi;
- D) Disfagi

104. Nervi cranial tek I cili mund të ndodhë dëmtim central apo periferik është:

- A) Nervi II;

- B) Nervi V;
- C) Nervi IX
- D) Nervi VII

105. Anosmia është shenjë e dëmtimit të:

- A) Nervave olfaktorë;
- B) Nervave facial;
- C) Nervave glosofaringealë;
- D) Nervave trigeminalë

106. Ptoza palpebrale haset në dëmtimet e nervit:

- A) olfaktor;
- B) okulomotor;
- C) trigeminal;
- D) hypogloss.

107. Shenja e "Bell", haset në:

- A) Neuraljinë trigeminale
- B) Paralizën faciale centrale
- C) Paralizën faciale periferike;
- D) Neuraljinë glosso-faringeale.

108. Në dëmtimet e nervit glosso-faringeal kemi humbjen e shijes në:

- A) 1/3 e përparme të gjuhës;
- B) 1/3 e mesme të gjuhës;
- C) 1/3 e pasme të gjuhës;
- D) Gjithë gjuhën.

109. Nervi hypogloss është:

- A) Nerv sensitiv;
- B) Nerv motor;
- C) Nerv miks (sensitivo-motor);
- D) Nerv me funksion parasimpatik.

110. Shenja "Babinski", haset në:

- A) Dëmtime të rrugëve ekstrapiramidale;
- B) Dëmtime të nervave kraniale;
- C) Dëmtime cerebellare
- D) Dëmtime të rrugëve piramidale

111. Tremori cerebellar është tremor:

- A) Intencional, vecanërisht në fund të lëvizjes;
- B) Tremor qetësie;
- C) Me përqëndrim distal;
- D) Shoqëruar me crrëgullime të të folurit.

112. Hypotonia muskulare është:

- A) Pakësim i rezistencës ndaj lëvizjes passive të anësive;
- B) Shtim i rezistencës ndaj lëvizjes passive të anësive
- C) Rezistencë e pandryshuar ndaj lëvizjes passive të anësive
- D) Mungesë e rezistencës ndaj lëvizjes passive të anësive.

113. Skleroza multiple është patologji:

- A) Dismielinizante hereditare;
- B) Dismielinizante e fituar;
- C) Demielinizante;
- D) Metabolike.

114. M. Alz'heimer është sëmundje:

- A) Demielinizante;
- B) Degjenerative progressive;
- C) Traumatike;
- D) Metabolike.

115. Në morbus Alz'heimer, ndodh:

- A) Humbje progressive neuronale në korteksin e lobeve parietale e temporal;
- B) Humbje progressive neuronale në korteksin e lobeve oksipitale e frontale;
- C) Humbje progressive neuronale në korteksin e lobeve frontale e parietale;
- D) Humbje progressive neuronale në korteksin e lobeve oksipitale e parietale.

116. Veteinspektimi e vetekzaminimi behet ne:

- A) Kancerin e qafes se mitres
- B) Menopauze
- C) Ne rastin e nje IST
- D) Kancerin e gjirit

117. Parandalimi paresor ul:

- A) Prevalencen e nje semundjeje
- B) Incidencen e nje semundjeje
- C) Prevalencen e nje handikapi
- D) Incidencen e nje handikapi

118. Per te evituar nje shtatzani abstinohet nga dita:

- A) 8 deri ne ditën e 14
- B) 6 deri ne ditën e 14
- C) 8 deri ne ditën e 18
- D) 6 deri ne ditën e 12

119. Pilula kontraceptive e urgjences merret ne:

- A) Mes te ciklit
- B) Fillim te ciklit
- C) Fund te ciklit

D) Nuk ka rendesi ne cfare momenti te ciklit

120. Hormoni luteinizues prodhohet:

- A) Ne hypofize
- B) Ne ovare
- C) Ne testikuj
- D) Ne uterus

121. Cilat metode kontraceptive mund te mbroje nga IST?

- A) e diteve kalendarike
- B) barriere
- C) Injekttablet
- D) orale

122. Nauzea, spotting, shtimi ne peshe, dhimbje koke kane lidhje me:

- A) Pranueshmerine e metodes
- B) Efikasitetin e metodes
- C) Sigurine e metodes
- D) Tolerancen e metodes

123. Testosteroni eshte:

- A) Qeliza seksuale mashkullore
- B) Hormoni seksual femeror
- C) Hormoni seksual mashkullor
- D) Qeliza seksuale femerore

124. E vetmja metode kontraceptive qe mbron nga HIV/AIDS eshte:

- A) Metoda kirurgjikale
- B) Spermicidet
- C) Kondomi
- D) Metodatat hormonale

125. Hormoni folikulo stimulus prodhohet nga:

- A) Hypofiza dhe hypotalamusi
- B) Ovaret
- C) Uterusi
- D) Testikujt

126. Depoproverat bejne pjese ne metodat:

- A) Orale
- B) Kirurgjikale
- C) Subdermale
- D) Injektabel

127. Pneumotoraksi nuk shkaktohet nga:

- A) Traumat;

- B) Nga nje patologji neoplazike e pulmonit;
- C) Nga aplikimi i sistemeve totalisht te qendrueshme;
- D) Nga hipertensioni.

128. Ka kapsul piogjene:

- A) Abcesi
- B) Flegmona
- C) Celuliti
- D) Forunkula

129. Perben urgjence kirurgjikale:

- A) Kalkuloza e kolecistes;
- B) Akalazia e ezofagut;
- C) Hernia strangulative;
- D) Noduli i ftohte i tiroides;

130. Kanceri i gjirit prek me shpesh kuadratin:

- A) medial te siperm;
- B) medial te poshtem;
- C) lateral te poshtem;
- D) lateral te siperm;

131. Ileusi akut i zorres se holle nuk ka origjine nga:

- A) Herniet interne
- B) Briljet
- C) Tumoret rektale beninje
- D) Ileusi biliar

132. Nuk eshte okluzion nga shtrengimi ai i shkaktuar nga:

- A) Brilja
- B) Volvusi
- C) Invaginacioni
- D) Ileusi biliar

133. Kolecistiti akut kalkuloz nuk eshte urgjence absolute kirurgjikale:

- A) Ne perionitin biliar,
- B) Piokolecistit;
- C) Kolecistopankreatit,
- D) Gangrene te kolecistes

134. Kolecistiti akut nuk konsiderohet rast i "keq" kirurgjikal ne:

- A) Pacientet geriartrik
- B) Insuficience renale,
- C) Ne obezitet,
- D) Ne lehoni

135. Hemorragjia nga barra ekstrauterine eshte:

- A) Hemorragji digjестive e larte,
- B) Hemorragji digjестive e poshtme,
- C) Hemorragji retroperitoneale
- D) Hemoperitoneum

136. Salla operatore eshte vendi ku:

- A) Trajtohen kirurgjikalisht te semuret;
- B) Ku shtrohen per trajtim pacientet;
- C) Ku shtrohen per trajtim pacientet kirurgjikal;
- D) Ku trajtohen intensivisht te semuret kirurgjikal;

137. Nuk eshte karakterisitke ne ileusin mekanik:

- A) Stop i feceve dhe gazrave;
- B) Nauze e te vjella;
- C) Dhimbja abdominale;
- D) Mungesa e hidroniveleve ne ro-grafi;

138. Agjenti me i vlefshem i perdorur si sterilizues te autoklavi eshte:

- A) Ajri uhor nenpresion;
- B) Forma e autoklavit;
- C) Koha;
- D) Nxehtesia;

139. Nuk eshte karakteristike e fazes akute te infeksionit:

- A) Dhimbja;
- B) Temperatura;
- C) Leukopenia;
- D) Hiperemia;

140. Eshte inflamacion i gjendrave limfatike:

- A) Adeniti;
- B) Celuliti;
- C) Furunkuli;
- D) Limfangoidi;

141. Nuk eshte parameter kryesor ne vleresimin e gjendjes se te ushqyerit:

- A) Klinik;
- B) Immunologjik;
- C) Dietetik;
- D) Bioumoral;

142. Nuk eshte e vertete per ushqimin parenteral:

- A) Eshte ushqim artificial i pacientit kirurgjikal;
- B) Merret me rruge venoze;
- C) Merret me rruge arteriale;

D) Merret kur ushqimi oral ose enteral jane te pamundura;

143. Portagia eshte instrument kirurgjikal qe perdoret per:

- A) Te suturuar;
- B) Per te diveriguar;
- C) Per te mbajtur agen
- D) Per te mbajtur lamen;

144. Nuk eshte urgjence kirurgjikale:

- A) Hemorragjia digjестive;
- B) Ulcer bulbi duodeni e perforuar;
- C) Kalkuloza e kolecistes;
- D) Apendiciti akut;

145. Fibrogastroskopia mund te jete mjet trajtimi per:

- A) Hemorragjine digjестive;
- B) Perforacionin e ulcers duodenale;
- C) Stenozen pylorike;
- D) Peritonitin post ulcers se perforuar;

146. Nuk ndodh ne hemorragjine gastro intestinale:

- A) Melene;
- B) Hemoptizi;
- C) Hematemeza;
- D) Anemia;

147. Nuk eshte komplikacion i nderhryjeve venoze qendrore:

- A) Pneumotoraksi;
- B) Nenushqyerja;
- C) Limforrea;
- D) Embolia;

148. Eshte inflamacion i gjendrave te djerses:

- A) Adeniti;
- B) Celuliti;
- C) Hidroadeniti;
- D) Furunkuli;

149. Nuk eshte parameter kryesor ne vleresimin e gjendjes se te ushqyerit:

- A) Klinik;
- B) Immunologjik;
- C) Dietetik;
- D) Bioumoral;

150. Eshte urgjenca me e shpeshte kirurgjikale:

- A) Hemorragjia digjестive;

- B) Ulcer bulbi duodeni e perforuar;
- C) Apendiciti akut;
- D) Kalkuloza e kolecistes;

151. Cili incision lejon nje nderhyrje ne te njejten kohe ne kavitetin torakal dhe abdominal?

- A) Sternotomia
- B) Toraco-freno-laparotomik
- C) Median
- D) Bisubcostal

152. Fijet e polipropilenit jane fije:

- A) Natyrale
- B) Artificiale
- C) Sintetike
- D) Vegjetale

153. Dreni Kehr perdoret per drenimin e:

- A) Rugeve biliare/biles
- B) Kolonit/duodenit
- C) Toraksit
- D) Kolecites

154. Skleroterapia ne endoskopi perdoret ne:

- A) Heqjen e trupave te huaj
- B) Zgjerimin e stnozave te aparatit tretes
- C) Hemostazen endoskopike
- D) Polipektomine

155. Cila nuk eshte komplikacion i menjehershem pas operacionit?

- A) Obstruksioni i rugeve te ajrit
- B) Nauze dhe te vjella
- C) Infeksioni i plage
- D) Hipotermia

156. Ne reaksionin e alarmit, pergjigja neuronale realizohet nga:

- A) Hormonet
- B) Riekuilibri hidro-elektrolitik
- C) Katekolaminat
- D) Reaksionet hemodinamike

157. Cila nuk eshte shenje klinike e embolise me gaz?

- A) Insuficienca kardicirkulatore/cianoze
- B) Polipne
- C) Hiperglicemi
- D) Hipertension i larte



158. Cila nuk eshte komplikacion i mevonshem i nderhyrjeve venoze qendrore?

- A) Infeksioni
- B) Thyerja e kateterit
- C) Hematoma locale
- D) Mbylla kateterit

159. Sindromat e imobilizimit kane te bejne me ulcerat:

- A) Nga dekubituset
- B) Arteriale
- C) Diabetike
- D) Neuropatike

160. Nderprerja e antibiotikeve pa zhdukjes se shenjave te infeksionit keshillohet pas:

- A) 8 oreve
- B) 16 oreve
- C) 1-2 dite
- D) 2-4 dite

161. Plaga quhet e kontaminuar kur kalojne se paku:

- A) 1-2 ore
- B) 4 ore
- C) 8 ore
- D) 16 ore

162. Cila nga keto nuk eshte patologji e menjehershme dhe fillestare e stomive te aparatit tretes?

- A) Pezmatimi i lekures
- B) Fistula
- C) Hemoragjia
- D) Edema

163. Dhëmbët e qumështit zëvendësohen me dhëmbët e përhershëm:

- A) Rreth moshës 3-4 vjeç
- B) Rreth moshës 4-5 vjeç
- C) Rreth moshës 6-7 vjeç
- D) Rreth moshës 8-9 vjeç

164. Faktorët e jashtëm që ndikojnë në rritje e zhvillim janë të gjithë me përjashtim të:

- A) Kushtet social-ekonomike
- B) Klima tropikale
- C) Sëmundjet kronike pas lindjes
- D) Faktorët gjenetikë

165. Fëmija e dyfishon peshën e lindjes në moshën:

- A) 1 vjeç
- B) 8 muaj
- C) 10 muaj

D) 5 muaj

166. Vitamina D merr pjesë në:

- A) mineralizimin e kockës
- B) aktivitetin nervor
- C) pjekurinë seksuale
- D) ematopoezë

167. Fëmija e trefishon peshën e tij në moshën:

- A) 8 muaj
- B) 1.5 vjeç
- C) 2 vjeç
- D) 12 muaj

168. Për vaksinimin sipas kalendarit të vaksinimit janë të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- A) Është i detyrueshëm për të gjithë fëmijët
- B) Nuk këshillohet të bëhet për fëmijët e lindur para kohe
- C) Ndihmon në krijimin e imunitetit të fëmijës
- D) Për aplikimin e vaksinave duhen respektuar afatet kohore sipas këtij kalendarit

169. Gjatësia e fëmijës në lindje është rreth:

- A) 50 cm
- B) 40 cm
- C) 30 cm
- D) 60 cm

170. Faktorët e brendshëm që ndikojnë në rritje e zhvillim janë të gjithë me përjashtim të:

- A) hormoneve seksuale
- B) kushteve social-ekonomike
- C) hormoneve e tiroides
- D) hormoni somatotrop

171. Kulloshtra:

- A) prodhohet nga gjendrat mamare ditët e para pas lindjes
- B) përmban shumë yndyrma e sheqerna dhe pak proteina
- C) përmban antikorpe të nënës
- D) mbron fëmijën nga infeksionet

172. Infeksioni nga Rubeola Kongenitale:

- A) prek fetusin me rrugë transplacentare
- B) shkakton vonesë në rritjen intrauterine dhe anemi tek bebi
- C) nuk kemi në përdorim asnjë mënyrë parandalimi
- D) është një nga shkaqet e prematurancës

173. Infeksioni neonatal nuk ka të vërtetë:

- A) hipotermi

- B) hipoglicemi
- C) hipobilirubinemi
- D) ulje të frekuencës kardiake

174. Vlerësimi i Apgarit nuk përfshin:

- A) frekuencën kardiake
- B) tonusin muskular
- C) frekuencën respiratore
- D) reflekset primare

175. Shkaktojnë keqformime të lindura të gjitha, me përjashtim të:

- A) rubeola kongenitale
- B) toksoplazmoza kongenitale
- C) CMV kongenital
- D) hepatiti B kongenital

176. Mund të jenë shenja klinike të një infeksioni neonatal të gjitha, me përjashtim të:

- A) hipotermi
- B) hiperglicemi
- C) hepatosplenomegali
- D) bombim i fontanelës

177. Kern ikteri shkaktohet nga:

- A) fiksimi i bilirubinës së palidhur në bërthamat trunore
- B) fillimi i parakohshëm i ablaktacionit
- C) anemia nga mungesa e hekurit
- D) ikteri nga qumështi i gjirit

178. Terapia rehidruese orale është trajtim i zgjedhur për të gjithë fëmijët e dehidruar, me përjashtim të:

- A) të vjella dhe temperaturë e lartë,
- B) koma ose shok,
- C) shigelozë,
- D) helmim ushqimor

179. Ndërlikimi më i shpeshtë i Salmonelozës është:

- A) prolapsi rektal
- B) anemia
- C) dehidrimet e tipeve të ndryshme
- D) meningiti

180. Cili nga ekzaminimet e mëposhtme nuk ka vlerë në shigelozë?

- A) koprokultura
- B) hemokultura
- C) kërkimi për pus e gjak në feçe
- D) gjak komplet

181. Në dehidrimin hiperton vuan më shumë:

- A) sistemi kardiovaskular
- B) sistemi nervor
- C) trakti tretës
- D) sistemi limfatik

182. Tetanosi neonatal ka të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- A) shkakton sepsis
- B) shkakton kontraktura muskulare
- C) shkakton fraktura të kockave
- D) shkakton trismus

183. Fëmija postmatur është i lindur:

- A) përpara 37 javësh moshë shtatzënie
- B) me peshë nën 2500 g
- C) pas javës 42 të shtatzënisë
- D) nga 37 në 42 javë moshë shtatzënie

184. Mekonium quhet:

- A) qumështi i ditëve të para pas lindjes
- B) një keqformim i lindur i traktit gastrointestinal
- C) një sëmundje ngjitëse e transmetuar nga nëna
- D) jashtëqitja e parë e bebit

185. Doza e Acetaminofenit (Paracetamol) në fëmijë është:

- A) 2 mg/kg për çdo marrje,
- B) 5 mg/kg për çdo marrje,
- C) 15 mg/kg për çdo marrje,
- D) 50 mg/kg për çdo marrje

186. Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë për stenozen hipertrofike të pilorit:

- A) të vjella që në lindje
- B) fillon reth muajit të parë
- C) ka prani të bilës në të vjella
- D) ka humbje të oreksit

187. Sa është sasia e Tresolit që përdoret për rehidrim oral në dehidrimin e lehtë?

- A) 10 mg/kg peshë
- B) 20 mg/kg peshë,
- C) 50 mg/kg peshë,
- D) 100 mg/kg peshë

188. Forma e dehidrimit (i lehtë-i mesëm-i rëndë) tek fëmija vlerësohet me të gjitha, me përjashtim të:

- A) matja e presionit arterial,

- B) thellimi i syve,
- C) dhimbja e kokës,
- D) niveli i fontanelës së madhe

189. Shkaktarët më të shpeshtë të diarresë në fëmijë (rreth 70% e diarreve) janë:

- A) viruset
- B) bakteret
- C) mykrat
- D) asnjëri

190. Doza e Adrenalinës subkutan për trajtimin e shokut anafilaktik është:

- A) 1 mg për çdo 10 kg peshë,
- B) 0.5 mg për çdo 10 kg peshë,
- C) 0.1 mg për çdo 10 kg peshë,
- D) 10 mg për çdo 10 kg peshë

191. Dhënia e vitaminës K tek i porsalinduri duhet të jetë:

- A) sistematike-e detyrueshme për çdo të porsalindur
- B) e këshillueshme,
- C) e panevojshme tek fëmija që ushqehet me gji,
- D) vetëm në rast hemorragjie të jashtme

192. Sindromi Reye lidhet me përdorimin e:

- A) Aspirinës
- B) Aminofilinës
- C) Amfetaminës
- D) Antibiotikëve

193. Njollat e Koplik-ut janë karakteristikë e:

- A) Rubeolës
- B) Varicelës
- C) Fruthit
- D) Skabiesit

194. Ekzantema që shfaqet edhe në lëkurën me flokë flet për:

- A) Rubeolë
- B) Varicelë
- C) Fruth
- D) Skarlatinë

195. Rashi kutan makulo-papulo-vezikular, i shoqëruar me temperaturë të lartë dhe prurit flet për:

- A) Rubeolë
- B) Varicelë
- C) Fruth
- D) Skarlatinë

196. Janë komplikacione të varicelës të gjitha, me përjashtim të:

- A) Qelbëzimi i elementeve kutane
- B) Sindromi Reye
- C) Glomerulonefriti
- D) Herpes Zoster

197. Shenja madhore e glomerulonefritit akut është:

- A) Proteinuria
- B) Hematuria
- C) Hipertensioni arterial
- D) Anemia

198. Tiroidja prodhon:

- A) Serotonine
- B) Kalcitonine
- C) Histamine
- D) Glukagon

199. Kalcitonina ben:

- A) Uljen e Kalciumit ne lengun jashteqelizor
- B) Rritjen e kalciumit ne lengun jashteqelizor
- C) Uljen e depozitimit te kalciumit ne kocka
- D) Rritjen e kalciumit ne urine

200. Origjina etiologjike e tiroiditit akut eshte:

- A) Virale
- B) I panjohur
- C) Infektive
- D) Autoimmune

201. Tiroiditi kronik sklerotik Riedel jep keto shenja klinike pervec:

- A) Dispne
- B) Disfoni
- C) Hipotiroidizem
- D) Tetani

202. Cila nga keto nuk eshte komplikacion i kirurgjise se tiroideve (tiroidektomise)?

- A) Disfoni
- B) Tetani
- C) Infeksion, sepsis
- D) Krize tirotoksike

203. Karakteristikat klinike te morbus Basedow jane keto pervec:

- A) Takikardi
- B) Ekzoftalmi

- C) Shqetesime/pagjumesi
- D) Shtim ne peshe

204. Hemotoraksi shkaktohet nga keto gjendje pervec:

- A) Infarkt pulmonary
- B) Infeksion
- C) Trauma
- D) Neoplazi
- E) Koagulopati

205. Cila nga keto nuk eshte shenje e nje mediastiniti akut?

- A) Dhimbje
- B) Hemotoraks
- C) Kollë
- D) Disfagi

206. Mezotelioma eshte tumor i:

- A) Bronkeve
- B) Parenkimes pulmonare
- C) Mediastinit
- D) Pleures

207. Sipas stadifikimit te tumoreve cili nga te meposhtmet eshte me i avancuar? I radhisni ato

- A) T1 n1 m0
- B) T2 n2 m0
- C) T2 n1 m1
- D) T3 n2 m0

208. Cila metode diagnostike konsiston ne vizualizimin e vazave mushkerore me ane te kontrastit?

- A) Radioskopia
- B) Bronkografia
- C) Angiopneumografia
- D) Tomografia e kompjuterizuar

209. Cili nga llojet e pneumotoraksit shkakton me teper ngjeshje te pulmonit?

- A) i mbyllur
- B) i hapur
- C) i hapur me natyre traumatike
- D) valvular

210. Karcinoma spinocelulare eshte tumor i:

- A) Tiroides
- B) Paratiroides
- C) Ezofagut
- D) Pulmonit

211. Mastopatia fibrocistike prek grate e moshes:

- A) 20-35 vjec
- B) 25-45 vjec
- C) 40-50 vjec
- D) 50-60 vjec

212. Mbas cilit stad kanceri i gjirit eshte inoperabel/i paoperueshem?

- A) 2a
- B) 2b
- C) 3a
- D) 3b

213. Krahu i fryre (limfedema) eshte pasoje e kirurgjise se:

- A) Toraksit
- B) Gjirit
- C) Pulmonit
- D) Stomakut

214. Krahu i fryre (limfedema) shfaqet pas:

- A) 3 ditesh
- B) 1-2 javesh
- C) 4-6 javesh
- D) 6-12 javesh

215. Cila nga te meposhtmet nuk eshte karakteristike per fibroadenomen e gjirit?

- A) Ka konsistence te forte
- B) Siperfaqe te lemuar ose e lobular
- C) Prek grate e moshes nen 30 vjec
- D) Paraqet dhimbje

216. Cila nga llojet e displazise ne mastopatine fibrocistike ka me teper tendenca malinjiteti?

- A) Displazia qe nuk perhapet
- B) Displazia qe perhapet pa atipi
- C) Displazia fibroze mikrocistike
- D) Dizplazia qe perhapet me atipi

217. Akalazia e ezofagut eshte:

- A) Zgjerim i ezofagut ne forme trastezash
- B) Mungesa e lirimit te sfinkterit te poshtem ezofageal
- C) Zhvendosja e stomakut ne kraharor nepermjet hiatusit diafragmatik
- D) Mungesa e lirimit te sfinkterit te siperm ezofageal

218. Divertikuli i Zenkerit ka te beje me:

- A) Zgjerimin ne piken e bashkimit te faringut me ezofagun
- B) Zgjerim ne bifurkacionin e trakese
- C) Zgjerim ne pjesen fundore te ezofagut



D) Mungese e lirimit te sfinkterit te poshtem ezofageal

219. Karcinoma gastrike gjendet ne me shume se 50% te rasteve ne:

- A) Kurvatura major
- B) Kurvatura minor
- C) Korpusi gastric
- D) Kardiasi i stomakut

220. Sindromi Dumping eshte komplikacion i kirurgjise se:

- A) Duodenit
- B) Stomakut
- C) Kolecistes
- D) Heparit

221. Cila nga keto nuk eshte shkak i refluksit gastroezofageal?

- A) Akalazia e ezofagut
- B) Mbipesha
- C) Shtatzania
- D) Ndryshimet ne kendin e hisit

222. Cila nga keto nuk eshte komplikacion i kirurgjise se stomakut?

- A) Keqperthithje
- B) Sindromi dumping
- C) Hemoragji
- D) Stenoze anastomotike

223. Keto jane shkaqet e abcesit hepatic pervec:

- A) Stenoza biliare
- B) Hipertensioni portal
- C) Kalkuloza biliare
- D) Infeksion i pergjithshem

224. Biliomat jane pasoja te traumes se:

- A) Stomakut
- B) Duodenit
- C) Heparit
- D) Rrugeve biliare te jashtme

225. Nderhyrja kirurgjikale ne adenomen hepatic eshte e keshillueshme te kryhet kur adenoma eshte:

- A) > 1 cm
- B) > 2 cm
- C) > 4 cm
- D) > 6 cm

226. Karcinoma kolangioqelizore mund te krijohet nga keto shkaqe pervec njerit:

- A) Litiaza intrahepatike
- B) Infeksionet
- C) Semundjet inflamatore te zorres
- D) Cirroza

227. Guret ne kalkulozen intrahepatike jane:

- A) Kolesterol te perzier
- B) Kolesterol te paster
- C) Me pigmente biliare, te zinj
- D) Me pigmente biliare, te murme

228. Cili nga keto nuk eshte faktor etiologjik i kolangitit sklerotizues?

- A) Infeksioni
- B) Cirroza
- C) Autoimune
- D) Litiaza

229. Pasojat e kolangitit sklerotizues jane keto pervec:

- A) Cirroza
- B) Hipertensioni portal
- C) Ascitit
- D) Varicet e ezofagut

230. Ikteri per shkak te hemolizes akute ka natyre:

- A) Prehepatike
- B) Hepatike
- C) Post hepatike
- D) Te gjitha

231. Ikteri nga deficitet enzimatiqe (semundja Crigler-Mayor) ka natyre:

- A) Prehepatike
- B) Hepatike
- C) Post hepatike
- D) Idiopatik

232. Cila nga keto nuk eshte nderlikim pas kolecistektomise (heqjes kirurgjikale te kolecistes)?

- A) Fistul biliare
- B) Hemoragji
- C) Dementim i rrugeve biliare
- D) Gure ne rruget biliare

233. Cila nga keto nuk eshte nderlikim i litiazes se kolecistes?

- A) Fistula biliare
- B) Pezmatimi
- C) Kalkuloza intrahepatike
- D) Hemobilia

234. Ikteri per shkak te kancerit te kokes se pankreasit ka natyre:

- A) Prehepatike
- B) Hepatike
- C) Posthepatike
- D) Idiopatik

235. Nuk ben pjese ne shtresat e kornese:

- A) Membrana e Bawmanit
- B) Stroma
- C) Konet
- D) Endoteli

236. Fuqia perthyese e syrit eshte:

- A) 60 dioptri
- B) 58 dioptri
- C) 62 dioptri
- D) 50 dioptri

237. Ne keratite dallojme gjithe keto pervec:

- A) Infiltrate korneale
- B) Hypopion
- C) Turbullim I vitrozit
- D) Edeme korneale

238. Keratokonusi mjekohet me:

- A) Antibiotik
- B) Syze
- C) Lente e fort kontakti
- D) Kortizonike

239. Makrokornea eshte:

- A) Semundje inflamatore e kornese
- B) Diametri I kornese > 12mm
- C) Dhome e perparme e thelle
- D) Diameter <10 mm

240. Keratokonus eshte:

- A) Anomali e perthyerjes se drites
- B) Dalje ne forme koni e kristalinit
- C) Semindje inflamatore
- D) Ka sekrecione purulente

241. Cila forme e keratitit shfaqet me heret?

- A) dentritik
- B) punktut

- C) vezikular
- D) stromal

242. Keratiti mykotik:

- A) Shfaqet ne dimer
- B) Ka aftesi te perseritet shpesh
- C) Shfaqet nga perdorimi i gjate i kortizonikeve
- D) Mjekohet me antibiotike

243. Ametropia eshte:

- A) Anomalia e retines
- B) Anomali e kornese
- C) Shembellimi bie ne retine
- D) Anomali e perthyerjes se drites

244. Ne hipermetropi shembellimi bie:

- A) ne retine
- B) pas retines
- C) para retine
- D) ne pika te ndryshme ne retine

245. Keratiti mykotik mjekohet:

- A) Antivirale
- B) Antibiotike
- C) Antimykotike
- D) Kortizonikle

246. Emetropia eshte:

- A) Anomali e refraksionit
- B) Anomali e kornese
- C) Shembellimi bie ne retine
- D) Shembellimi bie para retines

247. Ne miopi shembellimi bie:

- A) ne retine
- B) para retines
- C) pas retines
- D) ne pika te ndryshme te retines

248. Astigmatizimi:

- A) Eshte anomali e kornese
- B) Eshte anomali e kristalinit
- C) Shembellimi bie ne retine
- D) Eshte demtim i akomodimit

249. Syzet e lugeta perdoren:

- A) Miopi
- B) Hipermetropi
- C) Astigmatizem
- D) Glaukone

250. Shkolitje retinal mund te kemi ne:

- A) Hipermetropi alta
- B) Astigmatizem
- C) Miopi alta
- D) Asnjera

251. Sfinkter dhe dilatators pupile ndodhen ne:

- A) Iris
- B) Trupin ciliar
- C) Choroidea
- D) Retine

252. Fenomeni tindal vihet re ne:

- A) Uveite te perparme
- B) Uveite te pasme
- C) Konjuktivite
- D) Glaukome

253. Syzet e myseta perdoren:

- A) Miopi
- B) Hipermetropi
- C) Astigmatizem
- D) Glaukome

254. Akomodimi realizohet nga:

- A) Retina
- B) Kristalini
- C) Kornea
- D) Trupi qelqor

255. Fenomeni tindal eshte:

- A) Anomali e perthyerjes se drites
- B) Anomali e kristalinit
- C) Turbullim i dhomes se perparme
- D) Turbullim i vitrozit

256. Hypopion eshte:

- A) Grumbullim pusi ne dhomen e perparme
- B) Turbullim i dhomes se perparme
- C) Turbullim i trupit qelqor
- D) Inflamacion i konjuktives

257. Sinecy anterior eshte ngjitje e:
- A) kornese me kristalinin
  - B) irisit me kornene
  - C) irisit me kristalinin
  - D) kristalinit me vitrozin
258. Cila shenje i perket uveiteve posteriore?
- A) Turbullime te vitrozit
  - B) Turbullime ne kamera anterior
  - C) Skuqje ciliare
  - D) Dhimbje
259. Synecy posterior eshte ngjitje e:
- A) kornese me kristalinin
  - B) irisit me kornene
  - C) irisit me kristalinin
  - D) kristalinit me vitrozin
260. Cili mjekim eshte kryesor ne uveite?
- A) Atropina
  - B) Kortizoniket
  - C) Antiviralet
  - D) Antibiotiket
261. Glaukome eshte:
- A) Tension i larte i syrit
  - B) Semundje e nervit optic
  - C) Anomali refraksioni
  - D) Shtremberim i syrit
262. Lengu uxor i syrit eleminohet nga:
- A) Trabekulat
  - B) Trupi qelqor
  - C) Kristalini
  - D) Kornea
263. Tensioni normal i syrit eshte:
- A) 10 -20 mmhg
  - B) 11-22 mmhg
  - C) 11-21 mmhg
  - D) 10-22 mmhg
264. Cili medikament nuk perdoret ne uveite?
- A) Antiviralet
  - B) Kortizoniket

- C) Antibiotiket
- D) Atropina

265. Strabizmi eshte:

- A) Shtremberim i kapakeve
- B) Shtremberim i syve
- C) Rritje e tensionit te syrit
- D) Turbullim i vitrozit

266. Lengu ujqor nuk eleminohet nga:

- A) Trabekulat
- B) Kanali i shlemit
- C) Hapesirat e fontanes
- D) Kornea

267. Ne glaukome nuk ndodh:

- A) Rritje e tensionit intraocular
- B) Demtim i n. Optic
- C) Ulja e pamjes
- D) Astigmatizmi

268. Kendi i dhomes se perparme:

- A) Kornea-kristalin-trupi ciliar
- B) Trupi qelqor- trupi ciliar-kristalini
- C) Kristalin - trupi qelqor-irisi
- D) Kornea-irisi-trupi ciliar

269. Tensioni i syrit matet me

- A) Tonometer
- B) Ophthalrnoskop
- C) Gonioskop
- D) Biomikroskop

270. Timololi eshte:

- A) B-bllokues
- B) A2-Agoniste
- C) Prostaglandine
- D) ACE-inhibitor

271. Azopti eshte:

- A) B-bllokues
- B) A2agoniste
- C) Prostaglandine
- D) Asmi

272. Kendi i CA shihet me:

- A) Tonometer
- B) Biomikroskop
- C) Ophthalmoskop
- D) Gonioskop

273. Travatani eshte:

- A) B-blokues
- B) A2-agoniste
- C) Prostaglandine
- D) ACE-inhibitor

274. Muskujt e jashtem te syrit jane:

- A) 2
- B) 4
- C) 5
- D) 6

275. Cili muskul i jashtem i syrit inervohet nga n. Abducent?

- A) M.rectus extern
- B) M. Rectus intern
- C) M.rectus superior
- D) M.rectus inferior

276. Cila shenje nuk eshte ne krizen glaukumatoze?

- A) Iris bombe
- B) Sy i forte si gur
- C) Dhome e perparme e thelle
- D) Edeme korneale

277. Cili muskul i jashtem inervohet nga n.troklearis?

- A) M.obliquos inferior
- B) M. Rectus inferior
- C) M.obliquos superior
- D) M.rectus med

278. Ngjitje e tensioni te syrit ne uveite:

- A) Eshte i larte ne fillim, pastaj bie
- B) Eshte i ulet ne fillim, pastaj rritet
- C) Nuk ndryshon
- D) Eshte i larte gjithe kohën

279. Elementet qe formojne kallusin e bute e kane prejardhjen nga:

- A) Qelizat mezenkimale te padiferencuara
- B) Fibrat e kolagenit
- C) Indi kartilaginoz
- D) Indi kockor



280. Demtimi i nervit ulnar ndodh me shpesh ne:

- A) Fraktura e olekranit
- B) Fraktura e humerusit
- C) Fraktura e epikondilit medial humeral
- D) Fracture e radiusit

281. Cili eshte komplikacioni me i shpeshte i fractures subkapitale te femurit?

- A) Pseudoarthroza
- B) Nekroze e kokes e pseudoarthrozes
- C) Rigiditeti nekroza
- D) Kufizim i rotacionit

282. Angiografia eshte:

- A) Futja e sondave ne kavitetin artikular
- B) Matja e differences se potencialit ndermjet dy pikave te nje muskuli
- C) Ekzaminimi i spaciumit subaraknoidal me ane te lendeve te kontrastit
- D) Vizualizimi i eneve te gjakut nepermjet lendeve te kontrastit

283. Kuadri radiologjik i osteoarthrozave shfaq:

- A) Osteofikate, fraktura patologjike
- B) Shkopi i bambuse
- C) Skleroze subhondrale, osteofite, zvogelim i rimes artikulare
- D) Osteoporozë

284. C'eshte fraktura Monteggia?

- A) Fraktura e radiusit + fraktur e olekranit
- B) Fraktura suprakondilare + fraktur olekrani
- C) Fraktura e ulnes + fraktur e kokes se radiusit
- D) Fraktura e ulnes + luksacion i kokes se radiusit

285. Tumori gjigandocelular (osteoklastoma) prek me shume:

- A) Epifizen
- B) Diafizen
- C) Apofizen
- D) Metafizen

286. Me cfare shoqerohet me shpesh coxa valga?

- A) Luksacionin congenital kokso femoral
- B) Luksacion habitual i pateles
- C) Epifiziolize e kokes femorale
- D) Anteversionin e shtuar

287. Reparimi dhe zevendesimi i kockes se demtuar ne osteokondrite kerkon:

- A) 2 vjet
- B) 3 vjet

- C) 1.5 vjet
- D) 5 vjet

288. Cili eshte tipi me i shpeshte ne frakturat suprakondilare te humerusit?

- A) Rotator
- B) Ekstension
- C) Perzier
- D) Fleksion

289. Per trajtimin kirurgjikal te skoliozes vendoset kur:

- A) skolioza fillon ne moshe te vogel
- B) nuk korrigjohet edhe me korse milloëoki
- C) ka dhe kifoze
- D) kendi i deformimit dhe ecuria e tij nuk lejojne trajtimin ortopedi

290. Osteoporoza shkaktohet nga deficit i:

- A) mases kockore
- B) fosforit
- C) proteinave
- D) kalciumit

291. Si trajtohet zakonisht luksacioni kokso femoral traumatik:

- A) Reponim me anestezi
- B) Kirurgji
- C) Terheqje skeletike
- D) Reponim pa anestezi

292. Ne luksacionin skapulohumeral struktura e demtuar eshte:

- A) Indi synovial
- B) Kartilago artikulare
- C) Kocka
- D) Kapsula artikulare

293. Kur diagnostikohet zakonisht scapula alta?

- A) 2-3 vjec
- B) 4-5 vjec
- C) 0-1 vjec
- D) 3-4 vjec

294. Cfare preket ne akondroplazi?

- A) Rritja ne gjeresi e kockes
- B) Rritja ne gjatesi e kockes
- C) Zhvillimi indit lidhor
- D) Zhvillimi i musculatures

295. C'eshte arthroskopia?

- A) Futja e sondave ne kavitetin artikular
- B) Ekzaminimi i spaciumit subaraknoidal me ane te lendeve te kontrastit
- C) Matja e differences se potencialit ndermjet dy pikave te nje muskuli
- D) Injektimi i lendeve te kontrastit ne artikulacion e vleresimi radiologjik i tyre

296. Cila simptome eshte me e shpeshte ne artrozat?

- A) Kontraktуре e pergjithshme
- B) Rigiditeti mengjesor
- C) Dhimbje episodike
- D) Dhimbje e gjeneralizuar

297. Myelomeningocela shoqeron:

- A) Spina bifida
- B) Sakrolizim i vertebres l5
- C) Sinostaza vertebrale
- D) Skoliozen kongenitale

298. Kontraktra Volkman eshte:

- A) Kontraktуре e m. Flexore
- B) Miosit post traumatic
- C) Shkurtese e kockave te parakrahut
- D) Paralize e m. Flexore te parakrahut

299. Demtimi i nervit median shoqerohet me:

- A) Demtim te tendineve abduktore
- B) Frakture te metakarpeve
- C) Demtim te tendineve flexore
- D) Frakture colles

300. Sindromi Volkman ndodh me shpesh ne frakturat e:

- A) Diafiza e femurit
- B) Radius e ulna
- C) Radiusit
- D) Ulnes

301. Per ulceren peptike jane te verteta pohimet e meposhtme pervec:

- A) Etiopatogjeneza e se ciles ka lidhje me prishjen e ekuilibrit ndermjet faktoreve agresive dhe atyre mbrojtes te mukozes
- B) Ne etiopatogjeneze ka rol helicobacter pilori
- C) Prek vetem doudenin
- D) Preparatet AIJS kane rol te rendesishem ne shkaktimin e ulceres

302. Incizioni ne piken Mc Burney kryhet per:

- A) Kolecistektoni
- B) Apendektomi
- C) Hernie te paretit abdominal

D) Kalkuloze biliare

303. Cila nga keto shenja nuk eshte e Morbus Crohn?

- A) Diarre me gjak
- B) Temperature
- C) Dhimbje barku
- D) Kolangite

304. Probabiliteti i shnderrimit te polipozes familjare te kolonit ne kancer te kolonit shkon ne 100% ne:

- A) 10 vjet
- B) 20 vjet
- C) 30 vjet
- D) 40 vjet

305. Cili nga te meposhtmet nuk eshte komplikacion i hernieve te paretit abdominal?

- A) Perforacioni
- B) Inkarcerimi (shtrengimi)
- C) Inflamacioni
- D) Trauma

306. Cili nga keto nuk eshte nderlikim postoperator i hernies inguinale?

- A) Hematoma e sakusit scrotal
- B) Atrofi testikulare
- C) Perforacion i zorreve
- D) Ileusi (bllokim i zorreve)

307. Cila nga keto nuk ndikon ne krijimin e hernieve te paretit abdominal?

- A) Rritja e presionit intraabdominal
- B) Shtendosja e struktures se muskujve
- C) Incizionet e nderhyrjeve te meparshme kirurgjikale
- D) Madhesia e pazakonte e vrimave te paretit abdominal

308. Cila nga keto nuk eshte patologji retroperitoneale?

- A) Trauma
- B) Perforacioni
- C) Abcesi
- D) Neoplazite

309. Cili nga keto nuk klasifikohet ne tumore retroperitoneale?

- A) Tumori renal
- B) Lipoma
- C) Leiomioma
- D) Hemangiosarkoma

310. Cila nga keto nuk eshte klinike e fibrozës retroperitoneale?

- A) Ikteri
- B) Tromboflebitet
- C) Diarre
- D) Dhimbje

311. Cila nga keto nuk eshte shenje e neoplazive retroperitoneale?

- A) Hemoragji gastrointestinal
- B) Ikter
- C) Tromboze venoze
- D) Dizuri

312. Leiomioma e rabdomiosarkoma jane tumore retroperitoneale me origjine nga:

- A) Indi lidhor
- B) Indi nervor
- C) Mbetjet embrionale
- D) Indi muskulor

313. Cili nga keto tumore nuk ben pjese ne sindromin MEN 2?

- A) Carcinoma medulare
- B) Feokromacitoma
- C) Adenoma e hipfizes
- D) Hiperplazia e paratiroides

314. Sindromi Zollinger Ellison ka te beje me cilin nga tumoret:

- A) Insulinoma
- B) Gastrinoma
- C) Glukagonoma
- D) Feokromacitoma

315. Cila nga keto nuk eshte shenje e insulinomes?

- A) Hipoglicemia
- B) Halucinacione
- C) Cefale
- D) Ikter

316. Vipoma (sekretimi i peptidit vazokativ intestinal) nuk shoqerohet me cilen?

- A) Diarre
- B) Hipokalemi
- C) Hipobilirubinemi
- D) Hipokloremi

317. Cila nga keto tumore neuroendokrine nuk e merr origjinen nga pankreasi?

- A) Glukagonoma
- B) Feokromacitoma
- C) Somatostatinoma
- D) Insulinoma

318. Cila nga keto nuk eshte komplikacion i cistektomise?

- A) Hemoragjia
- B) Tromboza venoze e thelle
- C) Laparocela
- D) Retensioni urinar

319. Cila nga keto nuk eshte shkak i hidronefrozes ne nivel ureteral?

- A) Litiaza
- B) Spazma ureterale
- C) Keqformimet
- D) Fibroza retroperitoneale

320. Cili nga keto nuk eshte shkak i hidronefrozes renale?

- A) Inkontinenca e urines
- B) Anomali te sistemit
- C) Tumore te parenkimes renale
- D) Litiaza

321. Cila nga keto nuk eshte komplikacion i prostatektomise?

- A) Hemoragjia
- B) Sepsisi abdominal
- C) Inkontinenca (mosmbajtja e urines)
- D) Anemia

322. Cila nga keto nuk eshte shkak i hidronefrozes?

- A) Litiaza (guret) ne sistemin urinar
- B) Keqformimet
- C) Fibroza retroperitoneale
- D) Dizuria

323. Deri ne cfare stadi sipas klasifikimit te Leriche-Fontaine te stenozes ateromatoze te pjeses iliako-femorale merret ne considerate terapia medikamentoze?

- A) Stadi I
- B) Stadi II a
- C) Stadi II b
- D) Stadi III

324. Simpatektomia ne mjekimin e stenozes ateromatoze lejon permiresimin e trofizimit kutan nepermjet:

- A) Ngushtimin e vazave qendrore
- B) Zgjerimin e eneve periferike
- C) Ngushtimin e eneve periferike
- D) Rritjen e tensionit arterial

325. Aneurizem i vertete quhet kur kemi zgjerim te lumenit te enes:

- A) > 20%
- B) > 30%
- C) > 40%
- D) > 50%

326. Cila nga keto nuk eshte komplikacion i aneurizmes se aortes ne evolucionin e saj?

- A) Shkaterrimi (carja)
- B) Infeksioni
- C) Embolia
- D) Disekacioni (ndarja e shtresave te vazes)

327. Kirurgjia ne aneurizmen abdominale merret ne konsiderate kur aneurizmi ka diameter:

- A) > 2 cm
- B) >3 cm
- C) > 5 cm
- D) > 7 cm

328. Cila nga keto nuk eshte simptome e tromboembolise arteriale?

- A) Dhimbje
- B) Mungese pulsi
- C) Zbehtesi
- D) Hemoragji

329. Per sa kohe provokohet nekroza ishemike e zones se prekur nga tromboembolia arteriale?

- A) 2-3 ore
- B) 6-8 ore
- C) 3-4 ore
- D) 4-6 ore

330. Gjaku rrjedh ne venat e kembes i shtyre nga keto faktore pervec njeres:

- A) Presioni arterial
- B) Kontraksionet e muskujve te kembes
- C) Shtyrja nga valvulat e venave
- D) Aspiracioni kardio torakal

331. Cila nga keto nuk eshte shkak i tromboflebiteve sekondare?

- A) Tumore
- B) Jo ndonje shkak i dukshem
- C) Infektive
- D) Hematologjike

332. Aneurizma eshte:

- A) Semundje degjeneruese me grumbullimin e qelizave me prejardhje nga indi lidhor, lipide etj
- B) Zgjerim i vazhdueshem e i qendrueshem i nje arterie per shkak te ndryshimeve ne muret e saj
- C) Bllokim akut nje arterie ardhur nga trombet ne arteriet me demtime te shtreses intime
- D) Carje gjatesore e tunike media te arteries

333. Cila nga keto nuk ben pjese ne etiopatogjenezen e tromboflebiteve sipefaqesore?

- A) Hiperkoagulabiliteti
- B) Demtimet parietale
- C) Hipotensioni arteria
- D) Shtjellat e rrjedhes se gjakut

334. Per te vleresuar afersisht gravitetin/siperfaqen e djegieve perdoret rregulli i:

- A) 30%
- B) 5%
- C) 6%
- D) 9%

335. Konjuktiviti bakterial:

- A) Shkaktohet nga viruset
- B) Ka papilla te zmadhuara
- C) Ka prani te folikujve
- D) Ka sekrecione mykoide

336. Ne ankesat subjektive nuk ben pjese:

- A) Ulja e te parit
- B) Dhimbja
- C) Lotimi i shtuar
- D) Skuqja

337. Ne uvea nuk ben pjese:

- A) Irisi
- B) Trupi ciliar
- C) Choroidea
- D) Retina

338. Trupi qelqor:

- A) Ka mbaresa nervore
- B) Ka pigment
- C) I jep formen syrit
- D) Ushqen retinen

339. Konjuktivitetet virale:

- A) Jane te shpeshta ne cdo stine
- B) Kane sekrecione purulente
- C) Ka folikuj ne konjuktive
- D) Ka zmadhim te papilave

340. Mjekimi i konjuktivitit viral:

- A) Antiviral
- B) Antibiotik



- C) Antimykotik
- D) Kalon pa mjekim

341. Ne ankesat objektive nuk ben pjese:

- A) Ulja e te parit
- B) Skuqja
- C) Crrregullimi i pozicionit te syrit
- D) Tumoret

342. Norplanti dhe implanon bëjnë pjesë te metodat:

- A) injekttable
- B) orale
- C) barriere
- D) subdermale