



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E ARSIMIT  
DHE SPORTIT

QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE  
DREJTORIA E PROVIMEVE TË SHTETIT

**PROVIMI I SHTETIT**

**FONDI I PYETJEVE PËR PROFESIONIN E  
RREGULLUAR TË INFERMIERIT**

**01. Bazat e Infermieristikës**

1. Ajo degë e filozofisë që merret me standardet e sjelljes dhe të gjykimit moral quhet:

- A) Deontologji
- B) Vlerë
- C) Detyrë
- D) Etikë

2. Nëse një infermier përdor uniformën e tij jashtë mjediseve spitalore, ka thyer:

- A) Të drejtat e pacientit
- B) Kodin etik
- C) Ligjin
- D) Parimet

3. Në konceptet kryesore të teorisë infermiere bën pjesë ?

- A) Besnikëria
- B) Bamirësia
- C) Autonomia
- D) Infermieristika

4. Në zhvillimin e kujdesjeve dhe shtrirjen e roleve infermiere bën pjesë ?

- A) Infermieri anesteziist
- B) Infermieri si avokat
- C) Infermieri si vendimarrës
- D) Infermieri si edukues

5. Homeostaza psikologjike nënkupton një ekuilibër të sistemit:

- A) Respirator

- B) Urinar
- C) Gastro-intestinal
- D) Mendor

6. Në nevojat fiziologjike të pacientit bën pjesë :

- A) nevoja për siguri
- B) nevoja për dashuri
- C) nevoja për ujë
- D) nevoja për mbrojtje

7. Ndër parimet e normave etike të kujdesit shëndetësor bën pjesë:

- A) Vërtetësia
- B) Autonomia
- C) Besnikëria
- D) Besueshmëria

8. Cila nga këto nevoja fiziologjike është më e rëndësishme ndër të tjerat?

- A) Nevoja për oksigjen
- B) Nevoja për ujë
- C) Nevoja për ushqim
- D) Nevoja për gjumë

9. Aftësia për të influencuar tek të tjerët, për tu përpjekur për një vizion, qëllim ose për të ndryshuar quhet:

- A) Menaxhim
- B) Organizim
- C) Planifikim
- D) Lidërsip

10. Në parimet e ruajtjes së shëndetit bën pjesë?

- A) Gjendja emocionale
- B) Parandalimi i drogës dhe duhanit
- C) Biografia kulturore
- D) Faktorët socialë

11. Në qendër të të gjitha roleve infermierore është roli i infermieres si:

- A) Edukuese
- B) Menaxhuese
- C) Vendim marrëse
- D) Komunikuese

12. Në menaxhimin infermieror nuk bën pjesë:

- A) Planifikimi
- B) Organizimi
- C) Kontrolli
- D) Modifikimi

13. Nuk është pjesë e poliklinikës një nga ambientet e mëposhtme:

- A) Laboratori Biokimik
- B) Dhoma e injeksioneve
- C) Konsultat e Fëmijëve
- D) Salla Operatore

14. Kur një pacient ndodhet në ambulancën e pranimit mund të marrë disa drejtime për trajtimin e tij. Cili prej këtyre më poshtë nuk është i saktë?

- A) Në Terapinë Intensive
- B) Në Sallën Operatore
- C) Në Pavion
- D) Në Laborator

15. Një pacient pasi del nga salla e operacionit mund të transportohet në:

- A) Dhomë injeksionesh
- B) Terapinë intensive
- C) Laborator
- D) Mikrokirurgji

16. Sëmundjet kronike janë sëmundje të cilat kanë një kohëzgjatje:

- A) 1 muaj
- B) 2 muaj
- C) 3 muaj
- D) Mbi 3 muaj

17. Të dhënat historike janë informacione:

- A) Aktuale të gjendjes shëndetësore
- B) Mbi ecurinë e mëparshme të gjendjes shëndetësore
- C) Mbi përshkrimin individual të situatës shëndetësore
- D) Mbi situatën që do të pasojë gjendjen shëndetësore

18. Ndërhyrja në parandalimin tretësor synon?

- A) Edukimin shëndetësor
- B) Diagnostimin e sëmundjes
- C) Trajtimin e sëmundjes
- D) Parandalimin e komplikacioneve

19. Cila është ngjyra që perdoret për të lyer muret në sallat e operacionit?

- A) E bardhë
- B) E kuqe
- C) E verdhë
- D) Jeshile

20. Mledhja e të dhënave nga komunikimi me familjarët dhe klientin është etapa:

- A) E parë e kujdesit infermieror

- B) E dytë e kujdesit infermieror
- C) E tretë e kujdesit infermieror
- D) E katërt e kujdesit infermieror

21. Në mbledhjen e të dhënave për përcaktimin e diagnozës infermierore nuk bën pjesë një nga elementët e mëposhtëm:

- A) Observimi
- B) Kartela e mjekut
- C) Biseda me klientin
- D) Planifikimi

22. Hemoragjia nga hundet quhet:

- A) Epistaksis
- B) Petekje
- C) Eritema
- D) Hipoksi

23. Ekzaminimi i një regjoni me anë të goditjes quhet:

- A) Palpacion
- B) Perkusion
- C) Askultacion
- D) Vibracion

24. Të dhënat subjektive janë të dhëna që sigurohen nga:

- A) Testet diagnostikuese
- B) Testet laboratorike
- C) Pacienti dhe familjarët
- D) Observimi

25. Komunikimi intrapersonal është komunikimi që ndodh brenda:

- A) Një individ
- B) Dy individëve
- C) Një grup individësh
- D) Publik

26. Kufiri i një termometri varjon nga:

- A) 37-45 gradë Celsius
- B) 34-42.2 gradë Celsius
- C) 30-41.2 gradë Celsius
- D) 26-40 gradë Celsius

27. Rritja e temperaturës trupore mbi normalen quhet:

- A) Hipotension
- B) Hypertension
- C) Hipotermi

D) Hipertermi

28. Matja e pulsit apikalo-radial realizohet nga:

- A) 1 infermiere
- B) 2 infermiere
- C) 3 infermiere
- D) Vet pacienti

29. Administrimi topikal i medikamenteve realizohet në rrugë:

- A) Orale
- B) Parenterale
- C) Traktit respirator
- D) Lëkura & mukozat

30. Cila nga mënyrat e mëposhtëme të administrimit të medikamenteve nuk bën pjesë në administrimin parenteral?

- A) Intra/muskular
- B) Intra/venoz
- C) Sub/kutan
- D) Transdermal

31. Kur një medikament duhet të qëndrojë në stomak për efekt lokal pacienti pozicionohet?

- A) Dekubitus lateral dexter
- B) Dekubitus lateral sinister
- C) Pozicioni Fowler
- D) Pozicioni semi-fowler

32. Kur indi subkutan është i hollë ose kemi një age të gjatë injeksionet sub-kutane realizohen në kënd:

- A) 75 gradë
- B) 65 gradë
- C) 55 gradë
- D) 45 gradë

33. Injeksionet intra/muskulare nuk realizohen në muskulin:

- A) Gluteal
- B) Femoral
- C) Vastus-lateral
- D) Facial

34. Teknika zikzak e injektimit të medikamenteve realizohet në injeksionet:

- A) Intra/venoze
- B) Intra/muskulare
- C) Intra/dermale
- D) Sub/kutane

35. Metoda e administrimit të oksigjeno terapisë realizohet me anë të :

- A) Sondës nazo-gastrike
- B) Kateterit urinar
- C) Vigonit
- D) Kateterit nazal

36. Shtimi i masës qarkulluese në organizëm quhet:

- A) Hiperkalemi
- B) Hipokalemi
- C) Hipovolemi
- D) Hipervolemi

37. Sa përqind të peshës së përgjithshme trupore zë sasia totale e ujit në organizëm?

- A) 55-85%
- B) 45-75%
- C) 35-65%
- D) 25-55%

38. Cili nga këta elementë kimikë ka një rol të rëndësishëm në formimin e skeletit të trupit?

- A) Natriumi
- B) Kaliumi
- C) Kalciumi
- D) Magnezi

39. Cili nga këta përbërës kimikë dhe elementë kimikë ka një rol të rëndësishëm në acidozën dhe alkalozën metabolike?

- A)  $\text{HPO}_4$
- B) Cl
- C) Mg
- D)  $(\text{HCO}_3)^-$

40. Cili nga këto element nuk bën pjesë në makroelementët ushqimor?

- A) Uji
- B) Karboidratet
- C) Vitaminat
- D) Yndyrnat

41. Ulja e oreksit ose e dëshirës për të ngrënë quhet:

- A) Nauze
- B) Anoreksi
- C) Vomitus
- D) Flatulencë

42. Gjatë periudhës së dimrit proceset metabolike:

- A) Ulen
- B) Rriten

- C) Ndikohen nga gjinia
- D) Nuk ndryshojnë

43. Hapja kirurgjikale që bëhet në stomak nëpërmjet murit abdominal dhe shërben për ushqyerjen e pacienti quhet:

- A) Tonsilectomi
- B) Laringostomi
- C) Gastrostomi
- D) Faringostomi

44. Procesi i zbrazjes së vezikës urinare quhet:

- A) Meatus
- B) Uretër
- C) Miksion
- D) Sfinkter

45. Zbrazja e vezikës urinare tek adultët ndodh kur në veshkë janë grumbulluar:

- A) 50-150 ml/urinë
- B) 100-200 ml/urinë
- C) 150-250 ml/urinë
- D) 200-300 ml/urinë

46. Sasia e urinës që mbetet në vezikë pas urinimit quhet:

- A) Poliuri
- B) Anuri
- C) Oliguri
- D) Urinë reziduale

47. Prania e pusit në urinë quhet:

- A) Glukozuri
- B) Piuri
- C) Hematuri
- D) Dizuri

48. Urinimi i shpeshtë gjatë natës, vecanërisht kur nuk janë marre sasi të mëdha lëngjesh quhet:

- A) Inkontinencë urinare
- B) Polakiuri
- C) Nikturi
- D) Piuri

49. Sa është sasia e solucionit që shërben për të fryrë balonin e kateterit foley gjatë procesit të kateterizimit urinar?

- A) 5 ml
- B) 10 ml
- C) 15 ml
- D) 20 ml

50. Hemokultura është një analizë gjaku:

- A) Biokimike
- B) Klinike
- C) Bakteriologjike
- D) Parazitologjike

51. Ekzaminimi bakterologjik i feçeve quhet:

- A) Hemokulturë
- B) Koprokulturë
- C) Urokulturë
- D) Parazitologjike

52. Në pozicionet e qëndrimit shtrirë në planin horizontal të pacientit nuk bën pjesë:

- A) Dekubitus dorsal
- B) Dekubitus ventral
- C) Dekubitus lateral
- D) Pozicioni ortopne

53. Gjatë vendosjes së pacientit në pozicion semi-Fowler shpina formon me shtratin një kënd:

- A) 90 gradë
- B) 60 gradë
- C) 45 gradë
- D) 25 gradë

54. Plagët që krijohen nga qëndrimi në shtrat për një kohë të gjatë ose nga presioni quhen;

- A) Ulçera sipërfaqësore
- B) Ulçera të thella
- C) Dekubitus
- D) Imobilitet

55. Cili ndër këta faktor ka më tepër ndikim në formimin e dekubitusëve?

- A) Anemia
- B) Lageshtia
- C) Vit. C
- D) Temperatura

56. Paftësia për të bërë një gjumë cilësor quhet:

- A) Narkolepsi
- B) Insomnia
- C) Apnea e gjumit
- D) Somnambulizëm

57. Paftësia e zotërimit të defekimit të feçeve dhe gazrave nga anusi quhet:

- A) Diarre
- B) Koprolite



- C) Konstipacion
- D) Inkontinencë fekale

58. Egzaminimi i një organi ose i një regjoni me anë të prekjes quhet:

- A) Askultacion
- B) Perkusion
- C) Palpacion
- D) Vibracion

59. Matja e temperaturës orale nuk është e sigurtë:

- A) Te pacientët me diarre
- B) Te pacientët e djersitur
- C) Te pacientët me episode krizash
- D) Te pacientët me konstipacion

60. Rritja e shpejtësisë së pulsit mbi 100 rrahje në minutë quhet:

- A) Takipne
- B) Takikardi
- C) Bradipne
- D) Bradikardi

61. Natriumi është një element i cili merr pjesë në :

- A) Tkurrjen muskulare
- B) Metabolizmin e karbohidrateve
- C) Ruajtjen e ekulibrit acido-bazik
- D) Balancën hidrike

62. Cila është sasia e oksigjenit që jepet me anë të kanjules nazale?

- A) 1l/min
- B) 2-4l/min
- C) 5-7 l/min
- D) 6-8 l/min

63. Nga mëngjesi në darkë temperatura e trupit ndryshon?

- A) me 0.2 gradë Celsius
- B) me 0.4 gradë Celsius
- C) me 0.6 gradë Celsius
- D) me 1 gradë Celsius

64. Ulja e frekuencës së pulsit nën 60 rrah/min quhet:

- A) Takipne
- B) Takikardi
- C) Bradipne
- D) Bradikardi

65. Cili nga këta muskuj është më i përdorshmi për bërjen e injeksioneve intramuskular?

- A) Gluteal
- B) Vastus lateral
- C) Deltoid
- D) Femoral

66. Në rregullat e kujdesit shëndetësor bën pjesë:

- A) Drejtësia
- B) Vërtetësia
- C) Jokeqdashje
- D) Bamirësia

67. Parandalimi dytësor konsiston:

- A) Programet e edukimit shëndetësor
- B) Imunizimin e efekteve të sëmundjes
- C) Trajtimin dhe izolimin e sëmundjes
- D) Diagnostikimin e sëmundjes

68. Cila është temperatura që duhet të ruhet në ambientet spitalore?

- A) 21-26 gradë celcius
- B) 22-27 gradë celcius
- C) 26-28 gradë celcius
- D) 20-22 gradë celcius

69. Diagnoza mjekësore:

- A) Është e drejtuar nga patologjia dhe zgjat aq kohë sa zgjat sëmundja
- B) Përshkruan përgjigjen e personave për sëmundjen
- C) Trajton të sëmurin
- D) Identifikon një simptomë të caktuar

70. Matja e temperaturës rektale nuk është e sigurtë te:

- A) Pacientët me episode krizash
- B) Pacientët që kanë bërë ndërhyrje në zonën rektale
- C) Pacientët me të vjella
- D) Pacientët me konstipacion

71. Sa përqind të peshës së përgjithshme trupore zë lengu intersticial?

- A) 5 %
- B) 10 %
- C) 15 %
- D) 20 %

72. Sa përqind të oksigjenit në gjak transporton Hb?

- A) 90 %
- B) 93 %
- C) 97 %
- D) 99 %

73. Ne qofte se një infermiere përvetëson sendet personale të një pacienti ajo ka thyer:
- A) Kodin etik
  - B) Ligjin
  - C) Deontologjinë
  - D) Vlerat
74. Pasi jepen medikamentet me anë të tubit nazogastrik pacienti vendoset në pozicion:
- A) Shtrirë nga e majta
  - B) Shtrirë nga e djathta
  - C) Semi-Fowler
  - D) Fowler
75. Jonet e kalciumit kryejnë këtë funksion në sinaps:
- A) Transmetimin e impulseve nervore
  - B) Transmetimin e impulseve elektrike
  - C) Nxiti aktivitetin e enzimave
  - D) Nxiti aktivitetin e karbohidrateve
76. Orificiumi i jashtëm i uretrës quhet:
- A) Meatus
  - B) Miksion
  - C) Polakiuri
  - D) Poliuri
77. Paaftësia për të kontrolluar shkarkimin e urinës nga vezika urinare quhet:
- A) Oliguri
  - B) Retesion urinar
  - C) Inkontinencë urinare
  - D) Anuri
78. Pamundësia për të qëndruar në gjumë për shkak të zgjimeve të shpeshta quhet insomni:
- A) fillestare
  - B) Sekondare
  - C) Terminale
  - D) Intermitente
79. Një vale e papritur mbingarkese me gjumë që ndodh gjatë ditës quhet:
- A) hipersomni
  - B) narkolepsi
  - C) parasomni
  - D) Insomni
80. Infeksionet urinare që ndodhin nga vendosja e kateterit të vezikës urinare mund të shkaktohen nga :
- A) Mos respektimin i teknikës aseptike

- B) Mos futja siç duhet e kateterit
- C) Mos larja e duarve të pacientit
- D) Mos funksionimi siç duhet i uretrës

81. Rritja e hematokritit mund të jetë tregues i:

- A) Anemisë
- B) Infeksionit
- C) Hemorragjisë
- D) Dehidrimit

82. Ecja në gjumë quhet:

- A) Insomni
- B) Hipersomni
- C) Parasomni
- D) Somnambulizëm

83. Cili është raporti antikoagulant /gjak që duhet për marjen e një analize?

- A) 0.3ml/5ml
- B) 0.5ml/3ml
- C) 0.5-0.3ml
- D) 0.5ml/5ml

84. Metodat për kontrollimin e tubit nazogastrik:

- A) Tubi futet me ane të gastrostomise
- B) Tubi futet me anë të një incizioni
- C) Fut me anë të shiringës pak ajër në fund të tubit
- D) Fut me anë të shiringës pak gjak në fund të tubit

85. Sa zbritet përqindja metabolike gjatë gjumit?

- A) 5-9 %
- B) 10-15 %
- C) 16-20 %
- D) 21-25 %

86. Ulçerat që fillojnë në shtresat subkutane mbi një dalje kockore dhe më pas zgjerohen dhe në sipërfaqe quhen:

- A) Ulçera sipërfaqësore
- B) Ulçera të thella
- C) Nekrozë sipërfaqësore
- D) Nekrozë që depërton në thellësi

87. Cili nga këto pozicione nuk bën pjesë në vendosjen e pacientit në plan horizontal?

- A) Dekubitus lateral
- B) Dekubitus dorsal
- C) Dekubitus ventral
- D) Fowler

88. Ulja e dendesisë së urinës nën vlerën 1010-1030 haset në semundje të:

- A) Heparit
- B) Diabetit
- C) Veshkave
- D) Stomakut

89. Testi widal është një metodë që mund të përdoret për diagnozë në:

- A) Sëmundjet infektive
- B) Tifo abdominale
- C) Sëmundjet pulmonare
- D) Cirrozë hepatike

90. "Ca" është një kation i cili merr pjesë në këto funksione:

- A) Transmetimin e impulseve nervore
- B) Transmetimin e impulseve elektrike
- C) Krijimin e impulseve nervore
- D) Krijimin e impulseve elektrike

91. Hipertension quhet kur presioni arterial i matur i gjakut është:

- A) Në vlerat 140/90 mmHg
- B) Në vlerat 140/90 mmHg
- C) Mbi vlerat 140/90 mmHg
- D) Mbi vlerat 160/100 mmHg

92. Cili nga vëndet e matjes së temperaturës është më pak i sakti?

- A) Rektale
- B) Orale
- C) Aksilare
- D) Temporale

93. Në administrimin e injeksioneve s/c bëhet:

- A) Tërheqje e lëkurës
- B) Mbledhje e lëkurës
- C) Shtypje e lëkurës
- D) Tendosje e lëkurës

94. Në administrimin e injeksioneve intramuskulare bëhet:

- A) Tërheqje e lëkurës
- B) Mbledhje e lëkurës
- C) Shtypje e lëkurës
- D) Tendosje e lëkurës

95. Për të shtuar lagështirën e mjedisit në dhomën e pacientit përdoret:

- A) Ventilator
- B) Vaporizator

- C) Kondicioner
- D) Oksigjen I lagështuar

96. Diagnoza infermierore:

- A) është e drejtuar nga patologjia
- B) zgjat aq kohë sa vazhdon sëmundja e personit
- C) trajton sëmundjen
- D) trajton të sëmurin

97. Injeksionet jepen në rrugë :

- A) Orale
- B) Paranterale
- C) Endogjene
- D) Egzogjene

98. Deontologjia është:

- A) Një sistem i parimeve fiziologjike
- B) Teoria e obligimit moral
- C) Kodi udhëheqës
- D) Vlerë individuale

99. Metakomunikimi është:

- A) Shkëmbimi i mesazhit pa përdorur fjalët
- B) Mesazhet që kërkojnë përdorimin e teknikave efektive të komunikimit
- C) Mesazhi që transponon qëndrimin e dërguesit ndaj vetes dhe mesazhit
- D) Proçes mësimi dhe interpretimi

100. Matja direkte (monitorim invaziv) e presionit të gjakut përfshin :

- A) Metodën auskultative
- B) Metodën palpuese
- C) Futjen e një kateteri në arterien radiale ose femorale
- D) Asnjëra

101. Sistola është periudha kur ventrikujt e zemrës janë:

- A) Të relaksuar
- B) Të kontraktuar
- C) Gjysëm të kontraktuar
- D) Gjysëm të relaksuar

102. Eshtë identifikuar dhe quajtur si pionerja dhe themeluesja e infermieristikës moderne dhe botërore, si dhe një reformatore e spitaleve:

- A) Patricia Benner
- B) V. Henderson
- C) Florence Nightingale
- D) D.E.Johnson

103. Dita Ndërkombëtare e Infermierit është vënë në nder të ditëlindjes së Florence Nightingale, dhe është më :

- A) 12 Mars
- B) 12 Prill
- C) 12 Maj
- D) 12 Qershor

104. Njihet si Infermiera dhe Themeluesja e Infermieristikës Shqiptare:

- A) Safka Kushi
- B) Esmë Pojani
- C) Zonjusha Austriake
- D) Asnjëra

105. Respiracioni i shpejtë shoqëron temperaturën e organizmit:

- A) Më të lartë se normale
- B) Më të ulët se normale
- C) Të pandryshueshme
- D) Relativisht e barabartë

106. Bradipnea është frekuenca respiratore:

- A) Nën 18 respiracione/minutë
- B) Mbi 20 respiracione/minutë
- C) Mbi 30 respiracione/minutë
- D) Nën 12 respiracione/minutë

107. Plotësimi i nevojave themelore të qënieve njerëzore janë një element i domosdoshëm për të ruajtur :

- A) Homeostazën fiziologjike
- B) Homeostazën psikologjike
- C) Homeostazën fiziologjike dhe psikologjike
- D) Asnjëra

108. Lidërshtipi, i cili përfshin ndjekësit e tij në zgjidhjen e problemeve, në marrjen e vendimeve dhe pjesëmarrjen e lirë në diskutime quhet:

- A) Lidërshtipi drejtues ose autoritar
- B) Lidërshtipi pjesëmarrës ose demokratik
- C) Lidërshtipi drejtues dhe pjesëmarrës
- D) Asnjëra

109. Kur indet subkutanë është i trashë, injeksionet subkutane bëhen me kënd:

- A) 45 gradë
- B) 70 gradë
- C) 80 gradë
- D) 90 gradë

110. Sasia maksimale e dhënies së medikamenteve në injeksione intra-muskulare në mililitra është:

- A) 1 mililitra
- B) 3 mililitra
- C) 5 mililitra
- D) 7 mililitra

111. Në Parimet e ruajtjes së shëndetit nuk bën pjesë:

- A) Ushqyerja
- B) Praktikrat familjare
- C) Ushtrimet
- D) Mos përdorimi i drogës dhe duhanit

112. Sëmundja Adison karakterizohet nga funksionimi jo i plotë i gjëndrës:

- A) Adrenale
- B) Hipofizës
- C) Tiroides
- D) Paratiroide

113. Parandalimi i vërtetë realizohet tek pacientët, të cilët konsiderohen fizikisht dhe emocionalisht të

shëndetshëm. Ai ndryshe quhet:

- A) Parandalimi parësor
- B) Parandalimi dytësor
- C) Parandalimi tretësor
- D) Parandalimi parësor, dytësor dhe tretësor

114. Përthithja më e shpejtë e medikamenteve bëhet në rrugë:

- A) Orale
- B) Venoze
- C) Subkutane
- D) Intradermale

115. Një ndërprerje e përkohshme frymëmarrjes (shpesh duke fjetur) që zgjat të paktën 10 sekonda quhet:

- A) Takipne
- B) Bradipne
- C) Apne
- D) Asnjëra

116. Prania e qelizave epiteliale në urinë duhet të jetë:

- A) Negativ
- B) E rrallë
- C) E shpeshtë
- D) Mesatare



117. Gjatë retensionit urinar vezika urinare:

- A) Është e boshatisur
- B) Është gjysëm e mbushur
- C) Ka pak urinë reziduale
- D) Fryhet deri sa arrin umbelikusin

118. Dizuria është:

- A) Urinim i pakët
- B) Urinim i tepërt
- C) Vështirësi në urinim
- D) Paaftësi për të urinuar

119. Procesi i observimit është mbledhja e të dhënave duke:

- A) përdorur shqisat
- B) përdorur informacionin nga pacienti
- C) përdorur informacionin nga kartela e mjekut
- D) shqyrtuar rezultatet laboratorike

120. Observimi me anë të dëgjimit quhet:

- A) Perkusion
- B) Askultacion
- C) Palpacion
- D) Asnjëra

121. Informacioni që dërgohet ose shprehet nga dërguesi gjatë një procesi komunikimi quhet:

- A) Referent
- B) Mesazh
- C) Marrës
- D) Mjedis

122. Pikëpamjet personale rreth ngjarjeve që ndodhin në një mjedis quhen:

- A) Perceptime
- B) Emocione
- C) Vlera
- D) Besime

123. Një individ mund të qëndrojë pa ujë:

- A) 2-3ditë
- B) 3-5ditë
- C) 5-7ditë
- D) 8-9ditë

124. Lidhja ndihmuese është lidhja:

- A) Infermier-infermier
- B) Infermier-Mjek
- C) Infermier-Pacient

D) Pacient -Familjar

125. Aftësia për të kuptuar, pranuar jetën e një personi tjetër dhe për të saktësuar ndjenjat perceptuese quhet:

- A) Kujdes
- B) Empati
- C) Besim
- D) Reciprocitet

126. Pulsu qendror është pulsi i cili matet:

- A) në arterien temporale
- B) në arterien brakiale
- C) në arterien carotis
- D) në arterien radiale

127. Pakësimi i masës muskulare si quhet:

- A) atrofi
- B) atoni
- C) plogështi
- D) kontrakturë

128. Në karakteristikat e një lidhje ndihmuese nuk bën pjesë:

- A) besimi
- B) empatia
- C) kujdesi
- D) testimi

129. Analiza e cila shërben për të matur çrregullimet acido-bazike në gjak quhet:

- A) Niveli i protrombinës
- B) Koha howell
- C) Hemokultura
- D) Gazanaliza e gjakut

130. Kur diagnoza nuk është e saktë dhe nuk është vendosur që pacienti të shtrohet ai dërgohet në:

- A) në sallën e operacionit
- B) në terapinë intensive
- C) në pavion ose në klinikë
- D) dhomën e observimit

131. Ulja e nivelit të dioksidit të karbonit në gjak quhet:

- A) Hiperventilim
- B) Hipoventilim
- C) Hiperkapni
- D) Hipokapni

132. Një respiracion i shpejtë dhe shumë i thellë quhet:

- A) Hiperventilim
- B) Hipoventilim
- C) Respiracion i thellë
- D) Respiracion i cekët

133. Cili nga këta elementë nuk bën pjesë në faktorët e jashtëm të mjedisit që ndikojnë në shëndetin e pacientit:

- A) kontrolli i ndriçimit
- B) përdorimi i ngjyrave
- C) kontrolli i lagështirës
- D) nevoja për dashuri dhe ngrohtësi

134. Hipoventilimi është:

- A) shtim i frekuencës respiratore
- B) pakësim i frekuencës respiratore
- C) ventilim i ulët dhe i papërshtatshëm
- D) rritje e kapacitetit vital

135. Hipoksemi quhet:

- A) rritja e nivelit të dioksidit të karbonit në gjak
- B) reduktimi i nivelit të dioksidit të karbonit në gjak
- C) rritja e nivelit të oksigjenit në gjak
- D) reduktimi i nivelit të oksigjenit në gjak

136. Vala e gjakut e krijuar nga tkurrja e ventrikulit të majtë të zembrës quhet:

- A) Presion arterial
- B) Puls
- C) Takikardi
- D) Bradikardi

137. Presioni i ulët i gjakut që ndodh kur personi ngrihet nga pozicioni ulur apo shtrirë në këmbë quhet:

- A) Hipertension
- B) Hipotension Ortostatik
- C) Hipotension
- D) Asnjëra

138. Ekzaminimi bakterologjik i feçeve quhet:

- A) Koprokulturë
- B) Urokulturë
- C) Hemokulturë
- D) Asnjëra

139. Injektimi i një substance medikamentoze nën lëkurë quhet :

- A) Injeksion i/m

- B) Injeksion s/c
- C) Injeksion i/d
- D) Injeksion i/v

140. Cila nga rrugët e mëposhtme nuk është një rrugë ushqyerjeje për pacientin:

- A) Gastrostomia
- B) Sonda nazo-gastrike
- C) Rruga intavenoze
- D) Kanjula nazale

141. Sasia e urinës që mbetet në vezikën urinare pas aktit të urinimit quhet:

- A) Retension urinar
- B) Oliguri
- C) Inkontinencë urinare
- D) Urina reziduale

142. Urinimi i shpeshtë gjatë natës quhet:

- A) Narkolepsi
- B) Hematuri
- C) Dizuri
- D) Nikturi

143. Masa fekale e forcuar e grumbulluar dhe e ngecur në rektum dhe në raste të rënda gjendet në sigmoide, e cila është e pamundur për tu nxjerrë jashtë quhet:

- A) Konstipacion
- B) Koprolite
- C) Tenezma
- D) Dhimje rektale

144. Presioni diastolik është kur ventrikuli i majtë është:

- A) i kontraktuar
- B) gjysëm i kontraktuar
- C) i relaksuar
- D) gjysëm i relaksuar

145. Paaftësia e zotërimit të defekimit të feçeve dhe të gazrave nga anusi quhet:

- A) Inkontinenca fekale
- B) Inkontinenca urinare
- C) Diarrea
- D) Konstipacion

146. Shtimi i numrit të defekimit në ditë dhe nxjerrja e feçeve të paformuara dhe të lëngshme quhet:

- A) Diarre
- B) Laksativ
- C) Koprolite

D) Infeksione intestinale

147. Përdorimi i laksativëve ose i klizmave pastruese bëhet në rast se ndodh:

- A) Diarre
- B) Konstipacion
- C) Inkontinenca fekale
- D) Inkontinenca urinare

148. Dhimbja që shkaktohet si rrjedhojë e dëmtimeve të mbaresave nervore periferike ose nga dëmtimi i sistemit nervor qendror quhet:

- A) Dhimbje neuropatike
- B) Dhimbje viscerale
- C) Dhimbje somatike
- D) Dhimbje akute

149. Ruajtja e ekuilibrit hidrik është një pjesë e sistemit të brendshëm hemostatik dhe çrregullohet nëse:

- A) çrregullohet ekuilibri elektrolitik
- B) çrregullohet presioni osmotik
- C) çrregullohet ngrohja trupore
- D) çrregullohet ekuilibri acido-bazik

150. Cila nga elementët e mëposhtëm është mikroelementë?

- A) Uji
- B) Proteinat
- C) Yndyrnat
- D) Vitaminat

151. Aparati i cili shërben për të matur Kapacitetin Total Pulmonar quhet:

- A) Oksimetër
- B) Monitor
- C) Spirometër
- D) Aspirator

152. Grumbullimi i gjakut në kavitetin pleural quhet:

- A) Pneumotoraks
- B) Hemotoraks
- C) Hidrim
- D) Lagështim

153. Jonet Fosfat ( $\text{HPO}_4^{3-}$ ) janë:

- A) katione
- B) anione
- C) minerale
- D) elektrolite

154. Pozicioni më i përshtatshëm për pacientët me probleme respiratore është pozicioni fowler i cili përdoret për të ndihmuar:

- A) Menaxhimin e stresit
- B) Riaktivizimin e aparatit kardiopulmonar
- C) Zgjerimin e mushëkrive
- D) Teknikat relaksuese

155. Drenimi i hapësirës pleurale për të nxjerrë ajrin nga kjo hapësirë realizohet në rast:

- A) Pneumoperitoneumi
- B) Hemotoraksi
- C) Pneumotoraksi
- D) Hemartroze

## **02. Infermieristik Pediatrie, Infermieristik Puerikulture Dhe Infermieristik Neonatologjie**

1. Sa është koha që duhet të përdorim, që të stimulojmë respiracionin dhe të parandalojmë apneë?

- A) 3-4 min
- B) 5-10min
- C) 10-15min
- D) 15-20min

2. Aspirimi i lëngut amniotik tek fëmija gjatë lindjes duhet të kryhet jo më shumë se?

- A) 5sek
- B) 10sek
- C) 10min
- D) 15min

3. Pas sa orësh normalizohet temperatura pas lindjes?

- A) 6 minuta
- B) 8 minuta
- C) 5 orë
- D) 8 orë

4. Kush është pozicioni që ushqehet fëmija me çrregullim të buzës të lepurit?

- A) shtrirë mbi bark
- B) shtrirë anash
- C) gjysëm vertikal
- D) shtrirë me kurriz

5. Aplikimi i vitaminës K tek i porsalinduri bëhet:

- A) në dozën 1 mg IM
- B) në dozën 0.5 mg IM
- C) në dozën 1 mg IV
- D) në dozën 0.5 mg IV

6. Me çfarë solucioni pastrohet mukoza e gojës në fëmijët me stenoza të pilorit?

- A) Bikarbonat
- B) Nitrat
- C) Gencian violet
- D) Glukoz

7. Edema serosanguine shoqërohet me:

- A) Fraktura të kafkës
- B) Petekie ose ekimoza
- C) Shkollitje të lëkurës
- D) Deformim të gojës

8. Cefalohematoma është një hemorragji që ndodh në zonën ndërmjet:

- A) lëkurës dhe kockës
- B) kockës dhe periostit
- C) trurit dhe kockës
- D) periostit dhe trurit

9. Zhvillimi pamor i fëmijës së porsalindur është rreth një gjatësie:

- A) 20 cm
- B) 40 cm
- C) 50 cm
- D) 60 cm

10. Fëmija fillimisht kur lind aspirohet nga:

- A) hunda
- B) goja
- C) veshi
- D) syri

11. Në cefalohematomë vlerësohet si ndërlikim:

- A) shfaqja e ikterit
- B) humbja e kujtesës
- C) çrregullimi i temperaturës
- D) çrregullimi i frymëmarrjes

12. Gjatë fototerapisë tek i porsalinduri, duhet të mbulohet:

- A) koka
- B) sytë
- C) gjymtyrët
- D) asnjë pjesë e trupit

13. Cilat janë shenjat që fëmija paraqet në një frakturë të klavikulës?

- A) Asimetri në refleksin moro
- B) Paraliz të krahut

- C) Një hemoragji të krahut
- D) Demtime të trupit

14. Sa janë vlerat e bilirubinës kur ikteri fiziologjik ka filluar të shfaqet në anësit e poshtme?

- A) 10 mg/dl
- B) 15 mg/dl
- C) 20 mg/dl
- D) 25 mg/dl

15. Paraplegjia prek këto regjione:

- A) Vetem 1 gjymtyre
- B) Vetem 1 pjese te trupit
- C) Kater gjymtyret dhe trupin
- D) 2 kembet dhe trungun e trupit

16. Faza sensomotore kujt moshe i perket sipas Piazhes:

- A) lindje deri ne 2vjeç
- B) 3 deri në 4 vjeç
- C) 5 deri në 7 vjeç
- D) 8 deri në 10 vjeç

17. Shpirti i inisiatives kundrejt ndjenjës së fajit kujt moshe i perket?

- A) Lindje deri 2 vjec
- B) 3-6vjec
- C) 7-11 vjeç
- D) 13-15vjec

18. Rrugët e infektimit të eritrodermes jane:

- A) Transplacentare
- B) Ushqyerja artificiale
- C) Frymëmarrja
- D) Veshjet

19. Presioni sistolik i gjakut tek infanti:

- A) 15- 20
- B) 30-40
- C) 50-60
- D) 70-90

20. Presioni sistolik i gjakut tek fëmijet e vegjël eshte:

- A) 15-20
- B) 30-40
- C) 50-70
- D) 80-100

21. Presioni sistolik i gjakut tek fëmijet e rritur:



- A) 15-20
- B) 20-40
- C) 50-70
- D) 90-110

22. Me çfare shenjash shoqërohet atrezia biliare?

- A) Distension abdominal
- B) Dhimbje këmbë
- C) Dhimbje koke
- D) Nauze

23. Manifestimet klinike të sindromës hemoragjike janë:

- A) gjakoqje te umbelikut
- B) dhimbje barku
- C) dhimbje këmbë
- D) nauze

24. Simptomat e tetanozit neonatal janë:

- A) spazma të muskulaturës së qafës dhe rigiditet
- B) te vjella
- C) diarre
- D) dhimbje barku

25. Shenja klinike e paralizës faciale është se nuk:

- A) mbyll plotesisht syrin
- B) merr dot frym
- C) lëviz krahun
- D) lëviz trupin

26. Sipas Frojdit kujt moshe i perket stadi latent?

- A) 1-4 vjeç
- B) 6-12 vjeç
- C) 15-18 vjeç
- D) 20-25 vjeç

27. Apneja shoqërohet me:

- A) bradikardi
- B) dhimbje barku
- C) nauze
- D) diarre

28. Mund që çojnë në hernie umbilikale?

- A) shtrëngimi në momentin e jashtëqitjes
- B) dhimbje këmbë
- C) dhimbje barku
- D) dhimbje koke

29. Cili është faktori që ka lidhje me sindromin hemorragjik?  
A) Mungesa e vitaminës K nga nëna  
B) Mungesa e oreksit  
C) Nauzea  
D) Diarrea
30. Paraliza e nervit frenik shkakton paralize të:  
A) diafragmës  
B) krahut  
C) kembës  
D) barkut
31. Çfarë ndodh në organizëm në fazën e 5 të helmimit nga hekuri?  
A) Zhvillohet stenoza e pilorit  
B) Dëmtim të mëlçis  
C) Dëmtim të veshkave  
D) Dëmtim të zembrës
32. Tek kriza vazo-okluzive e drepanocitozes simptomat më madhore janë:  
A) artralgi  
B) temperature  
C) anemi  
D) marrje mendsh
33. Kur epistaksin e kemi nga arteria etmoide, ka lidhje më shume me:  
A) traumat  
B) sëmundjet sistemike  
C) dëmtime të zembrës  
D) dëmtime të gojës
34. Në rast se trupi i huaj është i vogël dhe kalibri i bronkut i madh do kemi këto shenja:  
A) fishkëllim  
B) vështirësi të frymarrjes  
C) sekrecione  
D) dispne
35. Në rast se trupi i huaj ka bërë një bllokim të pjesshëm të lumenit do kemi:  
A) emfizem obstruktive  
B) atelektaze  
C) pneumotoraks  
D) bronkit
36. Kur kemi një infeksion te adenoidit kemi këto shenja kryesore:  
A) dhimbje veshi  
B) frymemarrje me gojë

- C) gjakrrjedhje nga hunda
- D) gërrhitje

37. Respiracioni i pafrytshëm lidhet me:

- A) deficitin e volumit të lëngjeve
- B) rritjen e kërkesave metabolike
- C) rritjen e sekrecioneve
- D) inflamacionin e pemës trakeo-bronkiale

38. Gromerulonefriti akut futet në grupin e sëmundjeve të sistemit urinar, ku ato quhen:

- A) reaksion inflamator
- B) reaksion indor
- C) ulje të imuniteti
- D) sëmundje infektive

39. Në astmë, faktori endokrinologjik si tireotoksikoza:

- A) e përmirëson astmën
- B) e agravon gjëndjen
- C) nuk ndikon fare
- D) ka ndikim të papërfillshëm

40. Tek astma, cilat janë elemente që kanë veprim obstruktiv mbi bronke?

- A) makrofaget
- B) monocidet
- C) bikarbonati
- D) glukonate

41. Shenjat e intoksikimit nga digogsina jane:

- A) nauze
- B) lipotemi
- C) hipoglicemi
- D) anoreksi

42. Tek astma frymemarrja e pafrytshme lidhet me:

- A) bllokimin e rrugëve ajrore
- B) përmirësimin e sëmundjes
- C) përgjigjjen jo të mirë ndaj mjekimit
- D) sekrecionet e shumta

43. Astma përfaqëson një:

- A) Dëmtim funksional
- B) Obstruksion te rrugeve respiratore
- C) Sekrecione të shumta
- D) Mjekime jo specifike

44. Haemarthrosis është gjakrrjedhje ne:

- A) toraks
- B) SNQ
- C) artikulacione
- D) traktin gastro-intestinal

45. Parotiti është një sëmundje:

- A) e gjëndrave limfatike
- B) endemike sporadike
- C) enët e gjakut
- D) sistemin nervor

46. Shkaktari i fruthit është virusi :

- A) RNA
- B) i grupit të herpoviruseve
- C) i fruthit
- D) i gripit

47. Në bronkiolit pas hyrjes së virusit kemi këto pasoja:

- A) vështirësi në frymarrje
- B) infiltrim peribronkial
- C) bllokim të anës së prekur
- D) zmadhim të anës së prekur

48. Tipari karakteristik i fibrozës cistike është:

- A) disfunktion i sipërfaqeve epiteliale
- B) mosfunktionimit të shkëmbimit të brëndshëm të gjëndrave
- C) disfunzioni i bërthamës qelizore të gjëndrave.
- D) mos oksigjenimi i organizmit

49. Fibroza cistike vjen si pasojë e çrregullimit të fluksit hidroelektrolitik:

- A) midis gjëndrave
- B) midis sistemeve
- C) transepitelial
- D) i enëve të gjakut

50. Metodat për përcaktimin e testit për fibrozën cistike bëhen pas muajit :

- A) të parë të jetës
- B) të gjashtë të jetës
- C) të tretë të jetës
- D) të dymbëdhjetë të jetës

51. Tek fibroza cistike dozat e enzimave do jepen në bazë të :

- A) deficitit të enzimave
- B) sipas oreksit
- C) sipas harxhimeve në organizëm
- D) humbjeve të gjakut

52. Rreziku për ndryshimin e funksionit kardio-vaskular lidhet me :

- A) pamjaftushmërin e punës së zemrës
- B) mungesën e mjekimit
- C) pamundësin për të kuptuar gjëndjen
- D) pamjaftushmerin e lëndëve proteinike

53. Tek të sëmurët me probleme kardiake digogsina shkakton:

- A) reduktim të të rrahurave të zemrës
- B) rritje të të rrahurave të zemrës
- C) neutralizim të të rrahurave të zemrës
- D) ndalje të punës së zemrës

54. Anemia vjen si pasojë e :

- A) uljes së masës leukocitare
- B) prodhimit gabim të leukociteve
- C) uljes se mases eritrocitare
- D) rritjes se masës eritrocitare

55. Në dëmtimet kronike renale, ulja e filtrimit renal, fillon nga rritja e:

- A) pH
- B) produktit të katabolizimit të proteinave
- C) nivelit te serumit te fosfateve
- D) nivelit te yndyrnave

56. Ne stadin e dytë shiriti i gjedhit migron për në :

- A) mëlçin
- B) mushkri
- C) tru
- D) veshka

57. Pas sa kohësh kemi ulçeracion të plagës nga pickimi i merimangës së zezë?

- A) 3-4 dite
- B) 7-14 dite
- C) 15-20 dite
- D) 22-27 dite

58. Veprimi i zgjatur ultralent i insulinës e ka kulmin pas sa orësh të injektimit subkutan

- A) 2-4 orë
- B) 6-12 orë
- C) 14-24 orë
- D) 28-36 orë

59. Sa është sasia e lëndëve rehidruese (Trisol) për ml/kg/peshë, që nevojiten në 24 orë në dehidrimin e lehtë nga diarrea?

- A) 30

- B) 50
- C) 70
- D) 100

60. Në dehidrimin e rëndë sasia për ml/kg/Peshë e likideve intravenoze që nevojiten në 24 orë janë:

- A) 70
- B) 100
- C) 150
- D) 250

61. Cila është koha që fëmija riinfekton veten me oksiure?

- A) 6-10 orë
- B) 3-5 ditë
- C) 6-8 javë
- D) 10-15 javë

62. Cila dhimbje tregon se fëmija ka askaride?

- A) Abdominale
- B) Muskujsh
- C) Koke
- D) Këmbe

63. Shenjat klinike të Trichinosis janë:

- A) dhimbje koke
- B) anemi
- C) enjte të syve
- D) kollë

64. Karakteristikat e dhimbjes të pickimit nga merimanga janë:

- A) fillon brenda një dite pas pickimit
- B) përhapet nga vendi i pickimit në kokë
- C) imiton një apendisit akut
- D) shoqërohet me prurit

65. Gjatë helmimit bëjme futjen e sondës gastrike dhe aplikojmë tretësire kripore:

- A) 10-25 ml
- B) 30-40 ml
- C) 50-80 ml
- D) 100-120 ml

66. Shenjat klinike të helmimit nga hidrokarburet janë:

- A) ndryshime të vetëdijes
- B) oliguri
- C) dehidrim
- D) anemi

67. Pas sa kohësh ndodh periudha e fshehte tek helmimi nga acetaminofeni?

- A) 2-4 sekonda
- B) 8-16 minuta
- C) 24-36 ore
- D) 7-10 ditë

68. Pas të vjellave fëmija vëzhgohet për shenja të dehidrimit, të cilat janë:

- A) thellim të syve
- B) dhimbje barku
- C) dhimbje koke
- D) thellim të syve, dhimbje barku e koke

69. Cilat janë shenjat e idiosinkrazise?

- A) Dilatim i pupilave
- B) Puls
- C) Dhimbje barku
- D) Nauze

70. Çfarë shenjash ka stomatiti Vincent?

- A) Gjakrrjedhje nga gingivat
- B) Të vjella
- C) Dhimbje të gjymtyrëve
- D) Diarre

71. Zhvillimi i alergjise ndikohet nga :

- A) lloji i kontaktit
- B) dhimbjet e barkut
- C) diare
- D) të vjellat

72. Si pasojë e mungesës së vitaminës D, kemi çrregullime si:

- A) dhimbje barku
- B) nauze
- C) diarre
- D) vonesë në mbylljen e fontanelës

73. Tetania lidhet me çrregullimin e :

- A) joneve të Natriumit
- B) joneve të Kalciumit
- C) joneve të Klorit
- D) joneve të Natriumit, Kalciumit dhe Klorit

74. Regjimi diabetik përqëndrohet në:

- A) bërjen e insulinës
- B) kontrolli i diares

- C) kontrolli i të vjellave
- D) kontrolli i lekures

75. Obeziteti është i shoqëruar me një varg pasojash mjekësore ku përfshihen:

- A) diabeti
- B) pulsi i ulur
- C) probleme të dhëmbëve
- D) dhimbje koke

76. Ku depozitohen askaridet në stadin e parë të tyre?

- A) Duoden
- B) Pankreas
- C) Stomak
- D) Veshka

77. Vlerësimi infermieror në diabet përqëndrohet në:

- A) gjendjen fiziologjike
- B) informimin për sëmundjen
- C) dhimbjet e barkut
- D) dhimbjet e kokës

78. Shenjat klinike në reaksionin imuno kompleks jane:

- A) urtikarje
- B) nauze
- C) të vjella
- D) diare

79. Kujdesi infermieror në ostiomelit, për sigurimin e komfortit përfshin:

- A) pozicioni i pershtatshem
- B) dhimbjet e barkut
- C) diarre
- D) të vjella

80. Ndërlikimet afatgjata të diabeti insulinovartës jane:

- A) retinopatia
- B) sëmundjet intestinale
- C) anoreksia
- D) të vjellat

81. Veshka sekreton hormone si:

- A) Renina
- B) Acidi uric
- C) Urea
- D) Kristale

82. Periudha e inkubacionit tek difteria është :



- A) 2-5 dite
- B) 7-10 ditë
- C) 13-16 ditë
- D) 20-24 ditë

83. Para marrjes së diuretikeve matet rregullisht:

- A) urinimi
- B) defekimi
- C) të vjellat
- D) tensioni arterial

84. Periudha e fshehtë e poliometit abortiv është:

- A) 3-6 dite
- B) 7-10 ditë
- C) 13-15 ditë
- D) 16-18 ditë

85. Faza post renale vjen si pasojë e një obstrukcioni mekanik:

- A) të traktit urinar
- B) traktit gastrointestinal
- C) respirator
- D) venoz

86. Sindromi hemoragjik tek i porsalinduri, vjen si pasojë e mungesës së vitaminës:

- A) A
- B) D
- C) K
- D) E

87. Cila nga këto shenja shihet në analizën e ikterit?

- A) Rritja e glukozës në gjak
- B) Rritja e azotemisë
- C) Rritja e glicemisë
- D) Rritja e bilirubinës

88. Cila është ndërhyrja e parë në fëmijën prematur?

- A) Ushqyerja
- B) Dhënia e oksigjenit
- C) Vënia e perfuzioneve I/V
- D) Rregullimi i temperaturës

89. Cila është shenja e infeksionit umbelikal?

- A) Nauze
- B) Temperaturë
- C) Humbje oreksi
- D) Zverdhje

90. Ku konsiston ndërhyrja për foshnjen lindur me ikter?
- A) Vendosija nën oksigjen
  - B) Dhënia e antibiotikëve
  - C) Bërja e transfuzioneve
  - D) Futja në fototerapi
91. Cila është simptoma që tregon frakturë të klavikulës?
- A) Shtrembërim të cepit të buzës
  - B) Dhimbje kur i prek krahun
  - C) Hematomë te fytyrës
  - D) Rënie të cepit të syrit
92. Cili organ luan rol në eleminimin e bilirubinës, gjatë jetës fetale?
- A) Placenta
  - B) Mushkëria
  - C) Zemra
  - D) Pankreasi
93. Cila është ndërhyrja e parë, që bëhet në foshnjen me asfiksi?
- A) Ushqyerja
  - B) Rregullimi i temperaturës
  - C) Aspirimi
  - D) marrja e analizave
94. Apnea është:
- A) frymemarrje e shpejtë
  - B) frymemarrje e ngadaltë
  - C) pushim në frymëmarrje
  - D) frymemarrje normale
95. Cila është simptoma e stenoze hipretrofike të pilorit?
- A) Cianoze
  - B) Frymëmarrje e vështirësuar
  - C) Apnoe
  - D) Të vjella
96. Cila është masa e parë që marrim për parandalimin e përhapjes së infeksionit?
- A) Dhënia e oksigjenit
  - B) Rregullimi i temperaturës
  - C) Izolimi i foshnjes
  - D) Bërja e ekzaminimeve
97. Hipoglicemia trajtohet me dhenie të:
- A) kaliumit
  - B) antibiotikëve

- C) bikarbonat natriumit
- D) perfuzioneve me glukoze 5%

98. Periudha neonatale quhet periudha që përfshin:

- A) 20 ditët e para të jetës
- B) 28 ditët e para të jetës
- C) 30 ditët e para të jetës
- D) 40 ditët e para të jetës

99. Ushqyerja me sondë nazo-gastrike behet në fëmijët me:

- A) ikter
- B) frakturë të klavikulës
- C) buzë dhe qellzë të carë
- D) asfiksi

100. Cili lindje është shkaktare për një lindje asfiktike?

- A) Ne term
- B) Me sexio-cezarea
- C) Post - term
- D) Podalike

101. Me çfarë trajtohet nje infeksion umbilikal?

- A) Antibiotic
- B) Natri-bikarbonat
- C) Alkool 70 gradë
- D) PerfuzioneI/V

102. Cili nga këta faktorë nuk ndikon në shfaqjen e diareisë?

- A) Mosha e fëmijës
- B) Kequshqyerja ose humbja në peshë
- C) Higjena e pastër
- D) Mosruajtja e mire e ushqimeve

103. Në cilën nga shkallët e dehidrimit është shprehur saktë rënia e peshës trupore?

- A) Dehidrim i lehtë = 10 %
- B) Dehidrim mesatar mbi 10%
- C) Dehidrim i rëndë = 10%
- D) Dehidrim i rëndë > 10%

104. Cili nga faktoret nuk është shkaktare i obezitetit?

- A) Metabolik
- B) Trashëgues
- C) Nënushqyerja
- D) Psikologjik

105. Cila nga kujdesjet nuk bën pjesë në trajtimet e anoreksisë?

- A) Kujdesi ndaj malnutricionit
- B) Fillimi i një diete të pasur dhe me lëngje
- C) Mbështetja psikologjike
- D) Përdorimi i laksativëve

106. Cili nuk hyn ne shkaktarët e stomatitit?

- A) Sëmundjet sistemike
- B) Traumat
- C) Dalja e dhëmbëve
- D) Higjiena e pastër

107. Kandidoza orale është:

- A) Infeksion kërpudhor
- B) Inflamacion i mukozave orale
- C) Ulcer e membranave të mukozave të gojës
- D) Sëmundje sistemike

108. Në cilin helmim nuk këshillohet nxitja e të vjellave?

- A) Medikamentet
- B) Ushqyerja
- C) Salicilatet
- D) Lëndët gërryese

109. Cili nga këto nuk është shkaktare i shfaqjes së alergjive?

- A) Ushqimi
- B) Medikamentet
- C) Mungesa e hekurit
- D) Pluhurat

110. Në mjekimin e shokut anafilaktik nuk ndikon:

- A) Adrenalina
- B) Ultrakorteni
- C) Aspirina
- D) Antihitaminikët

111. Cila nga simptomat e mëposhtme nuk vërehet në sëmundjen e serumit?

- A) Edema
- B) Eritema
- C) Hypotirozë
- D) Edeme laringu

112. Cila është zona ku nuk shfaqet dermatiti seborroik?

- A) Skalpi
- B) Balli
- C) Zona inguinale
- D) Shputat e këmbëve

113. Cila nga këto vitamina mund të sintetizohet nga organizmi ?

- A) Vitamina A
- B) Vitamina B
- C) Vitamina C
- D) Vitamina D

114. Deformimet kockore të avitaminozës D prekin të gjitha të poshtëshënuara përveç:

- A) Toraksin
- B) Kockat e fytyrës
- C) Anësitë
- D) Kockat e kokës

115. Cila nuk është e saktë, në shenjat e fëmijëve me hypotiroide, në lindje?

- A) Ikteri fiziologjik
- B) Dalje e shpejtë jashtë
- C) Probleme respiratore
- D) Vështirësi në ushyerje

116. Cila nga këto shenja nuk bën pjesë në sëmundjen e osteomielitit?

- A) Temperturë e lartë
- B) Zona e prekur e skuqur dhe e nxehtë
- C) Epistaksis
- D) Gjymtyrë e dhimbshme

117. Cili nga parametrat ndryshon shumë në osteomielit?

- A) Eritrocitet
- B) Leukocitet
- C) Hemoglobina
- D) Hematokriti

118. Cilin nga indet apo organet prek artriti?

- A) Veshkën
- B) Mushkëritë
- C) Kycet
- D) Pankreasin

119. Cila nga këto shenja nuk bën pjesë në artrit?

- A) Inflamacion lokal
- B) Lëvizjes spontane të kyceve
- C) Humbje të vetëdijes
- D) Temperaturë

120. Cili nga ekzaminimet e mëposhtme është i zgjedhuri në defektet e lindura të zemrës?

- A) Skaner
- B) Radiografi

- C) Rezonancë
- D) Ekografi

121. Cili nga te meposhtemit nuk e shkakton artritit?

- A) E. Coli
- B) Haemaphilus influenzae
- C) Salmonela
- D) Stafilokok

122. Cili pohim nuk është i saktë në ndërhyrjet post - operatore të tonsilitit?

- A) Monitorimi
- B) Pozicionohet shtrirë dhe drejtë
- C) Vlerësohet për shenjat e hemoragjisë
- D) Fillohen perfuzione I/V

123. Skarlatina shkaktohet nga:

- A) Bordetella pertusis
- B) Corynae bacterium diphtheriae
- C) Streptokoku B hemolitik i grupit A
- D) Bakteriet

124. Cila nga shenjat e mëposhtme nuk është e saktë, në rihnit?

- A) Teshtitje
- B) Obstruksion I rrugëve të frymëmarrjes
- C) Temperaturë
- D) Sekrecione

125. Cila nga këto sëmundje nuk bën pjesë në LTB( laringo-trakeo -bronkitit)?

- A) Laringotrakeiti
- B) Epiglottis
- C) Bronkioliti
- D) Trakeiti bakterial

126. Cila nga këto shenja nuk bën pjesë në laringo-trakeo -bronkitit?

- A) Temperaturë
- B) Dhimbje fyti
- C) Melena
- D) Vështirësi në frymëmarrje

127. Cila nuk bën pjesë në kujdesin për pulmonet?

- A) Dhënia e Heparinës
- B) Aerosoloterapia
- C) Aspirimi i sekrecioneve
- D) Oksigjenoterapia

128. Cili nga medikamentet e mëposhtme nuk jepet në astmën bronkiale?

- A) Bronkodilatatorët
- B) Kortikosteroidet
- C) Levotiroksina
- D) Antiacidet

129. Cili nga aparatet e mëposhtme preket më shumë nga fibroza cistike?

- A) Genito-urinar
- B) I frymëmarrjes
- C) Kardio-vaskular
- D) Pankreasi

130. Në cilën nga të dhënat e mëposhme nuk bazohet diagnoza e fibrozës cistike?

- A) Në historinë e sëmundjes familjare
- B) Në mungesën e enzimave pankreatike
- C) Në dhimbjen abdominale
- D) Në rritjen e koncentrimin elektrolitik të djersës

131. Cili nga kriteret e mëposhtme, nuk është manifestim klinik madhor i ethes?

- A) Karditis
- B) Poliartriti
- C) Artralgjia
- D) Eritema

132. Shkaktojnë endokardit bakterial të gjitha, me përjashtim të:

- A) Streptokoku
- B) Enterokoku
- C) Gonokoku
- D) Rikecia

133. Kemi anemi kur hemoglobina është:

- A) nën 12g/dl (6 - 12 vjec)
- B) 12g/dl (6 muaj - 6 vjec)
- C) 13g/dl (6muaj - 6 vjec)
- D) nën 11g/dl (6muaj - 12 vjec)

134. Cili nuk bën pjesë në efektet klinike të talasemisë majore?

- A) Difektet në sintezën e hemoglobinës A
- B) Dobësim i strukturës së qelizave të kuqe të gjakut
- C) Rritje e numrit të leukociteve
- D) Jetëgjatësia e shkurtër e eritrocitit

135. Cilët nga elementët e analizës së gjakut, rriten në leucemi?

- A) Eritrocitet
- B) Hemoglobina
- C) Leukocitet
- D) Sedimenti

136. Cila nga nderhyrjet, nuk bën pjesë në ndërhyrjet për IRA?

- A) Monitorimi i shenjave vitale
- B) Llogaritja me saktësi e marrjes dhe nxjerrjes së lëngjeve
- C) Administrimi i medikamentave
- D) Kryerja e ushtrimeve fizike

137. Cilat nga indet e mëposhtme prek encefaliti?

- A) Brinjët e përparme të palsës së kurrizit
- B) Prek indin granular dhe sistemin nervor
- C) Prek parenkimën e trurit
- D) Prek aparatit e frymëmarrjes

138. Cili nga këto manifestime klinike tregon për sëmundjen e hemofilisë?

- A) Rënia në peshe
- B) Vështirësi në frymëmarrje
- C) Melena
- D) Të vjella

139. Cila nga këto shenja nuk bën pjesë në klinikën e bronkiolitit?

- A) Temperaturë 38- 39
- B) Dhimbje koke
- C) Vështirësi në frymëmarrje
- D) Konvulsione

140. Nuk është shkaktar i bronkopneumonisë bakteriale ?

- A) Bakteriet
- B) Streptokoku
- C) Pneumokoku
- D) Fruthi

141. Cila nga simptomat e mëposhtme nuk është e pranishme në meningit?

- A) Temperatura
- B) Cefaleja
- C) Rigiditeti nuchal
- D) çrregullim i ritmit të zemrës

142. Cila nuk bën pjesë në trajtimin e fëmijës me anemi?

- A) Aerosolo-terapia
- B) Dhënia e vit B12
- C) Dhënia Fe
- D) Dhënia e një diete të pasur me Fe

143. Nuk bën pjesë në ndërhyrjen e pacientëve me IRA (insuficiencë renale akute)?

- A) Kufizimi i kriprave
- B) Dhënia e antibiotiko-terapisë



- C) Bërja e dializës
- D) Oksigjenoterapia

144. Cila shenje nuk bën pjesë në manifestimet klinike të trombocitopenisë?

- A) Hematemezis
- B) Melena
- C) Hemoragji e gingivave
- D) Temperaturë

145. Meningiti është:

- A) Inflamacion i meningeve
- B) Inflamacion i zorreve
- C) Inflamacion i perikardit
- D) Sëmundje e trashëguar

146. Inkubacioni tek rubeola zgjat:

- A) 10-20 ditë
- B) 17-30 ditë
- C) 6- 7 ditë
- D) 14-21 ditë

147. Nuk është rruga e saktë e transmetimit të heptatitit B?

- A) Rruga aerogene
- B) Nga nëna shtatzanë te fetusit
- C) Rruga hematogene
- D) Me anë të pështymës

148. Cila është rruga e transmetimit të fruthit?

- A) Nëpërmjet frymëmarrjes, spërklave
- B) Rrugës hematogene
- C) Perfuzioneve I/V
- D) Kontaktit të lëkurës

149. Eneurezis nokturna është urinim:

- A) normal
- B) me ndërprerje
- C) i shpeshtë
- D) i pavullnetshëm natën

150. Përgjegjësia kryesore e veshkave është te mbaje konstant:

- A) volumin e lëngjeve
- B) frymëshkëmbimin
- C) ritmin e zemrës
- D) qarkullimin e gjakut

151. Cila nga përgjigjet nuk është e saktë për fëmijët me sindrom Down?

- A) Kanë qëndrim hypotonik
- B) Pëllëmba e dorës me rrudha
- C) Fytyra me pamje normale
- D) Gishti i madh i dorës i vecuar

152. Forma më e rëndë e krizave epileptike quhet:

- A) Humbje e vetëdijes
- B) Marrje mendsh
- C) Status epileptik
- D) Gjendje sinkopale

153. Në analizën e gjakut të fëmijëve me leuçemi kemi rritje:

- A) Të eritrociteve
- B) Hemoglobinës
- C) Hematokritit
- D) Leukociteve

154. Në purpurën trombocitopenike, ulja e trombociteve është nen:

- A) 150.000/mm<sup>3</sup>
- B) 140.000/mm<sup>3</sup>
- C) 130.000/mm<sup>3</sup>
- D) 120.000/mm<sup>3</sup>

155. Sa shkurtohet jeta e trombocitit tek trombocitopenia?

- A) 2-4 dite
- B) 3-5 dite
- C) 6-8 dite
- D) 7-10 dite

156. Cili nga aparatet preket në 90% të rasteve nga fibroza cistike?

- A) Genito-urinar
- B) Kardiak
- C) Respirator
- D) SNQ

157. Cila nuk bën pjesë në shenjat e astmës bronkiale?

- A) Kolla e thatë
- B) Vështirësi në frymëmarrje
- C) Fishkëllima në ekspirim
- D) Urinim i pavullnetshëm

158. Dhënia e karbohidrateve ndihmon në:

- A) Kursimin e proteinave të organizmit
- B) Pakësimin e rezervave të glikogjenit
- C) Prodhimin e proteinave dhe glikogjenit
- D) Eliminimin e proteinave dhe glikogjenit

159. Fëmijët me kequshqyerje rrezikohen nga plaget e:

- A) dekubituseve
- B) kavitetit oral
- C) narinës
- D) lobit të veshit

160. Gjatë vitit të parë të jetës, fëmija duhet të marrë vitamine D:

- A) 400 UI në ditë
- B) 1000 UI në ditë
- C) 2000 UI në ditë
- D) 2500 UI në ditë

161. Tetania është:

- A) Një gjendje e shtuar ekstabiliteti neuromuskular
- B) Një gjendje e pakësuar ekstabiliteti neuromuskular
- C) Një mungesë totale ekstabiliteti neuromuskular
- D) Një gjendje e shtimit dhe pakësimit në të njëjtën kohë

162. Ç'është Ketoacidoza diabetike?

- A) Shtim i theksuar i insulinës
- B) Mungesë e theksuar e insulinës
- C) Pakësim i kalciumit
- D) Pakësim i elektroliteve

163. Shkallët e dehidrimit janë:

- A) I lehtë 5%; mesatar 10%; i rëndë mbi 10%
- B) I lehtë 10%; mesatar 15%; i rëndë 20%
- C) I lehtë 15%; mesatar 20%; i rëndë 25%
- D) I lehtë 20%; mesatar 25%; i rëndë 30%

164. Nuk është shenjë klinike në vendosjen e trupave të huaj në bronke:

- A) Hemoragji nga hunda
- B) Kolla
- C) Kriza dispneje
- D) Wheezing

165. Trupat e huaj në trake manifestohen me:

- A) Vështirësi në frymëmarrje
- B) Mungesë kolle
- C) Skuqje të fytyrës
- D) Frymëmarrje normale

166. Nëse bronkoskopia rigide dështon:

- A) Është i nevojshëm trajtimi kirurgjikal
- B) Nuk është i nevojshëm trajtimi kirurgjikal

- C) Përdoren mënyra të tjera
- D) Nuk ekzistojnë mënyra të tjera

167. Virusi respirator sincial tek bronkioliti është:

- A) Shkaku i vetëm
- B) Shkaku kryesor në mbi 50% të rasteve
- C) Nuk është shkak kryesor
- D) Nuk ekziston fare si mundësi

168. Matja e gazeve në gjak është e rëndësishme:

- A) Për të testuar influencën e tyre
- B) Për mbulimin e agjentit etiologjik
- C) Për të gjykuar gravitetin e sëmundjes
- D) Për kodifikimin e tyre

169. Bronkopneumonia takohet ne:

- A) të gjitha moshat
- B) moshën e tretë
- C) adoleshencë
- D) parashkollorë

170. Disavantazhi i aeorozolit është:

- A) Medikamentet nuk absorbohen me shpejtësi
- B) Fëmija mund të kërkojë administrimin e tij shumë shpesh
- C) Medikamentet veprojnë me shpejtësi
- D) Minimizon efektet e përgjithshme

171. Ç'është hidrokloriaziti dhe përse përdoret?

- A) Diuretik dhe përdoret për të rritur diurezen
- B) Vitaminë dhe përdoret për rritje rezistence
- C) Antidepresiv dhe përdoret për gjendjet depresive
- D) Atropine dhe përdoret për relaksim e muskulaturës së pilorit

172. Procesi i kujdesjeve në pediatri përfshin:

- A) Moskryerjen e ekzaminimeve fizike
- B) Vendosjen e diagnozës
- C) Mjekimin e menjëhershëm
- D) Zbatimin e planeve të kujdesjeve

173. Vlerësimi për veten i përket gjykimit:

- A) personal
- B) përgjithësues
- C) asnjës
- D) pa subjekt

174. Për të parandaluar pasojat e ftohjes prematuri:

- A) vendoset në inkubator
- B) vendoser në një dhomë sido që të jetë
- C) i vishen rroba të trasha
- D) Temperatura e dhomës të jetë sa më e lartë

175. Shpenzimi minimal i Oksigjenit ndodh kur temperatura sipërfaqësore e lëkurës është:

- A) 36.5 gradë celsius
- B) 36.8 gradë celsius
- C) 37 gradë celsius
- D) 37.2 gradë celsius

176. Te kujdesjet për lëkurën e fëmijës këshillohet:

- A) Përdorimi i sapunëve
- B) Përdorimi i locioneve alkaline
- C) Çdo lloj solucioni larës
- D) Jo çdo lloj solucioni

177. Nevojat themelore të fëmijës janë:

- A) Te jetës së përditshme
- B) Ushqimi dhe uji
- C) Mbajtja afër
- D) Ajër i pastër

178. Për të parandaluar fleksionin e qafës së fëmijës:

- A) Vendoset një jastëk nën shpatull
- B) Vendoset një jastëk nën kokë
- C) Vendoset një jastëk nën zonën e belit
- D) Nuk vendoset jastëk fare

179. Nëse ndërpritet ushqyerja me gji:

- A) Ulet niveli serik i bilirubinës
- B) Ngrihet niveli serik i bilirubinës
- C) Niveli serik i bilirubinës s'leviz
- D) Niveli serik i bilirubinës ngrihet dhe ulet

180. Me rritjen e moshës së shtatzanisë:

- A) Frekuenca respiratore ulet
- B) Frekuenca respiratore ngrihet
- C) Frekuenca respiratore s'pëson ndryshim
- D) Ndryshimet respiratore janë të pakonsiderushme

181. Mekanizmat e thithjes dhe të tretjes:

- A) Përcaktohen pas lindjes
- B) Përcaktohen para lindjes
- C) Përcaktohen shumë më vonë
- D) Nuk përcaktohen absolutisht

182. Disa nga faktorët që shkaktojnë asfiksionë janë:

- A) Moshë e nënës, e shtatzënisë
- B) Lindjet në kohë, barrë e rregullt
- C) Mospërdorimi i medikamenteve
- D) Problemet psikologjike

183. Janë shenja të infeksionit tek i porsalinduri përveç:

- A) Lëkurë e zbehtë në ngjyrë gri
- B) Pin mirë gjirin
- C) Çrregullime të frekuencës respiratore dhe kardiake
- D) Ulje të temperaturës

184. Traumata e indeve të buta shkaktohen:

- A) Kur ka disproporcion cefalopelvik
- B) kur nuk ka disproporcion pelvik
- C) Kur ka proporcion cefalopelvik
- D) Si pasojë e dëmtimeve të ndryshme

185. Në hemoragjitë umbilikale injektohet vitamine:

- A) D për parandalim
- B) A për parandalim
- C) K për parandalim
- D) C për parandalim

186. Edemat serosanguine:

- A) Nuk janë leziona cefalike
- B) Janë leziona cefalike
- C) Janë leziona cefalo-pelvike
- D) Nuk janë leziona të asnjë lloji

187. Stenoza e pilorit është:

- A) Bllokim hipertrofik i muskulit rrethues të kanalit të pilorit
- B) Zgjerim i muskulit rrethues të kanalit të pilorit
- C) Bllokimi dhe zgjerimi në të njëjtën kohë i muskulit rrethues
- D) Çrregullim Hidro-elektrolitik

188. Obeziteti shoqërohet me:

- A) Pasoja mjekësore, psikologjike
- B) Vetëm pasoja mjekësore
- C) Vetëm pasoja psikologjike
- D) Lulatje sipërfaqësore

189. Medikamentet që shkaktojnë humbjen në peshë tek anoreksikët janë:

- A) Laksativët, diuretikët
- B) Imipramina, deprimina

- C) Antepar, povan
- D) Aspirina, Fe sulfat

190. Në rastet e një reaksioni të rëndë nga pickimi i grerëzës apo bletës:

- A) Bëhet lavazh stomaku
- B) Injektohet vit.K
- C) Bëhet adrenalinë e ultrakorten
- D) Injektohet vit A+D

191. Alergjia është:

- A) Hipersensibilitet ndaj një substance
- B) Hiposensibilitet ndaj një substance
- C) Përqaasje e virozave të stinës
- D) Komplikacion nga substancat toksike

192. Eritroblastoza fetale quhet ndryshe semundje:

- A) hemolitike e të porsalindurit
- B) ikterike e të porsalindurit
- C) bakteriale e të porsalindurit
- D) e sistemit respirator e të porsalindurit

193. Me çfarë trajtohet hipokalcemia?

- A) Kalcium
- B) Glukozë
- C) Serum
- D) Oksigjen

194. Me çfarë trajtohet hipoglicemia?

- A) Trisol
- B) Kalcium
- C) Perfuzion solucion glukoze
- D) Vitamine A

195. Mami di që faza e parë e lindjes është :

- A) Dalja e placentës
- B) Dilatacioni
- C) Expulsioni
- D) Rikuperimi i gruas

### **03. Infermieristike Semundje Brëndëshme**

1. Shenjat klinike më të zakonshme në pacientet me enfizemë pulmonare janë:

- A) Prania e sputumit
- B) Ortopnea
- C) Lodhja
- D) Dispnea

2. Infermieri/a e vlerëson pacientin me bronkit kronik për:
- A) Fryrje abdominale
  - B) Kequshqyerje
  - C) Cianoza
  - D) Dispnea
3. Shenjat e kufizimit respirator ,në momente qetësie zakonisht zhduken në :
- A) Insufiçensë repiratore
  - B) Asthma bronkiale
  - C) Bronkitin kronik
  - D) Emfizemë
4. Diagnozat e mundshme infermirore në asthmën bronkiale janë:
- A) Reduktimi I rrezikut për infeksion
  - B) Përmirsimi I shkëmbimit të gazeve
  - C) Intolerance e aktiviteteve
  - D) Reduktimi I ankthit
5. Sistemet e shpërndarjes se oksigjenit me ritëm të lartë janë:
- A) Maska pa rithithje të ajrit
  - B) Maska me rithithje te ajrit
  - C) Maska venturë
  - D) Kanjula nazale
6. Në hipertirozë janë të gjitha shenjet me përjashtim të:
- A) Takikardisë
  - B) Shkurtim të reflekseve
  - C) Shtim në peshë
  - D) Çrregullim të ciklit menstrual
7. Toksiciteti i mushkërive me O<sub>2</sub> jep dëmtime të tyre të tilla si:
- A) Dhembje substernale
  - B) Koll productive
  - C) Ortopne
  - D) Temperaturë
8. Kërkesat për oksigjen zakonisht rriten në gjendje të tilla si:
- A) Edemë polmonare
  - B) Hemoragji polmonare
  - C) Membrana hyaline
  - D) Gjendjet septike
9. Agjentët mukolitike në pacientët me probleme respiratore përdoren në kolla:
- A) me sekrecione trasha
  - B) jopruduktive



- C) pa sekrecione
- D) produktive

10. Në hipotireozë kemi situatën e mëposhtme hormonale:

- A) Rritje të T3, T4 dhe rritje të TSH
- B) Rritje të T3, T4 dhe ulje të TSH
- C) Ulje të T3, T4 dhe rritje të TSH
- D) Ulje të T3, rritje të T4 dhe ulje të TSH

11. Përdorimi i anksiolitikëve është më produktiv gjatë gjendjeve të tilla si:

- A) Emboli pulmonare
- B) Emphyzemë pulmonare
- C) Atelektazë pulmonare
- D) Atak azmatik

12. Edukimi shëndetësor i pacientit me probleme respiratore bëhet nëpërmjet:

- A) Përmiresimit të marrjeve ushqimore
- B) Përmiresimit të natyrës së frymemarrjes
- C) Përmiresimit të ankthit
- D) Terapisë relaksuese

13. Rritje të rasteve me TBC ka pasur vitet e fundit në pacientët me :

- A) hepatit B kronik
- B) hepatit C
- C) HIV
- D) IST

14. Artriti reumatoid nuk ka karakteristikë:

- A) Prekjen e artikulacioneve të vogla
- B) Eritemën marginale
- C) Fenomenin Raynaud
- D) Karakterin simetrik të prekjes artikulare

15. Vlersimi infermieror i një pacienti me TBC bëhet nëpërmjet:

- A) Gjendje e përgjithshme septike me temperature
- B) Prezantimit të simptomave
- C) Të dhënave objektive
- D) Të dhënave subjektive

16. Zakonisht pacientët të cilët kanë sëmundjen e TBC:

- A) Kanë temperature
- B) Nuk kanë fare temperaturë
- C) Kanë temperature subfebrile
- D) Temperatura nuk është kriter vlerësimi

17. Në rastin e aplikimit të testit të tuberkulinës, zona e skuqjes së lëkurës është reaksion pozitiv:

- A) me diameter 5 mm
- B) me I madh se 10mm
- C) me I vogel se 10mm
- D) me diameter 10mm

18. Vaksina e BCG jep mbrojtje efektive për pacientët për:

- A) Zakonisht per 5 vjet
- B) Zakonisht per 10 vjet
- C) Zakonisht per 15 vjet
- D) Për 20 vjet

19. Shkaktari më i shpeshtë i embolisë pulmonare është:

- A) Cdo substancë që depërton në qarkullim
- B) Nje copë garze ose pambuk
- C) Nje copë age metalike
- D) Nje koagul gjaku

20. Angina pectoris është gjendje në të cilën kemi:

- A) Imbalancë e përhershme e muskulit kardiak nga oksigjeni
- B) Imbalancë e përkohshme nga oksigjeni
- C) Deprivim i përgjithshëm nga oksigjeni
- D) Nekrotizim i përkohshem

21. Ndër faktorët e modifikushëm të sëmundjeve te arterieve koronare janë:

- A) Historia familjare
- B) Stresi
- C) Seksi
- D) Moshë

22. Cila nga të dhënat e mëposhtme nuk i përket endokarditit:

- A) Zmadhim total i zemrës
- B) Temperaturë, palpacione
- C) Djersë të shtuara, dispne
- D) Kollë me sekrecione të shumta hemoragjike

23. Cila është veçoria me tipike e angina pectoris?

- A) Dhembja substernale
- B) Ndodh pa ndonjë shkaktar
- C) Zakonisht zgjat 30 minuta
- D) Lehtësohet vetëm me opioide

24. Zakonisht pacientët që kanë dizorientim dhe konfuzion mendor janë:

- A) Të moshës mesme post- infarkt
- B) Të moshës vjetër post-infarkt
- C) Më shumë burrat post- infarkt
- D) Më shumë gratë post- infarkt

25. Në pacientët të cilët vuajnë nga angina ose infarkt gjatë observimit të përgjithshëm verejmë:

- A) Me anë të palpacionit shohim që lëkura është e ngrrohtë
- B) Me anë të prekjes ndjejmë që lëkura është e ftohtë
- C) Observimi me sy shohim djersitje
- D) Mungesë e pranisë së djersve

26. Cili nga shkaktarët e mëposhtëm nuk i përket pankreatitit:

- A) Gurët biliare, hiperlipidemia
- B) Ndërhyrjet kirurgjikale
- C) Infeksionet virale
- D) Osteoporoza dhe varfërimi me kalcium

27. Nitroglicerina jepet nga infermieri/a zakonisht me rrugë:

- A) i.m
- B) i.v
- C) s/c
- D) sublinguale

28. Gjeneri përgjigjen e gabuar për Kolutin ulceroz:

- A) Karakterizohet nga ulceracione të shumta të zorrës
- B) Prek kryesisht duodenin
- C) Shoqërohet me rënie në peshë dhe diarre
- D) Kolonoskopia vendos diagnozën

29. Një pacient i cili ka kaluar infarkt miokardi zakonisht për tu shëruar plotësisht i duhen:

- A) Me pak se 4 jave
- B) Zakonisht 5-6 jave
- C) Duhet 6-8 jave
- D) Në 10 jave shërohen plotësisht

30. Osteoartriti prek më shumë regjionin cervikal në nivelin:

- A) C2-C3
- B) C3-C4
- C) C4-C5
- D) C4-C6

31. Gjeneri përgjigjen e gabuar:

- A) HTA sekondar ka patologjitë renale si shkaktarë më të shpeshtë
- B) HTA kemi vetëm në rastet kur presioni sistolik është mbi 160 mmHg
- C) Hipertrofia kardiake është karakteristike e HTA kronik
- D) Preken nga HTA më shumë meshkujt se sa femrat

32. Gjeneri përgjigjen e saktë:

- A) Nekroza miokardiale është proces i rikthyeshëm
- B) Obeziteti nuk është faktor predispozues për Infarkt Akut të Miokardit

- C) Preken më shumë femrat se meshkujt nga Infarkti Akut i Miokardit
- D) Duhanpirja është ndër faktorët etiologjikë më të shpeshtë të Infarktut Akut të Miokardit

33. Menaxhim kirurgjikal në osteoartrit do të thotë:

- A) Rivendosje e pjesshme e kyçit
- B) Osteotomi
- C) Heqje e pjesshme e kyçit
- D) Rivendosje totale e kyçit

34. "Ngurtësimi mengjedor" është shenjë tipike për pacientët me :

- A) Osteoartrit
- B) Artriti reumatoid
- C) Asnjëra
- D) Hernie diskale te regjionit lumbar

35. Një kyç i ngrohtë dhe i enjtur tregon për:

- A) Rritje e furnizimit me gjak në atë pjesë të kyçit
- B) Grumbullim jonormal I gjakut venoz ne ate pjese te kyçit
- C) Inflamacion
- D) Infeksion

36. Gastriti kronik shoqerohet me :

- A) Infeksion
- B) Inflamacion
- C) Lezione ne tru
- D) Insufiçensë renale

37. Terapia antiacide nuk lehtëson gjendjen ne:

- A) Gastritin kronik
- B) Gastritin atrofik
- C) Gastrititn akut
- D) Ne ulçeren gastrike

38. Vitamina B12 , e rëndësishme si antianemik, sekretohet nga mukoza:

- A) e pemës bronkiale
- B) intestinale
- C) gastrike
- D) e ezofagut

39. Gjenerali i përgjigjen e saktë:

- A) Insuficienca renale shoqërohet me ulje të kreatininës
- B) Mungesa e eritropoetinës është karakteristike e insuficiencës renale
- C) Proteinuria tregon për dëmtim tëndjeshëm të filtracionit glomerular
- D) Dializa është një ndër opsionet terapeutike

40. Shkaktar të tilla si helicobacter pilori, duhani, stresi janë tipike për:

- A) Gastritin akut
- B) Gastritin kronik
- C) Gastritin atrofik
- D) Ulçeren peptike

41. Triada discomfort - dhembje - urth jane tipike per ulçeren:

- A) gastrike
- B) peptike
- C) duodenale
- D) siperfaqesore

42. Perforacioni i stomakut shkakton shok:

- A) septic
- B) hypovolemik
- C) hemoragjik
- D) endogjen

43. Shkaktarët më të zakonshëm të pielonefritit janë:

- A) Pseudomonas
- B) Enterobakteret
- C) E. Coli
- D) Klipsiella

44. Gjenerali pergjigjen e gabuar

- A) Leucemia është mieloide dhe limfoide
- B) Ulja e eritrociteve është domosdoshmëri në leucemi
- C) Prek me shumë meshkujt se femrat
- D) Leucemia mund të jetë akute ose kronike

45 Trajtimi i pielonefritit bëhet nëpërmjet:

- A) Ndjekje e vazhdueshme në shtëpi
- B) Trajtimi medikamentoz
- C) Trajtimi kirurgjikal
- D) Hospitalizimi

46. Ulcera gastrike ndodh zakonisht në grup moshat:

- A) 50-60 vjecare
- B) 40-50 vjecare
- C) 30-40 vjecare
- D) 20-30 vjecare

47. Simptoma klinike karakteristike e pacientit me Cistit është:

- A) Urgjenca për të urinuar
- B) Anuri
- C) Oliguri
- D) Temperaturë e ulët

48. Gjenerali i gjenerimit e gabuar: në astmën bronkiale kemi:
- A) Respiracion të shpeshtë
  - B) Spirometria tregon rritje të kapacitetit pulmonar
  - C) Dhimbje të kraharorit
  - D) Kollë të fortë
49. Në aneminë ferrodifitare gjejmë të gjitha përveç:
- A) Ferritinemi të ulur
  - B) Rritje të hemoglobinës
  - C) Hipokromi
  - D) Ulje të hematokritit
50. Gjenerali i gjenerimit e saktë:
- A) Hiperuricemia nuk shkakton patologji reumatizmale
  - B) Dhimbjet me karakter inflamator nuk ndeshen në qetësi
  - C) Polimialgja gjendet vetëm në sëmundjet reumatizmale
  - D) Osteoporoza prek më shumë femrat se meshkujt
51. Gjenerali i gjenerimit e gabuar:
- A) Neuropatia monitorohet përmes ENG
  - B) Fundus okuli është ekzaminim i domosdoshëm tek diabetikët
  - C) HbA1C nuk është tregues i saktë i hiperglicemive
  - D) Peptidi C tregon për sasinë e saktë të insulinës së prodhuar nga pankreasi
52. Tek pacienti me insuficiencë renale kronike, manifestimet hematologjike përfshijnë, anemine, e cila manifestohet me:
- A) temperaturë
  - B) dhimbje
  - C) zbehje
  - D) te vjella
53. Tek pacientet me insuficiencë renale kronike, infermieri monitoron sasine e kaliumit të marre, pasi hiperkalemia mund shkaktojë:
- A) Disritmi kardiake
  - B) Hypertension
  - C) Edema
  - D) Te vjella
54. Tek pacientet me insuficiencë renale kronike, infermieri siguron kujdesje për çdo zonë ku integriteti i lëkurës është i demtuar; kjo është e rëndësishme për të :
- A) Zvogëluar rrezikun për infeksione
  - B) Është një kujdes rutinë nga ana e infermierit
  - C) E rëndësishme për higjienën e pacientit

D) Nuk është faktore pedipozues

55. Në diabetin mellitus janë të pranishme të gjitha shenjat përveç njëjës:

- A) Polidipsia
- B) Polifagia
- C) Galaktorrea
- D) Poliuria

56. Për të reduktuar konstipacionin, me qëllim që pacienti të ketë një aktivitet normal të zorrëve është e rëndësishme:

- A) Një dietë me përmbajtje fibrash
- B) Një dietë pikante
- C) Jete sedentare
- D) Sa më pak aktivitet

57. Trajtimi primar i pacientëve me anemi nga mungesa e Fe, është:

- A) Rritja e marrjeve orale të hekurit nepermjet ushqimit
- B) Aktiviteti fizik
- C) Sa më shumë likide
- D) Regjim shtrati

58. Në trajtimin e pacientëve me anemi aplastike themelore janë:

- A) Transfuzionet e gjakut
- B) Dieta
- C) Likidet
- D) Aktiviteti

59. Tek pacientet me anemi, shmangia e lodhjes, është e rëndësishme që:

- A) Pacienti të mos përjetojë lodhje gjatë kryerjes së aktiviteteve ditore
- B) Është një kujdes rutin
- C) Nuk është e rëndësishme për pacientin
- D) Aktivizon pacientin

60. Qarko një ndër simptomat karakteristike të sëmundjes së diabetit mellitus:

- A) Polifagi
- B) Fotofobi
- C) Anuri
- D) Edem

61. Cirroza hepatike ka si shkaktar të gjithë shkaqet e poshtëshënuar përveç njërit:

- A) Konsumimin e alkoolit
- B) Dëmtimet e rrugëve biliare
- C) Ulcerën duodenale
- D) Hepatitin autoimun

62. Limfomat Hodgkin jane semundje malinjizante qe mund te zhvillohen ne cdo grup moshe, por, piken me te madhe te incidences e ka ne moshat e reja:
- A) 10-vjecare
  - B) 20-vjecare
  - C) 30-vjecare
  - D) 40-vjecare
63. Per infermierin qe kujdeset per pacientin me Leucemi, objektivi kryesor eshte :
- A) Ta mbroje ate nga infeksionet
  - B) Te parandaloje te vjellat
  - C) Te qetesoj nauset
  - D) Te qetesoj familjaret
64. Per shkak se prodhimi I palces normale eshte shume I kufizuar ne pacientet me leucemi, kjo e vendos pacientin ne rrezik te madhe:
- A) per hemoragji
  - B) per nausea
  - C) te vjella
  - D) temperature
65. Diabeti mellitus eshte nje semundje kronike qe ndikon ne :
- A) Shume organe dhe sisteme te organizmit
  - B) Ne te gjithë organizmin
  - C) Pothuaj nuk ndikon ne organet dhe sistemet e organizmit
  - D) Prek vetem nje organ te organizmi
66. Mungesa e insulines ndalon qelizat qe :
- A) Te perdorin glukozen si burim energjie
  - B) Nuk eshte e rendesishme per organizmin
  - C) Eshte fatale ne organizem
  - D) Ndikon disi ne mbarvajtjen e organizmit
67. Nje nder faktoret predispozues te infeksioneve te traktit urinar eshte:
- A) Anomalia strukturale dhe funksionale e traktit urinar
  - B) Refluksi ezofageal
  - C) Gastritet
  - D) Diarret
- 68 Cistiti jo-infeksioz mund te rezultoje nga:
- A) ekspozimi ne agjent kimik
  - B) ekspozimi ne agjent infeksioz
  - C) ekspozimi ne temperature te larta
  - D) semundje te ndryshme
69. Nje nder vendet ku eshte lokalizuar edema ne pacientet me Cirroze eshte :
- A) Fytyra



- B) Kapaket e syve
- C) Sakrumi
- D) ne te gjithë trupin

70. Hypokalemia kronike qe takohet tek bulemiket rezulton nga:

- A) Abuzimi me laksativ
- B) Abuzimi me alkool
- C) Abuzimi me kafein
- D) Aktivitet I tepruar

71. Në pankreatitin akut nuk gjejmë:

- A) Amilazën e rritur
- B) Lipazën e rritur
- C) Eritopoetinën e rritur
- D) Kalcifikime të pankreasit

72. Psikoterapia tek paciente me bulemi nervore eshte e rendesishme dhe ka si qellim:

- A) Rritjen e vet-vleresimit
- B) Eshte nje procedure rutin
- C) Nuk ka ndonje qellim te caktuar
- D) Ndikon ne ushqyerjen e pacientit

73. Shkaktari kryesor i Cistitit eshte:

- A) Bakteri koliform
- B) Insulin
- C) Acetitolina
- D) Dopamine

74. Bronhektazia karakterizohet nga të gjithë elementet me përjashtim të:

- A) Kollë kronike me sputum purulent
- B) Hemoptizia
- C) Elemente kutane purpurik
- D) Dispne dhe cianoze

75 Kolecistiti kronik nuk karakterizohet nga:

- A) Dhimbje të forta në zonën epigastrike
- B) Të vjella biliare
- C) Temperaturë subferile
- D) Rritje e amilazës dhe lipazës

76. Qarko nje nder simptomat karakteristike te semundjes se diabetit insipid:

- A) Diureza masive
- B) Fotofobia
- C) Anuria

D) Edema

77. Diabeti insipid nefrogenik rezulton nga:

- A) Nje defect I trashegueshem
- B) Tumoret ne regionin hypothalamic-petuitar
- C) Trauma ne koke
- D) Tumoret metastazike

78. Pielonefriti akut eshte :

- A) Infeksioni akut I traktit te siperme urinar
- B) Pezmatimi I fshikezes urinare
- C) Pezmatimi I uretres
- D) Pezmatimi I prostatit

79. Nje ndër shkaktarët sekondarë të glomerulonefritit kronik është:

- A) Stafilokoku
- B) Streptokoku beta hemolitiki grupit A
- C) Lupus sistemik eritematoz
- D) Hepatitis A

80. Nje ndër shkaktarët primar të glomerulonefritit akut është:

- A) sklerodermia sistemike progressive
- B) purpura trombocitopenike
- C) poliartriti nodular
- D) sifilizi

81. Azotemia prerrenale në pacientë me insuficiencë renale akute karakterizohet me një nga simptomat e mëposhtme:

- A) Ndryshime në sasinë ose aparcën e urinës
- B) Hipotension arterial
- C) Diarre
- D) Konstipacion

82. Agjenti shkaktar i hepatitit A përhapet nëpërmjet rrugës:

- A) Hematogjene
- B) Oralo-fekale
- C) Kontakti me plagë të kontaminuar
- D) Kontakti me ujë të kontaminuar

83. Periudha e inkubacionit të hepatitit A është:

- A) 2-3 javë
- B) 2-6 javë
- C) 2-9 javë
- D) 2-12 javë

84. Gastriti kronik shkakton dhimbje epigastrike e cila:

- A) Lehtesohet nga marrja e ushqimit
- B) Perkeqesohet nga marrja e ushqimit
- C) Nuk ndikon ne dhimbje marrja ose jo e ushqimit
- D) Lehtesohet me likide

85. Tek cirrotiket, rekomandohet administrimi I Laktulozes per arsye se:

- A) Eleminon amoniakun nepermjet feceve
- B) Eshte pjese e kujdesit
- C) Nuk eleminon amoniakun
- D) Ndikon ne permiresimin e klinikes

86. Faktoret familjare dhe gjenetik luajne nje rol te rendesishem ne obezitet. Kur te dy prinderit jane obese sa % e femijeve lindin te tille:

- A) 80 % e femijeve
- B) 60 % e femijve
- C) 40% e femijve
- D) 20% e femijve

87. Nje person percaktohet si obez kur, pesha e tij eshte:

- A) 45-50 % mbi peshen ideale
- B) 35-40 % mbi peshen ideale
- C) 25-30% mbi peshen ideale
- D) 15-20% mbi peshen ideale

88. Nje person percaktohet me obezitet morbid kur pesha e tij eshte:

- A) 80% mbi peshen ideale
- B) 60% mbi peshen ideale
- C) 40 % mbi peshen ideale
- D) 20 % mbi peshen ideale

89. Karaharori i pacientit merr një formë si fuçi (bucelë) në:

- A) Bronkit kronik
- B) Pneumoni
- C) Emfizemë
- D) Fibrozë cistike

90. Pacientët me SPOK (Sëmundje Pulmonare Obstruktive Kronike), preferohen të administrohen nëpërmjet inhalatimit sepse shpërnahet medikamenti direkt në mushkëri:

- A) Mukolitikët
- B) Sodium kromolin
- C) Bronkodilatatorët
- D) Antibiotikët

91. Në pacientët me Pneumoni aspekti më i rëndësishëm për edukimin e pacientëve dhe familjarëve është:

- A) Larja e duarve

- B) Pozicionimi
- C) Edukimi për shmangien e infeksioneve të traktit të sipërm respirator
- D) Shmangia e qëndrimit me këmbë të kryqëzuara

92. Në pacientët me SPOK, për të reduktuar inflamacionin në fyt dhe mushkëri: përdoren

- A) Mukolitikët
- B) Antikolinergjikët
- C) Sodium kromolin
- D) Kortikosteroidet

93. Testi i tuberkulinës bëhet (injektohet) në mënyrë:

- A) Intravenoze
- B) Intradermale
- C) Intramuskulare
- D) Subkutane

94. Në pacientët me emboli pulmonare mjekët, që të mos lejojnë zmadhimin e embolës dhe të parandalojnë formimin e koagulave të reja, rekomandojnë:

- A) Analgjezik
- B) Antikoagulantë
- C) Antikolinergjikë
- D) Antibiotikë

95. Palpitacioni është:

- A) Një ndjenjë e të rrahurave të shpeshta në kraharor
- B) Humbje e përkohshme e koshiencës
- C) Frymëmarrje e shkurtër
- D) Një tregues i qarkullimit periferial

96. Diferenca midis vlerave sistolike dhe diastolike është referuar si:

- A) Pulsacioni venoz
- B) Presion i pulsit
- C) Presion i gjakut paradoksal
- D) Presion postural i gjakut

97. Presioni i gjakut paradoksal është përkufizuar si një rënie e presionit sistolik më shumë se:

- A) 10 mmHg
- B) 20 mmHg
- C) 30 mmHg
- D) 40 mmHg

98. Vlerësimi i pulsacionit arterial i jep infermierit informacion për:

- A) Zhurmat
- B) Integritetin vascular dhe qarkullimin
- C) Temperaturën e lëkurës
- D) Cianozën periferiale

99. Shkaktari më i zakonshëm i insuficiensës kardiake është:

- A) Infarkti i miokardit
- B) Pneumonia
- C) Bronkiti kronik
- D) Astma bronkiale

100. Në pacientët me hipertension, efekti anësor kryesor që shoqëron administrimin e diuretikëve është:

- A) Disfunksioni seksual
- B) Lodhja
- C) Depresioni
- D) Hypokalemia

101. Në pacientët me Infarkt Miokardi mjeku mund të përshkruajë morfinë sulfat për lehtësimin e diskomfortit. Shenjat e një intoksikimi me morfinë janë:

- A) Depresioni respirator-hypotensioni-të vjella të shumta
- B) Lodhje-hypoglicemi-hypokalemi
- C) Dhimbje koke-marrje mendsh-zbehtësi
- D) Dobesi-lodhje-marrje mendsh

102. Në pacientët me Angina Pectoris medikamenti fillestar i përshkruar kundër dhimbjes është nitroglicerina sublinguale. Nitroglicerina:

- A) Rishpërndan gjakun në drejtim të subendokardit
- B) Redukton ritmin dhe punën e zemrës
- C) Rrit kontrakturat
- D) Ka efekt të shpejtë shkarkues

103. Endokarditi infektiv i referohet:

- A) Inflamacionit të perikardiumit, qeses embriologjike që mbështjell zemrën
- B) Trashjes inflamatore kronike të perikardiumit që e shtyp zemrën
- C) Infeksionit bakterial ose fungal të endokardit, e cila përshin dhe valvulat
- D) Dëmtimeve inflamatore të gjitha shtresave të zemrës

104. Ankesa kryesore e një pacienti me Osteoartrit është:

- A) Dispnea
- B) Kolla
- C) Dhimbja e kyçeve
- D) Petekie

105. Nodulat Osler's apo lezionet Janeways konsiderohen manifestime klasike në pacientët me:

- A) Endokardit infektiv
- B) Perikardit
- C) Kardiomiopati
- D) Kardit reumatik

106. Manifestimi më i madh dhe zakonisht i vetmi në Lupusin diskoid është:

- A) Temperature lokale
- B) Lokalizimi i edemave
- C) Prania e rashesve të thata dhe të luspuara në fytyrë
- D) Hipertrofi e kyçeve

107. Për shkak se Lupus nefritis është një shkaktar i vdekjes, infermieri me vëmendje vlerëson për shenjat e përfshirjes së:

- A) sistemit respirator
- B) sistemit renal
- C) sistemit kardiak
- D) sistemit neurologjik

108. Për shkak se Lupusi Sistemik është një gjendje inflamatore, gjendja më e zakonshme tek këta pacientë është:

- A) Ethja
- B) Takikardia
- C) Dispnea
- D) Kolla

109. Kujdesi infermieror për një pacient me Sklerodermi përfshin:

- A) Përmirësimin dhe sigurimin e mos vajtjes në llixha dhe plazh
- B) Sigurimin e lëvizjes së artikulacioneve duke inkurajuar ushtrime të shumta
- C) Përdorimin e kremi mbrojtës kundër diellit
- D) Kujdesin ndaj perceptimit të familjarëve

110. Është një sëmundje inflamatore kronike e rrugëve të frymëmarrjes, në të cilën marrin pjesë shumë qeliza dhe element qelizorë, sidomos mastocitet, eozinofilet, dhe limfocitet T:

- A) Tuberkulozi pulmonar
- B) Embolia pulmonare
- C) Astma bronkiale
- D) Edema pulmonare

111. Glukokortikodet inhalatore janë barnat mbajtëse më efikase në pacientët astmatikë. Ato:

- A) Frenojnë inflamacionin e rrugëve të ajrit, pakësojnë hiperaktivitetin bronkial, kontrollojnë dhe parandalojnë simptomat
- B) Janë bronkodilatatorë që bllokojnë efektin e acetilkolinës së çliruar nga nervat kolinergjikë në rrugët e ajrit
- C) Janë bronkodilatatorë që e relaksojnë muskulaturën e lëmuar të bronkeve
- D) Janë bronkodilatatorë që mund të kenë efekte ekstrapulmonare

112. Disfagia është:

- A) Ndjenja e bllokimit apo shtrëngimit në rajonin retrosternal apo epigastër, gjatë fazës së kalimit të masës ushqimore nëpër ezofag
- B) Një inflamacion i shtresës mukozale të stomakut
- C) Një okluzion i plotë i lumenit të një segmenti të traktit gastrointestinal

D) Një kalim permanent ose interminent i një porcioni të pjesës së sipërme të stomakut, nëpërmjet orificiumit ezofageal të diafragmës

113. Refluksi- Gastro-Ezofagial përfaqëson nje:

- A) okluzion të plotë të lumenit të një segmenti të traktit gastro-intestinal
- B) ngushtim të lumenit të një pjese të tubit tretës
- C) qese të lokalizuar të murit të traktit tretës e cila përmban të gjitha shtresat e indit
- D) situatë patologjike, që karakterizohet nga rikthimi i përmbajtjes acide të stomakut në ezofag.

114. Cilat nga barnat e mëposhtme shkakton efekteve të padëshirueshme në stomak?

- A) Antiinflamatorët josteroidë
- B) Antiacidet
- C) Antagonistët e receptorëve histaminikë
- D) Frenuesit e pompës protonike

115. Asciti është:

- A) Rritja e likidit me përmbajtje të lartë të karbohidrateve dhe të ulet në yndyrna
- B) Akumulimi i likidit brenda kavitetit peritoneal
- C) Rritja e osmolaritetit në urinë
- D) Rritja e nivelit të urea-nitrogenit në serum

116. Ikteri hepatoqelizor zhvillohet sepse hepari:

- A) Nuk mund të metabolizojë bilirubinën
- B) Metabolizon bilirubinën më shumë se norma
- C) Nuk ka çdo lob të përfshirë
- D) I ka nodulat që ndryshojnë në formë dhe përmasë

117. Në pacientët me Cirrozë dhe likid ascitik qëllimi primar i terapisë diuretike është:

- A) Të reduktojë volumin qarkullues dhe të ulë sasinë e likidit ascitik
- B) Që pacienti të përjetojë lehtësim nga hemoragjia gastro-intestinale
- C) Të mos ketë ripërsëritje të episodeve hemoragjike
- D) Reduktimi i simptomave gastro-intestinale

118. Bulimia nervore është një sëmundje e ushqyerjes që karakterizohet nga:

- A) Episode të mbingrënies të cilat janë të pakontrolluara
- B) Refuzimi i ushqimit për shkak të frikës së dhjamosjes
- C) Defiçite të vitaminave në dietë
- D) Humbje e masës kockore nga osteoporoza

119. Obeziteti morbid (patologjik) i referohet peshës që negativisht vepron në shëndetin e personit, zakonisht më shumë se:

- A) 10% e peshës ideale trupore
- B) 20% e peshës ideale trupore
- C) 30% e peshës ideale trupore
- D) 40% e peshës ideale trupore

120. Infeksionet e traktit urinar ndodhin:

- A) Në raport të njëjtë mes meshkujve dhe femrave
- B) Më shpesh tek meshkujt se tek femrat
- C) Më shpesh tek femrat se tek meshkujt
- D) Nuk ka rëndësi gjinia

Pyetja 121. Cistiti ndodh më shpesh tek gratë për shkak të:

- A) Shkurtësisë së uretrës
- B) Ndryshimeve në inde lidhur me nivelin e ulët të estrogenit
- C) Ndryshimeve në procesin e të menduarit
- D) Deficiteve në njohuri në lidhje me metodat e parandalimit

122. Veçoria primare e sindromit nefrotik është nivel i lartë i:

- A) proteinurisë
- B) glicemisë
- C) leukociteve
- D) acidit folik

123. Anemia hemolitike kongjenitale më e shpeshtë është e shoqëruar me mungesën e:

- A) Fe (hekurit)
- B) Glukoz 6 Fosfat Dehidrogjenit (G6PD)
- C) Vit B 12
- D) Acidit folik

124. Problemi bazë në aneminë nga mungesa e Fe është:

- A) Pengimi i transportit të acidit folik
- B) Një deficit i qarkullimit të eritrociteve, nga një dëmtim i qelizave të mëparshme hemapoetike
- C) Zvogëlimi i mbështetjes së Fe për zhvillimin e rruazave të kuqe të gjakut
- D) Një deficit i enzimës Glukoz 6 Fosfat Dehidrogjenit (G6PD)

125. Komplikacionet kryesore të diabetit përfshijnë:

- A) Çrregullime të strukturës e funksionit të murit të enës së gjakut
- B) Dhimbje koke
- C) Zvogëlim të periudhave të vëmendjes
- D) Hemoragji nga gingivat

126. Acidoketoza Diabetike vjen nga mungesa e insulinës, me rritje relative apo absolute të:

- A) Proteinurisë
- B) Urea-nitrogenit
- C) Glukagonit
- D) Kaliumit

127. Hypomagnezemia shihet tek:

- A) Pijanecet dhe tek personat me sindromë të keqabsorbimit, disa sëmundje renale dhe keqëushqim
- B) Tek pacientët me mungesë të Vit D



- C) Tek pacientët me deformime të gjymtyrëve
- D) Tek pacientët me shqetësime psikologjike

128. Endokarditi Reumatik ndodh zakonisht pas një infeksioni të rrugëve të sipërme respiratore, shkaktuar nga:

- A) Streptokoku i grupit A
- B) Pseudomonas aeruginosa
- C) Serratia marcescens
- D) Adenoviruset

129. Sindroma klinike, që karakterizohet nga rënie e shpejtë dhe e theksuar e vlerës së filtrimit glomerular (me rritje të kreatininës dhe azotemisë) është:

- A) Insuficensa kardiake
- B) Insuficensa ventilatore
- C) IRA (Insuficensa Renale Akute)
- D) Insuficensa e oksigjenimit

130. Në diabetin insipid sasia e ADH (Hormonit Anti Diuretik) e çliruar në përgjigje të stimujve fiziologjikë është:

- A) E pamjaftueshme
- B) Në normë
- C) E rritur
- D) Në vlerat maksimale

131. Sindroma Kushing është sëmundje që vjen si pasojë e prodhimit të shtuar të:

- A) Kortizolit
- B) Kaliumit
- C) Kalçiumit
- D) Natriumit

132. Shkaktari kryesor i Ulçerës gastrike është:

- A) Anemia pernicioze
- B) Helicobacter pylori
- C) Terapia me antiacid
- D) Marrja e qumështit

133. Është sëmundje multisistemike e karakterizuar nga dëmtime inflamatore, vaskulare të lëkurës dhe të organeve të brendshme:

- A) Ethja reumatizmale
- B) Artriti rheumatoid
- C) Sklerodermia
- D) Osteoartriti

134. Në pacientët me Uretrit, Cistit dhe Piolenefrit mikrobi shkaktar në 80% të infeksioneve të pandërlikuara të rrugëve urinare është:

- A) Esherica coli

- B) Herpes simplex
- C) Adenoviruset
- D) Cytomegaloviruset

135. Infermieri fokusohet në simptomat kryesore të një pacienti me Bronkit kronik të cilat janë:

- A) Dhimbje kraharori gjatë respirimit
- B) Dispne dhe kollë produktive
- C) Temperaturë dhe djersë
- D) Takipne dhe takikardi

136. Dhimbja e kraharorit në pacientët me Angina Pectoris shkaktohet nga:

- A) Vazokonstriksioni koronar
- B) Lëvizja e trombit
- C) Ishemia e miokardit
- D) Prezenca e ateromës

137. Ndër efektet anësore kryesore që shoqërojnë administrimin e nitroglicerines është:

- A) Dobësia muskulare
- B) Hipertensioni
- C) Bradikardia
- D) Dhimbja e kokës

138. Alogjia-simptomat negative të skizofrenisë do të thotë:

- A) Kontakt i varfër me sy
- B) Emocion i papërshtatshëm
- C) Varfëri në të folur
- D) Latencë në përgjigje

#### **04. Inf. Psikiatri , Okulistike, Derma, Neuro**

1. Bashkebisedimet terapeutike përbëhen nga:

- A) ato sociale dhe terapeutike
- B) Faza fillestare ose faza hyrëse
- C) Faza e punës
- D) Faza përfundimtare

2. Faza përfundimtare e bashkebisedimeve do të thotë:

- A) Menaxhim i ankthit
- B) Kujdesi dhe puna në maksimum
- C) Një hap pozitiv
- D) Përforsimi i kufinjëve gjatë takimeve

3. Infermieri/a i shëndetit mendor është i aftë kur është në gjendje:

- A) Të respektojë diversitetin
- B) Të ketë besim tek të tjeret
- C) Të manifestojë siguri

D) Të marrë përsipër përgjegjësitë

4. Cila nga shtresat e lëkurës përbëhet kryesisht nga fije kolagjene dhe elastike:

- A) epiderma
- B) shtresa korneale
- C) derma
- D) hipoderma

5. Kortikoterapia është trajtimi bazë për:

- A) folikulitin
- B) kandidozën
- C) ekzemën
- D) melanomën

6. Në principet e rikthimit të pacientit në jetën normale bën pjesë:

- A) Mbështetja familjare
- B) Aksesit në burime
- C) Kujdesi klinik
- D) Stigma

7. Respektimi i Diversitetit do të thotë:

- A) Bashkëpunimi me familjarë dhe kolegë
- B) Të kuptojë dhe të njohë diversitetin
- C) Përkushtim dhe mundësi të barabarta
- D) Respektimi i nivelit kulturor të pacientit

8. Dermatofitoza është një infeksion:

- A) viral
- B) mikrobik
- C) stafilo-streptokoksik
- D) mykotik

9. Depresioni shprehet me :

- A) Vështërsi në përqendrim
- B) Tension muscular
- C) Deluzione
- D) Haluçinacione

10. Ankthi i vazhdueshëm mund të shkaktojë:

- A) Pamundësi funksionimi i përditshëm
- B) Depresion te pakontrollueshëm
- C) Psikozë manjakale
- D) Skyzofreni hebrefrenike

11. Gjendjet ankstioze shoqërohen me:

- A) Pamundësi për tu kujdesur për veten

- B) Harrese dhe humbje kujtese
- C) Papërgjegjshmëri
- D) Gjykim i dobët

12. Manaxhimi i depresionit bëhet nëpërmjet:

- A) Manaxhimi i sëmundjes fizike
- B) Trajtimi me medikamente
- C) Vetndihma
- D) Trajtim i përgjithshëm

13. Të sjellë shndryshimin do të thotë:

- A) Të kuptosh pasojat e problemit
- B) Formulimi i programit të besueshëm
- C) Të mundësosh shërbime me vlera
- D) Arritja e një ndryshimi pozitiv

14. Rreziqet nga çrregullimet e humorit vijnë si rezultat i:

- A) Gjykim të dobët
- B) Mohimi i rrezikut
- C) Agresivitetit
- D) Provokimit

15. Nuk është formë e depresionit:

- A) Çrregullimi bipolar
- B) Ulja mëngjezore
- C) Hypomania
- D) Mania

16. Neuralgjia posherpetike nuk ka si karakteristikë:

- A) dhimbjet nevralgjike që mund të zgjatin për një kohë të gjatë
- B) shfaqet kryesisht te të moshuarit
- C) shoqëron infeksionet bakteriale
- D) është një komplikacion pas shërimit klinik të Herpes Zoster

17. Çrregullimi bipolar NJE shprehet me:

- A) Distrofi parësore
- B) Mani me depression
- C) Hypomania pa depression
- D) Ulje mëngjezore

18. Trajtimi në çrregullimet e humorit bëhet me:

- A) Antidepresiv
- B) Antikomvulsiv
- C) Antipsikotik
- D) ECT

19. Zakonisht pacientët me hypomani paraqesin:
- A) Entuziazëm të tepruar
  - B) Hiperaktivitet
  - C) Pagjumësi
  - D) Suicid
20. Në psikozën paranoide pacienti paraqet:
- A) Rritje e vetvlersimit
  - B) Veprimtari e shtuar
  - C) Humor I ngritur
  - D) Halucinacione
21. Pacienti me depresion psikotik paraqet:
- A) Tentativa për vetvrasje
  - B) Crrregullime të oreksit
  - C) Të qara me lot
  - D) Anhedoni
22. Në psikozën maniakale pacienti paraqet:
- A) Konfuzion
  - B) Izolim
  - C) Fluturim të ideve
  - D) Anhedoni
23. Niveli i litiumit në gjak duhet të jetë Brenda normës:
- A) 5-7 miliektolitër
  - B) 7-10 miliektolitër
  - C) 10-17 miliektolitër
  - D) 17-20 miliektolitër
24. Episodet depressive të mëdha shoqërohen me:
- A) Çrregullime emocionale
  - B) Mendime për vetvrasje
  - C) Humor I ngritur
  - D) Veprimtari e shtuar
25. Për cilën nga sëmundjet është karakteristikë shoqërimi me sëmundje të tjera atopike:
- A) psoriazis vulgaris
  - B) akne Vulgaris
  - C) ekzema endogjene
  - D) tinea pedis
26. Simptomat pozitive të skizofrenisë I përkasin dimensionit:
- A) emocional
  - B) intelektual
  - C) psikotik

D) shpirtëror

27. Skizofrenia shoqërohet me prognozë "shumë të keqe" në ate:

- A) katatonike
- B) hebefrenike
- C) reziduale
- D) te thjeshtë

28. Shkaktari më domëthënës i skizofrenisë është :

- A) Çrregullimi biokimik I metabolizmit në tru
- B) Zhvillimi patolgjik I trurit
- C) Faktorët ambjental
- D) Gjenetika

29. Trajtimi më produktiv në skizofreni konsiston në :

- A) Trajtim social
- B) Antipsikotik
- C) Antidepresiv
- D) ECT

30. Deluzionet janë zakonisht:

- A) Konkluzione
- B) Percepsione
- C) Zëra imagjinarë
- D) Bindje të gabuara

31. Halucinacionet janë perceptime:

- A) imagjinare
- B) fetare
- C) somatike
- D) nihiliste

32. Në psikozën paranoide mbizotërues është deluzioni:

- A) persekutimit
- B) përndjekjes
- C) madhësisë
- D) xhelozisë

33. Fenomeni I "mutizmit" është tipik për :

- A) Skizofreninë e thjeshtë
- B) Skizofreninë reziduale
- C) Skizofreninë katatonike
- D) Skizofreninë e padiferencuar

34. Vleresimi infermieror parësor në skizofreni i referohet vleresimit te:

- A) gjendjes së humorit

- B) potencialit për dhunë
- C) mbështetjes sociale
- D) njohurive

35. Ndërhyrja infermierore në skizofreni fillon me permiresimin e:

- A) procesit të mendimit
- B) e izolimit social
- C) kujdesjeve vetjake
- D) komunikimit verbal

36. Hedhja sistematike që në lindje e një koliri antiseptik ose antibiotik ka për qëllim prevenimin e konjuktivitit:

- A) Nga adenoviruset
- B) Nga trakoma
- C) Gonokoksik
- D) Pneumokoksik

37. Hedhja e kolireve kortikoide kundraindikohem në:

- A) Edemën korneale
- B) Uveitin anterior
- C) Keratitin epithelial
- D) Kataraktën

38. Cili është kundraindikacioni absolutë i midriatikëve?

- A) Koroiditi
- B) Neuriti optik
- C) Glaucoma me kënd të mbyllur
- D) Keratiti

39. Pilocarpina është një kolir:

- A) Parasimpatikomimetik
- B) Parasimpatolitik
- C) Simpatikomimetik
- D) Simpatikolitik

40. Epinefrina është një kolir:

- A) Parasimpatikomimetik
- B) Parasimpatolitik
- C) Simpatikomimetik
- D) Miotik

41. Cili nga koliret e mëposhtëm nuk e zgjeron pupilën?

- A) Pilocarpina
- B) Kokaina
- C) Adrenalina
- D) Atropine

42. Cili nga propozimet e mëposhtme mbi koliret nuk është i saktë?
- A) Koliret me bazë sulfamidi nuk veprojnë ndaj infeksioneve nga klamidet
  - B) Koliret antibiotikë penetrojnë keq në vitroz
  - C) Koliret anestezike në doza të përsëritura kanë efekt toksik mbi epitelin e kornesë
  - D) Koliret simpatomimetike kanë efekt midriatik
43. Çfarë duhet survejuar në rastet e përdorimit të zgjatur të kolireve kortikoide?
- A) Tensioni ocular
  - B) Këndi irido-korneal
  - C) Sensibiliteti korneal
  - D) Endoteli i kornesë
44. Cili nga koliret e mëposhtëm nuk duhet përdorur në rastet me iridociklit?
- A) Midriatikët
  - B) Miotikët
  - C) Antibiotikët lokalë
  - D) Kortikoidët lokalë
45. Cili nga propozimet e mëposhtme ka kundraindikacion absolut përdorimin e kolireve parasimpatikolitike?
- A) Trajtimi i uveitit anterior
  - B) Ekzaminimi i fundus okulit
  - C) Trajtimi i glaukomës
  - D) Riedukimi i ambliopisë
46. Cili nga propozimet e mëposhtme lidhur me koliret nuk është i saktë?
- A) Penicilina përdoret pak në kolir sepse jep alergji
  - B) Kloramfenikoli ka difuzion corneal
  - C) Neomicina ka një spektër të ngushtë veprimi
  - D) Aminozidet përdoren kundra mikrobeve gram-negative
47. Koliret midriatike indikohen në rastet me:
- A) Sklerit
  - B) Iridociklit
  - C) Glaukomë kronike me kënd të hapur
  - D) Glaukomë me kënd të mbyllur
48. Cilët nga kolirët e mëposhtëm japin hipertoni okulare?
- A) Midriatikët
  - B) Miotikët
  - C) Antiseptikët
  - D) Antibiotikët
49. Cili nga koliret e mëposhtëm favorizon rrjedhjen e lëngut uxor jashtë syrit:
- A) Pilocarpina



- B) Timololi
- C) Atropine
- D) Neosinefrina

50. Cili nga koliret e mëposhtëm redukton sekrecionin e lëngut ujor?

- A) Betablokuesit
- B) Kortikoidet
- C) Acetazolamidi
- D) Kolinergjikët

51. Cili nga propozimet e mëposhtme nuk shkakton katarakt?

- A) Hipokalçemia
- B) Diabeti
- C) Marrja e kortikoidëve
- D) Marrja e indometacinës

52. Cilët janë argumentët në favor të konjuktivitit?

- A) Cefalea e fortë
- B) Kornea transparente
- C) Ulja e pamjes
- D) Prekja unilaterale

53. Në cilin nga lezionet e mëposhtme nuk duhet të kërkohet prezenca e një trupi të huaj intra okular?

- A) Plagë e kornesë
- B) Opacitet i kristalinit
- C) Hemoragji sub-konjuktivale
- D) Zbardhje e papilës

54. Cili nga propozimet që i përkasin glaukomës me kënd të mbyllur nuk është i saktë?

- A) Trajtimi medical mbështetet në përdorimin e hipotonikëve me rrugë të përgjithshme
- B) Miotikët janë të kundraindikuar
- C) Trajtimi kirurgjikal sekondar është i nevojshëm
- D) Kriza e glaukomës akute përfaqëson mbylljen jo complete të këndit irido-korneal

55. Për të kontrolluar rritjen e bakterieve në mungesë të infeksionit në pacientët me ulçer dekubituese rekomandohen:

- A) Antibacterial lokalë
- B) Antiinflamatorë
- C) Analgjezikë
- D) Antimykotikë

56. Një dëmtim të aftësive të pacientit me ulçer dekubituese për të rezistuar ndaj infeksionit e tregon:

- A) Një edemë e thellë subkutane
- B) Një prurit i rëndë

- C) Një sasi e shtuar eksudati dhe një shkatërrim progresiv i indeve
- D) Rritja e temperaturës së lëkurës

57. Cila prej shkaqeve të mëposhtme bën pjesë në shkaqet e brendshme të sëmundjeve të lëkurës:

- A) mykotike
- B) parazitare
- C) gjenetike
- D) kimike

58. Cili nga medikamentet e mëposhtme ka efekt antiseptik:

- A) acicloviri
- B) sol. Gencian violet
- C) sol. Benzilbenzoat
- D) hidrokortizoni

59. Shfaqja e lezioneve në Herpes Zoster ngjan me Herpesin Simplex, por veçoria kryesore është:

- A) Shfaqja e lezioneve vizaton trajektoren e nervave sensitive
- B) Shfaqja e papulave të rastësishme
- C) Telengioektazitë dhe pigmentimi
- D) Shfaqja e papulave me mure të forta rrethore

60. Shfaqja më e shpeshtë klinike e HSV-1 (Herpes Simplex Virus 1) është:

- A) Papula me mure të forta rrethore
- B) Telengioektazi dhe pigmentim
- C) Një grup me vezikula mbi një bazë eritematoze
- D) Makula të vogla me kruste të verdha të forta

61. Incidenca në patologjinë e Psoriasis zakonisht më e ulur është në:

- A) Racat e bardha
- B) Racat e zeza
- C) Në njerëzit me numër apo përmbajtje të lartë të rruazave të kuqe të gjakut
- D) Në njerëzit me numër apo përmbajtje të ulët të rruazave të kuqe të gjakut

62. Funkcionin e saj sekretor, lëkura e realizon nëpërmjet :

- A) poreve të lëkurës
- B) hapësirave ndërqelizore
- C) folikujve të flokut
- D) gjendrave të yndyrës dhe djersës

63. Funkcionin sensitiv lëkura e realizon nëpërmjet:

- A) pH të saj acid
- B) mbaresave nervore
- C) proceseve të shumta metabolike

D) shtresës së shndritshme

64. Krusta është element morfologjik dytësor që formohet nga :

- A) disa qeliza të brirëzuara të shtresës korneale
- B) tharja e sekrecioneve të vezikulave, erozioneve apo ulçerave
- C) traumatizimi i lëkurës me anë të thonjve
- D) hollimi i sipërfaqes së të gjitha shtresave të lëkurës

65. Përdorimi i acidit salicilik, për cilën nga patologjitë e mëposhtme është karakteristike:

- A) Psoriazis vulgaris
- B) Variçela
- C) Erizipela
- D) Skabies

66. Cili nga medikamentet e mëposhtme ka efekt keratolitik:

- A) permanganati i kaliumit
- B) pomada me gentamicinë
- C) acidi salicilik
- D) kortizonikët lokalë

67. Adipocitet janë qeliza të pranishme në :

- A) epidermë
- B) shtresën bazale të lëkurës
- C) shtresën papilare të dermës
- D) hipodermë

68. Cilën nga funksionet e mëposhtme kryen melaninia:

- A) merr pjesë në sistemin e mbrojtjes imunitare
- B) mbron lëkurën nga veprimi i rrezeve ultraviolet
- C) siguron funksionin mbrojtës kimik
- D) siguron mbajtjen konstante të temperaturës

69. Cila nga karakteristikat e mëposhtme i përket shtresës korneale:

- A) është shtresa e parë e epidermës duke u nisur nga brendësia në sipërfaqe
- B) përbëhet nga qeliza të mëdha me bërthamë
- C) merr pjesë në rigjenerimin e shtresave të sipërme të epidermës
- D) përbëhet nga qeliza të vdekura pa bërthamë

70. Në pacientët me Urtikarie, reaksioni i lëkurës është shoqëruar me një çlirim të histaminës, medikamentet e zgjedhura janë:

- A) Antibiotikët
- B) Antimykotikët
- C) Antihistaminikët
- D) Antiviralët

71. Infeksionet bakteriale lokale zakonisht mjekohen me:

- A) Antiviral
- B) Antibiotikë topical
- C) Nizoral
- D) Antihistaminikë

72. Cilat janë komplikacionet që takohen tek pacienti pas demtimit të sistemit nervor qendror?

- A) Paraliza
- B) Dhimbje kycesh
- C) Dhimbje muskujsh
- D) Temperaturë e lartë

73. Sa % e foshnjave të lindura nga nëna me Miasteni gravis shfaqin simptoma të sëmundjes?

- A) 44% e foshnjave
- B) 34% e foshnjave
- C) 24% e foshnjave
- D) 14% e foshnjave

74. Parkinsoni prek më shpesh grup-moshat:

- A) 50-55 vjeç
- B) 60-65 vjeç
- C) 70-75 vjeç
- D) 80-85 vjeç

75. Zona Wernicke, e lokalizuar midis zonave paresore të degjimit dhe shikimit është shumë e rëndësishme për:

- A) Interpretimin e gjuhës
- B) Përgjegjësi për gjenerimin e modeleve levizore
- C) Termoregulacionin
- D) Shikimin

76. Demtimet konjitive tek pacienti me skleroze multiple hasen në:

- A) Fazën e hershme të sëmundjes
- B) Fazën e mëvonshme
- C) Nuk takohen të tilla demtime
- D) Janë simptoma paralajmëruese

77. Vëzhgimi dhe vlerësimi neurologjik i pacientit me epilepsi, nga ana e infermierit, janë faktorë të rëndësishëm sepse:

- A) Përcaktojnë tipin e krizës epileptike
- B) Përcaktojnë llojin medikamentoz të trajtimit
- C) Vëndosin diagnozën përfundimtare
- D) Nuk janë pjesë e kujdesit

## **05. Inf. Kirurgji, Infekt, Trauma, Aneste, Reanimacion**

1. Termi hiperemi aktive i referohet ngjyrës së lëkurës:

- A) pas djegies së saj
- B) normale
- C) pas mjekimit
- D) pas një traume

2. Hypotermia aksidentale është një gjendje ku personi ekspozohet:

- A) në temperatura shumë të ulta
- B) në temperatura të ulta
- C) në situata aksidentale
- D) në temperatura të larta

3. Hypotermia urbane është :

- A) ekspozimi ekstrem ndaj të ftohtit në mjedise urbane
- B) ulja e temperaturës trupore nga kontakti me ujë të ftohtë
- C) ulja e temperaturës trupore nga patologji të ndryshme
- D) ulja e temperaturës trupore nga të ftohtit

4. Hemoragjia, quhet e ndërmjetme kur shfaqet :

- A) gjatë operacionit
- B) pak orë pas operacionit
- C) pak ditë pas operacionit
- D) pas një traume të jashtëme

5. Hemoragjia, quhet primare kur shfaqet:

- A) pak orë pas operacionit
- B) gjatë operacionit
- C) pak ditë pas operacionit
- D) pas një traume të jashtëme

6. Ndhma e pare në raste hemoragjie është:

- A) vendosja shtrirë e pacientit
- B) vendosja e bandazhit
- C) vendosja e akullit
- D) terapi medikamentoze

7. Donatori lejohet të japi gjak pasi të kenë kaluar të paktën:

- A) 45 ditë nga dhurimi i fundit
- B) 56 ditë nga dhurimi i fundit
- C) 65ditë nga dhurimi i fundit
- D) 75 ditë nga dhurimi i fundit

8. Sasia e gjakut që dhurohet është të paktën :

- A) 350ml
- B) 450 ml
- C) 550ml
- D) 650ml

9. Pësha minimale trupore për një donator gjaku duhet të jetë:

- A) 40 kg
- B) 50 kg
- C) 60 kg
- D) 70 kg

10. Moshë minimale për një donator gjaku është:

- A) 15 vjeç
- B) 17 vjeç
- C) 20 vjeç
- D) 25 vjeç

11. Moshë maksimale për një donator gjaku duhet të jetë:

- A) 45 vjeç
- B) 55 vjeç
- C) 65 vjeç
- D) 75 vjeç

12. Pozicioni më i përshtatshëm për pacientët pas operacionit është :

- A) pozicioni semi - Fowler
- B) pozicioni Fowler
- C) tredelenburg
- D) gjinekologjik

13. Mjeku Reanimator është anëtar në grupin:

- A) steril
- B) jo steril
- C) vezhgues
- D) qarkullues

14. Numërimi i veglave kirurgjikale para dhe pas operacionit kryhet nga:

- A) infermiera qarkulluese
- B) infermiera instrumentare
- C) mjeku kirurg
- D) mjeku anesteziat

15. Me termin asepsi nënkuptojmë:

- A) Eliminim të mikroorganizmave në një zonë të caktuar
- B) Kufizim të mikroorganizmave në një zonë të caktuar
- C) Pastrim
- D) Dezinfektim

16. Asepsia kirurgjikale përfshin të gjitha si më poshtë përveç:

- A) Përdorimin e dorezave sterile gjatë vendosjes së kateterit urinar
- B) Përdorimin e pajisjeve sterile në ndryshimin e garzave të plagës

- C) Larjen e duarve para dhe pas kryerjes së manipulimeve
- D) Sterilizimin e instrumentave kirurgjikal

17. Asepsia mjekësore përfshin :

- A) Larjen e duarve para dhe pas servirjes së ushqimit
- B) Larjen e duarve pas zbrazjes së uturakut
- C) Përdorimin e dorezave sterile gjatë mjekimit të plagës
- D) Larjen e duarve para, pas servirjes së ushqimit dhe pas zbrazjes së uturakut

18. Flebotomia konsiston në :

- A) venipunkturën dhe thithjen e gjakut
- B) dëmtimin e enës së gjakut
- C) venipunkturën dhe dhënien e gjakut
- D) aplikimin e infuzioneve

19. Vlerësimet fizike të pacientit në periudhën preoperative përfshijnë të gjitha si më poshtë, përveç:

- A) Vlerësimin e bilancit hidrik dhe elektrolitik
- B) Vlerësimin e statusit ushqimor
- C) Vlerësimin e funksionit kardiovaskular
- D) Vlerësimin e ankthit

20. Bën pjesë në anëtarët e grupit steril :

- A) Kirurgu
- B) Anestezisti
- C) Infermiera qarkulluese
- D) Asnjëra

21. Administrimi i opiateve para operacionit ndihmon :

- A) në paksimin e sekrecioneve
- B) uljen e tonusit muskular
- C) reduktimin e ankthit dhe stresit
- D) tharjen e mukozave

22. Administrimi i antikolinergjikëve para operacionit ndikon në :

- A) në pakësimin e sekrecioneve
- B) reduktimin e ankthit dhe stresit
- C) uljen e tonusit muskular
- D) tharjen e mukozave

23. Asepsitë kirurgjikale janë aktivitete që :

- A) minimizojnë përhapjen e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar
- B) eliminonin numrin dhe përhapjen e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar
- C) pakësojnë numrin e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar
- D) pakësojnë përhapjen e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar

24. Asepsia është procedura që bën të mundur:
- A) eliminimin e të gjithë mikroorganizmave
  - B) eliminimin e shumicës së mikroorganizmave
  - C) pakësimin e të gjithë mikroorganizmave
  - D) pakësimin e shumicës së mikroorganizmave
25. Anëtarë të grupit jo steril janë të gjithë si më poshtë përveç:
- A) Anestezisti
  - B) Infermiera qarkulluese
  - C) Ndhmës kirurgu
  - D) Teknikët radiolog
26. Praktikrat që ulin dhe pengojnë proceset e infeksionit në pacientët post– kirurgjikal quhen:
- A) Teknika Dezinfektuese
  - B) Teknika Dekontaminuese
  - C) Teknika Kontrolli
  - D) Teknika Aseptike
27. Pacientët e pranuar në Njësinë e Kujdesit Post – Anestezik pa refleksin faringeal duhet të vendosen në pozicion:
- A) Dorsal
  - B) Lateral
  - C) Fowler
  - D) Asnjëra
28. Infermieri duhet të njohë shenjat dhe simptomat e pengesës respiratore tek pacienti në periudhën post operatore, këto shenja përfshijnë:
- A) përdorimi i muskujve ndihmës gjatë frymëmarrjes
  - B) hipotension arterial
  - C) dhimbje kraharori
  - D) asnjëra
29. Përdorimi i klizmës pastruese është i detyrueshëm të aplikohet :
- A) para të gjitha llojeve të operacioneve
  - B) para operacioneve që përfshijnë traktin gastro - intestinal
  - C) para operacioneve që përfshijnë traktin uro -genital
  - D) para asnjë lloj operacioni pasi nuk rekomandohet më
30. Infermiera qarkulluese është pjesë e:
- A) grupit steril
  - B) grupit josteril
  - C) grupit vëzhgues
  - D) nuk është antare e bllokut operator
31. Ruajtja e sigurisë dhe integritetit të fushës sterile gjatë procedurës kirurgjikale është detyrë e :



- A) kirurgut primar
- B) anestezistit
- C) infermieres qarkulluese
- D) infermieres instrumentare

32. Në rast se pas operacionit kanë kaluar më shumë se 12 – 18 orë dhe pacienti nuk ka urinuar, ndërhyrje primare është :

- A) vendosja e kateterit urinar
- B) nxitja e pacientit për të urinuar vetë nëpërmjet përdorimit të borsave të ngrohta
- C) vendosja e kateterit supra pubik
- D) asnjëra

33. Hipotensioni arterial në periudhën post –operatore mund të shkaktohet nga:

- A) Acidoza
- B) Hipokseミア
- C) Disritmia
- D) Humbja e gjakut dhe e lëngjeve

34. Cila nga alternativat e mëposhtme tregon për një procedurë diagnostikuese?

- A) kolostomia
- B) ileostomia
- C) kolonoskopia
- D) jejunostomia

35. Djegiet kimike të lëkurës cilat rezultojnë nga lëndë korrozive duhet:

- A) Të shpëlahen menjëherë me ujë të rrjedhshëm për 15 – 20 min
- B) Të aplikohet pomadë
- C) Të aplikohet balsame
- D) Të fashohet menjëherë

36. Pas operacioneve gastrike pacienti këshillohet të qëndroj në pozicionin:

- A) Fowler
- B) Semi- Fowler
- C) Tredelenburg
- D) Gjinekologjik

37. Infermiera qarkulluese ka përgjegjësi për të gjitha sa më poshtë përveç :

- A) A Kryerjen e veprimeve jashtë fushës sterile
- B) Të siguroj kujdes infermieror për pacientin
- C) Të siguroj mbështetje emocionale për pacientin
- D) Të numërojë instrumentet dhe paisjet e përdorura në operacion

38. Është procedure diagnostikuese :

- A) qarkullimi ekstrakorporal
- B) koronarografia
- C) stenti

D) koronaroskopia

39. Qarkullimi ekstrakorporal haset në:

- A) Kardiokirurgji
- B) Neurokirurgji
- C) Kirurgji abdominale
- D) Kirurgji estetike

40. Hematemeza është :

- A) Prania e gjakut në të vjella
- B) Prania e gjakut në feçe
- C) Rrjedhja e gjakut nga hundët
- D) Asnjëra

41. Dhënia e ushqimeve dhe e lëngjeve nga goja tek pacientët post – operator fillon:

- A) Në momentin e rifillimit të peristaltikës dhe zhurmës aktive intestinale
- B) Në momentin e rifillimit të diurezës
- C) Në momentin e stabilizimit të presionit arterial
- D) Asnjëra

42. Çrregullimi i bilancit hidro-elektrolitik tek pacientët e djegur mund të vijë si pasojë e:

- A) Humbjes të një sasive të madhe plazme
- B) Humbjes të një sasive të madhe gjaku
- C) Diurezës së shtuar
- D) Asnjëra

43. Plagët nga dekubituset janë plagë që shkaktohen nga:

- A) traumat e hapura
- B) armët e zjarrit
- C) aksidentet automobilistike
- D) qëndrimi në shtrat për një kohë të gjatë

44. Faktorët që ndikojnë për formimin e dekubituesëve janë të gjitha përveç:

- A) kequshqyerja
- B) higjiena e ulët
- C) gjendja emocionale
- D) qëndrimi gjatë në shtrat

45. Në një retension urinar përdoret kateteri:

- A) Robinson
- B) Nichols
- C) Foley
- D) Moby- Dick

46. Gastrostomia është procedure që ushqen pacientin nga:

- A) ezofagu

- B) stomaku
- C) jejunum
- D) kolon

47. Ndërrimi i pensamentëve të plagës operatore bëhet:

- A) 10 - 15 orë pas operacionit
- B) 16 - 24 orë pas operacionit
- C) 36 - 48 orë pas operacionit
- D) 52 - 72 orë pas operacionit

48. Trajtimi fillestar i plagës bëhet me:

- A) antibiotik
- B) kortizonik
- C) sol. fiziologjik
- D) betadinë

49. Litotripsia është thyerja e gurëve në:

- A) vezikën urinare
- B) veshka
- C) uretër
- D) kolecist

50. Një plagë quhet e papastër kur:

- A) nuk ka rrjedhje të madhe nga organet viscerale
- B) kur ka pezmatim pa eksudat qelbëzues
- C) që nuk kanë shenja të pezmatimit
- D) nëse ka supuracion

51. Një plagë quhet e kontaminuar kur:

- A) nuk ka rrjedhje të madhe nga organet viscerale
- B) kur ka pezmatim pa eksudat qelbëzues
- C) që nuk kanë shenja të pezmatimit
- D) nëse ka supuracion

52. Faktorët e rrezikut për infeksione spitalore të plagëve janë të gjitha përveç:

- A) përkujdesja perioperative
- B) sterilizimi i pajisjeve
- C) gjendja e të sëmurit
- D) statusi emocional i të sëmurit

53. Irrigimi i plagës nënkupton:

- A) suturimi i plagës
- B) trajtimi me antibiotik
- C) lavazhi i plagës
- D) fashimi i plagës

54. Qëllimi primar në trajtimin e ulçerës stazike venoze të këmbës është:

- A) Pastrimi i plagës me alkool
- B) Përdorimi i lidokainës lokale
- C) Sigurimi i shërimit të plagës dhe parandalimi i infeksionit
- D) Asnjëra

55. Gjatë djegies pacienti ka humbje më të theksuar të :

- A) plazmës
- B) gjakut
- C) urinës
- D) djersës

56. Ku përdoret rregulli i 9-ës?

- A) Në politrauma
- B) Në ngrirjet trupore
- C) Në djegiet trupore
- D) Plagët me armë zjarri

57. Ileusi adinamik zakonisht ndodh:

- A) 1 ditë pas operacionit
- B) 2 - 3 ditë pas operacionit
- C) 4 - 6 ditë pas operacionit
- D) 6 - 8 ditë pas operacionit

58. Mamografia është e këshillueshme të behet çdo vit për gra:

- A) 20 vjeç
- B) 30 vjeç
- C) 40 vjeç
- D) mbi 50 vjeç

59. Ekstravazacioni është komplikacion pas:

- A) kirurgjisë
- B) kimioterapisë
- C) radioterapisë
- D) radiografisë

60. Traumata e rënda të heparit mund të shkaktojnë:

- A) Insuficiencë renale
- B) Shok hipovolemik si pasojë e hemoragjisë
- C) Hipertension arterial
- D) Leukopeni

61. Në tumoret metastatike të heparit dallohet:

- A) Angiografi negative
- B) Zvogëlim të heparit
- C) Ascit (me nuancë gjaku)

D) Hiperproteinemi

62. Në kancerin e gjirit nuk ndikojnë:

- A) Historia familjare me këtë diagnozë
- B) Terapia me hormone
- C) Numri i pakët i lindjeve
- D) Ulja e konsumit të yndyrnave shtazore dhe proteinave

63. Për kancerin e gjirit nuk përfshihen këto diagnoza infermierore:

- A) Ndryshime në jetën seksuale
- B) Pamundësi për infeksion
- C) Dëmtim i integritetit të lëkurës
- D) Frikë dhe ankth, lidhur me prognozën e sëmundjes

64. Në pacientët me kancer gastrik:

- A) Hemoragjia është e theksuar
- B) Në raste të rralla ndodh hemoragjia për këtë diagnozë
- C) Ikteri paraqitet në stadin e parë të sëmundjes
- D) Prognoza nuk është shumë e varfër

65. Gjatë realizimit të një transfuzioni gjaku, në 15–30 minutat e para infermieri observon pacientin për :

- A) Shenja reaksioni
- B) Shenja infeksioni
- C) Hipertension
- D) Asnjëra

66. Edukimi i një pacienti me urolitiazë në lidhje me sigurimin e një hidratimi optimal, ka si qëllim kryesor:

- A) Parandalimin e recidivave
- B) Rehidrimin e pacientit
- C) Parandalimin e komplikacioneve
- D) Asnjëra

67. Në karcinomën hepatoqelizore, testet diagnostike shpesh zbulojnë:

- A) Nivele të larta të leukociteve
- B) Nivele të larta të trombociteve
- C) Nivele të larta të AFP (alfafetoproteinës)
- D) Të gjitha

68. Në rastin e gastrektomisë më e rëndësishme është të administrohet:

- A) Vitaminë E
- B) Vitaminë B12
- C) Ushqime me frekuencë të lartë
- D) Ushqime me rrugë orale

69. Ileostomia - Qëllimi i interventeve infermiere nuk përfshin:

- A) Sigurimin e eliminimit normal intestinal
- B) Reduktimin e dhimbjeve dhe spazmave abdominale
- C) Përshkrimin e medikamenteve analgjezike
- D) Reduktimin e ankthit dhe stresit

70. Në prekjën e heparit nga metastazat nuk ndikojnë:

- A) Vaskularizimi i theksuar i heparit
- B) Pozicioni i tij anatomik
- C) Niveli i koshiencës
- D) Tumoret nga trakti gastrointestinal

71. Ileusi adinamik:

- A) Ka një prognozë të varfër
- B) Në përgjithësi ka prognozë të mirë
- C) Trajtimi është gjithmonë kirurgjikal
- D) Është shkaku më i rrallë i obstrukcionit intestinal

72. Për të parandaluar ulçerën stazike venoze duhet te:

- A) Ndërpritet aktiviteti fizik
- B) Ekspozohet zona e prekur në temperatura të ftohta
- C) Pozicionohen ekstremitetet më poshtë se niveli i zemrës
- D) Të kontrollohen pulset periferike dhe temperatura e ekstremiteteve

73. Faktor që nuk ndikon në kalkulozën e aparatit urinar është:

- A) Staza urinare
- B) Infeksioni i traktit urinar
- C) Staza venoze
- D) Dehidrimi

74. Për të mbajtur bilancin elektrolitik, nuk është vlerësim specifik:

- A) Niveli i elektroliteve
- B) Marrjet dhe nxjerrjet e likideve
- C) Turgori i lëkurës
- D) Niveli i gazeve në gjak

75. Pacienti me gastrostomi, nuk ka prezencë infeksioni nëse:

- A) Lëkura është e skuqur përreth inçizionit
- B) Është afebril
- C) Ka drenim nga plaga
- D) Leukocitozë

76. Interventet infermiere për pacientin me ileostomi nuk kanë për qëllim:

- A) Reduktimin e dhimbjes
- B) Pakësimin gradual të marrjeve orale
- C) Mbajtjen e bilancit elektrolitik dhe peshës trupore

D) Sigurimin e eleminimit intestinal

77. Menaxhimi infermieror, para kirurgjisë kardiake përfshin:

- A) Vetëm vlerësim të hollësishëm të sistemit kardiak
- B) Vlerësimin e sistemit respirator
- C) Vlerësim të detajuar sistematik
- D) Ndërprerjen e terapisë medikamentoze të mëparshme

78. Stafi infermieror instrukton pacientët me patologji të sistemit biliar të:

- A) Shtojnë sasinë e ynyrnave
- B) Të pakësojnë kaloritë dhe yndyrnat në dietën ushqimore
- C) Të shtojnë peshën trupore
- D) Mbajnë regjim absolut pushimi

79. Nuk është prioritet i menaxhimit infermieror për pacientët me gastrostomi:

- A) Mbajtja e statusit nutricional
- B) Mbrojtja integritetit të lëkurës
- C) Përshtatja me ndryshimet në imazhin trupor
- D) Përcaktimi i dietës ushqimore specifike për këta pacientë

80. Perfuzioni indor për pacientët me patologji kardiake vlerësohet me të gjitha metodat e mëposhtme përveç njëjës:

- A) Monitorimit të EKG
- B) Matjes së presionit arterial dhe nivelit të gazeve në gjak
- C) Eleminimit urinar
- D) Reagimit nga medikamentet analgjezike

81. Menaxhimi i pacientëve me obstrukcion të zorrës së trashë bëhet me:

- A) Trajtim operator kur bllokimi është i pjesshëm
- B) Intervent kirurgjikal vetëm kur bllokimi është i plotë
- C) Radiografi me barium
- D) Trajtim jo kirurgjikal në rastin e perforimit intestinal

82. Komplikacioni më i shpeshtë për pacientët me ileostomi është:

- A) Kalkuloza urinare
- B) Stenoza stomale
- C) Irritimi i lëkurës peristomale
- D) Cholelithiasis

83. Limadeniti është:

- A) infeksion kirurgjik i nyjeve limfatike
- B) infeksion akut nekrotik
- C) infeksion kirurgjikal i gjendrave të djersës
- D) infeksion akut purulent

84. Ulçera diabetike karakterizohet nga:

- A) Dhimbje shumë të fortë
- B) Dhimbje të moderuar
- C) Dhimbje të lehtë ose mungesë të saj
- D) Mungesa e recidivimit

85. Në diagnozat infermierore në rastin e ileostomisë nuk përfshihet:

- A) Alternime në komfort
- B) Spazma abdominale
- C) Imbalancë lëngjesh dhe elektrolitësh
- D) Stabilitet në eliminimin intestinal

86. Shoku septik fillon me të gjitha shenjat e mëposhtme përveç:

- A) ethe
- B) stres
- C) temperaturë të lartë
- D) hypotension

87. Karbunkuli është:

- A) inflamacion akut nekrotik purulent
- B) infeksion akut-purulent
- C) infeksion kirurgjikal i gjendrave të djersës
- D) infeksion kirurgjik i nyjeve limfatike

88. Organizmi shkaktar për gjendjen e sepsit të rëndë nuk mund të jetë:

- A) Escherichia coli
- B) klebsiella
- C) stafilococcus aureus
- D) virusi

89. Sa duhet të jetë diureza që të themi se funksioni renal vjen duke u përmiresuar?

- A) 20 ml/ore
- B) 25 ml/ore
- C) 30 ml/ore
- D) 40 ml/ore

90. Efektin e vet dëmtues virusi i SIDA-s e ka mbi limfocitet:

- A) A
- B) C
- C) T
- D) E

91. Cili është streptokoku më i hasur tek njerëzit:

- A) hemolitik i grupit E
- B) hemolitik i grupit C
- C) hemolitik i grupit D
- D) hemolitik i grupit A



92. Mononukleozat Infektive shkaktohet nga :

- A) neisseria gonorea
- B) clostridium botulinum
- C) virusi Epstein-Barr
- D) Plasmodium

93. Transmetimi i sëmundjes infektive nga një vektor mekanik vjen nga:

- A) mizat
- B) mushkonjat
- C) karkalecat
- D) gjinkallat

94. Transmetimi i sëmundjes infektive nga një vektor organik vjen nga:

- A) mizat
- B) mushkonjat
- C) karkalecat
- D) gjinkallat

95. Tipar i përbashkët i gjithë infeksioneve kirurgjikale është:

- A) nekroza
- B) fistula
- C) hemorragjia
- D) hipotermia

96. Shkalla e prevalencës është raporti :

- A) nr total i të sëmurëve me sëmundje infektive / nr. i pacientëve në total
- B) nr. i pacientëve në total / nr.total i të sëmurëve me sëmundje infektive
- C) nr. i pacientëve në spital në krahasim me popullatën
- D) nr. i pacientëve në infektiv / me nr. e pacientëve në spital

97. Incidenca e infeksionit për plagët operatorore të pastra duhet të jetë:

- A) nën 5%
- B) nën 7 %
- C) nën 10 %
- D) nën 15 %

98. Nuk bën pjesë në plagët e mbyllura:

- A) Kontuzioni
- B) Hematomat
- C) Sindromi Crush
- D) Plagët incizionale

99. Nuk bën pjesë në manifestimet klinike të Kontuzionit:

- A) Hematoma
- B) Fraktura

- C) Hemorragjia
- D) Nauze/të vjella

100. Shkaktari më i shpeshtë i infeksioneve spitalore është :

- A) E. Coli
- B) Candidas
- C) Spiroketa
- D) Streptokoku

101. Periudha e inkubacionit të mononukleozës infektive varion :

- A) 10- 20 ditë
- B) 20- 30 ditë
- C) 30- 50 ditë
- D) 40- 60 ditë

102. Triada ethe - dhimbje fyti- zmadhim i nodjve limfatik cervikal është karakteristik e:

- A) tetanozit
- B) meningokoksisë
- C) mononukleozes infektive
- D) stafilokoksisë

103. Forma më e shpeshtë e salmonelozës është :

- A) ethet tifoide
- B) forma gastrointestinale
- C) bakteremia me ose pa infeksion
- D) mbartia asimptomatike

104. Sëmundja e "papastërtisë" mund të quhet

- A) salmoneloza
- B) amebiaza
- C) ethet tifoide
- D) shigeloza

105. Përfshihet në shkaqet e hemorragjisë digjестive të poshtme:

- A) varicet e ezofagut
- B) gastritet
- C) divertikuli i Meckelit
- D) sindromi Mallory-Weiss

106. Infeksionet Nosokomiale ndryshe quhen:

- A) komune
- B) ambjentale
- C) spitalore
- D) shtëpiake

107. Eshtë karakteristike për hemorragjinë venoze:

- A) gjaku me ngjyrë të kuqe
- B) gjaku rrjedh me pulsacione
- C) rrjedhje e pandërprerë e gjakut
- D) rrjedhje e ngadalshme e gjakut të errët

108. Nuk bejnë pjesë në grupin e përhapjes së infeksionëve nga vektorët:

- A) njerëzit
- B) minjtë
- C) mizat
- D) mushkonjat

109. Vaksina profilaktike për hepatitin B aplikohet në:

- A) një dozë
- B) dy doza
- C) tre doza
- D) katër doza

110. Nuk bën pjesë në imobilizimin e jashtëm:

- A) gipsi
- B) qaforia
- C) protezat
- D) traksioni

111. Osteomieliti është:

- A) frakturë e kockës
- B) infeksioni i kockës
- C) distorcion i artikulacionit
- D) rupturë ligamenti

112. Fiksatori ekstern përdoret në :

- A) rupturën e ligamenteve
- B) rupturën e tendinave
- C) frakturë të kockave të shkurtra
- D) frakturë të kockave të gjata

113. Sa kohë mbahet longeta e allçisë në frakturën e kockave të parakrahut?

- A) 2 javë
- B) 3 javë
- C) 6 javë
- D) 8 javë

114. Koha e tharjes së allçisë në ekstremitete është:

- A) rreth 10-12-orë
- B) rreth 12-24 orë
- C) rreth 24-48 orë
- D) rreth 48-72 orë

115. Traksioni pelvik është:

- A) i vazhdueshem
- B) statik
- C) dinamik
- D) intermitent

116. Vlerësimi i mekanizmave të dëmtimit dhe e forcave kinetike që kanë vepruar mbi pacientin gjatë një incidenti traumatik ose aksidenti quhet:

- A) energji kinetike
- B) kinetika e traumës
- C) procesi i traumës
- D) shpejtësia e goditjes

117. "Ora e artë" ju kujton:

- A) koha në të cilën ndodh një politraum
- B) koha në të cilën transportohet një person i aksidentuar
- C) dhënia e ndihmës brenda 1 ore nga koha e dëmtimit
- D) mbledhja e të dhënave për një person të aksidentuar

118. Një frakturë quhet e stresuar kur:

- A) muskujt mbështjellës nuk e akumulojnë më energjinë e nevojshme
- B) ndodh si pasojë e patologjive të ndryshme
- C) ndodh si pasojë e traumave të jashtëme
- D) ndodh si pasojë e osteomielitit

119. Esenciale kur transportohet një pacient me politraum është:

- A) mbështjellja e pacientit
- B) imobilizimi i kokës dhe i qafës
- C) imobilizimi i ekstremiteteve të sipërme
- D) infuzionimi i pacientit

120. Në cilin lloj të traksionit sasia e peshave që aplikohet është me e vogel:

- A) te lekurës
- B) skeletal
- C) statik
- D) dinamik

121. Fiksatorët ekstern në ekstremitetet e sipërme hiqen pas:

- A) 2 javë
- B) 4 javë
- C) 6 javë
- D) 8 javë

122. Cili është qëllimi kryesor i vlerësimit infermieror preoperator?

- A) Të reduktojë morbiditetin dhe mortalitetin perioperator

- B) Të merren të dhëna për sëmundjen kirurgjikale
- C) Të hartohet një strategji menaxhimi
- D) Të hartohet një plan anestetik

123. Sa orë para duhet të ushqehen neonatët dhe fëmijët para kirurgjisë?

- A) 2 orë para kirurgjisë
- B) 30 minuta para kirurgjisë
- C) 6 orë para kirurgjisë
- D) 4 orë para kirurgjisë

124. Bronkospazma mund të shkaktojë:

- A) Qëndrueshmëri hemodinamike
- B) Hiperventilim postoperator
- C) Insuficiencë renale
- D) Hipoventilim dhe hipoksemi

125. Insuficienca respiratore në kirurgjinë abdominale ndodh nga shkaqet e mëposhtme përveç:

- A) Depresion i qendrës respiratore pas anestezisë
- B) Distensioni abdominal
- C) Dhimbja abdominale
- D) Hemorragji nga plaga

126. Cili është standarti bazë për të vlerësuar shkëmbimin e gazeve në pulmone:

- A) vlera e presionit arterial të dioksidit të karbonit
- B) vlera e presionit arterial të oksigjenit
- C) gazanaliza e gjakut arterial
- D) vlera e oksihemoglobinës

127. Vlera e saktë e presionit arterial të oksigjenit është:

- A) 50-70 mmHg
- B) 90-100 mmHg
- C) 100-120 mmHg
- D) 30-40 mmHg

128. Shoku hipovolemik shkaktohet nga humbja e:

- A) më shumë se 20-25% të masës qarkulluese të gjakut
- B) më pak se 5-10% të masës qarkulluese të gjakut
- C) afërsisht 2-3% të masës qarkulluese të gjakut
- D) 1-5% të masës qarkulluese të gjakut

129. Në shokun hipovolemik kemi:

- A) Hipertension
- B) Lëkurë të zbehtë dhe të ftohtë
- C) Puls I ngadaltë
- D) Diurezë të shtuar

130. Interventet infermiore në rastin e shokut fillojnë me:

- A) Rivendosjen e funksionit kardiak
- B) Reduktimin e ankthit
- C) Përmirësimi i oksigjenimit
- D) Rivendosjen e bilancit elektrolitik

131. Likidet intravenoze zëvendësuese:

- A) Mbajnë volumin në hapësirën vaskulare
- B) Nuk japin asnjëherë reaksione alergjike
- C) Janë trajtues të hipovolemisë
- D) Përfshijnë edhe plazmën e frekët të ngrirë

132. Pas ingestionit të substancave korrozive është I kundërrinduar:

- A) Shplarja me likide menjëherë pas ingestionit
- B) Lavazhi gastrik
- C) Hollimi i substancës korrozive
- D) Sigurimi i rrugëve respiratore

133. Në helmimet ingestive me helme, kur pacienti nuk është koshient së pari aplikojmë: A)

- Lavazhin me sondë orogastrike
- B) Aspirimin gastrik
- C) Vendosja e tubit endotrakeal për të mbrojtur rrugët respiratore
- D) Provokimin e të vjellave

134. Në helmimet me substanca fortësisht acide ose bazike kundërrindohen:

- A) Inserimi i sondës nazogastrike me shumë kujdes
- B) Radiografia
- C) Provokimi i të vjellave
- D) Përdorimi i qumështit në raste të veçanta

135. Veprimi i parë infermior në rastin e reaksionit akut hemolitik është:

- A) Administrimi i kortikosteroideve
- B) Trajtimi i hipotensionit me likide dhe vazopresorë
- C) Dërgimi i një mostre gjaku në bankën e gjakut
- D) Ndërprerja e menjëhershme e transfuzionit

136. Shkalla e ndryshimeve që ndodhin në organizmin e të operuarit nuk varet nga:

- A) përgatitja preoperatorë
- B) gjendja e të sëmurit pas operacionit
- C) lloji i anesteziës
- D) lloji i ndërhyrjes kirurgjikale

137. Dhimbja e patrajtuar shkakton:

- A) Rritjen e kërkesave për oksigjen
- B) Ulje të pulsit
- C) Ulje të presionit arterial

D) Reduktim të ideve suicidale

138. Në komplikacionet e mëvonshme të operacionit bën pjesë:

- A) infeksioni
- B) ethe reumatizmale
- C) pneumotoraks valvular
- D) skoliozë

139. Vlerat e presionit venoz central janë:

- A) Shumë të ulëta në shokun hipovolemik
- B) Shumë të ulëta në shokun septik
- C) Normale në shokun kardiogjen
- D) Shumë të larta në shokun hemoragjik

140. Shoku është një sindrom i:

- A) Hipertensionit dhe perfuzionit relativisht të lartë indor
- B) Presionit arterial të lartë
- C) Hipotensionit dhe perfuzionit të ulët indor
- D) Rritjes së masës qarkulluese

141. Rastet kur indikohet intubimi endotrakeal:

- A) Ventilim i përshtatshëm
- B) Rrugëve respiratore të lira
- C) Saturimi i oksigjenit është mbi 90%
- D) Insuficienca respiratore me hiperkapni

142. Nuk bën pjesë në instrumentat kirurgjikale:

- A) pincat
- B) bisturia
- C) diverikatorët
- D) defibrilatori

143. Nuk është qëllim i pastrimit të plagës në ulcer:

- A) largimi i fibrinës
- B) largimi i nekrozës
- C) largimi i gjakut
- D) largimi i fistulës

144. Halotani është lëndë anestetike e cila përdoret:

- A) Vetëm tek fëmijët
- B) Vetëm tek të rriturit
- C) Tek fëmijët dhe të rriturit
- D) Duke mos u përzier me oksigjenin

145. Obeziteti nuk favorizon komplikacione postoperatore të tilla si :

- A) Infeksion

- B) Dehishencë të suturave
- C) Obstruksion të rrugëve respiratore
- D) Psikozën postoperatore

146. Ulcerat venoze shfaqen nga:

- A) diabeti
- B) fistulat artero-venoze
- C) infeksionet e lëkurës
- D) pamjaftueshmëria arteriale

147. Obstruksioni respirator nuk manifestohet me:

- A) Cianoze
- B) Apne
- C) Nivele normale të gazeve në gjakun arterial
- D) Përdorim të muskujve aksesor

148. Në rastin e ventilimit jo të përshtatshëm kemi:

- A) Ulje të presionit të dioksidit të karbonit
- B) Ulje të PH të gjakut (acidozë respiratore)
- C) Rritje të PH sistemik
- D) Funkcion të ruajtur të miokardit

149. Staf i infermieror para interventit kirurgjikal nuk mund të përcaktojë:

- A) Diagnozën, lidhur me ankthin preoperator
- B) Diagnozën ,lidhur me nivelin e dhimbjes
- C) Llojin e anesteziës që do të aplikohet
- D) Komplikacionet potenciale në periudhën postoperatore

150. Kateterët ureteral kanë qëllim:

- A) Diagnostik
- B) Parandalues
- C) Terapeutik
- D) Evakuativ

151. Nuk bën pjesë në komplikacionet e menjëhershme pas operacionit:

- A) Hipertension
- B) Hipotension
- C) Hipotermi
- D) Hiperkalcemi

## **06. Inf. Obstr-Gjin, Sh-Riprodhues**

1. Ku bën pjesë metoda kalendarike?

- A) Në kontraktivët oralë
- B) Në metodat natyrale
- C) Në metodat barijere



D) Në metodat kimike

2. Cili është mekanizmi i veprimit të një spermicidi?

- A) Mbajtja e pH acid të vaginës
- B) Mbajtja e pH alkaline të vaginës
- C) Hollimit të mukusit cervikal
- D) Trashje të mukusit cervikal

3. Cila nga simptomat e mëposhtme bën që gruaja të ndërpres menjëherë kontraktivët oral të kombinuar dhe të paraqitet tek mjeku?

- A) Çrregullime të të parit
- B) Perforacion të uterusit
- C) Infeksion
- D) Temperaturë

4. Sekretionet vaginale me erë si të peshkut të prishur është karakteristikë për cilin nga këto infeksione:

- A) Herpesin genital
- B) Infeksioni nga gonorea
- C) Infeksioni nga chlamydia
- D) Vaginozën bakteriale

5. Shfaqja e ulçeracionit që në momentin e parë të inokulimit të shkaktarit në organet gjinore është karakteristike për infeksion nga:

- A) Trikomoniaza
- B) Gonorea
- C) Sifilizi
- D) Klamidia

6. Cili nga infeksionet seksualisht të transmetueshme ka mundësi të çojë në kancer të traktit gjinor?

- A) Human Papiloma Virus
- B) Infeksioni trikomonial
- C) Vaginoza bakteriale
- D) Infeksioni mykotik

7. Dhimbje në kuadratet e poshtme abdominale, temperaturë, gjakrrjedhje vaginale të herë pas herëshme, sekrecione vaginale purulente, nauze, të vjella; kuadri klinik i cilës patologji i referohet:

- A) Sindromit të Shokut Toksik
- B) Sëmundjes Inflammatorë Pelvike
- C) Infeksionit trikomonial
- D) Infeksionit herpetik

8. Zonja X është beqare dhe përshkruan jetën e saj seksuale, si aktive dhe me shumë partnerë. Ajo dëshiron të përdorë një metodë kontrceptive, e cila është e sigurtë dhe që nuk ndikon në aktivitetin e saj seksual. Ajo kërkon D.I.U.. Përgjigja më e përshtatëshme e mamise do të jetë:

- A) D.I.U. do t'ju mbrojë ju nga SST
- B) D.I.U. nuk ndikon në aktivitetin seksual
- C) Përqindja e shtatzanive është më e lartë me D.I.U.
- D) Rreziku i Sëmundjes Inflammatorë Pelvike është më i madh për ju

9. Cila nga metodat kontrceptive të mëposhtme përveç efektit kontrceptiv ka ndikim për të parandaluar infeksionet seksualisht të transmetueshme?

- A) Dispozitivi intrauterin
- B) Kontraceptivi oral
- C) Sterilizimi kirurgjikal
- D) Spermicidet

10. Perforacioni i uterusit është komplikacioni i cilës metodë kontrceptive:

- A) Metodave barrjerë
- B) Sterilizimit kirurgjikal
- C) Kontraceptivëve injektabel
- D) Dispozitivit intrauterin

11. Karakteristika e sekrecioneve vaginale në infeksionin mykotik është:

- A) Sekrecione të pakta në sasi por pa erë
- B) Sekrecione të pakta në sasi por me erë
- C) Sekrecione të shumta, të trasha pa erë
- D) Sekrecione të shumta, të trasha me erë

12. Cila nga infeksionet seksualisht të transmetueshme shoqërohet me sëmundjen inflamatorë pelvike, barrën ekstrauterine, infertilitetin?

- A) Gonorrea
- B) Kondyloma
- C) Klamidia
- D) Herpesi

13. Mbrojtia abdominale që përfitohet gjatë palpacionit është një e dhënë e rëndësishme që ndodh në:

- A) Sëmundjen Inflammatorë Pelvike
- B) Sindromi e Shokut Toksik
- C) Infeksionin moniliar
- D) Vaginozën bakteriale

14. Nga se shkaktohet infertiliteti?

- A) Përdorimi i tamponëve vaginalë
- B) Sëmundjet seksualisht të transmetueshme
- C) Përdorimi i metodave barrjerë
- D) Përjetimi i infeksionit mykotik

15. Cila nga metodat kontraceptive ka efekt më të gjatë?

- A) Injeksionet Depo-Provera
- B) Kontraceptivi i urgjencës
- C) Implantet subdermale
- D) Spermicidet

16. Cili nga infeksionet e mëposhtme nuk ka mjekim specifik por vetëm simptomatik?

- A) Sifilizi
- B) Herpesi Genital
- C) Gonorrea
- D) Klamidia

17. Sëmundja inflamatore pelvike jep infeksionin:

- A) Salpingitis
- B) Otitis
- C) Iritis
- D) Artrit

18. Pilulat kontraceptive të kombinuara veprojnë sipas mekanizmit të mëposhtëm përveç:

- A) nivelet e larta të estrogenit parandalojnë ovulacion duke inhibuar prodhimin e FSH
- B) progesteroni mban mukusin cervical të trashë dhe bën kështu të vështirë penetrimin e spermës.
- C) progesteroni ndryshon shtresën e uterusit dhe e bën të papërshtatshme implantimin e vezës.
- D) veprojnë lokalisht në uterus

Pyetja 19. Kur gruaja shtatzanë paraqitet për herë të parë në klinikë mamia/mjeku i drejton disa pyetje rreth hepatitit, të cilat bëjnë pjesë në:

- A) Anamnezën e kaluar obstetrikale
- B) Anamnezë personale dhe familjare
- C) Historinë mjekësore
- D) Anamnezë gjenetike

20. Cila nga alternativat bën pjesë në anamnezën gjinekologjike?

- A) Histori për dysmenorrhea
- B) Infeksione gjatë periudhes së post partumit
- C) Probleme të post partumit hemoragjik
- D) Rezultatet e testeve të barrës, nëse janë kryer

21. Cila nga alternativat përfshihet në anamnezën obstetrikale?

- A) Cila ka qënë mënyra e lindjes?
- B) Kur ka ndodhur kojtusi i parë?
- C) Kë Metodë kontraceptive ke përdorur?
- D) Sa është numri i partnereve seksual?

22. Konjugata diagonale është distanca midis:

- A) Buzës së sipërme të simfizës pubike & promontoriumit
- B) Dy tuberoziteteve iskiadike
- C) Pjesës së pasme të simfizës pubike & promontoriumit
- D) Promontoriumit sacral & buzës së poshtme të simfizës pubike

23. Konjugata e vërtetë është distanca midis :

- A) Buzës së sipërme të simfizës pubike & promontoriumit
- B) Dy tuberoziteteve iskiadike
- C) Promontoriumit sacral & buzës së poshtme të simfizës pubike
- D) Pjesës së pasme të simfizës pubike & promontoriumit

24. Pjesa e pelvisit e cila është më shumë e përfshirë me lindjen është:

- A) Koksiksi
- B) Pelvisi falls
- C) Pelvisi i vërtetë
- D) Sakrumi

25. Informacioni i siguruar nga metodat e Leopoldit përfshin:

- A) Paraqitjen fetale
- B) Rritjen dhe zhvillimin fetal
- C) Vlersimin e toneve fetale
- D) Vlersimin e tonusit maternal

26. Metodat e Leopoldit kryesisht janë përdorur për të:

- A) Për të hequr presurën nga kordoni umbilikal
- B) Përcaktuar nëse vezika është e distenduar
- C) Sygjëruar vendin e monitorimit external të kontraksioneve uterine
- D) Vlerësuar prezentacionin dhe zbritjen

27. Frekuenca normale e toneve fetale është:

- A) 90 - 100 rrahje për minut
- B) 180 rrahje për minut
- C) 90 - 140 rrahje për minut
- D) 120 - 160 rrahje për minut

28. Një grua 4 javëshe shtatzanë i kërkon mamisë se kur ajo është në gjendje të dëgjojë RZF- të e fëmijës së saj. Mami i thotë asaj se me stetoskop ultrasonografik special apo fetoson i cili i amplifikon (i zmadhon) tonet, R.Z.F. mund të dëgjohen afërsisht

- A) 2 - 4 javësh
- B) 6 - 8 javësh
- C) 10 - 12 javësh
- D) 14- 16 javësh

29. Rrahjet e Zemrës Fetale nuk dëgjohen me stetoskop të zakonshëm obstetrikal kur kemi:

- A) Anomali fetale
- B) Moshë barre 28 javë

- C) Shtatzani me më shumë se një fetus
- D) Obezitet amtar

30. Sa shpejt arrin të percaktojë barrën, ekografia me sondë vaginale?

- A) 6 javë
- B) 4 javë
- C) Afersisht 10 javë
- D) Pas 10 ditësh

31. Një shenjë supozuese e shtatzanisë është:

- A) Kontraksionet e Braxton- Hicks
- B) Ndërprerja e menseve
- C) Shenja e Hegarit
- D) Zhurmat uterine

32. Shenja Goodell është:

- A) Diskolorim (cerviksit, mukozës së vaginës & vulvës)
- B) Përkulja e trupit të uterusit mbi cerviks
- C) Zbutja e cerviksit
- D) Zbutja e istmusit

33. Në ekzaminimin fizik, mamia vë re se cervixi i gruas është në ngjyrë të kaltër. Kjo është shënja:

- A) Cheduk
- B) Goodell
- C) e Hegarit
- D) Mc Donald (Lading )

34. Cila nga pikat e mëposhtme nuk bën pjesë në ndryshimet e lëkurës gjatë shtatzanisë?

- A) Kloasoma gravidarum
- B) Linea nigra
- C) Shenja e Hegarit
- D) Striae gravidarum

35. Mamia i shpjegon gruas se gjatë shtatzanisë sëmundja e mënngjesit (nausea & të vjellat) zakonisht takohet në :

- A) Gjashtë javët e para
- B) Në 6 j - 12 j
- C) Në 8j - 16j
- D) Në muajin e pare

36. Cila nga pikat e mëposhtme nuk ndikon në lartësinë e fundusit uterin?

- A) Barra binjake
- B) Hydramnioni
- C) Qëndrimi fetal
- D) Tonusi muskular

37. Lëvizjet aktive fetale perceptohen fillimisht në:

- A) Dymbëdhjetë javë
- B) Mes muajit të gjashtë dhe të shtatë
- C) Në muajin e tretë të barrës
- D) Para se të përfundojë muaji i katërt

38. Kujdesi prenatal është ideale të fillojë:

- A) Pas mundesës së tretë të menseve
- B) Pas mungesës së dytë të menseve
- C) Pas mungesës së parë të menseve
- D) Përpara mungesës parë të menseve

39. Në 16 javë niveli i fundusit uterin është:

- A) 1/3 e poshtme që bashkon umbilikusin me procesin ksifoid
- B) 1/2 e vijës që bashkon simfizën pubike me umbilikusin
- C) 2/3 e vijës që bashkon umbilikusin me procesin ksifoid
- D) Një gisht nën umbilicus

40. Në 24 javë niveli i fundusit uteri është:

- A) 1/3 e poshtme që bashkon umbilikusin me procesin ksifoid
- B) 1/2 e poshtme që bashkon umbilikusin me procesin ksifoid
- C) 1 - 2 gisht mbi umbilicus
- D) 3 - 4 gisht nën procesin ksifoid

41. Zonja X është 14 javë shtatzanë. Mamia duhet të palpojë fundusin e uterusit në nivelin:

- A) Në nivelin e umbilikutit
- B) Nuk palpohet mbi simfizën pubike
- C) Pak mbi simfizën pubike
- D) Pak mbi umbilikus

42. Znj është në javën e 23 të shtatzanisë. Ajo është informuar se shenjë alarmi në shtatzani është:

- A) Palpitacioni kardiak
- B) Rritja e oreksit
- C) Ulja e lëvizjeve fetale
- D) Ulja e presionit të gjakut

43. Cila nga simptomat e mëposhtme konsiderohet si shenjë paralajmëruese e një problemi potencial, dhe gruaja shtatzanë duhet të raportojë menjëherë personelin e kujdesit shëndetësor?

- A) Gjakrrjedhje vaginale
- B) Lodhje
- C) Nausea
- D) Shtim i frekuencës urinare

44. Kultura për gonorrhoea në shtatzani përfshihet si një nga testet rutinë e cila rekomandohet të bëhet në:

- A) Çdo fillim muaji gjatë shtatzanisë,
- B) Fillim të vizitës së parë prenatale
- C) Përfundim të muajit të fundit të shtatzanisë
- D) Vizitën e parë prenatale dhe përsëritet në 36 javë

45. Ç' ndryshim mund të shkaktojë pozicioni lithotomik, në presionin e gjakut tek gruaja shtatzanë?

- A) Asgjë e veçantë nuk vihet re
- B) E rrit presionin e gjakut
- C) E ulë presionin e gjakut
- D) Rrit dhe ul, varet nga linja bazë e presionit të gjakut

46. Në vizitat e radhës, në shtatzaninë e pakomplikuar zakonisht nuk përfshihet:

- A) Dëgjimi i RZF-ve
- B) Ekzaminimin vaginal
- C) Manovrat e Leopoldit
- D) Matjet e lartësisë së fundusit

47. Okupimi në punë i gruas gjatë shtatzanisë:

- A) Duhet të reduktohet në tremestrin e tretë
- B) Nuk ka probleme në barrën normale
- C) Rrit rrezikun e problemeve në barrë
- D) Ul riskun e problemeve në barrë

48. Mamia instrukton gruan të zbatojë ushtrimet e Kegelit, pasi ato:

- A) Forcojnë dyshe-menë pelvike
- B) Ndihmojnë në zbritjen e fetusit
- C) Ndihmojnë në zbutjen e columit
- D) Përshejtojnë aktin e lindjes

49. Pozicioni që ju i rekomandoni gruas shtatzanë për t'u çlodhur ose fjetur është:

- A) Anash
- B) Gjysëm ndenjtur.
- C) Në shpinë
- D) Permbys

50. Dita e parë e zakoneve të fundit të gruas ka qënë 3 Maj 2011, duke përdorur rregullën e Negelit kësaj gruaje i takon të lindë:

- A) 10 shkurt 2012
- B) 10 mars 2012
- C) 31 qershor 2012
- D) 06 korrik 2012

51. Cila nga vaksinat e mëposhtme mund të administrohet gjatë shtatzanisë?

- A) Parotitit
- B) Poliometilit
- C) Rabies
- D) Varicelës

52. Cila nga vaksinat e mëposhtme nuk duhet të administrohen gjatë shtatzanisë?

- A) Difteria
- B) hepatiti b
- C) Parotiti
- D) Rabies

53. Për të përcaktuar frekuencën e kontraksioneve uterine mamia do të vlersojë kohën nga:

- A) Fillimi i një kontraksioni deri në fund të kontraksioni tjetër
- B) Fundi i një kontraksioni deri në fund të kontraksionit tjetër
- C) Shpërthimi i kontraksionit deri në fund
- D) Shpërthimi i një kontraksioni deri në shpërthimin e kontraksionit tjetër

54. Në stadin e parë të lindjes shenja vendimtare që tregon për kontraksione uterine efektive është:

- A) Dilatacioni i cerviksit
- B) Ruptura e membranave amniotike
- C) Shfaqja e një sasive hemorragjie
- D) Zbritja e fetusit

55. Mamia i mëson gruas shtatzanë rreth karakteristikave të kontraksioneve të aktivitetit të vërtetë. Mamia vlereson të arsyetuarit e gruas nëpërmjet instruksionit kur gruaja "do të përjetojë kontraksione të aktivitetit të vërtetë:

- A) Ato shkaktojnë diskomfort në pjesën e sipërme të uterusit
- B) Kontraksionet uterine do të bien kur unë do të ecë
- C) Vazhdojnë të jenë të çrregullta, por bëhen të forta.
- D) Vazhdojnë të jenë të forta edhe nëse unë relaxohem e bëj një dush

56. Infermierja është duke parë një grua që sapo ka bërë një test shtatzanie dhe rezulton pozitiv. Pas ekzaminimit vaginal infermierja bën shënimet në kartelë. Cila nga gjetjet e mëposhtme është sinjifikative për këtë moshë shtatzanie :

- A) Zbutje të cerviksit
- B) Një zhurmë e lehtë që korrespondon me pulsën e nënës gjatë dëgjimit të uterusit
- C) Prezencën e HCG në urinë
- D) Prezencën e lëvizjeve fetale

57. Cila nga pikat e mëposhme nuk bën pjesë në nënfazat e stadi të parë të aktivitetit të lindjes?

- A) Faza aktive
- B) Faza e expulsionit
- C) Faza e tranzicionit
- D) Faza latente



58. Cila fazë e aktivitetit të lindjes është më i gjatë?

- A) Dytë
- B) Katërt
- C) Parë
- D) Tretë

59. Faza e dytë e lindjes nis me:

- A) 1 - 2 orët e para pas daljes së placentës
- B) Dilatacionin komplet dhe përfundon me lindjen e infantit
- C) Fillimin e hapjes dhe zbutjes së cerviksit
- D) Lindjen e infantit dhe përfundon me lindjen e placentës

60. Faza e tretë e lindjes nis me :

- A) 1-2 orët e para pas lindjes
- B) Dilatacionin komplet
- C) Lindjen e infantit
- D) Me përfundimin e fazës aktive

61. Në njësinë e paralindjes mamia po ndjek një grua primigravida. Ajo do ta lejojë gruan të shterzojë kur dilatacionin i qafës së mitrës të jetë:

- A) 10cm
- B) 5 cm
- C) 7cm
- D) 8cm

62. Infermierja shoqëron ekspulsionin e placentës duke administruar oxytocinë për:

- A) Lehtësimin e dhimbjeve
- B) Lehtësuar qëndrimin dhe relaximin
- C) Prevenimin e infeksionit
- D) Parandalimin e e hemoragjise pas lindjes

63. Cilat nga pikat e mëposhtme nuk i tregon mamisë shkolitjen e placentës?

- A) Kontraksionet uterine
- B) Ndryshime të TA dhe pulsit
- C) Ndryshimi i formës së uterusit
- D) Shtim i një sasive hemoragjie

64. Një grua duhet të marrë në konsideratë këshillimin gjenetik nëse në kohën që do të mbetet shtatzanë është :

- A) 30 vjeç ose më shumë
- B) 35 vjeç ose më shumë
- C) midis 25 vjeç dhe 30 vjeç
- D) nën 35 vjeç

65. Gjatë palpimit për të përcaktuar fundusin uterin tek një grua që sapo ka lindur, ju vini re se fundusi i saj është i fortë dhe tre gisht gjëresë mbi umbelikus dhe i devijuar. Ju duhet të:

- A) Kontrolloni për shtim të lohjeve
- B) Masazhoni uterusin e fortë
- C) Matni presionin arterial
- D) Palponi për vezikë urinare të distenduar

66. Pritshmëria e mamisë lidhur me involucionin normal uterin në periudhën post partumit do të ishte, zbritja e uterusit :

- A) 1 cm në ditë
- B) 1 cm në dy ditë
- C) 1 cm në tre ditë
- D) 1 cm në javë

67. Dhimbja e fortë e kokës në tremestrin e tretë të shtatzanisë, mund të jetë shenjë paralajmëruese për:

- A) Dehidratim
- B) Hypertension
- C) Lodhje
- D) Pamjaftueshmëri ushqimi

68. Eklampsia është:

- A) Hipertensioni i zhvilluar menjëherë pas lindjes
- B) Prania e hipertensionit para 20 javësh gravidancë
- C) Prania e hipertensionit pas 20 javësh gravidancë
- D) Preeklampsi plus konvulsione, koma ose të dyja

69. Znj. X ka eklampsi. Detyra e parë e mamisë është:

- A) Administrimi i O<sub>2</sub> me maskë
- B) Aspirimin e përmbajtjes së gojës për të prevenuar kalimin në rrugën e frymëmarrjes
- C) Të fusë ajër në rrugë orale
- D) Të qëndrojë me pacienten dhe të telefonojë për ndihmë

70. Infermierja po merr anamnezën e znj. X gjatë vizitës së parë prenatale kur gruaja rezulton 10 javë me barrë. Cila prej pikave të mëposhtme tregon që znj. X është në rrezik për zhvillimin e diabetit gestacional gjatë kësaj barre:

- A) Ajo është 28 vjeçe
- B) Fëmija i parë i saj ka lindur me seksio
- C) Në anamnezën familjare rezulton diabet i tipit të I-rë
- D) Pesha e fëmijës së fundit në lindje ka qënë 4530gr.

71. Gjatë instruksionit në lidhje me nivelet e dëshiruara të glukozës kur flitet për diabet gestacional, infermierja shpjegon nivelet e glukozës si p.sh. para ushqimit të cilat janë:

- A) 60-90 mg/dl
- B) 90-120 mg/dl
- C) 110-150 mg/dl
- D) 150-180 mg/dl

72. Konsultimi para konceptimit është i rëndësishëm për përfundimin e shtatzanisë tek gruaja me diabet, sepse kontrolli jo i mire i i glicemisë para dhe në periudhën e hershme të barrës shoqërohet me:

- A) Anomali kongenitale të fetusit
- B) Episode të shpeshta të hipoglicemisë amtare
- C) Hiperemezis gravidarum
- D) Polihidramion

73. Zonja D. është 13 javë shtatzanë. Ajo ankton për dhimbje në fund të barkut dhe hemorragji. Gjatë ekzaminimit vaginal, mjeku konstaton se gruaja ka shkurtim të qafës së mitrës dhe dilatacion të saj. Cili lloj aborti është ky?

- A) Abort i paevitueshëm ose progredient
- B) Abort i komplet
- C) Mised abort
- D) Rrezik aborti

74. Gruaja është në javën e tetë të shtatzanisë. Gjatë ekzaminimit me ultrasaund mjeku nuk arrin të kapë RZF. Në këtë rast kemi të bëjmë me:

- A) Abort habitual
- B) Abort i komplet
- C) Abort të paevitueshmëm
- D) Mised abort

75. Një grua 10 javë shtatzanë merr në telefon shërbimin prenatal dhe i referon se ajo ka hemoragji vaginale. Cila duhet të jetë përgjigjia fillestare e infermieres?

- A) Ndoshta ju kenë abortuar. Sill me vete të gjitha garzat apo lineset dhe hajde në klinikë tani.
- B) Përshkruaj sasinë e hemoragjisë, karakteristikat dhe kohën e gjakrrjedhjes ( sa kohë ka zgjatur hemoragjia)
- C) Të rrijë regjim shtrati dhe nëse hemoragjia vazhdon të lajmërojë menjëherë
- D) Të vijë në klinikë sa më shpejt të jetë e mundur me qëllim që të vizitohet

76. Një grua gravide 8 javëshe paraqet rrezik aborti. Kush është trajtimi i duhur për këtë lloj aborti:

- A) Përgatitja e gruas për t'ju bërë dilatacionin e kyretazhi
- B) Vendosja e gruas rregjim shtrati për disa ditë dhe rivlerësimi i saj
- C) Përgatitja e gruas për ekzaminim ekografik për të parë integritetin e sakusit gestacional
- D) Qetësimi i gruas duke i treguar asaj që edhe n.q.se e humbet këtë fëmijë ajo mund të ngelet përsëri shtatzane pas një muaji.

77. Testet e përdorura për të zbuluar SGA (I vogël për moshën e shtatzanisë) janë :

- A) Palpimi abdominal
- B) Lartësia fundale
- C) Biometria ekografike
- D) Testet biofizike për të diagnostikuar SGA/IUGR

78. Kur vendoset forcepsi dilatacionin duhet të jetë:

- A) 6 - 7 cm
- B) 7 - 8 cm
- C) 10 cm
- D) Mbi 10 cm

79. Barra serotine është shtatzania që zgjat:

- A) 36 - 38 javë
- B) 38 - 40 javë
- C) 40 - 41 javë
- D) Mbi 42 javë

80. Nëse gruaja ka një lindje në javën e 41 të shtatzanisë së saj, çfarë lloj lindje ajo duhet të konsiderohet:

- A) Pretermë
- B) Termë
- C) Postermë
- D) Gestacinale

81. Nëse gruaja ka një lindje në javën e 38 të shtatzanisë së saj, çfarë lloj lindje ajo duhet të konsiderohet:

- A) Pretermë
- B) Termë
- C) Postermë
- D) Gestacinale

82. Nëse gruaja ka një lindje para javës së 36 të shtatzanisë së saj, çfarë lloj lindje ajo duhet të konsiderohet:

- A) Pretermë
- B) Termë
- C) Postermë
- D) Gestacinale

83. Shënja që një grua shtatzane ka aktivitet të parakohshëm lindje mund të jetë:

- A) Dhimbja që shoqëron kontraksionet uterine është e fortë, konstante dhe lokalizohet në pjesën e sipërme të barkut, në fundusin uterin
- B) Kontraksionet uterine zgjasin të paktën 20 minuta
- C) Kontraktime uterine të cilat ndodhin me një frekuencë prej katër kontraksionesh në 1 orë
- D) Shkurtimi i qafës së mitrës deri në 80% edhe dilatacioni 2 cm.

84. Një grua shtatzanë, në javën e 32 të shtatzanisë është përcaktuar të jetë me rrisht për lindje pretermë. Një shenjë, që të ndodhë lindja pretermë do të jetë:

- A) Dhimbja që shoqëron kontraksionet uterine është e fortë dhe konstate
- B) Dilatacioni cervikal është më shumë se 1 cm
- C) Kontraksionet uterine i kemi me një frekuencë, 4 kontraksione në një orë
- D) Përgatitja e qafës mitrës (zbutja) dhe shkurtimi i saj 25%

85. Një grua e hospitalizuar për aktivitet të parakohshëm po merr MgSO<sub>4</sub> i/v. Rezultati i pritur për këtë trajtim do të jetë n.q.s.:
- A) Ataket eklamptike nuk do të ndodhin
  - B) Kontraksionet uterine ndalohen
  - C) Mushkритë e të porsalindurit fillojnë prodhojnë surfaktant
  - D) Nuk ndodh plasja e parakohshme e membranave
86. Zonja X është 23 javë shtatzanë. Ajo ju telefonon dhe ju thotë se mendon që ka rrjedhje të ujrave nga vagina.ju do ti thoni asaj:
- A) Hajdeni menjëherë në klinikë
  - B) Më telefono pas 2 h dhe më trego nëse ka ndryshime të rrjedhjeve
  - C) Ne mund të presim deri në vizitën tjetër të radhës
  - D) Për sa kohë që bebi lëviz ju mos u shqetësoni
87. Kur gruas i plasin membranat amniotike parakohe mamia duhet të vlersojë T° çdo:
- A) 1 orë
  - B) 4 orë
  - C) 6 orë
  - D) 8 orë
88. Gruaja paraqitet në klinikë dhe ankon për dhimbje (kontraksione). Mamia mendon që gruas i ka filluar aktiviteti i lindjes, kur kontraksionet janë:
- A) 30 minuta dhe zgjasin 90 sekonda
  - B) çdo 5 minuta dhe zgjasin 30 sekonda
  - C) të çrregullta në intervale të ndryshme kohore
  - D) të çrregullta, por të forta
89. Znj x është 36 javë shtatzanë. Ajo referon se ka dhimbje shpine, si dhe dhimbje me forcim të barkut. Infermiera në këtë rast vleron kontraksionet uterine për rreth :
- A) 5min
  - B) 10 min
  - C) 15 min
  - D) 30 min
90. Kur infermiere-mamia bën planifikimin e kujdesit për gruan të cilës i kanë plasur membranat amniotike parakohe, ajo arsyeton që gruaja është e riskuar për:
- A) Hemorragji
  - B) Hipotension në pozicion shtrirë me shpinë
  - C) Infeksion intrauterin
  - D) Lindje precipitoze
91. Menjëherë pas lindjes, gjatë vlersimit që infermiera i bën gruas vë re që fundusi uterin është i squllur dhe ka gjakrrjedhje të madhe. Etiologjia më e mundëshme e kësaj gjakrrjedhje është.
- A) Atonia e uterusit
  - B) Hematoma vaginale
  - C) Inversioni uterin

D) Laceracioni vaginal

92. Hemoragjitë e vona të post partumit shkaktohen nga:

- A) Atonia uterine
- B) Mbetjet e fragmenteve placentare
- C) Multipariteti i madh
- D) Zgjatje e aktivitetit të lindjes

93. Pas lindjes, gjatë ekzaminimit të zonjës X ju konstatoni se brenda 15 min linesi i saj arrin të saturohet plotësisht. Veprimi i parë infermier që ju ndërrmëni është:

- A) Kontrolloni shënjat vitale
- B) Lajmëroni mjekun
- C) Palponi fundusin uterin
- D) Rrisni marrjen e likideve i/v

94. Simptomat e mëposhtme janë karakteristike për distakon e placentës së inseruar normalisht përveç:

- A) Dhimbja konstante (abdominale) uterine
- B) Hemorragjia vaginale me gjak të errët
- C) Uterusi i kontraktuar, i dhimbshëm, hipertonic
- D) Mungesë e hemorragjisë

95. Pas lindjes gruaja ka hemoragji të vazhdueshme në sasi të pakët, fundusi uterin i kontraktuar. Kjo vjen si pasojë e:

- A) Atonisë së uterusit
- B) Laçeracionit të columit
- C) Mbetjeve të fragmenteve placentare
- D) Mbetjeve të membranave amniotike

96. Hemorragjia e hershme e postpartumit (hemorragjia që ndodh brenda 24 orëve të para të pas lindjes) ka më pak gjasa të ndodhë si rezultat i :

- A) Atonin uterine
- B) Formacioneve të hematomave
- C) Laceracionet e labieve, perineumit, vaginës ose cerviksit
- D) Subinvolucionin e uterusit

97. Shkaqet më të shpeshta të subinvolucionit janë:

- A) Barra multiple dhe hemorragjia postpartum
- B) Hemorragjia postpartum dhe infeksioni
- C) Kontraksion persistent dhe mbidozim me oxytocinë
- D) Mbetje e fragmenteve placentare dhe infeksioni

98. Një grua shtatzanë për herë të parë lind dy binjakë në javën e 37 të shtatzanisë. Përshkrimi korrekt i anamnezës obstetrikale të gruas do të jetë:

- A) Multigravida, multipara
- B) Multigravida, primipara

- C) Primigravida, multipara
- D) Primigravida, primipara

99. Amniotomia është:

- A) Marrja e likidit amniotik për vlerësim
- B) Plasja artificiale e membranave
- C) Plasja spontane e membranave
- D) Studimi citologjik i likidit amniotik

100. Në metodat diagnostikuese jo-invazive në obstetrikë NUK bën pjesë:

- A) Ekografia
- B) Stress test
- C) Amniocenteza
- D) Profili biofizik

101. Zonja X ka zgjedhur metodën kalendarike për të kontrolluar kontracepsionin. Gjatë procesit të vlerësimit, më e rëndësishme për infermierën është:

- A) Ekzaminimi i pigmentacionit të lëkurës dhe cilesisë së flokëve për ndryshime hormonale
- B) Marrja e anamnezës menstruale për 6- 12 muajt e fundit
- C) Njohja e experiencës së mëparshme të gruas për të kontrolluar lindjen
- D) Përcaktimi i shtimit dhe humbjes në peshë

102. Zonja X është duke përdoruar temperaturën bazale trupore si metodë kontrceptive. Ajo shkon për kontroll në klinikë dhe i tregon infermieres "periodat e mia janë paksuar dhe temperatura nuk është rritur" përgjigja më e përshtatshme e mamisë duhet të jetë:

- A) Ju keni qënë e sëmurë këtë muaj
- B) Ju ndoshta nuk patët ovulacion këtë muaj
- C) Kjo ndoshta nënkupton që ju jeni shtatzanë
- D) Mos u mërzitni ndoshta kjo nuk është asgjë

103. Sifilia shkaktohet nga :

- A) Clamidia tracomatis
- B) Herpesi simpleks
- C) Neiseria gonorrhoea
- D) Treponema pallidum

104. Substancat spermicide veprojnë me anë të:

- A) Barrierave mekanike
- B) Duke frenuar ovulacionin
- C) Duke shtuar rritjen e epitelit vaginal.
- D) Shkatërrimit të spermës

105. Cili tip i pilulave kontrceptive konsiderohet i përshtatshëm për gjashtë javët e para pas lindjes kur është në ushqyerje me gji?

- A) pilulat kontrceptive të kombinuara
- B) pilulat kontrceptive trifazike

- C) pilulat me dozë të lartë estrogeni
- D) pilula vetëm me progesterone

106. Çrregullimet e shikimit dhe ato cerebrale janë karakteristike për:

- A) Diabetin e shtatzanisë
- B) Aneminë e shtatzanisë
- C) Preeklampsinë e rëndë
- D) Asnjë nga këto

107. Kondomët duhet të përdoren gjatë shtatzanisë:

- A) Asnjëherë
- B) Nga gratë me rrezik për kandida
- C) Nga gratë me rrezik të lartë për SST
- D) Nga të gjitha gratë shtatzana

108. Një grua e re vjen në klinikë dhe ju shpjegon që një natë më parë gjatë marëdhënies seksuale kondomi u çua. Në konsultë me këtë kliente ju e këshilloni atë që kontracepsioni post koital (kontracepsioni i urgjencës) ul rrezikun e një shtatzanie dhe është shumë efektiv kur:

- A) Ajo merret në çdo kohë përpara ciklit
- B) Doza e parë merret sa më shpejt që të jetë e mundur
- C) Doza e parë mund të merret pas 72 orëve
- D) Mund të merret dhe pas tre ditësh

109. Zonja X është beqare dhe përshkruan jetën e saj seksuale, si active dhe me shumë partnerë. Ajo dëshiron një metodë kontraceptive, e cila është e sigurtë dhe që nuk ndikon në aktivitetin e saj seksual. Ajo kërkon D.I.U.. Përgjigja me e përshtatëshme e ma

- A) D.I.U. do t'ju mbrojë ju nga SST
- B) D.I.U. nuk ndikon në aktivitetin seksual
- C) Përqindja e barrave është më e lartë me D.I.U.
- D) Rreziku i SIP është më i madh për ju

110. Zoti dhe Zonja X po kalojnë momente të vështira për pamundësinë e tyre për të krijuar shtatzanësi. Ata duan të dinë se çfarë mund të bëjnë për të ruajtur ekuilibrin e tyre emocional. Përgjigja më e përshtatëshme nga ana e mamisë është :

- A) T'i tregojnë gjithë shokëve të tyre dhe familjeve
- B) Të bisedojnë me homologët e tyre infertil
- C) Të kërkojnë mbështetje nga grupet e specializuara për këtë problem
- D) Të fillojnë procedurat e menjëherëshme për adoptim

111. Një grua është duke përdorur diafragmën në mënyrë jo korrekte nëse ajo:

- A) Aplikon spermicid brenda kupës dhe rreth buzëve të diafragmës
- B) E lan atë me sapun të butë dhe ujë pas përdorimit dhe më pas e pudros atë me niseshte
- C) Lëviz atë brenda 2 orëve pas aktit të fundit të koitusit
- D) Vendos diafragmën 6 orë para marëdhënies



112. Zonja X. sapo ka patur abort në tremestrin e I-rë dhe është dërguar në shtëpi duke i dhënë kontraktivë oral për tu mbrojtur nga një barrë, ajo është këshilluar të :

- A) Të fillojë kontraktivet oral që ditën e kryerjes se abortit
- B) Të mënjanojë kontaktin seksual deri sa të pushojë hemorragjia
- C) Të përdorë kondom dhe shkumë për javën e parë
- D) Të përdorë një metodë tjetër kontraktive për një cikël të plotë

113. Procedura e sterilizimit në meshkuj është:

- A) Lidhja e tubave
- B) Spermicitet
- C) Spermitostatikë
- D) Vasektomia bilaterale

114. Metoda më frekvente për kontrollin e lindjeve e përdorur nga femrat 15-19 vjeçare është:

- A) Depo-Provera
- B) DIU-ja
- C) Kontraktivët oral
- D) Norplanti

115. Zonja X është diagnostikuar dhe trajtuar për sindromin e shokut toksik. Ajo në ndonjë rast të marrdhënieve seksuale ka përdorur kontraktivë të marrë vetë në farmaci. Bazuar në anamnezën e saj, çfarë kontraktivësh, nuk duhet të përdorë ajo dhe partner

- A) Diafragmat
- B) Kondom vaginal.
- C) Kondomi
- D) Sfungjerët

116. IST që transmetohen më shpesh janë:

- A) C. Trachomatis
- B) N. Gonorrhoea
- C) Sifilizi
- D) Vulvovaginal candidosis

117. Në efektet anësore të DIU (dispozitivi intrauterin) përfshihen:

- A) Depresioni
- B) Gjendja e ankthit
- C) Nauzeja dhe dhimbja e kokës
- D) Menstruacione më të rënda

118. Cilat nga pikat e mëposhtme sugjerojnë infermierin që gruaja mund të ketë vaginitis monialis?

- A) Ankesë për kuarje vulvare irrituese
- B) Dhimbje mesi të padurueshme
- C) Sekrecine të ujshme në ngjyrë të verdhë
- D) Temperaturë

119. Kur një femer konsultohet për dismenorrhea primare, cila nga ndërhyrjet e më poshtme jo farmakologjike do të përdoret:

- A) Mos bërja e ushtrimeve gjatë periudhës menstruale
- B) Përdorimi i kompresave të ngrohta për të lehtësuar crampet
- C) Shmagia e marrdhënieve seksuale gjatë ditës së parë të menseve
- D) Shmangia e kafeinës gjatë periudhës menstruale

120. Me amenorre kuptojmë:

- A) Fluks i pakët menstrual
- B) Fluks i shtuar menstrual
- C) Menstruacione të dhimbshme
- D) Mungesë e menseve

121. Dhimbja e fortë, akute jo menstruale lidhet me:

- A) Cisti ovarial i rruptuar
- B) Dismenorrheanë primare
- C) Dispozitivin Intra- Uterin
- D) Sëmundjet malinje të ovareve

122. Dhimbja menstruale rekurente dhe në mënyrë periodike lidhet me:

- A) Cistet ovariale
- B) Dismenorrhea (primare, sekondare)
- C) Sëmundjet inflamatore pelvike akute
- D) Sëmundjet malinje të uterusit

123. Gjatë intervistës me një zonjë 31 vjeçare, mamia përpara ekzaminimit rutinë, mbledh të dhëna rreth ciklit të fundit menstrual. Ajo duhet të mbledhë informacion shtesë, në rastin kur gruaja përshkruan:

- A) rrjedhje shumë të shtuara
- B) sasi të vogël spottingu mes periodave
- C) Gjatësinë e ciklit menstrual nga 26 deri 29 ditë
- D) Rrjedhje menstruale më pak se 5-6 ditë

## **07. Infermieristike Fizioterapi**

1. Terapia me rreze ultraviole përdoret në pacientët me:

- A) tendinit të muskulit biceps në fazën akute
- B) ne traumat e freskëta
- C) ne limfedemat e komplikuara
- D) ne patologjitë degjenerative në fazën kronike

2. Pas një endoproteze të artikulacionit koksofemoral pozicionimi i kundëringduar i artikulacionit është?

- A) Fleksion, abduksion i artikulacionit koksofemoral
- B) Ekstension dhe abduksion i artikulacionit koksofemoral
- C) Ekstrarotacion dhe aduksion i artikulacionit koksofemoral

D) Fleksion dhe intrarotacioni artikulationit koksofemoral

3. Kur duhet të vertikalizohet një pacient pas një operacioni kardiak?

- A) menjëherë pas operacionit
- B) një javë pas operacionit
- C) ditën e dytë ose të tretë pas operacionit
- D) sipas dëshirës së pacientit

4. Rehabilitimi i pacientit është:

- A) Punë individuale e fizioterapistit
- B) Proces pasiv
- C) Punë multidisiplinare
- D) Punë individuale për infermierin

5. Ushtrimet aktive janë të rëndësishme për:

- A) rritjen e forcës muskulare
- B) përmirësimin e kapacitetit respirator
- C) përmirësimin e qarkullimit të gjakut
- D) të gjitha alternativat e sipërpërmendura

6. Vendosja e objekteve në dhomat e pacientëve hemiparezë duhet të jetë:

- A) Çdo objekt duhet të vendoset në anën e shëndetshme
- B) Objektet duhet të vendosen në anën me parezë
- C) Nuk është e rëndësishme vendosja
- D) Vendosja e objekteve varet nga dëshira e pacientit

7. Elektrostimulimi është terapi fizike që përdoret për të stimuluar:

- A) muskulin e inervuar dhe nervat periferike
- B) muskulin e denervuar dhe nervat periferike
- C) muskulin e inervuar dhe muskulin e denervuar
- D) nervat periferike dhe palcën e kurrizit

8. T.E.N.S është terapi antalgjike që e ul dhimbjen nëpërmjet:

- A) stimulimit të prodhimit të dopamines
- B) sistemit të kontrollit të portës në palcën e kurrizit
- C) bllokimit të impulsive në fibrat nervore me kaliber të madh
- D) shtimit të impulsive në fibrat nervore me kaliber të vogël

9. Sipas parimit të Arkimedi trupi i zhytur në një teren ujor:

- A) peshon më shumë
- B) peshon më pak
- C) nuk i ndryshon pesha
- D) pëson deformime të formës

10. Në tendinitin e kalçifikuar modaliteti i tepapise fizike më efikas është:

- A) krioterapia

- B) ultratigujt
- C) lazerterapia
- D) T.EN.S

11. Presoterapia është kunder:

- A) dhimbjes
- B) linfedemes
- C) kalçifikimeve
- D) hemoragjise

12. Hidrokinezi terapia gjen kunderindikacion absolute në:

- A) hemiplegji
- B) paraplegji
- C) spondiloartroze
- D) në dermatitin purulent

13. Ushtrimet pasive mund të kryhen:

- A) në pacientët pas një kraniotraume
- B) në pacientët në gjendje “shoku”
- C) në të gjithë pacientët e hospitalizuar
- D) në pacientët e hospitalizuar pas kontrollit dhe aprovimit të mjekut përgjegjës

14. Përpara fillimit të seances së reabilitimit me një pacient me hemiplegji rekomandohet banje me:

- A) ujë të ngrohtë
- B) parafinë
- C) ujë të ftohtë
- D) hidromasazh

15. Terapia me rreze ultraviolete indikohet në:

- A) pelagra
- B) lupusin eritematoz
- C) sarkoidoze
- D) akne

16. Terapia me rreze ultraviolete kunderindikohet në:

- A) mundesën e vitaminës D
- B) sinuzit
- C) psoriazis
- D) hipertiroidizem

17. Ushtrimet aktive dhe pasive nuk kryhen në rastet kur:

- A) pacienti është në gjendje febrile
- B) pacienti ka vështirësi në kryerjen e ushtrimeve
- C) pacienti është i hospitalizuar në reanimacion
- D) të gjitha alternativat e sipërpërmendura

18. Ultratingujt në rehabilitim, përveç efektit antalgjik I përdorim dhe për efektin:

- A) nxirës të lëkurës
- B) termik
- C) masazhues
- D) stimulim të nervave

19. Akulli në qoftë se vendoset direkt në lëkure jep:

- A) vazodilatacion
- B) rritje të permeabilitetit kapilar
- C) zbehje të lëkurës
- D) djegie

20. Ushtrimet pasive te pacientët e hospitalizuar duhet të kryhen:

- A) vetëm një herë në ditë
- B) dy herë në ditë
- C) çdo një orë
- D) asnjëherë

21. Terapia me ultratinguj gjen indikacion në:

- A) tumore
- B) osteoporoze
- C) limfedemen me fibroze
- D) në bursit të kalçifikuar

22. Llambat me rreze ultraviolett bëjnë pjesë në termoterapinë me:

- A) kunduksion
- B) konveksion
- C) skanim
- D) rrezatim

23. Banjot kontraste gjejnë indikacion :

- A) në distrofinë muskulare
- B) në infarkt të miokardit
- C) në vaskulopatite periferike
- D) artritin rheumatoid

24. Jonoforeza është modalitet terapeutik që realizon përsheptimin e medikamenteve me anë të:

- A) fushës manjetike
- B) rrymës elektrike të alternative
- C) vibrimeve akustike
- D) rrymës elektrike të vazhduar

25. Ushtrimet pasive te pacientët e hospitalizuar bëhen për arsyet:

- A) Për të parandaluar vetëm kontrakturat artikulare
- B) Për të ruajtur gjendjen aktuale të pacientit

- C) Për të rritur forcën muskulare
- D) Për të parandaluar plagët e shtratit

26. Tufa e rrezeve lazer ka keto karakteristika:

- A) njëngjyreshe, paralele, koherente
- B) një ngjyreshe, paralele, jokoherente
- C) shumë ngjyreshe paralele, koherente
- D) shumë ngjyreshe paralele, jokoherente

27. Drita Lazer nuk perdoret në :

- A) kirurgji
- B) dermatologji
- C) fizioterapi
- D) gjinekologji

28. Pozicionimi i saktë i pacienit në shtrat është i nevojshëm për:

- A) parandalimin e plagëve të shtratit (dekubitus)
- B) përmirësimi i qarkullimit të gjakut
- C) përmirësimi i përqëndrimit dhe orietimit në ambient
- D) të gjitha alternativat e sipërpërmendura

29. Cila është arsyeja që pacienti i hospitalizuar duhet të ulet për disa orë në karrige?

- A) Përmirësimi i gjendjes emocionale
- B) Përmirësimi i frymëshkëmbimit dhe qarkullimit të gjakut
- C) Përmirësimi i drenimit postural
- D) Të gjitha alternativat e mësipërme

30. Cilat janë zonat më të rrezikuara për tu shfaqur një dekubitus?

- A) occipitum, sacrum, spina scapulae
- B) occipitum, spina scapulae, klavikula
- C) os sacrum, thembrat, regioni lombal
- D) asnjë nga alternativat

31. Modaliteti më i përdorur dhe efikas i terapisë me ultratinguj është me:

- A) me kontakt direkt
- B) me lëvizje rrotulluese të kokës
- C) me lëvizje perpendikulare
- D) me lëvizje gjatesore të kokës

32. Terapia me ultratinguj kunderindikohet në:

- A) çrregullime të sensibilitetit
- B) kalçifikime
- C) tendinite
- D) borsite

33. Sonoforeza është terapi përshpejtimi medikamentesh me anë të:

- A) rrymës elektrike
- B) mikrovaleve
- C) ultratingujve
- D) lazerit

34. Inflamacioni karakterizohet nga këto shenja:

- A) dolor, kalor, tumor, rubor, funksioleza
- B) dolor, rubor, kalor, tumor, nekroza
- C) kalor, tumor, dolor, hiperplazia, nekroza
- D) hiperplazia, nekroza, dolor

35. Në dhimbjen e artikulacionit tempo-mandibular modalitet terapeutike që përdoren janë:

- A) mikrovalët, lazeri, ultratingujt
- B) TENS, radarterapi, korente interferenciale
- C) presoterapi, radarterapi, korente interferenciale
- D) ultratingujt, TENS, lazer

36. Trigger point janë pika:

- A) të padhimbshme të trupit
- B) të agopunturës
- C) shumë të dhimbshme
- D) ku vendosen elektrodat e TENS

37. Rrymat diadinamike janë rryma:

- A) galvanike
- B) alternative retangolare
- C) sinusoidale me frekuence të ulët
- D) të kombinuara

38. Efektet fiziologjike të rrymave diadinamike nuk lidhen me :

- A) shtimin e vazokonstriksionit
- B) shtimin e vazodilatacionit
- C) rritjen e permeabilitetit të membranës qelizore
- D) rritjen e ngacmueshmerisë së fibrave nervore me kalibër të madh

39. Pozicioni i pacientit të hospitalizuar në shtrat ndryshohet:

- A) 1 herë në ditë
- B) çdo 7-8 orë
- C) çdo 2-3 orë
- D) sa herë të dëshirojë pacienti

40. Elektrodat më komode në përdorim gjatë elektroterapisë janë:

- A) plastike
- B) metalike
- C) sfungjerore
- D) autoaderente

41. Manjeto terapia indikohet:

- A) osteoporozë
- B) hemiplegji
- C) paraplegji
- D) hypotoni

42. Llambat ultraviolet nuk japin:

- A) djersitje
- B) vazodilatacion
- C) vazokostriksion
- D) ulje të dhimbjes

43. Terapia fizike :

- A) ka vetëm efekt placebo
- B) nuk perdoret vitet e fundit ne rehabilitim
- C) perdoret gjerësisht në rehabilitim
- D) perdoret gjithmone e kombinuar me terapinë medikamentoze

## **08. Sëmundje të Brendshme**

1. Për ulcerën peptike janë të verteta pohimet e mëposhtme përveç:

- A) Etiopatogjeneza ka lidhje me prishjen e ekuilibrit ndërmjet faktorëve agresiv dhe atyre mbrojtës të mukozës
- B) Në etiopatogjenezë ka rol helicobacter pilori
- C) Prek vetëm doudenin
- D) Preparatet Antiinflamatorë josteroidë kanë rol të rëndësishëm në shkaktimin e ulcerës

2. Lupusi Eritematoz Sistemik prek me teper:

- A) femrat me moshën e riprodhimit
- B) meshkujt
- C) gratë në menopauzë
- D) meshkujt në pubertet

3. Lupusi Eritematoz Sistemik prek me teper:

- A) Femrat e bardha
- B) Femrat me ngjyrë
- C) Meshkujt e bardhe
- D) Meshkujt me ngjyrë

4. Për Lupusin Eritematoz Sistemik janë të gjitha të verteta përveç:

- A) Sëmundja mund të prekë çdo organ apo sistem
- B) Fillon me shenja të përgjithshme : dobësi, temperaturë subfebrile, lodhje
- C) Sëmundja ka shfaqje në lëkurë
- D) Nuk shoqërohet me alterime hematologjike



5. Antikorpët antinuklear:

- A) Perbejnë një shenjë laboratorike kryesore ndonëse jo specifike për Lupusin Eritematoz Sistemik
- B) Bëhen në çdo ekzaminim laboratorik rutinë
- C) Shikohen në mikroskop të zakonshëm
- D) Nuk perbehen nga nentipa antikorpesh

6. Artriti Reumatoid është një sëmundje për të cilën janë të vërteta të gjitha përveç:

- A) Prek afërsisht 0.8% të popullatës
- B) Femrat preken më shumë se meshkujt
- C) Sëmundja është më shpeshtë në dekadën e parë dhe të dytë të jetës
- D) Karakterizohet nga prania e sinoviteve inflamatorë të persistente

7. Artralgjia në Artritin Reumatoid është:

- A) Jo simetrike
- B) Pa rritje të ndjeshmërisë gjatë palpimit dhe enjtje të artikulacioneve të prekura
- C) Preken më shumë artikulacionet e vogla të gishtave
- D) Infiamacioni për kohë të gjatë nuk shkakton deformim artikulacionesh

8. Shfaqet ekstrartikulare të Artritit Reumatoid përfshijnë të gjitha përveç:

- A) Prekje pulmonare
- B) Çrregullime hematologjike
- C) Çrregullime okulare
- D) Praninë e hiperkeratozës dhe atrofisë së lëkurës

9. Sklerodermia:

- A) Patogjeneza e sëmundjes është e sqaruar plotësisht
- B) Nuk është e lidhur me faktore ndërrprues gjenetik dhe mjedisor
- C) Karakteristike për sëmundjen është prania e fibrozës së lëkurës
- D) Sëmundja prek më tepër meshkujt se femrat

10. Për mjekimin e Artritit Reumatoid përdoren të gjitha përveç:

- A) Anti inflamatorët jo steroid
- B) Glukokortikosteroidet intrartikular dhe sistemik
- C) Metformina
- D) Sulfazalazina

11. Sklerodermia difuze

- A) Karakterizohet vetëm nga prekja e anësive distale e proksimale
- B) Nuk preken organet e brendshme
- C) Ka prognoze të mira
- D) Ka hipomotilitet ezofageal dhe hipofunksion gastrointestinal

12. Dermatomioziti dhe polimioziti:

- A) Nuk janë sëmundje autoimune
- B) Nuk shkaktojnë dobësi dhe dhimbje muskuljsh

- C) Paraqesin alterime të CPK, SGOT, SGPT
- D) Nuk kanë autoantikorpë karakteristike

13. Rashi ngjyre lejla rreth syve është tipik për :

- A) Dermatomiozitin
- B) Polimiozitin
- C) Sindromin sjogren
- D) Sklerodermine

14. Te semuret me miopati kanë:

- A) Dobesi të muskujve distale
- B) Dobesi të muskujve proksimale
- C) Dobesi të qafes
- D) Nuk kanë shqetësime të lokalizuara

15. Mjekimi në dermatomiozitin:

- A) Efekti i tij vlerësohet përmes ndryshimit të vlerave të CPK (kreatin fosfokinazës)
- B) Përdoret metformina dhe antiinflamtorët jo steroidë
- C) Mjekohet me ACE inhibitor dhe beta bllokues
- D) Nuk është i nevojshëm mjekimi sepse sëmundja është e përkohshme

16. Klasifikimi i vaskuliteve paresore bazohet në:

- A) Agresivitetin e sëmundjes
- B) Përmasat e vazave të prekura
- C) Ekzistojnë dy klasa vaskulitesh
- D) Nuk ka ndryshuar gjatë viteve

17. Granulomatoza Wegener është:

- A) Vaskulit i vazave të mëdha
- B) Është vaskulit granulomatoz i aparatit respirator i shoqëruar dhe me glomerulonefrit
- C) Te semuret nuk kanë demtime otojatrike
- D) Është vaskulit i vazave mesatare

18. Spondiliti ankilozant është sëmundje:

- A) e femrave në dhjetë-vjeçarët e katërt dhe të pestë të jetës
- B) e meshkujve në dhjetë-vjeçarët e dytë dhe të tretë të jetës
- C) e grave në menopauzë
- D) infektive

19. Spondiliti ankilozant është sëmundje inflamto-re që prek:

- A) Kryesisht artikulationet e anësive
- B) Nuk fillon me shenjat e sakroileitit
- C) Prek zakonisht shtyllën kurrizore dhe artikulationet sakroiliake
- D) Dekursi natyror i sëmundjes nuk përfundon në invalidizim të plotë

20. Ankesat e të sëmurit me spondilit ankilozant :

- A) Rendohen nga aktiviteti fizik
- B) Nuk ndikohen nga aktiviteti fizik
- C) Ngurtesimi mengjezor zgjat 15 min
- D) Ankesat e te semurit rendohen ne mengjes dhe permiresohen gjate aktivitetit fizik

21. Spondiliti ankilozant mjekohet :

- A) Me terapi medikamentoze dhe terapi fizike
- B) Vetem me terapi medikamentoze
- C) Vetem me terapi fizike
- D) Nuk ka nevojë për mjekim shumë të gjatë pothuajse gjithë jetën

22. Cili nga pohimet e mëposhtme është i saktë për acidin urik:

- A) Prodhimi i tij nuk lidhet ngushtë me metabolizmin e purinave
- B) Hiperuricemia është karakteristike e goutes
- C) Në goute acidi urik në plazëm dhe lëngun jashtëqelizor është në vlera normale
- D) Hiperuricemia është rezultat i vetëm një çrregullimi

23. Podagra fillon zakonisht në :

- A) Artikulacionin e gjurit
- B) Artikulacionet e gishtave të duarve
- C) Artikulacionin e qafes
- D) Gishtin e madh të këmbës

24. Diagnostikimi i podagres:

- A) Mbështëtet vetëm në të dhënat klinike
- B) Është i nevojshëm analizimi i lëngut sinovial
- C) Janë të mjaftueshme vetëm të dhënat laboratorike
- D) Asnjëra prej tyre

25. Insuficenca renale akute klasifikohet në :

- A) Në dy kategori : prerrenale dhe postrenale
- B) Në IRA residuale dhe jo residuale
- C) Në IRA prerrenale, intrinseke, dhe postrenale
- D) Asnjëra prej tyre

26. Insuficenca renale akute është një sindrome klinike e karakterizuar nga :

- A) Rritje e shpejtë e filtrimit glomerular, rritje e metejshme e nivelit të kreatinines dhe azotemise
- B) Rritje e shpejtë e filtrimit glomerular, ulje e metejshme nivelit të kreatinines dhe azotemise
- C) Rritje e shpejtë e filtrimit glomerular, ulje e metejshme nivelit të kreatinines dhe azotemise
- D) Rritje e shpejtë e filtrimit glomerular, rritje e metejshme nivelit të kreatinines dhe azotemise

27. Kemi infeksion urinar kur :

- A) Është e pranishme bakteriuria me > 10,000 baktere për ml
- B) Është e pranishme bakteriuria me < 10 baktere për ml
- C) Nuk ka baktere në urinë
- D) Asnjëra prej tyre

28. Cistitet janë :

- A) Infeksione te rrugeve te sipërme urinare
- B) Infeksione te rrugeve te poshtme urinare
- C) Janë infeksione te veshkes
- D) Nuk shoqerohen me djegje gjate urinimit

29. Infeksionet e rrugeve urinare:

- A) Infeksionet e rrugeve urinare janë shkak i pergjithshem i sepsisit
- B) Infeksionet urinare nuk shoqerohen me dhimbje e djegje gjate urinimit
- C) Nuk shoqerohen me crregullime te aktit te urinimit
- D) Asnjëra prej tyre

30. IRA prerenale shkakohet nga Të gjitha përveç:

- A) Diarresë masive
- B) Hemorragjia e brendshme dhe e jashtme
- C) Humbjet në lekure (djegjet)
- D) Prania e osteoartritit

31. Nekroza tubulare akute është shkak me i shpështë i :

- A) IRA prerenale
- B) IRA intrinseke
- C) IRA postrenale
- D) Asnjëra prej tyre

32. Studimi i sedimentit urinar jep te dhena te rendesishme per cilen kategori te IRA :

- A) IRA prerenale
- B) IRA intrinseke
- C) IRA postrenale
- D) Asnjëren prej tyre

33. Të gjitha janë te vërteta për mjekimin e llojeve të ndryshme të insuficiencës renale akute (IRA) përveç:

- A) Shumica e rasteve me IRA zgjidhen me masa konservative
- B) Në IRA prerenale nga humbja e lëngjeve duhet bërë korrigjimi i këtyre humbjeve
- C) Në rastet e IRA me pielonefrit përdoren antibiotikë
- D) Nuk merret asnjëherë në konsideratë hemodializa

34. Glomerulonefriti akut poststreptokoksik :

- A) Nuk është nje nga format me te shpeshta te glomerulonefriteve
- B) Perben shkakun me te shpështë te glomerulonefriteve tek femijet
- C) Nuk ka lidhje me infeksionet e shkaktuara nga streptokoku beta hemolitik i grupit A
- D) Asnjëra prej tyre

35. Faktorë risku për infeksionet e rrugeve urinare janë Të gjitha përveç:

- A) Shtatzania

- B) Diabeti
- C) Aktiviteti seksual
- D) Prania e osteoartritit bashkëshoqërues

36. Pamja radiologjike e shkropit të bambuse është tipike për cilën patologji:

- A) Lupus Eritematoz Sistemik
- B) Artrit Reumatoid
- C) Polimioziti
- D) Morbus Bekteriev

37. Sakroileiti është shenjë fillestare e ciles prej këtyre patologjive :

- A) Sklerodermi
- B) Artrit reumatoid
- C) Osteoartrit
- D) Morbus Bekteriev

38. Me anë të bronkoskopisë realizohen të gjitha përveç :

- A) Mundëson vlerësimin e anomalive endobronkiale
- B) Vlerësimin e rrugëve perçjellese të ajrit
- C) Marrjen e biopsisë
- D) Ndihmon në vënien e diagnozës së embolisë pulmonare

39. Në astmën bronkiale :

- A) Obstruksioni i rrugëve të ajrit është episodik dhe reversibel
- B) Reaktiviteti i rrugëve të ajrit ndaj stimuljeve specifike dhe jo specifike është normal
- C) Te sëmurët nuk kanë anamnezë prani të sëmundjeve të tjera alergjike
- D) Asnjëra prej tyre

40. Bronkiti kronik është :

- A) Një sëmundje e sistemit respirator e karakterizuar nga prodhimi i shtuar i sekrecioneve mukozale trakeobronkiale të shoqëruara me kollë e sputum për të paktën 3 muaj deri në 1 vit.
- B) Një sëmundje e sistemit respirator e karakterizuar nga prodhimi i shtuar i sekrecioneve mukozale trakeobronkiale të shoqëruara me kollë e sputum për të paktën 3 javë.
- C) Një sëmundje e sistemit respirator e karakterizuar nga prodhimi i shtuar i sekrecioneve mukozale trakeobronkiale të shoqëruara me kollë e sputum për të paktën 1 muaj.
- D) Asnjëra prej tyre

41. Etiopatogjeneza e bronkitit kronik mendohet të lidhet me shkaktarët e mëposhtëm përveç:

- A) Me tymin e duhanit
- B) Ekspozimi ndaj pluhurave profesionale
- C) Infeksione të shkaktuara nga mykoplasma pneumonie
- D) Ndotja atmosferike

42. Pneumonia është :

- A) Pakesim i elasticitetit të rrugëve të ajrit në nivel të bronkiolave terminale
- B) Shkaktohet nga ekspozimi ndaj pluhurave profesional

C) Nje infeksion i parënkimes pulmonare i shkaktuar nga lloje te ndryshme bakteriesh, virusesh, myqesh

D) Asnjë prej pohimeve nuk është i saktë

43. Pneumoni shkaktone te tera përveç:

A) Shigella dysantheriae

B) Klamidia

C) Rikeciet

D) Mykoplazma

44. Rol te rëndësishëm ne vendosjen e diagnozes se pneumonise ka:

A) Radiografia pulmonare

B) Torakocenteza dhe biopsia e pleures

C) Shintigrafia

D) Testet kutane

45. Ekzaminimi i sekrecioneve te nje te semuri me pneumoni tregon:

A) Nese ne preparatin e pregatitur nga sekrecionet mukoalveolare janë te pranishme < 25 qeliza polimorfonukleare dhe > 10 qeliza epiteliale inflamacioni është i perhapur

B) Nese ne preparatin e pregatitur nga sekrecionet mukoalveolare janë te pranishme > 25 qeliza polimorfonukleare dhe < 10 qeliza epiteliale inflamacioni është i perhapur

C) Nese ne preparatin e pregatitur nga sekrecionet mukoalveolare janë te pranishme < 25 qeliza polimorfonukleare dhe > 10 qeliza epiteliale inflamacioni nuk është i perhapur

D) Të gjitha janë te pasakta

46. Kolesterolit total duhet mbajtur ne keto vlera:

A) nën 460 mg/dl

B) nën 200 mg/dl

C) nën 500 mg/dl

D) nën 50 mg/dl

47. Faktor madhor risku për Sëmundje të Arterieve Koronare janë të tërë, përveç

A) Dislipidemia

B) Niveli i lartë i kolesterolit

C) Mosmarrja me sporte

D) Anamneza familjare

48. Ne IRA prerrenale, dëmtimi renal është rezultat i Të gjithave përveç:

A) Humbje e volumit nga trakti gastrointestinal

B) Humbje kutaneale e volumit (djegjet)

C) Humbje e volumit si rezultat i hemoragjise interne dhe ekstrene

D) Dëmtimit strukturor i nefroneve

49. Oliguria percaktohet si sekretimi i:

A) me pak se 400 ml/ urinë ne ditë

B) me pak se 200 ml/ urinë ne ditë

- C) me shume se 3 l/ urinë ne ditë
- D) me pak se 100 ml/urinë ne ditë

50. Anuria percaktohet si sekretimi i:

- A) me pak se 300 ml/ urinë ne ditë
- B) me pak se 400 ml/ urinë ne ditë
- C) me shume se 2 l/ urinë ne ditë
- D) me pak se 100 ml/urinë ne ditë

51. Ne crregullimet e ritmit bëjnë pjesë Të gjitha përveç :

- A) Takikardia sinusale
- B) Bradikardia sinusale
- C) Flateri atrial
- D) Infarkti i miokardit

52. Takikardia paroksizmale supraventrikulare me rihyrje pa parangacmim është :

- A) Crregullim i ritimit sinusal
- B) Crregullim i ritmit atrial
- C) Crregullim i ritmit junksional
- D) Asnjëra prej tyre

53. Crregullimet e ritmit sinusal perfshijne Të gjitha përveç:

- A) Takikardia sinusale
- B) Bradikardia sinusale
- C) Fibrilacioni atrial
- D) Aritmi sinusale dhe disfunkcion të nyjes sinusale.

54. Polakiuria është urinim:

- A) naten
- B) me djegje
- C) i shpësthtë
- D) i dhimbshem

55. Enuresis nocturna është urinim:

- A) i dhimbshem
- B) me djegje
- C) i shtuar
- D) naten

56. Tiroidja normale:

- A) Është e palpueshme
- B) Nuk është e palpueshme
- C) Është e palpueshme vetem tek meshkujt
- D) Është e palpueshme vetem tek femrat

57. Karakteristike per fazen akute te tirotoksikoze është prania e:

- A) T3 dhe T4 te rritura dhe TSH te ulët
- B) T3 dhe T4 te rritura dhe TSH e lartë
- C) T3 dhe T4 te ulta dhe TSH te ulët
- D) Asnjëra prej tyre

58. Per mjekimin e morbus Graves perdorën Të gjitha përveç :

- A) Karbimazoli
- B) Metimazoli
- C) Indometacina
- D) Propiltiuracili

59. Tiroidit Hashimoto i perkasin Të gjitha, përveç :

- A) Është inflamacion kronik me natyre autoimune i tiroides
- B) Gusha mund te paraqitet asimetrike
- C) Nuk janë te pranishme Asnjë lloj autoantikorpesh
- D) Pothuajse gjithmone janë te pranishme antikorpet antimikrozomiale

60. Shkaktare te hipertiroidizmit janë Të gjitha përveç:

- A) Sëmundjet autoimune
- B) Patologjitë tumorale
- C) Patologjitë inflamatorë
- D) Atireoza

61. Morbus Basedov:

- A) Prek me shpesh femrat e moshës 30 deri ne 50 vjeç
- B) Mungon ekzoftalmia
- C) Funkzioni kardiak është normal
- D) Mungon osteoporoza

62. Rreziqet e hipotiroidizmit janë Të gjitha përveç:

- A) Koma miksedematoze
- B) Aksidentet kardiake
- C) Prania e astenise
- D) Nervoziteti

63. Është i pranishem diabeti kur glicemia esell ne dy dozime është me e lartë se:

- A) 2.40 g/l
- B) 1.40 g/l
- C) 0.20 g/l
- D) 0.10 g/l

64. Ne komplikacionet metabolike akute te diabetit hyjen Të gjitha përveç:

- A) Acidoketoza
- B) Koma hiperosmolare
- C) Mikroangiopatia diabetike
- D) Hipoglicemite



65. Diabeti i tipit te parë mjekohet me :

- A) Daonil
- B) Metformine
- C) Insuline
- D) Dietë hiperkalorike

66. Diabeti i tipit te dyte mjekohet me:

- A) Daonil, metformine
- B) Insuline
- C) Diete hiperkalorike
- D) Kufizim i aktivitetit fizik

67. Presion arterial normal konsiderohen vlerat e meposhtme:

- A) Sistoliku me i vogel se 140 mmhg dhe diastoliku me i vogel se 90 mmhg
- B) Sistoliku me i madh se 140 mmhg dhe diastoliku me i madhe se 90 mmhg
- C) Sistoliku ndermjet 160-180 mmhg dhe diastolike 90-120 mmhg
- D) Sistoliku me i madh se 190 mmhg dhe diastoliku me i madh se 100 mmhg

68. Hipertension arterial pragu konsiderohet :

- A) Me shume se 180 mmhg dhe/ose me shume se 105
- B) Sistolike 140-180 mmhg dhe/ose diastolike 90-105
- C) Sistoliku 140-180 mmhg dhe/ose diastoliku 90-95
- D) Sistoliku me i vogel se 140 mmhg dhe diastoliku me i vogel se 90 mmhg

69. Mjekimi i hipertensionit arterial perfshin Të gjitha përveç :

- A) Aktivitetin fizik
- B) Shtimin ne peshë
- C) Kufizimin e kripes
- D) Lenien e alkolit

70. Mjekimi farmakologjik i hipertensionit arterial perfshin Të gjitha përveç :

- A) Metotreksat
- B) Betablokues
- C) Ace inhibitorë
- D) Antagoniste te kalciumit

71. Panusi është strukture histologjike qe vihet re tek te sëmurët me :

- A) Lupus Eritematoz Sistemik
- B) Sklerodermi difuze
- C) Artrit Reumatoid
- D) Dermatomiozit

72. Manifestimi me i zakonshem dhe nga me te hershmit qe vihet re ne Morbus Bekteriev është :

- A) Rashi malar ne forme fluture
- B) Artriti simetrik i artikulacioneve Të vogla te duarve

- C) Sakroileiti
- D) Polifagi dhe polidipsi

73. Pielonefriti:

- A) Perfaqeson nje infeksion te rrugeve te siperme urinare
- B) Perfaqeson nje infeksion te rrugeve te poshtme urinare
- C) Nuk është i dhimbshem
- D) Asnjëra prej tyre

74. Hipotiroidizmi shfaqet me simptomat e meposhtme përveç:

- A) Krampe muskulare
- B) Tolerance ndaj te ftohtit
- C) Konstipacion
- D) Gjendje te pergjumur

75. Cili nga medikamentet konsiderohet si linja e parë e mjekimit ne depresionin madhor dhe crregullimin obsesiv kompulsiv?

- A) Inhibitorët selektive te rikapjes se serotoninës
- B) Antidepresantet triciklike
- C) Stabilizuesit e humorit
- D) Benzodiazepinat

76. Cila prej përgjigjeve tregon praninë e tolerancës ndaj opioideve?

- A) Për të kontrolluar dhimbjen nevojiten doza më të mëdha opioidesh krahasuar me atë që mjaftonte javët e para
- B) Duhet dhënë stimulantë për të balancuar efektet sedative të opioideve
- C) Pacienti bëhet anksioz kur kujton orën kur duhet të marrë opioidet
- D) Pacienti nuk ka konstipacion pas marrjes së dozave të zakonshme të opioideve

77. Nje pacient 53 vjeçar, i cili mjekohet me ibuprofen 400mg dy here ne ditë per te kuruar dhimbjen kronike te mesit krijon edeme e ekstremiteteve te poshtme. Infermierja qe kujdeset per te mendon se edema është rezultat i :

- A) Uljes te funksionit renal
- B) Uljes se nivelit te kreatinines
- C) Rritje te filtrimit glomerular
- D) Rritje te nivelit te proteinave plazmatike

78. Cila prej sëmundjeve te meposhtme muskulo-skeletike karakterizohet nga prania e nyjeve te Heberdenit?

- A) Lupusi eritematoz sistemik
- B) Artriti reumatoid
- C) Sclerodermia
- D) Osteoporoza

79. Sindroma Kushing :

- A) Është sëmundje që vjen si pasojë e zvoglimit të prodhimit të kortizolit nga gjendra mbiveshkorë
- B) Është sëmundje që vjen si pasojë e shtimit të prodhimit të kortizolit nga gjendra mbiveshkorë
- C) Është sëmundje që karakterizohet nga dhimbja e mesit dhe ngurtësimi mengjezor
- D) Në këtë sëmundje mungojnë shenjat e virilizimit si depozitimi i dhjamit në regjionet nëndermje shpatullave

80. Karakteristika për sindromën Kushing është prania e të gjithave, përveç :

- A) Hiperkalemisë
- B) Alkalozës metabolike
- C) Prodhimit ektopik të ACRH
- D) Artriti simetrik i artikulacioneve interfalangeal proksimale

81. Terapija e spondilitit ankilozant përfshin:

- A) Vetëm terapi medikamentoze
- B) Terapi medikamentoze dhe fizike
- C) Levotiroskine dhe deksametazon
- D) Desmopresinë dhe indometacine

82. Te sëmurët me poliarterit nodoz kutan kanë:

- A) Rënie në peshë
- B) Temperaturë
- C) Dëmtime në organe
- D) Noduse subkutane

83. Në skleroderminë e lokalizuar ka dëmtime vetëm:

- A) të miokardit
- B) renale
- C) gastrointestinale
- D) të anesive

84. Arteriti Takayasu:

- A) Është inflamacion granulomatoz i arterive të vogla
- B) Është inflamacion granulomatoz i arterieve të mëdha
- C) Është inflamacion granulomatoz i arterieve të mesme
- D) Nuk është inflamacion granulomatoz

85. Në mjekimin e pneumonisë përdoren me shpesh preparatet e mëposhtme përveç:

- A) Ampicilina
- B) Cefotaxidina
- C) Eritromicina
- D) Metotreksati

86. Cirroza e mëlçisë mund të shkaktohet nga faktorët e mëposhtem përveç:

- A) Hepatit B
- B) Hepatit C

- C) Alkolit
- D) Hepatitit A

87. Ne hepatitin alkolik

- A) Vlerat e aspartat aminotransferazes (GPT) janë ne norme
- B) Vlerat a aspartat amiontransferazes (GPT) janë thujse dy here me te larta se ato te alanin aminotransferazes (GOT)
- C) Bilirubina është ne norme
- D) Pacienti nuk ka ndryshime te orëksit

88. Mjekimi i cirrozes alkolike perfshin Të gjitha përveç :

- A) Diete
- B) Nderprerje te marrjes e alkolit
- C) Vitamin terapi
- D) Voltaren ne doze te lartë

89. Osteoporozja mjekohet me :

- A) Bifosfonate
- B) Kripa te arit
- C) D- penicilamine
- D) Azatioprine

90. Osteoartriti është: semundje:

- A) inflamatorë muskuloskeletike
- B) degjenerative muskuloskeletike
- C) endokrine
- D) gjenetike

91. Glukokortikosteroidet e injektueshem ne artikulacione indikohen te perdorën ne patologjite muskuloskeletike :

- A) Inflamatorë
- B) Mekanike
- C) Ne prani te osteoporozes
- D) Ne prani te frakturave

92. Pneumonia atipike karakterizohet nga keto shenja përveç:

- A) Dobesi trupure
- B) Dhimbje koke
- C) Kolle e thate
- D) Melena

93. Të gjitha sa me poshte janë te vërteta per IRA postrenale përveç:

- A) Është mjaft e shpësthtë ndermjet te semureve ambulatorë
- B) Prek me shume burrat sesa gratë
- C) Ne shumicen e rasteve i detyrohet bllokimit uretral.
- D) Shkaktohet nga medikamente qe reduktojnë filtrimin glomerular

## 09. Kirurgji E Pergjithshme

1. Cili incision lejon nje nderhyhet ne te njejten kohe ne kavitetin torakal dhe abdominal?

- A) Sternotomia
- B) Toraco-freno-laparotomik
- C) Median
- D) Bisubcostal

2. Fijet e polipropilenit janë fije:

- A) Natyrale
- B) Artificiale
- C) Sintetike
- D) Vegjetale

3. Sonda Sengstaken -Blakemorë perdorët per:

- A) Kateterizimin e vezikes urinare
- B) Hemostazen e variceve te ezofagut
- C) Tharjen e sekrecioneve gastrike
- D) Enteroklizma

4. Dreni Kehr perdorët per drenimin e:

- A) Rrugeve biliare/biles
- B) Kolonit/duodenit
- C) Toraxit
- D) Abceseve

5. Skleroterapia ne endoskopi perdorët ne:

- A) Heqjen e trupave te huaj
- B) Zgjerimin e stenozeve te aparatit tretes
- C) Hemostazen endoskopike
- D) ERCP pankreato-kolangiografia retrograde endoskopike

6. Cila nga keto nuk është komplikacion i menjehershëm pas operacionit?

- A) Obstruksioni i rrugeve te ajrit
- B) Nauze dhe te vjella
- C) Infeksioni i plagës
- D) Ankthi dhe dhimbja

7. Ne reaksionin e alarmit, pergjigja neuronale realizohet nga:

- A) Hormonet
- B) Riekuilibri hidro-elektrolitik
- C) Katekolaminat
- D) Reaksionet hemodinamike

8. Solucionet e glukozes 10%, 20% dhe 33% injektohen ne sistemet:

- A) venoze periferike
- B) venoze qendrorë
- C) arteriale periferike
- D) arteriale qendrorë

9. Cila nga keto nuk është komplikacion I menjehershem i nderhyrjeve venoze qendrorë?

- A) Hematoma lokale
- B) Pneumotoraksi
- C) Ndryshimet kardiake
- D) Infeksionet

10. Cila nga keto nuk është shenje klinike e embolise me gaz?

- A) Insuficenca kardiocirkulatorë/ cianoza
- B) Polipnea
- C) Hiperglicemi
- D) Dhimbja

11. Cila nga keto nuk është komplikacion i mevonshem i nderhyrjeve venoze qendrorë?

- A) Infeksioni
- B) Thyerja e kateterit
- C) Hematoma lokale
- D) Tromboza e thellë venoze

12. Këto janë ndryshimet në qarkullimin venoz në ulçerat venoze të këmbës përveç njëres:

- A) Mungesa e valvulave të thella
- B) Bllokimi i venave të thella
- C) Fistula arterio-venoze
- D) Hipotensioni arterial

13. Cila nga keto nuk është shkak i krijimit të ulcervave diabetike?

- A) Mikro/makro angiopatia
- B) Dëmtimet trofike nga pakesimi i qarkullimit të gjakut
- C) Bllokimet e venave të thella
- D) Prirja për infeksione

14. Sindromat e imobilizimit kanë të bëjnë me ulcervat:

- A) nga dekubituset
- B) arteriale
- C) diabetike
- D) neuropatike

15. Këto janë kushtet e zhvillimit të infeksionit në plagët kirurgjikale përveç njërit:

- A) Vaskularizimi i keq
- B) Prania e trupave të huaj dhe nekrozave
- C) Flora polimikrobiale
- D) Lloji i antibiotikut të përdorur

16. Këto janë faktorët e përgjithshëm që vonojnë shërimin e plagëve, përveç:

- A) Dehidrimi i të sëmurit
- B) Moshë e madhe
- C) Hipoproteinemia
- D) Prania e trupave të huaj në plagë

17. Këto janë faktorët lokalë që vonojnë shërimin e plagëve, përveç:

- A) Infeksioni bakterial i plagës
- B) Defiçitet e vitaminave
- C) Hematomat
- D) Indet e devitalizuara

18. Një plagë quhet e kontaminuar kur kalojnë se paku:

- A) 1-2 orë
- B) 4 orë
- C) 8 orë
- D) 16 orë

19. Matja e nivelit të albuminës në gjak lidhet me cilin nga parametrat e vlerësimit të ushqyerjes së një pacienti?

- A) Klinike
- B) Antropometrik
- C) Biohumerale
- D) Immunologjike

20. Sa është BMI (Body mass index) në njerëzit normale?

- A) 15-20 kg/m<sup>2</sup>
- B) 20-25
- C) 25-30
- D) 30-35

21. Cila nga keto nuk është patologji e menjehershme dhe fillestare e stomave të aparatit tretës?

- A) Pezmatimi i lëkurës
- B) Fistula
- C) Hemoragjia
- D) Edema

22. Cila nga keto nuk është patologji e vone të stomave (gojezave) të aparatit tretës?

- A) Terheqja, mbledhja e gojezes
- B) Granuloma
- C) Fistula
- D) Hernie

23. Cila nga patologji është shkak i abdomenit akut JO-Kirurgjikal?

- A) Apendisiti akut

- B) Keto-acidoza diabetike
- C) Divertikuliti (divertikuli i zorrës së hollë/trashë)
- D) Infarkti intestinal

24. Cila nga këto patologji është shkak i abdomenit akut Kirurgjikal?

- A) Patologjitë metabolike dhe endokrine
- B) Sëmundjet reumatizmale dhe të kolagjenit
- C) Insuficenca mbiveshkore
- D) Sindromi okluziv nga invaginacioni i zorrës

25. Cili nuk është shkaktar i dhimbjes në abdomenin akut kirurgjikal?

- A) Hemorragjia peritoneale
- B) Tranziti intestinal
- C) Bllokimi i tranzitit
- D) Ischemia/infarkti intestinal

26. Karakteri dhe shkalla e ndryshimeve që ndodhin në organizmin e të operuarit, varen nga keto faktorë përveç njerit:

- A) Nga lloji i anesteziave
- B) Nga lloji i analizave dhe ekzaminimeve preoperatorë
- C) Nga përparimet preoperatorë
- D) Nga gjendja e të sëmurit para operacionit

27. Pneumotoraksi nuk shkaktohet nga:

- A) traumat
- B) një patologji neoplazike e pulmonit
- C) aplikimi i sistemeve totalisht të qëndrueshme
- D) hipertensioni

28. Ka kapsul piogjene:

- A) Abscesi
- B) Flegmona
- C) Celuliti
- D) Forunkula

29. Nuk është e vërtetë për obezitetin:

- A) Haset shpesh
- B) Gjendet me shumë në meshkujt
- C) Faktore predispozues mund të jete rritja e estrogjeneve në gjak
- D) Lidhet me nënshqyerjen

30. Nuk është sëmundje kirurgjikale:

- A) Ulcera e përforuar
- B) Kanceri i stomakut
- C) Ulcera stenozaante grada IV
- D) Diabeti melitus



31. Përben urgjence kirurgjikale:

- A) Kalkuloza e kolecistes
- B) Akalazia e ezofagut
- C) Hernia strangulative
- D) Noduli i ftohte i tiroides

32. Kanceri i gjirit prek më shpesh kuadratin:

- A) medial të sipërm
- B) medial të poshtëm
- C) lateral të sipërm
- D) lateral të poshtëm

33. Përdorimi i garzave hyn në:

- A) Antiseptikën fizike
- B) Antiseptikën kimike
- C) Antiseptikën mekanike
- D) Antiseptikën biologjike

34. Në pozicionimin e pacientit në tavolinën e operacionit duhet pasur parasysh të gjitha të poshtëshënuara përveç:

- A) Të evitohet komprimimi abdominal i tejzgjatur
- B) Të përdoren metodat që parandalojnë dekubituset
- C) Të evitohet aplikimi për kohë të gjatë në gjymtyrë i lakut hemostatik
- D) Të pozicionohet pacienti si ndihet më mirë

35. Sindromi Dumping është komplikacion i kirurgjisë së:

- A) duodenit
- B) stomakut
- C) kolecistës
- D) heparit

36. Nuk është urgjencë ekstreme kirurgjikale:

- A) Ruptura e lienit
- B) Ruptura kataklizmike e barrës ekstrauterine
- C) Embolia arteriale mezenteriale
- D) Kolecistiti akut kalkuloz

37. Defibrilatori nuk është:

- A) Një pajisje me anë të të cilit i jep pacientit një shkarkim elektrik të kontrolluar për të ndërprerë një aritmi
- B) Një pajisje me anë të të cilit i jep pacientit një shkarkim elektrik të pakontrolluar për të ndërprerë një aritmi
- C) Një pajisje që ushqehet me bateri të karikueshme ose rrjet i vazhdueshem tensioni
- D) Një pajisje që realizon shkarkesën të pacienti me anë të dy elektrodave

38. Salla operatore është vendi ku:

- A) trajtohen kirurgjikalisht të sëmurët
- B) shtrohen për trajtim pacientët
- C) shtrohen për trajtim pacientët kirurgjikal
- D) trajtohen intensivisht të sëmurët kirurgjikal

39. Është parimi më i rëndësishëm në ndarjen në dhoma të të sëmurëve kirurgjikal:

- A) Moshë
- B) Seksi
- C) Asepsia
- D) Asnjëra

40. Nuk është karakteristike në ileusin mekanik:

- A) Stop i feceve dhe gazrave
- B) Nauze e të vjella
- C) Dhimbja abdominale
- D) Mungesa e hidroniveleve në radiografi

41. Agjenti më i vlefshëm i përdorur si sterilizues në autoklav është:

- A) Ajri ujor nën presion
- B) Forma e autoklavit
- C) Koha
- D) Nxehtësia

42. Cila nga të mëposhtmet nuk është komplikacion i ulçerës gastrike:

- A) hemorragjia
- B) stenoza
- C) degjenerim neoplazik
- D) refluksi i lëngut biliar

43. Divertikuli i Zenkerit ka të bëjë me:

- A) zgjerimin në pikën e bashkimit të faringut me ezofagun
- B) zgjerim në bifurkacionin e trakesë
- C) zgjerim në pjesën fundore të ezofagut
- D) mungesë e lirimit të sfinkterit të poshtëm ezofageal

44. Nuk është karakteristike e fazës akute të infeksionit :

- A) Dhimbja
- B) Temperatura
- C) Leukopenia
- D) Hiperemia

45. Është inflamacion i gjendrave limfatike:

- A) Limfadeniti
- B) Celuliti
- C) Furunkuli

D) Limfangoidi

46. Nuk është e vërtetë për ushqimin parenteral që:

- A) Është ushqim artificial i pacientit kirurgjikal
- B) Merret me rruge venoze
- C) Merret me rruge arteriale
- D) Merret kur ushqimi oral ose enteral janë të pamundura

47. Cila nga këto plagë është e pastër?

- A) plagë traumatike e bërë brenda 8 orëve të para
- B) plagë nga djegiet
- C) plagë operatore
- D) plagë traumatike nga mjete prerëse sterile

48. Portagia është instrument kirurgjikal që përdoret:

- A) për të suturuar
- B) për të diveriguar
- C) për të mbajtur agen
- D) për të mbajtur lamën

49. Kirurgji mini-invazive quhet:

- A) Lapartomia
- B) Torakotomia
- C) Laparoscopia
- D) Endoscopia

50. Antiseptikën nuk e ndajmë në:

- A) Fizike
- B) Kimike
- C) Biologjike
- D) Vaskulare

51. Fluktuacioni është karakteristik për:

- A) Flegmonën
- B) Limfangoidin
- C) Abscesin
- D) Celulitin

52. Fibrogastroskopia mund të jetë mjet trajtimi për:

- A) Hemorragjine digjестive
- B) Përforacionin e ulcers duodenale
- C) Stenozen pylorike
- D) Përitonitin post ulcers se përforuar

53. Nuk ndodh në hemorragjine gastro intestinale:

- A) Melena

- B) Hemoptizia
- C) Hematemeza
- D) Anemia

54. Janë karakteristike në ileusin mekanik përveç:

- A) Stop i feçeve dhe gazrave
- B) Nauze e të vjella
- C) Prania e hidroniveleve në radiografi
- D) Diarre masive

55. Nuk është komplikacion i nderhryjeve venoze qendrore:

- A) Pneumotoraksi
- B) Nenushqyerjai
- C) Limforrea
- D) Embolia

56. Janë karakteristikë e fazes akute të infeksionit përveç:

- A) Dhimbja
- B) Temperatura
- C) Leukocitoza
- D) Cianoza

57. Nuk është e vërtetë për abscesin:

- A) Prania e kapsulës piogjene
- B) Prania e fluktuacionit
- C) Mund të jetë i nxehtë/i ftohtë
- D) Ndodh vetëm nën lëkurë

58. Është inflamacion i gjendrave të djersës:

- A) Adeniti
- B) Celuliti
- C) Hidroadeniti
- D) Furunkuli

59. Infeksioni rrugëve limfatike quhet:

- A) Mastit
- B) Limfadenit
- C) Limfangoid
- D) Furunkul

60. Tiroidja prodhon:

- A) Serotonine
- B) Kalcitonine
- C) Histamine
- D) Glukagon

61. Kalcitonina ben:

- A) Uljen e Kalciumit ne lengun jashteqelizor
- B) Rritjen e kalciumit ne lengun jashteqelizor
- C) Uljen e depozitimit te kalciumit ne kocka
- D) Rritjen e kalciumit ne urine

62. Origjina etiologjike e tiroiditit akut eshte:

- A) Virale
- B) I panjohur
- C) Infektive
- D) Autoimmune

63. Tiroiditi kronik sklerotik Riedel jep keto shenja klinike pervec:

- A) Dispne
- B) Disfoni
- C) Hipotiroidizem
- D) Tetani

64. Cila nga keto nuk eshte komplikacion i kirurgjise se tiroideve (tiroidektomise)?

- A) Disfoni
- B) Tetani
- C) Infeksion, sepsis
- D) Krize tirotoksike

65. Karakteristikat klinike te morbus Basedow jane keto pervec:

- A) Takikardi
- B) Ekzoftalmi
- C) Shqetesime/pagjumesi
- D) Shtim ne peshe

66. Hemotoraksi shkaktohet nga keto gjendje pervec:

- A) Infarkt pulmonar
- B) Infeksion
- C) Trauma
- D) Neoplazi

67. Cila nga keto nuk eshte shenje e nje mediastinitit akut?

- A) Dhimbje
- B) Hemotoraks
- C) Kollë
- D) Disfagi

68. Mezotelioma eshte tumor i:

- A) Bronkeve
- B) Parenkimes pulmonare
- C) Mediastinit

D) Pleures

69. Mastopatia fibrocistike prek grate e moshes:

- A) 20-25 vjec
- B) 25-45 vjec
- C) 40-50 vjec
- D) 50-60 vjec

70. Dhimbja si shenjë e kancerit të stomakut është:

- A) E hershme
- B) Gjatë zhvillimit të sëmundjes
- C) E vonshme
- D) Gjatë gjithë kohës

71. Akalazia e ezofagut është:

- A) Zgjerim i ezofagut në formë trastëzash
- B) Mungesa e lirimit të sfinkterit të poshtëm ezofageal
- C) Zhvendosja e stomakut në kraharor nëpërmjet hiatusit diafragmatik
- D) Mungesa e lirimit të sfinkterit të sipërm ezofageal

72. Cili nga këto është shkak i divertikulit të traksionit në ezofag?

- A) Rritja e presionit intraluminal
- B) Djegiet e ezofagut
- C) Ulcerat e ezofagut
- D) Proceset cikatrizuese trakeobronkiale të puthitura me ezofagun

73. Biliomat jane pasoja te traumes se:

- A) Stomakut
- B) Duodenit
- C) Heparit
- D) Rrugeve biliare te jashtme

74. Këto jane shkaqet e abcesit hepatic përvec:

- A) Stenoza biliare
- B) Hipertensioni portal
- C) Kalkuloza biliare
- D) Infeksion i përgjithshem

75. Pasojat e kolangitit sklerotizues janë këto përveç:

- A) Cirroza
- B) Hipertensioni portal
- C) Kalkuloza e kolecistës
- D) Variçet e ezofagut

76. Ikteri nga deficitet enzimatiqe (semundja Crigler-Mayor) ka natyre:

- A) Prehepatike

- B) Hepatike
- C) Post hepatike
- D) Idiopatik

77. Cila nga keto nuk eshte nderlikim pas kolecistektomise (heqjes kirurgjikale te kolecistes) ?

- A) Fistul biliare
- B) Hemoragji
- C) Demtim i rrugeve biliare
- D) Gure ne rruget biliare

78. Cila nga keto nuk eshte nderlikim i litiazes se kolecistes?

- A) Fistula biliare
- B) Pezmatimi
- C) Kalkuloza intrahepatike
- D) Hemobilia

79. Incizioni ne piken Mc Burney kryhet per:

- A) Kolecistektoni
- B) Apendektomi
- C) Hernie te paretit abdominal
- D) Kalkuloze biliare

80. Cili nga keto nuk eshte nderlikim postoperator i hernies inguinale ?

- A) Hematoma e sakusit scrotal
- B) Atrofi testikulare
- C) Përforacion i zorreve
- D) Ileusi

81. Cili nga keto nuk klasifikohet ne tumore retroperitoneale?

- A) Tumori renal
- B) Lipoma
- C) Leiomioma
- D) Hemangiosarkoma

82. Cila nga keto nuk eshte klinike e fibrozës retroperitoneale?

- A) Ikteri
- B) Tromboflebitet
- C) Diarre
- D) Dhimbje

83. Cila nga keto nuk eshte shenje e neoplazive retroperitoneale?

- A) Hemoragji gastrointestinale
- B) Ikteri
- C) Tromboza venoze
- D) Dizuria

84. Cila nga këto nuk është shenjë e insulinomes?  
A) Hipoglicemia  
B) Halucinacione  
C) Cefale  
D) Ikter
85. Vipoma (sekretimi i peptidit vazokativ intestinal) nuk shoqerohet me cilen?  
A) Diarre  
B) Hipokalemi  
C) Hipobilirubinemi  
D) Hipokloremi
86. Cila nga këto nuk është komplikacion i cistektomise?  
A) Hemoragjia  
B) Tromboza venoze e thelle  
C) Laparocela  
D) Retensioni urinar
87. Cila nga këto nuk është komplikacion i prostatektomise?  
A) Hemoragjia  
B) Sepsisi abdominal  
C) Inkontinenca (mosmbajtja e urinës)  
D) Anemia
88. Cila nga këto nuk është shkak i hidronefrozes?  
A) Litiaza (guret) ne sistemin urinar  
B) Keqformimet  
C) Fibroza retropëritonela  
D) Dizuria
89. Deri ne çfarë stadi sipas klasifikimit te Leriche-Fontaine te stenozes ateromatoze te pjeses iliako-femorale merret ne considerate terapia medikamentoze?  
A) Stadi I  
B) Stadi II a  
C) Stadi II b  
D) Stadi III
90. Kirurgjia ne aneurizmen abdominale merret ne konsiderate kur aneurizmi ka diameter:  
A) > 2cm  
B) >3 cm  
C) > 5 cm  
D) > 7 cm
91. Cila nga këto nuk është simptome e tromboembolise arteriale?  
A) Dhimbje  
B) Mungese pulsi



- C) Zbehtesi
- D) Hemoragji

92. Gjaku rrjedh ne venat e kembes i shtyre nga këto faktore përvec njëres:

- A) Presioni arterial
- B) Kontraksionet e muskujve te kembes
- C) Shtyrja nga valvulat e venave
- D) Aspiracioni kardio torakal

93. Aneurizma është:

- A) Semundje degjeneruese me grumbullimin e qelizave me prejardhje nga indi lidhor, lipide etj
- B) Zgjerim i vazhdueshem e i qendrueshem i një arterie për shkak te ndryshimeve ne muret e saj
- C) Bllokim akut një arterie ardhur nga trombet ne arteriet me demtime te shtreses intime
- D) Çarje gjatësore e tunike media te arteries

94. Cila nga këto nuk ben pjese ne etiopatogjenezen e tromboflebiteve sipefaqesore?

- A) Hipërkoagulabiliteti
- B) Demtimet parietale
- C) Hipotensioni arteria
- D) Shtjellat e rrjedhes se gjakut

## 10.Pediatri

1. Dhëmbët e qumështit zëvendësohen me dhëmbët e përhershëm:

- A) Rreth moshës 3-4 vjeç
- B) Rreth moshës 4-5 vjeç
- C) Rreth moshës 6-7 vjeç
- D) Rreth moshës 8-9 vjeç

2. Quhet fëmijë prematur:

- A) Fëmija i lindur para 37 javësh moshë shtatzënie
- B) Fëmija që lind para 37 javësh moshë shtatzënie dhe me peshë nën 2500 g
- C) Fëmija i lindur pas 42 javësh moshë shtatzënie
- D) Fëmija që lind ndërmjet 37 dhe 42 javësh moshë shtatzënie

3. Faktorët e jashtëm që ndikojnë në rritje e zhvillim janë të gjithë me përjashtim të:

- A) Kushtet social-ekonomike
- B) Klima tropikale
- C) Sëmundjet kronike pas lindjes
- D) Faktorët gjenetikë

4. Fëmija e dyfishon peshën e lindjes në moshën:

- A) 1 vjeç
- B) 10 muaj
- C) 8 muaj
- D) 5 muaj

5. Vitamina D merr pjesë në:

- A) Mineralizimin e kockës
- B) Aktivitetin nervor
- C) Pjekurinë seksuale
- D) Hematopoezë

6. Fëmija e trefishon peshën e tij në moshën:

- A) 8 muaj
- B) 12 muaj
- C) 1.5 vjeç
- D) 2 vjeç

7. Gjatësia e fëmijës në lindje është rreth:

- A) 60 cm
- B) 50 cm
- C) 40 cm
- D) 30 cm

8. Faktorët e brendshëm që ndikojnë në rritje e zhvillim janë të gjithë me përjashtim të:

- A) Hormonet seksuale
- B) Kushtet social-ekonomike
- C) Hormonet e tiroides
- D) Hormoni somatotrop

9. Encefalopatia bilirubinike tek një fëmijë në term shfaqet kur vlera e bilirubinës serike arrin vlera:

- A) më të larta ose të barabarta me 20 mg/dl
- B) më të larta ose të barabarta me 18 mg/dl
- C) më të larta ose të barabarta me 15 mg/dl
- D) më të larta ose të barabarta me 10 mg/dl

10. Për infeksionin nga Rubeola Kongenitale janë të vërteta të gjitha me përjashtim të:

- A) Prek fetusin me rrugë transplacentare
- B) Shkakton vonesë në rritjen intrauterine dhe anemi tek bebi
- C) Ka në përdorim metoda parandalimi.
- D) Është një nga shkaqet e prematurancës

11. Infeksioni neonatal nuk ka:

- A) Hipotermi
- B) Hipoglicemi
- C) Hipobilirubinemi
- D) Ulje të frekuencës kardiake

12. Apgari është:

- A) Sëmundje ngjitëse e neonatit

- B) Keqformim i lindur
- C) Sëmundje e sistemit kardiorëspirator
- D) Sistem vlerësues i shenjavejetësorë të neonatit

13. Përbëjnë kundërindikacion absolut për ushqyerjen me gji të gjitha me përjashtim të:

- A) HIV i nënës
- B) Insuficiencë kardiake e dekompesuar e nënës
- C) TBC aktiv i nënës
- D) Ragadet e gjirit të nënës

14. Fëmija katërfishon peshën e lindjes në moshën:

- A) 1 vjeç
- B) 1.5 vjeç
- C) 2 vjeç
- D) 5 vjeç

15. Proteina C reaktive është e rritur në të gjitha rastet, me përjashtim të:

- A) Meningitit
- B) Sepsisit
- C) Pneumonisë
- D) Hipoksisë nga një lindje e vështirë

16. Tetanozi neonatal ka të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- A) Shkakton sepsis
- B) Shkakton kontraktura muskulare
- C) Shkakton fraktura të kockave
- D) Shkakton trismus

17. Për fototerapinë janë të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- A) Vepron duke zbërthyer bilirubinën kutane
- B) Ndhmon në uljen e nivelit të bilirubinës së palidhur
- C) Nuk ekziston një vlerë e përcaktuar e nivelit të bilirubinës tek të gjithë neonatët për fillimin e fototerapisë
- D) Përdorimi i saj nuk e parandalon shfaqjen e encefalopatisë bilirubinike

18. Fëmijë postmatur quhet i linduri:

- A) përpara 37 javësh moshë shtatzënie
- B) me peshë nën 2500 g
- C) pas javës 42 të shtatzënisë
- D) nga 37 në 42 javë moshë shtatzënie

19. Infeksioni neonatal ka të gjitha shenjat klinike të mëposhtme, me përjashtim të:

- A) Temperaturë e lartë
- B) Rash kutan (njolla të kuqe në lëkurë)
- C) Ikter
- D) Hiperglicemi

20. Mekonium quhet:

- A) Qumështi i ditëve të para pas lindjes
- B) Një keqformim i lindur i traktit gastrointestinal
- C) Një sëmundje ngjitëse e transmetuar nga nëna
- D) Jashtëqitja e parë e bebit

21. Vlerësimi i Apgarit nuk përfshin:

- A) Frekuencën kardiake
- B) Tonusin muskular
- C) Frekuencën respiratorë
- D) Refleksët primare

22. Shkaktojnë keqformime të lindura të gjitha, me përjashtim të:

- A) Rubeola kongenitale
- B) Toksoplazmoza kongenitale
- C) CMV kongenital
- D) Hepatiti b kongenital

23. Mund të jenë shenja klinike të një infeksioni neonatal të gjitha, me përjashtim të:

- A) Hipotermisë
- B) Hiperglicemisë
- C) Hepatosplenomegalisë
- D) Bombimit të fontanelës

24. Kern ikteri shkaktohet nga:

- A) Fiksimi i bilirubinës së palidhur në bërthamat trunorë
- B) Fillimi i parakohshëm i ablaktacionit
- C) Anemia nga mungesa e hekurit
- D) Ikteri nga qumështi i gjirit

25. Gjatësia e fëmijës në fund të vitit të parë është rreth:

- A) 1 m
- B) 85 cm
- C) 75 cm
- D) 50 cm

26. Ikteri tek neonati bëhet i dukshëm në lëkurë kur niveli serik i bilirubinës është:

- A) 2-4 mg/dl
- B) 5-7 mg/dl
- C) 8-9 mg/dl
- D) 10 mg/dl

27. Terapia rehidruese orale është trajtim i zgjedhur për të gjithë fëmijët e dehidruar, me përjashtim të:

- A) Të vjella dhe temperaturë e lartë,

- B) Koma ose shok,
- C) Shigelozë,
- D) Helmim ushqimor

28. Favorizojnë malnutricionin të gjitha, me përjashtim të:

- A) Infeksionet kronike
- B) Përdorimi pa kriter i antibiotikëve
- C) Rrezatim i tepruar nga rrezet e diellit
- D) Kushtet e këqija social-ekonomike

29. Mjekimi i zgjedhur në Giardiazë është:

- A) Amikacina
- B) Mebendazoli
- C) Piperazina
- D) Metronidazoli

30. Ndërlikimi më i shpeshtë i Salmonelozës është:

- A) Prolapsi rektal
- B) Anemia
- C) Dehidrimet e tipeve të ndryshme
- D) Meningiti

31. Kwashiorkor-i karakterizohet nga të gjitha shenjat e mëposhtme, me përjashtim të:

- A) Anamnezë për mosmarrje të mjaftueshme të proteinave, por marrje relativisht e mjaftueshme e kalorive
- B) Fëmija është ushqyer vetëm me gji gjashtë muajt e parë të jetës
- C) Edema
- D) Hipoalbuminemi

32. Cili nga ekzaminimet e mëposhtme nuk ka vlerë në shigelozë?

- A) Koprokultura
- B) Hemokultura
- C) Kërkimi për pus e gjak në feçe
- D) Gjak komplet

33. Hymenolepsis nana transmetohet nga:

- A) Pleshti
- B) Miza
- C) Njeriu
- D) Këpusha

34. Masat e mëposhtme duhen marrë në një fëmijë me shok anafilaktik të rëndë, përveç?

- A) Lirimi i rrugëve të frymëmarrjes
- B) Oksigjenimi
- C) Përdorimi i adrenalinës
- D) Antibiotikoterapi

35. Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë për dermatitin atopik?
- A) Është sëmundje me predispozitë të qartë trashëguese
  - B) Lidhet me praninë e parazitëve intestinalë,
  - C) Prek kryesisht adoleshentët,
  - D) Lë imunitet të përgjeshëm
36. Në dehidrimin hiperton vuan më shumë:
- A) Sistemi kardiovaskular
  - B) Sistemi nervor
  - C) Trakti tretës
  - D) Sistemi limfatik
37. Oliva pilorike është nje mase qe palpohet
- A) Ne regjionin epigastrik
  - B) Ne regjionin inguinal te majte
  - C) Ne regjionin inguinal te djathte
  - D) Ne Asnjërën
38. Diarrea nga Shigella karakterizohet klinikisht nga të gjitha simptomat e mëposhtme përveç:
- A) Diarre me mukus dhe gjak
  - B) Temperaturë e lartë
  - C) Dhimbje barku
  - D) Dhimbje koke
39. Spazmofilia paraqitet klinikisht me shenjat e mëposhtme, përveç:
- A) Konvulsione parciale
  - B) Konvulsione të gjeneralizuara
  - C) Konvulsione te dukshme ose qe provokohen
  - D) Diarre
40. Kraniotabes është shenjë klinike e:
- A) Rakitit
  - B) Hipovitaminozes A
  - C) Te dyjavë
  - D) Asnjëres
41. Kraniotabesi evidentohet duke:
- A) Marre anamnezen e të sëmurit
  - B) Shtypur kockat në regjonin oksipital
  - C) Auskultuar me stetoskop
  - D) Asnjërën
42. Doza e Acetaminofenit (Paracetamol) në fëmijë është:
- A) 2 mg/kg për çdo marrje,
  - B) 5 mg/kg për çdo marrje,

- C) 15 mg/kg për çdo marrje,
- D) 50 mg/kg për çdo marrje,

43. Infiltrati eozinofilik Löffler në pulmone mund të haset në:

- A) Enterobiozë (oksiuriasë),
- B) Teniazë,
- C) Askaridozë,
- D) Sepsis nga salmonella

44 Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë për stenozen hipertrofike të pilorit?

- A) Të vjella që në lindje
- B) Ekziston një interval pa shenja klinike ndërmjet lindjes dhe çrregullimeve të para
- C) Ka prani të bilës në të vjella
- D) Ka humbje të orëksit

45. Shkaktojnë çrregullime malabsorbitive të gjitha, me përjashtim të:

- A) Alergjia nga proteinat e qumështit të lopës,
- B) Dermatiti atopik,
- C) Malnutricioni proteino-kalorik,
- D) Lambliaza

46. Sa është sasia e Tresolit që përdoret për rehidrim oral në dehidrimin e lehtë?

- A) 10 mg/kg peshë
- B) 20 mg/kg peshë,
- C) 50 mg/kg peshë,
- D) 100 mg/kg peshë

47. Tetania në fëmijët e vegjël është pasojë e:

- A) Rritjes së glicemisë,
- B) Uljes së kalciumit të jonizuar në gjak,
- C) Uljes së glicemisë,
- D) Rritjes së kalcemisë

48. Shkaku më i shpeshtë i urtikarieve është:

- A) Alergjia ushqimorë,
- B) Infeksionet virale,
- C) Alergjia medikamentoze,
- D) Idiopatik- i pa njohur

49. Prania e leukociteve në feçe vihet re në diarrenë nga:

- A) Shigella,
- B) Viruset,
- C) Gabimet në ushqyerje,
- D) Helmimet ushqimorë

50. Provokimi i të vjellave ka kundërindikacion absolut në helmimet:

- A) Ushqimorë,
- B) Nga marrja e lëndëve kaustike,
- C) Nga paracetamoli,
- D) Nga valiumi

51. Forma e dehidrimit (i lehtë-i mesëm-i rëndë) tek fëmija vlerësohet me të gjitha, me përjashtim të:

- A) Matja e presionit arterial,
- B) Thellimi i syve,
- C) Dhimbja e kokës,
- D) Niveli i fontanelës së madhe

52. Trajtimi i stenoze hipertrofike të pilorit:

- A) Nuk është urgjencë mjekësore
- B) Është urgjencë mjekësore
- C) Nuk ka nevojë për ekzaminime paraprake
- D) Asnjëra

53. Shkaktarët më të shpeshtë të diarresë në fëmijë (rreth 70% e diarreve) janë:

- A) Viruset
- B) Bakteret
- C) Mykrat
- D) Asnjëri

54. Teniat janë:

- A) Viruse,
- B) Baktere,
- C) Krimba,
- D) Myke

55. Disa komplikacione afatgjata të diabetit janë të gjitha të poshtëshënuarat, përveç:

- A) Dëmtimi i shikimit
- B) Dëmtimi i funksionit renal
- C) Ulçera trofike kryesisht në këmbë
- D) Konvulsione

56. Shenja Trousseau lidhet me:

- A) Hipokalceminë,
- B) Hipovitaminozën A
- C) Hipovitaminozën K
- D) Shokun anafilaktik

57. Doza e Adrenalinës subkutan për trajtimin e shokut anafilaktik është:

- A) 0.1 mg për çdo 10 kg peshë,
- B) 0.5 mg për çdo 10 kg peshë,
- C) 1 mg për çdo 10 kg peshë,



D) 10 mg për çdo 10 kg peshë

58. Vlerësimi i moshës kockorë bëhet më mirë me radiografinë e:

- A) Gjurit,
- B) Artikulacionit radiokarpal,
- C) Kaviļjes,
- D) Bërrylit

59. Për hipotiroidizmin kongenital janë karakteristike të gjitha, me përjashtim të:

- A) Fontanela anteriorë e posteriorë shumë të mëdha,
- B) Vonesë në pjekurinë skeletike,
- C) Ikter,
- D) Hipertension arterial

60. Problemi nutricional më kritik i moshës parashkollorë në të gjithë botën është:

- A) i karbohidrateve,
- B) i yndyrnave,
- C) proteinik,
- D) i mineraleve

61. Shenja Trousseau lidhet me:

- A) Hiperkalceminë,
- B) Hiponatreminë,
- C) Hipokalceminë,
- D) Hipotiroidizmin

62. Lavazhi gastrik është i kundërindikuar në marrjen e:

- A) Aspirinës,
- B) Valiumit,
- C) Lëndëve acide,
- D) Vitaminave,

63. Në dehidrimin e rëndë, në 2-3 orët e para të rehidrimit nuk jepet solucion:

- A) Ringer Lactat
- B) bikarbonat natriumi [NaHCO<sub>3</sub>]
- C) fiziologjik [NaCl 0.9%]
- D) klorur kaliumi [KCl 7.5%]

64. Cili nga ekzaminimet e mëposhtme nuk ka vlerë në shigelozë?

- A) Koprokultura,
- B) Hemokultura,
- C) Ekzaminimi i feçeve për gjak e pus,
- D) Elektrolitët dhe ekuilibri acidobazik,

65. Thithja e kalciumit në zorrë varet nga:

- A) Hormonet e tiroides,

- B) Insulina,
- C) Vitamina D,
- D) Përqëndrimi në gjak i vitaminës C,

66. Njëra nga shenjat e mëposhtme dëshmon për stenoze hipertrofike të pilorit:

- A) Të vjellat biliare,
- B) Anorëksia,
- C) Diarrea,
- D) Të vjellat ushqimore pas ushqyerjes,

67. Diabeti melitus karakterizohet nga keto shenja klinike, përveç:

- A) Poliuri,
- B) Polifagi,
- C) Polidipsi
- D) Shtim në peshë

68. Diarrea infektive shkaktohet vetëm nga :

- A) Bakteret
- B) Viruset
- C) Mykrat
- D) Parazitët

69. Çfarë vë në dukje koprokultura?

- A) Viruset
- B) Myket
- C) Bakteret
- D) Protozoarët

70. Rakiti është sëmundje e:

- A) Skeletit të fëmijës
- B) Aparatit tretës
- C) Aparatit urinar
- D) Aparatit gjeneral

71. Rakiti karakterizohet nga të gjitha të poshtshenuarat, përveç:

- A) Mosmineralizimi i skeletit të fëmijës
- B) Dobësi
- C) Deformim i kockave
- D) Shtim në peshë

72.. Kwashiorkor:

- A) Është sëmundje infektive bakteriale,
- B) Shkaktohet nga marrja e pamjaftueshme e yndyrave,
- C) Shkaktohet nga krimbat e rumbullakët intestinalë,
- D) Shkaktohet nga marrja e pamjaftueshme e proteinave, e shoqëruar me marrje disi të mjaftueshme të kalorive

73. Në diarrenë akute me mukus e gjak përdorën:

- A) Antidiarrikët,
- B) Antiemetikët,
- C) Antibiotikët,
- D) Opiatet

74. Dhënia e vitaminës K tek i porsalinduri duhet të jetë:

- A) Sistematike-e detyrueshme për çdo të porsalindur
- B) E këshillueshme,
- C) E panevojshme tek fëmija që ushqehet me gji,
- D) Vetëm në rast hemorragjie të jashtme

75. Në rakit është karakteristike:

- A) Hipokalcemia,
- B) Proteinuria,
- C) Anemia,
- D) Hiperglicemia

76. Sa është sasia e likideve për mbushjen e shtratit vaskular në dehidrimin e mesëm?

- A) 10 ml/kg peshë,
- B) 20 ml/kg peshë,
- C) 50 ml/kg peshë,
- D) 90 ml/kg peshë

77. Hipotiroidizmi kongenital mjekohet me:

- A) Hormonin e rritjes,
- B) L-tyroksine,
- C) Kortizonikë,
- D) Insulinë

78. Për stnozën hipertrofike të pilorit janë të vërteta të gjitha, përveç:

- A) Është më e shpeshtë në meshkuj,
- B) Fillimisht të vjellat janë gojë-gojë, pastaj presioni shtohet,
- C) Të vjellat janë biliare,
- D) Rritja e fëmijës dëmtohet nga kjo patologji

79. Cili nga çrregullimet e mëposhtme është i pranishëm në shokun hipovolemik?

- A) Edemat e shprehura,
- B) Hiperglicemia
- C) Hiperalbuminemia
- D) Acidoza metabolike

80. Janë shenja të rakitit të gjitha, me përjashtim të:

- A) Kraniotabes,
- B) Ngadalësimi të rritjes,

- C) Sulkusit tëi harrisonit,
- D) Skorbuti

81. Çrregullimet alergjike mund të mjekohen me sukses me të gjitha mënyrat e mëposhtme, me përjashtim të:

- A) Mënjanimit të kontaktit me alergjenin
- B) Mjekimi adekuat farmakologjik [adrenalinë, anihistaminikë],
- C) Përdorimi i barnave antimikrobike,
- D) Përdorimi i bronkodilatatorëve

82. Karboni aktiv përdorët për trajtimin e:

- A) Intoksikacioneve në fëmijë
- B) Hipokalcemisë,
- C) Diarresë dhe/ose të vjellave,
- D) Hipokalcemisë,

83. Diarrea infektive nga Shigella karakterizohet klinikisht nga shenjat e mëposhtme, përveç:

- A) Diarre e pakët me mukus e gjak
- B) Dhimbje të forta barku
- C) Temperaturë e lartë
- D) Konstipacion

84. Cili është medikamenti që përdorët për korrigjimin e acidozës metabolike?

- A) Sol. Bikarbonat Na 8.4%
- B) Sol. Ca glukonat
- C) Sol. klorur kaliumi
- D) Asnjëra

85. Koha e rikolorimit (rimbushjes kapilare në normë është më pak se :

- A) 1 sekonda
- B) 3 sekonda
- C) 6 sekonde
- D) 9 sekonda

86. Sindromi Reye lidhet me përdorimin e:

- A) Aspirinës
- B) Aminofilinës
- C) Amfetaminës
- D) Antibiotikëve

87. Doza e paracetamolit për uljen e temperaturës në fëmijë është:

- A) 2 mg/kg në një marrje
- B) 5mg/kg në një marrje
- C) 15 mg/kg në një marrje
- D) 20 mg/kg në një marrje

88. Serumi antidifteritik:

- A) Lidh toksinën që qarkullon në gjak
- B) Shkrin membranat e formuara në fyt
- C) Pengon shumimin e mikroorganizmit
- D) Përdorët si profilaksi kundër difterise

89. Për paralizat e poliomielitit njëri nga pohimet nuk është i vërtetë:

- A) Janë flakside
- B) Janë simetrike
- C) Janë të përherëshme
- D) Janë proksimale

90. Paraliza e nervit glosofaringeal, me dalje të lëngjeve nga hunda, mund të vihet re në:

- A) Rubeolë
- B) Sinuzit
- C) Difteri
- D) Askaridozë

91. Njollat e Koplik-ut janë karakteristikë e:

- A) Rubeolës
- B) Varicelës
- C) Fruthit
- D) Skabiesit

92. Ekzantema që shfaqet edhe në lëkurën me flokë flet për:

- A) Rubeolë
- B) Varicelë
- C) Fruth
- D) Skarlatinë

93. Rashi kutan makulo-papulo-vezikular, i shoqëruar me temperaturë të lartë dhe prurit flet për:

- A) Rubeolë
- B) Varicelë
- C) Fruth
- D) Skarlatinë

94. Janë komplikacione të varicelës të gjitha, me përjashtim të:

- A) Qelbëzimi i elementeve kutane
- B) Sindromi Reye
- C) Glomerulonefriti
- D) Herpes Zoster

95. Fenobarbitali (Luminali) përdorët për trajtimin e:

- A) Giardia lamblia
- B) Laringitit akut
- C) Statusit konvulsiv

D) Skarlatinës

96. Në varicelë nuk duhen përdorur:

- A) Antihistaminikët
- B) Aspirina
- C) Antibiotikët
- D) Solucionet rehidruese

97. Shenja madhorë e glomerulonefritit akut është:

- A) Proteinuria
- B) Hematuria
- C) Hipertensioni arterial
- D) Anemia

98. Është e dobishme të përdorën për pertusin të gjitha të poshtshenuarat, përveç:

- A) Oksigjenoterapi
- B) Diazepam
- C) Inhalacion me bronkodilatatorë
- D) Suplemente me hekur

99. Gjuha si manaferra të kuqe është karakteristike e:

- A) Rubeolës
- B) Parotitit
- C) Skarlatinës
- D) Fruthit

100. Njëra nga shenjat e mëposhtme nuk bën pjesë në kriteret madhorë të Ethes Reumatizmale Akute:

- A) Carditis
- B) Poliartiritis
- C) Bradikardia
- D) Chorëa minor

101. Shkakton anemi ferriprive:

- A) Hemofilia
- B) Talasemia
- C) Papajtueshmëria nga faktori Rh
- D) Nënushqyerja

102. Cila nga shenjat e mëposhtme nuk është karakteristike e Sindromit Nefrotik Idiopatik?

- A) Hipoproteinemia
- B) Edema
- C) Poliuria
- D) Proteinuria

103. Në cilën moshë hasen më shpesh konvulsionet febrile?

- A) Tek i porsalinduri
- B) Nga muaji i parë në muajin e pestë të jetës
- C) 6 muaj - 5 vjeç
- D) Pas moshës 12 vjeç

104. Bronkioliti nuk ka :

- A) Takipne
- B) Tirazh
- C) Wheezing
- D) Dispne inspiratore

105. Diagnoza etiologjike e faringotonsilitit streptokoksik beta-hemolitik të grupit A bëhet me:

- A) Hemokulturë
- B) Kulturë fyti
- C) Urokulturë
- D) Gjak komplet

106. Karakteristikat klinike të infeksionit nga Hepatiti A janë si më poshtë, me përjashtim të:

- A) Periudha e inkubacionit është 15-50 ditë
- B) Klinika ka manifestime të shumta ekstrahepatike
- C) Transmetimi është fekal-oral
- D) Infeksioni manifestohet me rritje të transaminazave dhe të bilirubinës

107. Toksina difteritike parapëlqen:

- A) Indin renal
- B) Miokardin
- C) Timusin
- D) Tiroiden

108. Doza e diazepamit për trajtimin e një krize konvulsive është:

- A) 0.1 mg/kg ne nje marrje
- B) 0.5 mg/kg ne nje marrje
- C) 5 mg/kg ne nje marrje
- D) 10mg/kg ne nje marrje

109. Kolla lehëse është karakteristikë e:

- A) Tonsilitit
- B) Pertusit
- C) Astmës bronkiale
- D) Laringitit

110. Cila nga sëmundjet e mëposhtme nuk shkaktohet nga Streptokoku beta-hemolitik ose nuk është pasojë e tij?

- A) Ethja reumatizmale
- B) Skarlatina
- C) Hepatitis

D) Angina folikulare

111. Paraliza Landry mund të vihet re në:

- A) Poliomielit
- B) Difteri
- C) Laringit
- D) Meningit

112. Rash rozë, temperaturë subfebrile, limfadenopati cervikale - flet për:

- A) Skarlatinë
- B) Rubeolë
- C) Frut
- D) Varicelë

113. Herpes zoster shkaktohet nga virusi:

- A) herpes simplex
- B) i varicelës
- C) i hepatitit
- D) HIV

114. Komplikacioni më i shpeshtë i varicelës është:

- A) Bronkopneumonia
- B) Qelbëzimi i elementeve kutane
- C) Meningoencefaliti
- D) Laringotrakeobronkiti

115. Maska e Filatov-it është karakteristike e:

- A) Fruthit
- B) Rubeolës
- C) Skarlatinës
- D) Varicelës

116. Meningiti i latantit ka të pranishme të gjitha shenjat e mëposhtme klinike, me përjashtim të:

- A) Bombim të fontanelës
- B) Konvulsione
- C) Hipotermi
- D) Fotofobi

117. Cila prej shenjave mund të lidhet me hepatitin akut?

- A) Stridori laringeal
- B) Urtikaria e gjeneralizuar
- C) Temperatura septike
- D) Konvulsionet

118. Për astmën janë të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- A) Kriza e astmës mund të shpërthejë nga një infeksion viral, sforcim fizik, emocion



- B) Eshtë sëmundje inflamatorë kronike
- C) Prania e wheezing është e përhershme
- D) Sëmundja karakterizohet nga dispne e tipit inspirator

119. Krimbat e rrumbullakët mjekohen me:

- A) Metronidazol (Flagyl)
- B) Mebendazol (Vermox)
- C) Manitol
- D) Makrolidë

120. Shenjë madhorë e insuficiencës renale kronike është:

- A) Oligoanuria
- B) Edema
- C) Poliuria
- D) Hematuri

121. Cili nga ekzaminimet e mëposhtme rekomandohet të kryhet në një fëmijë me urtikarie?

- A) Urinë komplet
- B) Urokulturë
- C) Koprokulturë
- D) Feçe parazit

122. Sindroma Reye është komplikacion i:

- A) Skarlatinës
- B) Variçelës
- C) Pertusit
- D) Poliomielitit

123. Nuk transmetohen me rrugë fekal-orale:

- A) Poliomieliti
- B) Hepatiti viral B
- C) Hepatiti viral A
- D) Hepatiti viral E

124. Diagnoza e drepanocitozës bëhet me:

- A) Të dhënat e gjakut komplet
- B) Elektroforëzën e hemoglobinës
- C) Matjen e nivelit të bilirubinës në gjak
- D) Matjen e hekurit në gjak

125. Parandalimi dhe trajtimi i tonsilofaringitit nga Streptokoku beta-hemolitik i grupit A parandalon:

- A) Miokarditin
- B) Ethen reumatizmale
- C) Skarlatinën
- D) Infeksionin e rrugëve urinare

126. Tonsiliti akut shkaktohet nga, dhe mjekohet me:

- A) Escherichia coli; Gentamicinë
- B) Hymenolepsis nana; Cefalosporina
- C) Streptococcus beta-hemolyticus; Penicilinë
- D) Staphylococcus aureus; Gentamicinë

127. Doza e ibuprofenit për trajtimin e ethes në fëmijë është:

- A) 0.1 mg/kg në një marrje
- B) 0.5 mg/kg në një marrje
- C) 1 mg/kg në një marrje
- D) 10 mg/kg në një marrje

128. Shenjë madhore e sindromit nefrotik është:

- A) Oligoanuria
- B) Hematuria
- C) Hiperlipidemia
- D) Proteinuria masive

129. Forma më e rëndë e difterisë është difteria:

- A) faringeale
- B) nazale
- C) e konjuktivës
- D) laringeale

130. Chorëa e Sydenham është karakteristike në:

- A) Encefalopatitë kongenitale
- B) Konvulsionet febrile
- C) Veset e zemrës me cianoze
- D) Ethen reumatizmale

131. Talasemia major nuk ka:

- A) Splenomegali
- B) Qeliza me shenjë
- C) Hbf të rritur
- D) Pakësim të nivelit të hekurit në gjak

132. Meningiti bakterial nuk ka karakteristike në LCS:

- A) Rritjen e neutrofileve
- B) Rritjen e numrit të qelizave
- C) Uljen e glukozës
- D) Uljen e proteinave

133. Për Hemofilinë A nuk është vërtetë se :

- A) Vjen nga mungesa e faktorit VIII
- B) Karakterizohet nga hemartroza

- C) Eshtë sëmundje autozomale recesive
- D) Mund të ketë hemorragji intrakraniale

134. Nuk është shenjë e insuficiencës kardiake:

- A) Takipnea
- B) Kardiomegalia
- C) Hepatomegalia
- D) Poliuria

135. Cila nga enzimat e mëposhtme rritet në parotit?

- A) Fosfataza alkaline
- B) Transaminazat
- C) Amilaza
- D) Lipaza

136. Janë të vërteta për Hemofilinë B të gjitha me përjashtim të:

- A) Nuk dallohet klinikisht nga hemofilia A
- B) Niveli i faktorit IX është i ulur
- C) Shfaqet klinikisht vetëm tek vajzat
- D) Trashëgohet në mënyrë autozomale recesive

137. Në rastin e epiglotitit duhet shmangur:

- A) Matja e temperaturës
- B) Oksigjenimi
- C) Shikimi i fytit me spatul
- D) Aerosoloterapia me adrenalinë

138. Hb që gjendet në sasi më të madhe tek i porsalinduri është:

- A) Hba
- B) Hba2
- C) Hbf
- D) Hbs

139. Cila nga sëmundjet e mëposhtme shkaktohet nga një gjen i lidhur me seksin?

- A) Talasemia
- B) Anemia ferriprive
- C) Hemofilia
- D) Drepanocitoza

140. Mjekimet e mëposhtme janë të dobishme në laringotrakeobronkitin akut, me përjashtim të:

- A) Rritja e lagështisë së mjedisit
- B) Aerosoloterapia me adrenalinë
- C) Oksigjenoterapia
- D) Antitusivët (frenuesit e kollës)

141. Cilën nga shenjat e mëposhtme nuk e gjejmë në infeksionet e rrugëve të sipërme respiratorë?

- A) Kollë
- B) Ethe
- C) Polipne
- D) Wheezing

142. Shkaktarë të angines purulente janë:

- A) Viruset
- B) Streptokoku
- C) Mykoplazma
- D) Ndotësit ambientalë

143. Ethja në fëmijë trajtohet me të gjitha mënyrat e mëposhtme, me përjashtim të:

- A) Ibuprofen
- B) Paracetamol
- C) Aspirinë
- D) Kompresa

144. Në trajtimin e bronkiolitit akut kanë vlerë të gjitha, me përjashtim të:

- A) Inhalacionit me bronkodilatatorë
- B) Mjekimit me antibiotikë
- C) Oksigjenoterapisë
- D) Trajtimin të ethes me antipiretikë

145. Orkiti është komplikacion i:

- A) Skarlatinës
- B) Parotitit
- C) Varicelës
- D) Fruthit

146. Në një fëmijë me purpur trombocitopenike autoimune i gjejmë të gjitha, me përjashtim të:

- A) Petekie dhe ekimoza
- B) Anemi
- C) Numri i trombociteve i ulur
- D) Hepatosplenomegali

147. Në cilën moshë hasen më shpesh konvulsionet febrile?

- A) Tek i porsalinduri
- B) Pas moshës 12-vjeçare
- C) Nga 6 në 12 vjeç
- D) Nga 6 muaj në 5 vjeç

148. Shenja Brudzinski është pozitive në:

- A) Parotit
- B) Miokardit

- C) Meningit
- D) Hepatit

149. Fruthi ka shenjë patognomonike:

- A) Maskën e Filatovit
- B) Dermografizmin e bardhë
- C) Njollat e Koplikut
- D) Shenjën Trousseau

150. Nje i porsalindur klasifikohet si SGA kur:

- A) Pesha është nën 3% percentile
- B) Gjatesia është nën 3% percentile
- C) Perimetri i kokës është nën 3 % percentile
- D) Të gjitha

151. Nje i porsalindur klasifikohet si LGA kur

- A) Pesha është mbi 97% percentile
- B) Gjatesia është mbi 97 % percentile
- C) Perimetri I kokës është mbi 97 % percentile
- D) Të gjitha

152. Ikteri fiziologjik shfaqet:

- A) Ditën e parë të jetës
- B) Ditën e trete të jetës
- C) Ditën e dhjete të jetës
- D) Muajin e parë të jetës

153. Ikteri nga papjtueshmeria e rhezusit shfaqet:

- A) Ditën e parë të jetës
- B) Ditën e trete të jetës
- C) Ditën e dhjete të jetës
- D) Muajin e parë të jetës

154. Kernikter ose ikteri nuklear prek:

- A) Aparatin gastro-intestinal
- B) Aparatin lokomotor
- C) Berthamat nukale te trurit
- D) Aparatin kardio-respirator

155. E vjella ne refluxin gastro-ezofageal ndodh:

- A) Menjehere pas ushqyerjes
- B) Para ushqyerjes
- C) Rreth 1-2 orë pas ushqyerjes
- D) Asnjëra

156. E vjella ne stenozen hipertrofike te pilorit ndodh:

- A) Menjehere pas ushqyerjes
- B) Para ushqyerjes
- C) Rreth 1-2 orë pas ushqyerjes
- D) Asnjëra

157. Neonati nuk vendoset ne gji kur nëna është e semure nga:

- A) Rubeola
- B) Meningiti
- C) HIV-aids
- D) Tetanozi

158. Oftalmi është shenja me e zakonshme dhe me e shpësthtë e;

- A) Tetanozit
- B) Gonorëse
- C) Sifilizit
- D) Drubeoles

159. Ushqyerja ekskluzive me gjë duhet te vazhdohet:

- A) Dy muaj pas lindjes
- B) Kater muaj pas lindjes
- C) Gjashte muaj pas lindjes
- D) Deri ne vitin e parë të jetës

160. Ne sallën e lindjes veprimi qe duhet bere gjithmone është:

- A) Vendos bebin mbi barkun e nënes
- B) Largoje ne nje dhome me vete
- C) Mbaje larg nga ambjenti ku rri nëna
- D) Mos i jep informacion nënes

161. Ne ekzaminimin e parë te bebit gjithmone duhet parë

- A) Kalueshmeria anale
- B) Kalueshmeria nazale
- C) Kalueshmeria ezofago-gastrike
- D) Të gjitha

162. Ne sallën e lindjes Asnjëhere nuk duhet te mungoje:

- A) Burimi i oksigjenit
- B) Ngrohësi i ambjentit
- C) Pelenat e ngrohta
- D) Asnjëra

163. Ne sallën e lindjes ekipi neonator duhet te njoftohet:

- A) 30 minuta para lindjes
- B) Ne momentin e lindjes
- C) Pas lindjes
- D) Nuk është e nevojshme te jene ne salle

164. Nje i porsalindur klasifikohet si serotin kur lind:

- A) Para javes se 37-te të shtatzanisë
- B) Pas javes se 42 -te të shtatzanisë
- C) Midis 37-41 javështatzanie
- D) Asnjëra

165. E vjella ne stenozen hipertrofike te pilorit është:

- A) Permbajtje qumeshti
- B) Qumesht I prere si hirre
- C) Me permbajtje bile
- D) Asnjëra

166. Bebi i porsalindur vendoset ne gji:

- A) Menjehere pas lindjes
- B) Ditën e parë pas lindjes
- C) Tre ditët e par ate lindjes
- D) Javen e parë pas lindjes

167. Cilën nga sëmundjet e mëposhtme shfaq me shpejt fëmija prematurë?

- A) Papjekuri te sistemit respirator
- B) Papjekuri te sistemit lokomotor
- C) Papjekuri te sistemit nervor
- D) Papjekuri te sistemit tretes

168. Hipotermia ose temperature e ulët është karakteristike e:

- A) Bebit prematur
- B) Bebit hipotrof
- C) Bebit serotin
- D) Asnjërit

169. Perpara nje femije premature cilen do te vleresosh me shume:

- A) Veshtiresine ne frymemarje
- B) Hypoglicemine
- C) Hypotermine
- D) Të gjitha

170. Pikezimi i Apgarit kryhet:

- A) Ne minute e parë të jetës
- B) Ne minute 0 të jetës
- C) 30 minutat e para
- D) Ditën e parë te lindjes

171. Anomalite e bashkelindura janë me teper karakteristike e:

- A) Femijeve te lindur ne term
- B) Femijeve te lindur SGA

- C) Femijeve te lindur LGA
- D) Asnjërit

172. Cili nga ekzaminimet e meposhtme laboratorike tregon nivelin e ikterit:

- A) Bilirubinemia
- B) Azotemia
- C) Glicemia
- D) Sedimenti

173. Cfare duhet te bejme para nje femije te semure?

- A) Te trajtojme problemin imediat
- B) Te gjejme pse femija është semurur dhe te trajtojme shkakun
- C) Te monitorojme cdo factor reziku
- D) Të gjitha

174. Mortaliteti infantil nënkupton vdekshmerine neonatale;

- A) brenda vitit te parë të jetës
- B) ne muajin e parë të jetës
- C) ne javen e parë të jetës
- D) ne ditën e parë të jetës

## **11. Okulistike, Gastr-Hepato, Nefro, Neuro, Sh.Riprodhus, Ortotrauma**

1. Konjuktiviti bakterial:

- A) Shkaktohet nga viruset
- B) Ka papilla te zmadhuara
- C) Ka prani te folikujve
- D) Ka sekrecione mykoide

2. Ne ankesat subjektive nuk ben pjese:

- A) Ulja e te parit
- B) Dhimbja
- C) Lotimi i shtuar
- D) Skuqja

3. Ne uvea nuk ben pjese:

- A) Iri
- B) Trupi ciliar
- C) Choroidea
- D) Retina

4. Trupi qelqor:

- A) Ka mbaresa nervore
- B) Ka pigment
- C) I jep formen syrit
- D) Ushqen retinen



5. Konjuktivitetet virale:

- A) Jane te shpeshta ne cdo stine
- B) Kane sekrecione purulente
- C) Ka folikuj ne konjuktive
- D) Ka zmadhim te papilave

6. Mjekimi i konjuvitit viral:

- A) Antiviral
- B) Antibiotik
- C) Antimykotik
- D) Kalon pa mjekim

7. Nuk ben pjese ne shtresat e kornese:

- A) Membrana e Bawmanit
- B) Stroma
- C) Konet
- D) Endoteli

8. Fuqia perthyese e syrit eshte:

- A) 60 dioptri
- B) 58 dioptri
- C) 62 dioptri
- D) 50 dioptri

9. Ne keratite dallojme gjithe keto pervec:

- A) Infiltrate korneale
- B) Hypopion
- C) Turbullim I vitrozit
- D) Edeme korneale

10. Keratokonusi mjekohet me:

- A) Antibiotik
- B) Syze
- C) Lente e fort kontakti
- D) Kortizonike

11. Makrokornea eshte:

- A) Semundje inflamatore e kornese
- B) Diametri I kornese > 12mm
- C) Dhome e perparme e thelle
- D) Diameter <10 mm

12. Keratokonus eshte:

- A) Anomali e perthyerjes se drites
- B) Dalje ne forme koni e kristalinit

- C) Semindje inflamatore
- D) Ka sekrecione purulente

13. Cila forme e keratitit shfaqet me heret?

- A) dentritik
- B) punktat
- C) vezikular
- D) stromal

14. Keratiti mykotik:

- A) Shfaqet ne dimer
- B) Ka aftesi te perseritet shpesh
- C) Shfaqet nga perdorimi I gjate I kortizonikeve
- D) Mjekohet me antibiotike

15. Ametropia eshte:

- A) Anomalia e retines
- B) Anomali e kornese
- C) Shembellimi bie ne retine
- D) Anomali e perthyerjes se drites

16. Ne hipermetropi shembellimi bie:

- A) ne retine
- B) pas retines
- C) para retine
- D) ne pika te ndryshme ne retine

17. Keratiti mykotik mjekohet:

- A) Antivirale
- B) Antibiotike
- C) Antimykotike
- D) Kortizonikle

18. Emetropia eshte:

- A) Anomali e refraksionit
- B) Anomali e kornese
- C) Shembellimi bie ne retine
- D) Shembellimi bie para retines

19. Ne miopi shembellimi bie:

- A) ne retine
- B) para retines
- C) pas retines
- D) ne pika te ndryshme te retines

20. Astigmatizimi:

- A) Eshte anomali e kornese
- B) Eshte anomali e kristalinit
- C) Shembellimi bie ne retine
- D) Eshte demtim i akomodimit

21. Syzet e lugeta perdoren:

- A) Miopi
- B) Hipermetropi
- C) Astigmatizem
- D) Glaukone

22. Shkolitje retinal mund te kemi ne:

- A) Hipermetropi alta
- B) Astigmatizem
- C) Miopi alta
- D) Asnjera

23. Sfinkter dhe dilatators pupile ndodhen ne:

- A) Iris
- B) Trupin ciliar
- C) Choroidea
- D) Retine

24. Fenomeni tindal vihet re ne:

- A) Uveite te perparme
- B) Uveite te pasme
- C) Konjuktivite
- D) Glaukome

25. Syzet e myseta perdoren:

- A) Miopi
- B) Hipermetropi
- C) Astigmatizem
- D) Glaukome

26. Akomodimi realizohet nga:

- A) Retina
- B) Kristalini
- C) Kornea
- D) Trupi qelqor

27. Fenomeni tindal eshte:

- A) Anomali e perthyerjes se drites
- B) Anomali e kristalinit
- C) Turbullim I dhomes se perparme
- D) Turbullim I vitrozit

28. Hypopion eshte:  
A) Grumbullim pusi ne dhomen e perparme  
B) Turbullim I dhomes se perparme  
C) Turbullim I trupit qelqor  
D) Inflamacion I konjuktives

29. Sinecy anterior eshte ngjitje e:  
A) kornese me kristalinin  
B) irisit me kornene  
C) irisit me kristalinin  
D) kristalinit me vitrozin

30. Cila shenje i perket uveiteve posteriore?  
A) Turbullime te vitrozit  
B) Turbullime ne kamera anterior  
C) Skuqje ciliare  
D) Dhimbje

31. Synecy posterior eshte ngjitje e:  
A) kornese me kristalinin  
B) irisit me kornene  
C) irisit me kristalinin  
D) kristalinit me vitrozin

32. Cili mjekim eshte kryesor ne uveite?  
A) Atropina  
B) Kortizoniket  
C) Antiviralet  
D) Antibiotiket

33. Glaukome eshte:  
A) Tension i ulet i syrit  
B) Semundje e nervit optik  
C) Anomali refraksioni  
D) Shtremberim i syrit

34. Lengu ujqor i syrit eleminohet nga:  
A) Trabekulat  
B) Trupi qelqor  
C) Kristalini  
D) Kornea

35. Tensioni normal i syrit eshte:  
A) 10 -20 mmhg  
B) 11-22 mmhg

- C) 11-21 mmhg
- D) 10-22mmhg

36. Cili medikament nuk perdoret ne uveite?

- A) Antiviralet
- B) Kortizoniket
- C) Antibiotiket
- D) Atropina

37. Strabizmi eshte:

- A) Shtremberim I kapakeve
- B) Shtremberim I syve
- C) Rritje e tensionit te syrit
- D) Turbullim I vitrozit

38. Lengu ujqor nuk eleminohet nga:

- A) Trabekulat
- B) Kanali I shlemit
- C) Hapesirat e fontanes
- D) Kornea

39. Ne glaukome nuk ndodh:

- A) Rritje e tensionit intraocular
- B) Demtim I n. Optic
- C) Ulja e pamjes
- D) Astigmatizmi

40. Tensioni i syrit matet me

- A) Tonometer
- B) Ophthalrnoskop
- C) Gonioskop
- D) Biomikroskop

41. Timololi eshte:

- A) B-bllokues
- B) A2-Agoniste
- C) Prostaglandine
- D) ACE-inhibitor

42. Azopti është:

- A) B-bllokues
- B) A 2 agonist
- C) Prostaglandinë
- D) Inhibitor i anhidrazës karbonike

43. Kendi i CA shihet me :

- A) Tonometer
- B) Biomikroskop
- C) Ophthalmoskop
- D) Gonioskop

44. Travatani eshte:

- A) B-blokues
- B) A2-agoniste
- C) Prostaglandine
- D) ACE- inhibitor

45. Muskujt e jashtem te syrit jane:

- A) 2
- B) 4
- C) 5
- D) 6

46. Cili muskul i jashtem i syrit inervohet nga n. Abducent?

- A) M.rectus extern
- B) M. Rectus intern
- C) M.rectus superior
- D) M.rectus inferior

47. Cila shenje nuk eshte ne krizen glaukوماتoze?

- A) Iris bombe
- B) Sy I forte si gur
- C) Dhome e perparme e thelle
- D) Edeme korneale

48. Cili muskul i jashtem inervohet nga n.troklearis?

- A) M.obliquos inferior
- B) M. Rectus inferior
- C) M.obliquos superior
- D) M.rectus med

49. Termi adenopati i referohet:

- A) Ënjtjes (zmadhimit) të nyjave limfatike
- B) Ënjtjes së zorrëve të mëdha
- C) Ënjtjes së fshikëzës së tëmthit
- D) Ënjtjes së stomakut

50. Vjellja e gjakut është i njohur si:

- A) Hemorroide
- B) Hemostasis
- C) Hematemesis
- D) Melena

51. Inflamacioni i mëlçisë njihet si:

- A) Cirrhozë
- B) Hepatit
- C) Bulimi
- D) Fistul

52. Ndjesia e djegies retrosternale njihet si:

- A) Cardiosis
- B) Pyrosis
- C) Mostretje
- D) Meteorizëm

53. Të vjellat e shtuara njihen si:

- A) Hyperpepsia
- B) Hyperemesis
- C) Hyperamnesia
- D) Hyperfagia

54. Defekimi me feçe në ngjyrë të zezë quhet:

- A) Diarre
- B) Karcinozë
- C) Konstipacion
- D) Melena

55. Inspektimi instrumental i pjesës fundore të zorrës së trashë është i njohur si:

- A) Colostomi
- B) Trakeostomi
- C) Sigmoidoskopi
- D) Tonsilektomi

56. Cila nga të mëposhtmet nuk është patologji e pankreasit?

- A) Pancreatiti akut
- B) Kolecititi akut
- C) Fibroza cistike
- D) Kanceri pankreatik

57. Disfagia është:

- A) Vështirësi në gëlltitje
- B) Vështirësi në tretje
- C) Pamundësi për të përtypur
- D) Vështirësi në defekim

58. Stenoza e lindur e pilorit:

- A) Zakonisht paraqitet që në ditët e para të jetës
- B) Ndodh më shpesh në meshkuj se femra

- C) Paraqitet me të vjella me gjak
- D) Trajtohet me FPP

59. Cirroza është:

- A) Sëmundje kronike degjenerative e mëlçisë
- B) Tumor i gojës
- C) Tumor i stomakut
- D) Prania e gurëve në fshikëzën e tëmthit

60. Një pacient diagnostikuar me hbs Ag (+), propabikish ka:

- A) Një Hepatit B
- B) Koledokolitiazë
- C) Cirrozë biliare primare
- D) Kolangit sklerotizant primar

61. Cili ekzaminim gjaku do të ishte më i dobishëm për të konfirmuar diagnozën e Cirrozës biliare primare?

- A) Antitrupa Antigliadinë
- B) Antitrupa Antimitokondrial (AMA)
- C) Antitrupa Antinuclear
- D) Niveli i amilazes në gjak

62. Për cilin nga viruset e hepatitit ekziston vakcina?

- A) Për virusin A
- B) Për virusin B
- C) Për virusin C
- D) Për virusin D

63. Faktori më i rëndësishëm për progresionin e nefropatisë është:

- A) Proteinuria
- B) Leukocituria
- C) Hematuria
- D) Asnjëra

64. Ndër shkaqet e Insuficencës Renale Kronike mund të jetë:

- A) Diabeti Mellitus
- B) Hipertensioni Sistemik
- C) Pielonefriti kronik
- D) Të gjitha

65. Në Insuficencën Renale Kronike të avancuar mund të vihen re këto leziona kutane:

- A) Pruritis
- B) Kalçifikime kutane dhe subkutane
- C) Dermatopati të fistulës arteriovenoze
- D) Të gjitha



66. Faktorë predispozues për Insuficencën Renale Akute mund të jetë:

- A) Moshë e avancuar
- B) Përdorimi i anti-inflamatorëve-josteroidal
- C) Përdorimi i anti-hipertensivëve ACE inhibitorë.
- D) Të gjitha

67. Indikacion absolut për fillimin e dializës është:

- A) Edema pulmonare
- B) Hiperkaliemia
- C) Perikarditi uremik
- D) Të gjitha

68. Hemisferat cerebrale janë:

- A) Identike me njëra-tjetrën;
- B) Thuajse identike me njëra-tjetrën
- C) Plotësisht të ndryshme nga njëra-tjetra
- D) Të pakrahasueshme

69. Hemisferat dallojnë nga njëra-tjetra nga:

- A) Përmasat e lobit frontal;
- B) Përmasat e lobit temporal;
- C) Lokalizimi i zonës së të folurës;
- D) Përmasat e lobit oksipital

70. Ndarja e hemisferave për arsye didaktike bëhet në:

- A) 2 lobe;
- B) 3 lobe;
- C) 4 lobe;
- D) 5 lobe.

71. Korteksi cerebral përbëhet kryesisht nga:

- A) trupa qelizash nervore;
- B) zgjatimet e qelizave nervore;
- C) qeliza mbështetëse (jo neurone);
- D) trupa qelizore dhe zgjatime të qelizave nervore në sasi thuajse të barabarta.

72. Afazia është crregullim i:

- A) vëmendjes
- B) të folurit
- C) nuhatjes
- D) shikimit

73. Çrregullime të kujtesës janë:

- A) Afazi
- B) Agrafi
- C) Amnezi

D) Disfagi

74. Anosmia është shenjë e dëmtimit të nervave:

- A) olfaktorë
- B) facial
- C) glosofaringealë
- D) trigeminalë

75. Hemianopsia është:

- A) Deficit motor
- B) Çrregullim sensitiv
- C) Deficit i fushës vizive
- D) Çrregullim i ekuilibrit

76. Ptoza palpebrale haset në dëmtimet e nervit:

- A) olfaktor
- B) okulomotor
- C) trigeminal
- D) hypogloss

77. Shenja e "Bell", haset në:

- A) Neuraljinë trigeminale
- B) Paralizën faciale centrale
- C) Paralizën faciale periferike;
- D) Neuralgjinë glosso-faringeale.

78. Në dëmtimet e nervit glosso-faringeal kemi humbjen e shijes në:

- A) 1/3 e përparme të gjuhës;
- B) 1/3 e mesme të gjuhës;
- C) 1/3 e pasme të gjuhës;
- D) Gjithë gjuhën.

79. Nervi hypogloss është:

- A) sensitiv;
- B) motor;
- C) miks (sensitivo-motor);
- D) me funksion parasimpatik.

80. Në sindromat miastenike dëmtimi primar është në:

- A) Nervat periferikë;
- B) Fibrat muskulare;
- C) Pllakën neuro-muskulare;
- D) Sistemin nervor qendror.

81. Në miopatië, dëmtimi primar është në:

- A) mekanizmin e kontraksionit muscular;

- B) junksionin muskul-nerv;
- C) nervat periferike;
- D) harqet reflektore.

82. Furnizimi arterial i trurit sigurohet nga 2 arteriet:

- A) cerebri anterior;
- B) cerebri media;
- C) comunicante anterior dhe 2 arteriet comunicante posteriore;
- D) karotis dhe 2 arteriet vertebrale.

83. Patologjite cerebrovaskulare karakterizohen nga deficite:

- A) subakute neurologjike, nga çrregullim metabolic;
- B) akute neurologjike, nga çrregullim I sistemit cerebro-vaskular;
- C) neurologjik me baze gjenetike;
- D) neurologjik nga intoksikacionet.

84. Skleroza multiple është patologji:

- A) Dismielinizante hereditare;
- B) Dismielinizante e fituar;
- C) Demielinizante;
- D) Metabolike.

85. M. Alzheimer është sëmundje:

- A) Demielinizante;
- B) Degjenerative progressive;
- C) Traumatike;
- D) Metabolike.

86. Në morbus Alzheimer ndodh humbje progressive neuronale në korteksin e lobeve:

- A) parietale e temporal;
- B) oksipitale e frontale;
- C) frontale e parietale;
- D) oksipitale e parietale.

87. Skleroza laterale amiotrofike (SLA) , karakterizohet nga humbje:

- A) progresive neuronale në korteksin frontal;
- B) neuronale në traktin pyramidal;
- C) neuronale në fashikujt posterior;
- D) neuronale në cornu anterior yë medulles spinale.

88. Atrofitë spinocerebellare janë patologji:

- A) demielinizante;
- B) metabolike;
- C) hereditare;
- D) vaskulare.

89. Patologjitë metabolike të trashëguara të sistemit nervor shkaktohen nga defekte te:

- A) genit që kodon për një enzimë apo protein të rëndësishme;
- B) kontraksionit muskular;
- C) funksionit të harkut reflektor;
- D) funksionit të pllakës neuro-muskulare.

90. Morbus Willson është pasojë e anomalisë së një proteine transportuese të:

- A) hekurit në organizëm;
- B) klorit në organizëm;
- C) azotit në organizëm;
- D) bakrit në organizëm.

91. MMSE, është test i cili përdoret për të vlerësuar:

- A) forcën muskulare;
- B) funksionet e larta konjitive;
- C) sensibilitetin;
- D) ekuilibrin.

92. Dëmtimet e motoneuroneve inferior shkaktojnë:

- A) Reflekse të pandryshuara;
- B) Hipërrefleksi;
- C) Hyporefleksi;
- D) Arefleksi.

93. Dëmtimet e motoneuroneve supëriore shkaktojnë:

- A) Reflekse të pandryshuara;
- B) Hipërrefleksi;
- C) Hyporefleksi;
- D) Arefleksi.

94. Zona motore primare ndodhet në korteksin:

- A) motor;
- B) parietal;
- C) oksipital;
- D) temporal

95. Dhimbje neuropatike është dhimbje që shkaktohet nga leziona:

- A) të korteksit cerebral;
- B) të radikseve nervore;
- C) muskulare;
- D) të fibrave nervore.

96. Për të ekzaminuar sensibilitetin termik përdoren:

- A) Një epruvetë qelqi me ujë të ngrohtë;
- B) Një epruvetë qelqi me ujë të ftohtë;
- C) Dy epruveta qelqi, njëra me ujë të ngrohtë dhe tjetra me ujë të ftohtë;

D) Një age sterile.

97. Zona sensore primare ndodhet në korteksin:

- A) frontal;
- B) parietal;
- C) oksipital;
- D) temporal.

98. Në sindromën hipotalamike (dëmtime të hipotalamusit), kemi:

- A) Hypoestezi dhe disestezi;
- B) Hipërestezi;
- C) Hypoestezi;
- D) Anestezi.

99. Halucinacionet olfaktore kanë të bëjnë me:

- A) Mungesën e nuhatjes;
- B) Ekzagjerimin e nuhatjes;
- C) Mungesën e shijes;
- D) Përceptimin e aromave inekzistente.

100. Ataksia statike është paaftësia për të:

- A) ruajtur ekuilibrin në pozicionin në këmbë;
- B) ruajtur ekuilibrin në ecje me sytë hapur;
- C) ruajtur ekuilibrin në ecje me sytë mbyllur;
- D) kryer provën index-nasi.

101. Dismetria është paaftësia për:

- A) ruajtjen e ekuilibrit në ecje;
- B) arritjen në mënyrë korrekte një shenjë;
- C) kapjen e një objekti;
- D) ecjen me sytë mbyllur.

102. Agnozia është çrregullim i:

- A) kuptimit të të folurës;
- B) orientimit në kohë dhe hapësirë;
- C) njohjes së objekteve në prani të sistemeve sensoriale intakte;
- D) sensibilitetit taktil.

103. Elektroneurografia përcakton:

- A) Aktivitetin elektrik kortikal;
- B) Vijueshmërinë funksionale të harqeve reflektore;
- C) Funksionin e fibrave muskulare;
- D) Shpejtësinë e konduksionit nervor motor apo sensitiv;

104. Epilepsia reflektore përbëhet nga atake epileptike që:

- A) Shpërthejnë pas një stimuli të caktuar;

- B) Janë të palidhura me stimuj të ndryshëm;
- C) Hasen më tepër në të rriturit;
- D) Janë me bazë gjenetike.

105. EEG bën regjistrimin e :

- A) Funksionit të harqeve reflektore;
- B) Aktivitetit elektrik kortikal;
- C) Funksionit të fibrave muskulare;
- D) Funksionit të fibrave nervore.

106. Aura e migrenës është:

- A) Faza e dhimbjes maksimale të kokës;
- B) Përiudha pas qetësimit të kësaj dhimbjeje;
- C) Simptomatologjia specifike që shfaqet para dhimbjes;
- D) Nuk ka lidhje me dhimbjen e kokës.

107. Progesteroni prodhohet nga:

- A) Trupi i verdhe
- B) Uterusi
- C) Hypofiza
- D) Ovaret

108. Parandalimi paresor ul:

- A) Prevalencen e një semundjeje
- B) Incidencen e një semundjeje
- C) Prevalencen e një handikapi
- D) Incidencen e një handikapi

109. Për te evituar një shtatzani abstinohet nga dita:

- A) 8 deri ne ditën e 14
- B) 6 deri ne ditën e 14
- C) 8 deri ne ditën e 18
- D) 6 deri ne ditën e 12

110. Pilula kontraceptive e urgjences merret ne:

- A) Mes te ciklit
- B) Fillim te ciklit
- C) Fund te ciklit
- D) Nuk ka rendesi ne çfarë momenti te ciklit

111. Hormoni luteinizues prodhohet:

- A) Ne hypofize
- B) Ne ovare
- C) Ne testikuj
- D) Ne uterus

112. Testosteroni është:

- A) Qeliza seksuale mashkullore
- B) Hormoni seksual femeror
- C) Hormoni seksual mashkullor
- D) Qeliza seksuale femerore

113. Hormoni folikulo stimulus prodhohet nga:

- A) Hypofiza dhe hypotalamusi
- B) Ovaret
- C) Uterusi
- D) Testikujt

114. Depoproverat bejne pjese ne metodat:

- A) Orale
- B) Kirurgjikale
- C) Subdermale
- D) Injektuale

115. E vetmja metode kontraceptive qe mbron nga HIV/AIDS është:

- A) Metoda kirurgjikale
- B) Spërmicidet
- C) Kondomi
- D) Metodat hormonale

116. Cilat metoda kontraceptive mund te mbrojne nga IST?

- A) Metoda e diteve kalendarike
- B) Metodat barriere
- C) Injektivat
- D) Metodat orale

117. Vetinspektimi e vetekzaminimi behet ne:

- A) Kancerin e qafës se mitres
- B) Menopauze
- C) Ne rastin e një IST je
- D) Kancerin e gjirit

118. PAP testi behet për te diagnostikuar:

- A) Kancerin e qafës se mitres
- B) Kancerin e gjirit
- C) HIV/AIDS
- D) Kancerin e ovarit

119. Norplanti dhe implanon bejne pjese te metodat:

- A) injektivat
- B) orale
- C) barriere

D) subdermale

120. Kur kemi largim të kondileve femorale kontrolaterale nga njëri-tjetri dhe afrim të maleolave kontrolaterale me njëra-tjetrën, kemi të bëjmë me:

- A) Genus rekurvatum
- B) Genus varum
- C) Genus valgum
- D) Genus pronatum

121. Në shenjat klinike të osteogenezës imperfekte vërejmë:

- A) Deformim të shtyllës kurrizore
- B) Ekzoftalmi
- C) Sklera blu
- D) Ptozë palpebrale

122. Osteoporoza ka si karakteristikë:

- A) Mineralizim të pamjaftueshëm të kockës
- B) Pakësim i masës kockore
- C) Të dyja sa më sipër
- D) Asnjë prej tyre

123. Në pes ekuinovarus kemi:

- A) Shkurtim të strukturave laterale
- B) Shkurtim të strukturave mediale
- C) Shkurtim të strukturave dorsale
- D) Nuk kemi shkurtim të asnjë strukture

124. Në hallux valgus patologjia qëndron në:

- A) Artikulacionin metacarpo-falangeal
- B) Artikulacionin interfalangeal
- C) Artikulacionin talo-krural
- D) Artikulacionin metatarso-falangeal

125. Kur kemi rrotullim të vertebrave në aksin e tyre dhe transmetim të këtij rrotullimi tek brinjët duke formuar gibus kifo-skoliotik kemi të bëjmë me:

- A) Skoliozë strukturale
- B) Skoliozë funksionale
- C) Kifoze
- D) Spondilolistezë

126. Në luksacionin congenital koksofemoral kur fëmija fillon të ecë duke çaluar, kjo ndodh si pasojë:

- A) E shkurtesës së njërit femur
- B) E shkurtesës së të dy femureve
- C) E insuficencës së muskujve gluteale
- D) Asnjë prej sa më sipër



127. Mielomeningocela shfaqet në kë nga këto diagnoza:

- A) Sakralizim të vertebrës së fundit lumbare
- B) Luksacion congenital kokso-femoral
- C) Skoliozë funksionale
- D) Spina bifida

128. Në pes planus patologjia qëndron në:

- A) Pozicionimin e metatarseve
- B) Harkun longitudinal dhe atë transversal
- C) Pozicionimin e kockës kuboide
- D) Tendinin e akilit

129. Trajtimi i luksacionit kokso-femoral kongenital në moshën 3 muaj konsiston:

- A) Në vendosjen e jastëkut abduktor (Pavlik)
- B) Në imobilizimin me gips
- C) Në rikonstrukcion të acetabulit kirurgjikalisht
- D) Në reponim të hapur kirurgjikal

130. Mjekimi i pes equinovarus tek të porsalindurit konsiston në:

- A) Ndërhyrje kirurgjikale
- B) Artrodezë
- C) E lëmë të autokorrigjohet deri në moshën 8 vjeç
- D) Redresime me gips

131. Në coxa vara këndi cerviko-diafizar është:

- A) Më i ngushtë (vogël) se norma
- B) Më i gjerë (madh) se norma
- C) 180 gradë
- D) Këndi cerviko-diafizar nuk ndikohet nga coxa vara

132. Fraktura e diafizës tibiale trajtohet:

- A) Duke imobilizuar gjithë anësinë superiore
- B) Duke imobilizuar vetëm bërrylin
- C) Duke imobilizuar artikulacionin Gleno-humeral
- D) Asnjë prej tyre

133. Në frakturat e thjeshta të klavikulës pa komplikacione duhet kryer:

- A) Reponim dhe imobilizim në gips
- B) Reponim kirurgjikal dhe fiksion me vida
- C) Reponim e fiksion me bandazh në formë tete
- D) Reponim dhe fillim i lëvizjeve të lehta

134. Në frakturën e diafizës humerale mund të kemi dëmtim të:

- A) arteries radiale
- B) arteries ulnare

- C) nervit radial
- D) nervit ulnar

135. Luksacioni gleno-humeral reponohet sipas:

- A) metodës së Hipokratit
- B) metodës Kocher
- C) metodës së Hipokratit metodës Kocher
- D) kirurgjikalisht

136. Nëse kemi frakturë ekstensore suprakondilare të humerusit, pas reponimit imobilizimi duhet të kryhet në:

- A) Fleksion
- B) Abduksion
- C) Ekstension
- D) Pronacion

137. Fraktura e kondileve femorale ndodh:

- A) Në pjesën distal të femurit
- B) Në pjesën diafizare të femurit
- C) Në pjesën proksimale të femurit
- D) Në pjesën proksimale të humerit

138. Luksacioni gleno-humeral mund të jetë të gjitha më poshtë përveç:

- A) Subklavikular
- B) Erehta
- C) Subakromial
- D) Submandibular

139. Frakturë oblike është fraktura që e ndan kockën:

- A) Në 2 pjesë nëpërmjet një linje horizontale
- B) Në 2 pjesë nëpërmjet një linje të pjerrët
- C) Në 2 pjesë nëpërmjet një linje ovale
- D) Në 3 ose më shumë pjesë

140. Fraktura e ulnës dhe luksacioni i radiusit emërtohet:

- A) Locos tipica ose Colles
- B) Galeazzi
- C) Monteggia
- D) Jones

141. Në konsolidimin kockor faza e dytë është:

- A) e kallusit primar
- B) e inflamacionit
- C) pseudoartroza
- D) asnjë prej tyre

142. Një frakturë mund të jetë:

- A) komocionale
- B) kompartmentale
- C) spirale
- D) të gjitha sa më lart

143. Implantet janë metoda kontracesinhormonale

- A) Hormonale
- B) Jo hormonale
- C) Kimikate
- D) Asnjë nga keto

144. Pilulat progestative kunderindikohen në;

- A) Gjashtë mujorin e parë të ushqyerjes me gjë
- B) Gjashtë javët e para të ushqyerjes me gjë
- C) Tre muajt e parë të ushqyerjes me gjë.
- D) Asnjë nga keto

145. DIU vendoset kur femra është:

- A) Shtatzane
- B) Ka një infeksion puerperal
- C) Ka një sëmundje inflamatorë pelvike.
- D) Asnjë nga opsionet

146. Hormoni folikulo stimulus

- A) Provokon ovulacionin
- B) Mban trupin e verdhë
- C) Nxist rritjen dhe zhvillimin e folikulit ovarian
- D) Asnjë nga opsionet

147. Estradioli prodhohet nga:

- A) Hypofiza
- B) Ovaret
- C) Uterusi
- D) Asnjë nga opsionet

148. Kush e përcakton tipin e pilulave të kombinuara:

- A) Doza e etinil estradiolit
- B) Doza e progesteronit
- C) Doza e të dyve
- D) Asnjë nga këto

149. Kontrceptivet oral janë metoda:

- A) Hormonale
- B) Jo hormonale
- C) Kimikate

D) Asnje nga opsionet

150. Menopauza natyrale eshte si rezultat i:

- A) Ndalimit te aktivitetit folikular ovarian
- B) Ablacionit kirurgjikal te ovareve
- C) Frenimit jatrogjen te funksionit te ovareve
- D) Te treja se bashku

151. Nje mesazh duhet te jete:

- A) I gjate
- B) I shkurter
- C) Te mos perseritet
- D) Asnje nga opsionet

152. Cfare eshte ovulacioni:

- A) Pjekja e vezes
- B) Dalja e vezes nga folikuli
- C) Pjekja dhe dalja e vezes nga folikuli
- D) Asnje nga opsionet

## 12. Obstr-Gjin, Anest-Reanim

1. Ne ciklin menstrual, duke nisur nga dita e pare e ciklit, dallohen tre faza. Tregoni cila nga alternativat e meposhtme i paraqet ne renditjen e rregullt:

- A) Luteale,ovulatore, folikulare
- B) Ovulatore, luteale, folikulare
- C) Folikulare, ovulatore, luteale
- D) Folikulare, luteale, ovulatore

2. Sa shtresa dallohen ne strukturen e uterusit?

- A) Tre : mukoze, muskulare e seroze
- B) Dy : seroze dhe muskulare
- C) Dy: mukoza dhe muskulare
- D) Tre: dy mukoze dhe një muskulare

3. Cili nga këto hormone nuk prodhohet nga placenta gjatë barrës?

- A) Gonadotropina korionike humane (hCG)
- B) Hormoni laktogjen placentar
- C) Prolaktina
- D) Progesteroni

4. Cila është frekuenca e rrahjeve të zemres fetale RZF:

- A) 70-80/min
- B) 90-110/min
- C) 120-160/min
- D) > 160/min

5. Cila nga këto mundësi nuk është e pranishme në javën e 12-të të shtatzanisë ?
- A) Amenorea
  - B) Hormoni bhCG në gjak
  - C) Rrahjet e zemres fetale në ekografi
  - D) Lëvizjet fetale të ndjera nga nena
6. Difektet e tubit neural te fetusit mund t'i atribuohen mungesës së:
- A) hekurit
  - B) folateve
  - C) vitamines A
  - D) estrogjeneve
7. Kordoni umbilikal përmban:
- A) Dy vena dhe një arterie
  - B) Dy arterie dhe dy vena
  - C) Dy arterie dhe një venë
  - D) Një arterie dhe një venë
8. Volumi i gjakut në barrë rritet me
- A) 10-20 %
  - B) 30-40 %
  - C) 50-60 %
  - D) 70-80 %
9. Diametri më i madh i kokës fetale është:
- A) Suboksipital
  - B) Oksipito-mental
  - C) Biparietal
  - D) Oksipito-frontal
10. Ekspulsioni i anekseve fetale (placentes dhe membranave) pas lindjes normalisht ndodh brenda:
- A) 2-3 minutave
  - B) 10 minutave
  - C) 15-30 minutave
  - D) 60-90 minutave
11. Puerpërium quhet:
- A) Përiudha menjëherë pas lindjes deri në 4-6 javë pas lindjes
  - B) Përiudha para fillimit të aktivitetit të lindjes
  - C) Përiudha e aktivitetit të lindjes
  - D) Asnjëra nga këto
12. Cila nga substancat e mëposhtme clirohet ose është përgjegjëse për prodhimin e qumështit të gjirit (laktogjenezen) ?

- A) Estrogjeni
- B) Progesteroni
- C) Oksitocina
- D) Prolaktina

13. Cila nga substancat e mëposhtme clirohet ose është përgjegjëse për rrjedhjen (daljen) e qumështit të gjirit ?

- A) Estrogjeni
- B) Progesteroni
- C) Oksitocina
- D) Prolaktina

14. Cila nga substancat e mëposhtme është përgjegjëse për involucionin uterin?

- A) Estrogjeni
- B) Progesteroni
- C) Oksitocina
- D) Prolaktina

15. Cila nga pohimet e mëposhtme është e saktë për kontracepsionin pas lindjes ?

- A) Duhet filluar menjëherë tek gruaja që nuk ushqen bebin me gj
- B) Nuk është i rëndësishëm tek gruaja që ushqen bebin me gj
- C) Nuk është i rëndësishëm deri në shfaqjen e menstruacioneve të para
- D) Nuk është i nevojshëm për një muaj pas Sectio Cezarea

16. Cila nga këto paraqitje i referohet paraqitjes me koke të fetusit?

- A) Podalike
- B) Cefalike
- C) Oblike
- D) Transversus

17. Cila nga indikacionet dietetike të mëposhtme NUK është e duhura për gruan shtatzënë?

- A) Ulja e përdorimit të kripës
- B) Shtesa e hekurit
- C) Shtimi i acidit folik
- D) Shtimi i të paktën 6 kg peshë në barrë

18. Cili nga ekzaminimet e mëposhtme nuk është test i zakonshëm gjatë një barre pa komplikime?

- A) Dozimi në serum i bhCG
- B) Hemoglobina
- C) Pap testi
- D) Grupi i gjakut dhe faktori Rh

19. Cili nga kushtet e mëposhtme NUK lidhet me një shtim të riskut të sëmundshmërisë perinatale ?

- A) Kushtet e dobëta socioekonomike

- B) Mosha e nënës nën 20 vj
- C) Duhanpirja
- D) Ushtrimet fizike

20. Barra me moshe më shumë se 42 jave quhet:

- A) preterm
- B) premature
- C) ne term
- D) serotine

21. Sindroma e postmaturit (serotinit) përfshin gjithë mundesite e meposhtme, përvec:

- A) Rritja e trashesise se indit adipoz subkutan
- B) Lekura e rrudhosur, qe deskuamohet
- C) Gjurmë mekoniumi mbi lekure, membrane e kordon
- D) Thonj te gjatë

22. I porsalinduri nga nena diabetike NUK rrezikohet nga:

- A) Hipoglicemia
- B) Hipërglicemia
- C) Hipocalcemia
- D) Makrosomia

23. Cili është mbartesi natyral i Toksoplazmozës?

- A) Gjaku
- B) Macja
- C) Peshku i kontaminuar
- D) Femijet ne moshe shkollore

24. Prematur përkufizohet një neonat i lindur para javës:

- A) 24 te barrës
- B) 34 te barrës
- C) 36 te barrës
- D) 40 te barrës

25. Ne metodat diagnostikuese joinvazive ne obstetrike NUK ben pjese:

- A) Ekografia
- B) Stress test
- C) Amniocenteza
- D) Profili biofizik

26. Abort habitual quhet prania e njëpasnjëshme e :

- A) Dy aborteve spontane
- B) Tre aborteve spontane
- C) Kater aborteve sponatene
- D) Me shumë se 5 aborte spontane

27. Placenta previa është vendosja e placentes ne:
- A) 1/3 e poshtme te kavitetit uterin
  - B) 1/3 sipërme te kavitetit uterin
  - C) Fundus uteri
  - D) Murin e përpareshem uterin
28. Cili nga organet apo lokalitetet anatomike nuk ben pjese ne organet e jashtme genitale?
- A) Vulva
  - B) Vagina
  - C) Mons pubis
  - D) Përineumi
29. Zgjatja mesatare e ciklit menstrual është:
- A) 22 ditë
  - B) 25 ditë
  - C) 28 ditë
  - D) 35 ditë
30. Ardhja e ciklit menstrual shkaktohet nga:
- A) Çlirimi i prolaktinës
  - B) Çlirimi pulsatil i GnRH (hormoni clirues i gonadotropinave)
  - C) Zgjatja e ndryshueshme e fazës folikulare
  - D) Nga sinteza e progesteronit në corpus luteum
31. Indikatorin me i mire qe pararend ovulacionin është:
- A) Piku i estrogjenit
  - B) Shtimi i sekretimit te FSH
  - C) Fillimi i stimi te sekretimit te LH
  - D) Shtimi preovulator i progesteronit
32. Cila nga karakteristikat e mëposhteme NUK është tipike për fazën folikulare të ciklit ?
- A) Kohezgjatja e ndryshueshme
  - B) Rritja dhe zhvillimi i folikujve ovariane
  - C) Tempëratura bazale mbi 36,5
  - D) Rritja vaskulare e endometrit
33. Cila nga shënjat e më poshtme NUK takohet në rastin e barrës ektopike (GEU) ?
- A) Dhimbje në kuadrantet e poshtme të barkut
  - B) Gjakrrjedhje vaginale ose spotting
  - C) Amenorrea
  - D) Proctoragjia (hemoragji rektale)
34. Trajtimi i GEU (barrës ektopike) mund te behet me:
- A) Laparaskopi
  - B) Laparatomy
  - C) Methotroxate



D) Të gjitha

35. Cilat nga patologjitë e mëposhtme NUK është pasojë e sëmundjes inflamatore pelvike ?

- A) Endometrioza
- B) Barra ektopike
- C) Aderencat pelvike
- D) Dispareunia

36. Cila nga situatat e mëposhtme NUK shoqërohet me risk të shtuar për SIP?

- A) Fillimi i kontakteve seksuale 15 vj
- B) Nderprerje të vullnetshme të barrës
- C) Marrja e kontrceptiveve orale
- D) Përdorimi i DIU

37. Diagnoza e endometriozeës vendoset në baze të:

- A) Anamnezës
- B) Ekzaminimit objektiv
- C) Dozimi i CA 125
- D) Shikimi direkt i lezionit endometriozeik dhe biopsia

38. Terapia më e përshtatshme për një grua 35 vjece që i është nënshtuar interventit kirurgjikal radikal (hysterectomy totale cum adnesis) është:

- A) Danazoli
- B) Kontrceptivet orale
- C) Antiinflamatorët jo steroidienë
- D) Terapia estrogenike zëvendësuese

39. Cila nga pohimet e mëposhtmet NUK shërben si teori për endometriozeën?

- A) Metaplazia e epitelit celomik
- B) Hipërplazia endometriale
- C) Menstruacioni retrograd
- D) Deficiti imunologjik

40. Cila nga terapitë e mëposhtme NUK është e indicuar për trajtimin e endometriozeës?

- A) Agonistët e hormonit lirues të gonadotropinave (GnRH)
- B) Progesteroni
- C) Kontrceptivet orale
- D) Danazoli

41. Parimet e trajtimit të gonorresë, ME PËRJASHTIM TE:

- A) Doza unike
- B) Trajtimi i partnerit
- C) Trajtimi spitalor
- D) Mjekimi i sëmundjeve bashkëshoqëruese

42. Me cilat nga patologjitë e mëposhtme janë të lidhura me shpesh metroragjitë disfunktionale?

- A) Polipet endometriale
- B) Anovulacioni
- C) Çregullimet e koagulimit
- D) Endometrioza

43. Me çfarë termi (emri) përcaktohen menstruacionet me humbje gjaku 100 ml dhe me ritëm cdo 35 ditë?

- A) Menometroragjia
- B) Menoragjia
- C) Polimenorea
- D) Oligomenorea

44. Me çfarë termi (emri) përcaktohen menstruacionet me humbje gjaku 40 ml dhe ritëm cdo 35 dite?

- A) Menometroragjia
- B) Menoragjia
- C) Polimenorea
- D) Oligomenorea

45. Cila nga këto IST kalon nëpër tre stade të njëpasnjëshme nëse lihet pa u mjekuar ?

- A) HPV
- B) Sifilizi
- C) Chlamidia tracomatis
- D) Gardnerella vaginalis

46. Miomat submukoze mund të shoqerohen me këto shenja dhe simptoma, përvec:

- A) Anemi
- B) Infertilitet
- C) Menometroragji
- D) Qarkullim gjaku parazitar nga organet e tjera

47. Miomat janë të lidhura me kushtet e mëposhtme klinike përvec se me:

- A) Aneminë
- B) Amenorenë
- C) Dismenorea
- D) Pielonefritin

48. Cila nga ankeset e mëposhtme nuk lidhet me kliniken e fibromiomave uterine?

- A) Te vjellat
- B) Dhimbja
- C) Problemet riprodhuese
- D) Menometroragjia

49. Fibromiomat uterine gjatë barrës:

- A) I zvogelojnë përmasat
- B) I rrisin përmasat

- C) Pësojnë transformim malinj
- D) Nuk pësojnë ndryshime

50. Cila nga metodat diagnostike të mëposhtme është e duhura për vlerësimin e kalueshmerisë tubare?

- A) Testi post-koital
- B) Histerosaplingografia
- C) Laparaskopia
- D) Spermograma

51. Cila nga metodat diagnostike të mëposhtme është e duhura për vlerësimin e malformacioneve të kavitetit uterin ?

- A) Testi post-koital
- B) Histerosaplingografia
- C) Laparaskopia
- D) Biopsia e endometrit

52. Cila nga situatat e mëposhtme NUK është treguese e ndodhjes së ovulacionit?

- A) Shtimi i temperaturës normale
- B) Barra
- C) Endometri i tipit sekretiv
- D) Menstruacioni

53. Cila nga situatat e mëposhtme NUK flet për sterilitet femeror?

- A) Mungesa e kalueshmerisë tubare
- B) Anovulacioni
- C) Kriptokirdia
- D) Insuficienca e progesteronit në fazën e dytë të ciklit

54. Cila nga ekzaminimet e mëposhtme NUK përdoret për identifikimin e infertilitetit mashkullor?

- A) Spermograma
- B) Testi post-koital
- C) Biopsia endometriale
- D) Antikorp të anti-spermatozoidike

55. Për fillimin dhe mbajtjen e ciklit menstrual NUK është e nevojshme:

- A) Hormoni lirues i gonatropinave (GnRH)
- B) Një endometër i ndjeshëm ndaj hormonit steroide seksual
- C) Kalueshmëria tubare
- D) Hormonet steroide seksual me origjinë ovariale

56. Cili nga ekzaminimet hormonale është kryesor për përcaktimin e ndodhjes së menopauzës?

- A) FSH
- B) LH
- C) Prolaktina

D) Androgjenet

57. Afshet e nxehta në menopausë krijohen nga:

- A) Rritja e FSH
- B) Rritja e LH
- C) Rënia e estrogjeneve
- D) Rënia e progesteronit

58. Trajtimi i keshilluar për osteoporozë në menopauzë i përfshin të gjitha PËRVEC:

- A) Estrogjen
- B) Progesterone
- C) Ushtrime fizike
- D) Kalcium

59. Pasojat afatgjata të menopauzës janë:

- A) Anemia
- B) HTA dhe diabeti
- C) Osteoporozë dhe arterioskleroza
- D) Depresioni

60. Cili nuk përben një faktor risku për kancerin e qafës së mitres?

- A) Raporti i pare seksual në mosha të re
- B) Partnere seksuale të shumta
- C) Duhanpirja
- D) Hipërkolesterolemia

61. Gjatë laktacionit janë të lejuar kontraktivët oralë:

- A) Monofazikë të kombinuar
- B) Dyfazikë të kombinuar
- C) Trefazikë të kombinuar
- D) Vetëm me progesteron

62. Metodave kontraktive afatgjata të rikthyeshme përfshijnë:

- A) DIU
- B) Spërmicidet
- C) Kondomi
- D) Diafragma

63. Dizavantazhet e kontraktivëve progesteronike përfshijnë:

- A) Metrorragji
- B) Amenore
- C) Nauze
- D) Humbje në peshë

64. Diagnoza e menopauzës vendoset pas:

- A) 3 muaj amenore

- B) 6 muaj amenore
- C) 12 muaj amenore
- D) 18 muaj amenore

65. Dispareunia është dhimbja:

- A) gjatë menstruacioneve
- B) gjatë kontakteve seksuale
- C) në mesin e ciklit (ovulatore)
- D) pelvike e papërcaktuar

66. HPV është i lidhur me kancerin e :

- A) Gjirit
- B) Mitrës
- C) Vaginës
- D) Qafës së mitrës

67. IST favorizohen nga:

- A) Menopauza
- B) Abstenenca seksuale
- C) Përdorimi i profilaktikëve
- D) Numri i lartë i partnerëve seksualë

68. Nëntipat e HPV që përfshihen si onkoviruse me risk të lartë janë:

- A) 6 , 11
- B) 16, 18
- C) 21, 23
- D) 52, 53

69. Kush është ekzaminimi baze depistues për kancerin e qafës së mitrës?

- A) Ekografia
- B) Vizita gjinekologjike
- C) Pap-testi
- D) Kultura e sekrecioneve vaginale

70. Kush përbën faktor parandalues për kancerit e gjirit?

- A) Menarka e herëshme
- B) Menopauza e vonëshme
- C) Nullipariteti
- D) Asnjëra

71. Menopauza artificiale nenkupton të gjitha obsionet e meposhtme, përveç:

- A) Ablacioni kirurgjikal I dy ovaeve
- B) Ndalimit natyral të aktivitetit folikular oovarian
- C) Kemioterapia
- D) Radioterapia

72. Infeksioni vaginal i shoqeruar me leukore me ere si te peshkut te prishur shkaktohet nga:

- A) Chlamydia tracomatis
- B) Streptokoku B hemolitik
- C) Trichomonas vaginalis
- D) Gardnerela vaginalis

73. Kur harrohet pilula kontraceutivi, cili është qendrimi i duhur?

- A) Nderpritet paketa e filluar
- B) Merren dy pilula njëherazi
- C) Hidhet tableta e harruar dhe merret pasardhesja
- D) Merret pilula e harruar brenda 12 oreve dhe vazhdohet pilula e radhes

74. Kateterizimi arterial:

- A) Nuk realizon një monitorim agresiv të presionit arterial
- B) Nuk mundëson marrjen e gjakut për analiza
- C) Përdoret shpesh për infuzionin e likideve dhe medikamenteve
- D) Përdoret për infuzionin e likideve dhe medikamenteve jovazoaktivë vetëm në situata urgjente

75. Presioni venoz central:

- A) Është një e dhënë që shpreh volumin e likideve që ndodhen në venat centrale
- B) Ulet kur ulet presioni arterial sistolik
- C) Është mbi 10 cm shtyllë ujë në shokun hipovolemik
- D) Merr vlera të larta kur kemi humbje të masës qarkulluese

76. Monitorimi respirator behet:

- A) për të mbikëqyrur përfuzionin e organeve
- B) për të vlerësuar shkëmbimin e gazeve në pulmone
- C) nëpërmjet matjes së presionit arterial të gjakut
- D) nëpërmjet matjes së frekuencës kardiake

77. Gjendja vegetative:

- A) është mungesë e funksionit cerebral me funksione vitale të ruajtura
- B) quhet ndryshe vdekje cerebrale
- C) është gjendja në të cilën pacienti kryen aktivitet intelektual dhe shqisor
- D) është gjendja në të cilën pacienti ka nevojë për mbështetje reanimatore të funksioneve jetike të tij

78. Shenjat e arrestit kardiocirkulator janë:

- A) Pacienti është koshient
- B) Apnea, ose respiracion me gulçim
- C) Lëkurë e ftohtë, e zbehtë, e djersitur
- D) Mungesë e pulsit periferik

79. Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë:

- A) Ischemia cerebrale për më shumë se 5-7 minuta nuk jep dëmtime në sistemin nervor qendror
- B) Rezervat e ATP në tru konsumohen brenda 15 minutash në rast arresti kardiak

C) Truri mund të ruhet edhe 15 minuta pas arrestit kardiak n.q.s. Fillohet menjëherë reanimimi kardiopulmonar

D) Truri mund të ruhet edhe 15 minuta pas arrestit kardiak pavarësisht fillimit të reanimimit kardio-pulmonar

80. Vdekja cerebrale:

A) është humbje e parikthyeshme e funksionit të korteksit

B) është humbje e rikthyeshme e funksionit të trungut të trurit

C) është humbje e funksionit të korteksit, me funksion të rujtur trungut të trurit

D) është gjendja ku pacienti ka nevojë për mbështetje reanimatore të funksioneve jetike të tij

81. Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë:

A) Në pacientët që janë zgjuar, reflekset mbrojtëse të rrugëve të ajrit nuk parandalojnë aspirimin pulmonar të përmbajtjes gastrike

B) Pacientët me një status mental të alteruar mund t'i humbasin reflekset mbrojtëse gjë që i ekspozon ata me riskun e rritur për pneumoni aspirative

C) Intubimi trakeal me një tub me manshetë nuk e ul riskun për aspirim

D) Intubimi trakeal me një tub me manshetë mund ta parandalojë plotësisht aspirimin e përmbajtjes gastrike

82. Shkaqet më të zakonshme që shkaktojnë arrestin kardiopulmonar janë:

A) Hipovolemia nga humbjet e shpejta të gjakut

B) Hipokapnia

C) Alkalozia metabolike

D) Hipertermia

83. Vlerësimi i komës sipas shkallës GLASGOW:

A) Nuk jep të dhëna për thellësinë e komës

B) Nuk ndikohet nga përgjigja motore e pacientit

C) Kryhet vetëm duke i folur pacientit

D) Bën vlerësimin e përgjigjeve motore, verbale dhe lëvizjes së syve

84. Ventilimi mekanik:

A) Nuk zëvendëson ventilimin e kryer nga sistemi respirator i pacientit

B) Ul gjithnjë debitin kardiak

C) Ul rrezikun e aspirimit

D) Rrezikon për barotraumë ose volutraumë pulmonare

85. Në pacientët që marrin opioide për një kohë të gjatë për trajtimin e dhimbjes:

A) Zhvillohet apasionimi ose varësia psikologjike

B) Zhvillohet toleranca

C) Kanë diarre për një kohë të gjatë

D) Me rritjen e dozës shfaqet deprimimi i respiracionit

86. Në pacientët me ventilim mekanik:

A) Preferohet ushqyerja enterale kundrejt asaj parenterale

- B) Nuk bëhet ushqyerje për sa kohë që pacienti është në ventilim mekanik
- C) Shkurtohet koha e qëndrimit në ventilator mekanik tek pacientët me kequshqyerje
- D) Duhet dhënë një sasi sa më e madhe ushqimesh nga sonda nazo-gastrike për të përmirësuar gjendjen nutricionale të pacientit

87. Insuficiencia respiratore:

- A) Nuk zhvillohet gjatë detresit respirator të adultit
- B) Ndikohet nga raporti ventilim/perfuzion
- C) Mund të shoqërohet me hiperoksemi
- D) Trajtohet gjithnjë me ventilim mekanik pavarësisht shkakut të saj

88. Cili nga pohimet është i vërtetë?

- A) Të gjitha dhimbjet kanë një shkak fiziologjik të identifikueshëm
- B) Nëse raportohet lehtësim i dhimbjes pas një placeboje, kjo do të thotë se dhimbja nuk është reale
- C) Toleranca ndaj dhimbjes është individuale
- D) Meshkujt ndiejnë më pak dhimbje se femrat

89. Në respiracionin paradoksal, në inspirim :

- A) Ndërkohë që toraksi ngrihet abdomeni ulet
- B) Ngrihet si toraksi dhe abdomeni
- C) Ulet toraksi dhe ngrihet abdomeni
- D) Ulet toraksi dhe ulet dhe abdomeni

90. Shenja të perfuzionit jo të përshtatshëm të organeve vitale janë:

- A) Presioni sistolik i gjakut mbi 80 mmHg
- B) Presioni arterial mesatar nën 50 mmHg
- C) Prezenca e presionit venoz central të lartë
- D) Lëkura e ngrohtë, rimbushja kapilare e mirë

91. Në një pacient të terapisë intensive me çrregullim akut të statusit mental:

- A) Monitorohet pulsoksimetria dhe gazanaliza e gjakut
- B) Jepet gjithmonë sedativë
- C) Jepet glukozë i/v vetëm në diabetikët
- D) Vendoset oksigjen suplementar pavarësisht O2Sat normal

92. Në dhimbjen kronike pacienti:

- A) Paraqitet me shenjat e fluksit të shtuar simpatik
- B) Nuk ka ndryshime në shenjat vitale
- C) Uj dozën e analgjezikeve për qetësimin e dhimbjes
- D) Rrit tolerancën ndaj dhimbjes sepse sa më gjatë të ketë patur dhimbje aq më i pandjeshëm bëhet ndaj saj

93. Cilën nga gjendjet e mëposhtme shkakton humbja e bikarbonateve nga organizmi?

- A) Acidozë metabolike
- B) Alkalozë metabolike



- C) Alkalozë respiratore
- D) Acidozë respiratore

94. Shoku hipovolemik:

- A) Shkaktohet nga shtimi i masës qarkulluese të gjakut
- B) Shkaktohet nga insuficienca primare e zemrës
- C) Shfaqet me hipertension
- D) Ka si karakteristike një PH arterial nën 7,35

95. Monitorimi hemodinamik behet:

- A) për të mbikëqyrur përfuzionin e organeve
- B) për të vlerësuar shkëmbimin e gazeve në pulmone
- C) nëpërmjet matjes së presionit të dioksidit të karbonit në rrugët e ajrit
- D) nëpërmjet matjes së PH dhe gazeve të gjakut arterial

96. Pulsoksimetria bën të mundur monitorimin në vazhdimësi:

- A) Te përqëndrimin të oksihemoglobinës së saturuar të një subjekti
- B) Të niveleve të presionit pjesor të oksigjenit në gjak
- C) Të niveleve të presionit pjesor të dioksidit të karbonit në gjak
- D) Presionit të dioksidit të karbonit në rrugët ajrore

97. Masazhi i jashtëm kardiak:

- A) Kur zhvillohet në mënyrë efikase mban një presion arterial sistolik nën 80 mmhg
- B) Praktikohet kur pulsi në arteriet e mëdha është mbi 30 rrahje në minutë
- C) Qëllimi i tij është të rikthejë respiracionin dhe aktivitetin kardiak
- D) Shoqëron dhënien e adrenalines, defibrilimin dhe respiracionin artificial në menaxhimin e arrestit kardiak

98. Shoku anafilaktik:

- A) Shkaktohet si pasojë e reduktimit të masës qarkulluese të gjakut
- B) Shkaktohet nga insuficienca primare e zemrës
- C) Është pasojë e një vatre infeksioni dhe e bakteremisë
- D) Është pasojë e futjes në organizëm të substancave alergene

99. Acidoza metabolike karakterizohet nga:

- A) PH i gjakut nën 7.35
- B) Bikarbonatet në gjak mbi 23.4 mEq/l
- C) Presioni arterial i dioksidit të karbonit mbi 35 mmHg
- D) Mjekohet me oksigjenoterapi

100. Pacienti duhet intubuar nqs:

- A) Presioni i dioksidit të karbonit në gjak ulet progresivisht
- B) Kur pacienti bëhet jokoshient nga narkoza me dioksid karboni
- C) Kur ngrihet pH i gjakut nga alkalozja e thellë respiratore
- D) Presioni i oksigjenit arterial rritet progresivisht pavarësisht përdorimit të maskës faciale

101. Cilat duhet të kryhen të parat në një pacient të terapisë intensive?

- A) Manovrat diagnostike
- B) Manovrat terapeutike
- C) Anamneza dhe ekzaminimit fizik
- D) Vlerësimi dhe terapia

102. Kush është rruga e përshtatshme për administrimin e medikamenteve gjatë reanimimit kardiopulmonar në një arrest kardial kur nuk mund të vendoset rruga venoze?

- A) Rruga intramuskulare
- B) Rruga endotrakeale
- C) Rruga intraoseale në pacientë adultë
- D) Rruga intrakardiake

103. Efektet anësore më të shpeshta të opioideve janë:

- A) Hiperventilimi
- B) Nauzeja dhe të vjellat
- C) Diarrea
- D) Axitimi

104. Sindroma e abstinencës nga opioidet:

- A) Quhet ndryshe varësi psikologjike nga opioidet
- B) Shfaqet kur një pacient ndërpret menjëherë përdorimin e opioidit
- C) Ndodh si pasojë gripit në pacientë që marrin opioide në doza të mëdha
- D) Nuk ndodh kur opioidi ndërpritet menjëherë në një pacient që i ka përdorur për një kohë të gjatë

105. Në rastet kur ka ndodhur vdekja cerebrale:

- A) Pacienti nuk ka nevojë për mbështetje reanimatore të funksioneve jetike të tij
- B) Pacienti është në arrest respirator
- C) Pacienti nuk ka nevojë për ventilim mekanik për oksigjenim të mirë të indeve
- D) funksionojnë ende qendrat përgjegjëse për automatizmin kardiorespirator që ndodhen në bazën e kafkës

106. Plazma e freskët e ngrirë:

- A) Është një likid zëvendësues i mirë për të korrigjuar hipovoleminë
- B) Nuk ka risk për transmetimin e infeksioneve të transmetueshme nëpërmjet transfuzionit
- C) Ka prioritet ndaj përdorimit të likideve zëvendësues kristaloidë në trajtimin e hipovolemisë
- D) Nëse mbahen temperaturat e duhura mund të ruhet për të paktën një vit, ose më shumë

107. Ngritja e shtratit me kënd 45 gradë në pacientët në ventilim mekanik:

- A) Rrit rrishtun për aspirim të përmbajtjes gastrike
- B) Ul rrishtun për pneumoni nozokomiale
- C) Përmirëson hipotensionin
- D) Ndikon në përmirësimin e gjumit.

108. Cilat nga pohimet e mëposhtme janë të vërteta:

- A) Sedacioni dhe paraliza përdoren në çdo pacient që është në ventilim mekanik
- B) Për parandalimin e pneumonisë të lidhur me ventilimin mekanik koka e shtratit duhet të ulet sa më shumë
- C) Për ta shkëputur pacientin nga respiratori duhet që ai të ketë reflekse intakte të rrugëve ajrore
- D) Në pacientët që marrin opioide zhvillohet varësia psikologjike nëse ato ndërpriten menjëherë

109. Acidoza respiratore:

- A) Zhvillohet gjatë diarreve masive
- B) Zhvillohet në insuficiencën renale
- C) Korrigjohet me dhënien e bikarbonateve
- D) Është tregues i nevojës së ventilimit mekanik në insuficiencën respiratore

110. Shoku septik:

- A) Shkaktohet si pasojë e reduktimit të masës qarkulluese të gjakut
- B) Shkaktohet nga insuficienca primare e zemrës
- C) Është pasojë e një vatre infeksioni dhe e bakteremisë
- D) Është pasojë e futjes në organizëm të substancave alergene

111. Reaksionet hemolitike të transfuzionit vijnë si pasojë e:

- A) Transfuzionit jokompatibël sipas grupit
- B) Antitropave kundër leukociteve, ose proteinave plazmatike të dhuruesit
- C) Kalimit të një sasive të konsiderueshme të ajrit në vena
- D) Transfuzionit të shpejtë të gjakut të ftohtë

112. Një pacient mund të vetëinfektohet si pasojë e:

- A) Transportit të agjentëve infektues nga një pacient tek tjetri
- B) Mikroorganizmave të pranishëm në florën e tij
- C) Mosndryshimit të barrierave individuale
- D) Përdorimit të antibiotikëve

113. Transfuzioni i gjakut:

- A) Bëhet me gjak të saponxjerrë nga frigoriferi
- B) Bëhet me gjak të ngrohur më parë në 37 gradë celsius
- C) Duhet të zgjasë më shumë se 4 orë
- D) Bëhet me gjak që ka mbi 6 orë i nxjerrë nga frigoriferi dhe i ngrohur

114. Cila nga thëniet e mëposhtme është e vërtetë :

- A) Anestezia spinale dhe epidurale jep hipërtension arterial
- B) Anestezia spinale dhe epidurale jep takikardi
- C) Anestezia spinale dhe epidurale jep të përziera dhe të vjella
- D) Anestezia epidurale jep më shpesh se anestezia spinale dhimbje koke nga shpimi postdural

115. Nga moseleminimi i plotë i anestezisë gjenerale dhe/ose bllokut neuromuskular ndodh:

- A) Çrregullime të elektrolitëve
- B) Obstruksioni i rrugëve të sipërme ajrore nga rënia e gjuhës
- C) Zgjim i shpejtë

D) Çrregullime të tempëratures

116. PaO<sub>2</sub> (presioni arterial i oksigjenit):

- A) Ndryshon në varësi të presionit pjesor të oksigjenit në ajrin e inspiruar
- B) Nuk ndryshon në sëmundjet pulmonare
- C) Matet nëpërmjet pulsoksimetrit
- D) Nuk ndryshon nga presioni venoz i oksigjenit

117. Cila nga thëniet e mëposhtme është e vërtetë:

- A) Të gjitha medikamentet që përdor pacienti duhet të ndërpriten para kirurgjisë
- B) Duhanin mund ta pijë deri para operacionit
- C) Gjatë operacionit nuk ka rëndësi nëse stomaku është plot, ose jo
- D) Të korrigojë hipovolemia dhe hipokalemia e mundshme para operacionit nëse koha e lejon

118. Hipoventilimi postoperator çon në:

- A) Hipokapni
- B) Acidozë respiratore akute
- C) Hiperoksemi
- D) Në një ventilim të rritur në minutë

119. Komplikacionet e analgjezisë epidurale janë:

- A) Hipertensioni
- B) Retensioni urinar
- C) Takikardia
- D) Sedacioni

120. Efektet e mbisedacionit në një pacient të terapisë intensive janë:

- A) Diskomfort
- B) Dhimbje
- C) Hipertension
- D) Vështirësi në komunikim

121. Shoku hipovolemik:

- A) Shkaktohet nga humbja e më pak se 20-25% të masës qarkulluese të gjakut
- B) E ka klinikën të ngjashme me shokun septik
- C) Presionin venoz central e ka të njëjtë me shokun kardiogjen
- D) Shoqërohet me rritje të kohës së mbushjes kapilare

122. Anestezia spinale jep:

- A) Blllok motor dhe blllok sensor
- B) Blllok sensor pa blllok motor
- C) Analgjezi për një kohë të gjatë
- D) Anestezia të një ekstremiteti

123. Anestezia regjionale endovenoze jep:

- A) Anestezia të një ekstremiteti

- B) Jep gjumë të thellë
- C) Jep relaksim neuromuskular
- D) Hipotension dhe bradikardi

124. Presioni i rritur intrakranial ulet nëpërmjet:

- A) Oksigjenimit të pacientit
- B) Hipoventilimit
- C) Përdorimit të agjentëve osmotikë
- D) Përdorimit të diuretikëve

125. Infeksionet që hasen më shpesh në terapi intensive janë:

- A) infeksionet e lëkurës
- B) infeksionet e traktit gastrointestinal
- C) septicemia
- D) infeksionet e sistemit nervor qendror

126. Transfuzioni i shpejtë i gjakut të ftohtë:

- A) Mund të shkaktojë reaksione anafilaktike
- B) Çon në mbingarkesë cirkulatore
- C) Mund të shkaktojë aritmi, ose arrest kardiak
- D) Rrit mundësinë për formimin e mikroagregatev

127. Gjaku gjatë ruajtjes së tij pëson këto ndryshime:

- A) E ruan viabilitetin dhe funksionin e eritrociteve
- B) Bëhet me acid
- C) Ulet përqëndrimi i kaliumit në plazëm
- D) Faktori i VIII i koagulimit është relativisht i stabilizuar

128. Në organizmin që ka marrë gjak, pas transfuzionit të gjakut:

- A) Mund të ndodhin ndryshime të kalemisë
- B) Mund të rritet niveli i kalciumit të jonizuar
- C) PH i gjakut bëhet acid për shkak se gjaku i konservuar është acidotik
- D) Ngarkesa acidotike tek pacienti është minimale

129. Mjekimi i shokut anafilaktik bëhet me dhënien e:

- A) Antibiotikëve
- B) Adrenalinës
- C) Kardiotonikëve
- D) Analgjezikëve

130. Alergjenët më të shpeshtë që çojnë në shok anafilaktik janë:

- A) Antibiotikët
- B) Rrezatimi që përdoret në imazherinë diagnostikuese
- C) Pickimi nga gjarpri
- D) Helmimet me fosfororganikë

131. Anestezia inhalatore:

- A) Përdoret si anestezi mbajtëse
- B) Nuk përdoret për induksion anestezi
- C) Futet në rrugë venoze
- D) Nuk varet nga funksioni respirator

132. Anestezia endovenoze:

- A) Futet nëpërmjet rrugës venoze
- B) Nuk përdoret si anestezi mbajtëse
- C) Shfrytëzon potencialin shkëmbyes të sistemit respirator
- D) Nuk mund të realizohet pa vendosur më parë tubin endotrakeal

### **13. Anatomi-Fiziologji**

1. Cila nga brinjët e mëposhtme nuk është atipike?

- A) E parë
- B) E dytë
- C) E tretë
- D) E dymbëdhjetë

2. Brinjët e vërteta janë:

- A) Nga 1-7
- B) Nga 1-10
- C) Nga 1-12
- D) Asnjëra prej tyre

3. Angulus sternum formohet nëpërmjet:

- A) Manubrium sternum dhe corpus sterni
- B) Manubrium sternum dhe incisura costale
- C) Manubrium sternum dhe brinjës
- D) Asnjëra prej tyre

4. Mbledhja e muskujve quhet:

- A) Adduksion
- B) Abduksion
- C) Flexion
- D) Extension

5. Pelvisi formohet nga kockat e mëposhtme me përjashtim të:

- A) Oss coxae
- B) Oss sacrum
- C) Oss coccygeum
- D) Vertebra lumbare e pestë

6. Skapula nuk ka Fose:

- A) glenoidale

- B) subskapulare
- C) supraspinata
- D) infraspinata

7. Humerusi nuk ka Fose:

- A) olekrani
- B) kapitis
- C) radiale
- D) koroide

8. Procesi spinos i vertebrave torakale është:

- A) Në formë katrore
- B) Spina bifida
- C) Në formë tjegullave të catisë
- D) Në formë pesëkëndore

9. Nuk i takon kësaj elemente:

- A) Calvaria
- B) Promontorium
- C) Glabella
- D) Clivus

10. Atlasi nuk ka:

- A) procese artikulare
- B) Foramen transversal
- C) Fovea dentis
- D) dy tuberkulume

11. Procesi i skeletit torakal është:

- A) stiloideus
- B) xiphoideus
- C) mamillaris
- D) zygomatikus

12. Tek sacrum nuk gjejmë:

- A) Facies articularis
- B) Linea transversal
- C) Cornua sacralia
- D) Spina sacralis

13. Cili nga muskujt e mëposhtëm nuk fillon me dy koka?

- A) Rectus femoris
- B) Digastrikus
- C) Pronator teres
- D) Gastrocnemius

14. Artikulacioni temporomandibular është i tipit:

- A) Cilindrik
- B) Sferik
- C) Elipsoid
- D) Enarthrozis

15. Muskujt pektoralë i takojnë:

- A) Abdomenit
- B) Pelvisit
- C) Shpinës
- D) Toraksit

16. Muskujt e mimikës:

- A) Lëvizin manibulën
- B) Inervohen nga n. Facial
- C) Kanë inervime të ndryshme nga njëra -tjetra
- D) Kanë dy pika fiksimi në kocka

17. M.deltoideus fiksohet në:

- A) Oss scapula
- B) Oss Clavikula
- C) Oss humerusi
- D) Vertebren e tretë

18. Artikulacioni genu realizohet ndërmjet:

- A) Femurit, tibies, fibules
- B) Femurit, tibies, patelles
- C) Femurit dhe tibies
- D) Femurit fibula dhe patella

19. Në lidhjet e kafkës mbizotërojnë:

- A) Artikulacionet
- B) Suturat
- C) Ligamentet
- D) Sinkondrozat

20. Shtrin parakrahun:

- A) m ekstensor karpi radial longus
- B) m ekstensor karpi radial brevis
- C) m.ekstensor karpi ulnar
- D) m.triceps brakial

21. Artikulacioni coxo-fmoralis është;

- A) Inkogurent
- B) Kongurent
- C) Pjesërisht inkogurent



D) Asnjëri prej tyre

22. Cili nga të mëposhtmit është funksion i membranës qelizore?

- A) inicion transduksionin e sinjalit
- B) transporton jone dhe molekula të tjera
- C) formon kanale selective
- D) të gjitha më sipër janë funksione të membranës qelizore

23. Në cilin prej proceseve, qelizat shpenzojnë rreth 40% të energjisë së tyre ditore?

- A) Ne transportin aktiv
- B) Ne endocitozë
- C) Ne exocytosë
- D) Ne difuzion të lehtësuar

24. Me cilin lloj procesi transportohet glukoza prej proteinës mbartëse nga një zonë me përqendrim më të lartë drejt një zone me përqendrim më të ulët?

- A) Me transportin aktiv
- B) Endocitozën
- C) Difuzionin e lehtësuar
- D) Difuzionin e thjeshtë

25. Pjesa e sistemit nervor që konsiderohet e pavullnetshme është:

- A) SN somatic
- B) SN autonom
- C) SN sensor
- D) SN motor

26. Invaginimet e sarkolemës që formojnë zgjatime në formë gishtërinjsh, që depërtojnë në brendësi të fibrës muskulare quhen:

- A) retikulum sarkoplazmik
- B) retikulum endoplazmatik
- C) tubujt T
- D) filamentet e aktines

27. Segmenti i miofibrilit i quajtur sarkomer, gjendet midis:

- A) dy linjave Z
- B) dy bandave A
- C) dy zonave H
- D) dy aktinave

28. Në një sinaps neuro-muskular, neuroni e çliron neurotransmetuesin në:

- A) pllakën motore
- B) citoplazmën e qelizës muskulare
- C) cisternat terminale
- D) hapësirën sinaptike

29. Një njësi motore përbëhet nga:

- A) të gjitha fibrat muskulare brenda një muskuli të caktuar
- B) nga një neuron motor dhe fibrat muskulare që ai kontrakton
- C) të gjitha neuronet që inervojnë një pjesë të caktuar të trupit
- D) një muskul dhe një nerv

30. Të gjitha më poshtë janë shenja të inflamacionit përveç:

- A) dhimbjes
- B) skuqjes
- C) temperaturës
- D) hipertensionit arterial

31. Një nga molekulat e mëposhtme bën të mundur që muskuli të sigurojë energjinë e nevojshme për kontraksion duke gjeneruar ATP prej ADP. Cila është ajo?

- A) Creatinë fosfati
- B) Fosfokinaza
- C) Acetilkolinesteraza
- D) Katalaza

32. Ku ndryshon fizilogjia e kontraksionit muskular midis muskulit të lëmuar dhe atij të strijuar?

- A) muskuli i lëmuar kontrahet më shpejt se ai i strijuar
- B) muskuli i strijuar përdor dy neurotransmetues, ai i lëmuar vetëm një
- C) muskuli i lëmuar shfaq aktivitet spontan dhe mund të modifikohet nga veprimi i HO
- D) muskuli i lëmuar nuk përmban të njëjtët elementë tkurrës si ai i strijuar

33. Cila nga qelizat e mëposhtme prodhon antikorpe?

- A) limfocitet T
- B) limfocitet B
- C) monocitet
- D) fagocitet

34. Si quhen degëzimet nervore të cilat përcjellin impulsin drejt trupit të neuronit?

- A) Aksone
- B) Dentritë
- C) Trupa Nissl
- D) Neurofibrile

35. Sistemi nervor autonom inervon të gjitha më poshtë përveç:

- A) muskulit kardiak
- B) gjendrave egzokrine
- C) muskulit skeletik
- D) traktit tretës

36. Cila nga qelizat e neuroglisë veshin pleksin korioid dhe ventrikujt e trurit?

- A) astrocitet
- B) oligodentrocitet

- C) mikroglia
- D) qelizat endimale

37. Zgjidhni thënien e pasaktë ndër të mëposhtmet lidhur me përçimin e impulsit nevor:

- A) Përçimi i impulsit nevor bëhet sipas ligjit gjithcka ose asgjë
- B) Një stimulim me intensitet më të lartë shkakton impulse më të fuqishme
- C) Përçimi i impulsit në fibrat e mielinizuara bëhet me kërcim nga një nyje Ranvier në tjetrën
- D) Arritja e potencialit të veprimit rrit përshkueshmërinë e membranës aksonale

38. Neurotransmetuesit të cilët rrisin për meabilitetin e membranës post sinaptike për jonet Na, dhe potencojnë impulsin nevor quhen neurotransmetues:

- A) inhibitorë
- B) eksitues
- C) aktive
- D) neutral

39. Pjesa fillestare e harkut reflektor është:

- A) interneuroni
- B) fjet efektore
- C) receptoët ndijësor
- D) neuroni motor

40. Aktiviteti elektrik i muskulit vlerësohet me:

- A) EEG
- B) EMG
- C) ECG
- D) MRI

41. Cili është rajoni i retinës që përgjigjet për mprehtësinë e pamjes?

- A) Sclera
- B) Lëngu qelqor
- C) Fovea centralis
- D) Disku optic

42. Kontrolli i çlirimit hormonal bëhet nga organizmi me të gjitha rrugët e mëposhtme përveç:

- A) feed-back negative
- B) stimulim nevor
- C) çlirim i HO kontrolluese
- D) auto destruksion i gjendrës endocrine

43. Hormonet e mëposhtme çlirohen nga antehipofiza, përveç:

- A) FSH
- B) TSH
- C) ACTH
- D) HAD

44. Hormoni i prodhuar në kortexin e gjendrës mbiveshkore që vepron në veshkë duke mbajtur Na e duke eliminuar K, dhe që indirekt ndikon në ruajtjen e presionit arterial është:

- A) Aldosteroni
- B) Epinefrina
- C) Kortizoli
- D) Adrenalina

45. Rritja e nivelit të hormoneve të tiroides në gjak jep efektet e mëposhtme, përveç:

- A) rënie në peshë
- B) rritje të metabolizmit bazal
- C) rritje të debitit kardiak
- D) rënie të metabolizmit të karbohidrateve

46. Cila pjesë (element) i eritrocitit mund të riciklohet në palcën e kockave për prodhimin e eritrociteve të reja?

- A) Globina
- B) I gjithë eritrociti
- C) Biliverdina
- D) Hekuri

47. Cili nga përbërësit ushqimor është më i rëndësishëm për prodhimin e eritrociteve?

- A) Ca
- B) Na
- C) proteinat
- D) vitamina B12 dhe acid Folik

48. Zgjidhni alternativën e cila përshkruan në mënyrë të saktë fazat e hemostazës:

- A) kogulim i gjakut, formim i trombit, spazme e enës së gjakut
- B) formim i trombit, koagulim i gjakut, spazmë e enës së gjakut
- C) spazmë e enës së gjakut, formim i tapës trombocitare, formim i koagulit
- D) spazmë e enës së gjakut, koagulim i enës së gjakut, formim i trombit

49. Cila pjesë e zembrës funksionon si pacemaker duke dërguar impulse?

- A) nyja sino-atriale
- B) nyja atrio-ventrikulare
- C) fijet Purkinje
- D) tufa e Hiss

50. Kompleksi QRS në ECG tregon:

- A) depolarizim të atriumeve
- B) depolarizim të ventrikujve para kontraksionit
- C) repolarizim të ventrikujve
- D) zemren në qetësi

51. Çfarë e inicion reflexin e gëlltitjes?

- A) Frika nga gëlltitja

- B) Gjuha që vërtitet në gojë
- C) Receptorët sensorë që ndiejnë ushqimin në farings
- D) Receptorët e shijes

52. Receptorët e dëgjimit vendosen në:

- A) kanalet semicirkulare
- B) koklea
- C) sakula
- D) vestibule

53. Cilat qeliza të stomakut sekretojnë faktorin intrinsek?

- A) Të mukozës
- B) Parietale
- C) Peptike
- D) G

54. Cila nga të mëposhtmet nuk është përbërje e lëngut pankreatik?

- A) Kimotripsina
- B) Amilaza
- C) Bikarbonatet
- D) Acidi klorhidrik

55. Lipoproteina që ul tensionin sipërfaqësor të alveolave dhe i bën ato të mos kolabohen quhet:

- A) Fosfolipid
- B) Lipoproteinë alveolare
- C) Surfactant
- D) Tensinogjen

56. Sasia maksimale e ajrit që një për son mund të expirojë pas frymëmarrjes më të thellë të mundshme është:

- A) kapaciteti pulmonar total
- B) vëllimi expirator rezervë
- C) vëllimi residual
- D) vëllimi rezervë inspirator

57. Imuniteti qelizor sigurohet nga:

- A) A .makrofagët
- B) Bazofilet
- C) Qelizat T
- D) Qelizat B

58. Oksigjeni transportohet në gjak kryesisht si:

- A) O<sub>2</sub> i tretur në plazëm
- B) deoksihemoglobinë
- C) oksihemoglobinë

D) karbaminëhemoglobinë

59. Nyja sinoatriale:

- A) prodhon impulse me frekuence normale
- B) është udheheqesja e ritmit të zemres
- C) vendoset ne pjesen e pasme të atriumit të djathte
- D) asnjë nga të mesipër met

60. Nuk ben pjese ne sistemin konduktor të zemres:

- A) tufa e Hisit
- B) nyja nderatriale
- C) nyja atrio-ventrikulare
- D) pema Purkinje

61. Ne derivacionin e tretë të Elektrokardiogrames shprehet lidhja e:

- A) dora e majtë me kemben e majte
- B) dora e djathtë me kemben e majte
- C) komba e djathtë me doren e djathte
- D) komba e djathtë me doren e majte

62. Nyja atrio-ventrikulare:

- A) prodhon impulse me frekuence normale
- B) është udheheqesja e ritmit të zemres
- C) vendoset ne pjesen e pasme të septumit nderventrikular
- D) asnjë nga të mesipër met

63. Individet me grupin e gjakut AB kane:

- A) vetëm antigenin B
- B) vetëm antigenin A
- C) antigenet A dhe B
- D) asnjerin prej tyre

64. Cili nga përberesit ushqimor është me I rendesishem për prodhimin e eritrociteve?

- A) Ca
- B) Na
- C) proteinat
- D) vitamina B12 dhe ac. folik

65. Volum Tidal quhet:

- A) kapaciteti vital
- B) Volumi inspirator rezerve
- C) ajri respirator
- D) të gjitha të mesipër met

66. Cili nga të meposhtmit është funksion i membranës qelizore:

- A) .inicion transduksionin e sinjalit

- B) transporton jone dhe molekula të tjera
- C) formon kanale selective
- D) të gjitha me sipër janë funksione të membranës qelizore

67. Vala P ne ECG tregon:

- A) .depolarizim të atriumeve
- B) depolarizim të ventrikujve para kontraksionit
- C) repolarizim të ventrikujve
- D) zemra ne qetesi

68. Cila nga të meposhtmet nuk luan rol mbrojtës ne traktin respirator:

- A) hunda
- B) goja
- C) epiteli respirator
- D) leukocitet

69. Me cilin lloj procesi transportohet glukozja prej proteines mbartese nga nje zone me për qendrim me të lartë drejt nje zone me për qendrim me të ulet:

- A) transport aktiv
- B) endocitoze
- C) difuzion i lehtësuar
- D) difuzion i thjeshtë

70. Dhembja T shfaqet:

- A) gjatë depolarizimit të atriumit të majte
- B) gjatë depolarizimit të ventrikulit të djathte
- C) ne fillim të sistoles atriale
- D) gjatë repolarizimit të zemres

71. Ajri rezidual i mushkerive :

- A) matet me spirometer
- B) varion nga 2000-3000 ml
- C) quhet sasia e ajrit qe mbetet ne mushkeri pas nje frymenxjerrje të sforcuar
- D) quhet sasia e ajrit qe del gjatë nje frymenxjerrje normale

72. Toni i dytë i zemres ka vecoritë e meposhtme, për vec njerës:

- A) është ton diastolik
- B) është ton i forte
- C) është ton sistolik
- D) është ton i shkurter

73. Të gjitha me poshtë janë shenja të inflamacionit përveç;

- A) dhimbje
- B) skuqje
- C) ethe
- D) enjtje

74. Hormoni I prodhuar ne kortexin e gjendres mbiveshkore qe vepron ne veshke duke mbajtur Na e duke eliminuar K,dhe qe indirect ndikon ne ruajtjen e për sionit arterial është:

- A) aldosteroni
- B) epinefrina
- C) kortizol
- D) adrenalina

75. Qelizat shpenzojne rreth 40% të energjise se tyre ditore ne cilin prej proceseve;

- A) transport aktiv
- B) endocitoze
- C) exocytose
- D) difuzion të lehtesuar

76. Segmentimi ne traktin tretes është karakteristike për :

- A) muskulaturen rrethore
- B) muskulaturen gjatesore
- C) asnjeren prej tyre
- D) muskulaturen e traktit tretes ne për gjithesi.

77. Ku ndryshon fizilogjia e kontraksionit muskular midis muskulit të lemuar dhe atij të strijuar:

- A) muskuli i lemuar kontraktohet me shpejt se ai i strijuar
- B) muskuli i strijuar përdordy neurotransmetues, ai i lemuar vetëm nje
- C) muskuli I lemuar Mund të shfaqe aktivitetet spontan dhe Mund tëmodifikohet nga veprimi i HO
- D) muskulin kardiak

78. Zgjidhni thenien e pasaktë nder të meposhtmet, lidhur me përcimin e impulsit nevor:

- A) për cimi i impulsit nevor behet sipas ligjit gjithcka ose asgje
- B) nje stimulim me intensitet me të lartë shkakton impulse me të fuqishme
- C) për cimi I impulsit ne fibrat e mielinizuara behet me kercim nga nje nyje Ranvier ne tjetren
- D) arritja e potencialit të veprimit rrit për shkueshmerine e membranesh aksonale

79. Zgjidhni alternativën e cila për shkruan ne menyre të saktë fazat e hemostazes

- A) Active
- B) endocitoze
- C) difuzion i lehtesuar
- D) difuzion I thjështë

80. Hormonet qe rregullojne metabolizmin e Ca<sup>++</sup> ne gjak janë;

- A) insulina+ glukagoni
- B) glukagoni + PTH
- C) PTH+ kalcitonina
- D) estrogen + progesterone

81. Hipofiza e pasme sekreton:

- A) FSH



- B) Oksitocine
- C) HAD
- D) asnjë

82. Pjesa e sistemit nervor qe konsiderohet e pavullneshme është;

- A) SN somatik
- B) SN autonom
- C) SN sensor
- D) SN motor

## 14. Shendet Publik, Etika

1. Shendeti sipas teorisë Bio-Mjekësore është:

- A) Mireqenie Shpirtërore
- B) Mireqenie Fizike
- C) Mungesë e sëmundjes
- D) Mireqenie mendore

2. Shendeti sipas OBSH është:

- A) Gjendja e mireqenies së plotë
- B) Mireqenie fizike dhe shpirtërore
- C) Mireqenie mendore dhe shoqërore
- D) Mireqenie fizike, mendore dhe shoqërore

3. Shëndeti Publik e ka fokusin:

- A) Në popullatë
- B) Në individë
- C) Në institucionet shëndetësore
- D) Në politikën shëndetësore.

4. Shëndeti Publik e ka fokusin:

- A) Në parandalimin e sëmundjeve
- B) Në shërbimet shëndetësore
- C) Të dyja
- D) Asnjëra

5. Shëndeti publik e ka fokusin në:

- A) Diagnostikimin e sëmundjeve
- B) Në trajtimin e sëmundjeve
- C) Në diagnostikimin e hershëm të sëmundjeve
- D) Asnjëra

6. Parimet etike të shëndetit publik të "ri" janë:

- A) Barazia dhe solidariteti
- B) Vlerat morale
- C) Mospjesëmarrja

D) Pjesëmarrja

7. Karakteristika unike e shendetit publik:

- A) Aplikimi i nje disipline
- B) Aplikimi i trajtimit
- C) Aplikimi i parandalimit
- D) Të gjitha

8. Karakteristika unike e shendetit publik:

- A) Aplikimi i njekohshem i shume disiplineve
- B) Aplikimi i diagnostikimit
- C) Për dorimi i burimeve financiare pa eficince
- D) Asnjëra

9. Funkcionet e shendetit publik të "ri" :

- A) Forcimi i infrastruktures
- B) Udheheqja e punës kerkimore-shkencore
- C) Adaptimi i nje për qasje komunitare
- D) Të gjitha

10. Sfidat e shendetit publik të ri:

- A) Obeziteti
- B) Asbestoza
- C) Kanceri i endometrit
- D) Bronkopneumonitë

11. Epidemiologjia studion:

- A) Statistiken
- B) Higjenen
- C) Shpëshhtësine e semundjeve
- D) Metodat

12. Stili dhe menyra e jetesës kanë të bejne me:

- A) duhanpirja
- B) Sjelljet seksuale
- C) Faktoret dietetike
- D) Të gjitha

13. Qellimi i nje kerkimi epidemiologjik është:

- A) Ndricimi i faktoreve etiologjike
- B) Studimet ekspër imentale
- C) Studimet transversale
- D) Ndricimi i faktorëve dietetikë

14. Randomizimi ndodh ne:

- A) Studimet trnsversale

- B) Studimet rast-kontroll
- C) Studimet kohorte
- D) Asnjëra

15. Pandemia i referohet:

- A) Rritjes incidences
- B) Rritjes se rrishtit relativ
- C) Rritjes se prevalences
- D) Asnjëra

16. Kurba epidemike përfaqëson :

- A) Incidencën
- B) Imunitetin e grupit
- C) Shpër ndarjen e periudhave të inkubacionit
- D) Prevalencën

17. Fluoroza është një:

- A) Pandemi
- B) Endemi
- C) Epidemi
- D) Asnjëra

18. Survejanca epidemiologjike është:

- A) Pasive
- B) Sentinele
- C) Aktive
- D) Të gjitha

19. Incidenca është:

- A) Numri i rasteve të reja
- B) Prevalence
- C) Studim rasti
- D) Numri total i rasteve

20. Prevalenca është:

- A) Incidence
- B) Epidemi
- C) Risk relative
- D) Asnjëra

21. Studimet deskriptive janë:

- A) Analitike
- B) Vezhuese
- C) Ekspër imentale
- D) Asnjëra

22. Studimet analitike:

- A) Zbulojne lidhje
- B) Provojnë hipoteza
- C) Rrezojne hipoteza
- D) Të gjitha

23. Per ribozomet nuk eshte e vertete qe:

- A) ne to kryhet sinteza e proteinave
- B) permbajne ARN
- C) perbehen nga subuniteti i madh dhe i vogel
- D) nuk permbajne proteina strukturore

24. Nuk është e vërtetë që bërthama:

- A) ka përmasa të ndryshme në qeliza të ndryshme
- B) ka forma të ndryshme ne qeliza të ndryshme
- C) për mban material gjenetik ne trajten e adn
- D) vendoset gjithmonë në qendër të qelizës

25. ADN:

- A) Gjendet vetëm në bërthamë
- B) Shoqërohen nga proteinat histone
- C) Organizohet në kromozome
- D) Organizohet në kromatinë

26. Formimi i njëkohshëm i eritrocitit, trombocitit dhe granulociteve realizohet në:

- A) Nyjen limfatike
- B) Lien
- C) Palcën e kuqe të kockave
- D) Hepar

27. Për neuronin është e gabuar që:

- A) është njësia morfologjike dhe funksionale e indit nervor
- B) nuk kanë aftësi të shumohen
- C) aksonet e tij për mbajne lende tigoide
- D) dentritet janë më të shkurtër se aksoni

28. Në veshkë sintetizohen substancat e mëposhtme, përveç:

- A) Reninës
- B) Eritropoetinës
- C) Aldosteronit
- D) Angiotensinogjenit

29. Epiteli i kavitetit oral është:

- A) më i keratinizuari i trupit të njeriut
- B) pseudo-shumështresor prizmatik
- C) i mbuluar në sipërfaqe nga indi muskolor

D) shumëshresor i sheshtë

30. Cili është pohim i gabuar për kompleksin Golxhi?

- A) Vendoset përballë bërthamës
- B) Është më i shprehur në qelizat sekretore
- C) Në to kryhet trafiku më i madh i makromolekulave
- D) Ndërmjet tij dhe rep-it ka komunikim direkt

31. Gjeni pohimin e gabuar në lidhje me bërthamën:

- A) Madhësia e saj është e ndryshme në qeliza të ndryshme
- B) Qelizat kanë gjithmonë vetëm një bërthamë
- C) Ajo mund të gjendet në dy gjendje fizike
- D) Kromatina është përbërja kryesore e bërthamës

32. Cila nga qelizat e mëposhtme nuk është autoktone në indin lidhor?

- A) Fibroblastet
- B) Eozinofilet
- C) Qelizat mezenkimale
- D) Mastocitet

33. Për eritrocitet është e gabuar që:

- A) kanë bërthamë
- B) përmbajnë proteinën hemoglobinë
- C) kanë formën e diskut bikonkav
- D) kanë funksion transportin e oksigjenit dhe dioksidit të karbonit

34. Për eozinofilet nuk është e vërtetë që:

- A) bëjnë pjesë në seritë granulocitare
- B) kanë granula specifike me nuancë portokalli
- C) kanë bërthamë të rrumbullakët
- D) rritja e numrit të tyre quhet eozinofili

35. Cili funksion nuk i përket neuroglisë?

- A) Mbështetës
- B) Ushqyes
- C) Përcjellës
- D) Kufizues

36. Cilat qeliza nuk përbëjnë mukozën e kavitetit nazal?

- A) Olfaktore
- B) Parietale
- C) Mbështetëse
- D) Kaliciforme

37. Në lëkurën e hollë mungon shtresa:

- A) bazale

- B) e shndritshme
- C) kokrrizore
- D) e brirëzuar

38. Gjeni pohimin e gabuar mbi uterusin:

- A) Përbëhet nga tre shtresa
- B) Është vendi i implantimit të vezës së fekunduar
- C) Epiteli i tij përbëhet nga dy shtresa
- D) Shtresa muskulore është më e holla

39. Fibrocitet kanë tipar karakteristike:

- A) Praninë e zgjatimeve të shumta citoplazmatike
- B) Organelet citoplazmatike të zhvilluara
- C) Formën boshtore të bërthamës
- D) Bërthamën eukromatinike

40. Eritrocitet kanë tipar karakteristike:

- A) gjatësinë 60-80 milimetër
- B) ngjyrën blu të bërthamës
- C) diametrin 7-8 mikrometër
- D) formën bikonvekse

41. Shendetë Publik e ka fokusin në:

- A) Popullatë
- B) Individe
- C) Institucione shendetesore
- D) Politika shendetesore

42. Palca e kockave nuk ka funksion:

- A) Hematoklazik
- B) Lokomotor
- C) Retikulo-endotelial
- D) Hemopoetik

43. Fijet muskulare të skeletit në prerje tërthore janë:

- A) me formë poligonale
- B) me pamje të vijëzuar
- C) pa bërthamë
- D) me bërthamë në qendër të qelizës

44. Qelizat e mikroglisë në sistemin nervor qendror janë:

- A) me funksion përcjellës
- B) me origjinë nga indi muskolor
- C) me funksion fagocitar
- D) përbërëse të mielinës

45. Mukoza olfaktore në kavitetin nazal mbulon:
- A) gjithë sipërfaqen
  - B) pjesën supër iore
  - C) pjesën më të madhe
  - D) pjesën inferiore
46. Gjendrat sublinguale:
- A) prodhojnë sekrecion të përzier
  - B) prodhojnë sekrecion vetëm seroz
  - C) nuk kanë gjysmehënëza të xhianucit
  - D) kanë qeliza centroacinare
47. Në përbërje të acinusit pankreatik marrin pjesë edhe:
- A) ishujt e Langerhansit
  - B) qelizat Sertoli
  - C) qelizat Centroacinare
  - D) qelizat Beta
48. Në glomerula:
- A) Përqëndrohet urina
  - B) Ka qeliza mezangiale
  - C) Nuk ka podocitë
  - D) Sintetizohet eritropoetina dhe renina
49. Në terrenet qelizore nuk nevojiten:
- A) Kushtet aseptike
  - B) Antinflammatorët
  - C) Bujonet organike
  - D) Antibiotikët
50. Në gjendjen vegjetative, vendimi për zgjatjen e jetës nëpërmjet ushqyerjes artificiale:
- A) bazohet në parimin e drejtësisë për shkak të burimeve të kufizuara shëndetësore
  - B) promovon të mirën më të madhe, për një numër më të madh të popullsisë
  - C) bazohet në të drejtën e patjetërsueshme për jetën e pacientit
  - D) bazohet në ruajtjen e mirëqënies dhe i shërben interesave më të mira të pacientit
51. Kujdesi mjekësor paliativ:
- A) i mundëson pacientit terminal një cilësi më të mirë jetese
  - B) konsiston në zgjatjen e jetës së pacientit
  - C) vepron mbi shkakun e një sëmundjeje
  - D) përfshin vetëm terapinë që lehtëson dhimbjen fizike të pacientit
52. Eutanazia pasive:
- A) është në përputhje me Betimin e Hipokratit
  - B) kryhet me pjesëmarrjen aktive të pacientit
  - C) zbatohet në sëmundje të pashërueshme, pavarësisht stadi të sëmundjes

D) refuzon terapinë intensive që zgjat jetën e një të sëmurit terminal

53. Në teoritë e jo pasojave veprimi është cilësuar i drejtë :

- A) nëse bazohet në virtytet e moralit
- B) nëse ai është i bazuar vetëm në ligje apo rregullore
- C) për aq kohë sa pasojat janë të mira
- D) nëse nga ky përfiton vetë personi

54. Plotësimi i detyrës së parandalimit të sëmundjeve ka çuar në konflikt me:

- A) detyrën e shtetit për të mbrojtur shëndetin dhe mirëqenien publike
- B) parimin e ruajtjes së sekretit mjekësor
- C) detyrën profesionale për të mbrojtur shëndetin e pacientit
- D) interesat e shoqërisë

55. Në teoritë e jo pasojave veprimi është:

- A) i drejtë nëse ai është i bazuar vetëm në ligje apo rregullore
- B) korrekt nëse funksionon dhe nëse është mëse i domosdoshëm
- C) i mirë për aq kohë sa efektet janë të mira
- D) i mirë nëse nga ky përfiton vetë personi

56. Cila nga karakteristikat e mëposhtme nuk i përket jatrogjenisë:

- A) ndodh më shpesh tek personat që kanë ndjeshmëri dhe predispozicion për sëmundje psikike
- B) njihen si sëmundje sugjestionuese në mjekësi
- C) kryhet me dashje nga profesionistët e shëndetësisë, zakonisht nga shpërdorimi i detyrës
- D) shkaktohen nga fjalët, gjestet apo mimika e njeriut të shëndetësisë

57. Lëvizja "Hospice" u ofron ndihmë:

- A) personave me aftësi të kufizuara
- B) pacientëve të moshuar të braktisur nga familjarët
- C) pacientëve me sëmundje kronike
- D) të sëmurëve të pashpresë për jetën

58. Testamenti i jetës:

- A) shoqërohet me kërkesën për të drejtën e vdekjes me dinjitet
- B) shkruhet nga personat e afërm të pacientit, në stadin terminal të sëmundjes
- C) hyn në fuqi pas vdekjes së pacientit
- D) mund të rritë nevojën për eutanazi të pavullnetshme

59. Bazuar në argumentet kundër eutanazisë aktive, legalizimi i saj:

- A) rrit mundësinë për kujdes paliativ
- B) motivon respektin e shoqërisë për shenjtërinë e jetës
- C) ekspozon njerëzit e rrezikuar ndaj presionit për t'i dhënë fund jetës së tyre
- D) inkurajon kërkime për mjekime të reja për të sëmurët terminalë

60. Në dhimbjen kronike, pacienti:

- A) adaptohet me dhimbjen



- B) flet shumicën e kohës për dhimbjen
- C) ka ankth të shtuar
- D) shfaq reagime fiziologjike të ngjashme me dhembjen akute

61. Të trajtosh pacientin si një të tërë do të thotë:

- A) t'i lejosh pacientit të bëhet një marrës pasiv i kujdesit ndaj tij
- B) të fokusohesh vetëm tek sëmundja e tij
- C) të pajtohesh me nocionin e paternalizmit
- D) t'i lejosh të ushtrojë autonominë morale

62. Qëllimi i utilitarizmit, si një teori etike perëndimore është:

- A) të sigurojë kënaqësi për një numër të kufizuar individësh
- B) të respektojë ligjet dhe rregulloren, pavarësisht nëse veprimi ka pasoja të mira ose jo
- C) të arrijë rezultate sa më mira, për një numër sa më të madh personash
- D) të frenojë kultivimin e një shoqërie imorale

63. Koncepti i paternalizmit në etikën mjekësore tradicionale nuk inkurajon:

- A) parimin e të bërit mirë
- B) respektimin e autonomisë së pacientit
- C) parimin e të mos dëmtuarit të pacientit
- D) marrjen e vendimeve nga ana e mjekut, në emër të pacientit, bazuar në interesin më të mirë të tij

64. Një dilemë etike:

- A) rezulton në një zgjedhje të drejtë apo të gabuar
- B) është një çështje pa një përfundim të kënaqshëm
- C) nuk paraqet vështirësi në marrjen e vendimit, nëse bazohemi në parimet etike
- D) krijon një konflikt vlerash, por që nuk çënon interesat e pacientit

65. Cilat nga pohimet për konsentin është i gabuar:

- A) është në kundërshtim me të trajtuarit e njerëzve në mënyrë holistike
- B) është shprehje e parimit të autonomisë së pacientit
- C) bazohet në një komunikim të mirë profesionist shëndetësor-pacient
- D) nënkupton miratimin ose refuzimin e mjekimit nga ana e pacientit

66. Deklarata e të Drejtave të Pacientit quhet ndryshe:

- A) deklarata e Lisbonës
- B) deklarata e Gjenevës
- C) kodi i Nurenbergut
- D) deklarata e Helsinkit

67. Një infermier që vuan nga sindroma e konsumimit profesional:

- A) ka mjaft lodhje fizike, por ndihet i motivuar për punën e tij
- B) është mjaft produktiv si në karrierën profesionale dhe atë personale
- C) mban distancë ndaj të sëmurit
- D) ka frymë bashkëpunimi dhe ndarje idesh me kolegët e tij

68. Në vlerësimin e dhimbjes tek pacienti, infermieri duhet të bazohet:
- A) vetëm në komunikimin verbal
  - B) në reagimet e pacientëve ndaj dhimbjes, pavarësisht fazës së saj
  - C) komunikimin verbal dhe joverbal
  - D) vetëm në shkaqet e dhimbjes
69. Misioni i mbështetjes shpirtërore ndaj të sëmurit terminal nuk përmbushet si duhet, nëse:
- A) profesionisti shëndetësor ka arritur të krijojë një raport të qartë me vdekjen
  - B) kompetenca profesionale shihet si kusht i mjaftueshëm për të kryer këtë mision
  - C) profesionisti ka trajnimin e duhur për të punuar në situata me ngarkesë të fortë emocionale
  - D) profesionisti integron vdekjen brenda kuadrit të jetës duke i dhënë kuptim asaj
70. Thënia e së vërtetës për një sëmundje terminale, sipas modelit participativ:
- A) bazohet në rrethanat dhe gjendjen psikologjike të pacientit, duke vepruar me shumë takt
  - B) nuk i tregohet pacientit duke e mbajtur me shpresë deri në fund të jetës së tij
  - C) bazohet në gjykimin dhe vendimin e mjekut për të mirën e pacientit
  - D) bazohet në dialog të hapur midis mjekut dhe të sëmurit duke i treguar pa asnjë ngurim
71. Detyrimi që kanë profesionistët e shëndetit ndaj kolegëve, pacientëve dhe të afërmeve të tyre lidhet me:
- A) përgjegjësinë personale
  - B) përgjegjësinë profesionale
  - C) përgjegjësinë tutoriale
  - D) përgjegjësinë publike
72. Cila nga deklaratat e mëposhtme njihet si variant i rinovuar i Betimit të Hipokratit:
- A) deklarata e Manilës
  - B) deklarata e Helsinkit
  - C) kodi i Nurenbergut
  - D) deklarata e Gjenevës

## 15. Teknik Laboratori, Imunologji

1. Hipersensitiviteti imediat zakonisht përfshin:
- A) Mastocitet
  - B) IgG
  - C) Trombocitet
  - D) Makrofaget
2. Një fëmijë ngacmon një fole grerëzash, thumbohet në mënyrë të përsëritur, dhe pëson shok brenda disa minutash, duke manifestuar insuficiencë respiratore dhe kolaps kardiovaskular. Kjo ka më tepër të ngjarë të ketë ndodhur nëpërmjet:
- A) Një reaksioni Arthus
  - B) Anafilaksisë sistemike
  - C) Hipersensibilizimit citotoksik

D) Sëmundjes së serumit

3. Cila prej të mëposhtme nuk është sëmundje hipersensitiviteti?

- A) Angioedema e trashëguar
- B) Sindroma Goodpasture
- C) Ethet e barit
- D) Dermatiti i Kontaktit

4. Antitruapat IgG kundrejt proteinave të veta:

- A) Janë gjetur vetëm në pacientë me tumore
- B) Janë të prodhuara vetëm në shpretke
- C) Mund të kalojnë placentën
- D) Janë më të zakonshme në meshkuj

5. Cila nga sëmundjet e mëposhtme është sëmundje autoimmune?

- A) Hipërtesnioni arterial
- B) Astma Bronkiale
- C) Diabeti i Sheqerit I-re
- D) Tetanozi

6. Cila nga sëmundjet e mëposhtme nuk është autoimmune?

- A) Lupusi eritematoz
- B) Tonsiliti Akut
- C) Artriti Reumatizmal
- D) Sindroma Sjorgen

7. Survejanca imune tumorale mund të ndermjetësohet nga:

- A) Mastocitet
- B) Neutrofilet
- C) Qelizat Langerhans
- D) Qelizat NK

8. Transplantet ndermjet individëve gjenetikisht identike (psh binjakeve identike):

- A) Nuk flaken, edhe në mungesë të terapise imuno-supresive
- B) Janë të flakur ngadale, si pasojë e antigeneve minore të histokompatibilitetit
- C) Janë subjektë të flakjes super akute
- D) Nuk kemi flakje në rast transplantit veshke, por kemi flakje në rast transplantit lekure

9. Përparësia kryesore e imunizimit pasiv mbi atë aktiv është që:

- A) Mund të administrohet nga goja
- B) Siguron antikorpe në mënyrë më të shpejtë
- C) Antikorpi qëndron për një kohë më të gjatë
- D) Për mban fillimisht IgM

10. Imunizimi është:

- A) Një antigjen

- B) Nje antikorp
- C) Nje proces qe prodhon imunitet
- D) Trajtim qe përdorantikorpe

11. Imunosupresioni është:

- A) Frenim i përgjigjes imune
- B) Nje proces qe prodhon imunitet
- C) Nje antikorp
- D) Trajtim qe përdorantikorpe

12. Nje komplikim i rende i përdorimit të medikamenteve imunofrenuese është:

- A) Rritje e rrezikut për sëmundje autoimune
- B) Rritja e rrezikut për infeksione oportunistë
- C) Renia e flokeve
- D) Renia e përqendrimit të komplementit

13. Cili nga organet e mëposhtme nuk futet tek organet limfoide primare?

- A) Melcia
- B) Shpretka
- C) Palca e kockave
- D) Timusi

14. Cila nga qelizat e mëposhtme është mikrofaq?

- A) Eritrociti
- B) Neutrofili
- C) Trombociti
- D) Asnjëra nga të sipër për mendurat

15. Cila nga rrugët e mëposhtme nuk ka të bëjë me aktivizimin e komplementit?

- A) Rruga alterne
- B) Rruga e ciklit të Krebsit
- C) Rruga e lectines
- D) Rruga klasike

16. Cila nga shprehjet e mëposhtme nuk është e saktë?

- A) Imunogjeni është një substancë që stimulon një përgjigje imune
- B) Antigjeni është një substancë që reagon me produktet (elementet) e përgjigjes imune specifike
- C) Hapteni është një substancë që nuk është imunogjenike por që mund të reagojë me produktet e përgjigjes imune specifike
- D) Epitopi është pjesa e antitritupit që lidhet me antigjenin

17. Cila nga shprehjet e mëposhtme është e vertetë?

- A) Alergjen quhet çdo antigjen
- B) Alergjenet janë imunologjikisht të demshem
- C) Alergjenet quhen ndryshe tolerogjene
- D) Asnjëra nga shprehjet e mësipër me nuk është e vertetë

18. Cila nga vetitë e meposhtme nuk është e vertetë për adjuvantet?
- A) Rekrutojnë qeliza që reagojnë ndaj antigjeneve
  - B) Nxisin diferencimin dhe shumfishimin e qelizave imunokompetente
  - C) Frenojnë prodhimin e antitropave
  - D) Stimulojnë imunitetin qelizor.
19. Cila nga theniet e meposhtme nuk është e vertetë për IgG?
- A) Kalon placentën
  - B) Depërton me vështirësi në inde
  - C) Aktivizon komplementin
  - D) Ka rol opsonizues
20. Cila nga imunoglobulinat e meposhtme është në baze të sëmundjeve atopike?
- A) IgE
  - B) IgA
  - C) IgD
  - D) IgG
21. Cila nga qelizat nuk është pjesë e imunitetit qelizor specifik?
- A) Limfocitet B
  - B) Limfocitet T
  - C) Plazmocitet
  - D) Qelizat e Kupferit
22. Identifikimi i proteinave nëpërmjet ndarjes elektroforetike e me tej të testit serologjik të imunofluoreshencës është quajtur:
- A) Teknika ELISA
  - B) Imunodifuzion
  - C) Imunoelektroforeze
  - D) Imunofluorescence
23. Reaksionet e aglutinimit janë:
- A) Nderveprimi i antigjeneve të tretshëm me antikorpe IgG apo IgM
  - B) Nderveprimi i antigjeneve të partikulizuara me antikorpe IgM
  - C) Test serologjik i bazuar në shterimin e një sasi të caktuar të komplementit në prani të një reaksioni antigen-antikorp
  - D) Test serologjik që përdor antikorpe të shënuar me ngjyra floreshente
24. Individet me grup gjaku të tipit AB:
- A) Janë Rh(D)-negativ
  - B) Janë "marres universale" të transfuzioneve
  - C) Kanë qarkullim antikorpe anti-A dhe anti-B
  - D) Kanetë një tip haplotip

25. Sëmundja hemolitike e të sapolindurit nga papajtueshmeria e grupit të gjakut Rh kerkon qe antikorpet maternale të hyjne ne rrymen e gjakut. Kesisoj, mediatori i kesaj semundjeje është:

- A) Antikorp IgE
- B) Antikorp IgG
- C) Antikorp IgM
- D) Antikorp IgA

26. Nje reaksion madhor transfuzioni Mund tëshfaqet nese marresi:

- A) Ka antikorpe ndaj qelizave të transfuzuara
- B) Ka qeliza T reaktive ndaj antigjeneve të grupeve të gjakut
- C) Është kompatibel për RhD
- D) Është AB pozitiv

27. Cili nga reaksionet e mëposhtme është me i rrezikshem për jetën?

- A) Hemolitik jashtëvazal
- B) Hemolitik brendavazal i shpejtë
- C) Hemolitik brendavazal i vonuar
- D) Febril johemolitik

28. Ku nuk janë të rëndesishme grupet e gjakut?

- A) Transfuzione
- B) Shtatzani
- C) Psikologji
- D) Kriminalistike

29. Cili nga grupet është dhurues universal?

- A) A
- B) AB
- C) B
- D) O

30. Kur mund të kemi semundje hemolitike të porsalindurit?

- A) Nena RhD-, fetusi RhD-
- B) Nena RhD+, fetusi RhD-
- C) Nena Rh D+, fetusi RhD+
- D) Nena RhD-, fetusi RhD+

31. Cili nga të mëposhtmit nuk mund të jetëreaksion imun nga transfuzioni?

- A) Purpura post-Transfuzionale
- B) Sëmundja e grafit ndaj pritësit
- C) Infektimi me HIV
- D) Anafilaksia me IgE anti-IgA

32. Cili nga të mëposhtmit nuk është grup i sistemit ABO?

- A) A
- B) B

- C) D
- D) AB

33. Nese kemi dy prind me grupe gjaku për katësisht: babai AB, Rh- dhe nena B, RhD-, cili nga fëmijët e mëposhtëm nuk mund të jetë i tyri?

- A) A,RhD-
- B) O,RhD-
- C) B,RhD-
- D) AB,RhD-

34. Imuniteti aktiv i fituar natyralisht është:

- A) Nje rezistence individuale ndaj disa semundjeve e paracaktuar gjenetikisht
- B) Aftësia e trupit për t'iu kundervene specifikisht organizmave apo substancave të huaja
- C) Imunitet si pasojë e infeksionit
- D) Imunitet si pasojë e vaksinimit

35. Imuniteti pasiv i fituar natyralisht është:

- A) Antitropa të transferuar pasivisht nga nje nene të fetusit apo i sapolindur
- B) Antitropa të transferuar nga nje njeri i shendetshem i imunizuar tek nje tjetër
- C) Imunitet si pasojë e infeksionit
- D) Imunitet i fituar si pasojë e transplantit të palces se kuqe të kockave.

36. Të sapolindurit:

- A) Marrin antitropa IgM nga nëna nëpërmjet placentës
- B) Kanë virtualisht një kompleks të plotë të antitropave maternale IgG
- C) Kanës humë pak limfocitë në qarkullimin e tyre
- D) Marrin qeliza B maternale

37. Funkzioni kryesor i neutrofileve është:

- A) Transporti i O<sub>2</sub> dhe CO<sub>2</sub>
- B) Koagulimi i gjakut
- C) Fagocitoza
- D) Prodhimi i proteinave toksike kunder parazitëve të caktuar

38. Aplikimi i vaksines DPT ne cilin nga tipet e meposhtme të imunitetit do të kontribuonte?

- A) Imunitetin aktiv natyral
- B) Imunitetin pasiv natyral
- C) Imunitetin aktiv artificial
- D) Imunitetin pasiv artificial

39. Të gjitha qelizat e meposhtme përmbajne granula qe shërbejnë ne citotoksicitet dhe ne shkatërrimin e qelizave të huaja përveç:

- A) Neutrofilin
- B) Qelizes vrasese natyrale
- C) Makrofagut
- D) Plazmocitin

40. Funkzioni kryesor i monociteve është:
- A) Prodhimi i antittrupave
  - B) Fagocitoza (kur ata maturohen ne makrofage)
  - C) Citotoksiciteti jashtëqelizor
  - D) Koagulimi i gjakut
41. Cili është organ paresor i sistemit imun?
- A) Timusi
  - B) Zemra
  - C) Nyjet limfatike
  - D) Shpretka
42. Cili është organ qendror i sistemit imun?
- A) Veshka
  - B) Nyjet limfatike
  - C) Shpretka
  - D) Palca kockore
43. Si mastocitet edhe bazofilet:
- A) Janë fagocitues
  - B) Çlirojnë histamine
  - C) Qarkullojnë ne rrymen e gjakut
  - D) Kanë receptore për antikorpe IgM
44. Të gjitha pohimet ne lidhje me antigjenin janë të sakta, përveç njërit:
- A) Është një substancë kimike që mund të nxisë prodhimin e antittrupave apo qeliza T specifike
  - B) Ai është, si rregull, substancë e huaj
  - C) Ato janë substanca komplekse organike
  - D) Ato janë substanca me peshë të vogël molekulare që kombinohet me një antitrup por që nuk mund tëshkaktojnë prodhimin e tyre
45. Roli i makrofageve gjatë nje përgjigjeje me antitrupa është te:
- A) Gelltise antitrupa
  - B) Sintetizoje antikorpe
  - C) Trese qeliza shenje të infektuara nga viruset
  - D) Procesoje dhe prezantoje antigenin
46. Zgjidh nje stad korrekt të hapave të fagocitozes:
- A) Kematosis, aderence, digjestion, ekzocitoze
  - B) Digjestion, kematosis, aderence, ekzocitoze
  - C) Aderence, ekzocitoze, digjestion, kematosis
  - D) Ekzocitoze, digestion, kematosis, adherence
47. Procesi me anë të cilitn fagocitet janë terhequr drejt mikroorganizmave quhet:
- A) Aderence



- B) Kemotaksis
- C) Digjestion
- D) Oponizacion

48. Procesi me anë të të cilit fagocitet i janë atashuar mikroorganizmave apo materialeve të tjera të huaja quhet:

- A) Aderence
- B) Kemotaksis
- C) Digjestion
- D) Oponization

49. Procesi me anë të cilit mikroorganizmat e fagocituar janë vrare nga enzimat lizozomale dhe agjentet oksidues quhet:

- A) Aderence
- B) Kemotaksis
- C) Digjestion
- D) Oponization

50. Rruga klasike e aktivizimit të komplementit nis nga nderveprimi i C1 me:

- A) Antigenin
- B) Faktorin B
- C) Komplekset antigen-IgG
- D) Lipopolisaharidet bakteriale

51. Patientet me ulje të rënde të nivelit të C3 priren të kene:

- A) Numer të lartë infeksionesh virale të rënda
- B) Numer të lartë infeksionesh të rënda bakteriale
- C) Nivel të ulët të gama-globulinave
- D) Episode të shpeshta të anemise hemolitike

52. IgA dimerike:

- A) Është e pranishme ne qumesht
- B) Është e për fshire ne ethen e barit
- C) Aktivizon komplementin me rrugen klasike
- D) Kalon placenten

53. IgM humane:

- A) Kalon placenten
- B) Mbron sipër faqet mukozale
- C) Është e kufizuar brenda vazave të gjakut
- D) Është antitруп i prodhuar nga qeliza plazmatike me afinitet të larte

54. Klasa imunoglobulinike me për qendrim me të lartë ne gjakun e të porsalindurit është:

- A) IgE
- B) IgM
- C) IgA

D) IgG

55. Cili prej pohimeve të mëposhtme në lidhje me allotipat imunoglobulinike është i vertetë?

- A) Allotipat gjenden vetëm në zinxhret e rende
- B) Allotipet janë të përcaktuar nga gjene të klases 1 të KMPI
- C) Allotipet kufizojnë regjionet variabel
- D) Allotipet janë si pasojë e polimorfizmit gjenetik brenda species

56. Cila nga klasat imunoglobulinike është pentamer?

- A) IgG
- B) IgA
- C) IgE
- D) IgM

57. Antitrupi i shfaqur fillimisht në përgjigje të një infeksioni për herë të parë është:

- A) IgG
- B) IgM
- C) IgA
- D) IgD

58. Antitrupi që kalon placenten është:

- A) IgG
- B) IgA
- C) IgD
- D) IgE

59. Toleranca qendrore e limfociteve T ndodh në:

- A) Limfonodula
- B) Timus
- C) Shpretke
- D) Melçi

60. Funkzioni kryesor i limfociteve është:

- A) Përgjegjësia për imunitetin specifik
- B) Fagocitoza
- C) Prodhimi i heparines apo histamines
- D) Prodhimi i proteinave toksike kundër parazitëve të caktuar

61. Prania në 70% të limfociteve CD3 pozitive tek një pacient tregon se ai e ka normal:

- A) Imunitetin humoral
- B) Imunitetin celular
- C) Numrin e limfociteve B
- D) Numrin e limfociteve T

62. Një përgjigje imune primare në një njeri të rritur sa kohë kërkon afërsisht të prodhojë nivele të zbulueshme antikorpalet në gjak?

- A) 12 ore
- B) 3 dite
- C) 1 jave
- D) 3 jave

63. Qeliza B e aktivizuar mund:

- A) Të prodhojë një klon plazmocitësh
- B) Të prodhojë direkt imunoglobulina
- C) Të prodhojë T-supresore
- D) Të prodhojë makrofage

64. Kujtesa imunologjike është karakteristike e:

- A) Limfociteve T dhe Qelizave Vrasëse Natyrale
- B) Limfociteve B dhe qelizave dendritike
- C) Limfociteve T dhe B
- D) Makrofageve dhe Limfociteve B

65. Normalisht nuk përmban mikroorganizma:

- A) Trakti i sipër m respirator
- B) Mushkeria
- C) Vagina
- D) Zorret e trasha

66. Aftësia e një patogjeni për të shkaktuar një sëmundje duke kaluar mbrojtjet e mbartësit është quajtur:

- A) Patogjenicitet
- B) Virulence
- C) Toksigjenicitet
- D) Invazion

67. Leukocidinat janë:

- A) Të prodhuara nga disa bakterie që mund të shkatërrojnë neutrofilet
- B) Enzima të prodhuara nga bakterie që mund të shkaktojnë lizë të eritrociteve
- C) Enzima bakteriale që koagulojnë fibrinogjenin në gjak
- D) Grup enzimesh katabolizuese të fibrinës që shpërbëjnë koagulën e formuar nga trupi për izolimin e infeksionit

68. Një fëmijë që nuk ka qeliza T apo B të detektueshme është probablisht me defekt në:

- A) Timus
- B) Qeliat fagocitare
- C) Ndërveprimin qelizë T qelizë B
- D) Qelizat burimore me origjinë nga palca e kockave

69. Qelizat T në limfonodula:

- A) Mungojnë në sindromën Di-George
- B) Shfaqen kryesisht në regjionin medular

- C) Janë të vetmet të tipit citotoksik
- D) Janë fagocituese

70. Hypogamaglobulinemia e Bruton demonstrohet nga mungesa e

- A) Limfociteve B
- B) Makrofageve
- C) Limfociteve T
- D) Neutrofileve

## 16. Legjisl,Gjen Mjeksore,Biologji,Farmakologji

1. Ligji hyn ne fuqi :

- A) që në momentin qe miratohet ne Parlament,
- B) 15 ditë pas publikimit ne Fletoren Zyrtare,
- C) menjehere pasi dekretohet nga Presidenti,
- D) asnjëra nga alternativat.

2. Organë drejtuese të spitaleve janë :

- A) keshilli administrativ ,
- B) keshilli i ministrave,
- C) drejtoria,
- D) Keshilli administrative dhe Drejtoria.

3. Nje infermier me shtetesi të huaj :

- A) Nuk Mund të punoje ne Shqipëri ,
- B) mundet të punoje vetëm nese është i anetaresuar në një urdher ne vendin e tij,
- C) Mund të punësohet në çdo rast,
- D) asnjë nga alternativat.

4. Me detyrim për anetaresi (sipas ligjit për urdhrin e infermierit) kuptojme :

- A) asnjë individ nuk Mund të ushtroje profesionin e infermierit, mamise apo fizioterapeutit pa gene anetar i Urdhrit të Infermierit,
- B) asnjë individ nuk Mund të ushtroje profesionin e infermierit, mamise apo fizioterapeutit pa gene anetar i Urdhrit të Mjekut,
- C) Për të ushtruar profesionin nuk është i nevojshëm anetaresimi në një Urdher Profesional
- D) asnjë nga alternativat.

5. Ligji për Urdhrin e infermierit vepron:

- A) vetëm për infermieret , mamitë dhe fizioterapeutet ne Tirane,
- B) për infermieret , mamitë dhe fizioterapeutet ne të gjithë Shqipëri ,
- C) ndaj çdo infermieri në botë
- D) asnjëra nga alternativat.

6. Urdhri i infermierit është i organizuar ne:

- A) nivel bashkie/ kombëtar ,
- B) nivel rajonal/ kombëtar ,

- C) nivel institucionesh shendetesore
- D) asnjë nga alternativat.

7. Cila prej alternativave është faze e nxjerrjes se nje ligji?

- A) Iniciativa ligjore,
- B) Miratimi,
- C) Shpallja,
- D) Të gjitha me sipër .

8. Ligji i nje shteti vepron :

- A) Ne të gjithë territorin e atij shteti,
- B) Në atë shtet dhe ne shtetë afer tij,
- C) vetëm ne sipërfaqen tokësore të shtetit,
- D) vetëm ne hapësiren ajrore.

9. Urdhri i Infermierit :

- A) Subvencionohet vetëm nga shteti,
- B) Financohet vetëm nga kuotat e anetaresimit,
- C) Subvencionohet nga Shteti dhe financohet nga kuotat e anetaresimit
- D) Asnjëra me sipër .

10. Cili prej këtyre kushteve nevojitet për të për fituar nga skema e sigurimeve shoqerore:

- A) Arritja e moshes se caktuar,
- B) vitet e punës ,
- C) pagesa e kontributit,
- D) të gjitha alternativat e mësipërme

11. Sigurimet shoqërore janë :

- A) pagese për sonale ,
- B) detyrim administrativ,
- C) I paguajnë vetëm pensionistet,
- D) I paguajnë vetëm të punësuarit në ndërmarrjeprivate.

12. Kontributi mund të jetë:

- A) I detyrueshëm,
- B) Vullnetar ,
- C) Penal,
- D) I detyrueshëm ose vullnetar.

13. Sëmundja kromozomike që karakterizohet nga labiopalatoskiza, prapambetje mendore dhe fizike është:

- A) sindroma Down
- B) sindroma Turner
- C) sindroma Patau
- D) sindroma Klinefelter

14. Një gjenotip XO shfaqet në:

- A) sindromën Patau
- B) trizominë 21
- C) sindromën Klinefelter
- D) sindromën Turner

15. Cilat nga sindromat e mëposhtme është sindromë gjenetike që rrjedh nga delecionet?

- A) S. down
- B) S. chri-du-cat
- C) S. Patau
- D) S. Edwards

16. Cila nga sëmundjet e mëposhtme tejçohet në mënyre reçesive të lidhur me X?

- A) Akondroplazia
- B) Albinizmi Okular
- C) Hemofilia B
- D) Rakitizmi rezistent ndaj vitaminës D

17. Një pacient/e paraqet pilozitet të pakësuar, hipogonadizm, inteligjencë normale, gjinekomasti. Dyshojmë për Sindromën:

- A) Klinefelter
- B) Edwards
- C) Down
- D) Turner

18. Në një qelizë me një numer  $2n+1$  kromozomesh, kemi të bëjmë me:

- A) aneuploidi
- B) monozomi
- C) triploidi
- D) trizomi

19. Sindroma Down ka:

- A) Defiçiençë imunitare
- B) mekanizmi gjenetik në mbi 90% të rasteve është mosshkëputja e kromozomeve në mejozë
- C) facies lunata
- D) të gjitha

20. Në qoftë se një çift ka një fëmijë me sëmundjen e Fibrozës Cistike, shansi për të pasur një fëmijë tjetër të prekur nga kjo sëmundje është:

- A) 10%
- B) 25%
- C) 50%
- D) 75%

21. Në mitozë, qelizat me 16 kromozome prodhojnë qeliza bija ku secila ka:

- A) 32 kromozome

- B) 8 kromozome
- C) 16 kromozome
- D) 16 çiftë kromozomesh.

22. Në mejozë, qelizat me 32 kromozome prodhojnë qeliza bja ku secila ka:

- A) 32 kromozome
- B) 8 kromozome
- C) 16 kromozome
- D) 4 çiftë kromozomesh.

23. Është një çrregullim i rëndë i metabolizmit të purinave që shoqërohet me efektet klinike të prapambetjes mendore dhe tendencës për vetëshkatërrim:

- A) Tay-sachs
- B) Galaktozemia
- C) Lesch-Nyhan
- D) Alkaptonuria

24. Në cilën sëmundje autozomike recesive, Fenilalaninë hidroksilaza është defekteze?

- A) Alkaptonuria
- B) Homosistinuria
- C) Albinizmi
- D) Fenilketonuria

25. Cila nga hipotezat e mëposhtme është më e sakta për sa i përket produktit të një gjeni?

- A) Një gjen-një proteine
- B) Një gjen-një sheqer
- C) Një gjen-një ADN
- D) Një gjen-një tipar

26. Mejoza:

- A) Ndodh në të gjitha qelizat që përbejnë organizmin
- B) Është e përberë nga një ndarje e vetme
- C) Ndodh vetëm në qelizat e linjës seksuale
- D) Prodhon 4 gametë haploide si tek meshkujt ashtu edhe tek femrat

27. Nga sa kopje kromozomesh përbëhet kariotipi human normal?

- A) 23
- B) 24
- C) 22
- D) 20

28. ADN-ja nuk mund të analizohet nga:

- A) Eritrocitet
- B) Nga sistemi nervor
- C) Spër matozoidet
- D) Floket

29. Cili prej klasifikimeve të mëposhtme është më i lartë se klasifikimi klasa?

- A) familja
- B) Brendi
- C) tipi
- D) lloji

30. Proteinat formohen nga bashkimi në varg i:

- A) ribosomeve
- B) nukleotideve
- C) aminoacideve
- D) karboneve

31. Cili prej sheqernave të mëposhtme gjëndet tek ADN?

- A) riboza
- B) hekzoza
- C) fruktoza
- D) dezoksiriboza

32. Cili prej sheqernave të mëposhtme gjëndet tek ARN?

- A) riboza
- B) hekzoza
- C) fruktoza
- D) dezoksiriboza

33. Karbohidratet ne trupin e njeriut kanë funksion:

- A) energjitik
- B) levizes
- C) riprodhues
- D) mitotik

34. Cili prej organevele nuk gjëndet në qelizën shtazore?

- A) ribozomet
- B) mitokondritë
- C) kloroplastet
- D) REP

35. Shtresën lipidike të membranës qelizore e përshkruajnë plotësisht :

- A) kokat polare
- B) nukleotidet
- C) bishtat polarë
- D) proteinat

36. Acidet nukleike gjenden ne :

- A) bërthamë
- B) mikondri



- C) REP
- D) Ap.Golxhit

37. Tek molekula e ADN, sasia e Guaninës është e barabartë me sasinë e:

- A) Adeninës
- B) Citozinës
- C) Timinës
- D) Uracil

38. Tek molekula e ADN, sasia e Citozinës është e barabartë me sasinë e:

- A) Adeninës
- B) Guaninës
- C) Timinës
- D) Uracil

39. Tek molekula e ADN, sasia e Adeninës është e barabartë me sasinë e:

- A) Guaninës
- B) Citozinës
- C) Timinës
- D) Uracil

40. Tek molekula e ADN, sasia e Timinës është e barabartë me sasinë e:

- A) Adeninës
- B) Citozinës
- C) Guaninës
- D) Uracil

41. Procesi i kundërt me ekzocitozën është :

- A) fagocitoza
- B) osmoza
- C) transport pasiv
- D) difuzioni

42. Procesi qelizor gjatë të cilit lëndet kalojnë përmes një membranë nga përqëndrimi më i madh drejt përqëndrimit më të vogël:

- A) osomozë
- B) transport aktiv
- C) difuzion
- D) endocitozë

43. Membrana qelizore është e përbërë nga një shtresë e dyfishtë e :

- A) proteinave
- B) enzimave
- C) karbohidrateve
- D) lipideve

44. Numri i kromozomeve autosomike në një qelizë epiteliale tek njeriu është:

- A) 22
- B) 44
- C) 23
- D) 46

45. Numri i kromozomeve autosomike në një qelizë vezë tek njeriu është:

- A) 22
- B) 44
- C) 23
- D) 46

46. Numri i kromozomeve seksuale në një qelizë epiteliale tek njeriu është:

- A) 1
- B) 23
- C) 2
- D) 46

47. Numri i kromozomeve seksuale në një qelizë vezë tek njeriu është:

- A) 1
- B) 22
- C) 2
- D) 46

48. Kromozomet gjënden të bashkuara me anë të :

- A) centromerit
- B) nukleotidit
- C) bërthamzës
- D) centriolit

49. Në qelizën vezë të njeriut sa është numri i kromozomeve Y :

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 23

50. Në qelizën trupore të një mashkulli sa është numri i kromozomeve X:

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 46

51. Në qelizën trupore të një mashkulli sa është numri i kromozomeve Y:

- A) 0
- B) 1
- C) 2

D) 46

52. Në qelizën trupore të një femre sa është numri i kromozomeve Y:

A) 0

B) 1

C) 2

D) 46

53. Cikli Krebsit zhvillohet ne:

A) matriksin mitokondrial

B) krështën mitokondriale

C) hapësiren ndërmembranore

D) citoplazmë

54. Etapa e glikolizës së frymëmarjes qelizore zhvillohet në:

A) matriksin mitokondrial

B) krështën mitokondriale

C) hapësiren ndërmembranore

D) citoplazmë

55. Cili acid formohet në fund të glikolizës?

A) acidi laktik

B) acidi piruvik

C) acidi oksalacetik

D) acidi citrik

56. Sa ATP fitohen në fund të etapës së glikolizës?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

57. Cili është acidi që ripërtërihet gjatë Ciklit të Krebsit?

A) acidi laktik

B) acidi piruvik

C) acidi oksalacetik

D) acidi citrik

58. Ne cilin prej organeleve të mëposhtme kryhet tretja qelizore:

A) Ap.Golxhi

B) bërthame

C) REP

D) lizozome

59. Në cilin organel formohet ATP qelizore:

A) Ap.Golxhi

- B) bërthamë
- C) REP
- D) mitokondri

60. Molekula e ADN-polimerazës përfqëson një:

- A) acid
- B) ADN
- C) nukleotid-ADN
- D) enzimë

61. Në fund të frymemarjes qelizore sa molekula ATP fitohen :

- A) 2
- B) 32
- C) 36
- D) 4

62. Sa NADH<sub>2</sub> formohen gjatë Ciklit të Krebsit?

- A) 2
- B) 4
- C) 6
- D) 8

63. Sinteza e ARNm nga ADN kryhet në:

- A) REP
- B) mitokondri
- C) bërthamë
- D) Ap.Golxhi

64. Kryqëzohen dy prindër me sy të zinj. Ata kanë një fëmijë me sy blu. Sa është probabiliteti të kenë një fëmijë më sy të zinj?

- A) 1/2
- B) 3/4
- C) 1/4
- D) 2/3

65. Një njeri me grupin e gjakut O, si e ka gjenotipin:

- A) IAIA
- B) IAIO
- C) IOIA
- D) IOIO

66. Nëse një grua me grup gjaku A martohet me një burrë me grupin e gjakut B, dhe kanë një vajzë me grup gjaku O, si do të jetë gjenotipi i gruas?

- A) IAIB
- B) IBIA
- C) IAIO

D) IAIA

67. Mënyra e osifikimit ku prej disa pikash fillestare në indin embrional osifikimi përhapet në formë rrezore, quhet osifikim:

- A) endokondrial
- B) për ikondrial
- C) për iostal
- D) endesmal

68. Mënyra e osifikimit kur indi kockor depozitohet në sipërfaqen e jashtëme dhe zë vëndin e indit kërcor quhet :

- A) endokondrial
- B) për ikondrial
- C) për iostal
- D) endesmal

69. Në qarkullimin e gjakut proteina hemoglobin lidhet me :

- A) CO<sub>2</sub>
- B) H<sub>2</sub>O
- C) H<sub>2</sub>
- D) O<sub>2</sub>

70. Në fund të ovogjenëzës, sa qeliza vezë formohen:

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

71. Tabletat janë:

- A) ekstraktë alkolike
- B) pluhura të komprimuara ne makineri të posaçme
- C) forma farmaceutike të buta që përdoren për lyerjen e lëkurës
- D) tretësira ujore që përdoren me anë të aparateve të posaçme

72. A është e vërtetë se rruga natyrale e marrjes se barit është :

- A) Subkutane
- B) Intramuskulare
- C) Intravenoze
- D) Inhalatore

73. A është e vërtetë se gjatë administrimit të barit me rrugë intravenoze;

- A) efekti i barit është i ngadaltë
- B) efekti i barit është i kontrollueshem
- C) nuk Mund tëjapim sasi të madhe bari
- D) reaksionet anafilaktike janë me të lehta

74. A është e vërtetë se gjatë administrimit të barit me rrugë intramuskulare vendi më i shpësthtë i aplikimit të injeksionit në fëmijët e vegjël është muskuli?

- A) deltoid
- B) ventrogluteal
- C) dorsogluteal
- D) vastus lateralis

75. Efekti anesor kryesor i alfa-adrenoblokuesve është :

- A) Hypotensioni i theksuar postural
- B) Retensioni urinar
- C) Diareja
- D) Dhimbje artikulare

76. Beta-blokuesit përdoren për mjekimin e:

- A) Podagres
- B) Diabetit
- C) Takiaritmive
- D) Bronkitit kronik

77. Beta-blokuesit kunderindikohen në:

- A) Insuficiencën kardiake
- B) Hypër tension
- C) Takikardi
- D) Në sëmundjen migrenoze

78. Kolinomimetiket shkaktojnë:

- A) Midriaze
- B) Ulin djersitjen
- C) Bradikardi
- D) Bronkodilatacion

79. Kolinomimetiket përdoren për mjekimin e:

- A) Glaukomes
- B) Astmes bronkiale
- C) Bradikardive
- D) Diareve acute

80. Kolinomimetiket kunderindikohen në;

- A) Bradikardi
- B) Retensionin urinar
- C) Hipër tireoze
- D) Artritin reumatoid

81. M-kolinoblokuesit shkaktojnë:

- A) Mioze
- B) Shtim të sekrecioneve bronkiale

- C) Bronkodilatacion
- D) Bradikardi

82. Efekti anesor kryesor qe vihet re gjatë për dorimit të miorelaksanteve është;

- A) Apnea
- B) Hipër tensioni
- C) Hipër natremia
- D) Hipotermia

83. Aspirina përdoret për mjekimin e;

- A) Ethes reumatizmale
- B) Për uljen e tempër atures ne moshat pediatrike
- C) Insuficiences renale
- D) Parkinsonit

84. Cili nga keto barna anestezik jep rritje të tensionit arterial:

- A) Tiopentali
- B) Midazolami
- C) Ketamina
- D) Fentanyli

85. Benzodiazepinat shfaqin efekt:

- A) Eksitues
- B) Hipër tensiv
- C) Myorelaksant
- D) Anksioz

86. Barbituratet kunderindikohen ne:

- A) Epilepsi
- B) Porfiri
- C) Hypër tension
- D) Takikardi

87. Bari i zgjedhur për mjekimin e statusit epileptik është:

- A) Acidi Valproik
- B) Karbamazepina
- C) Diazepami
- D) Trimetadioni

88. A është e vërtetë se antipsikotiket kunderindikohen ne;

- A) Parkinson
- B) Alzheimer
- C) Skizofreni
- D) Ne pacientet me të vjella

89. Kripërat e litiumit përdoren për mjekimin e ;

- A) Epilepsise
- B) Parkinsonit
- C) Gjendjes maniakale
- D) Miastenise grave

90. Kofeina përdoret për mjekimin e;

- A) Insuficiences akutë cirkulatore
- B) Hipër tensionit
- C) Takikardise
- D) Hipër tireoze

91. Glukozidet kardiake kunderindikohen ne:

- A) Flaterin atrial
- B) Fibrilacionin atrial
- C) Infarktin e miokardit
- D) Takikardine paroksizmale supraventrikulare

92. Kinidina përdoret për mjekimin e :

- A) Aritmive atriale
- B) Astmes bronkiale
- C) Parkinsonit
- D) Epilepsise

93. Bari i preferuar në aritmitë e shkaktuara nga helmimi me digitalike është:

- A) Verapamili
- B) Amidaroni
- C) Difenidani
- D) Lidokaina

94. Bari që preferohet në mjekimin e krizës anginoze është;

- A) Propanololi
- B) Kinidina
- C) Digoksina
- D) Trinitrina

95. Cili nga barnat kalçiblokues mund të përdoret edhe si antiaritmik?

- A) Nifedipina
- B) Verapamili
- C) Amlodipina
- D) Nikardipina

96. Diuretiket osmotike përdoren për mjekimin e:

- A) Hipertensionit
- B) Edemave cerebrale
- C) Sindromin nefrotik
- D) Asnjëra nga keto thënie nuk është e vërtetë



97. Diuretiket tiazidike kunderindikohen ne:

- A) Hipertoni
- B) Insuficiencen renale
- C) Edemen kardiake
- D) Edemen hepatike

98. A.C.E. inhibitorët kundërindikohen në:

- A) Hipertension
- B) Diabet
- C) Hiperkalemi
- D) Insuficiencë kardiake

## **17. Dietologji, Shendet Mjedisor, Mikrobiologji, Biokimi Mjeksore**

1. BMI është raporti i :

- A) LDL/HDL kolesterol
- B) gjatësi/peshë trupore
- C) perimetër abdominal/perimetër gluteal
- D) asnjë nga të mësipërmet

2. Kalciumi rekomandohet si suplement në:

- A) urolitiazë
- B) kolelitiazë
- C) diabet mellitus
- D) menopauzë

3. Jodi rekomandohet si suplement në:

- A) Kancerin e tiroides
- B) Hipertireozë
- C) 3 mujorin e parë të shtatzanisë
- D) Të gjitha të mësipërmet

4. Hekuri perthithet më mirë nëse shoqërohet me:

- A) vitaminë D
- B) acid folik
- C) vitaminë C
- D) magnez

5. Proteinat duhet të zënë përqindjen e mëposhtme në kalorazhin ditor:

- A) 30-35%
- B) 50%
- C) 15-20%
- D) 40%

6. Hekuri është i nevojshëm në të gjitha gjendjet e mëposhtme përveç:

- A) anemi
- B) sëmundjet e veshkave
- C) shtatzani
- D) osteoporozë

7. Në konstitucionin android:

- A) perimetri abdominal = perimetri gluteal
- B) perimetri abdominal > perimetri gluteal
- C) perimetri torakal > perimetri gluteal
- D) perimetri gluteal > perimetri abdominal

8. Defiçiti i vitaminës D tek fëmijët çon në:

- A) Malabsorbim
- B) Rakitizëm
- C) Diabet Melitus
- D) Diabet insipid

9. Obeziteti është pjesë e:

- A) Sindromit metabolik
- B) Sindromit nefrotik
- C) Sindromit koronar akut
- D) Sindromit radikular

10. Veza përmban më tepër :

- A) Yndyrna
- B) Fibra
- C) Proteina
- D) Karbohidrate

11. Yndyrnat shtazore janë të pasura me:

- A) acide yndyrore të ngopura
- B) acide yndyrore të pangopura
- C) të dyja se bashku
- D) asnjë nga të mesipër met

12. Kalorazhi ditor i nevojshëm për një mashkull me peshë ideale është:

- A) 2500 kcal/ditë
- B) 2000 kcal/ditë
- C) 3000 kcal/ditë
- D) 1500 kcal/ditë

13. Lipidet duhet të zënë:

- A) 60-70% të kalorazhit ditor
- B) 20-30% të kalorazhit ditor
- C) 30-35% të kalorazhit ditor
- D) 10-15% të kalorazhit ditor

14. Mungesa e hekurit mund të jetëpasojë e:

- A) anoreksise
- B) hemorragjise
- C) diarrese
- D) të gjitha të mesipër met

15. Cili nga produktet e mëposhtme përmban më shumë magnez:

- A) farat e kungullit
- B) çokollata e zezë
- C) spinaqi
- D) bajamet

16. BMI = 23 shpreh:

- A) mbipeshe
- B) obezitet
- C) peshe ideale
- D) nenpeshe

17. Jodi gjendet më pak tek:

- A) molla
- B) hurma
- C) gështenja
- D) karkalecat

18. Obeziteti morbid i korrespondon:

- A) BMI = 30
- B) BMI = 25
- C) BMI > 40
- D) BMI > 35

19. Një grua shtatzanë me preeklampsi duhet të kufizojë:

- A) karbohidratet
- B) kripën
- C) frutat
- D) të gjitha të mësipërmet

Pytja 20. Vitamina C gjendet me tepër tek:

- A) domatja
- B) speci
- C) portokalli
- D) qitro

21. Gratë shtatzana nenpeshe duhet të respektojnë kalorazhin ditor:

- A) të njëjtë me shtatzanat me peshe normale
- B) dyfishin e kalorazhit normal

- C) ne varesi të BMI
- D) ne varesi të gjatesise trupore

22. Acidi folik është i domosdoshëm në:

- A) 3 mujorin e parë të shtatzanisë
- B) pubertet
- C) menopauzë
- D) periudhën pas lindjes

23. Karbohidratet duhet të zene ne kalorazhin ditor:

- A) 50%
- B) 30%
- C) 20%
- D) 10%

24. Vegjetarianet preken me shpesh nga:

- A) semundjet kardio-vaskulare
- B) anemia
- C) obeziteti
- D) diabeti mellitus

25. Diarreja mund të jetë pasojë e :

- A) marrjes së tepërt të yndyrnave
- B) hiperfeksionit të gjendrës tiroide
- C) marrjes së mangët të fibrave
- D) A dhe B së bashku

26. Në konstitucionin genoid :

- A) perimetri abdominal < perimetri gluteal
- B) perimetri abdominal = perimetri gluteal
- C) perimetri torakal > perimetri gluteal
- D) perimetri gluteal < perimetri abdominal

27. Ngrenia e tepërt e karbohidrateve mund të shkaktoje:

- A) diabet të sheqerit
- B) mbipeshe
- C) të vjella
- D) diarre

28. Kalorazh me të madh për njësi grami kane:

- A) yndyrnat
- B) kripër at minerale
- C) karbohidratet
- D) proteinat

29. Yndyrnat bimore janë të pasura me:

- A) acide yndyrore të pangopura
- B) kolesterol
- C) trigliceride
- D) acide yndyrore të ngopura

30. Kalorazhi ditor i grave shtatzana është:

- A) i njëjtë me gratë normale
- B) me i vogël se gratë normale
- C) me i madh se gratë normale
- D) varet nga BMI e gruas në fillim të shtatzanisë

31. Vitamina C në organizëm është e nevojshme për :

- A) thithjen e yndyrave
- B) thithjen e hekurit
- C) thithjen e kalciumit
- D) asnjë nga të mësipërmët

32. Për të parandaluar shfaqjen e diabetit gestacional, kufizimi i karbohidrateve rekomandohet në tremujorin:

- A) e parë të shtatzanisë
- B) e dytë të shtatzanisë
- C) e tretë të shtatzanisë
- D) e dytë dhe të tretë të shtatzanisë

33. Konsumimi i peshkut duhet të kufizohet gjatë:

- A) shtatzanisë
- B) pubertetit
- C) menopauzës
- D) laktacionit

34. Vitamina E rekomandohet në:

- A) dhimbjet e kokës
- B) renien e flokëve
- C) anemi
- D) osteoporozë

35. Trajtimi afatgjatë me Metforminë mund të shkaktojë pakësim të:

- A) vitaminës D
- B) acidit folik
- C) vitaminës E
- D) asnjërës prej tyre

36. Studimet deskriptive:

- A) Bejne vetëm për shkrimin e gjerave,
- B) Nuk për doren për studimin e ekspozimeve,
- C) Nuk për doren për studimin e efekteve,

D) Për doren vetëm për ekspozimet,

37. Indikatoret për monitorimin e riskut;

- A) Nuk ka vlere besueshmeria,
- B) Nuk është e rëndësishme lehtësia e matjes,
- C) Nuk duhet të jene të lidhur ngushtë me risqet,
- D) Duhet të shfaqen shpejt pas ekspozimit

38. Dioksidi i squfurit si lëndë ndotëse në ajër:

- A) Ka efekt kryesor-dëmtimin e trurit
- B) Nuk ka lidhje me reshjet acide
- C) Është ndotësi kryesor me përmbajtje squfuri
- D) Është bërë problem vetëm dekadat e fundit

39. Fluoruret:

- A) Futen ne organizem kryesisht me anë të ushqimeve,
- B) Merren ma anë të ujit të pishem,
- C) Mungesa e tyre ne uje ul incidencen e kariesit,
- D) Flurore me pakice-shfaqeje e flurozes,

40. Efektet shendetesore të pesticideve:

- A) Nuk prekin sistemin imun të organizmit,
- B) Nuk prekin organet e riprodhimit,
- C) Nuk demtojne lekuren,
- D) Kanëefektë teratogjenike,

41. Efektet ekstraauditive të zhurmave:

- A) Nuk lidhen me presionin arterial,
- B) Nuk ka crregullime të gjumit,
- C) Ndikon mbi sistemin imun,
- D) Rritja e irritabilitetit SNQ,

42. Programi i nje qyteti të shendetshem:

- A) Zgjedhjet janë multisektoriale,
- B) Rritje e pjesemarrjes ne vendimmarrje,
- C) Roli i publikut i papër fillshem,
- D) Nje akt dhe jo proces ne vazhdimesi,

43. Shëndeti mjedisor:

- A) Nuk lidhet me kualitetin e jetes,
- B) Nuk ndikohet nga faktoret sociale,
- C) Ka lidhje me agjentet biologjike,
- D) Nuk lidhet me shendetin e gjeneratave pasardhese,

44. Ekspozimi:

- A) Nuk merr ne konsideratë llojin e ndotesit,

- B) Ndikohet nga elementi kohe,
- C) Nuk ka lidhje me sasine e ndotesit,
- D) Nuk merr parasysh futjen e ndotesit,

45. Tranzicioni demografik:

- A) Lidhet me numrin e vdekjeve,
- B) Nuk ndikohet nga numri i lindjeve,
- C) Ndikon mbi numrin e popullates,
- D) Nuk ka lidhje me shendetin,

46. Problemet e shendetit mjedisor:

- A) Lidhen me migrimin, lindjet, etj,
- B) Nuk ndikohen nga varferia,
- C) Nuk lidhen me konsumin,
- D) Nuk ndikohen nga politikat makroekonomike,

47. Risku:

- A) Nuk është nje propabilitet
- B) Shfaqet kur ka patur nje ekspozim
- C) Është faktor qe Mund tëshkaktoje efektë shendetesor
- D) Asnjëra nga përgjigjet

48. Fusha elektromanjetike:

- A) Është nje rezatim i llojit jonizues
- B) Nuk haset rreth linjave elektrike
- C) Shkakton kataraktin e syrit
- D) Mund tëshkaktoje kancerin

49. Vleresimi i ekspozimit human:

- A) Doza është e veshtire të matet
- B) Me mire matja e për qendrimit
- C) Doza e marre nuk varet nga vecoritë e individit
- D) Doza nuk është ne funksion të kohes

50. Zhiva ( Merkuri ):

- A) Nxirret ne mjedis nga automjetet
- B) Për doret si antiseptic/antifungal
- C) Nuk për doret ne prodhimin e pasqyrave
- D) Nuk për doret ne punimet e veshjes me ar

51. Akumulimi i lendeve ndotese ne ajer:

- A) Nuk lidhet me relievin e tokes
- B) Nuk lidhet me levizjet e ajrit
- C) Lidhet me rezatimin diellor
- D) Nuk lidhet me inversionet tempër aturore

52. Efektet e drejtpërdrejta të oksidit të azotit janë:

- A) Nuk ka efekt në aparatën respirator
- B) Ka efekt në shpërndarjen e gjakut në mushkëri
- C) Është ndotës dytësor
- D) Asnjëra nga përgjigjet

53. Vendbanimet humanë si ekosisteme:

- A) Nuk lidhen me furnizimin me uje
- B) Nuk ndikohen nga ujërat e hapura
- C) Nuk lidhen me kushtet për jetën e eger
- D) Lidhen me qeverisjen lokale

54. Zhvillimi i qëndrueshem:

- A) Nuk lidhet me ekonomine
- B) Lidhet me brezat e ardhshem
- C) Nuk lidhet me mjedisin
- D) Asnjëra nga përgjigjet

55. Tranzicioni demografik nenkupton:

- A) Nr. I vdekjeve është I ulet
- B) Nr. I lindjeve është I ulet
- C) Për ben nje për iudhe
- D) Për ben nje moment

56. Rreziqet fizike janë:

- A) nga mjetet motorrike
- B) nga sportet
- C) nga rrezatimet
- D) Demtimet ne vendin e punës

57. Studimet e toksicitetit akut:

- A) Përdoren për matjen e toksicitetit të lëndëve
- B) Janë mjaftueshem të karakterizuara nga kimikatet
- C) Përdoren për kancerogenet
- D) Nuk përfshijnë DL50 dhe PL 50

58. Treguesi i viteve potenciale të humbura të jetes (VPHJ):

- A) Tenton të gjykoje humbjen e jetes humane
- B) Nuk lidhet me nr e viteve produktive të jetes qe humbasin
- C) Për doret për të për shkruar humbjen e kontributeve
- D) Demtimet shpjegojnë njëvegel të VPHJ

59. Gjykimi mbi riskun:

- A) Nuk lidhet me vendimmarrjet
- B) I domosdoshem krahasimi me standartet
- C) Nuk lidhet me publikun



D) Asnjëra nga përgjigjet

60. Indikatorët në shëndetin mjedisor:

- A) Janë të domosdoshëm në monitorimin e riskut
- B) Nuk lidhen me jetëgjatësinë e pritshme
- C) Nuk për fshijnë peshën në lindje
- D) Nuk për fshijnë vdekjet e parakohshme

61. Lëndet organike të avullueshme:

- A) Shkaktojnë iritimin e aparatit respirator
- B) Nuk janë problem për ajrin e brendshëm
- C) Nuk ndikojnë në krijimin e ozonit
- D) Asnjëra nga përgjigjet

62. Kontrolli i cilësisë së ajrit të jashtëm:

- A) Lidhet me vendet e ndërtimit
- B) Lidhet me kontrollin e emisioneve
- C) Nuk lidhet me transportin
- D) Nuk lidhet me energjinë

63. Kualiteti i ujit të pijshëm:

- A) Është i lidhur ngushtë me sasinë e ujit
- B) Nuk varet nga veprimtaria humane
- C) Nuk varet nga aktivitetet agrobujqësore
- D) Asnjëra nga përgjigjet

64. Zgjedhja e ushqimeve:

- A) Nuk lidhet me ndikimet kulturore
- B) Nuk varet nga mundësia e sigurimit të ushqimeve
- C) Nuk varet nga shija, era, paraqitja
- D) Varet nga kostoja dhe për shtatshmeria

65. Encefalopatia spongiforme:

- A) Shkaktohet nga një bakter
- B) Shkaktohet nga një ameba
- C) Ka si vektor kepushat
- D) Për hapet me ushqimin e gjedhit

66. Forma dhe rigiditeti i qelizës bakteriale janë si pasojë e :

- A) Membranes celulare
- B) Shtresës së peptidoglikanit
- C) Lipopolisaharideve
- D) Acideve teikoike

67. Në qelizat eukariotë nuk hyjnë:

- A) Bakteret

- B) Bimet;
- C) Protozoaret;
- D) Kerpudhat;

68. Cila nga keto substanca është prezentë ne spor por jo ne qelizën bakteriale vegetative:

- A) Peptidoglikani
- B) Fosfolipidet
- C) Acidi ribonukleik
- D) Acidi dipicolinik

69. Cila nga cilesitë e meposhtme është tipike për sporin bakterial:

- A) Fagocitoza
- B) Levizshmeria
- C) Termorezistenca
- D) Prodhimi i antibiotikeve

70. Fimbriet ose Pilet:

- A) Janë gjithmone me natyre proteinike
- B) Disa janë faktore virulence
- C) Disa bejne të mundur levizjen
- D) Janë të gjitha të verteta

71. Humbja e kapsules i ben bakteret :

- A) Të pa aftë për tu rritur
- B) Të pa aftë për ti rezistuar fagocitozes
- C) Me të ndjeshem ndaj antibiotikeve
- D) Me të lehtë për tu kultivuar

72. Muri i gram pozitiveve është i përbere nga:

- A) Nje shtrese e vetme peptidoglikani
- B) Nje shtrese e peptidoglikanit dhe membrana e jashtme
- C) Peptidoglikani, acidi teicoic dhe acidi lipoteikoik
- D) Membrana fosfolipidike e acidi teikoik

73. Ne cfare temperature vriten sporet bakteriale?

- A) 121°C
- B) 30° C
- C) 37°C
- D) 80°C

74. Ne ngjyrimin me Gram, rezultojne me ngjyre të kuqe:

- A) Bakteret Gram-pozitiv
- B) Bakteret Gram-negativ
- C) Bakteret sporogjene
- D) Bakteret anaerobe

75. Cili është momenti më i përshtatshëm për marrjen e hemokulturës?
- A) Kur temperatura ka rënë
  - B) Kur fillojnë frisonet
  - C) Në çdo moment të fazës febrile
  - D) Mbas etheve, kur temperatura po rritet
76. Cili nga mikroorganizmat e mëposhtëm përfshihet në patogjenezen e kariesit dentar?
- A) Streptococcus pneumoniae
  - B) Streptococcus mutans
  - C) Treponema pallidum
  - D) Echerichia coli
77. Cili është bakteri kryesor më i shpështë në infeksionet urinare?
- A) Salmonella typhi
  - B) Escherichia coli
  - C) Pseudomonas aeruginosa
  - D) Chlamydia trachomatis
78. Shfaqet në vazhdimësi në njëkomunitet duke përfshirë zakonisht vetëm një popullatë të paket:
- A) Epidemia
  - B) Pandemia
  - C) Endemia
  - D) Sëmundja sporadike
79. Është e vertetë se gripi :
- A) Shfaqet më të dridhura (frissonet)
  - B) Është infeksion viral
  - C) Shoqërohet edhe me vdekje
  - D) Mjekohet me tetracikline
80. Cila nga pohimet nuk është e vertetë për Giardia-n:
- A) Është bakter gram negative
  - B) Infeksion i zorrës holle
  - C) Transmetohet me rrugë fekal -orale
  - D) Trajtohet me flagyl
81. Cilat nga format nuk i përkojnë klasifikimit të baktereve:
- A) Sferike ose koke
  - B) Cilindrike
  - C) Spirale
  - D) Hekzagonale
82. Cila nga strukturat e mëposhtme nuk është kurrë në njëqelizë prokariote?
- A) Membrana qelizore
  - B) Ribozomet

- C) Berthama
- D) Flagjelet

83. Prokariotet, eukariotet dhe viruset Kanë të për bashket karakteristikën:

- A) Për mbajnë material gjenetik të për bere nga acid nukleik
- B) Për mbajnë gjenome të për bere nga adn
- C) Për mbajnë membranë plazmatike
- D) Për mbajnë berthame

84. Ne baktere levizshmeria i dedikohet:

- A) Ciljeve (pili)
- B) Glikokaliksit
- C) Pseudopodeve
- D) Flagjelit

85. Cila nga shprehjet është e saktë për transduksionin:

- A) Është proces i transferimit gjenetik i mundësuar nga bakterofagu
- B) Është një mekanizëm nëpër mjet të cilit qelizat transferojnë materialin gjenetik me kontakt fizik
- C) Është një mekanizëm ku qeliza për fiton një ADN prezentë në ambjent
- D) Është i mundësuar nga plamidi i pranishëm në qelizën dhuruese.

86. Mikroorganizmat oportunistë :

- A) Janë agjent të toksikoinfeksioneve alimentare
- B) Janë për gjegjes për infeksionet në për sonat me imunitet të rene
- C) Janë gjithnjë sensibil ndaj antibiotikeve
- D) Janë të pranishëm në indet njerzore të infektuara

87. Në ngjyrimin e Gramit rezultojnë me ngjyrë vjollë:

- A) Bakteret Gram -negativ
- B) Bakteret anaerob
- C) Vetëm bakteret G + aerob
- D) Bakteret Gram +

88. Flora bakteriale e traktit gastrointestinal për behet nga:

- A) Baktere anaerob
- B) Baktere aerob
- C) Në masë të barabartë nga baktere dhe viruse
- D) Për gjithsisht baktere anaerob por edhe aerob

89. Cila është simptoma me karakteristike në Bakteremi:

- A) Kolle e forte
- B) Tempër ature
- C) Diarre
- D) Të vjella

90. Është e vertetë që Interferonet INF
- A) Bejne pjese ne linjen e pare të mbrojtjes
  - B) Bejne pjese ne vijen e dytë të mbrojtjes
  - C) Janë grup proteinash
  - D) Frenojne sintezen e viruseve
91. Cili prej tyre është infeksion respirator
- A) Tërbimi
  - B) Ethja tifoide
  - C) Trikomoniaza
  - D) Pertusi
92. Cila nga të mëposhtmet nuk është e saktë për Toksoplazma Gondii ?
- A) Është protozoar i detyruar brendaqelizor
  - B) Është infeksion transplacentar
  - C) Transmetohet nga qente
  - D) Prek gjendrat limfatike
93. Karbohidratet kanë funksion:
- A) Enzimatik
  - B) Energjiprodhues
  - C) Strukturor
  - D) Kalorik
94. Është karbohidrat:
- A) Glicina
  - B) Glukoza
  - C) Bakri
  - D) Vitamina C
95. Proteinat e thjeshta:
- A) Kanë grup prostetik
  - B) Kanë vetëm amino acide
  - C) Kanë grup prostetik dhe amino acide
  - D) Nuk kanë aminoacide.
96. Vlera të ulura albuminemisë shkaktojnë:
- A) Ulje të presionit onkotik
  - B) Rritje të presionit hidrostatik
  - C) Rritje të presionit onkotik
  - D) Asnjë nga efektet e sipër përmendura
97. Acidi Aspartik është:
- A) Vitaminë
  - B) Aminoacid
  - C) Karbohidrat

D) Lipid

98. Trigliceridet janë

- A) Lipide të thjeshta
- B) Lipide të përbëra
- C) Karbohidrate
- D) Proteina

99. Acidi hialuronik është:

- A) Monosaharid
- B) Homopolisaharid
- C) Heteropolisaharid
- D) Asnjëra