

PROGRAM I PROVIMIT TË FORMIMIT PËR DEGËN MJEKËSI E PËRGJITHSHME

URDHËRI I MJEKUT

PËRMBAJTJA

A. SËMUNDJE TË BRENDSHME

1. ALERGOLOGJIA
2. KARDIOLOGJIA
3. GASTROHEPATOLOGJIA
4. ENDOKRINOLOGJIA
5. NEFROLOGJIA
6. PNEUMOLOGJIA
7. HEMATOLOGJIA
8. REUMATOLOGJI
9. NEUROLOGJIA
10. PSIKIATRIA
11. SËMUNDJE INFEKTIVE
12. SËMUNDJE PROFESIONALE

B. KIRURGJIA

1. KIRURGJIA E PËRGJITHSHME
2. UROLOGJIA
3. KARDIOKIRURGJI-ANGIOLOGJI
4. ORTOPEDI-TRAUMATOLOGJI
5. KIRURGJI INFANTILE
6. ANESTEZI-REANIMACION

C.ONKOLOGJI

D.OBSTETRIKË-GJINEKOLOGJI

E.PEDIATRI

F.MJEKËSI LIGJORE

G.FARMAKOLOGJI-TOKSIKOLOGJI KLINIKE

H.ORGANIZIM-MENAXHIM SHËNDETËSOR

I.ORL

J.OKULISTIKE

K.DIAGNOZË ME IMAZHE DHE PROCEDURA DIAGNOSTIKE TË PËRGJITHSHME

A. SËMUNDJE TË BRENDSHME

1. ALERGOLOGJIA

1. Të gjitha pohimet e mëposhtme në lidhje me astmen bronkiale janë të vërteta, me përjashtim të:

- A. është një sëmundje që karakterizohet nga inflamacioni i mukozës bronkiale
- B. është një sëmundje me natyrë kronike me riakutizime të shkaktuar nga faktorë të ndryshëm
- C. është një sëmundje e karakterizuar nga aksese dispneje dhe ndjesia e shtrëngimit në nivel të toraksit
- D. është një sëmundje e karakterizuar nga bronkospazma reversibile
- E. është një sëmundje që në mënyrë të pashmangshme shoqërohet me pamjaftueshmeri të zemrës për të kryer funksionin e saj

2. Nga barnat e poshtëshënuar rretho ato që ka efekt më të fuqishëm bronkodilatator:

- A. kortikosteroidët inhalator
- B. kortikosteroidët me rrugë orale
- C. beta 2 mimetikët
- D. antihistaminikët
- E. teofilina

3. Cili është kuptimi etimologjik i fjalës “alergji”:

- A. një reaksion i zakonshëm i organizmit
- B. një reaksion jo normal i organizmit
- C. një reaksion favorizues i organizmit
- D. një reaksion specifik i organizmit
- E. një reaksion i izoluar i organizmit

4. Polinozat para-pranverore janë pasojë e:

- A. Poleneve të pemëve
- B. Graminetë
- C. Shkurret
- D. Parietaria Judaica
- E. Dermatofagët

5. Polenët janë:

- A. struktura mashkullore riprodhimi të bimës

- B. struktura femërore riprodhimi të bimës
- C. struktura femërore dhe mashkullore riprodhi mi të bimës
- D. asnjë nga këto më lart

6. Astma bronkiale:

- A. përpara adoleshencës prek kryesisht femrat
- B. përpara adoleshencës prek kryesisht meshkujt
- C. përpara adoleshencës prek njëlloj të dy gjinitë
- D. është më e shpeshtë pas 40 vjeç
- E. është më e shpeshtë tek duhanpirësit se sa tek joduhanpirësit

7. Gjatë krizës të astmatike:

- A. FE është i rritur
- B. FVC është e rritur
- C. PEF është i ulur në mënyrë të parikthyeshme
- D. FE është i ulur
- E. Raporti FE/FVC është normal ose i rritur

8. Hipersensibiliteti i vonuar është karakteristik në të gjitha patologjitë e mëposhtme, me përjashtim të:

- A. Dermatiti i kontaktit
- B. Hipersensibiliteti nga tuberkulina
- C. Riflakja gjatë transplantit
- D. Sëmundja graft-versus-host pas transplantit të palcës kockore
- E. Sëmundja e serumit

9. Shkaku më i shpeshtë i angioedemës të izoluar që vihet re në të rriturit është:

- A. mungesa e inhibitorit të C1
- B. mungesa e funksionit fagocitar
- C. mungesa e IgA
- D. terapia me ACE-inhibitor
- E. Terapia me beta-blokues

10. Rinit alergjik klinikisht karakterizohet nga:

- A. Rrjedhja e sekrecioneve të ujshme nga hundët, dispne ne qetësi, teshtima, bllokim të hundëve

- B. Kruarje hundëve, dispne ne qetësi, teshtima, bllokim të hundëve
- C. Rrjedhja e sekrecioneve të ujhme nga hundët, dhimbje gjoksore, dispne ne qetësi, teshtima
- D. Rrjedhja e sekrecioneve të ujhme nga hundët, teshtima, kruarje të hundëve, bllokim të hundëve
- E. Kruarje të hundëve, dhimbje koke, teshtima , bllokim të hundëve

2.KARDIOLOGJIA

1. Niveli serik i peptidit atrial natriuretik në një pacient me insuficincë kardiake kronike është në përputhje me:

- A. moshën e pacientit
- B. gjininë dhe moshën e pacientit
- C. shkallën e dëmtimit të funksionit të zemrës
- D. vlerat e presionit sistolik
- E. nivelin e aterosklerozës në arteriet koronare

2. Cili prej barnave të poshtëshënuar është bari i zgjedhur për parandalimin e fibrilacionit ventrikular gjatë trajtimit të infarktut akut të miokardit?

- A. lidokaina
- B. digoksina
- C. kinidina
- D. flrkanidi
- E. propanololi

3. Të gjitha të mëposhtme janë shkaqe të ndalimit të zemrës me përjashtim të:

- A. Blllok atrioventrikular grada III-të
- B. Çrregullim i përçimit
- C. Asistolia
- D. Takikardia ventrikulare
- E. Shok volemik

4. Në rastet me angina pectoris të paqëndrueshme, cili bar duhet konsideruar si terapia mbajtëse, përveç barnave të nevojshëm për të kontrolluar simptomat e anginës?

- A. aspirina 100 mg/dita
- B. aspirina 325 mg/dita + calciparina 0.5 mg per 2/dita
- C. diltiazem 360 mg/die
- D. verapamil 240 mg + nifedibinë 40 mg/dita
- E. nitroderivate nën gjuhë sipas nevojës

5. Të gjithë barnat e mëposhtëm janë të nevojshëm në trajtimin e anginës gjoksore të paqëndrueshme me përjashtim të:

- A. Nitrateve
- B. Betablokuesve
- C. O₂

- D. Digoksinës
- E. Kalçiblokuesve

6. Duke patur parasysh fispatologjinë e shokut hipovolemik, cila nga veprimet e poshtëshënuara nuk duhet ndërmarrë?

- A. terapia me oksigjen
- B. pozicionimi i pacientit shtrirë me shpinë dhe me kokën e ulur
- C. aplikimi i terapisë me vazokonstriktor për të ruajtur presionin arterial
- D. aplikimi i terapisë endovenoze me solucione koloidale
- E. monitorimi i presionit venoz qëndror

7. Tamponada kardiake është një situatë emergjence e cila evidentohet gjatë një:

- A. goditje të fortë të toraksit
- B. stenoze të rëndë mitrale
- C. një aksidenti rrugor
- D. grumbullimit të likidit të presuar në hapsirën perikardiale
- E. stenoze të rëndë aortale

Përgjigjia e saktë është:D

8. Cil prej faktorëve të mëposhtëm riskant për zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare përgjigjet edhe për disfunktionin erektil:

- A. duhanpirja
- B. dislipidemia
- C. diabeti melitus
- D. të gjitha përgjigjet e mësipërme
- E. jeta sedentare

9. Cila nga ndryshime e poshtëshënuara është karakteristike e cor pulmonar:

- A. hipertrofia e ventrikulit të djathtë
- B. zgjerimi i ventrikulit të majtë
- C. shunti interventrikular majtas-djathtas
- D. persistimi i pulsit arterial
- E. sindroma Claude-Bernard-Horner

10. Të gjithë barnat antihipertensiv të shënuar më poshtë janë të kundërrindikuar në shtatzani, me përjashtim të:

- A. betablokuesit

- B. ACE-inhibitorët
 - C. kalçiantagonistët
 - D. nitratet
 - E. diuretikët
11. Hipertensioni arterial në insufiçencën renale kronike vjen si pasojë e:
- A. stnozës të arteries renale të njëjës veshkë
 - B. stnozës të arteries renale në të dy veshkat
 - C. rritjes të vëllimit jashtëqelizor si pasojë e retensionit sodik
 - D. hiperaldosteronizmit primar
 - E. sindromës Barter
12. Cila nga alterimet e mëposhtme elektrolitike sjell shfaqjen në EKG të një segmenti Q-T të zgjatur me praninë e një vale U?
- A. hipopotasemia
 - B. alkalozia
 - C. hiperkalçemia
 - D. hiperpotasemia
 - E. hiponatremia
13. Të gjitha situatat e mëposhtme janë shkaqe tipike të pamjaftueshmërisë zemrore distolike me përjashtim të:
- A. hipertensionit arterial me hipertrofi ventrikulare të majtë
 - B. takiaritmia
 - C. hipertiroidizmi
 - D. miokarditet virale
 - E. fibroza miokardiale
14. Cila shenjë nuk zbulohet në stnozën mitrale?
- A. zhurmë diastolike me përforcim presistolik
 - B. pulsi i shpejtë
 - C. theksim i tonit të dytë në apex
 - D. theksim i tonit të dytë në bazë
 - E. zhurmë në hapje të valvulës

15. Në stenozën e aortës cila nga shenjat e mëposhtme vihet re?
- A. pulsi kërcyes
 - B. pulsimi i arterieve karotide
 - C. pulsimi i arterive femorale
 - D. pulsi i vonuar
 - E. asnjë nga këto
16. Në stenozën e aortas, dëgjohet:
- A. toni i II-të në sistol
 - B. kërcitje në fillimin e hapjes të valvulës
 - C. zhurma diastolike
 - D. zhurmë sistolike zbrazëse në hapsirën interkostale të II-të
 - E. të gjitha këto
17. Cilin prej barnave të poshtë shënuar nuk do ja jepnit një pacienti, në EKG-në e të cilit kohët e fundit është evidentuar fibrilacion atrial:
- A. Beta-blokues+ACE-inhibitor
 - B. Digoksinë
 - C. Beta stimulues
 - D. Kumarol
 - E. Antagonist të kalçiumit
18. Kundërindikacion relativ në përdorimin e terapisë me digitalikë është:
- A. hipokalemia
 - B. hemibloku anterior i majtë
 - C. hipertiroidizmi
 - D. terapia me kortikosteroid
 - E. terapia me spironolakton
19. Në EKG e një pacienti me Torsade de pointes do të evidentohet:
- A. komplekse QRS të zgjeruara dhe bradikardi
 - B. komplekse QRS të zgjeruara dhe takikardi
 - C. komplekse QRS të ngushtuara dhe bradikardi
 - D. komplekse QRS të ngushtuara dhe takikardi

20. Sipas klasifikimit NYHA (New York Heart Association) të insuficiencës kardiake, të gjitha pohimet e më poshtme janë të vërteta me përjashtim të:

- A. në grupin e I-rë në prani të një kardiopatie organike nuk vihet re kufizim i dukshëm i aktivitetit fizik
- B. në grupin e IV-të simptomat e insuficiencës kardiake janë të pranishme edhe në qetësi
- C. edema deklive e kavilje të këmbës nuk bën pjesë në kritetret e klasifikimit
- D. prania e dhimbjes gjoksore e kalon situatën klinike automatikisht në grupin e III-të ose të IV-të
- E. pacientët e grupit të II-të janë asimptomatik në qetësi

21. Ekzaminimi i kërkuar normalisht për të konfirmuar diagnozën e anginës të qëndrueshme është:

- A. EKG-ja
- B. Koronarografia
- C. Kateterizimi i kornareve
- D. Prova ushtrimore
- E. Ventrikulografia

22. Cila prej shenjave dhe simptomave të mëposhtme është e pranishme në pacientët me insuficiencë kardiake kongjестive të rëndë?

- A. përqëndrimi i rritur plazmatik i ADH
- B. edema e gjeneralizuar
- C. rritja e përmasave të mëlçisë
- D. etje
- E. të gjitha këto më lart

23. Cila nga alternativat e poshtëshënuara paraqet shenjën patognomotike në elektrokardiogramën e një pacienti me fibrilacion atrial?

- A. zgjatje e intervalit QT
- B. subnivelimi i segmentit ST
- C. intervali PR > 0.20 msec
- D. mungesa e valës P
- E. kompleksi QRS i ngushtuar

24. Në një pacient me episode sinkopi, bllok atrioventrikular të plotë dhe kriza të shpeshta takikardie atriale është e nevojshme:

- A. përdorimi i terapisë me amiodaron
- B. përdorimi i terapisë me beta-blokues
- C. përdorimi i terapisë me verapamil
- D. përdorimi i terapisë me digitalik
- E. implantimi i një pace-makeri ventrikular

25. Cili prej elementëve të mëposhtëm mund të përdoret për të diferencuar insuficiencën ventrikulare të majtë nga insuficiencia ventrikulare e djathtë?

- A. Rritja e enzimave hepatike
- B. Edema pulmonare
- C. Asciti
- D. Edema periferike
- E. Tendosja e venave jugulare

26. Cili duhet të jetë bari që i duhet dhënë fillimisht një pacienti me hiperkalemi dhe komplekse QRS të zgjeruar në EKG?

- A. klorur kalçiumi
- B. kayexalate
- C. digoksin
- D. furosemid
- E. bikarbonat natriumi

27. Cili është elementi që haset më shpesh në kuadrin klinik të stnozës mitrale?

- A. prekordialgia
- B. hemoptizia
- C. dispnea
- D. iktus
- E. ngjirja e zërit

28. Cili prej këtyre ushtrimeve fizike këshillohet në parandalimin, kurimin dhe riaftësimin e pacientëve me sëmundje kardiovaskulare?

- A. anaerobik
- B. aerobik
- C. izokinetik
- D. force
- E. fuqie

29. Terapia në insuficiencën kardiake përfshin përdorimin e të gjithë barnave të poshtë shënuar me përjashtim të:

- A. beta-blokuesve
- B. ACE-inhibitorëve
- C. Statinave
- D. Eritropoetinës
- E. Diuretikëve

30. Cili është niveli i kolesterolit LDL që duhet të arrij një pacient me infarkt miokardi?

- A. < 130 mg/dl
- B. < 200 mg/dl
- C. < 100 mg/dl
- D. < 180 mg/dl
- E. < 110 mg/dl

31. Krizat e lipotimisë janë të shpeshta në:

- A. insuficiencën e aortës
- B. stnozën e aortës
- C. stnozën e istmusit aortal
- D. insuficiencën mitrale
- E. stnozën mitrale

32. Në infarkt in e miokardit cila prej enzimave të më poshtme rrite më shpejtë?

- A. Mioglobina
- B. SGOT
- C. LDH
- D. CK-MB
- E. Troponina

33. Në stnozën mitrale hasen të gjitha ndryshimet e më poshtme me përjashtim të:

- A. hipertrofi e arteriolave pulmonare
- B. hipertension venoz pulmonar
- C. hipertrofi atriale e majtë
- D. hipertrofi ventrikulare e majtë

- E. fremitus diastolik
34. Në EKG një ekstrasistol ventrikulare karakterizohet nga:
- A. kompleksi QRS i ngushtë ndjekur nga një pauzë kompesatore
 - B. kompleksi QRS i gjerë ndjekur nga një pauzë kompesatore
 - C. kompleksi QRS i gjerë ndjekur nga një pauzë jo kompesatore
 - D. kompleksi QRS i ngushtë ndjekur nga një pauzë jo kompesatore
 - E. kompleksi QRS i gjerë pa pauzë
35. Shkaku më i shpeshtë i pamjaftueshmërisë të zemrës është:
- A. disfunzioni diastolik i ventrikulit të majtë
 - B. disfunzioni sistolik i ventrikulit të majtë
 - C. hipovolemia
 - D. disfunzioni i ventrikulit të djathtë
 - E. shoku
36. Zhurma e Flint dëgjohet në:
- A. fibrilacion atrial
 - B. insuficiencë mitrale
 - C. stenoze aortale
 - D. insuficiencë aortale
 - E. duktus Botalli
37. Nga pikëpamja klinike fibrilacioni ventrikular karakterizohet nga:
- A. dispnea e rëndë
 - B. infarkti akut
 - C. arresti kardiocirkulator
 - D. cianoza
 - E. gishtat si shkop tamburi
38. Cili është ndërlikimi më i rëndë që vërehet në stenozen mitrale?
- A. Fibrilacioni atrial
 - B. Infarkti pulmonar
 - C. Infarkti miokardit
 - D. Embolia sistemike
 - E. Asistolia

39. Në pacientin hipertensiv graviteti i dëmtimit organor lidhet ngushtësisht me:

- A. presionin arterial të monitoruar në klinikë
- B. presionin arterial të monitoruar në shtëpi
- C. presionin arterial të monitoruar dy herë në ditë
- D. presionin arterial të monitoruar për 24 orë
- E. presionin arterial të monitoruar gjatë natës

40. Në cilën prej këtyre sëmundjeve degjohet një “klik” mezo-sistolik?

- A. insuficiencë mitrale
- B. prolaps i valvulës mitrale
- C. infarkt
- D. aneurizëm aortale
- E. defekt interventrikular

3.GASTROHEPATOLOGJIA

1.Një ikter i lehtë, i cili evidentohet duke parë sklerat e pacientit në dritë natyrale karakterizohet nga cilat vlera të bilirubinës serike:

- A. 1.5-2 mg/dl
- B. 3.5-4.5 mg/dl
- C. 2.5-3 mg/dl
- D. 1-1.5 mg/dl
- E. > 5 mg/dl

2.Në fazat fillestare të ileusit mekanik të kolonit kuadri klinik karakterizohet nga:

- A. të vjella fekaloidë
- B. krampe abdominale
- C. mbrojtje muskulare abdominale
- D. mungesë e peristaltikës
- E. temperaturë subfebrile

3. Një pacient paraqitet në shërbimin ambulator me likid të lirë peritoneal, splenomegali, hemorroide, hiperaldosteronizëm, mungesë e faktorëve të koagulimit dhe hipoalbuminemi . Drejt cilës patologji duhet të orjentohehi ne kete rast?

- A. Insuficiencë kardiake kongenitale
- B. Neoplazi abdominale
- C. Sindromë nefritike
- D. Cirroze hepatike
- E. Sëmundje limfoproliferative

4.Cili prej markuesve të mëposhtëm është tipik për periudhën fillestare të hepatitit B?

- A. HbsAg; HbeAg; anti HBc-IgM
- B. HbsAg; anti HBc-IgG
- C. HbsAg; HbcAg; anti HBe
- D. HbsAg; anti HBe
- E. Anti HBs; anti HBc

5.Janë përgjegjës për deficitin e vitaminës B12 të gjithë faktorët e mëposhtëm me përjashtim të:

- A. Dieta ushqimore e papërshtatshme (p. sh. dieta vegjetariane)
- B. Përthithja e pakët
- C. Eleminimi i shtuar

- D. Ulçera e ezofagut
- E. Keqpërdorimi

6. Metoda më e mirë për të vlerësuar një steatorre është:

- A. Testi me sakarozë
- B. Testi me ksilozë
- C. Dozimi i kriprave biliare
- D. Dozimi i yndyrnave fekale
- E. Biopsia e intestinit

7. Të gjitha pohime e më poshtme në lidhje me karcinomën e ezofagut janë të vërteta me përjashtim të:

- A. Incidenca është më e madhe në meshkuj (raporti mashkull/femër 3:1)
- B. Preket më shpesh segmenti i poshtëm i ezofagut
- C. Faktor riskant për zhvillimin e karcinomës është padyshim hernia hiatale
- D. Shpesh herë shoqërohet me fenomene disfagie
- E. Rreziku i sëmundjes është më i madh në njerëzit që pinë duhan se sa te ata që nuk pinë

8. Në urgjencë paraqitet një pacient 35 vjeç, që ka përdorur alkool për një kohë të zgjatur, i cili ankon për një dhimbje të fortë të menjëherëshme në regjionin periumbelikal dhe epigastrik që përhapet në të dy flanket dhe në segmentin e poshtëm torakal të kolonës vertebrale. Cila është diagnoza më e mundshme në këtë rast?

- A. Ulçera gastrike
- B. Ulçera duodenale
- C. Sëmundje e kolon trasvers
- D. Pankreatit akut
- E. Sëmundje e kolonit zbritës

9. Pacientët që vuajnë nga refluksi gastro-ezofageal:

- A. Vetëm shqetësime simptomatike pa sekela të rëndësishme
- B. Duhet të konsumojë sai të mëdha të karamелеve me mente dhe çokollata
- C. Kanë rrezik për të zhvilluar astëm, SPOK (Sëmundje Pulmonare Obstruktive Kronike), fibrozë pulmonare
- D. Nuk kanë rrezik për të zhvilluar neoplazi
- E. Të gjitha pohimet e mësipërme janë të vërteta

10. Megakolon toksik paraqitet si ndërlikim i një prej këtyre ssituatave:
- A. Rektokoliti ulçeroz
 - B. Sëmundja Crohn
 - C. Divertikuloza e kolonit
 - D. Enterokliti
 - E. Stenozat neoplastike të kolonit
11. Pankreatiti akut mund të shkaktohet nga të gjitha elementët e poshtëshënuar me përrshtim të:
- A. Kalkulozës biliare
 - B. Abuzimit me alkool
 - C. Ndërhyrjeve kirurgjikale në rrugët biliare ose në stomak
 - D. Toksina
 - E. Hipertrofia e pilorit
12. Shkaku më i shpeshtë i kolestazës ekstraheaptike është:
- A. Kalkuloza e koledokut
 - B. Parazitozat
 - C. Ligatura aksidentale e koleokut
 - D. Pankreatiti akut
 - E. Pankreatiti kronik
13. Shkaku i hipertensionit portal presinusoidal ekstrahepatik është:
- A. Parazitozat
 - B. Leuçemia mieloide
 - C. Cirroza heaptike
 - D. Tromboza e venës porta
 - E. Cirroza heaptike
14. Cili është një funksion i rëndësishëm fiziologjik i acideve biliare?
- A. favorizimi i ekskretimit të substancave toksike
 - B. favorizimi i absorbimit të vitaminës B12
 - C. ruajtja e Ph intestinal në normë
 - D. favorizon përthithjen e yndyrnave
 - E. favorizon përthithjen e aminoacideve

15. Parametrat laboratorik më të nevojshëm për monitorimin e aktivitetit të një procesi inflamator në hepatitin kronik janë::

- A. kriprat biliare
- B. bilirubina
- C. transaminazat dhe gamaglobulinat
- D. koha e protrombinës
- E. fosfataza alkaline

16. Simptoma e “pirozës retrosternale” është karkateristike për:

- A. ulçerën gastrike
- B. ulçerën duodenale
- C. gastritet autoimune
- D. sëmundjen e refluksit gastro-ezofageal
- E. gastritin nga Helikobakter pilori

17. Cila nga këto sëmundje mund të jetë shkaktare e komës hepatike?

- A. hepatiti kronik që ka evoluar drejt cirrozës
- B. ikteri obstruktiv nga kalkuloza
- C. cirroza hepatike e dekompesuar
- D. sëmundja Gilbert
- E. cirroza nga hepatiti B

18. Të gjithë barnat e poshtëshënuar përdoren në trajtimin e ulçerës peptidike, me përjashtim të:

- A. salazopirinës
- B. omeprazolit
- C. sukralfatit
- D. ranitidinës
- E. pirenzepinës

4.ENDOKRINOLOGJIA

1. Të gjitha situatat e më poshtme mund të shkaktojnë hipogliceminë me përjashtim të:

- A. Insulinoma
- B. Mungesa e glukozë-6fosfatit
- C. Sëmundja Addison
- D. Feokromocitoma
- E. Përdorimi i insulinës

2. Të gjitha situatat e më poshtme mund të shkaktojnë hipokalçeminë me përjashtim të:

- A. Hipoparatiroidizmi
- B. Sindroma Cushing
- C. Sekretimi i shtuar i kalçitoninës
- D. Hiperparatiroidizmi
- E. Mungesa e vitaminës D

3. Osteoporozja tip I lidhet me mungesën e hormonit:

- A. Kalçitoninë
- B. Testosteron
- C. Estrogjen
- D. Parathormon
- E. Tireotrop

4. Cilat anomali elektrolitike hasen më shpesh në sëmundjen Addison?

- A. Hiperglicemia
- B. Hipokalçemia
- C. Hipokalemia
- D. Hipernatremi dhe hipokalemi
- E. Hiponatremi dhe hiperkalemi

5. Sëmundja Graves:

- A. Është një shfaqje e mbifunksionit të surenales
- B. Është një formë hipotiroidizmi me etiologji autoimunitare
- C. Është një formë hipertiroidizmi
- D. Asnjë nga këto

6. Feokromocitoma është një neoplazi e cilës prej këtyre strukturave?

- A. Shtresës kortikale të gjëndrës mbiveshkore
- B. Shtresës medulës renale
- C. Shtresës medulare të gjëndrës mbiveshkore
- D. Hipofizës
- E. Timusit

7. Hipertiroidizmi sub-klinik shoqërohet me:

- A. Nivel të rritur të TSH
- B. Nivel të ulur të rT3
- C. Nivel të ulur të TSH dhe nivel normal të FT4
- D. Nivel të ulur të TSH dhe nivel të rritur të FT4
- E. Titër të rritur të antikorpeve

8. Cili nga hormonet e poshtë shënuar mund të japi hiponatremi nëse sekretohet me shumicë?

- A. Angiotenzina II
- B. PAN (peptidi natri uretik)
- C. Vazopresina/hormoni antidiuretik
- D. Aldosteroni
- E. Testosteroni

9. Pasojat klinike më të shpeshta në tiroiditin Hashimoto përfshijnë:

- A. Hipertiroidizëm subklinik
- B. Galaktorre
- C. Hipoparatiroidizëm
- D. Hipertiroidizëm në fazën e parë, hipotiroidizëm përfundimtar
- E. Sëmundje të tjera autoimune

10. Nivelet e rritura të prolaktinës mund të:

- A. Frenojnë sekrecionin pulsatil të GnRH
- B. Induktojnë ulje të testosteronit qarkullues
- C. Përcaktojnë rënien e libidos
- D. Të gjitha përgjigjet më lart janë të sakta
- E. Provokojnë amenorre

11. Në një pacient me ketoacidozë diabetikë duhet të ruhet:
- A. Fosfori
 - B. Bikarbonati
 - C. Kalçiumi
 - D. Kaliumi
 - E. Magnezi
12. Diabeti mellitus tip 1 shoqërohet me të gjitha elementët e poshtëshënuar me përjashtim të:
- A. Poliuri
 - B. Polifagi
 - C. Shtim në peshë
 - D. Polidipsi
 - E. Dhimbje abdominale
13. Akromegalia është:
- A. Një sëmundje e kockave
 - B. Një sëmundje e hasur në zonat malore
 - C. Një hipersekretim kronik i hormonit të rritjes pas pubertetit
 - D. Një sëmundje e rëndë maniakale
 - E. Policitemia e aviatorëve
14. Në cilën nga sëmundjet e më poshtme, ketoacidoza paraqitet si ndërlikim madhor dhe i shpeshtë:
- A. Diabeti tip 1
 - B. Diabeti tip 2
 - C. Hipertensioni arterial
 - D. Diabeti insipid
 - E. Hipertiroidizmi
15. Hipernatremia mund të vihet re në të gjitha situatat e mëposhtme me përjashtim të:
- A. Hiperkortikozes së adrenalit
 - B. Diabeti insipid
 - C. Abuzimi në përdorim të diuretikëve
 - D. Ushqyerja me sondë
 - E. Polidipsia e moshave të treta

16. Hipokalçemia është ndërlikimi që haset:
- A. Pas ushtrimeve fizike
 - B. Në hipogonadizëm
 - C. Pas tiroidektomisë totale
 - D. Pas menopauzës jatrogjenike
 - E. Gjatë trajtimit me anksiolitik
17. Cila prej familjeve enzimatike ndërhyjnë në procesin vaskular të erektimit:
- A. Hidroksilazat
 - B. Nitroksid-sintetazat + fosfodiesterazat
 - C. Peroksidazat
 - D. Aromatazat+hidroksilazat
 - E. Transferazat
18. Ushtrimet fizike të vazhdueshme:
- A. Rritin kolesterolin HDL
 - B. Ulin kolesteroleminë totale
 - C. Përmirësojnë tolerancën ndaj glucideve
 - D. Japin të gjithë efektet e përmendura më lart
 - E. Përmirësojnë BMI (Body Mass Index)
19. Cili është shkaku më i shpeshtë i insuficiencës akute kortikosurenale?
- A. Sindroma Sheehan
 - B. Insuficienca surenale sekondare si pasojë e ndërprerjes të trajtimit me steroid
 - C. Sindroma Schmid
 - D. Sindroma Waterhouse-Fridrischen
 - E. Insuficienca surenale primare me etiologji tuberkulare
20. Sasia ditore e proteinave që duhet të merren me dietë është:
- A. 40-50% të energjisë
 - B. 30-40% të energjisë
 - C. 0.8 gr/kg peshë
 - D. 1.5 gr/kg peshë
 - E. 2 gr/kg peshë

21. Në cilat vlera të BMI (Body Mass Index) do të konsiderohej një grua mbipeshë?
- A. Midis 20-25
 - B. Midis 25-30
 - C. Midis 30-35
 - D. Më shumë se 27.5
 - E. Më shumë se 30
22. Në cilën sëmundje vihet re një ulje e “peshës specifike” të urinës?
- A. Diabet mellitus
 - B. Cirroza hepatike
 - C. Diabet insipid
 - D. Hiperaldosteronizëm
 - E. Hipertension arterial
23. Cila nga këto ndryshime nuk vihet re në sëmundjen Addison?
- A. Rritje e sasisë të Na⁺ në gjak
 - B. Rritje e sasisë të K⁺ në gjak
 - C. Rritje e azotemisë
 - D. Hollim i urinës
 - E. Rritje e hematokriti
24. Në cilën sëmundje është e pranishme hiperkalemia?
- A. Sëmundja Addison
 - B. Diabet Mellitus
 - C. Sindroma Gilbert
 - D. Cirroza hepatike
 - E. Tireotoksikoza
25. Në kuadër të MEN 1 cili nga këto organe preket më rrallë?
- A. Gjëndrat paratiroide
 - B. Pankreasi
 - C. Hipofiza
 - D. Gjëndrat surenale
 - E. Të gjitha

26. Trajtimi i hiperaldosteronizmit primar përfshin:
- A. Dieta e varfër me kripë
 - B. Ndërhyrje kirurgjikale
 - C. Përdorim të spironolaktonit
 - D. Të gjitha të mësipërmet
 - E. Asnjë prej tyre
27. Në diagnozën e hipogonadizmit mashkullor është thelbësore të vlerësojmë:
- A. Përqëndrimin plazmatik të testosteronit të lirë
 - B. Përqëndrimin plazmatik të testosteronit total
 - C. LH, testosteron dhe SHBG
 - D. FSH, PRL dhe estradiol
 - E. Testi hCG për testosteronin
28. Obeziteti, steriliteti, hirsutizmi dhe ovari polikistik janë karakteristike të sindromit:
- A. Meniere
 - B. Turner
 - C. Frolich
 - D. Stein-Leventhal
 - E. Klinefelter
29. Të gjitha pohimet e më poshtme në lidhje me diabetin tip 2 janë të vërteta me përjashtim të:
- A. shoqërohet me insulinorezistencë
 - B. shoqërohet me obezitet
 - C. nuk ka shoqërim fmailjar
 - D. shoqërohet me HTA
 - E. shoqërohet me retinopati
30. Cili prej pohimeve të mëposhtme është i vërtetë në lidhje me tiroiditin subakut?
- A. Është forma më e shpeshtë e tiroiditit
 - B. Është me etiologji virale
 - C. Është me etiologji autoimune
 - D. Nuk shoqërohet me infiltrim granulomatoz
 - E. Prek kryesisht meshkujt e bardhë

5.NEFROLOGJIA

1.Në sindromën hepato-renale:

- A. në urinë vihet re hematuri
- B. kolesterolemia është e rritur
- C. diureza i kalon 1500 ml/ditë
- D. diureza është më pak se 300 ml/ditë
- E. glikozuria është e vazhdueshme

2.Insuficienca renale akut funksionale mund të jetë pasojë e:

- A. gurëve në rrugët urinare
- B. obstrukcionit të rrugëve urinare
- C. abuzimit me aminoglikane
- D. shterimit të vëllimit jashtëqelizor
- E. nekrozës kortikale bilaterale

3.Oliguria hipertoniqe, acidoza metabolike, hiperkalemia përputhen me kuadrin klinik-laboratorik të:

- A. diabetit mellitus të çekuilibruar
- B. diabetit insipid
- C. insuficiencës renale kronike
- D. fazës funksionale të insuficiencës renale akute
- E. fazës me poliuri të insuficiencës reanle akute

4.Fraksioni i ejeksionit të natriumit të filtruar normalisht është :

- A. më pak ose baraz me 1%
- B. 1.5-3%
- C. 3-4.5%
- D. 4.5-6%
- E. 6.5-8%

5.Hipokalçemia në insuficiencën renale kronike vjen si pasojë e:

- A. hiperkalçuriisë
- B. marrjen e pakët të kalçiumit me dietë
- C. mungesa e formës aktive të vitaminës D
- D. mungesa e PTH
- E. hiperparatiroidizëm

6. Cili prej mikroorganizmave të më poshtëm është shkaktari më i shpeshtë i pielonefritit akut:

- A. klebsiella
- B. klamidia
- C. esherikia
- D. pseudomonas
- E. candida

7. Janë gurë me natyrë radiotransparente:

- A. gurët e përbërë nga fosfati i kalçiumit
- B. gurët e përbërë nga oksalati i kalçiumit
- C. gurët me përbërje të përzjerë
- D. gurët e përbërë nga acidi urik
- E. gurët cistik

8. Në insuficiencen renale akute të tipit funksional pesha specifike e urinës është:

- A. e ulët
- B. e ndryshueshme
- C. e kushtezuar nga prania e cilindrave
- D. e rritur
- E. nuk mund të matet

9. Në poliurinë hipotonike pesha specifike e urinës është:

- A. midis 1020 dhe 1030
- B. më shumë se 1030
- C. më pak se 1006
- D. e barabartë me 1010
- E. midis 1010 dhe 1020

10. Të gjitha pohimet e mëposhtme përfaqësojnë shkaqe të hipokalemisë me përjashtim të:

- A. terapisë me ACE-inhibitor
- B. alkalozës metabolike
- C. sindromës Cushing
- D. të vjellave persistente
- E. terapisë me diuretik

11. Për të realizuar një transplant të veshkës, përputhshmëria sipas sistemit ABO:
- A. e domosdoshme vetëm nëse egziston përputhshmëria HLA
 - B. jo e domosdoshme nëse egziston përputhshmëria HLA
 - C. e panevojshme
 - D. e domosdoshme
 - E. e domosdoshme vetëm nëse është realizuar një transplant i mëparshëm
12. Sindroma nefrotike:
- A. përfaqëson një kuadër klinik të karakterizuar nga hipoalbuminemi e rëndë (< 3 g/dl)
 - B. paraqitet me një proteinuri mbi 2.5 g/ditë
 - C. paraqitet me insuficiencë renale
 - D. shoqërohet me gjendje hipokoagulimi dhe tendence për hemorragji
 - E. është gjithmonë një sëmundje parësore e veshkave
13. Pielonefrit akut është:
- A. një sëmundje që prek kryesisht meshkujt
 - B. prek kryesisht moshat e treta
 - C. karakterizohet nga prania e një temperature me natyrë septike
 - D. paraqitet me vlera normale të ERS dhe PCR
 - E. paraqitet me një neutropeni të theksuar
14. Cila nga këto shenja është patognomonike për glomerulonefritin me lezime minimale:
- A. proteinuria selektive
 - B. mikrohematuria
 - C. hiperazotemia
 - D. leukocituria
 - E. cilindruria
15. Të gjitha sëmundjet e më poshtme mund të çojnë drejt insuficiencës renale me përjashtim të:
- A. LES
 - B. Diabet mellitus
 - C. Amiloidozë
 - D. Mielosklerozë

E. Mieloma multiple

16. Në një paciente me probleme kardiake e cila trajtohet me furosemid, cili elektrolit duhet monitoruar me kujdes?

- A. Natrium
- B. Klor
- C. Kalium
- D. Kalçium
- E. Magnesium

17. Vlera normale të azotemisë dhe kreatinemisë do të konsideroheshin:

- A. Azotemia 2.0-4.0 mg/dl; Kreatinemia 0.4-0.8 mg/dl
- B. Azotemia 2.0-7.0 mg/dl; Kreatinemia 0.4-1.5 mg/dl
- C. Azotemia 7.0-20.0 mg/dl; Kreatinemia 0.6-3.5 mg/dl
- D. Azotemia 20.0-60.0 mg/dl; Kreatinemia 0.7-2.5 mg/dl
- E. Azotemia 60.0-70.0 mg/dl; Kreatinemia 0.4-1.5 mg/dl

6.PNEUMOLOGJIA

1. Të gjitha pohimet e mëposhtme në lidhje me insuficiencën respiratore janë të vërteta, me përjashtim të:

- A. raporti ventilim-perfuzion paraqitet i ndryshuar në SPOK (sëmundje pulmonare obstruktive kronike) dhe në emfizemën pulmonare
- B. hipoksia është gjithmonë e pranishme
- C. kapaciteti vital paraqitet i ulur në insuficiencën respiratore të tipit restriktiv
- D. hiperkapnia nuk është gjithmonë e pranishme
- E. përqëndrimi alveolar i oksigjenit është më i madh se ai i dioksidit të karbonit

2.Si paraqitet dispnea?

- A. gjithmonë në inspiracion
- B. gjithmonë në ekspiracion
- C. gjithmonë në inspiracion dhe ekspiracion
- D. varet nga presioni i gjakut në qarkullimin pulmonar
- E. ose në inspiracion ose në ekspiracion

3.Cianoza haset në të gjitha situatat e më poshtme me përjashtim të:

- A. poliglobulisë
- B. embolisë pulmonare
- C. metahemoglobinemisë
- D. qëndrimit për kohë të zgjatur në lartësi të mëdha mbi nivelin e detit
- E. anemise të rënde

4.Versamenti pleural paraqitet me natyrë hemorragjike në të gjitha situatat e poshtë shënuara me përjashtim të:

- A. embolisë pulmonare
- B. karcinomës pulmonare
- C. insuficiencës kardiake
- D. mezoteliomës
- E. karcinomës të gjëndrave mamae

5.Imunoglobulinat sekretore IgA prodhohen nga:

- A. pneumocistet tip 1
- B. pneumocistet tip 2
- C. qelizat endoteliale
- D. qelizat e epitelit bronkial

E. makrofagët alveolar

6. Acidoza respiratore e çekuilibruar, në astrupogramë karakterizohet nga:

- A. rritje e Ph, rritje e PaO₂, ulje e PaCO₂
- B. ulje e Ph, rritje e PaCO₂
- C. ulje e Ph, ulje e PaCO₂
- D. rritje e Ph, ulje e PaCO₂
- E. Ph normal, PaCO₂ i ulur

7. Shkaku kryesor i bllokimi të rrugëve ajrore në një pacient i cili ka humbur vetëdijen është:

- A. rënia e gjuhës prapa
- B. fleksioni i epiglotisit
- C. bronkospazma
- D. bllokimi nga grumbullimi i pështymës
- E. kolabimi i trakesë

8. Në insuficiencën respiratore në një pacient obez:

- A. alterimi i funksionit mbizotëron gjatë fazës të inspirimit
- B. alterimi i funksionit mbizotëron gjatë fazës të ekspirimit
- C. të dy fazat e ajrosjes të mushkërive janë të prekura
- D. ka ndryshuar shkëmbimi alveolo-kapilar i gazeve
- E. rritet vëllimi rezidual

9. Në cilën formë të insuficiencës respiratore rritet gjithmonë PaCO₂?

- A. në insuficiencën ventilatore të pompës
- B. në insuficiencën e shkëmbimit të gazeve në mushkëri
- C. në pamjaftueshmërinë e oksigjenit që marrë/transportuar dhe përdorur
- D. në asnjë nga këto raste

10. Cila nga këto është shkaku më i shpeshtë i embolisë pulmonare?

- A. tromboza e venave sipërfaqësore të gjymtyrëve të poshtme
- B. tromboza në atriumin e djathtë
- C. tromboza e venave të thella të gjymtyrëve të poshtme
- D. endokarditi bakterial
- E. embolia gazoze nga vatrat e frakturave

11. Të gjitha pohimet e më poshtme në lidhje me apnenë obstruktive të gjumit janë të vërteta me përjashtim të:

- A. favorizohen nga përdorimi i pijeve alkolike
- B. shoqërohen me periudha të zgjatura hipoksie dhe hiperkapnie
- C. shkaktjnë një frenim të sistemit nervor simpatik
- D. vihen re në personat që janë shumë obez
- E. faringju në këto raste është lehtësisht i kolabueshëm

12. Cili është shkaku më i shpeshtë i embolisë pulmonare?

- A. fibrilacioni atrial
- B. endokarditi bakterial
- C. abuzimi me substanca narkotike
- D. tromboza venoze e thellë e gjymtyrëve të poshtme
- E. tromboza e venës cava

13. Cili është trajtimi i zgjedhur në mikrocitomën pulmonare të stadi të IV?

- A. kirurgji
- B. kemioterapi
- C. radioterapi
- D. imunoterapi
- E. të gjitha përgjigjet më lart janë të vërteta

14. Një zgavër pulmonare që vihet re në radiografi mund të jetë shprehje e njërës prej këtyre patologjive me përjashtim të:

- A. tuberkulosi post-primar
- B. micetoma
- C. pneumonia nga stafilokoku
- D. pneumonia nga mycoplasma pneumoniae
- E. pneumonia nga pneumocistis carinii

15. Shkaku më i shpeshtë i atelektazës pulmonare lobare është:

- A. infarkti pulmonar
- B. pneumonia pneumokoksike
- C. pneumonitë virale
- D. inhalimi i materialeve ushqimore
- E. bronhektazia

16. Cili prej barnave përdoret më shpesh në profilaksinë ndaj tuberkulozit?

- A. rifampicina
- B. izoniazidi
- C. etambutoli
- D. pirazinamidi
- E. streptomocina

17. Në riakutizimet e Sëmundjes Pulmonare Obstruktive Kronike, antibiotiku i zgjedhur duhet të veprojë në mënyrë aktive kundrejt të gjithë këtyre mikroorganizmave me përjashtim të:

- A. haemophilus influenzae
- B. streptokokut pneumonie
- C. stafilokokut aureus
- D. moraxella catarrhalis
- E. pseudomonas aeruginosa

18. Si lexohet testi i tuberkulinës?

- A. duke matur sipërfaqen e skuqur
- B. duke matur diametrin e skuqjes
- C. duke matur diametrin e papulës
- D. duke matur sipërfaqen e papulës
- E. duke palpuar zonë e ngritur mbi lëkurë

19. Cili prej këtyre trajtimeve është në gjendje të rriti mbijetesën në pacientët me SPOK?

- A. bronkodilatatorët
- B. oksigjenoterapia e zgjatur
- C. antikolinergjikët
- D. ventilimi mekanik
- E. kortikosteroidët

20. Cili gjen onkosupresor akuzohet si kryesori në gjenezën e tumorit pulmonar:

- A. p47
- B. p53
- C. RAS
- D. Myc

E. Fos

21. Si përkufizohet empiema pleurale?
- A. grumbullim i limfës në hapësirën pleurale
 - B. grumbullim i koagulave në hapsirën pleurale pas pneumoektomisë
 - C. grumbullim i materialeve purulente në hapsirën pleurale
 - D. grumbullim i ajrit dhe gjakut në hapsirën pleurale
 - E. grumbullim i serumit në hapsirën pleurale
22. Në bazë të cilave kritere përcaktohet aktiviteti i tuberkulozit pulmonar?
- A. klinike
 - B. radiologjike
 - C. klinike, radiologjike, mikrobiologjike
 - D. mikrobiologjike
 - E. klinike dhe mikrobiologjike
23. Ku lokalizohet geni përgjegjës për fibrozën cistike?
- A. në kromozomin 5
 - B. në kromozomin 13
 - C. në kromozomin 7
 - D. në kromozomin 11
 - E. në kromozomin 3
24. Kundërrindikacion absolut për realizimin e bronkoskopisë janë:
- A. kolla
 - B. rastet kur dyshohet për fistul trakeozofageale
 - C. abceset pulmonare të përsëritura
 - D. gjendja kardiovaskulare e paqëndrueshme dhe aritmia kardiake
 - E. versamenti pleural

7. HEMAT OLOGJIA

1. Të gjitha pohimet e më poshtme për limfomën Hodking janë të vërteta me me përjashtim të:

- A. shoqërohet me limfadenopati uni ose bilaterale jo të dhimbshme
- B. në disa pacientë sëmundja fillon si një prurit i gjeneralizuar
- C. trajtimi dhe prognoza varen nga stadi klinik i sëmundjes
- D. temperatura, djersitja dhe humbja mbi 10 % në peshë tregojnë për përkeqësim të prognozës
- E. limfoma Hodking paraqitet rezistente vetëm ndaj trajtimit meradioterapi

2. Në cilën patologji rruazat e gjakut janë në formën e “tabelës të qitjes”

- A. anemi hemolitike autoimune
- B. talasemi
- C. leuçemia akute
- D. limfoma jo Hodking
- E. sëmundja Addison

3. Në aneminë nga mungesa e hekurit cili është ekzaminimi i vetëm që na jep një vlerësim të plotë në lidhje me rezervat e hekurit?

- A. MCV
- B. hemoglobina
- C. hemoglobina korpuskulare mesatare
- D. ferritina serike
- E. transferina serike

4. Në policiteminë vera vihet re:

- A. ulje e vlerës të hemoglobinës + eritrocitozë
- B. rritje e vlerës të hemoglobinës + eritrocitozë
- C. ulje e vlerës të hemoglobinës dhe ulje e sasisë të rruazave të kuqe
- D. rritje e vlerës të hemoglobinës dhe ulje e sasisë të rruazave të kuqe
- E. rritje ose ulje jo sinjifikante e vlerës të hemoglobinës + ulje e sasisë të rruazave të kuqe

5. Tek një femër 23 vjeç diagnostikohet një anemi mikrocitare. Cili është shkaku më i shpeshtë:

- A. hemorragjia kronike

- B. beta-talasemia major
- C. alfa-talasemia
- D. mungesa në folate
- E. mungesa në vitaminë B 12

6. Në leuçeminë limfatike kronike gamaglobulinat janë:

- A. të ulura
- B. mungojnë
- C. normale
- D. të rritura
- E. shumë të rritura

7. Vitamina B12 përthithet :

- A. në nivel gastrik
- B. në nivel duodenal
- C. në nivel të ileusit terminal
- D. në nivel të kolonit
- E. përgjatë traktit tretës

8. Deformimi në formë drapri e rruazave të kuqe të gjakut vjen si pasojë e:

- A. difekteve në prodhimin sasiar të hemoglobinës
- B. ndryshimeve mitokondiale
- C. antitropave
- D. çrregullimeve elektrolitike
- E. ndryshimeve cilësore në hemoglobinë

9. Trajtimi i zgjedhur në leuçeminë mieloide kronike në një subjekt në moshë të re është;

- A. radioterapi
- B. monokemioterapia
- C. polikemioterapi
- D. terapia me interferon
- E. transplantimi alogjenik i palcës kockore

10. Diagnoza e leuçemisë akute mund të vendoset vetëm me anë të;

- A. biopsisë të limfonodulit
- B. ekzaminimit të formulës leukocitare

- C. mielogramës
- D. biopsisë të shpretkës
- E. gjakut periferik

11. çfarë kuptoni me hiatus leuçemik?

- A. një ndërlikim të leuçemisë
- B. mungesën e elementëve të ndërmjetëm (midis të pjekurve dhe të papjekurve) në gjakun periferik
- C. një bar me efekte antiblastike
- D. mungesën e elementëve të pjekur plotësisht në palcën kockore
- E. të gjitha më lart

12. Në limfomën Hodking vihen re të gjithë elementët e më poshtëm me përjashtim të:

- A. uljes të aktivitetit të limfociteve T
- B. rritje të rrezikut për të zhvilluar lehtësisht infeksione tuberkulare
- C. limfonoduj të vegjël dhe shumë të dhimbshëm
- D. anemi normokrome normocitare
- E. tendencë për infeksione mykotike

13. Në hemofili paraqitet e ndryshuar nga vlerat normale:

- A. koha e hemorragjisë
- B. koha e koagulimit
- C. koha e protrombinës
- D. brishtësia kapilare
- E. eritrosedimenti

14. Gjatë ekzaminimit të një pacienti me Purpur Idopatike Trombocitopenike, përveç petekieve dhe ekimozave, mund të vërehet:

- A. splenomegali
- B. limfadenomegali
- C. hepatomegali
- D. një ekzaminim objektiv normal
- E. temperaturë

8.REUMAT OLOGJI

1. Cila nga terapitë e më poshtme konsiderohet si mjekim i zgjedhur në trajtimin mbajtës të një pacienti me artrit reumatoid të diagnostikuar për herë të parë?

- A. AIJS
- B. prednizon 40 mg/ditë
- C. metotraksat (10 mg/javë) + AIJS + kortikosteroid me doza të ulta
- D. AIJS + minociklina
- E. paracetamol sipas nevojës

2. Fenomeni Raynaud mund të shoqërohet me:

- A. erizipelë
- B. sklerodermi
- C. dermatit
- D. tromboflebit
- E. limfadenit

3. Arteriti Horton mund të ndërlikohet me:

- A. aneurizëm të aortës abdominale
- B. disekim të harkut të aortës
- C. bllokim të arteries subklave
- D. klaudikacio të përtypjes dhe të kafshimit
- E. të gjitha më lart janë të vërteta

4. Polimialgjia reumatizmale:

- A. është një sinovit jo eroziv i artikulationit skapulohumeral dhe strukturave përreth
- B. prek kryesisht meshkujt < 40 vjeç
- C. shkaktohet nga infeksione të shpeshta streptokoksise të tonsilave
- D. shoqërohet me purpurën Schonlein-Henoch
- E. karkaterizohet nga antikorpi JO1 pozitiv

5. Cili nga këto barna përdoret në terapinë e podagrës?

- A. penicilamina
- B. klofibratet
- C. kolestiramina
- D. kortizoni
- E. alopurinoli

6. Në cilën patologji vihet re kuadri radiologjik i “shkopit të bambusë”?
- A. Sindroma Reiter
 - B. Artriti Reumatoid
 - C. Spondilit ankilozant
 - D. Enteroartriti
 - E. Sindroma Sjogren
7. Në moshat e treta, verbëria mund të jetë pasojë e :
- A. infarkt të miokardit
 - B. arteriopative periferike
 - C. arteritit Horton
 - D. koleritit ulçeroz
 - E. hernies hiatale
8. Në artritin reumatoid nuk preket një nga këto artikulacione:
- A. talokrurali
 - B. radiokarpali
 - C. skapulohumerali
 - D. bërryli
 - E. sakroiliaku
9. Të gjithë faktorët e më poshtëm janë faktor rreziku për të zhvilluar osteoporozë me përjashtim të:
- A. menopauzës të parakohshme kirurgjikale
 - B. duhanpirjes
 - C. terapisë me fenobarbital
 - D. jetës sedentare
 - E. obezitetit
10. Në cilën prej patologjive të mëposht me janë specifike antitrupe anti-CCP?
- A. Spondilit ankilozant
 - B. LES
 - C. Artrit reumatoid
 - D. Sëmundja Behçet
 - E. Artrit psoriatik

11. Manifestimi kryesor i granulomës së Wegener është:

- A. në mushkri
- B. në zorrë
- C. në sy
- D. në lëkurë
- E. në vesh

12. Antitruapat anti-SSA dhe anti-SSB takohen më shpesh në:

- A. artritin reumatoid
- B. polikondrit
- C. sindromën Sjogren
- D. artritin psoriatik
- E. sëmundjen Behçet

9.NEUROLOGJIA

1. Ataku ishemik tranzitor zgjat për:

- A. < 1orë
- B. <12 orë
- C. < 24 orë
- D. < 1 javë
- E. < 1 muaj

2. Të gjitha pohimet e mëposhtme në lidhje me sëmundjen e Parkinsonit janë të vërteta me përjashtim të:

- A. dridhja ka frekencë 10-12 Hz
- B. sëmundja shkaktohet nga defiqiti i dopaminës
- C. paqëndrueshmëria posturale është shkaku kryesor i paaftësisë në lëvizje
- D. sëmundja mund të trajtohet me amantadinë
- E. sëmundja është më pak e shpeshtë se demenca nga Alzheimer

3. Neuralgjia trigeminale është më e shpeshtë në:

- A. fëmijë dhe gra
- B. burra dhe të moshuar
- C. gra dhe të moshuar
- D. fëmijë dhe burra
- E. gra dhe adoleshentë

4. Cili nga këto barna përdoret në trajtimin e epilepsisë temporale?

- A. karbamazepina
- B. levodopa
- C. butirrofenoni
- D. triciklikët
- E. fenotiazina

5. Cili nga faktorët e mëposhtëm nuk është shkaktar i krizës epileptike?

- A. përdorimi i tepruar i alkoolit
- B. mungesa e gjumit të natës
- C. temperatura e rritur
- D. dehidrimi
- E. duhanpirja

6. Të gjithë faktorët e poshtë shënuar janë faktor rreziku për sëmundjen Alzheimer me përjashtim të:

- A. traumave kraniale
- B. duhanpirjes
- C. moshës mbi 60 vjeç
- D. anamneza familjare pozitive
- E. sindroma Down

7. Në cilën prej këtyre situatave është më i nevojshëm përdorimi i EEG?

- A. koma
- B. demenca
- C. iktus
- D. vertigo
- E. cefale

8. Shfaqja fillestare e miastenisë gravis është:

- A. disfagi dhe disfoni
- B. lodhje kronike
- C. ptozë palpebrale dhe diplopi
- D. çrregullime të fymëmarrjes
- E. akne në lëkurë

10. PSIKIATRIA

1. Diskinezia tardive:

- A. simptomë e efektit të neuroleptikëve
- B. simptomë e alkolizmit
- C. simptomë e skizofrenisë
- D. simptomë e demencës
- E. simptomë e depresionit

2. Një person i prekur nga kleptomania:

- A. zakonisht ka para për të paguar atë që vjedh
- B. e ka të pamundur ti rezistojë vjedhjes të objekteve me pak vlerë monetare
- C. nuk i përdor objektet e vjedhura
- D. nuk ka bashkëpunorë
- E. të gjitha më lart

3. Abuzimi me kokainë mund të çojë drejt:

- A. tolerancës
- B. vartësisë
- C. neurozës
- D. psikozës
- E. abstinencës

4. Frika është:

- A. një çrregullim i personalitetit
- B. një çrregullim në mënyrën e të menduarit
- C. një simptomë e sëmundjeve me natyrë psikiatrike
- D. një çrregullim i perceptimit
- E. një simptomë e depresionit

5. Haluçinacionet në skizofreni janë kryesisht me natyrë:

- A. degjimore
- B. olfaktive
- C. taktile
- D. vizive
- E. nuk ka haluçinacione

6. Depresioni bën pjesë:

- A. në çrregullimet e humorit
- B. vetëm në çrregullimet me natyrë psikotike
- C. në alterimet e gjendjes të vetëdijes
- D. çrregullimet e perceptimit
- E. të gjitha më lart janë të sakta

7. Depresioni madhor përcaktohet si:

- A. prania e të paktën tri episodeve depressive për tri vite në vazhdim
- B. prania e dy apo më shumë episodeve depressive me intervale dy mujore përmirësimi
- C. shfaqja e depresionit në periudha të caktuara të vitit, veçanërisht në pranverë dhe vjeshtë
- D. të gjitha përgjigjet janë të sakta
- E. asnjë përgjigje nuk është e saktë

8. Barnat antidepresiv veprojnë në:

- A. membranat e neuroneve pre dhe post sinaptik
- B. në nivel intraqelizor
- C. lidhen me monoaminat në hapësirën post sinaptike
- D. veprojnë si endorfina
- E. asnjë nga përgjigjet më lart

9. Personaliteti histroinik (histerik) karakterizohet nga të gjitha ndryshimet më poshtë me përjashtim të:

- A. sjellja në mënyrë racionale
- B. paqëndrueshmëria emocionale
- C. kërkesa për vëmendje
- D. vartësia
- E. sjelljet joshëse

11. SËMUNDJE INFEKTIVE

1. Të gjithë agjentët patogjen të poshtë shënuar janë shkaktar të shokut septik me përjashtim të:

- A. kokeve gram + (stafilokok, enterokok)
- B. leptospirës
- C. enterobaktereve
- D. pseudomonas
- E. neisseria meningitis

2. Infeksioni nga HIV shoqërohet me të gjitha alterimet imunologjike të shënuar më poshtë me përjashtim të:

- A. ulje e numrit të limfociteve T4 (helper) qarkullues
- B. raporti i qelizave T4 dhe T8 (supresor) >1
- C. ulje të veprimtarisë të qelizave T citotoksike
- D. rritje të funksionit të beta2 mikroglobulinës
- E. mungesa e antigenëve në lëkurë për të gjithë testet kutane

3. Cila sëmundje infektive transmetohet me rrugë orofekale?

- A. difteria
- B. malaria
- C. sifilisi
- D. herpesi
- E. tifo

4. Për cilin infeksion kongenital do të dyshonim në një të porsalindur me mikrocefali, kalçifikime cerebrale, korioretinit?

- A. varicella zoster virus
- B. herpes simplex virus
- C. toksoplazma
- D. citomegalovirus
- E. HIV

5. Në helmimin ushqimor nga Clostridium perfringens simptomat shfaqen :

- A. menjëherë pas ngrënies
- B. 1-6 orë pas përdorimit të ushqimit të kontaminuar
- C. 6-24 orë
- D. 1-2 ditë

E. 3-4 ditë

6. Parazitizat shoqërohen me:

- A. mungesë të IgM
- B. mungesë të IgG
- C. rritje të IgE
- D. rritje të IgA
- E. mungesë të IgA

7. Cila prej këtyre sëmundjeve është një zoonozë?

- A. askaridoza
- B. shistosomiaza
- C. amebiaza
- D. toksoplazmoza
- E. enterobiaza

8. Sepsis karakterizohet nga:

- A. prania e përkohshme e baktereve në gjak
- B. hiporeaktiviteti ndaj një infeksioni
- C. hedhja e vazhdueshme e baktereve në gjakun qarkullues, nga një vatër e lokalizuar infeksioni
- D. lokalizimi i infeksionit në një apo dy organe
- E. përgjigje e egzagjeruar e organizmit ndaj një infeksioni

9. Herpes Zoster shkaktohet nga:

- A. i njëjti virus me atë të varicelës
- B. nga një virus i ngjashëm me atë të varicelës
- C. nga një Rinovirus me ADN
- D. nga një Enterovirus
- E. nga një Koksaki virus

10. Neoplazia më e shpeshtë në AIDS është:

- A. sarkoma e Kaposit
- B. adenokarcinoma e laringut
- C. leuçemia limfatike kronike

- D. adenokarcinoma gastrike
- E. adenokarcinoma pulmonare

11. Diarrea e udhëtarëve shkaktohet më shpesh nga:

- A. Stafilokoku aureus
- B. Herpes virus
- C. Mycobakterium bovis
- D. Eschericia coli enterotoksike
- E. Campylobacter jejuni

12. HIV transmetohet me anë të:

- A. Djersës
- B. Pështymës
- C. Lotëve
- D. Urinës
- E. Gjakut

13. Hepatitet që transmetohen me rrugë oro-fekale janë:

- A. Hepatiti A dhe E
- B. Hepatiti B
- C. Hepatitit C dhe D
- D. Hepatiti a dhe B
- E. Hepatiti A dhe C

14. Manifestimet më të shpeshta që shfaqen nga infeksioni fillestar me Herpes Simplex tip 1 janë:

- A. Herpes labial
- B. Gingivo-stomatite
- C. Ezofagite
- D. Hepatite
- E. Encefalite

12. SËMUNDJE PROFESIONALE

1. Cili është një element tjetër i rëndësishëm, përveç anamnezës, në vendosjen e diagnozës të pneumokoniozës?

- A. shinitgrafia pulmonare
- B. provat funksionale
- C. lavazhi bronkoalveolar
- D. radiografia torakale
- E. astrupograma

2. Silikoza shkaktohet nga:

- A. bioksidi i lirë i silicit
- B. bioksidi i lidhur i silicit
- C. tetraoksidi i silicit
- D. silici i lirë
- E. asnjë nga përgjigjet më lart

3. Ndërlikimi më i shpeshtë i asbestozës pulmonare është:

- A. pneumotoraksi
- B. mezotelioma pulmonare
- C. karcinoma spinoqelizore
- D. adenokarcinoma pulmonare
- E. asnjë nga përgjigjet më lart

4. Prania e kalçi fikimit në formën e “lëvozhgës të vezës” e limfonodujve hilar, është tipike e cilës pneumokoniozë?

- A. asbestozës
- B. beriliozës
- C. silikozës
- D. talkozës
- E. asnjë nga përgjigjet më lart

B KIRURGJIA

- 1 Cili prej ekzaminimeve diagnostike ndihmon më shumë se të tjerët në vendosjen e diagnozës së kancerit gastrik:
 - A- Rx i aparatit tretës
 - B- Ezofagogastroskopi me biopsi
 - C- TAC
 - D- Ekzaminimi citologjik i lëngut gastrik
 - E- Echografia

- 2 Ndërhyrja kirurgjikale, ku lidhet vena spermaticke është e sugjeruar në terapinë e:
 - A- Sëmundja e La Peyronie (Induratio penis plastica)
 - B- Torsioni i funikulit
 - C- Varikocеле
 - D- Criptorchidisis
 - E- Hydrocela komunikuese

- 3 Cila prej këtyre manovrave shkakton dhimbje, kur kemi të bëjmë me kolecistit?
 - A- Murphy
 - B- Blumberg
 - C- Giordano
 - D- Mc Burney
 - E- Të gjitha përgjigjet e mësipërme

- 4 Trajtimi i menjëhershëm i pneumotaraksit hipertensiv jo traumatik bazohet në:
 - A- Torakotomi
 - B- Intubim
 - C- Drenimin pleural
 - D- Terapi me antibiotikë
 - E- Regjim shtrati absolut

- 5 Cilat janë simptomat më të zakonshme të kancerit të vezikës urinare?

- A- Infeksionet urinare periodike e të vazhdueshme
- B- Inkontinencë urinare
- C- Hematuri
- D- Polakiuri
- E- Dizuri

6 Cili prej vlerësimeve të mëposhtëm është parësor, kur kemi të bëjmë me një pacient të politraumatizuar?

- A- Kontrolli i gjëndjes së ndërgjegjes
- B- Kontrolli i frymëmarrjes
- C- Kontrolli i lirshmërisë së rrugëve ajrore
- D- Kontrolli i aktivitetit kardiocirculator
- E- Kontrolli i presionit arterial

7 Carcinoma e mamelës klasifikohet si T2 nëse dimensionet e saj janë:

- a. më të mëdha se 1 cm, por më të vogla se 2,5 cm
- b. më të mëdha se 2 cm, por më të vogla se 3,1 cm
- c. më të mëdha se 2 cm, por më të vogla se 5,1 cm
- d. midis 3 e 5 cm
- e. midis 3 e 6 cm

8 Konsiderohet si indikacion për trasplant hepari tek të rriturit:

- A- Hepatosteatoza akute e shtatzanisë
- B- Cirroza biliare primitive
- C- Cholangiti sklerozant
- D- Të gjitha përgjigjet
- E- Asnjëra prej përgjigjeve

9 Cili është shkaku më i shpeshtë i ikterit obstruktiv:

- a. Shtypjet e jashtme
- b. Lezionet jatrogjene
- c. Kanceri hepatic
- d. Kanceri i kokës së pankreasit
- e. Inflamacion i rrugëve biliare extrahepatike

- 10 Cili prej organeve preket më shpesh në traumat e mbyllura të abdomenit?
- A- Hepar
 - B- Lien (shpretka)
 - C- Stomaku
 - D- Vezika urinare
 - E- Pankreasi
- 11 Në një pacient me obstrukcion neoplazik të koledokut, kolecista është:
- a. asnjë herë e tendosur
 - b. rrallë herë e tendosur
 - c. shpesh herë e tendosur
 - d. nuk është e palpueshme asnjë herë
 - e. e përjashtuar
- 12 Trajtimi i pneumotoraksit hipertensiv është:
- A- Torakotomia eksploruese
 - B- Dhënia e oksigjenit
 - C- Pritje
 - D- Drenimi në aspirim
 - E- Intubimi
- 13 Cili prej tumorëve malinj të traktit intestinal është më i shpeshti te moshat e reja?
- f. Limfosarkoma
 - g. Carcinoidi
 - h. Carcinoma e kolonit
 - i. Neuroblastoma
 - j. Rabdomyosarkoma
- 14 Carcinoma e mamelës klasifikohet si T2 nëse dimensionet e saj janë:

- A- më të mëdha se 1 cm, por më të vogla se 2,5 cm
- B- më të mëdha se 2 cm, por më të vogla se 3,1 cm
- C- më të mëdha se 2 cm, por më të vogla se 5,1 cm
- D- midis 3 e 5 cm
- E- midis 3 e 6 cm

15 Metastazat e kancerit të prostatës prekin më shpesh:

- A- Kockat e baçinit dhe vertebrat e fundit lumbare
- B- Heparin
- C- Trurin
- D- Pulmonet
- E- Në asnjë prej këtyre organeve

16 Pankreatiti akut shpesh herë shoqërohet me:

- A- Ezofagit nga refluksi
- B- Colelitiazë
- C- Diverticulit
- D- Ulçera gastrike
- E- Colangiti sklerozant

17 Cila prej shenjave është më e shpeshta në kancerin e vezikës urinare?

- A- Cistopieliti i përsëritur
- B- Mbajtja akute e urinës (ritension)
- C- Hematuri
- D- Polakiuri
- E- Stranguri

18 Një mashkull 72 vjeç shfaq dhimbje të forta të shpinës, një masë abdominale pulsuese dhe hipotension. Për cilën prej diagnozave mund të dyshojmë:

- A- Infarkt intestinal
- B- Aneurizëm disekante të aortës
- C- Rupturë (çarje) ose fisuracion të aneurizmës së aortës abdominale

- D- Sindroma e Leriche
- E- Aneurizëm e arteries hepatike

19 Për diagnozën e apendisitit akut është më e rëndësishmja:

- A- Echografia abdominale
- B- TC
- C- Rtg e traktit tretës me vlerësim të zorrës së hollë
- D- Clisma opake
- E- Anamneza dhe ekzaminimi objektiv

20 Trajtimi i duhur kirurgjikal për neoplazinë e kolonit ashendent është:

- A- Hemikolektomia e djathtë
- B- Hemikolektomia e majtë
- C- Rezekcioni ileus- ciecal
- D- Rezekcioni segmentar
- E- Kolektomia subtotalë

21 Angina abdominale shkaktohet nga:

- A- Neoplazi të kolonit
- B- Hemorragji intestinale
- C- Divertikulit
- D- Iskemia kronike intestinale
- E- Ulçera peptike post- anastomozës

22 Torakotomia urgjente është e indikuar tek:

- A- Kontuzioni (shembja) pulmonare
- B- Versamenti pleural bilateral
- C- Hemotoraksi i furnizuar
- D- Pneumotoraksi si valvul
- E- Empiema

- 23 Janë komplikanca të kolecistitit, përveç:
- A- Pankreatiti
 - B- Peritoniti
 - C- Fistula biliare
 - D- Perforimi
 - E- Tromboflebiti migrues
- 24 Cilin prej ekzaminimeve do t'i bëjë një pacienti që ka paraqitur hematemesis?
- A- Bronkoskopi
 - B- Rtg të traktit tretës
 - C- Ezofago-gastro-duodenoskopi
 - D- Rtg direkt të abdomenit
 - E- Clisma opake
- 25 Tiroidektomia totale është ndërhyrja e përshtatshme në:
- A- Struma multinodulare
 - B- Ca midular
 - C- Ca folikular
 - D- Asnjëra prej këtyre patologjive
 - E- Të gjitha patologjitë e lartpërmendura
- 26 Cilin ekzaminim instrumental zgjedh, nëse dyshon për litiazë të kolecistës?
- A- Rtg të rrugëve të para të traktit tretës
 - B- Manometri duodenale
 - C- Echografi hepato-biliare
 - D- Kolecistografi
 - E- Rtg direkt të abdomenit
- 27 Trajtimi parësor i embolisë pulmonare është:
- A- Lidhje të venës kava inferiore
 - B- Trombektomi

- C- Embolektomi pulmonare
- D- Antikoagulantë e fibrinolitikë
- E- Antibiotikë

28 Cilët segmentë intestinalë mund të prekë sëmundja e Crohn:

- A- Ileusin
- B- Kolonin
- C- Ezofagun
- D- Stomakun
- E- Te gjithë traktin tretës

29 Cili është trajtimi i pneumotoraksit hipertensiv?

- A- Ndërhyrja kirurgjikale me urgjencë
- B- Aspirimi
- C- Aspirimi dhe drenimi
- D- Plumbimi ekstrapleural
- E- Asnjëra prej përgjigjeve

30 Shoku anafilaktik karakterizohet nga:

- A- Hipotension, bradikardi, Presion venoz central (PVC) të reduktuar
- B- Hipotension, takikardi, Presion venoz central (PVC) të rritur
- C- Hipotension, takikardi, Presion venoz central (PVC) të reduktuar
- D- Hipotension, bradikardi, Presion venoz central (PVC) të rritur
- E- Hipotension, bradikardi, oligoanuri

31 Me dizuri kuptohet:

- A- Vështirësi gjatë urinimit
- B- Dhimbje gjatë urinimit
- C- Rritje të numrit të herëve të urinimit
- D- Prania e leukociteve në urinë
- E- Prania e pusit në urinë

- 32 Histologjikisht tumoret e prostatës janë:
- A- Carcinoma me qeliza tranzitore
 - B- Adenocarcinoma
 - C- Carcinoma skuamoqelizore
 - D- Leiomiosarkoma
 - E- Limfoma
- 33 Prerja në linjën mediane ombelikalë-pubike, nën shtresat e lekurës dhe nënlëkurës përfshin:
- A- Pjesën e brendshme të muskujve abdominalë rektis
 - B- Linjën alba
 - C- Fashën e muskujve abdominalë rektis
 - D- Muskuli rekti, oblik të madh e të vogël
 - E- Muskuli i madh e i vogël oblik dhe trasvers
- 34 Cilët janë receptorët që përfshihen më shumë në hiperplazinë e prostatës:
- A- Alfa 1-adrenergjikë
 - B- Beta 2- adrenergjikë
 - C- Serotoninerjikë
 - D- Kolinergjikët
 - E- Dopaminergjikët
- 35 Cila prej këtyre gjendjeve nuk i shoqërohet nefrolitiazës dhe hiperkalçiumisë?
- F- Hiperkalçiumia idiopatike
 - G- Hipoparatiroidizmi
 - H- Vitamina D me tepriçë
 - I- Sarkoidoza
 - J- Sëmundja e Paget
- 36 Echografia renale dhe pielografia endovenoze e kryer tek një mashkull 65 vjeç, që u vlerësua për inkontinencën urinare, rezultoi me hidronefrozë bilaterale. Cila prej gjendjeve të mëposhtme është më e mundshme për të shkaktuar këtë komplikim?

- K- Sëmundja e Alzheimer
- L- Ndërhyrje kirurgjikale paraprake
- M- Inkontinencë nga stresi
- N- Hiperplazi e prostatës
- O- Rritje e aktivitetit të muskullit detruozor në varësi të moshës

37 Cila prej gjendjeve të mëposhtme mund të jetë komplikancë e hipertrofisë beninje të prostatës:

- A- Kalkuj në vezikën urinare
- B- Ritencioni akut urinar
- C- Divertikuloza e vezikës urinare
- D- Të gjitha përgjigjet
- E- Stranguri

38 Çfarë është devijimi urinar:

- A- Vendosja në menyër definitive e ureterëve në lëkurë
- B- Ndërhyrja e kryer për të korrigjuar kapacitetin e humbur të vezikës urinare
- C- Anastomoza kirurgjikale uretero-uretrale
- D- Drenimi i vezikës nëpërmjet kateterit
- E- Modifikimi kirurgjikal i rrugëve normale të urinës në mënyrë të përkohshme ose definitive

39 Konsiderohet bakteriuri, nëse numri i mikroorganizmave për ml urine është:

- A- më e madhe se 100.000
- B- më e vogël se 50.000
- C- midis 10.000 dhe 50.000
- D- midis 5.000 dhe 10.000
- E- 1.000

40 Spermatorrea është:

- A- Lëshimi i likidit seminal pa ereksion
- B- Lëshimi i likidit seminal i përzier me gjak
- C- Lëshimi i likidit seminal i përzier me pus
- D- Lëshimi i likidit seminal me ereksion

E- Asnjëra nga përgjigjet

- 41 Hidronefrozë do të thotë:
- A- Përthithje të urinës nga tubujt kolektorë
 - B- Prania e urinës purulente në kavitetin ampulo-kalicien të zgjeruar
 - C- Stazë urinare, me rrjedhojë zgjerim të kavitetit ampulo-kaliciene
 - D- Stazë urinare vetëm në vezikën urinare
 - E- Dëmtim i përgjithshëm i parenkimës renale dhe rrugëve ekskretore
- 42 Carcinoma e prostatës jep metastaza më shpesh në:
- A- Skelet
 - B- Gjëndra mbiveshkore
 - C- Hepar
 - D- Pulmon
 - E- Tru
- 43 Cili prej ekzaminimeve klinike është i domosdoshëm për të përcaktuar diagnozën e dizfunktionit erektil?
- A- Arteriografia selektive
 - B- Vezikolodeferentografia
 - C- Nuk janë të nevojshëm ekzaminimet klinike
 - D- Profilin glicemik, lipidik dhe testosteroneminë
 - E- Teste psikometrike
- 44 Sfinteri vezikal i jashtëm është i përbërë nga:
- A- Muskulaturë e vijëzuar
 - B- Muskulaturë e lëmuar
 - C- Muskulaturë mikse
 - D- Ind fibroz
 - E- Ind fibro-adipoz
- 45 Hemorragjia që e ka pikënisjen nga uretra nën diafragmën shkakton:

- A- Uretrorragji
- B- Hematuri totale
- C- Hematuri fillestare
- D- Hematuri terminale
- E- Mikrohematuri

46 Shkaku më i shpeshtë i sindromës kavale superiore mund të jetë:

- A- Neoplazi e lobit superior të djathtë të pulmonit
- B- Tumori i timusit
- C- Carcinoma fulikulare e tiroides
- D- Fibroza e mediastinit
- E- Struma e zhytyr retrosternale

47 Cila valvul kardiake preket më shpesh nga sëmundja reumatike?

- A- Aortale
- B- Mitrale
- C- Pulmonare
- D- Trikuspidale
- E- Të gjitha valvulat preken në menyrë të njëjtë

48 Gjatë ndërhyrjet kardiokirurgjikale të by-passit koronar, perfuzioni me eritrocite të përqëndruara është:

- A- Gjithnjë i nevojshëm
- B- Asnjë herë i nevojshëm
- C- Kryhet gjithnjë nëse pacienti ka probleme me koagulimin e gjakut
- D- Gjithnjë i nevojshëm, në rast ndërhyrjesh ku bëhet qarkullimi ekstrakorpor
- E- Asnjëra prej përgjigjeve

49 Flebo-edema në fazën fillestare karakterizohet nga:

- A- Edema e fortë premaleolare
- B- Edema e butë premaleolare
- C- Inflamim kronik premaleolare

- D- Dizkromi premaleolare
- E- Ulçera të lëkurës

50 Vena e madhe safena e merr origjinën:

- A- Posteriorisht pjesës së brendëshme të maleolit
- B- Anteriorisht pjesës së brendëshme të maleolit
- C- Anteriorisht pjesës laterale të maleolit
- D- Posteriorisht pjesës laterale të maleolit
- E- Në nivelin e depërtueses së Hunter

51 Shkaku më shumë i mundshëm i një versamenti pleural hemorragjik është:

- A- Tuberkulozi
- B- Pulmoniti
- C- Mykoza
- D- Neoplazi
- E- Astma

52 Arteria femurale e ka origjinën nga:

- A- Aorta torakale
- B- Arteria iliake e brendëshme
- C- Arteria iliake e jashtme
- D- Femuralja sipërfaqësore
- E- Femuralja e thellë

53 Çfarë terapie urgjente do të bëje në një bllok A-V të plotë?

- A- Lidokainë bolus
- B- Defibrilim elektrik
- C- Vendosje të pacemaker transcutan
- D- Kardioversionin elektrik
- E- Të gjitha përgjigjet e mësipërme

54 Dega interventrikulare posteriore merr origjinë nga:

- A- Koronaria e majtë
- B- Koronaria e djathtë
- C- Arteria cirkumflekse
- D- Dega interventrikulare posteriore
- E- Direkt nga aorta ashendente

55 Kush nuk është një komplikancë e mundshme gjatë ndërhyrjes për zëvendësimin e valvulës së aortës?

- A- Fillimi i një blloku të degës së majtë
- B- Dëmtim të pjesës fillestare të koronareve
- C- Dëmtim të fletës anteriore mitrale
- D- Endokarditi infektiv
- E- Fillimi i një blloku të degës së djathtë

56 Cila është simptoma më e shpeshtë e hernies diskale lumbare?

- A- Lumbalgjia
- B- Gonalgjia
- C- Skiatalgjia
- D- Cervikalgjia
- E- Brakialgjia

57 Çfarë është sëmundja e Dupuytren?

- A- Tenosinovit stenozues i veshjes së tendinave fleksore të gishtave
- B- Sinostozë kongenitale radioulnare
- C- Retraksion të aponeurozës së pëllëmbës (palmare)
- D- Nekrozë aseptike të skafoidit
- E- Pseudo-artrozë të skafoidit

58 Tek pacientët e moshuar, cila është terapia përzgjedhëse në rastin e frakturave mediale të qafës së femurit?

- A- Me allçi
- B- Osteosintezë
- C- Zëvendësim me protezë

- D- Asnjë trajtim
- E- Heqjen e kokës së femurit

59 Të gjitha janë shenja radiografike të artrozës, përve:

- A- Reduktim të hapësirës artikulare
- B- Prania e osteofiteve
- C- Prania e geoidëve
- D- Profili artikular i çrregullt
- E- Zgjerim të hapësirës artikulare

60 Cili prej ekzaminimeve strumentale mundëson realizimin e diagnozës së hernies së diskut:

- A- Echografia
- B- Arteriografia
- C- Termografia
- D- TAC/RMN
- E- Radiografia

61 Cila prej tendinave nuk kalon në kanalin karpal (kyçit të dorës):

- A- Radiali fleksor i kyçit
- B- Fleksor i thellë i gishtave
- C- Fleksor sipërfaqësor i gishtave
- D- Ulnari fleksor i kyçit
- E- Fleksor i gjatë i gishtit të madh

62 Manovra e Lasègue është pozitive kur:

- A- Kur përfshihet nervi skiatik
- B- Neoplazi të kolonës vertebrale
- C- Si rezultat i poliomyelitit
- D- Tek miopatië
- E- Në distorsionin vertebral

- 63 Morbusi i Paget:
- A- Rrallëherë është poliostik
 - B- Prek kryesisht meshkujt
 - C- Shfaqet në dekadën e dytë të jetës
 - D- Ka një zhvillim të shpejtë
 - E- Karakterizohet nga rritja e turn-overit kockor
- 64 “Mano Cadente” (dora që bie) shkaktohet nga:
- A- Paraliza e nervit radial
 - B- Paraliza e nervit median
 - C- Paraliza e nervit ulnar
 - D- Paraliza e nervit muskulokutan
 - E- Paraliza e nervit aksilar
- 65 Nga cilat vertebra merr origjinën nervi skiatik:
- A- L5-S1
 - B- L2-L3
 - C- S2-S3
 - D- L4-L5-S1-S2
 - E- L3-L4-L5-S1
- 66 Skolioza:
- A- Është devijim i shtyllës kurrizore në planin sagital
 - B- Është idiopatik në 70% të rasteve
 - C- Është shpesh kongenital
 - D- Përcakton eterometri të gjymtyrëve të poshtme
 - E- Është shpesh sekondar
- 67 Komplikimet nervore më të shpeshta në frakturat e olekranit:
- A- Dëmtim të ulnarit
 - B- Dëmtim të medianit
 - C- Dëmtim të radialit

- D- Dëmtim të aksilarit
- E- Të muskulit kutan

68 Hernia e diskut përbëhet nga:

- A- Unaza fibrotike
- B- Bërthama pulpoze
- C- Nga i gjithë disku
- D- Nga disku+ ligamentin gjatësor anterior
- E- Nga disku, ligamentin gjatësor anterior, ligamentin gjatësor posterior

69 Cila strukturë përfshihet në sindromën e tunelit karpal?

- A- Nervi ulnar
- B- Nervi median
- C- Arteria radiale
- D- Nervi radial
- E- Tendina ekstensore ulnare e kyçit

70 Rakitizmi varet nga:

- A- Mungesa e vitaminës D
- B- Mungesa e vitaminës E
- C- Defiçiti i kalçitoninës
- D- Mungesa e vitaminës A
- E- Asnjëra prej përgjigjeve

71 Cila kockë e pëllëmbës së dorës bën frakturë më shpesh?

- A- Semilunarja
- B- Piramidalja
- C- Trapezoidi
- D- Kapitati
- E- Skafoidi

- 72 Fraktura bimaleolare e paqëndrueshme ka nevojë për:
- A- Bendazh funksional
 - B- Stabilizim kirurgjikal
 - C- Allçi në formën e kepucës
 - D- Allçi nga kofsha deri tek këmba
 - E- Manipulime
- 73 Fraktura e Colles përfshin:
- A- Ekstremitetin distal të tibias
 - B- Metafizën radiale distale
 - C- Kapitulumin e radialit
 - D- Oleokrani
 - E- Kokën e omerit
- 74 Osteoporozja është një faktor rrisht për:
- A- Artrozë
 - B- Infeksione
 - C- Tumore të kockës
 - D- Fraktura
 - E- Insuficiencë renale
- 75 Artikulacioni që përfshihet më shpesh nga luksacioni është:
- A- Anka (kocka e baçinit)
 - B- Gjuri
 - C- Kavalja
 - D- Shpatulla
 - E- Radio-karpal
- 76 Të gjithë janë komponentë të tetralogjisë së Fallot, përveç:
- A- Hipertrofi të ventrikulit të majtë
 - B- Difekt të septumit interventrikular
 - C- Pozicionim në anë të djathtë të aortës

- D- Hipertrofi të ventrikulit të djathtë
- E- Stenozë infundibulare (hinkore) të arteries pulmonare

77 Cili është shkaku i dizfonisë që shfaqet me zërin bitonal?

- A- Paraliza e një korde vokale
- B- Kollë e vazhdueshme për periudha të gjata
- C- Komprimim të trakesë
- D- Obstruksion të laringut
- E- Devijim të trakesë dhe ezofagut

78 Me spina bifida kuptohet:

- A- Keqformim kongenital i tubit nervor
- B- Agjenezi të trurit të vogël
- C- Mungesxe të trupit kalloz
- D- Mungesë të palcës kurrizore
- E- Tumor temporal

79 Apendisiti akut tek një fëmijë nën 5 vjeç, mund të shfaqë:

- A- Asnjëherë komplikime
- B- Komplikime të shpeshta
- C- Asnjë simptomë
- D- Komplikime vetëm në gjininë femërore
- E- Komplikime vetëm në gjininë mashkullore

80 Cila prej situatave të mëposhtme nuk është shkaku i cianozës tek një i sapolindur:

- A- Policitemia
- B- Sepsi
- C- Vazhdueshmëria e qarkullimit fetal
- D- Kanali atrioventrikular i plotë
- E- Tetralogjia e Fallot

- 81 Cilat janë rreziqet e kriptorkidizmit të pa operuar?
- A- Dizfunksioni erektil
 - B- Degjenerimi neoplastik
 - C- Orkiti
 - D- Epididimit
 - E- Hipogonadizëm hipogonadotrop
- 82 Një fëmijë 2 vjeçar, shfaq episode periodike e të rënda të dhimbjes së tipit kolik, të shoqëruara dhe me të qara e të vjella. Feçet janë me gjak të kuq. Në palpimin në epigastër vihet re një masë ovale. Cila prej diagnozave është më shumë e mundshme?
- A- Divertikuli i Meckel
 - B- Stenoza kongenitale e pilorit
 - C- Ileus nga mekonium
 - D- Invaginimi
 - E- Enterokoliti nekrotizant
- 83 Konsiderohet si “gold standard” për të diagnostikuar sëmundjen e Hirschsprung:
- A- Biopsia rektale
 - B- Manometria anorektale
 - C- Klizma opake
 - D- Echografia abdominale
 - E- Ph-metria
- 84 Ndërhyrja më e përshtatshme për trajtimin e stenoze kongenitale të pilorit është:
- A- Gatsrodigiunostomia
 - B- Gastroduodenostomia
 - C- Piloroplastika ekstramukozë
 - D- Antrektomia
 - E- Rezekcioni gastro-duodenal
- 85 Tek një i sapolindur me fibrozë cistike, episodi i obstruksionit intestinal shkaktohet me shumë mundësi nga:

- A- Atrezi e duodenit
- B- Invaginimi
- C- Ileus nga mekonium
- D- Mungesën e perforimit anal
- E- Malrotacionin intestinal

86 Sa është vlera normale e saturimit të O₂ në gjakun venoz të arteries pulmonare?

- A- 92%
- B- 75%
- C- 60%
- D- 30%
- E- 45%

87 Sa është osmolariteti në solucionin fiziologjik (NaCl në ujë):

- A- 145mOsm/l
- B- 175 mOsm/l
- C- 250 mOsm/l
- D- 300 mOsm/l
- E- 400 mOsm/l

88 Në cilën prej gjendjeve të mëposhtme, bëhet ventilimi artificial?

- A- Rritje e PaCO₂
- B- Ulje i PaO₂
- C- Rritje e pH
- D- Ulje e pH
- E- Të gjitha gjëndjet e mësipërme

89 Hipokaliemia shoqërohet me:

- A- Rritje të peristalsës intestinale
- B- Acidozë
- C- Rritje të amplitudës së valës T
- D- Nauze
- E- Depresion (ulje) të ST

- 90 Sa oksigjen ka normalisht në ajrin e ekspiruar?
- A- Përafërsisht 5%
 - B- Përafërsisht 10%
 - C- Përafërsisht 16%
 - D- Përafërsisht 25%
 - E- Përafërsisht 35%
- 91 Barbiturët, në nivelin e sistemit nervor qëndror:
- A- Ulin konsumin e O₂
 - B- Rrisin konsumin e O₂
 - C- Normalizojnë konsumin e O₂
 - D- Induktojnë hipokapni
 - E- Nuk ndikojnë në konsumin e O₂
- 92 Cili prej diuretikëve ruan kaliumin?
- A- Spironolactoni
 - B- Acetazolamidi
 - C- Furosemidi
 - D- Clortiazidi
 - E- Acidi etakrinik
- 93 Cili prej faktorëve ul probabilitetin e suksesit të defibrilimit elektrik:
- A- Hipotermia
 - B- Acidoza
 - C- Hipoksia
 - D- Rezistenca e rritur e toraksit
 - E- Të gjitha përgjigjet e mësipërme
- 94 pH arterial >7,6 dhe PaCO₂ >45 sugjerojnë për:
- A- Acidozë metabolike

- B- Acidozë respiratore
- C- Alkalozë metabolike
- D- Alkalozë respiratore
- E- Alkalozë mikse

95 Takikardia parosistike me bllok AV 2:1 është tipike nga mbidozimi me:

- A- Lidokainë
- B- Digital
- C- Verapamil
- D- Diltiazem
- E- Adenozinë

96 Në alkalozën respiratore, PCO₂:

- A- Rritet
- B- Ulet
- C- Nuk ndryshon
- D- Varion në kohë
- E- Nuk përcaktohet

97 Tek enfizema senile, insufiçenca respiratore shoqërohet me:

- A- Hipersekrecion bronkial
- B- Djersitje
- C- Takikardi dhe hipertension
- D- Kongjestion të lëkurës dhe cianoze
- E- Të gjitha përgjigjet e mësipërme

98 Pneumotoraksi i hapur shkaktohet nga:

- A- Sëmundjet pleuro-pulmonare
- B- Komunikimi i vazhdueshëm midis kavitetit pleural dhe ambientit të jashtëm
- C- Ruptura (çarja) e ndonjë bule subpleurale
- D- Fistulizimi bronkial
- E- Embolia pulmonare

- 99 Cili është shkaku më i zakonshëm i embolisë arteriale?
- A- Prania e aneurizmës së aortës
 - B- Fibrilacioni atrial
 - C- Prania e disa pllakave ateromatoze të ulçeruara
 - D- Përdorimi i mjekimit me kimioterapikë
 - E- Prania e sindromit të antitropave antifosfolipidë
- 100 Triada klinike tipike për hipertensionin endokranial është:
- A- Cefale, të vjella, edemë të papilës
 - B- Cefale dhe humbje të ndërgjegjes
 - C- Dhimbje të qafës dhe marrje mendsh
 - D- Temperaturë
 - E- Skotoma dhe ulje të shikimit

D.OBSTETRIKË-GJINEKOLOGJI

1. Pas menopauzës, dispareunia shkaktohet më shpesh nga:

- A. tharja e sekrecioneve vaginale
- B. inkontinenca
- C. infeksionet nga kandida
- D. problemet e ereksionit të partnerit
- E. të gjitha përgjigjet e mësipërme

2. Zgjidhni teknikën e përshtatshme të përdorur për diagnostikimin e anemisë drepanocitare në një fetus:

- A. kulturë e qelizave të lëngut amniotik
- B. kampione të gjakut fetal
- C. alfafetoproteina e likidit amniotik
- D. përqëndrimi i substancave kimike në urinën e nënës
- E. ekografi

3. Në një grua 32 vjeç me histori për infertilitet prej 4 vitesh, induktohet ovulimi me klomifen. Në javën e 16 të shtatzanisë evidentohet pozicionimi i fundusit të uterusit në nivel të kërthizës. Ekografia tregon për barrë binjake me dy placenta (anteriore dhe posteriore). Cilën prej këtyre problemeve mund të shfaqë kjo grua gjatë shtatzanisë?

- A. infeksione të rrugëve urinare
- B. hipertension të induktuar nga barra
- C. diabet gestacional
- D. ulje të nivelit të alfa-fetoproteinës
- E. candida

4. Kundërrindkohet përdorimi i pilulave kontraceptive në:

- A. endometrioze
- B. mastopati fibrocistike
- C. cist ovari
- D. karcinoma mamare e operuar prej më shumë se 3 vjetësh
- E. nuliparita

5. Në ekzaminimin mikroskopik të sekrecioneve uretrale *Neisseria gonorrhea* paraqitet si:

- A. streptokok grampozitiv jashtë qelizor
- B. diplokok grampozitiv jashtë qelizor
- C. diplokok gramnegativ jashtë qelizor
- D. diplokok grampozitiv brenda qelizor
- E. diplokok gramnegativ brenda qelizor

6. Prania e indit endometrial jashtë kavitetit njihet si:

- A. endometrioze
- B. endoskopi
- C. miomatoze
- D. mola hidatiforme
- E. ovar polikistik

7. Cili prej tumoreve të poshtë shënuar metastazon më shpesh në fetus?

- A. melanoma
- B. leuçemia
- C. karcinoma mamare
- D. karcinoma e cerviksit
- E. karcinoma uterine

8. Rritja fiziologjike e ERS në shtatzani vjen si pasojë e:

- A. uljes të gamaglobulinave
- B. rritjes të beta globulinave
- C. rritje të fibrinogjenit plazmatik
- D. rritje të transferinës
- E. rritjes të prolaktinës

9. Gjatë lindjes, dilatimi i qafës të uterusit do të konsiderohej i plotë kur ka arritur:

- A. 2-3 cm
- B. 6 cm
- C. 5 cm
- D. 10 cm
- E. 12 cm

10. Në cilën ditë LH arrin nivelin më të lartë në një grua që ka cikël menstrual të rregullt çdo 30 ditë?

- A. ditën e 12-të
- B. ditën e 14-të
- C. ditën e 16-të
- D. ditën e 18-të
- E. ditën e 27-të

11. Cili është shkaku më i mundshëm i hemorragjisë vaginale disfunktionale në një grua 28 vjeç e cila në ekzaminim objektiv nuk paraqet asnjë problem?

- A. sindromi i ovarit polikistik
- B. përdorimi i kontraktivëve oral
- C. dismenorea fiziologjike
- D. neoplazia gjinekologjike
- E. hipotiroidizmi

12. Me ektopron kuptojmë:

- A. praninë e endometrit me vendosje ektopike
- B. një lezion inflamator të cerviksit
- C. prolaps të uterusit
- D. eversion i mukozës endocervikale
- E. fistul rekto-vaginale

13. Cila situatë nuk shoqërohet me ulje të lubrifikimit vaginal?

- A. menopauza
- B. sindromi Sjogren
- C. sindromi Cushing
- D. skleroza multiple
- E. hipotiroidizmi

14. Diagnoza e endometrioze bazohet në:

- A. anamnezë
- B. ekzaminim objektiv
- C. histori për infertilitet
- D. dozim i CA 125
- E. evidentim i lezionit të endometrioze në biopsi

15. Cila vaksinë kundërrindikohet të kryhet gjatë shtatzanisë:
- A. tetanoz
 - B. poliomielit
 - C. parotit
 - D. gripi
 - E. tërbimi
16. Bari më i përshtatshëm në trajtimin e haemofilus vaginalis është:
- A. metronidazoli
 - B. mikonazoli
 - C. dienestrolit
 - D. sulfisoxazoli
 - E. deoksiciklina
17. Rritja e niveleve të alfa fetoproteinës në javën e 17-të të shtatzanisë i atribuohet:
- A. trisomisë 18
 - B. sindromës Down
 - C. vonesës të rritjes intrauterine
 - D. anencefalisë
 - E. gabimit në llogaritje të datës të shtatzanisë që realisht është vetëm në javën e 14-të
18. Një femër e prekur nga endometrioza mund të ankohet për të gjitha këto probleme me përjashtim të:
- A. dispareuni
 - B. sterilitet
 - C. dhimbje gjatë defekimit
 - D. dhimbje të vazhdueshme abdominale
 - E. mastodini
19. Tek një grua, shkak më i shpeshtë i humbjes të dëshirës për të kryer marrdhënie seksuale është:
- A. diabeti melitus
 - B. depresioni
 - C. hipotiroidizmi
 - D. të gjitha përgjigjet janë të sakta
 - E. asnjë përgjigje nuk është e saktë

20. Cila nga këto paraqitje e fetusit nuk lejon lindjen natyrale edhe pse fetusit është i zhvilluar normalisht?

- A. paraqitja me bregmë
- B. paraqitja podalike
- C. paraqitja me ballë
- D. paraqitja me fytyrë
- E. asnjë përgjigje nuk është e saktë

21. Pterigum colli është karakteristikë e:

- A. sindromës Down
- B. sindromës Klinefelter
- C. sindromës Turner
- D. sindromës Patau
- E. sindromës cri du chat

22. Simptoma më e shpeshtë e karcinomës endometriale është:

- A. vaginitë rekurente
- B. dispareuni
- C. metroragji
- D. amenorre
- E. asnjë përgjigje nuk është e saktë

23. Shkaku më i shpeshtë i sterilitetit në femra është:

- A. hormonal (anovulimi)
- B. i lidhur me tubat uterinë
- C. i lidhur me uterusin
- D. kongenital
- E. vaginal

24. Sa është mundësia e zhvillimit anormal të një fetusit pas realizimit të amniocenteza?

- A. 0%
- B. 3.5%
- C. 5%
- D. 10%
- E. 25%

25. Cili nga këto trajtime duhet të aplikohet në trajtimin e preeklampsisë?
- A. diuretik
 - B. dieta me pak kripë
 - C. propranolol
 - D. sulfat magnezi
 - E. kalçium
26. Të gjithë barnat e mëposhtëm japin anomali fetale me përjashtim të:
- A. tetraciklinës
 - B. talidomidit
 - C. litiumit
 - D. sulfonamideve
 - E. kumarinës
27. Cili prej tumoreve të më poshtme është përgjegjës për numrin më të madh të vdekjeve në çdo vit?
- A. endometrial
 - B. mamar
 - C. pulmonar
 - D. intestinal
 - E. cervikal
28. Në rrezik aboti rekomandohet të ndiqet terapia e më poshtme me përjashtim të:
- A. antibiotikoterapi
 - B. progesteroni
 - C. beta stimulues
 - D. antispastik
 - E. rregjim shtrati
29. Të gjitha parametrat laboratorik fiziologjik ulen në trimestrin e dytë të një shtatzanie normale me përjashtim të:
- A. frekuencës kardiake
 - B. hematokritit
 - C. shpejtësisë të eritrosedimentit
 - D. natremisë
 - E. frekuencës respiratore në minutë

30. Në një shtatzani normale nëna shton në peshë:

- A. 8 kg
- B. 6 kg
- C. 12.5 kg
- D. 20 kg
- E. 16 kg

31. Një grua 25 vjeç, në javën e 13-të të shtatzanisë të parë, ankon për hemorragji vaginale. Në ekzaminim objektiv evidentohet një TA=160/95 mmHg, proteinuri 3, dhe fundusi uterin në nivel të umbelikutit. Cila është diagnoza e mundshme?

- A. diabet gestacional
- B. barrë gemelare
- C. anencefali fetale
- D. abort i paevitueshëm
- E. barrë molare

32. Maturimi i spermatozoideve ndodh në nivel të:

- A. epididimisit
- B. tubujve seminiferë
- C. kanalit vaginal
- D. duktusit deferent
- E. në kontakt me ovarin

33. Shenjat thelbësore të preeklampsisë janë:

- A. hipertensioni
- B. hipertensioni dhe edema
- C. hipertension, cefale, konvulsione
- D. hipertension dhe proteinuri
- E. asnjë nga përgjigjet më lart

34. Gjatë lindjes, dilatimi i qafës të uterusit do të konsiderohej i plotë kur ka arritur:

- F. 2-3 cm
- G. 6 cm
- H. 5 cm
- I. 10 cm

J. 12 cm

35. Në cilën ditë LH arrin nivelin më të lartë në një grua që ka cikël menstrual të rregullt çdo 30 ditë?

- F. ditën e 12-të
- G. ditën e 14-të
- H. ditën e 16-të
- I. ditën e 18-të
- J. ditën e 27-të

36. Pilula kontraceptive estro-progestinike vepron në nivel të:

- A. hipofizës
- B. tubujve
- C. qafës uterine
- D. ovarit
- E. gjendrës mbiveshkore

37. Metoda më e mirë për identifikimin e placentës previa është:

- A. ekografia
- B. amniografia
- C. ekzaminimi gjinekologjik
- D. arteriografia e aa.uterine
- E. radiografia pelvike

38. Cili nuk bën pjesë në indeksin e Apgar?

- A. ngjyra e lëkurës
- B. tonusi muskular
- C. temperatura trupore
- D. frekuenca kardiake
- E. vlerësimi i frymëmarrjes

39. Cila nga këto situat është e lidhur më shpesh me oligohidraminos?

- A. agenezia renale
- B. atrezia duodenale
- C. hidrops fetal
- D. anencefalia

- E. barrat e shumta
40. Gjatë shtatzanisë, përqëndrimi i fibrogjenit në gjakun e nënës:
- A. ulet në mënyrë sinjifikante
 - B. ulet në mënyrë të moderuar
 - C. nuk ndryshon
 - D. rritet në mënyrë sinjifikante
 - E. rritet në mënyrë të moderuar
41. Cili hormon stimulon maturimin e folikult ovarial?
- A. FSH
 - B. LH
 - C. Estrogjen
 - D. Progesteron
 - E. Testosteron
42. çfarë është onfalocela?
- A. hernie cerebrale
 - B. aplazi e murit abdominal në regjionin umbelikal
 - C. hernie inguinale kongenital
 - D. divertikul
 - E. hernie hiatale
43. Shkaku më i shpeshtë i vdekjes në një grua me eklampsi është:
- A. raptura hepatike
 - B. insufienca renale akute
 - C. hemorragjia cerebrale
 - D. embolia pulmonare
 - E. shoku septik
44. Në rast të perforimit të uterusit gjatë ekzaminimit instrumental duhet:
- A. të vazhdohet ekzaminimi i nisur
 - B. të realizohet histerektomia e menjëherëshme
 - C. të aplikohet laparoskopji eksplorative
 - D. të realizohet me urgjencë ekografia
 - E. të ndërpritet ekzaminimi dhe të fillohet antibiotikoterpai

45. Vena ovariale e djathtë derdhet në venën:

- A. renale të djathtë
- B. mesenterike inferiore
- C. cava inferiore
- D. iliake të majtë
- E. femorale të majtë

46. Diabeti në shtatzani mund të shkaktojë:

- A. abort në trimujorin e parë
- B. vonesë në rritjen intrauterine
- C. polihidramnios
- D. placenta previa
- E. makrosomi fetale

47. Të gjitha pohimet e më poshtme jnaë të vërteta në lidhje me endometriozen me përjashtim të:

- A. endometrioza shkakton insuficiencë renale
- B. transformimi malinj i saj është i rrallë
- C. endometrioza është me e shpeshtë në periudhën e fertilitetit
- D. gratë e prekura nga endometrioza mund të shfaqin infertilitet
- E. shpesh herë diagnostikohet gjatë një kontrolli të zakonshëm

48. Gjatë shtatzanisë fibromat uterine kanë tendencë të:

- A. zvogëlohen
- B. zmadhohen
- C. mos ndryshojnë
- D. kolabohen
- E. malinjizohen

49. Qelizat e Leyding marrin pjesë në pordhimin e:

- A. spermatoцитеve
- B. estrogjenit
- C. testosteronit
- D. mineralokortikoideve

E. glukokortikoideve

50. Eklampsia karakterizohet nga:

- A. cefale e moderuar, tranzitore
- B. hiper refleksi
- C. konvulsione të tipit grand mal
- D. konvulsione
- E. skotoma

51. Cila nga patologjitë e mëposhtme nuk është shkak i amenorresë?

- A. Sindroma Turner
- B. Diabeti Mellitus
- C. Sindroma e ovarit polikistik
- D. Hiperplazia surenale kongenitale
- E. Hiperprolaktinemia

52. Cila patologji nuk mund të diagnostikohet në periudhën prenatale me teknikat e gjentikës molekulare?

- A. fenilketonuria
- B. fibroza cistike
- C. fibroz muskulare e Duchenne
- D. difektet e tubit neural
- E. beta-talase mia

53. Çrregullimet seksuale të femrat hasen në prevalencën :

- A. 45%
- B. 25%
- C. 10%
- D. 5%
- E. ska studime në lidhje me këtë çështje

54. Në analizën e urinës të një paciente me preeklampsi do evidentohet:

- A. proteinuria
- B. hematuri
- C. glukozuria
- D. ketonuria

- E. asnjë nga këto
55. Karcinoma e cerviksit të uterit nga pikëpamja histologjike paraqitet si një;
- A. adenokarcinome
 - B. karcinomë mukoepidermoide
 - C. karcinomë epidermoide
 - D. korionkarcinoma
 - E. cistosakomë
56. Shtatzani ektopike vendoset më shpesh në:
- A. ovar
 - B. fundusin uterin
 - C. periton
 - D. tubat uterin
 - E. qafën e uterusit
57. Miomat shoqërohen me të gjithë elementët e më poshtëm, me përjashtim të:
- A. anemi
 - B. pielonefrit
 - C. polakiuri
 - D. dismenore
 - E. amenore
58. Amnicenteza për vlerësimin e kariotipit fetal mund të realizohet në:
- A. javën e 8-10
 - B. javën 10-12
 - C. javën 16-18
 - D. javën 22-24
 - E. në çdo periudhë të shtatzanisë
59. Cili nga parametrat e më poshtëm nuk ndryshon në trimestin e dytë të një shtatzanie normale?
- A. frekuenca kardiake
 - B. hematokriti
 - C. shpejtësia e eritrosedimentit
 - D. natremia

E. vëllimi respirator në minutë

60. Përçindja e aborteve pasojë e realizimit të amniocentezës në trimestrin e dytë është:

- A. 1%
- B. 3%
- C. 4%
- D. 5%
- E. mbi 5%

61. Sa gjak humbet mesatarisht me një menstruacion :

- A. 10-15 ml
- B. 25-50 ml
- C. 75-100 ml
- D. 101-125 ml
- E. 135-150 ml

62. Në një grua me cikël të rregullt menstrual çdo 28 ditë, periudha më e përshtatshme e fekondimit është:

- A. dita 2-5
- B. dita 7-11
- C. dita 10-16
- D. dita 18-26
- E. dita 20-29

63. Placenta prodhon normalisht:

- A. estrogen dhe progesteron
- B. gonadotropinat korionike
- C. substanca të ngjashme me somatotropinat
- D. kortikosteroid
- E. të gjitha elementët e lart përmendur

64. Mastiti akut, në shumicën e rasteve evidentohet gjatë:

- A. pubertetit
- B. ushqyerjes me gjë
- C. ciklit menstrual normal
- D. shtatzanisë

E. menopauzës

65. Një grua 33 vjeç që ka lindur fëmijën e saj të parë para 5 javësh, paraqitet në ambulator ku të tregon se ndihet vazhdimisht e lodhur dhe në ankth. Ajo referon se ndihet e padobishme, rri gjithëditën kot dhe qan vazhdimisht pa ndonjë arsye specifike si dhe ka pagjumsi gjatë natës. Cila është diagnoza e mundshme?

- A. Depresioni pas lindjes
- B. Çrregullime të ankthit
- C. Psikoza pas lindjes
- D. Sëmundje bipolare
- E. Pagjumsi

66. Pas menopauzës, dispareunia shkaktohet më shpesh nga

- A. tharja e sekrecioneve vaginale
- B. inkontinenca
- C. infeksionet nga kandida
- D. problemet e ereksionit të partnerit
- E. të gjitha përgjigjet e mësipërme

67. Zgjidhni teknikën e përshtatshme të përdorur për diagnostikimin e anemisë drepanocitare në një fetus:

- A. kulturë e qelizave të lëngut amniotik
- B. kampione të gjakut fetal
- C. alfafetoproteina e likidit amniotik
- D. përqëndrimi i substancave kimike në urinën e nënës
- F. ekografi

68. Në një grua 32 vjeç me histori për infertilitet prej 4 vitesh, induktohet ovulimi me klomifen. Në javën e 16 të shtatzanisë evidentohet pozicionimi i fundusit të uterusit në nivel të kërthizës. Ekografia tregon për barrë binjake me dy placenta (anteriore dhe posteriore). Cilën prej këtyre problemeve mund të shfaqë kjo grua gjatë shtatzanisë?

- A. infeksione të rrugëve urinare
- B. hipertension të induktuar nga barra
- C. diabet gestacional
- D. ulje të nivelit të alfa-fetoproteinës
- E. candida

69. Kundërindikohet përdorimi i pilulave kontraceptive në:
- A. endometrioze
 - B. mastopati fibrocistike
 - C. cist ovarit
 - D. karcinoma mamare e operuar prej më shumë se 3 vjetësh
 - E. nuliparita
70. Cilën nga këto neoplazi malinje ka tendencë të zhvillojë një grua shtatzane 35 vjeçare?
- A. Neoplazi të ovarit
 - B. Neoplazi të qafës të mitrës
 - C. Neoplazi të gjirit
 - D. Neoplazi të vaginës
 - E. Neoplazi të kolonit
71. Në kulloshtrë dominojnë:
- A. IgM
 - B. IgG
 - C. IgA
 - D. IgD
 - E. IgE
72. Gjatë vlerësimit për një amenorre dytësore në një femër 24 vjeç, diagnostikohet hiperprolaktinemia. Cila nga këto situat mund të rritin sasinë e prolaktinës qarkulluese dhe të nxitin amenorrenë në këtë paciente?
- A. Stresi
 - B. Hipertiroidizmi parësor
 - C. Anoreksia nervore
 - D. Hiperplazia kongenitale e gjendrave mbiveshore
 - E. Sëmundja e ovarit polikistik
73. Një femër 27 vjeç sapo ka patur një shtatzani ektopike. Cili prej elementëve të mëposhtëm predisopzon zhvillimin e një shtatzanie ektopike?
- A. Malformimi i uterusit
 - B. Sëmundja inflamatore pelvike
 - C. Përdorimi i mjeteve kontraceptive
 - D. Induktimi i ovulacionit

- E. Ekspozimi ndaj dietilstilbisterolit
74. Në rastin kur fetusit paraqitet i pozicionuar me shpatull, trajti më i zgjedhur është:
- A. Përdorimi i oksitocinës me doza të larta
 - B. Përdorimi i kapseve obstetrike (ventuza obstetrike)
 - C. Nuk është e nevojshme të ndërhyet sepse bëhet fjalë për një paraqitje fiziologjike të bebit
 - D. Kirurgjia cezariene
 - E. Asnjë nga këto nuk përshtatet me këtë situatë.
75. Hormoni folikulostimulues prodhohet nga:
- A. Qelizat kromofobe të adenohipofizës
 - B. Qelizat gonadotrope të adenohipofizës
 - C. Qelizat acidofile të adenohipofizës
 - D. Qelizat thekale interne
 - E. Të gjitha përgjigjet janë të sakta
76. Shkaku më i shpeshtë i ambiguiteti gjenital në fëmijë është:
- A. Çrregullimet kromozomike
 - B. Disgenezia gonadike
 - C. Sindroma adrenogjenitale
 - D. Mozaicizmi
 - E. Feminizimi testikular
77. Cili nuk bën pjesë në indeksin e Apgar?
- A. ngjyra e lëkurës
 - B. tonusi muskular
 - C. temperatura trupore
 - D. frekuenca kardiake
 - E. vlerësimi i frymëmarrjes
78. Të gjitha janë simptoma të vdekjes intrauterine të fetusit me përjashtim të:
- A. mungesa e perceptimit të lëvizjeve fetale nga nëna
 - B. mungesa e rritje të vëllimit të uterusit
 - C. shtimi në peshë i nënës
 - D. regredimi i simptomave të shtatzanisë

- E. mungesa e rrahjeve të zemrës fetale në ekografi
79. Vendlokalizimi më i shpeshtë i endometriozës është:
- A. sipërfaqja peritoneale intestinale
 - B. omentumi
 - C. apendiksi
 - D. vesika urinare
 - E. hapsira Douglas
80. Të gjithë elementët e mëposhtëm janë të lidhur me rritjen e nivelit qarkullues të prolaktinës me përjashtim të:
- A. stresi
 - B. hipotiroidizmi
 - C. anoreksia nervore
 - D. akromegalia
 - E. shtatzania
81. Rritja e vlerave të beta HCG do të na orientonte për :
- A. tumor të gjirit
 - B. tumor të ovarit
 - C. cistoadenomë
 - D. tumor me qeliza Sertoli-Leyding
 - E. koriokarcinomë
82. Në një shtatzani normale do të evidentoheshin të gjitha ndryshimet e më poshtme të veshkave dhe rrugëve urinare me përjashtim të:
- A. dilatacionit të ureterëve
 - B. rritjes të fluksit plazmatik renal
 - C. rritje të fluksit glomerular
 - D. uljes të klirensit të kreatininës
 - E. rritjes të eliminimit urinar të glukozës
83. Klinikisht karcinoma endometriale zakonisht paraqitet me :
- A. rritje të përmasave të uterusit
 - B. dhimbje abdominale
 - C. hemorragji

- D. leukorre
 - E. të gjitha këto
84. Trupi i shkurtër te gratë mund të shoqërohet me;
- A. sindromën Turner
 - B. hipotiroidizëm
 - C. hiperplazi të gjendrave mbiveshkore
 - D. Sëmundja Cushing
 - E. Të gjitha këto më lart
85. Cila anomali kromozomike karakterizon sindromën Klinefelter?
- A. XO
 - B. Trizomia 15
 - C. Delecioni i krahut të shkurtër të kromozomit 18
 - D. XXY
 - E. XYY
86. Cili bar rekomandohet të përdoret në trajtimin e moniliazës?
- A. Metronidazoli
 - B. Mikonazoli
 - C. Dinestrol
 - D. Sulfisoksazol
 - E. Deoksiciklina
87. Shaku më i shpeshtë i dështimit të kontraktivëve oral, duke rezultuar më pas me një shtatzani të padëshiruar është:
- A. Ovulimi në mes të ciklit
 - B. Shpeshtësia e raporteve seksuale
 - C. Përdorimi i gabuar i kontraktivëve oral
 - D. Malabsorbimi gastrointestinal
 - E. Prodhimi i antitruapve
88. Terapitë hormonale zëvendësues që merren gj atë menopauzës mund të përmirësojnë:
- A. Sekretionet vaginale
 - B. Dispareuninë
 - C. Dëshirën seksuale
 - D. A+B+C

E. Mardhënien në çift

89. Shkaku më i shpeshtë i inkontinencës urinare në një grua në menopauzë është:

- A. Inkontinenca urinare nga stresi
- B. Prania e divertikujve uretral
- C. Inkontinenca nga grumbullimi i urinës
- D. Paqëndrueshmëria e vezikës urinare
- E. Fistulat

90. Cila nga substancat e më poshtme do të shkaktonin anomali të indit vaskular fetal dhe neonatal, nëse ato do të përdreshin nga nëna gjatë shtatzanisë?

- A. Duhani
- B. Alkooli
- C. Narkotikët
- D. Amfetaminat
- E. Kokaina

91. Në një grua shtatzanë diagnoza e hepatitit mund të konfirmohet nga rritja e vlerave të:

- A. ERS
- B. Fosfatzës alkaline
- C. Leukocitozës
- D. SGOT
- E. Azotemisë dhe kreatinemisë

92. Cikli menstrual varet nga:

- A. Çlirimi i prolaktinës nga hipofiza anteriore
- B. Sekretioni pulsues i hormonit stimulues të sekretimit të gonadotropinave (GnRH)
- C. Zgjatja e fazës folikulare
- D. Prodhimi i progesteronit nga trupi i verdhë
- E. Prodhimi i estrogenit nga ovaret

93. Qelizat e Leyding marrin pjesë në prodhimin e:

- A. spermatoцитеve
- B. estrogenit
- C. testosteronit
- D. mineralokortikoideve

E.glukokortikoideve

94. Eklampsia karakterizohet nga:
- A.cefale e moderuar, tranzitore
 - B.hiper refleksi
 - C.konvulsione të tipit grand mal
 - D.konvulsione
 - E.skotoma
95. Cila nga patologjitë e mëposhtme nuk është shkak i amenorresë?
- A.Sindroma Turner
 - B.Diabeti Mellitus
 - C.Sindroma e ovarit polikistik
 - D.Hiperplazia surenale kongenitale
 - E.Hiperprolaktinemia
96. Cila patologji nuk mund të diagnostikohet në periudhën prenatale me teknikat e gjentikës molekulare?
- A.fenilketonuria
 - B.fibroza cistike
 - C. fibroz muskulare e Duchenne
 - D. difektet e tubit neural
 - E.beta-talasemia
97. çrregullimet seksuale të femrat hasen në prevalencën :
- A.45%
 - B.25%
 - C.10%
 - D.5%
 - E. ska studime në lidhje me këtë çështje
98. Në analizën e urinës të një paciente me preeklampsi do evidentohet:
- A.proteinuria
 - B.hematuri
 - C.glukozuria

- D.ketonuria
- E.asnjë nga këto

99. Karcinoma e cerviksit të uteruit nga pikëpamja histologjike paraqitet si një;

- A.adenokarcinome
- B.karcinomë mukoepidermoide
- C.karcinomë epidermoide
- D.korionkarcinoma
- E. cistosakomë

100. Shtatzania ektopike vendoset më shpesh në:

- A.ovar
- B.fundusin uterin
- C.periton
- D.tubat uterin
- E.qafën e uterusit

E.PEDIATRI

1. Të gjithë faktorët e më poshtëm janë faktor prognostik favorizues në leuçeminë limfoblastike në moshë pediatrike, me përjashtim të:

- A. moshë midis 3 dhe 7 vjeç
- B. gjinia mashkullore
- C. rruazat e bardha $< 10.000/mm^3$
- D. hemoglobina $< 7 g/dl$
- E. trombocite $> 100.000/mm^3$

2. Cila shenjë apo simptomë haset fillimisht në kraniofaringeomën tek një fëmijë?

- A. strabzmi
- B. cefalea
- C. ndërprerja e rritjes
- D. vështirësi shikimi
- E. vertigo

3. Divertikuli i Meckel mund të jetë:

- A. simptomatik vetëm në fëmijë meshkuj
- B. asimptomatik
- C. gjithmonë simptomatik
- D. zbulohet vetëm në autopsi
- E. simptomatik vetëm në fëmijë femra

4. Cili prej përbërësve të më poshtëm është në përqëndrim më të madh në qumshtrin e nënës se sa në qumshtrin e lopes?

- A. acidet yndyror të polisaturuar
- B. vitaminat
- C. kazeina
- D. laktoalbumina
- E. kriprat minerale

5. Si realizohet diagnostikimi i refluksit gastroezofageal?

- A. me shintigrafi ezofageale

- B. me pH-metri të 24 orëve
- C. me manometri ezofageale
- D. me gastroskopi
- E. me asnjë nga këto mënyra

6. Në rastin e një fëmije me gastroenterit akut çfarë duhet bërë?

- A. realizimi i testeve të alergjisë
- B. vlerësimi i gjendjes të hidratimit dhe ekuilibrit acido-bazik
- C. realizimi i testeve të përthithjes intestinale
- D. fillimi i antibiotikoterapisë
- E. kërkimi për oksalate në feçe

7. Cili nuk është ndërlikim i parotitit?

- A. adenti purulent
- B. pankreatiti
- C. orkiti
- D. gastriti
- E. meningoencefalia

8. Infeksioni nga Mycoplasma pneumoniae mund të jetë shkaktar i të gjitha patologjive të mëposhtme me përjashtim të:

- A. bronkitit
- B. bronkiolitit
- C. konjuktivitit
- D. faringotonsilitit
- E. otitit media

9. Për cilën nga sëmundjet e hematologjike pediatrike rekomandohet përdorimi i heparinës si shoqërues gjatë aplikimit të transfuzionit të masave plazmatike të freskëta?

- A. Hemofilia A
- B. KID me trombozë
- C. Sëmundja Von Willebrand
- D. Hemofilia B
- E. Difekt në koagulim pasojë e një hepatopatie.

10. Cilat janë pasojat e rubeolës kongenitale?

- A. anencefalia
- B. kardiopatia
- C. shurdhimi
- D. verbimi
- E. të gjitha këto janë të mundshme

11. Intoleranca ndaj proteinave të qumështit të lopës mund të manifestohet me të gjitha shenjat klinike të poshtë shënuara me përjashtim të:

- A. forma akute manifestohet me diarre dhe të vjella
- B. forma kronike manifestohet me kolit dhe /ose anemi
- C. të vjella dhe acidozë metabolike
- D. ekzemë atopike dhe urtikarie

12. Cila nga këto patologji mund të jetë shkak i një abdomeni akut në një vajzë?

- A. torsioni ovarit
- B. hipertrofi e klitorit
- C. hipotrofi e klitorit
- D. hipertrofi e buzëve të vogla
- E. hipertrofi e buzëve të mëdha

13. Cili është trajtimi i zgjedhur gjatë një ataku astmatik të menjëhershëm në një fëmijë?

- A. beta2-agonist p.o
- B. kortikosteroid p.o
- C. beta2-agonist me rrugë inhalatore
- D. antihistaminik p.o
- E. beta2 agonist p.o shoqëruar me kromoglikane

14. Të gjithë elementët e poshtë shënuar janë karakteristike të hipertrofisë të pilorit me përjashtim të:

- A. alkalozës metabolike
- B. meshkujt preken më shumë se sa femrat
- C. klinika e saj shfaqet pas 2-3 javë jetë
- D. të vjella biliare
- E. të vjella jo biliare

15. Hiperplazia e gingivave mund të jetë e pranishme në një fëmijë i cili përdor:

- A. metocilinë

- B. ampicilinë
- C. eritromicinë
- D. tetraciklinë
- E. difenilidantoinë

16. Të gjitha patologjitë e poshtë shënuara përfaqësojnë keqformime të aparatit urogenital me përjashtim të:

- A. hidroureteronefroze
- B. veshka polikistike
- C. hipertrofi klitorisi
- D. megaureter
- E. refluksi veziko-uretral

17. Tek një fëmijë i porsalindur nga një nënë diabetike mund të vihen re të gjitha problemet e shënuara më poshtë me përjashtim të:

- A. ikterit
- B. policitemisë
- C. trauma nga lindja
- D. hernie umbelikalë
- E. anomali kongenitale

18. Të gjitha alternativat e poshtë shënuara përfaqësojnë shfaqje ekstraintestinale të alergjisë ushqimore, me përjashtim të:

- A. dermatitit atopik
- B. urtikaries
- C. cefalesë
- D. bronkospazmës, kollës të thatë produktive
- E. onikomiykozës

19. Cila është etiopatogjenza e hernies inguinale të fëmija?

- A. muri abdominal i dobët
- B. kriptokirdia
- C. trauma në lindje
- D. inflamacioni i kanalit inguinal
- E. asnjë nga këto

20. Në latantët me infeksione të rrugëve urinare, manifestimi klinik më i shpeshtë është:
- A. temperatura
 - B. dizuria
 - C. polakiuria
 - D. dhimbja në regjionin lumbar
 - E. inkontinenca
21. Sindromi McCune-Albright karakterizohet nga, pubertetet prekoks, njolla ngjyrë kafequmshti në lëkurë dhe:
- A. neurofibroma multiple
 - B. displazia fibroze një kockore
 - C. shurdhimi
 - D. displazia fibroze shumë kockore
 - E. anemia
22. Infeksionet e rrugëve urinare në fëmijë shoqërohen nga refluksi veziko-uretral:
- A. në 100 % të rasteve
 - B. në 30-50 % të rasteve
 - C. asnjëherë
 - D. në 98% të rasteve
 - E. në 2-3 % të rasteve
23. Cili është manifestimi më i shpeshtë i defiçitit të alfa 1 antitripsinës në fëmijë?
- A. Cisti pulmonar
 - B. Miokarditit
 - C. Cirroza hepatike
 - D. Insuficienca pankreatike
 - E. SPOK
24. Një fëmijë me sindromin Down ka rrezik të lartë për zhvillim të:
- A. malformimeve të aparatit urogenital
 - B. malformimeve cerebrale
 - C. malformimeve të aparatit gjigjestiv
 - D. malformimeve të aparatit kardiak
 - E. infeksione

25. Në vendet e industrializuara cili është patogjeni më i shpeshtë që shkakton gastroenterit akut në moshën pediatrike?

- A. E.Coli
- B. Salmonella
- C. Rotavirus
- D. Adenovirus
- E. Giardia lamblia

26. Cila nga thëniet e më poshtme është e vërtetë për vaksinën anti-fruth?

- A. aplikohet tek i porsalinduri
- B. aplikohet në muajin e 15-të pas lindjes
- C. nuk aplikohet tek fëmijët e lindur para kohe
- D. nuk aplikohet tek subjektet alergjik
- E. nuk aplikohet tek fëmijët e lindur nga nëna diabetike

27. Një fëmijë 4 vjeç defekon në mënyrë të bollshme me feçe me erë të rëndë dhe me konsistencë vajore. Diagnoza e mundshme në këtë rast do të ishte:

- A. sëmundje celiake
- B. xhardiazë
- C. fibrozë cistike
- D. deficieti i laktozës
- E. hipotiroidizëm

28. Një fëmijë 3 vjeç ka këto të dhëna laboratorike: Hb 11.5 g/dl, MCV 60, Rruaza të kuqe 5.5×10^6 . Cila është diagnoza e mundshme?

- A. Sëmundje kronike
- B. Sindrom talasemik
- C. Mungesë hekuri
- D. Mungesë në acid folik
- E. Mungesë në vitaminë B12

29. Cili parametër është me efikas në monitorimin e terapisë me heparinë?

- A. numri i trombociteve
- B. koha e trombinës
- C. dozimi i faktorit specifik
- D. koha e tromboplastinës parciale
- E. koha e protrombinës

30. Cilët limfonoduj preken më shpesh në limfomën Hodking?
- A. Limfonodujt aksial
 - B. Limfonodujt inguinal
 - C. Limfonodujt laterocervikal
 - D. Limfonodujt iliomediastinal
 - E. Limfonodujt lumboaortal
31. Cila nga simptomat e më poshtme mungon të një i porsalindur me meningit?
- A. temperatura
 - B. të vjellat
 - C. krizat konvulsive
 - D. rigor nukalis
 - E. PCR e rritur
32. Vlerat e hematokritit në lindje janë:
- A. 25-35%
 - B. 45-65%
 - C. 70-85%
 - D. 65-80%
 - E. mbi 85%
33. Hematuria asimptomatike në moshën shkollore është e pranishme në:
- A. 0-0.1 % të fëmijëve
 - B. 0.5-2 % të fëmijëve
 - C. 3-5 % të fëmijëve
 - D. 5-10 % të fëmijëve
 - E. 8-15 % të fëmijëve
34. Cili mund të jetë një ndërlikim i mundshëm madhor në trajtimin kirurgjikal të hernies inguinale kongenitale tek fëmija?
- A. atrofia testikulare jatrogjenike
 - B. gastroektazia jatrogjenike
 - C. retensioni urinar
 - D. infeksion i rrugëve urinare
 - E. ciste testikulare

35. Fëmijët e ushqyer vetëm me qumësht dhie, do të paraqesin mungesë të:

- A. vitaminës A
- B. vitaminës B6
- C. vitaminës E
- D. folateve
- E. tiaminës

36. Cila sëmundje e trashëguar ka një kuadër klinik të karakterizuar nga infeksione të herëpashershme dhe paaftësi e neutrofileve për të shkatëruar bakteret e fagocituar?

- A. Agamaglobulinemia
- B. Sëmundja Wilson
- C. Fibroza cistike
- D. Sëmundja granulomatozës kronike
- E. Neutropenia kongenitale

37. Në një fëmijë 40 javësh realizohet ekzaminimi objektiv. Cila nga problemet e poshtë shënuara mund të konsiderohet si patologjike?

- A. akrocianoza
- B. mëlçia 2 cm nën harkun brinjor
- C. zhurmë sistolike e lehtë
- D. frekuenca respiratore=70/min
- E. zona të pigmentuara në nivel të regjionit lumbosakral

38. Një fëmijë 15 muajsh paraqitet me kollë paroksistike të ndjekur nga të vjella. Me cilin bar duhet bërë trajtimi për të përmirësuar situatën?

- A. ampicilinë
- B. cefaklor
- C. kortikosteroid
- D. eritromicinë
- E. rifampicinë

39. Të gjitha shenjat dhe simptomat e më poshtme janë indikator të dehidrimit akut në fëmijë, me përjashtim të:

- A. mukoza dhe lëkura e thatë
- B. oliguria
- C. rënia në peshë > 10 %

- D. hipertensioni
- E. përgjumja, astenia

40. Cili është shkaku më i shpeshtë i insuficiencës respiratore në fëmijët obez?

- A. pneumotoraksi
- B. refluksi gastro-ezofageal
- C. insuficienca kardiake kongjestive
- D. astma
- E. apnea e gjumit

41. Cila nga etapat e zhvillimit psikomotor është karakteristik në një fëmijë 10 muajsh?

- A. ecja
- B. e folura
- C. zhgaravinat me laps
- D. të ulet lehtësisht dhe të ngrihet me ndihmën e dikujt
- E. të ndërtojë një kullë me 2-3 kuba

42. Cila nga këto anomali kardiake është më e shpeshtë në sindromën Williams?

- A. difekti i septumit atrioventrikular
- B. prolapsi i valvulës mitrale
- C. stenozë aortale supravalvulare
- D. koartacion i aortës
- E. stenozë i valvulës pulmonare

43. Në traumat e mëlçisë cili ekzaminim diagnostik mund të përdoret?

- A. cistografia
- B. urografia
- C. ekografia abdominale
- D. skaner i kokës
- E. skaner i barku

44. Të gjithë elementët e më poshtëm janë karakteristik për sindromën e Turner, me përjashtim të:

- A. kariotipi 45 X
- B. shtati i shkurtër
- C. amenorre primare

D.LH e rritur dhe FSH e ulët
E.koartacion i aortës

45. Cili është ekzaminimi kryesor në diagnostikimin e sëmundjes Hirschprung?

- A. Ph-metria
- B. skaneri
- C. biopsia rektale
- D. ekografia abdominale
- E. manometria anorektale

46. Cili është shkaku më i shpeshtë i hipoglicemisë në një fëmijë <1 vjeç:

- A. hiperinsulinemia
- B. hipopituitarizmi
- C. hipoglicemia ketotike
- D. defiçiti enzimatik i neoglukogjenezës
- E. malabsorbimi

47. Të gjithë elementët e më poshtëm janë të përfshirë në patogjenezën e bronkodisplazisë, me përjashtim të:

- A. infeksioneve
- B. prematuritetit
- C. ikterit të parakohshëm
- D. oksigjenoterapisë
- E. ventilimit mekanik

48. Një fëmijë prej 9 muajsh paraqitet me letargji, të vjella, të qara të vazhdueshme, mbledhje të gjymtyrëve të poshtme mbi bark. Prindrit referojnë se fëmija ka 10 orë me këto ankesa. Në ambulator evidentohen feçe xhelatinoze të ngjyrosura në të kuqe.

Diagnoza e mundshme në këtë rast është:

- A. stenoze pilorike
- B. apendisit
- C. infeksion i rrugëve urinar
- D. invaginacion intestinal
- E. ulçer duodenale

50. Vlerësimi klinik për të pëcaktuar pikëzimin Apgar duhet realizuar në cilën minutë?

- A. 1 min, 3 min, 6 min pas lindjes

- B. 1 min, 6 min, 8 min pas lindjes
- C. 1 min, 5 min, 10 min pas lindjes
- D. 3 min, 6 min, 9 min pas lindjes
- E. 3 min, 10 min, 20 min pas lindjes

51. Cili është shkaku më i shpeshtë i hipotiroidizmit në moshat e reja?

- A. mungesa e jodit
- B. tiroiditi subakut
- C. gusha endemike
- D. tiroiditi Hashimoto
- E. karcinoma e tiroides

52. Një fëmijë 3 vjeç paraqitet me temperaturë rash kutan, artrite, hepatosplenomegali, versament perikardial, eritrosediment të rritur dhe formulë leukocitare me shumë neutrofile. Cila është diagnoza më e mundshme?

- A. Ethe reumatizmale
- B. Lupus eritematoz sistemik
- C. Artrit reumatoid juvenil
- D. Sëmundja Lyme
- E. Spondilit ankilozant

53. Sa është vizusi i në një të porsalindur

- A. 10/10
- B. 5/10
- C. 8/10
- D. 3/10
- E. 1/10

54. Cila përfaqëson një element të veçantë për sindromën Turner?

- A. Hirsutizmi
- B. Prapambetja mendore
- C. Rritje e rrezikut për obezitet
- D. Rritje e incidencës të hipotiroidizmit kongenital
- E. Rritje të incidencës për aptologji autoimune

55. Një foshnje 3 javshe paraqitet me mikrocefale, kalçifikime cerebrale të evidentuar në radiografi të kraniumit, verbim. Cila nga patologjitë e shënuara i përgjigjet këtyre simptomave?

- A. Hemorragjia subdurale bilaterale
- B. Agenezia cerbrale
- C. Infeksionet nga citomegalovirus
- D. Eritroblastoza
- E. Mikrocefalia primitive

56. Cila është anomalia kongenitale që takohet më shpesh?

- A. Mielomeningocela
- B. Hipospadia
- C. Fokomelia
- D. Palato skizis
- E. Pes eqinus

57. Për një rritje optimale sa është saisa e proteinave që duhet të marri në ditë një fëmijë në 6 muajt e parë të jetës?

- A. 0.2 g/kg
- B. 1 g/kg
- C. 2 g/kg
- D. 5 g/kg
- E. 10 g/kg

58. Cila nga këto neoplazi haset më shpesh në moshat nën 15 vjeç:

- A. sëmundja Hodking
- B. neuroblastoma
- C. leuçemia
- D. retinoblastoma
- E. hepatoblastoma

59. Një foshnje lind në javën e 39 të shtatzanisë me një peshë 4500 g. Të gjitha situatat e shënuar më poshtë mund të jenë shkak i kësaj lindje me përjashtim të:

- A. sindromi Beckwith Weidman (hipoglicemia nga hiperinsulinemia, makroglosia etj)
- B. duhanpirja nga nëna gjatë shtatzanisë
- C. dieabeti mellitus i nënës
- D. hidropsi fetal

- E. predispozita gjenetike
60. Shkaku më i shpeshtë i hipotiroidizmit kongenital në fëmijë është:
- A. disgenezi e gjendrës tiroide
 - B. defiçiti hipotalamik i TRH
 - C. difekti në prodhim të hormoneve
 - D. hipotiroidizmi sekondar
 - E. mungesa në jod
61. Veshka polikistike është një anomali renale:
- A. elindur
 - B. e fituar ose e lindur
 - C. e fituar
 - D. e fituar vetëm në femra
 - E. e fituar vetëm në meshkuj
62. Si vendoset diagnoza në sëmundjen e celikaisë?
- A. duke dozuar antitruapat anti-gliadinë
 - B. duke dozuar antitruapat anti-IgG
 - C. duke dozuar antitruapat anti-transglutaminazë
 - D. me vlerësimin e HLA
 - E. duke marrë biopsi duodenale
63. Trajtimi i duhur i një fëmije 7 vjeç i diagnostikuar që prej 1 viti me diabet mellitus tip 1 është:
- A. hipogliceminat oral dhe dieta hipokalorike
 - B. insulinoterapi dhe dietë normoklaorike e ekuilibruar
 - C. insulinoterapi dhe dieta me përmbajtje të lartë të fibrave
 - D. insulinoterapi dhe dieta pa sheqer
 - E. insulinoterapi ose hipoglicemiant oral
64. Fëmijët e prekur nga obeziteti i thjeshtë paraqesin:
- A. pubertet të parakohshëm
 - B. vonesë në rritjen kockore
 - C. shtat të shkurtër në raport me bashkëmoshatarët
 - D. shtat më të gjatë në raport me bashkëmoshatarët

E. asnjë nga këto

65. Përdorimi i naloxonit indikohet në:

- A. sëmundjet bipolare
- B. depresionin madhor
- C. eneurezën
- D. skizofreni
- E. abuzim me drogën

66. Në trajtimin e hernies inguinale të stranguluar mund të jetë e nevojshme që të realizohet edhe:

- A. gonadektomia
- B. gastroektomia
- C. nefroektomia
- D. vezikëektomia
- E. splenoektomia

67. Diarreja akute në foshnje duhet të trajtohet me:

- A. antibiotikë
- B. antiemetik
- C. antiviral
- D. rehidrim oral
- E. rehidrim endovenoz

68. Cili është shkaku më i shpeshtë i malabsorbimit kronik në një fëmijë në moshë shkollore?

- A. Divertikuli Meckel
- B. Sëmundja Chron
- C. Celiakia
- D. Fibroza cistike
- E. Sindromi i zorrës të irrituar

69. Në fund të vitit të parë të jetës një fëmijë normal duhet të peshojë:

- A. 9-11 kg
- B. 13-14 kg
- C. 16-17 kg
- D. 19-20 kg

E. 8-9 kg

70. Shkaktari më i shpeshtë i sepsis neonatal është:

- A. streptokoku beta hemolitik i grupit A
- B. streptokoku beta hemolitik i grupit B
- C. stafilokoku aureus
- D. H.Influenzae tip B
- E. N. Meningitis

71. Shkaku më i shpeshtë i hematurisë makroskopike tek fëmija është:

- A. sindroma nefritike
- B. tumori renal
- C. infeksioni i rrugëve urinare
- D. koagulopatia
- E. trauma renale

72. Divertikuli i Mekelit vendoset në:

- A. rektum
- B. në ileus 20-60 cm nga valvula ileocecale
- C. në ileus 120 cm nga valvula ileocecale
- D. në kolon
- E. në ezofag

73. Si parandalohen ndërlikimet me natyrë reumatizmale të fruthit:

- A. me anë të izolimit të fëmijës të infektuar
- B. me përdorimin e penicilinës çdo 10 ditë
- C. me përdorimin e ampicilinës çdo 6 ditë
- D. me anë të vaksinimit në masë
- E. asnjë nga këto

74. Hidrocela duhet të operohet patjetër deri në:

- A. pubertet
- B. 15 ditë pas lindjes
- C. në muajin e 12-të
- D. pas 5 vitesh
- E. pas pubertetit

75. Cili është shkaku më i shpeshtë i otiti pas lindjes?

- A. S.pneumonie
- B. S.aureus
- C. Mycoplazma pneumonie
- D. E.coli
- E. Streptokoku i grupit A

76. Sa është indeksi Apgar në një të porsalindur me frekuncë kardiake 110/min, respiracion të ngadaltë dhe të çrregullt, lëkurë me ngjyrë rozë dhe ekstremitete lehtësisht të ngjyrosura në blu?

- A. 3
- B. 4
- C. 6
- D. 8
- E. 10

77. Cila nga këto sëmundje kërkon që fëmija të mbahet i izoluar ?

- A. varicela
- B. ekzantema
- C. HIV pozitiv
- D. Purpura Schonlein Henoch
- E. Mononukleozë infektive

78. Disleksia është:

- A. vonesë në të folur
- B. vonesë në të kuptuar të fjalëve që diagnostikohet në moshën 6 vjeç
- C. vështirësi specifike në kuptimin e materialit të lexuar në mungesë të një defiqiti konjitiv
- D. problem dëgjimor
- E. problem psikologjik

79. Cila nga këto sëmundje ka periudhën më të gjatë të inkubimit?

- A. Rubeola
- B. Parotiti
- C. Fruthi
- D. Varicela

E. Mononukleoza

80. Në rastin e lindjes para kohe, induktimi i maturimit të mushkërisë realizohet me;

- A. Kortizonik
- B. Antibiotik
- C. Surfaktant
- D. Hormone tiroide
- E. Growth factor

81. Limfadenopatie retronukale është karakteristikë e:

- A. Rubeolës
- B. Mononukleozës
- C. Adenitit tuberkular
- D. Infeksionit me HIV
- E. Gripit

82. Tumori më i shpeshtë që evidentohet në një testikul kriptokordik është:

- A. Teratoma
- B. Seminoma
- C. Karcinoma embrionale
- D. Tumori me qeliza Sertoli
- E. Tumori me qeliza Leyding

83. Në një fëmijë të lindur në kohë i cili edhe 36 orë pas lindjes ka nivel të bilirubinës 24 mg/dl duhet të realizohet:

- A. Hidratimi
- B. Infuzion me albuminë
- C. Fototerpia
- D. Eksanguinotransfuzioni

84. Tumori më i shpeshtë në fëmijëri është:

- A. Tumori Wilms
- B. Neuroblastoma
- C. Rhabdomiosarkoma
- D. Sarkoma Ewing
- E. Teratoma

85. Cili nga këto barna mund të rriti nivelin e teofilinës:

- A. Penicilina
- B. Eritromicina
- C. Cefalotina
- D. Sulfisoksazoli
- E. Gentamicina

86. Cila vitaminë këshillohet të jepet tek foshnjët që ushqehen me qumësht gjiri në 6 muajt e parë të jetës?

- A. Vitamina A
- B. Vitamina D
- C. Vitamina E
- D. Vitamina C
- E. Të gjitha

87. Pasojat e një infeksioni nga toksoplazma mund të jenë:

- A. Hidrocefalia
- B. Sëmundjet e zemrës
- C. Sëmundjet e mëlçisë
- D. Shurdhimi
- E. Keqformimi i gjymtyrëve

88. Në sindromën Turner cila nga këto shenja mungon?

- A. Shtati i shkurtës
- B. Steriliteti
- C. Prapambetja mendore
- D. Pterigum colli
- E. Coxa vara

89. Sa i gjatë është një fëni në lindje?

- A. 40 cm
- B. 55 cm
- C. 50 cm
- D. 60 cm
- E. 70 cm

90. Cili është shkaku i sëmundjes hemorragjike të i porsalinduri?
- A. mungesa e vitaminës D
 - B. mungesa e vitaminës E
 - C. mungesa e vitaminës K
 - D. mungesa e vitaminës C
 - E. mungesa e acidit folik
91. Kur quhet që një i porsalindur është nën peshë:
- A. kur ai peshon më pak se 2500 gr
 - B. kur ai peshon më pak se 2000 gr
 - C. kur ai peshon më pak se 1500 gr
 - D. kur ai peshon më pak se 1000 gr
 - E. kur ai peshon më pak se 500 gr
92. Në një vajzë 7 vjeç që ka enurezë nokturne sekondar cili ekzaminim këshillohet të realizohet fillimisht?
- A. Ekografi renale
 - B. Cistoureterografi
 - C. Radiografi abdominale
 - D. Analizë urine
 - E. Klirensi i kreatininës
93. Një vajzë në shkollë të filllore ka aftësinë intelektuale të një nxënëseje të vitit të parë gjatë shkollës të mesme. Me përafërsi sa është kofiqienti i inteligjencës i kësaj vajze?
- A. 90
 - B. 105
 - C. 120
 - D. 135
 - E. 150
94. Një vajzë 12 vjeç ankon për dobësi muskulare që shtohet përgjatë ditëve të javës si dhe për shfaqjen e një rashi eritematoz në fytyrë, krahe. Cili ekzaminimi do të ishte më i përshtatshmi në këtë rast?
- A. Matja e faktorit reumatoid
 - B. Shpejtësia e eritrosedimentit

- C. Analiza e urinës
- D. Përcaktimi i kreatinë kineazës serike
- E. Antitruapat anti bërthamor (ANA)

95. Në një të porsalindur 38 javsh, ka lindur nga një nënë diabetike. Pesha në lindje ka qenë 4225 kg. Çfarë problemi tjetër mund të ketë ky i porsalindur?

- A. Difekt të tubit neural
- B. Megakolon
- C. Kardiomegali
- D. Hidronefroze
- E. Displazi renale

96. Diarreja akute në foshnje duhet të trajtohet me:

- A. antibiotikë
- B. antiemetik
- C. antiviral
- D. rehidrim oral
- E. rehidrim endovenoz

97. Cili është shkaku më i shpeshtë i malabsorbimit kronik në një fëmijë në moshë shkollore?

- A. Divertikuli Meckel
- B. Sëmundja Chron
- C. Celiakia
- D. Fibroza cistike
- E. Sindromi i zorrës të irrituar

98. Në fund të vitit të parë të jetës një fëmijë normal duhet të peshojë: A.9-

- 11 kg
- B.13-14 kg
- C.16-17 kg
- D.19-20 kg
- E.8-9 kg

99. Shkaktari më i shpeshtë i sepsis neonatal është:

- A. streptokoku beta hemolitik i grupit A

- B. streptokoku beta hemolitik i grupit B
- C. stafilokoku aureus
- D.H.Influenzae tip B
- E.N. Meningitis

100. Shkaku më i shpeshtë i hematurisë makroskopike tek fëmija është:

- A. sindroma nefritike
- B. tumori renal
- C. infeksioni i rrugëve urinare
- D. koagulopatia
- E. trauma renale

F.MJEKËSI LIGJORE

1.Mjeku ligjor ka për detyrë të:

- A. realizojë plotësimin e skedës të vdekjes
- B. realizojë verifikimin e rrethanave të ngjarjes
- C. përcaktojë vdekjen
- D. të gjitha më lart janë të vërteta
- E. asnjë nga këto

2.Mumifikimi është:

- A. formë e konservimit të kufomës
- B. faza e fundit e kalbëzimit të kufomës
- C. faza e lëngëzimit të kufomës
- D. faza e ngjyritit të kufomës
- E. njëlloj si sapunifikimi

3.Në ekzami nimin mjeko-ligj or të kufomës bëjnë pjesë:

- A. kqyrja e kufomës në vendin e ngjarjes
- B. autopsia mjekoligjore e kufomës
- C. autopsia e dytë ose e përsëritur
- D. zhvarrosja e kufomës
- E. të gjitha pohimet më lart janë të vërteta

4. Marrëdhënia seksuale konsiderohet krim atëhere kur:

- A. kryhet me disa persona njëkohësisht
- B. kryhet me persona të ndryshëm në kohë të ndryshme
- C. kryhet duke përfituar nga pazotësia e të dëmtuarës/it për tu mbrojtur
- D. kur kryhet pa përdorur masa mbrojtëse
- E. asnjë nga këto

5. Ekspertimi mjekoligjor i gjakut merr vlera të mëdha në:

- A. çeshtje civile për zgjidhje të padive për njohje ose kundërshtim të atësisë apo mëmësisë
- B. çështjet e pronësisë
- C. përcaktimin e shkakut të vdekjes të foshnjes
- D. të gjitha alternativat më lart janë të vërteta
- E. asnjë nga alternativat më lart nuk është e vërtetë

G.FARMAKOLOGJI-TOKSIKOLOGJI KLINIKE

1. Në pneumoninë nga stafilokoku aureus rezistent ndaj trajtimit me met icilinës, antibiotiku i zgjedhur do të ishte:

- A. vankomicina
- B. oxacillina
- C. gentamicina
- D. piperacillina
- E. klaritromicina

2. Barnat hipoglicemiant të klasës të sulfaniluresë:

- A. jepen gjithmonë si terapi e vetme
- B. stimulojnë prodhimin e insulinës dhe mund të shkaktojnë një hipoglicemi të formës të rëndë
- C. kanë indikacion në diabetin tip 1
- D. në ndryshim nga biguanidet nuk kanë të nevojshme praninë aktive të qelizave beta të pankreasit
- E. mund të antagonojnë efektin hipoglicemiant të biguanideve

3. Të gjithë antidiabetikët e poshtëshënuar mund të shkaktojnë hipoglicemi, me përjashtim të:

- A. glipizideve
- B. klorpromamideve
- C. tolbutamideve
- D. metofminës
- E. insulinës lantus

4. Cila nga këto barna mund të shkaktojë një agranulocitozë të rëndë?

- A. klozapina
- B. nizatidina
- C. haloperidoli
- D. karbocisteina

E. kodeina

5. Cilat nga këto barna mund të shfaqin tolerancë nëse përdoren për një kohë të gjatë?

- A. betablokues
- B. statina
- C. antidiabetikët oral
- D. benzodiazepina
- E. antagonistët e kalçiumit

6. Salbutamoli është një:

- A. stimulues i receptorëve beta2-adrenergjik
- B. beta-blokues
- C. antihistaminik
- D. antikolinergjik
- E. asnjë prej tyre

7. Cili nga barnat e poshtëshënuar paraqitet aktiv në luftën ndaj haemofilus?

- A. bacitracina
- B. teikoplanina
- C. cikloserina
- D. ampicilina
- E. penicilina G

8. Të gjithë barnat e mëposhtëm japin nefrotoksicitet me përjashtim të:

- A. amfotericina B
- B. cisplastina
- C. gentamicina
- D. amoxiciklina
- E. vankomicina

9. Të gjithë barnat e poshtëshënuar janë agonist beta-adrenergjik me përjashtim të:

- A. adrenalinës
- B. izoproterenolit
- C. noradrenalinës
- D. fentolaminës
- E. dobutaminës

10. Në kardiopatinë ishemike përdoren të gjithë barnat e poshtëshënuar me përjashtim të:
- A. kortizonikëve
 - B. nitroderivateve
 - C. beta-blokuesve
 - D. ACE inhibitorëve
 - E. antiagregantëve
11. Cili bar është një beta bllokues selektiv?
- A. paraktolol
 - B. atenolol
 - C. soltalol
 - D. propanolol
 - E. pindolol
12. Amiloroidi është:
- A. diuretik anse
 - B. ruan kaliumin në organizëm
 - C. diuretik tiazidik
 - D. frenues i anhidrazës karbonike
 - E. diuretik osmotik
13. Në një pacient me ulje të dëgjimit duhet të jepet:
- A. penicilinë
 - B. cefalosporinë
 - C. aminoglikozide
 - D. karbon
 - E. makrolid
14. Në një pacient në terapi me simvastatina, përdorimi i njëkohshëm i klaritromicinës do të jepte:
- A. dhimbje stomaku
 - B. miopati dhe rabdomiolizë
 - C. cefale
 - D. vertigo
 - E. somnolencë

15. Pacientit me astëm nuk i jepet asnjëherë:
- A. salbutamol
 - B. digoksinë
 - C. propranolol
 - D. bretilium
 - E. lidokainë
16. Cili AIJS është më pak dëmtues i stomakut?
- A. Acidi acetyl salicilik
 - B. Diklofenaku
 - C. Indometacina
 - D. Paracetamoli
 - E. Sulindac
17. Mekanizmi kryesor me anë të së cilit AIJS dëmtojnë stomakun është:
- A. bllokimi i sekretimit të mukosit gastrik
 - B. shtimi i aciditetit
 - C. stimulimi i receptorëve histaminik në nivel të mukozës gastrike
 - D. bllokimi i sintezës të prostaglandinave
 - E. prodhimi i gastrinës
18. Omeprazoli e realizon funksionin e tij falë:
- A. antagonizimit të receptorëve H₂
 - B. bllokimit të pompës protonike
 - C. frenimit të antiporterit Na⁺/H⁺
 - D. veprimtarisë antivirale
 - E. veprimtarisë antikolinergjike
19. Në shok anafilaktik duhet realizuar menjëherë terapia me:
- A. kardiotonik
 - B. adrenalinë dhe kortizonik
 - C. diuretik
 - D. dopaminë dhe antihistaminik
 - E. anksiolitik

20. Efekti anësor që shfaqet gjatë terapisë me hekur është:
- A. çrregullime gastrointestinale
 - B. kollë
 - C. hipertension
 - D. përgjumje
 - E. alterime të diurezës
21. Cili nga këto barna mund të shkaktojë kollë :
- A. nitroderivatet
 - B. antagonistët e kalçiumit
 - C. ACE inhibitorët
 - D. Antagonistët e receptorëve alfa 1 adrenergjik
 - E. AIJS
22. Në një pacient diabetik insulino vartës, moshë e tretë, cili është beta bllokuesi i përshtatshëm për trajtimin e anginës dhe hipertensionit?
- A. propranolol
 - B. pindolol
 - C. atenolol
 - D. nadolol
 - E. timolol
23. Cil nga barnat e poshtë shënuar është një barbiturat që përdoret si antiepileptik?
- A. Pentobarbital
 - B. Tiopental
 - C. Fenobarbital
 - D. Diazepam
 - E. Secobarbital
24. Barnat me efikas në reduktimin e nivelit plazmatik të triglicerideve janë:
- A. Statinat
 - B. Rezinat jonoshkëmbyese
 - C. Fibratet
 - D. Frenuesit e lipazës pankreatike
 - E. Asnjë prej tyre

25. Në helmimet nga opiatet pupilat janë:

- A. Miotike
- B. Midriatike
- C. Anizokorike
- D. Hiper reflektore
- E. Nuk reagojnë

26. Cili bar mund të antagonizojë frenimin e procesit të frymëshkëmbimit të induktuar nga morfina?

- A. Buprenorfina
- B. Pentazocina
- C. Naloxoni
- D. Metadoni
- E. Kodeina

27. Kokaina ka veprime të tipit :

- A. Simpatolitike
- B. Miorelaksante
- C. Parasimpatomimetike
- D. Anestetike lokale
- E. Spazmolitike

28. Një prej këtyre cefalosporinave përthithet mirë me rrugë orale. Tregoni cila:

- A. Cefalotina
- B. Cefaloridina
- C. Cefalexina
- D. Cefamandoli
- E. Cefuroksima

29. Manitoli është:

- A. Antikoagulant oral
- B. Diuretik osmotik
- C. Beta bllokues
- D. Antagonist i kalçiumit
- E. Antidot në rastet e helmimit me plumb

30. Simptomat më të rënda të abstinencës nga morfina vihen re pas:

- A. 2-4 orëve
- B. 10-20 orëve
- C. 24-72 orëve
- D. 5-8 ditëve
- E. 14 ditëve

31. Në një pacient me mbidozim nga heroina ndërhyet duke dhënë:

- A. fenobarbital
- B. metadon
- C. aspirinë
- D. naloxon
- E. diazepam

H.ORGANIZIM-MENAXHIM SHËNDETËSOR

1. Plani Kombëtar i Shëndetësisë përfaqëson:
 - A. bashkësinë e ligjeve që rregullojnë aktivitetin mjekësor kombëtar
 - B. rregullat për organizimin e shërbimit shëndetësor
 - C. rregullat për aplikimin e terapive mjekësore
 - D. bashkësinë e ligjeve, normave, rregullave të nevojshme për realizimin korrekt të veprimtarisë mjekësore në të gjithë vendin
 - E. të gjitha pohimet më lart janë të vërteta

2. Funkzioni kryesor i Institutit të Shëndetit Publik është:
 - A. të mbështesi veprimtarinë mjekësore rajonale
 - B. të këshilloj qeverinë në lidhje me hartimin e linjave guidë të trajtimit
 - C. të këshilloj ministrinë e shëndetësisë në lidhje me mënyrat e përmirësimit të shëndetit të qytetarëve
 - D. të realizojë punë kërkimore të vazhdueshme në drejtim të vlerësimit dhe kontrollit të shëndetit publik
 - E. të bashkëpunoj me ministrinë në realizimin e kontrollit të barnave

3. Ku është qendra e Organizatës Botërore të Shëndetësisë?
 - A. Strasburg
 - B. Bruksel
 - C. Londër
 - D. Gjenevë
 - E. Stokholm

4. Faktorët përcaktues të shëndetit përfshijnë:
 - A. faktorët biologjik dhe gjenetik
 - B. stilin e jetesës
 - C. faktorët social-ekonomik
 - D. shtrirjen dhe natyrën e shërbimeve shëndetësore
 - E. të gjitha pohimet më lart janë të vërteta

5. Qëllimi i edukimit shëndetësor është:

- A. të ndryshojë sjelljet shëndetësore
- B. të përmirësojë gjendjen shëndetësore
- C. A dhe B janë të sakta
- D. të informojë në lidhje me shëndetin
- E. të realizojë projekte shëndetësore

DIAGNOZË ME IMAZHE DHE PROCEDURA DIAGNOSTIKE TË PËRGJITHSHME

Pyetja1

Në radiografinë torakale radiopaciteti është i ulur në kushtet të:

- A) Pnevmonisë nga aerobët
- B) Versamentit pleural
- C) Pnevmotoraksit
- D) Cisteve
- E) Pnevmonisë nga anaerobët

Pyetja2

Shisurat pleurale evidentohen në:

- A) Radiografi dhe CT
- B) Vetëm në radiografi
- C) Vetëm në CT
- D) Në ekografi
- E) Vetëm në raste të patologjisë pleurale

Pyetja3

Cili parametër laboratorik është gjithmonë i rritur në sindromën Cushing?

- A) kortizoli urinar
- B) transaminazat
- C) leukocitet
- D) ACTH plazmatik
- E) DHEA-sulfat plazmatik

Pyetja4

Vargu globinik në hemoglobinën e një të rrituri normal ka përbërje si më poshtë:

- A) dy vargje alfa dhe dy vargje beta
- B) dy vargje alfa dhe dy vargje beta
- C) një varg alfa dhe një varg beta

- D) një varg alfa dhe dy vargje gama
- E) dy vargje alfa dhe dy vargje gama

Pyetja5

Cili nga shënjesit tumoral mund të gjendet në vlera të rritura gjatë një tumori neuroendokrin?

- A) antigjeni karcino embrional (CEA)
- B) alfafetoproteina (AFT)
- C) kromogranina A
- D) antigjeni polipeptidik indor (TPA)
- E) CA 15-3

Pyetja6

Cili nga këto parametra laboratorik të alteruar mund të tregojë për egzistencën e një çrregullimi në gjendrën tiroide?

- A) Sideremia
- B) Kreatininemia
- C) Kolesterolemia
- D) Azotemia
- E) LDH

Pyetja7

Cili është testi diagnostik i fibrozës cistike?

- A) heliko tomografia me rezolucion të lartë e toraksit
- B) bronkoskopia
- C) spirometria
- D) testi i djersës
- E) shintigrafia pulmonare

Pyetja8

Cili bakter haset me shpesh në flogozën supurative?

- A) Stafilokoku epidermeitis
- B) Diplokoku
- C) Stafilokoku aureus
- D) Streptokoku fekal
- E) Streptokoku viridans

Pyetja9

Me cilën rrugë eliminohen nga organizmi lëndët e kontrastit organik jodik hidrosolubil?

- A) rektale
- B) hepatike
- C) pulmonare
- D) me pështymë
- E) renale

Pyetja10

Cila shenjë radiologjike konfirmon shenjat patognomotike të një okluzioni intestinal të dysshuar?

- A) nivele aeriike mbi diafragëm
- B) nivele aeriike nën diafragëm
- C) nivele hidro aeriike intestinale

- D) opacitet difuz abdominal
- E) radiotransparenzë difuze abdominale

Pyetja11

Në rastin e një traume muskulare ku dyshohet edhe për një hematomë post-traumatike, teknika diagnostike më e përshtatshme është:

- A) CT
- B) Radiografi zonale
- C) Xeroradiografi
- D) Shintigrafi
- E) Ekografia

Pyetja12

Nëse në një pacient dyshohet për perforacion intestinal, cili ekzaminimi instrumental duhet kërkuar urgjentisht?

- A) Ekografia abdominale
- B) Radiografi me barium e aparatit tretës
- C) Klizëm me kontrast hidrosolubël
- D) Klizëm me dopio kontrast
- E) Radiografi abdominale

Pyetja13

Ekografikisht një cistit renal i thjeshtë do të paraqitet:

- A) Anekogen
- B) Hiperekogen
- C) Hipoekogen
- D) Izoekogen
- E) Mikse

Pyetja14

Cili ekzaminimi është më i përshtatshëm në ndjekjen e ecurisë të sëmundjes së një pacienti me pankreatit akut?

- A) ERCP
- B) Kolangio-RM
- C) Kolangiografia
- D) RM abdominale
- E) Ekografia

Pyetja15

Cili është ekzaminimi i përzgjedhur në studimin e palcës kockore?

- A) Radiografia
- B) Angiografia
- C) TC
- D) Ekografia
- E) RM

Pyetja16

Në stadifikimin e tumorit pulmonar cila e dhënë radiologjike është me e përdorshme?

- A) Shintigrafia pulmonare

- B) TC torakale pa kontrast
- C) Bronkoskopia
- D) Radiografia e toraksit
- E) TC torakale me mjete kontrasti

Pyetja17

Pacient 50 vjeç, me episode hematurie dhe ekografi negative për kalkulozën renale. Cili ekzaminim instrumental është dytësor?

- A) Radiografi e aparatit urinar
- B) Ekografi
- C) Pielø-RM
- D) Urografi
- E) Uro-TC

Pyetja18

Kur dyshohen klinikisht për fraktura të meniskut post-traumatike, cili ekzaminim instrumenta është më i indikuari?

- A) Radiografia konvencionale
- B) RM
- C) Ekografia
- D) Artro-RM
- E) Artro-TC

Pyetja19

Një grua diagnostikohet në mamografi me mikro kalçifikime parenkimale. Çfarë ekzaminimi do të kërkonit më tej?

- A) Galaktografi
- B) Galakto-RM
- C) Biopsi e drejtuar ekografikisht
- D) Biopsi stereotaksike
- E) Ekografi

Pyetja20

Kur dyshohet për ikter obstruktiv cili ekzaminim instrumental kërkohet fillimisht?

- A) Kolangio-RM
- B) ERCP (endoscopic retrograde colangio-pancreatography)
- C) CT abdominale
- D) Ekografi abdominale
- E) CT abdominale me kontrast

Pyetja21

Gadolina (lëndë kontrasti) kalon barrierrën hemato-encefalike në cilën situatë?

- A) vetëm në rast të patologjive neoplazike
- B) vetëm në rast të patologjive neoplazike malinje
- C) kur dëmtohet barriera hemato-encefalike
- D) asnjëherë
- E) gjithmonë

Pyetja22

Cili ekzaminim radiologjik është më i përshtatshmi për vlerësimin e ndërlikimeve të pankreatitit akut?

- A) Ekografia abdominale
- B) Radiografi abdominale
- C) Kolangio-RM
- D) CT
- E) CT bazale

Pyetja23

Një i sëmurë 70 vjeç vlerësohet si pozitiv për praninë e gjakut në feçe. Nëse mbi bazë të kësaj të dhëne dhe të dydhonit për një lezion neoplazik intestinale cili ekzaminim do të duhej për vendosjen e një diagnoze të sigurt?

- A) Klizma
- B) Kolonoskopia e CT
- C) CT abdominale
- D) Klizma me dopio kontrast
- E) Kolonsigmoidoskopia

Pyetja24

Cili është burimi energjistik që përdoret në RMN?

- A) Rrezet infra të kuqe
- B) Fushat magnetike
- C) Radiacioni i jonizuar
- D) Valët G
- E) Ultratingulli

Pyetja25

Cili është aspekti radiologjik tipik i versamentit pleural?

- A) Opaciteti nodular
- B) Zona të radiotransparencës apikale
- C) Zona të radiotransparencës bazale
- D) Opacitet bazal me buzën e sipërme konkave
- E) Opacitet bazal me buzën e sipërme konvekse

Pyetja26

Proceset e ndryshme patologjike që zhvillohen në kocka dhe në kyçe radiologjikisht shoqërohen me:

- A) Ndryshime të densitetit kockor
- B) Ndryshime të strukturës kockore
- C) Ndryshime të formës
- D) Asnjë
- E) Të gjitha këto më lart

Pyetja27

Në frakturën e degës të gjelbër (subperiostale) radiologjikisht:

- A) Periosti mbetet i pandryshuar
- B) Periosti destruktohet
- C) Vija e thyerjes kalon në femur
- D) Evidentohet hipertrofi kockore

Pyetja28

Një pacient me arteriopati obliterante periferike diagnoza vendoset me:

- A) Angio RM
- B) Angio CT
- C) Ekocolor-Doppler
- D) Angiografi
- E) TC bazale

Pyetja29

Në një pacient me trauma kraniale cili është ekzaminimi bazë?

- A) Radiografi kraniale
- B) RM encefalike
- C) CT koke
- D) RM trupit
- E) Asnjë

Pyetja30

Nëse një pacient dyshohet për një sëmundje inflamatore kronike intestinale me anë të cilit ekzaminim vendoset diagnoza?

- A) Entero-RM
- B) Radiografi e aparatit tretës
- C) Entero-CT
- D) Colonsigmoidoskopia
- E) Ekografi

Pyetja31

Nëse dyshoni për emboli pulmonare cili ekzaminim instrumental lejton të vendosni diagnozën?

- A) Radiografia
- B) CT torakale
- C) Angio CT torakale
- D) Ekografia trans-ezofageale
- E) Ekokardiografia

Pyetja32

Cila është prerja optimale e përdorur në HRCT?

- A) 1-2 mm
- B) 2-3 mm
- C) 1 cm
- D) 0.1 mm
- E) 4-5 mm

Pyetja33

Errësimet në formë vijash (si shinat e trenit) janë karakteristikë e:

- A) bronhektazisë
- B) atelektazisë
- C) astmës bronkiale
- D) pneumopative
- E) abcesit

Pyetja34

Figura hidroaerike e rumbullakët me strukturë jo të njëtrajtshme e përbërë nga një errësim nga ana e poshtme me formë gjysmëhënë dhe një pjesë e tejdukshme nga ana e sipërme i korrespondon shfaqjes radiologjike pulmonare të një:

- A) abcesi pulmonar
- B) ekinokoku pulmonar
- C) pneumopatie
- D) hernie gjafragmale
- E) bronjektazie

Pyetja35

Kriter radiologjik që shkon në favor të një noduli pulmonar malinj janë:

- A) forma jo e rregullt
- B) buzët jo të rregullta
- C) mungesa e kalçifikimeve ose kalçifikimet ekscentrike
- D) të gjitha përgjigjet më lartë
- E) asnjë nga përgjigjet më lartë

Pyetja36

Për vlerësimin e retroperitoneumit, mënyra e zgjedhur është:

- A) urografia
- B) CT
- C) Ekografia
- D) Retropneumoperitonuemi
- E) RM

Pyetja37

Cili ind është më rezistent ndaj rrezatimit:

- A) Testikuli
- B) Lëkura
- C) Muskuli i strijuar
- D) Ovari
- E) Epiteli

Pyetja38

Cili ekzaminim realizohet për vlerësimin e tendinopative Akiliene:

- A) Ekografia
- B) Radiografia
- C) RM
- D) CT
- E) Xerografia

Pyetja39

Në cilin rast kërkohet që të realizohet një kolangiografi perkutane:

- A) Kolecistit kronik
- B) Ikter obstruktiv
- C) Kolelitizaë
- D) Cirrozë biliare
- E) Hepatokarcinome

Pyetja40

Në një pacient me hematemezë duhet realizuar:

- A) Radiografi e aparatit tretës me contrast me barium
- B) Radiografi e thjeshtë e aparatit tretës
- C) Radiografi kur pacienti është esëll
- D) Ekografi e pjesës të sipërme abdominale
- E) Endoskopi

Pyetja41

Në rastin e një hematome muskulare post- traumatike në nivel të kofshës, cila është teknika imazherike më e përshtatshme?

- A) Ekotomografia
- B) Xerografia
- C) Endoskopia
- D) CT
- E) Radiografia

Pyetja42

Në vlerësimin e frakturave kockore cila teknikë diagnostike imazherike përbën zgjedhjen e parë?

- A) Radiografia direkte
- B) Shintigrafia kockore
- C) RM
- D) CT
- E) Ekografia

Pyetja43

Në rast të embolisë pulmonare ekzaminimi imazherik më i përshtatshëm është:

- A) CT spirale
- B) Radiografi
- C) RM
- D) Ekocolor Doppler
- E) PET

Pyetja44

Shenja radiologjike e “këpucës prej druri” është karakteristikë e:

- A) Tetradës Fallot
- B) Stenoza e arteries pulmonare
- C) Defekti interventrikular
- D) Ductus botalli apertus
- E) Koartacion i aortës

Pyetja45

“Nisha” është shenjë radiologjike diagnostike e:

- A) Ulçerës peptike të stomakut
- B) Ulçerës duodenale
- C) Kancerit të stomakut
- D) Stenozën e duodenit
- E) Kancerin e ezofagut

Pyetja46

Cila lëndë përdoret si lëndë kontrasti e injektuar i.v gjatë realizimit të CT?

- A) Sulfati i bariumit
- B) Gadolina
- C) Jodi hidrosolubël
- D) Uji
- E) Metilceluloza

Pyetja47

Në vlerësimin e veshit të mesëm metoda e zgjedhur është:

- A) CT
- B) RM
- C) Radiografi
- D) Tomografi
- E) CT me rezolucion të lartë

Pyetja48

Cila nga këto qeliza është më e ndjeshme ndaj rrezatimit?

- A) Limfocitet
- B) Astrocitet
- C) Hepatocitet
- D) Miocitet
- E) Neuronet

Pyetja49

Ultratingulli është:

- A) Energji mekanike
- B) Mënyrë e transferimit të energjisë në hapsira boshe
- C) Njësi elementare e energjisë
- D) Dritë e dukshme
- E) Valë me radiofrekuencë

Pyetja50

Cila është metoda më e përdorur në drejtimin e punkcionit perkutan të rrugëve biliare?

- A) Ekografia
- B) RM
- C) CT
- D) Kolangiografia endovenoze
- E) ERCP

Pyetja51

Cila është metoda imazherike e zgjedhur në studimin e bifurkacionit karotid?

- A) Angiografi
- B) Angio-RM
- C) RM
- D) Eko-dopler
- E) CT

Pyetja52

Radiondjeshmëria indore varion në përputhje me:

- A) Aktivitetin mitotik
- B) Oksigjenimin
- C) Asbestozën
- D) Silikozën
- E) Indin adipoz

Pyetja53

Dozimetria vlerëson:

- A) Sasinë e rrezatimit të përthithur nga organizmi dhe qelizat e tij
- B) Sasinë e rrezatimit të aftë të shkatërrojë qelizat e organizmit
- C) Një disiplinë unike
- D) Lidhjen midis sasisë të rrezatuar dhe llojeve të ndryshme të radiacionit
- E) Shpeshhtësinë e tumoreve në raport me dozat e rrezatimit

Pyetja54

Në rast osteopenie ekzaminimi radiografik standart:

- A) Përcakton diagnozën në faza të avancuara
- B) Zëvendëson metodat vlerësuese mineralo-densitometrike
- C) Përcakton diagnozën në fazat e hershme
- D) Vlerëson humbjen kockore
- E) Nuk ka vlerë

Pyetja55

Osteodensitometria (DEXA):

- A) Përcakton diagnozën në faza të avancuara
- B) Zëvendëson metodat vlerësuese mineralo-densitometrike
- C) Përcakton diagnozën në fazat e hershme
- D) Vlerëson humbjen kockore
- E) Nuk ka vlerë

Pyetja55

Cili është ndryshimi midis CT dhe RM:

- A) Nuk ka asnjë ndryshimi midis CT dhe RM
- B) CT është një metodë vlerësimi multiparametrike që varet nga denistet
- C) RM është një metodë vlerësimi multi parametrike që nuk përdor rrezatimin e jonizuar
- D) Në RM nuk përdoren lëndë kontrasti
- E) RM është një metodë monoparametrike

Pyetja56

Tofet janë karakteristikë e:

- A) Artriti psoriatik
- B) Sklerodermisë
- C) Artritit akut gutoz
- D) Artropatisë kronike nga guta
- E) Osteoartrozës reozive

Pyetja57

Avantazh i RM:

- A) Është një ekzaminim monoparametrik
- B) Është shumëplanshe
- C) Ka kosto të ulët
- D) Ka kohë të shkurtër ekzaminim
- E) Nuk ka kundërrindikacione

Pyetja58

Në vlerësimin e surrenaleve ekzaminimi imazherik i zgjedhur është:

- A) RM
- B) CT
- C) Ekografia
- D) Angiografia
- E) Urografia

Pyetja59

Cili burim energjistik përdoret në ekografi?

- A) Rrezatimi jonizues
- B) Valët mekanike
- C) Rrezet infra të kuqe
- D) Rrezatimi elektromagnetik
- E) Rrezet gama

Pyetja60

Në cilën nga këto sëmundje të mëlçisë diagnoza me imazhe nuk ka vlerë?

- A) Hepatit akut
- B) Steatozë
- C) Cirrozë
- D) Abces
- E) Hipertension portal

Pyetja61

RM përdor:

- A) Radiofrekuencën
- B) Rrezatim jonizues
- C) Ultratinguj
- D) Rreze infra të kuqe

E) Rreze X

Pyetja62

Kundërrindikacion absolut i RM në patologjitë kardio-vaskulare është:

- A) Pace-maker
- B) Klaustrofobia
- C) Klipse metalike kirurgjikale
- D) Proteza
- E) Obeziteti

Pyetja63

Vlerësimi i menisqeve realizohet me:

- A) Radiografi
- B) Ekografi
- C) Shintigrafi
- D) Radiografi+shintigrafi
- E) RM

Pyetja64

Cili lloj rrezatimi përdoret në CT?

- A) Ultravjollcë
- B) Ultratingull
- C) Rreze X
- D) Valë elektromagnetike
- E) Infra të kuqe

Pyetja65

Nëse dyshohet për një litiazë të rrugëve biliare cila është teknika diagnostike e zgjedhur në vënie të diagnozës?

- A) Ekografia
- B) Ekokolor-Doppler
- C) Shintigrafia
- D) RM
- E) CT

Pyetja66

Në vlerësimin e një neoplazie të dyshuar në prostatë cila teknikë diagnostike do të ishte më e përdorshme?

- A) CT
- B) Angiografia
- C) RM
- D) Ekotomografia me sondë endorektale
- E) Radiografi abdominale me infusion me barium

Pyetja67

PET është:

- A) Tomografi elektromagnetike pozitronike
- B) Tomografi elicoidale pozitronike
- C) Tomografi me emision të pozitroneve

- D) Tomografi me emision të protoneve
- E) Asnjë

Pyetja68

Në osteoporozë:

- A) Masa kockore zvogëlohet dhe reduktohet përmbajtja minerale e matriksit kockor
- B) Masa kockore ruhet
- C) Masa kockore zvogëlohet dhe ruhet përmbajtja minerale e matriksit kockor
- D) Masa kockore rritet
- E) Vërtetohet përthithje kockore

Pyetja69

Radiologjikisht gurët biliarë janë:

- A) Vetëm radiopakë
- B) Vetëm radiotransparent
- C) Miks
- D) Radiopak dhe miks
- E) Radiopakë, radiotransparent, miks

Pyetja70

Cila nga këto patologji mund të japi metastaza kockore?

- A) Karcinoma e prostatës
- B) Karcinoma e ovarit
- C) Melanoma
- D) Karcinoma pulmonare
- E) Karcinoma kolonit

Pyetja71

Vlerësimi optimal i prostatës realizohet me:

- A) Ekografi me rrugë suprapubike
- B) Ekografi me rrugë transrektale
- C) CT
- D) RM
- E) Cistografi

Pyetja72

Në vlerësimin e pankreatitit akut është i rëndësishëm:

- A) Ekografia
- B) RM
- C) CT
- D) Radiografia
- E) Shintigrafia

Pyetja73

Për ndjekjen e ecurisë të transplantit reanl përdoret:

- A) CT
- B) RM

- C) Urografia
- D) Ekografia+ekocolor-Doppler
- E) Radiografi abdominale

Pyetja74

Spondilolisteza karakterizohet nga:

- A) Rrëshqitje nga prapa e trupit të vertebrës
- B) Rrëshqitje laterale e trupit të vertebrës
- C) Frakturë e trupit të vertebrës
- D) Rrëshqitje nga përpara e trupit të vertebrës
- E) asnjë

Pyetja75

Cila është metoda e përzgjedhur në studimin e mamellave:

- A) Mammografia
- B) Ekografia
- C) Xerodiagrafia
- D) RMN
- E) Termografia

Pyetja76

Nëse dyshohet për veshkë polikistike, urografia është një ekzaminim:

- A) Dytësor
- B) Thelbësor në vendosje diagnoze
- C) Bashkëshoqërues i shintigrafisë
- D) Që nuk ka asnjë vlerë
- E) I pa zëvendësueshëm

Pyetja77

Sa lobe ka mushkëria e djathtë?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

Pyetja78

Në rastin e një pankreatiti kronik cili ekzaminim mund të japi të dhëna më të plota?

- A) Wirsungografia retrograde
- B) Shintigrafia
- C) CT
- D) Radiografia abdominale
- E) Angiografia

Pyetja79

Një grua diagnostikohet në mamografi me mikro kalçifikime parenkimale. Çfarë ekzaminimi do të kërkonte më tej?

- A) Galaktografi

- B) Galakto-RM
- C) Biopsi e drejtuar ekografikisht
- D) Biopsi stereotaksike
- E) Ekografi

Pyetja80

Kur dyshohet për ikter obstruktiv cili ekzaminim instrumental kërkohet fillimisht?

- A) Kolangio-RM
- B) ERCP (endoscopic retrograde colangio-pancreatography)
- C) CT abdominale
- D) Ekografi abdominale
- E) CT abdominale me kontrast

Pyetja81

Gadoliniumi (lëndë kontrasti) kalon barrierrën hemato-encefalike në cilën situatë?

- A) vetëm në rast të patologjive neoplazike
- B) vetëm në rast të patologjive neoplazike malinje
- C) kur dëmtohet barriera hemato-encefalike
- D) asnjëherë
- E) gjithmonë

Pyetja82

Cili ekzaminim radiologjik është më i përshtatshmi për vlerësimin e ndërlikimeve të pankreatitit akut?

- A) Ekografia abdominale
- B) Radiografi abdominale
- C) Kolangio-RM
- D) CT
- E) CT bazale

Pyetja83

Një i sëmurë 70 vjeç vlerësohet si pozitiv për praninë e gjakut në feçe. Nëse mbi bazë të kësaj të dhëne dhe të dydhonit për një lezion neoplazik intestinal cili ekzaminim do të duhej për vendosjen e një diagnoze të sigurt?

- A) Klizma
- B) Kolonoskopia e TC
- C) CT abdominale
- D) Klizma me dopio kontrast
- E) Kolonsigmoidoskopia

Pyetja84

Cili është burimi energjistik që përdoret në RMN?

- A) Rrezet infra të kuqe
- B) Fushat magnetike
- C) Radiacioni i jonizuar
- D) Valët G
- E) Ultratingulli

Pyetja85

Cili është aspekti radiologjik tipik i versamentit pleural?

- A) Opaciteti nodular
- B) Zona të radiotransparencës apikale
- C) Zona të radiotransparencës bazale
- D) Opacitet bazal me buzën e sipërme konkave
- E) Opacitet bazal me buzën e sipërme konvekse

Pyetja86

Një pacient me arteriopati obliterante periferike diagnoza vendoset me:

- A) Angio RM
- B) Angio CT
- C) Ekocolor-Doppler
- D) Angiografi
- E) CT bazale

Pyetja87

Nëse një pacient dyshohet për një sëmundje inflamatore kronike intestinale me anë të cilit ekzaminim vendoset diagnoza?

- A) Entero-RM
- B) Radiografi e aparatit tretës
- C) Entero-TC
- D) Colonsigmoidoskopia
- E) Ekografi

Pyetja88

Nëse dyshoni për emboli pulmonare cili ekzaminim instrumental lejon të vendosni diagnozën?

- A) Radiografia
- B) CT torakale
- C) Angio CT torakale
- D) Ekografia trans-ezofageale
- E) Ekokardiografia

Pyetja89

Cila është prerja optimale e përdorur në HRCT?

- A) 1-2 mm
- B) 2-3 mm
- C) 1 cm
- D) 0.1 mm
- E) 4-5 mm

Pyetja90

Erësimet në formë vijash (si shinat e trenit) janë karakteristikë e:

- A) bronhektazisë
- B) atelektazës
- C) astmës bronkiale
- D) pneumopative

- E) abcesit

Pyetja91

Figura hidroerike e rrumbullakët me strukturë jo të njëtrajtshme e përbërë nga një errësim nga ana e poshtme me formë gjysmëhënë dhe një pjesë e tejdukshme nga ana e sipërme i korrespondon shfaqjes radiologjike pulmonare të një:

- A) abcesi pulmonar
- B) ekinokoku pulmonar
- C) pneumopatie
- D) hernie gjafragmale
- E) bronjektazie

Pyetja92

Për vlerësimin e retroperitoneumit, mënyra e zgjedhur është:

- A) urografia
- B) CT
- C) Ekografia
- D) Retropneumoperitonuemi
- E) RM

Pyetja93

Cili ind është më rezistent ndaj rrezatimit:

- A) Testikuli
- B) Lëkura
- C) Muskli i strijuar
- D) Ovari
- E) Epiteli

Pyetja94

Cili ekzaminim realizohet për vlerësimin e tendinopative Akiliene:

- A) Ekografia
- B) Radiografia
- C) RM
- D) CT
- E) Xerografia

Pyetja95

Në cilin rast kërkohet që të realizohet një kolangiografi perkutane:

- A) Kolecistit kronik
- B) Ikter obstruktiv
- C) Kolelitizaë
- D) Cirrozë biliare
- E) Hepatokarcinome

Pyetja96

Në një pacient me hematemezë duhet realizuar:

- A) Radiografi e aparatit tretës me kontrast me barium

- B) Radiografi e thjeshtë e aparttit tretës
- C) Radiografi kur pacienti është esëll
- D) Ekografi e pjesës të sipërme abdominale
- E) Endoskopi

Pyetja97

Në rastin e një hematome muskulare post- traumatike në nivel të kofshës, cila është teknika imazherike më e përshtatshme?

- A) Ekotomografia
- B) Xerografia
- C) Endoskopia
- D) CT
- E) Radiografia

Pyetja98

Në vlerësimin e frakturave kockore cila teknikë diagnostike imazherike përbën zgjedhjen e parë?

- A) Radiografia direkte
- B) Shintigrafia kockore
- C) RM
- D) CT
- E) Ekografia

Pyetja99

Në rast të embolisë pulmonare ekzaminimi imazherik më i përshtatshëm është:

- A) CT spirale
- B) Radiografi
- C) RM
- D) Ekocolor Doppler
- E) PET

Pyetja100

Cili nga strukturat më poshtë është më i ndjeshëm ndaj rrezatimit?

- A) Kolageni
- B) Tiroidja
- C) Mëlçia
- D) Veshka
- E) Palca kockore

Pyetja101

Patologjia nodulare e tiroides studiohet fillimisht me:

- A) Padiografi e qafës për indet e buta
- B) CT
- C) RM
- D) Shintigrafi
- E) Ekografi

Pyetja102

Në vlerësimin e tubujve uterin luan rol të rëndësishëm:

- A) Radiografia
- B) Ekotomografia
- C) CT
- D) Histersalpingografia
- E) RM

Pyetja103

Një nodul tiroidien që paraqitet i ngrohtë në shintigrafi mund të jetë:

- A) Gushë endemike
- B) Adenoma Plummer
- C) Karcionoma e padiferencuar
- D) Karcionoma oksifile
- E) Adenoma embrionale

Pyetja104

Nëse dyshohet klinikisht për emboli pulmonare, radiografia e toraksit:

- A) Nuk realizohet asnjëherë
- B) Ka vlerë diagnostike
- C) Duhet të realizohet gjithmonë
- D) Realizohet pas vlerësimit shintigrafik ventilim-perfuzion
- E) Ka ndjeshmeri më të madhe se CT

Pyetja105

Cilat janë karakteristikat ekografike të një strukture homogjene?

- A) Prania e ekos me intensitet të njëjtë të shpërndarë në mënyrë uniforme
- B) Prania e ekos me intensitet të dobët
- C) Hije akustike laterale
- D) Anekogenicitet
- E) Përforcim i murit të pasëm

Pyetja106

Në vlerësimin e traumave të fytyrës realizohet gjithmonë një:

- A) Radiografi e kokës
- B) Vetëm CT
- C) Vetëm RM
- D) Radiografi dhe CT e kokës
- E) Radiografi dhe RM e kokës

Pyetja107

Qafa vlerësohet me anë të:

- A) CT
- B) RM
- C) Ekografisë
- D) Angiografisë
- E) Sialografisë

Pyetja108

Në radiografinë torakale radiopaciteti është i ulur në kushtet të:

- A) Pneumonisë nga aerobët
- B) Versamentit pleural
- C) Pneumotoraksit
- D) Cisteve
- E) Pneumonisë nga anaerobët

Pyetja109

Shisurat pleurale evidentohen në:

- A) Radiografi dhe CT
- B) Vetëm në radiografi
- C) Vetëm në CT
- D) Në ekografi
- E) Vetëm në raste të patologjisë pleurale

Pyetja110

Cfarë kuptoni me efekt Doppler?

- A) Modifikim i frekuencës të tufës të ultratingullit kur kjo e fundit emetohet nga një trup në lëvizje
- B) Modifikim i drejtimit të tufës të ultratingullit kur kjo e fundit emetohet nga një trup në lëvizje
- C) Modifikim i tufës të ultratingullit kur kjo e fundit emetohet nga një trup në lëvizje
- D) Pasqyrim direkt i tufës të ultratingullit
- E) Pasqyrim me difuzion i tufës të ultratingullit

Pyetja111

Lëndët e kontrastit në CT:

- A) Jepen me rrugë orale dhe endovenoze
- B) Nuk përdoren fare
- C) Përdoren vetëm në disa raste
- D) Në CT e aparatit tretës përdoret sulfat bariumi
- E) Në CT abdominale jepen si perfuzion me pika

Pyetja112

Cila nga këto patologji kërkon përdorimin e një angiografie cerbrale?

- A) Iktus ishemik
- B) Hematoma epidurale
- C) Gjendja epileptike
- D) Disekimi i karotides
- E) Hemorragjia intracerebrale

Pyetja113

Në fazën akute (10 orë) të një aksidenti cerebro vaskular (AVC) reperti më i shpeshtë në CT është:

- A) Edema difuze
- B) Hiperdensiteti pas administrimit të lëndëve të kontrastit intravenë
- C) Negativiteti
- D) Hipodensiteti fokal
- E) Hiperdensiteti fokal

Pyetja114

Në një pacient që dyshohet për ictus TAC duhet të realizohet urgjentisht?

- A) Po, gjithmonë
- B) Asnjëherë
- C) Vetëm kur dyshohet për hemorragji
- D) Në pacientët të rinj në moshë < 45 vjeç
- E) Në pacientët në koma

Pyetja115

Cili ekzaminim na lejon të ndjekim ecurinë e një vatre hemorragjike në parenkimën cerebrale:

- A) CT
- B) Angiografi
- C) CT
- D) Angio-RM
- E) RM pa kontrast

Pyetja116

Cili ind është më rezistent ndaj rrezatimit:

- A) Testikuli
- B) Lëkura
- C) Muskli i strijuar
- D) Ovari
- E) Epiteli

Pyetja117

Cili ekzaminim realizohet për vlerësimin e tendinopative Akiliene:

- A) Ekografia
- B) Radiografia
- C) RM
- D) CT
- E) Xerografia

Pyetja118

Në cilin rast kërkohet që të realizohet një kolangiografi perkutane:

- A) A.Kolecistit kronik
- B) B.Ikter obstruktiv
- C) C.Kolelitizaë
- D) D.Cirrozë biliare
- E) E.Hepatokarcinome

Pyetja119

Në një pacient me hematemezë duhet realizuar:

- A) Radiografi e aparatit tretës me contrast me barium
- B) Radiografi e thjeshtë e aparttit tretës
- C) Radiografi kur pacienti është esëll

- D) Ekografi e pjesës të sipërme abdominale
- E) Endoskopi

Pyetja120

Në rastin e një hematome muskulare post- traumatike në nivel të kofshës, cila është teknika imazherike më e përshtatshme?

- A) Ekotomografia
- B) Xerografia
- C) Endoskopia
- D) CT
- E) Radiografia

Pyetja121

Në vlerësimin e frakturave kockore cila teknikë diagnostike imazherike përbën zgjedhjen e parë?

- A) Radiografia direkte
- B) Shintigrafia kockore
- C) RM
- D) CT
- E) Ekografia

Pyetja122

Në rast të embolisë pulmonare ekzaminimi imazherik më i përshtatshëm është:

- A) CT spirale
- B) Radiografi
- C) RM
- D) Ekocolor Doppler
- E) PET

Pyetja123

Shenja radiologjike e “këpucës prej druri” është karakteristikë e:

- A) Tetradës Fallot
- B) Stenoza e arteries pulmonare
- C) Defekti interventrikular
- D) Ductus botalli apertus
- E) Koartacion i aortës

Pyetja124

”Nisha” është shenjë radiologjike diagnostike e:

- A) Ulçerës peptike të stomakut
- B) Ulçerës duodenale
- C) Kancerit të stomakut
- D) Stenozën e duodenit
- E) Kancerin e ezofagut

Pyetja125

Cila lëndë përdoret si lëndë kontrasti e injektuar i.v gjatë realizimit të CT?

- A) Sulfati i bariumit

- B) Gadoliniumi
- C) Jodi hidrosolubël
- D) Uji
- E) Metilceluloza

Pyetja126

Në vlerësimin e veshit të mesëm metoda e zgjedhur është:

- A) CT
- B) RM
- C) Radiografi
- D) Tomografi
- E) CT me rezolucion të lartë

Pyetja127

Cila nga këto qeliza është më e ndjeshme ndaj rrezatimit?

- A) Limfocitet
- B) Astrocitet
- C) Hepatocitet
- D) Miocitet
- E) Neuronet

Pyetja128

Ultratingulli është:

- A) Energji mekanike
- B) Mënyrë e transferimit të energjisë në hapsira boshe
- C) Njësi elementare e energjisë
- D) Dritë e dukshme
- E) Valë me radiofrekuencë

Pyetja129

Cila është metoda më e përdorur në drejtimin e funksionit perkutan të rrugëve biliare?

- A) Ekografia
- B) RM
- C) CT
- D) Kolangiografia endovenoze
- E) ERCP

Pyetja130

Cila është metoda imazherike e zgjedhur në studimin e bifurkacionit karotid?

- A) Angiografi
- B) Angio-RM
- C) RM
- D) Eko-dopler
- E) CT

Pyetja131

Radiondjeshmëria indore varion në përputhje me:

- A) Aktivitetin mitotik
- B) Oksigjenimin
- C) Asbestozën
- D) Silikozën
- E) Indin adipoz

Pyetja132

Dozimetria vlerëson:

- A) Sasinë e rrezatimit të përthithur nga organizmi dhe qelizat e tij
- B) Sasinë e rrezatimit të aftë të shkatërrojë qelizat e organizmit
- C) Një disiplinë unike
- D) Lidhjen midis sasisë të rrezatuar dhe llojeve të ndryshme të radiacionit
- E) Shpeshhtësinë e tumoreve në raport me dozat e rrezatimit

Pyetja133

Në rast osteopenie ekzaminimi radiografik standart:

- A) Përcakton diagnozën në faza të avancuara
- B) Zëvendëson metodat vlerësuese mineralo-densitometrike
- C) Përcakton diagnozën në fazat e hershme
- D) Vlerëson humbjen kockore
- E) Nuk ka vlerë

Pyetja134

Osteodensitometria (DEXA):

- A) Përcakton diagnozën në faza të avancuara
- B) Zëvendëson metodat vlerësuese mineralo-densitometrike
- C) Përcakton diagnozën në fazat e hershme
- D) Vlerëson humbjen kockore
- E) Nuk ka vlerë

Pyetja135

Cili është ndryshimi midis CT dhe RM:

- A) Nuk ka asnjë ndryshimi midis CT dhe RM
- B) CT është një metodë vlerësimi multiparametrike që varet nga denistetia
- C) RM është një metodë vlerësimi multi parametrike që nuk përdor rrezatimin e jonizuar
- D) Në RM nuk përdoren lëndë kontrasti
- E) RM është një metodë monoparametrike

Pyetja136

Tofet janë karakteristike e:

- A) Artriti psoriatik
- B) Sklerodermisë
- C) Artritit akut gutoz
- D) Artropatisë kronike nga guta
- E) Osteoartrozës reozive

Pyetja137

Avantazh i RM:

- A) Është një ekzaminim monoparametrik
- B) Është shumëplanshe
- C) Ka kosto të ulët
- D) Ka kohë të shkurtër ekzaminim
- E) Nuk ka kundërrindikacione

Pyetja138

Në vlerësimin e surrenaleve ekzaminimi imazherik i zgjedhur është:

- A) RM
- B) CT
- C) Ekografia
- D) Angiografia
- E) Urografia

Pyetja139

Cili burim energjistik përdoret në ekografi?

- A) Rrezatimi jonizues
- B) Valët mekanike
- C) Rrezet infra të kuqe
- D) Rrezatimi elektromagnetik
- E) Rrezet gama

Pyetja140

Në cilën nga këto sëmundje të mëlçisë diagnoza me imazhe nuk ka vlerë?

- A) Hepatit akut
- B) Steatozë
- C) Cirrozë
- D) Abces
- E) Hipertension portal

Pyetja141

RM përdor:

- A) Radiofrekuencën
- B) Rrezatim jonizues
- C) Ultratinguj
- D) Rreze infra të kuqe
- E) Rreze X

Pyetja142

Kundërrindikacion absolut i RM në patologjitë kardio-vaskulare është:

- A) Pace-maker
- B) Kalustrofobia
- C) Klipse metalike kirurgjikale
- D) Proteza
- E) Obeziteti

Pyetja143

Vlerësimi i menisqeve realizohet me:

- A) Radiografi
- B) Ekografi
- C) Shintigrafi
- D) Radiografi+shintigrafi
- E) RM

Pyetja144

Cili lloj rrezatimi përdoret në CT?

- A) Ultravjollcë
- B) Ultratingull
- C) Rreza X
- D) Valë elektromagnetike
- E) Infra të kuqe

Pyetja145

Nëse dyshohet për një litiazë të rrugëve biliare cila është teknika diagnostike e zgjedhur në vënie të diagnozës?

- A) Ekografia
- B) Ekokolor-Doppler
- C) Shintigrafia
- D) RM
- E) CT

Pyetja146

Në vlerësimin e një neoplazie të dyshuar në prostatë cila teknikë diagnostike do të ishte më e përdorshme?

- A) CT
- B) Angiografia
- C) RM
- D) Ekotomografia me sondë endorektale
- E) Radiografi abdominale me infusion me barium

Pyetja147

Në një radiografi antero-posteriore të toraksit, sinusi frenik ndodhet:

- A) Në hapësirën retrokardiace
- B) Ndërmjet brinjëve dhe sternumit
- C) Midis trakesë dhe harkut pulmonar
- D) Në bazat e mushkërive, në anën laterale
- E) Nuk egziston

Pyetja148

Flebografia është një ekzaminim imazherik që studion:

- A) Arteriet
- B) Venat
- C) Artikulacionet
- D) Zemrën e majtë (atrium+ventrikul)
- E) Zemrën e djathtë (atrium + ventrikul)

Pyetja149

Për vendosjen e diagnozës të hidronefrozës është e nevojshme:

- A) RM
- B) CT
- C) Urografia
- D) Ekografia
- E) Radiografi direkte renale

Pyetja150

Në osteoporozë:

- A) Masa kockore zvogëlohet dhe reduktohet përmbajtja minerale e matriksit kockor
- B) Masa kockore ruhet
- C) Masa kockore zvogëlohet dhe ruhet përmbajtja minerale e matriksit kockor
- D) Masa kockore rritet
- E) Vërtetohet përthithje kockore

Pyetja151

Radiologjikisht gurët biliarë janë:

- A) Vetëm radiopakë
- B) Vetëm radiotransparent
- C) Miks
- D) Radiopak dhe miks
- E) Radiopakë, radiotransparent, miks

Pyetja152

Cila nga këto patologji mund të japi metastaza kockore?

- A) Karcinoma e prostatës
- B) Karcinoma e ovarit
- C) Melanoma
- D) Karcinoma pulmonare
- E) Karcinoma kolonit

Pyetja153

Vlerësimi optimal i prostatës realizohet me:

- A) Ekografi me rrugë suprapubike
- B) Ekografi me rrugë transrektale
- C) CT
- D) RM
- E) Cistografi

Pyetja154

Në vlerësimin e pankreatitit akut është i rëndësishëm:

- A) Ekografia
- B) RM
- C) CT
- D) Radiografia

E) Shintigrafia

Pyetja155

Për ndjekjen e ecurisë të transplantit renal përdoret:

- A) CT
- B) RM
- C) Urografia
- D) Ekografia+ekocolor-Doppler
- E) Radiografi abdominale

Pyetja156

187. Cila është metoda e përzgjedhur në studimin e mamellave:

- A) Mammografia
- B) Ekografia
- C) Xerodiografia
- D) RMN
- E) Termografia

Pyetja157

Nëse dyshohet për veshkë polikistike, urografia është një ekzaminim:

- A) Dytësor
- B) Thelbësor në vendosje diagnoze
- C) Bashkëshoqërues i shintigrafisë
- D) Qe nuk ka asnjë vlerë
- E) I pa zëvendësueshëm

Pyetja158

Sa lobe ka mushkëria e djathtë?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

Pyetja159

Në rastin e një pankreatiti kronik cili ekzaminim mund të japi të dhëna më të plota?

- A) Wirsungografia retrograde
- B) Shintigrafia
- C) CT
- D) Radiografia abdominale
- E) Angiografia

Pyetja160

Një grua diagnostikohet në mamografi me mikro kalçifikime parenkimale. Çfarë ekzaminimi do të kërkonit më tej?

- A) Galaktografi
- B) Galakto-RM

- C) Biopsi e drejtuar ekografikisht
- D) Biopsi stereotaksike
- E) Ekografi

Pyetja161

Kur dyshohet për ikter obstruktiv cili ekzaminim instrumental kërkohet fillimisht?

- A) Kolangio-RM
- B) ERCP (endoscopic retrograde colangio-pancreatography)
- C) CT abdominale
- D) Ekografi abdominale
- E) CT abdominale me kontrast

Pyetja162

Gadolina (lëndë kontrasti) kalon barrierrën hemato-encefalike në cilën situatë?

- A) vetëm në rast të patologjive neoplazike
- B) vetëm në rast të patologjive neoplazike malinje
- C) kur dëmtohet barriera hemato-encefalike
- D) asnjëherë
- E) gjithmonë

Pyetja163

Në një pacient me trauma kraniale cili është ekzaminimi bazë?

- A) Radiografi kraniale
- B) RM encefalike
- C) CT koke
- D) RM trupit

Pyetja164

Një i sëmurë 70 vjeç vlerësohet si pozitiv për praninë e gjakut në feçe. Nëse mbi bazë të kësaj të dhëne dhe të dydhonit për një lezion neoplazik intestinal cili ekzaminim do të duhej për vendosjen e një diagnoze të sigurt?

- A) Klizma
- B) Kolonoskopia e CT
- C) CT abdominale
- D) Klizma me dopio kontrast
- E) Kolonsigmoidoskopia

Pyetja165

Cili është burimi energjistik që përdoret në RMN?

- A) Rrezet infra të kuqe
- B) Fushat megnetike
- C) Radiacioni i jonizuar
- D) Valët G
- E) Ultratingulli

Pyetja166

Cili është aspekti radiologjik tipik i versamentit pleural?

- A) Opaciteti nodular

- B) Zona të radiotransparencës apikale
- C) Zona të radiotransparencës bazale
- D) Opacitet bazal me buzën e sipërme konkave
- E) Opacitet bazal me buzën e sipërme konvekse

Pyetja167

Në një radiografi antero-posteriore të toraksit, sinusi frenik ndodhet:

- A) Në hapësirën retrokardiakë
- B) Ndërmjet brinjëve dhe sternumit
- C) Midis trakesë dhe harkut pulmonar
- D) Në bazat e mushkërive, në anën laterale
- E) Nuk egziston

Pyetja168

Flebografia është një ekzaminim imazherik që studion:

- A) Arteriet
- B) Venat
- C) Artikulacionet
- D) Zemrën e majtë (atrium+ventrikul)
- E) Zemrën e djathtë (atrium + ventrikul)

Pyetja169

Për vendosjen e diagnozës të hidronefrozës është e nevojshme:

- A) RM
- B) CT
- C) Urografia
- D) Ekografia
- E) Radiografi direkte renale

Pyetja170

Nëse një pacient dyshohet për një sëmundje inflamatore kronike intestinale me anë të cilit ekzaminim vendoset diagnoza?

- A) Entero-RM
- B) Radiografi e aparatit tretës
- C) Entero-TC
- D) Colonsigmoidoskopia
- E) Ekografi

Pyetja171

Nëse dyshoni për emboli pulmonare cili ekzaminim instrumental lejon të vendosni diagnozën?

- A) Radiografia
- B) TC torakale
- C) Angio TC torakale
- D) Ekografia trans-efozageale
- E) Ekokardiografia

Pyetja172

Cila është prerja optimale e përdorur në HRCT?

- A) 1-2 mm
- B) 2-3 mm
- C) 1 cm
- D) 0.1 nm
- E) 4-5 mm

Pyetja173

Errësimet në formë vijash (si shinat e trenit) janë karakteristikë e:

- A) bronjektazisë
- B) atelektazës
- C) astmës bronkiale
- D) pneumopative
- E) abcesit

Pyetja174

Figura hidroerike e rumbullakët me strukturë jo të njëtrajtshme e përbërë nga një errësim nga ana e poshtme me formë gjysmëhëne dhe një pjesë e tejdukshme nga ana e sipërme i korrespondon shfaqjes radiologjike pulmonare të një:

- A) abcesi pulmonar
- B) ekinokoku pulmonar
- C) pneumopatie
- D) hernie diafragmale
- E) bronjektazie

Pyetja175

Për vlerësimin e retroperitoneumit, mënyra e zgjedhur është:

- A) urografia
- B) CT
- C) Ekografia
- D) Retropneumoperitonuemi
- E) RM

Pyetja176

Cili ind është më rezistent ndaj rrezatimit:

- A) Testikuli
- B) Lëkura
- C) Muskuli i strijuar
- D) Ovari
- E) Epiteli

Pyetja177

Cili ekzaminim realizohet për vlerësimin e tendinopative Akiliene:

- A) Ekografia
- B) Radiografia
- C) RM
- D) CT
- E) Xerografia

Pyetja178

Në cilin rast kërkohet që të realizohet një kolangiografi perkutane:

- A) Kolecistit kronik
- B) Ikter obstruktiv
- C) Kolelitizaë
- D) Cirrozë biliare
- E) Hepatokarcinome

Pyetja179

Në një pacient me hematemezë duhet realizuar:

- A) Radiografi e aparatit tretës me kontrast me barium
- B) Radiografi e thjeshtë e aparttit tretës
- C) Radiografi kur pacienti është esëll
- D) Ekografi e pjesës të sipërme abdominale
- E) Endoskopi

Pyetja180

Në rastin e një hematome muskulare post- traumatike në nivel të kofshës, cila është teknika imazherike më e përshtatshme?

- A) Ekotomografia
- B) Xerografia
- C) Endoskopia
- D) CT
- E) Radiografia

Pyetja181

Në vlerësimin e frakturave kockore cila teknikë diagnostike imazherike përbën zgjedhjen e parë?

- A) Radiografia direkte
- B) Shintigrafia kockore
- C) RM
- D) CT
- E) Ekografia

Pyetja182

Në rast të embolisë pulmonare ekzaminimi imazherik më i përshtatshëm është:

- A) CT spirale
- B) Radiografi
- C) RM
- D) Ekocolor Doppler
- E) PET

Pyetja183

Cili nga strukturat më poshtë është më i ndjeshëm ndaj rrezatimit?

- A) Kolageni
- B) Tiroidja
- C) Mëlçia
- D) Veshka
- E) Palca kockore

Pyetja184

Patologjia nodulare e tiroides studiohet fillimisht me:

- A) Radiografi e qafës për indet e buta
- B) CT
- C) RM
- D) Shintigrafi
- E) Ekografia

Pyetja185

Në vlerësimin e tubujve uterin luan rol të rëndësishëm:

- A) Radiografia
- B) Ekotomografia
- C) CT
- D) Histersalpingografia
- E) RM

Pyetja186

Rrezatimi jonizues ka efekte anësore:

- A) Somatike
- B) Gjenetike
- C) Somatike dhe gjenetike
- D) Ulje të eritrosedimentit
- E) Asnjë

Pyetja187

Një nodul tiroidien që paraqitet i ngrohtë në shintigrafi mund të jetë:

- A) Gushë endemike
- B) Adenoma Plummer
- C) Karcionoma e padiferencuar
- D) Karcionoma oksifile
- E) Adenoma embrionale

Pyetja188

Nëse dyshohet klinikisht për emboli pulmonare, radiografia e toraksit:

- A) Nuk realizohet asnjëherë
- B) Ka vlerë diagnostike
- C) Duhet të realizohet gjithmonë
- D) Realizohet pas vlerësimit shintigrafik ventilim-perfuzion
- E) Ka ndjeshmeri më të madhe se CT

Pyetja189

Cilat janë karakteristikat ekografike të një strukture homogjene?

- A) Prania e ekos me intensitet të njëjtë të shpërndarë në mënyrë uniforme
- B) Prania e ekos me intensitet të dobët
- C) Hije akustike laterale
- D) Anekogenicitet
- E) Përforcim i murit të pasëm

Pyetja190

Në vlerësimin e traumave të fytyrës realizohet gjithmonë një:

- A) Radiografi e kokës
- B) Vetëm CT
- C) Vetëm RM
- D) Radiografi dhe CT e kokës
- E) Radiografi dhe RM e kokës

Pyetja191

Qafa vlerësohet me anë të:

- A) CT
- B) RM
- C) Ekografisë
- D) Angiografisë
- E) Sialografisë

Pyetja192

Ekografia transvaginale në studimin e patologjive të uterusit është:

- A) Një metodë që përdoret rrallë herë
- B) Një metodë që nuk përdoret më në ditët e sotme
- C) Një metodë që bën një vlerësim të kujdesshëm edhe në rast të neoplazive uterine
- D) Një metodë e vlefshme në vlerësimin e malformimeve uterine

Pyetja193

Mbi bazë të studimeve të randomizuara përmendet se depistimi nëpërmjet mamografisë është mjaft i rëndësishëm në uljen e vdekshmërisë nga kanceri i gjirit në gratë e moshës:

- A) 30-39 vjeç
- B) 40-49 vjeç
- C) 50-69 vjeç
- D) > 70 vjeç

Pyetja194

Në frakturën e degës të gjelbër (subperiostale) radiologjikisht:

- A) Periosti mbetet i pandryshuar
- B) Periosti destruktohet
- C) Vija e thyerjes kalon në femur
- D) Evidentohet hipertrofi kockore

NEFROLOGJIA

1. Ne neoplazite pulmonare, ekstensioni ne nivel te pleksit cervical mund te shkaktoje dhembje, pareze dhe/ose dobesi te gjymtyres se prekur. Kjo simptomatologji quhet:

- A) Sindroma Bernard Horner
- B) Sindroma Gaucher
- C) Sindroma Charcot-Marie-Tooth
- D) Sindroma Pancoast
- E) Sindroma De Quervain

2. Kur një proteinuri e 24 orëve përcaktohet si nefrotike?

- A) proteinuria >3g
- B) proteinuria >2g
- C) proteinuria >1g
- D) proteinuria > ose e barabartë me 5g
- E) proteinuria > ose e barabartë me 8g

3. Të gjitha nefropatitë e mëposhtme mund të komplikojnë një shtatëzani, me përjashtim të

- A) amiloidoza
- B) pielonefriti
- C) nekroza tubulare akute
- D) nekroza kortikale
- E) uremia eklamptike

4. Përcaktuesit e filtracionit glomerular: cili prej këtyre variablave është më i rëndësishmi?

- A) fluksi i gjakut
- B) koeficienti i ultrafiltrimit glomerular
- C) përqëndrimi i proteinave në plazmën e arteries renale
- D) presioni hidrostatik glomerular
- E) presioni arterial

5. Cili prej këtyre medikamenteve hipotensivë shkakton rritje të aktivitetit plazmatik të reninës?

- A) metildopa
- B) propranololi
- C) kaptoprili
- D) klondina
- E) nifedipina

6. Insuficienca renale akute:

- A) karakterizohet gjithmonë nga prania e oligo-anurisë
- B) paraqet një sediment urinar të pasur me qeliza dhe cilindra hialino-granularë dhe/ose qelizorë
- C) shoqërohet gjithmonë me hipertension arterial
- D) mund të jetë sekondare nga ekzaminimet imazherike me kontrast
- E) lidhet gjithmonë me një dëmtim të strukturës renale

7. Cilët prej gurëve të mëposhtëm janë radiotransparentë?

- A) struvitë
- B) të fosfatit të kalçiumit
- C) të oksalatit të kalçiumit
- D) të acidit urik
- E) të karbonatit të kalçiumit

8. Shkaku më i zakonshëm i sindromit nefrotik tek adultët është:

- A) GN (glomerulonefriti, me leziona minimale)
- B) GN (glomerulonefriti, membrano-proliferativ)
- C) nefroskleroza malinje
- D) GN membranoz
- E) nefroskleroza beninje

9. Një grua e re paraqiti episodin e parë të një cistiti akut, i cili u trajtua me sukses me anë të antibiotikoterapisë përkatëse. Pacientja ka nevojë për:

- A) profilaksi me antibiotikë për 6 muaj
- B) analizë urine + urokulturë ç'do muaj për 6 muaj
- C) cistouretrografi miksionale
- D) asnjë veprim tjetër diagnostik ose terapeutik
- E) urografi perfuzional

10. Sindroma nefrotike:

- A) është një kuadër klinik që karakterizohet nga hipoalbuminemia e rëndë (<3g/dl.
- B) paraqet një proteinuri më të madhe se 2.5 g/ditë
- C) prezantohet me insuficiencë renale me gravitet të ndryshëm
- D) mund të shoqërohet me kuadër "hipokoagulabiliteti" me prirje për hemorragji spontane
- E) është gjithmonë një sëmundje renale primare

11. Cili është shkaku më i mundshëm i takikardisë së shoqëruar me komplekse QRS të gjerë, në një pacient që i është nënshtruar më parë një bypass-i aorto-koronar?

- A) flater atrial me çrregullim të përçimit
- B) fibrilacion atrial
- C) takikardi sinusale me çrregullim të përçimit
- D) sindromi Wolf-Parkinson-White
- E) takikardi ventrikulare

12. Cila prej këtyre vlerave paraqet gamën e vlerave normale të kalemisë?

- A) 1-3 mEq/l
- B) 3-4,5 mEq/l
- C) 3,5-5 mEq/l
- D) 5-6 mEq/l
- E) 6-7 mEq/l

13. Në pacientin me anuri rreziku për jetën përfaqësohet nga:

- A) varfërimi sodik
- B) hiponatremia
- C) hipoproteinemia
- D) hiperkalemia
- E) hipertensioni

14. Bakteriuria është sinjifikative kur përqëndrimi urinar është:

- A) 1.000/ml
- B) 10.000/ml
- C) 100.000/ml
- D) 1.000.000/ml
- E) 5.000.000/ml

15. Një sforcim i madh fizik mund të shkaktojë:

- A) hematuri
- B) hemoglobinuri
- C) proteinuri
- D) cilindra eritrocitarë
- E) të gjitha përgjigjet e mësipërme

16. Një burrë 50 vjec arrin në Shërbimin e Urgjencës me temperaturë të lartë ($T=38.8^{\circ}\text{C}$., të dridhura, dhimbje abdominale difuze dhe nauze. Në ekzaminimin objektiv shenja e Giordano-s është prezente. Cilin prej këtyre ekzaminimeve diagnostike të mëposhtme do kërkonit në fillim?

- A) ekografinë e aparatit urinar
- B) TAK
- C) Cistografinë retrograde
- D) RMN
- E) shintigrafinë renale

17. Si manifestohet më shpesh tumori renal?

- A) masë e palpueshme
- B) hematuri
- C) kolikë renale
- D) diagnoza është e rastësishme
- E) oliguria

18. Cila prej këtyre simptomave i paraprin zhvillimit të nefropatisë diabetike:

- A) rritja e natriurisë
- B) mikrohematuria
- C) cilindruria
- D) shtimi i vëllimit renal
- E) reduktimi i filtracionit glomerular

19. Cili është dekursi i glomerulonefritit akut post-streptokoksik?

- A) evoluon drejt insuficiencës renale kronike
- B) shërohet
- C) evoluon drejt sindromit nefrotik
- D) proteinuri reziduale
- E) hipertension arterial

20. Cili prej muskujve të aktivitetit inspirator është më i rëndësishmi?

- A) muskujt interkostalë ekstern
- B) diafragma
- C) muskuli rektus abdominal
- D) muskujt interkostalë intern
- E) muskuli sternokleidomastoid

21. Të gjitha pohimet e mëposhtme mbi diuretikët tiazidikë janë të vërteta me përjashtim të:

- A) mund të shkaktojnë hiperuricemi
- B) përdoren për të nxitur një diurezë të sforcuar në emergjencat toksikologjike
- C) janë diuretikë të zgjedhjes së parë për trajtimin e hipertensionit arterial

- D) ndikohen për trajtimin e edemave që shoqërojnë cirrozën hepatike
- E) inhibojnë transportin e Na⁺-Cl⁻ në tubulin distal të përdredhur

22. Në hemodializë akseset vasculare të përkohshme mund të përftohen me anë të inserimit të kateterëve me lumen të vetëm ose të dyfishtë në venat:

- A) subklavia
- B) jugulare interne
- C) femorale
- D) të gjitha përgjigjet e mësipërme
- E) asnjëra prej përgjigjeve të mësipërme

23. Dobësia muskulore në nivel të shpatullave, shoqëruar me rritje të eritrosedimentit gjatë orës së parë, tek një person i moshuar karakterizojnë:

- A) polimiozitin
- B) polimialgjinë reumatike
- C) sëmundjen Still
- D) miopatinë sekondare të hipotiroidizmit
- E) entesopatinë e rotatorëve

24. Zbulimi i proteinurisë së matshme (>3.5g/ditë. dhe cilindruarë është patognomonike për një:

- A) sindrom nefritik
- B) sindrom nefrotik
- C) hipertension arterial
- D) insuficiencë renale akute ishemike
- E) pielonefrit akut

25. Të gjitha pohimet e mëposhtme janë të vërteta me përjashtim të :

- A) angiotenzina II shkakton vazokonstriksion për shkak të efektit të drejtpërdrejtë mbi arteriolat prekapilare
- B) angiotenzina II antagonizon efektet e aldosteronit
- C) angiotenzina II shkakton hipertrofi dhe rimodelim të strukturave kardiovaskulare
- D) receptori AT1 për angiotenzinën II është i atashuar me një proteinë G
- E) lidhja e angiotenzinës II me receptorin AT2 frenohet në mënyrë specifike nga sartanet

26. Cila prej alternativave paraqet një komplikacion renal të rëndë në diabetin mellit?

- A) polakiuria me dizuri
- B) glukozuria persistente
- C) nefrolitiazë
- D) cistiti akut hemorragjik
- E) glomeruloskleroza

27. Ekzaminimet e shkallës së parë për diagnostikimin e karcinomës së prostatës janë:

- A) PSA, ekzaminimi rektal, ekografia transrektale + biopsia
- B) PSA, shintigrafia kockore, TAK abdominal
- C) PSA, ekzaminimi rektal, TAK abdominal
- D) PSA, ekzaminimi rektal
- E) Asnjëra prej përgjigjeve të mësipërme

28. Cila prej glomerulopative të mëposhtme paraqitet me sindrom nefrotik?

- A) post-infektive
- B) proliferative mezangiale
- C) proliferative ekstrakapilare
- D) glomerulopatia diabetike
- E) glomeruloskleroza

29. Një obstrukcion urinar që shkakton hidronefrozë tek fëmija zakonisht shkaktohet nga:

- A) një keqformim kongjenital i traktit urinar
- B) vaza jonormale që komprimojnë ureterin
- C) gurët
- D) "përdredhja" e një ureteri në terren të një veshke ptozike
- E) një fimozë shumë e rëndë

30. Si duken gurët në ekografi:

- A) imazh hipoebogen me hije akustike konike posteriore
- B) imazh hipoebogen me përforcim posterior
- C) imazh hiperekogen me hije akustike konike posteriore
- D) imazh hiperekogen me përforcim posterior
- E) imazh anekogen

31. Anemia e insuficiencës renale kronike:

- A) është kryesisht e lidhur me një deficiënt në thithjen e hekurit
- B) është kryesisht e lidhur me një deficiënt në prodhimin e eritropoetinës
- C) trajtohet vetëm me hemotransfuzion
- D) nuk trajtohet sepse kontribuon në ruajtjen e vlerave të pranueshme të presionit të gjakut
- E) prek kryesisht gratë në moshën e fertilitetit

32. Nga ku e merr më shpesh origjinën karcinoma me qeliza renale?

- A) tubuli proksimal i përdredhur
- B) ansa Henle
- C) dukti kolektor
- D) pieloni renal
- E) tubuli distal i përdredhur

33. Cilin veprim respirator predominues kryejnë muskujt abdominalë?

- A) veprim inspirator në qetësi
- B) asnjë veprim
- C) shtim të presionit intrapleural
- D) veprim ekspirator
- E) veprim inspirator gjatë sforcimit

34. Cila prej këtyre teknikave imazherike diagnostikuese nuk është e dobishme në diagnostikimin e stenozës së arteries renale?

- A) angiografia
- B) eko-kolor-dopler
- C) angiografia me rezonancë magnetike
- D) pielografia retrograde ashendente
- E) shintigrafia renale

35. Një pacient paraqet një gur oksalat kalçiumi më pak se 1cm në pielonin renal që shkakton kolika recidivante. Cila është terapia e zgjedhjes së parë?

- A) pielolitomia kirurgjikale
- B) ureterorenoskopia
- C) litotripsia ekstrakorpore
- D) terapia hidropike
- E) pielolitomia perkutane

36. Shkaku më i shpeshtë i sindromit nefrotik në moshën pediatrike është

- A) glomerulopatia proliferative ekstrakapilare
- B) glomerulopatia me leziona minimale
- C) glomerulopatia membranoze
- D) glomerulopatia proliferative mezangiale
- E) glomerulopatia post-infektive

37. Cila prej këtyre simptomave të insuficiencës renale është më e ndjeshme ndaj korrigjimit të hipokalemisë:

- A) nauzea dhe të vjellat
- B) astenia muskulore
- C) diarrea
- D) pruriti
- E) cefalea

38. Pielonefriti akut:

- A) është sëmundje karakteristike për seksin mashkull
- B) prek zakonisht personat në moshë të avancuar
- C) karakterizohet zakonisht nga prania e temperaturës të tipit septike
- D) paraqitet me vlera normale të eritrosedimentit dhe proteinës C reaktive
- E) paraqitet me një neutropeni të shprehur

39. Në cilin tip të emfizemës hiperinflacioni pulmonar merr një rëndësi më të madhe ?

- A) emfizema panlobulare
- B) emfizema buloze
- C) emfizema acinare distale
- D) emfizema paraseptale
- E) emfizema cikatriciale

40. Në sindromin nefrotik, cila prej këtyre simptomave/shenjave mund të ndeshet?

- A) urina me shkurë
- B) anoreksia
- C) shndritja e retinës
- D) dhimbja abdominale
- E) të gjitha përgjigjet e mësipërme janë të vërteta

41. Me cilat nga këto teknika imazherike nuk mund të vizualizohet ureteri?

- A) urografia
- B) tomografia e kompjuterizuar
- C) urografia gjatë rezonancës magnetike
- D) radiografia direkte e abdomenit
- E) pielografia transnefrostomike deshendente

42. Cila prej sindromave të mëposhtme karakterizohet nga: humbja renale e K, Na dhe Cl, hipokalemia, hiperaldosteronizmi, hiperreninemia dhe presioni arterial normal?

- A) Sindroma e Liddle
- B) Sindroma e Laron
- C) Sindroma e Kawasakit

- D) Sindroma e Bartter
- E) Sindroma e Di George

43. Cilat janë shkaqet më të shpeshta të versamentit pleural?

- A) pneumonia
- B) fibroza pulmonare
- C) tuberkulozi
- D) infeksionet virale
- E) pneumotoraksi

44. Cila prej këtyre shenjave është patognomonike për glomerulonefritin me lezione minimale:

- A) proteinuria selektive
- B) mikrohematuria
- C) hiperazotemia
- D) leukocituria
- E) cilidruria

45. Patogjeneza e hipernatremisë gjatë ushqyerjes parenterale lidhet me:

- A) shtimin e riabsorbimit proksimal të natriumit
- B) diurezën osmotike
- C) reduktimin e sekretimit të hormonit antidiuretik
- D) sekretimin e shtuar të hormonit aldosteron
- E) filtrimin e shtuar glomerular

46. Gjetja e një vlere të rritur të CA-125 shoqërohet në më shumë se 80% të rasteve me diagnozën e :

- A) karcinomës së kolonit
- B) karcinomës mamare
- C) karcinomës së ovareve
- D) seminomës
- E) karcinomës së qafës së mitrës

47. Hipertensioni nefrovaskular (shkak potencialisht i trajtueshëm i hipertensionit arterial, është vlerësuar në popullatë rreth:

- A) mbi 10%
- B) 5-10%
- C) 1-5%
- D) <1%
- E) nuk është kurrë shkak i hipertensionit arterial

48. Bakteri më shpesh i përfshirë në infeksionet e pakomplikuara të rrugëve urinare është:

- A) proteus
- B) stafilokoku
- C) mykoplazma
- D) Escherichia Coli
- E) Streptokoku

49. Të gjitha komplikacionet e mëposhtme klinike ndeshen në IRK terminale me përjashtim të:

- A) neuropatisë periferike
- B) bronkitit astmatiform
- C) perikarditit
- D) anemisë
- E) osteodistrofisë

50. Diagnoza e hipertensionit esencial:

- A) bëhet me siguri
- B) bëhet me anë të përjashtimit
- C) është instrumentale
- D) është histologjike
- E) është serologjike

51. Në flankun e djathtë të një neonati ndeshet një masë e palpueshme. Urografia evidenton zhvendosje dhe distorsion të pelvisit dhe kaliceve të veshkës së djathtë. Diagnoza më e mundshme është:

- A) neuroblastoma
- B) tumori i Wilms
- C) hidronefroza
- D) tromboza e venës renale
- E) veshka polikistike

52. Me cilat simptoma shoqërohet më shpesh karcinoma me qeliza renale gjatë diagnostikimit

- A) hematurinë
- B) hematurinë + dhimbjen në flank + masë e palpueshme
- C) asnjë simptomë (diagnozë e rastësishme gjatë një ekzaminimi ekografik.
- D) hipertensionin
- E) insuficiencën renale akute

53. Një grua 30 vjeç shtrohet me sindrom nefrotik. Ekzaminimi i proteinurisë zbulon një humbje të rëndësishme të albuminës dhe mungesë të humbjes urinare të proteinave me peshë molekulare të madhe. Cila prej këtyre situatave është në gjendje të përcaktojë një kuadër të tillë klinik?

- A) nefropatia membranoze
- B) nefropatia membrano-proliferative
- C) nefropatia glomerulare me leziona minimale
- D) glomerulonefriti proliferativ
- E) glomerulonefriti fokal

54. Dializa peritoneale:

- A) kërkon hospitalizim të detyrueshëm
- B) preferohet ndaj HD në pacientët me IRK hemodinamikisht të paqëndrueshëm
- C) lejon një fleksibilitet më të vogël për oraret dhe zhvendosjet, në krahasim me HD
- D) është një teknikë e vjetër
- E) të gjitha përgjigjet e mësipërme

55. Cilat janë vlerat që konsiderohen si shenjë e dëmtimit të veshkave në një pacient hipertensiv të seksit mashkull?

- A) kreatinina plazmatike > 1.5;
- B) kreatinina plazmatike > 1.0;
- C) kreatinina plazmatike > 1.3;
- D) kreatinina plazmatike > 1.0;
- E) kreatinina plazmatike > 1.6;

56. Simptoma fillestare e sindromit nefrotik normalisht është:

- A) edema
- B) hipertensioni
- C) hematuria
- D) stranguria
- E) oliguria

57. Të gjitha situatat e mëposhtme patologjike mund të çojnë në IRK me përjashtim të:

- A) glomerulonefritit
- B) pielonefritit
- C) renit polikistik
- D) tubulonekrozës akute nga shoku
- E) nefroangiosklerozës

58. Nefropatia më shpesh shkaktare e IRK është:

- A) nefropatia diabetike

- B) nefropatia intersticiale
- C) nefropatia glomerulare
- D) nefropatia vaskulare
- E) nefropatia tubulare

59. Administrimi i zgjatur i cilit prej këtyre medikamenteve konsiderohet një faktor rreziku për Osteoporozën?

- A) ACE inhibitorët
- B) Diuretikët tiazidikë
- C) Kortikosteroidet
- D) Antagonistët e kalçiumit
- E) Laksativët

60. Reduktimi i izoluar i koeficientit të ultrafiltrimit shkakton një nga këto simptoma:

- A) mikrohematuri
- B) leukocituri
- C) dislipidemi
- D) hipertension
- E) hipoproteinemi

61. Cili prej këtyre medikamenteve indikohet në trajtimin fillestar të pacientit me insuficiencë kardiace pak simptomatike?

- A) hidrokloriazidi
- B) ACE inhibitorët
- C) Digoksina
- D) Amiodaroni
- E) Betablockuesit

62. Tregoni cilët ekzaminime laboratorike janë zakonisht të alteruar në hipertensionin esencjal pa komplikacione sekondare:

- A) elektrolitet në gjak
- B) kreatininemia
- C) asnjëri
- D) ekzaminimi i urinës
- E) hormone

63. Një grua 40 vjeç pa ankesa kryen, në terren të një chek-up, një analizë urine me urokulturë pozitive për E. Coli me ngarkesë >100.000 UFC. Gruaja ka:

- A) IVU të rrugëve të poshtme urinare
- B) IVU të rrugëve të sipërme urinare
- C) bakteriuri asimptomatike
- D) dizuri

E) cistit intersticial

64. Cila prej situatave të mëposhtme shoqërohet me incidencën më të lartë të tumorit të testikutit?

- A) varikocela
- B) trauma e testikutit
- C) kriptorkidizmi
- D) hidrocela
- E) hipogonadizmi

65. Në glomerulonefritin membranoz tipik janë të pranishme të gjitha shenjat e mëposhtme, me përjashtim të:

- A) hipertensionit
- B) proteinurisë
- C) hipoproteinemisë
- D) hiperkolesterolemisë
- E) edemave

66. Cili është komplikacioni më i frikshëm i sindromit nefrotik?

- A) hipertensioni arterial
- B) insuficienca renale
- C) insuficienca renale akute
- D) tromboza e venës renale
- E) dekompernsimi kardio-cirkulator

67. Pielonefriti kronik (nefriti tubulo-intersticial infektiv kronik., shënoni përgjigjen e pasaktë:

- A) shpesh është bilateral
- B) shkakton atrofi dhe deformim të kaliceve
- C) nuk lidhet me anomali anatomike
- D) shpesh lidhet me një refluks veziko ureteral
- E) asnjëra prej përgjigjeve të mësipërme

68. Nefropatia nga IgA karakterizohet nga:

- A) nga një model histologjik variabël, më shpesh e tipit proliferativ-sklerotik mezangial, me depozitime të IgA
- B) prania e IgA në arteriola
- C) prania e IgA në tubula
- D) prania e IgA në lumenin e kapilarëve
- E) glomeruloskleroza

69. Cila nga nefropatitë e mëposhtme karakterizohet nga: proteinuria, hematuria e lehtë, hipertensioni, hiperazotemia?

- A) Sëmundja me leziona minimale tek fëmijët
- B) Glomerulonefriti membranoproliferativ
- C) Glomeruloskleroza fokale segmentare
- D) Kalkuloza renale
- E) Glomerulonefriti mezangioproliferativ

70. Enureza është:

- A) gjithmonë patologjike
- B) fiziologjike gjatë 2-3 viteve të para të jetës
- C) fiziologjike deri në moshën 5 vjeç
- D) nuk mund të shkaktohet kurrë nga infeksionet
- E) normale në moshën e avancuar

71. Komplementemia është e ulur në një nga glomerulopatitë e mëposhtme:

- A) nefropatia diabetike
- B) glomerulonefriti post-infektiv
- C) glomerulonefriti membranoz
- D) nefropatia në terren të amiloidozës
- E) glomerulonefriti me leziona minimale

72. Cila prej këtyre situatave favorizon akumulimin e K⁺ në organizëm?

- A) diarrea
- B) të vjellat e vazhdueshme
- C) acidoza diabetike
- D) abuzimi me klortiazidikë
- E) insuficienca kortikosteroide

73. Nekroza tubulare akute mund të jetë komplikacion i :

- A) glomerulonefritit akut difuz
- B) sindromit nefrotik
- C) litiazës renale
- D) amiloidozës renale
- E) sindromës së shtypjes

74. Në një pacient, gjatë ecurisë së versamentit pleural masiv, vlerësohen të gjitha shenjat e mëposhtme me përjashtim të :

- A) reduktimit të fremitus vokal taktil
- B) respiracionit vezikular të reduktuar ose që mungon

- C) prekjës së nervave
- D) ekskursionit të reduktuar të hemitoraksit të prekur
- E) tingullit të qartë pulmonar

75. Në personat me moshë të re, heqja e njëjës veshkë shkakton tek veshka e mbetur:

- A) hipertrofi
- B) hipertrofi dhe hiperplazi
- C) hiperplazi
- D) hipoplazi
- E) hipoplazi dhe hipotrofi

76. Testi specifik për vlerësimin e fluksit plazmatik renal është:

- A) klirensi i insulinës
- B) klirensi i kreatininës
- C) klirensi i paraaminohipuratit
- D) klirensi i inulinës
- E) të gjitha përgjigjet e mësipërme

77. Janë shkaktarë të inkontinencës tranzitore faktorët e mëposhtëm me përjashtim të:

- A) infeksionit simptomatik të rrugëve urinare
- B) konsumimit të alkoolit
- C) konsumimit të disa substancave mjekësore
- D) fekalomës
- E) konsumimit të sasive të tepërta të lëngjeve

78. Cili prej këtyre medikamenteve përbën terapinë më efektive, për reduktimin e vdekjeve të papritura në pacientë me kardiopati koronare të qëndrueshme me deficiet të funksionit ventrikular?

- A) amlodipina
- B) betablokuesit
- C) nitratet
- D) diuretikët
- E) digoksina

79. Cila prej alternativave të mëposhtme shihet më shpesh në hipokalemi?

- A) kapaciteti i reduktuar për të pëqëndruar urinën
- B) reduktimi i filtratit glomerular
- C) humbja e aftësisë së hollimit të urinës
- D) alterimi i klirensit të ujit të lirë
- E) reduktimi i klirensit të acidit para-aminohipurik

80. Prania e eritrociteve me morfologji të ruajtur e kufinj të rregullt, dhe veçanërisht, mungesa e plotë e akantociteve në sedimentin urinar, është tregues i fortë i:

- A) pH alkaline të urinës
- B) hemorragjisë me prejardhje nga rrugët urinare (uretere, vezikë, uretrë)
- C) pranisë së sindromit nefrotik
- D) dëmtimit glomerular
- E) nefropatisë intersticiale

81. Shfaqja e makrohematurisë 15 ditë pas një episodi inflamacioni të rrugëve të sipërme ajrore, për cilën glomerulopati të bën të mendosh:

- A) skleroza fokale dhe segmentare
- B) proliferative mezangiale me depozitime të IgA
- C) membrano-proliferative
- D) membranoze
- E) post-streptokoksike

82. Cili prej ndryshimeve të mëposhtme të stilit të jetesës ka rezultuar më efikas në reduktimin e presionit arterial?

- A) reduktimi i peshës trupore
- B) ndërprerja e duhanpirjes
- C) reduktimi i kripës në dietë
- D) eliminimi i kafeinës në dietë
- E) terapia e pushimit

83. Në pielonefritin akut, faktor favorizues për fillimin e një nekroze papilare është:

- A) bakteriuria
- B) diabeti mellitus
- C) hiperdislipidemia
- D) hipodisproteinemia
- E) bilirubinuria

84. Të gjitha pohimet e mëposhtme lidhur me IRK janë të sakta, me përjashtim të:

- A) bilancit sodik negativ
- B) bilancit sodik pozitiv
- C) bilancit sodik të ekuilibruar
- D) bilancit negativ të fosfateve
- E) bilancit pozitiv të joneve hidrogjen

85. Si prezantohet më shpesh tumori i vezikës urinare:

- A) si urgjencë mikSIONALE
- B) si polakiuri
- C) si makrohematuri
- D) si stranguri
- E) si poliuri

86. Cilën grupmoshë prek më shpesh glomerulonefriti akut post-streptokoksik?

- A) fëmijët
- B) të rinjtë
- C) të moshuarit
- D) adultët
- E) neonatët

87. Cili prej infeksioneve virale të mëposhtme shoqërohet më shpesh me shfaqjen e hepatokarcinomës në një pacient pa cirrozë hepatike?

- A) infeksioni me Virusin e Hepatitit A
- B) infeksioni me Virusin e Hepatitit B
- C) infeksioni me Virusin e Hepatitit C
- D) infeksioni me Virusin e Citomegalovirusit
- E) infeksioni me Virusin Epstein Barr

88. Një djalë 16 vjeç prezanton një kuadër klinik të sindromit nefrotik dhe kryen biopsinë renale; kuadri histologjik statistikisht më i mundshëm do të jetë:

- A) glomerulonefriti post-streptokoksik
- B) glomeruloskleroza segmento-fokale
- C) lezionet glomerulare minimale
- D) glomerulonefriti membranoz
- E) nefropatia diabetike

89. Cilat janë shenjat indirekte të një guri urinar në ekografi?

- A) formacion ekogen
- B) hije konike
- C) zgjerim i rrugëve urinare mbi pengesë
- D) radioopacitet
- E) radiotransparencë

90. Glomerulonefriti që vërehet më shpesh në terren të një neoplazie është:

- A) GN(glomerulonefriti, me leziona minimale
- B) GN(glomerulonefriti, membrano-proliferativ
- C) Glomeruloskleroza segmentare fokale
- D) GN(glomerulonefriti, membranoz
- E) GN(glomerulonefriti, proliferativ me trombe

91. Cili prej pohimeve të mëposhtme është i SAKTË?

- A) nivelet në gjak të kreatininës nuk ndryshojnë me moshën dhe seksin
- B) klirensi i kreatininës nënvlerëson filtracionin real glomerular (i matur me klirensin e inulinës, dhe ky nënvlerësim është më i madh sa më shumë të reduktohet filtracioni
- C) konsumimi i mishit në dietë nuk ndikon nivelet e kreatininës në gjak
- D) nivelet e azotemisë nuk ndikohen vetëm nga filtracioni glomerular, por edhe nga diureza dhe marrja e proteinave në dietë
- E) konsumimi i mishit në dietë nuk ndikon nivelet e azotemisë

92. Ç'farë duhet bërë kur kemi prani të mikrohematurisë së izoluar në një skiator?

- A) kryerja e biopsisë renale
- B) moskryerja e biopsisë renale
- C) përcaktimi i klirensit të kreatininës
- D) matja e presionit arterial
- E) kontrollimi i pacientit periodikisht

93. Urinat në glomerulonefrit akut paraqesin të gjitha alterimet e mëposhtme me përjashtim të:

- A) hematuri makroskopike
- B) cilindra eritrocitarë
- C) proteinuri
- D) ngjyrim kafe
- E) koagula

94. Cila prej terapive të mëposhtme përzgjidhet aktualisht në fillim në një pacient me Artrit Reumatoid?

- A) AINS
- B) Prednizon 40mg/ditë
- C) Metotreksat (10mg/javë. + AINS + ndoshta kortikosteroidë me dozë të ulët
- D) AINS + minociklinë (100mg 2 herë në ditë.
- E) Paracetamol sipas nevojës

95. Cila është patologjia më shumë përgjegjëse për hyrjet e reja në dializë për shkak të uremisë terminale?

- A) glomerulonefriti primar

- B) sëmundjet renale kongjenitale
- C) diabeti mellitus
- D) hipertensioni arterial
- E) nefropatitë tubulointersticiale

96. Cili prej çrregullimeve të mëposhtme të gjumit ka prevalencë më të madhe në pacientët e dializuar në krahasim me popullatën e përgjithshme:

- A) Somnambulizmi
- B) Çrregullim i fazës REM
- C) Sindromi i këmbëve të shqetësuara
- D) Kërcitja e dhëmbëve
- E) Asnjëra nga përgjigjet e mëposhtme

97. Të gjitha nefropatitë e mëposhtme recidivojnë në veshkën e transplantuar, përveç:

- A) glomeruloskleroze segmentare fokale
- B) glomerulonefritit membrano-proliferativ
- C) glomerulonefritit me antikorpe anti membranë bazale glomerulare
- D) nefropatia me depozitime mezangiale të IgA
- E) tubulopatia kongjenitale e Gitelman

98. Në asnjërën prej situatave të mëposhtme nuk vërehet rritja e gap-it anionik, përveç:

- A) nefropatisë intersticiale
- B) mosushqyerjes
- C) ureterosigmoidostomisë
- D) acidozës tubulare proksimale
- E) nefropatisë diabetike

99. Ku e merr origjinën më shpesh tumori i prostatës?

- A) nga zona qendrore
- B) nga zona periferike
- C) nga zona e tranzicionit
- D) nga vezikulat seminale
- E) nga uretra prostatike

100. Vendi më i shpeshtë i metastazave të tumorit të prostatës jashtë limfonodujve është:

- A) kolona lumbo-sakrale
- B) pulmonet
- C) mëlçia
- D) surenalet

E) truri

101. Cilat janë shkaqet më të zakonshme të dëmtimit të ereksionit me natyrë organike?

- A) vaskulare
- B) nervore
- C) jatrojenike
- D) hormonale
- E) patologji të trupave kavernoze

102. Të gjitha sëmundjet e mëposhtme mund të çojnë në IRK me përjashtim të:

- A) lupusit eritematoz sistematik
- B) diabetit mellitus
- C) amiloidozës
- D) mielosklerozës
- E) mielomës multiple

103. Cila prej këtyre simptomave të IRK është më e ndjeshme ndaj korigjimit të acidozës:

- A) diarrea
- B) nauzea dhe të vjellat
- C) astenia muskulore
- D) anemia
- E) pruriti

104. Gjatë vlerësimit të funksionit renal, parametrat më të përdorshëm janë Azotemia dhe Kreatininemia; vlerat që konsiderohen normale janë:

- A) Azotemia 2.0-4.0 mg/dl; Kreatininemia 0,4-0,8 mg/dl
- B) Azotemia 2.0-7.0 mg/dl; Kreatininemia 0,4-1,5 mg/dl
- C) Azotemia 7.0-20.0 mg/dl; Kreatininemia 0,6-3,5 mg/dl
- D) Azotemia 20.0-60.0 mg/dl; Kreatininemia 0,7-2,5 mg/dl
- E) Azotemia 60.0-70.0 mg/dl; Kreatininemia 0,4-1,5 mg/dl

105. Në një pacient me dekompensim kardial nën trajtim me furosemid, cili prej elektroliteve të mëposhtëm duhet monitoruar vazhdimisht?

- A) Natriumi
- B) Klori
- C) Kaliumi
- D) Kalçiumi
- E) Magnezi

106. Në një pacient me IRK kryerja e një ekzaminimi koronarografik:

- A) duhet kundërrindikuar gjithmonë
- B) duhet kundërrindikuar nëse vlerat e kreatinës janë më të larta se norma
- C) mund të realizohet me përgatitjen e duhur
- D) nuk ka efekte mbi funksionin renal
- E) pas një ekzaminimi të tillë kërkohet kryerja e procedurës së menjëhershme të dializës

107. Një individ i sëmurë me Tuberkuloz, nëse nuk i nënshtrohet kurave të përshtatshme, mund të infektojë për gjatë një viti:

- A) një mesatare prej 10-15 personash
- B) 20-30
- C) mbi 40
- D) mbi 50
- E) mbi 100

108. Për cilën nga manifestimet e mëposhtme të SIDA-s, besohet se luan një rol patogjenetik virusi human herpes tip 8 (HHV-8):

- A) sarkomën Kaposi
- B) limfadenopatinë e gjeneralizuar persistente
- C) angiomatozën bacilare
- D) diarrenë kronike
- E) leukoplakinë orale viloze

PNEUMATOLOGJI

1396. të gjitha shënjat e mëposhtëme janë karakteristikë e cor pulmonare kronik me perjashtim:

- A turgor i jugulareve
 - B edema periferike
 - C hepatomegali
 - D kolle
 - E gishta si shkop tamburi
-

1387. Cilat patologji mund të jenë shkaku i hemoptizisë?

- A koagulimi intravaskular i diseminuar
 - B tumore primitiv beninj ose malinj
 - C patologji granulomatoze aktive
 - D emboli – infarkt pulmonar
 - E të gjitha të mësipërmet
-

1398. Bronkiti infektiv akut ka incidencën maksimale në?

- A në dimër
 - B në verë
 - C në vjeshtë
 - D në pranverë
 - E nuk ka diferenca stinore në incidencë
-

1399. cilët janë mekanizmat patogjenetikë të pneumonisë nga hipersensibiliteti?

- A reaksione të mediatuara nga qelizat
 - B reaksione të lidhura me mungesën e IgA
 - C reaksione të lidhura me lëshimin e IgE
 - D reaksione të lidhura me komplimentin
 - E reaksione të lidhura me degradimin e fibrinogjenit
1400. cilët janë shkaqet më të shpeshta të versamenteve pleurale hemoragjike?
- A neoplazitë
 - B pneumonitë
 - C infeksionet virale
 - D pneumotoraks
 - E sarkoidozë
-

1401. Të gjitha gjëndjet e mëposhtëme përfaqsojnë një faktor reziku të pranuar për SPOK (sëmundja pulmonare obstruktive kronike) me përjashtim të :

- A infeksione respiratore rekurente
 - B tymit të dyhanit
 - C ndotjes atmosferike
 - D ndotjes në ambjentin e punës
 - E alkolizmi kronik
-

1402. shkaku më i shpeshtë i atelektazës lobare pulmonare është:

- A infarkti pulmonar
- B pneumoni pneumokoksike
- C pneumoni virale

D inhalim i materialeve të traktit tretës
E bronkoektazia

1403. cili është ilaçi që përdoret më shpesh në profilaksinë e tuberkulozit?

- A rifampicina
 - B izoniazid
 - C etambutol
 - D pirazinamid
 - E streptomycin
-

1404. në riakutizimet e semundjes pulmonare obstruktive kronike, antibiotiku i zgjedhur duhet të jetë aktiv kundër të gjithë bakteve të mëposhtëme me përjashtim të:

- A hemofilus influenzae
 - B streptokokus pneumonie
 - C stafilokokus aureus
 - D moraksela katarralis
 - E pseudomonas aeruginoza
-

1405. terapia e embolisë pulmonare mund të përfshijë të gjithë medikamentet e mëposhtëme me përjashtim të :

- A sedatimit me barbiturate
 - B oksigjenoterapi
 - C stimulant beta adrenergjik
 - D dopamin
 - E asnjë nga të mësipërmet
-

1406. Në cilat nga gjëndjet e mëposhtëme mund të stabilizohet prezenca e insuficiencës respiratore?

- A hemogazanaliza: PaO₂ 70 mmHg, PaCO₂ 55 mmHg
 - B hemogazanaliza: PaO₂ 67 mmHg, PaCO₂ 38 mmHg
 - C hemogazanaliza: PaO₂ 45mmHg, PaCO₂ 60 mmHg
 - D hemogazanaliza: PaO₂ 95 mmHg, PaCO₂ 41 mmHg
 - E hemogazanaliza: PaO₂ 65 mmHg, PaCO₂ 47 mmHg
-

1407. Si realizohet leximi i testit të tuberkulinik?

- A duke matur sipërfaqen e skuqur
 - B duke matur diametrin e skuqjes
 - C duke matur diametrin e papulës
 - D duke matur sipërfaqen e papulës
 - E palpimi i zonës së ngritur në vendin e inokulimit të PPD
-

1408. çfarë nënkuptohet me fibrozë pulmonare idiopatike?

- A një formë fibroze pulmonare jo evolutive
 - B një formë fibroze pulmonare me dekurs të papritur
 - C një formë fibroze pulmonare trashëgueshme
 - D një formë pneumonie interstiale idiopatike me ecuri klinike progresive
 - E asnjë nga përgjigjet e indikuara
-

1409. Cila metodë ngjyrimi përdoret zakonisht për identifikimin e shpejtë të Mycobacterium tuberculosis?

- A gram
- B hematoksinë
- C gimsa
- D ziehl-nielsen
- E papanikolau

1410. cilët janë komponentët të sistemit mekanik të mbrojtjes pulmonare?

- A sistemi mukoregulator, nënndarja dikotomike e bronkeve
 - B arkitektura anatomike dikotomike, hipersekretimi i mukusit, epiteli prizmatik me cilie vibruese
 - C arkitektura anatomike dikotomike, sistemi mukoregulator, epiteli prizmatik me cilie vibrante
 - D arkitektura anatomike dikotomike, sistemi mukoregulator, epiteli kubik
 - E arkitektura anatomike dikotomike, hipersekretimi i mukusit, epitel kubik
-

1411. kolapsi pulmonar komplet mund të verifikohet në të gjitha gjëndjet e mëposhtëme me përjashtim të:

- A pneumotoraksit
 - B plagë pulmonare
 - C obstrukcion i bronkut intermediar
 - D plagë të paretit torakal nga shtypja
 - E hemotoraks i djathtë
-

1412 Cilët nga trajtimet e mëposhtëme është demonstruar e aftë të rrisi mbijetesën në pacientët me SPOK?

- A bronkodilatator
 - B oksigjen për kohë të gjatë
 - C antikolinergjikët
 - D ventilacion mekanik
 - E kortikosteroid
-

1413. mezotelioma pleuritike mund të manifestohet me karakteristikat e mëposhtëme me përjashtim:

- A opacifikim difuz i hemitoraksit
 - B spostim kundralateral i mediastinit
 - C versament pleural hematik
 - D prezenca e acidit hialuronik në versamentin pleural
 - E dhimbje difuze torakale
-

1414. cili është elementi që përveç anamnezës është fundamental në diagnozën e pneumokoniozave?

- A shintigrafia pulmonare
 - B prova funksionale respiratore
 - C lavazhi bronkoalveolar
 - D radiografia e toraksit
 - E hemogaz analiza
-

1415. karcinoma bronkogjenike është (zgjidh përgjigjen e gabuar):

- A përgjegjës për më shumë se 90% të tumoreve pulmonar
 - B kanceri i dytë më i shpeshtë në burra
 - C më i shpeshti në moshën e re
 - D duhanpirja është shkaku kryesor
 - E vetëm një prognozë jo të favorshme
-

1416. cilat nga këto nuk është një indikacion për fibrobronkoscopi?

- A vlersimi i mukozave bronkiale
 - B heqja e tapave dens të mukusit
 - C biopsi e neoplazive endobronkiale
 - D trajtimi i hematemezës
 - E diagnoza e neoplazive bronkiale
-

1417. Cili është definicioni i empiemës pleuritike?

- A grumbullim i limfës në hapsirën pleuritike
- B grumbullimi i koagulave në hapsirën pleuritike si pasoje e pneumonektomisë
- C mbledhja e materialit purulent në hapsirën pleuritike

D mbledhja e ajrit dhe gjakut në hapsirën pleuritike

E mbledhja e likidit në hapsirën pleuritike

1418. cili është gjeni onkosupresor që akuzohet me shumë në gjenezën e tumoreve pulmonare

A p47

B p53

C RAS

D Myc

E Fos

1419. në cilat gjëndje fiziologjike predominon kontrolli metabolik i respiracionit:

A gjatë ushtrimeve fizike

B gjatë tretjes

C në fazat e agjerimit

D gjatë gjumit

E gjatë pagjumesise

1420. cfarë mund të tregojë prova funksionale respiratore gjatë astmës bronkiale?

A sindrom disventilator i tipit restriktiv

B vlera në limite të normës

C sindrom disventilator i tipit obstruktiv

D reduktim të volumit rezidual

E reduktim i izoluar i kapacitetit funksional rezidual

1421. cilat nga faktorët e mëposhtëm është një faktor shpërthyes i astmës bronkiale?

A ushtrimet fizike

B refluksi gastroezofageal

C inhalimi i aeroalergenëve

D infeksione virale të rrugëve primare respiratore

E të gjitha përgjigjet e indikuara

1422. në një krizë bronkospastike akute substanca e qetsimit që duhet dhënë është:

A neostigmina

B heparina

C adrenalina

D kinidina

E digitali

1423. Cila nga këto sumundje mund të provokojë hipertension pulmonar primar?

A sindromi Cushing

B feokromacitoma

C insufiçenca renale kronike

D stenoza e istmusit aortik

E fibroze pulmonare masive nga silikoza

1424. në bazë të cilave kritere vendoset aktiviteti i tuberkulozit pulmonar?

A klinike

B radiologjike

C klinike ,radiologjike, mikrobiologjike

D mikrobiologjike

E klinike dhe mikrobiologjike

1425. cili është izotipi më i zakonshëm i tumoreve malinje të trakesë?

A karcinoma spinoqelizore

- B karcinoma adenoskuamoze
 - C adenokarcinoma
 - D karcinoma adenoidocistike (cilindroma)
 - E karcinoma aplazike
-

1426. çfarë nënkuptohet me stadin zero të sarkoidozës?

- A prekje pulmonare e izoluar
 - B prekje okulare e izoluar
 - C prekje të izoluara kutane
 - D manifestime extratorakale në mungesë të anomalive torakale të demonstrueshme radiologjikisht
 - E asnjë nga përgjigjet e mësipërme
-

1427. antileukotrienet aktualisht janë të indikuara në trajtimin e SPOK?

- A jo
 - B po në shoqërim me antikolinergjikët
 - C po në shoqërim me kortikosteroidët inhalator
 - D po vetëm në prezencë të riakutizimeve të sëmundjes
 - E po vetëm në fazën stabil të sëmundjes
-

1428. të gjithë mekanizmat e mëposhtëm patogjenetik janë të pranishëm në astmën nga ushtrimet fizike me përjashtim:

- A hiperventilimit
 - B ftohja e rrugëve ajrore
 - C dehidrim i rrugëve ajrore
 - D stimulim nervoz refleksor
 - E rritjes së presionit sistemik pulmonar
-

1429. në diagnozën e embolisë pulmonare arteriografia pulmonare realizohet:

- A në të gjitha rastet e dyshuara për emboli pulmonare
 - B vetëm testi i D dimerit rezulton pozitiv
 - C në rastet kur testi i D dimerit, shintigrafia perfuzionale dhe ekografia venoze nuk kanë arritur të dirimere dyshimin diagnostik
 - D vetëm shintigrafia pulmonare rezulton pozitive
 - E vetëm prezenca e fibrilacionit atrial
-

1430. cilat nga pohimet e mëposhtëme bën pjesë në fazën diagnostike fillestare të një neoplazie pulmonare hemoragjike?

- A echografia abdominale
 - B eko dopler tronchi sovra- aortal
 - C ct koke
 - D fibrobronkoscopia
 - E ct maksikofaciale
-

1431. në cilat forma të hipertensionit pulmonar vërehet një rritje e presionit kapilar pulmonar

d'incunamento?

- A hipertension venoz pulmonar nga kardiopati të majta
 - B hipertension venoz pulmonar nga kardiopati të djathta
 - C hipertension pulmonar arterioz primitive
 - D hipertension pulmonar nga hipoksia
 - E asnjë nga përgjigjet e indikuara
-

1432. cili medikament përdoret për kontrollin e inflamacionit të rrugëve ajrore në një pacient astmatik?

- A aspirina
- B kortikosteroid me rrugë inhalatore
- C teofilina

D inhibitor COX-2

E beta 2 agonist

1433. cila është neoplazia pulmonare më shumë e lidhur me ekspozimin profesional?

A adenokarcinoma

B mikrocitoma

C ca spinoceleulare

D mezotelioma pleuritike

E karcinoide

1434. cili është trajtimi më i nevojshëm në obstrukcion të rrugëve ajrore të një pacienti të prekur nga fibroza cistike:

A drenazhi postural

B antibiotik

C bronkodilatator

D antikolinergjik

E kortikosteroid

1435. cili nga të mëposhtëmit është shkaktari më i shpeshtë në pneumoninë në praktikën e mjeksisë së përgjithshme?

A mycoplasma pneumonie

B hemofilus influenzae

C legionella pneumophila

D k.pneumonie

E streptococcus pneumonie

1436. sindromi Claude Bernard – Horner karakterizohet nga :

A enoftalmus,ptoze palpebrale,dhe anidroze unilaterale

B dhimbje në shpinë dhe krahë përgjatë zonës së inervimit të nervit ulnar

C strie rubre në nivelin abdominal, qafa e buallit dhe facies lunare

D edema mantel dhe turgor i jugulareve

E enoftalmi, miozë, ptozë palpebrale dhe anidrozë kontralaterale

1437.cili është testi i funksionalitetit respirator që diferencon astëm bronkiale nga SPOK?

A spirometria e thjeshtë

B body pletizmografia

C testi i difuzionit të monoksidit të karbonit

D testi i bronkoreversibilitetit

E testi i sforcos

1438. cilat janë format më frekvente të hipertensionit pulmonar?

A hipertension pulmonar primitiv

B hipertension pulmonar sekondar nga kardiopati të majta

C hipertension pulmonar nga prezenca e lartësive të mëdha

D sekondar si pasojë e sëmundjeve respiratore kronike

E asnjë nga përgjigjet e indikuara

1439. kur dyshohet prezenca e një karcinoidi pulmonar, në mungesë të diagnozës histologjike, cili egzaminim instrumental mund të jetë i nevojshëm të realizohet?

A shintigrafia pulmonare perfuzionale

B shintigrafia kockore

C shintigrafia pulmonare me oktrotid të markuar radioaktivisht

D ct e kokës

E shintigrafia pulmonare ventilatore

1440. nga se influencohet më shumë aktiviteti i qendrave respiratore?

- A nga hiperkapnia
 - B nga hipoksemia
 - C nga lëvizjet e paretit torakal
 - D nga alkalozia
 - E nga kalçemia
-

1441. të gjitha simptomat e mëposhtme janë të lidhura me ekspansionin torakal të kancerit pulmonar me përjashtim:

- A kollës
- B hemoptizia
- C dhimbja torakale
- D dispnea
- E pectus excavatum

1442. cili është tumori benignë më i shpeshtë i paretit torakal?

- A kondroma
 - B fibrodisplazia kockore
 - C esteokondroma
 - D tumor desmoid
 - E fibroma
-

1443. cilat janë medikamentet kryesore që përdoren në kontrollin e bronkokonstriksionit në pacientët me astëm kronike?

- A beta 2 agonistët me veprim të shkurtër
 - B beta 2 agonistët me veprim të zgjatur
 - C teofilina
 - D kortikosteroidët me inhalacion
 - E kortikosteroidët me rrugë sistemike
-

1444. cilët nga të mëposhtmet nuk është faktor favorizues i fillimit të pneumonisë post operatorore ose post traumatike:

- A hipoventilimi
 - B eskursion i limituar i hemidiafragmave
 - C inhibim i refleksit të kollës
 - D dehidrimi
 - E fillimi i e aritmive kardiake
-

1445. ku është e lokalizuar gjeni përgjegjës për fibrozën cistike?

- A kromozomin 5
 - B kromozomin 13
 - C kromozomin 7
 - D kromozomin 11
 - E kromozomin 3
-

1446. pneumotoraksi masiv si trajtohet:

- A oksigjenoterapi
 - B intubim orotrakeal
 - C drenim torakal në hapsirën e dytë interkostale hemiklavikulare
 - D drenim torakal në hapsirën e V interkostale aksilare posterior
 - E drenim umbilikal
-

1447. obstruksioni bronkial për definicion të spok:

- A është vazhdimisht prezent dhe pse është variabël dhe irreversibël
- B nuk është gjithmonë prezente por është irreversibël
- C jo domosdoshmërisht është gjithmonë prezente dhe mund të jetë pak a shumë reversible

D është gjithmonë prezente dhe reversible
E asnjë nga përgjigjet e indikuara
1448. cili është kriteri aktual i klasifikimit të SPOK
A kliniko – funksional
B radiologjik
C ekskluzivisht funksional
D anatomopatologjik
E radiologjikisht – funksional

1449. kundraindikimet absolute të bronkoskopisë janë:
A kollë
B dyshimi i fistulave trakeozofageale
C akses pulmonar refraktar
D status kardiovaskular jo stabil dhe aritmi kardiake
E versament pleural

1450. trajtimi imediat i pneumotoraksit të hipertendosur jotraumatik konsiston në :
A torakotomi
B intubacion trakeal
C drenazh pleuritik
D antibiotikoterapi
E pushim absolut në shtrat

1415. cili është relacioni i polikimioterapisë të mykobakteriozave jo tuberkulare?
A përqëndrimi në nivelin e lezionit dhe shmangia e lindjes së rezistencave sekondare
B shoqërimi me medikamente sensibile dhe shmangia e lindjes së rezistencave sekondare
C përqëndrimi në nivel të lezionit dhe shmangia e lindjes së rezistencave të kryqëzuara
D shoqërimi me medikamente sensibile dhe shmangia e lindjes së rezistencave të kryqëzuara
E shoqërimi me medikamente sensibile, shmangia e lindjes së rezistencave të kryqëzuara dhe reduktim i toksicitetit farmakologjik

1452. pas heparit organi më shumë i prekur nga metastazat e karcinomës pulmonare është:
A skeleti
B gjëndra mbiveshkore
C veshkat
D truri
E shpretka

1453. janë të kundraindikuara në egzekutimin e agoaspirimit perkutan torakal gjëndjet e mëposhtëme me përjashtim:
A instabiliteti kardiovaskular
B pneumonektomia kuntralaterale
C ciste hidatike
D difekte të koagulimit
E sëmundje buloze pulmonare kundralaterale

1454. cilët janë shkaqet më të shpeshta të stenozeve trakeale esktrinseke?
A anomali vaskulare
B neoformacione tiroideje
C neoplazi të paretit torakal
D hipertrofi e ventrikulit të majtë
E timoma

1455. cili është komplikacioni më i shpeshtë i azbestozës pulmonare?
A pneumotoraksi

- B mezotelioma pleuritike
 - C adenokarcinoma pulmonare
 - D ca spinoqelizore
 - E asnjë nga përgjigjet e indikuara
-

1456. pneumotoraksi spontan shkaktohet më shpesh:

- A tuberkulozi
 - B trauma
 - C emfizema bulloze
 - D tumore të mediastinit
 - E pneumonia
-

1457. cilat nga substancat e mëposhtëme metabolizohen ne nivel pulmonar?

- A substanca p
 - B histamina
 - C dopamina
 - D angiotenzina II
 - E angiotenzina I
-

1458. cilët janë faktorët e riskut përgjegjës për lindjen e pneumonisë nga hipersensibiliteti

- A inhalimi okazional i pluhrave inorganik
 - B inhalimi perserites i pluhrave inorganik
 - C inhalimi te perseritura i plurave organik me dimensione inferiore 5 micron
 - D inhalimi i plurave organik mbi 5 mikron
 - E asnjë nga përgjigjet e indikuara
-

1459. cilët nga simptomat e mëposhtëme nuk është e lidhur drejtpërsëdrejti me tumoret malinje të trakesë?

- A hemoptizia
 - B disfonia
 - C dispnea
 - D disfagia
 - E refluksi gastroezofageal
-

1460. një versament pleural tuberkular karakterizohet nga :

- A rritja e neutrofileve
 - B rritja e makrofagëve
 - C rritja e limfociteve
 - D rritja e plazmocyteve
 - E asnjë nga përgjigjet e mësipërme
-

1461. terapia e pneumonise jashtëspitalore:

- A është pothuajse gjithmonë empirike ose e arsyetuar
 - B nuk drejtohet asnjëherë nga një diagnozë etiologjike
 - C është gjithmonë e drejtuar nga një diagnozë eziologjike
 - D është e udhëhequr nga një radiografi
 - E konsiston në përdorimin e cefalosporinave me spektër të gjerë veprimi
-

1462. infeksionet mund të ndikojnë në patogenezën e SPOK?

- A si efekte në distancë të infeksioneve respiratore të fëmijërisë
 - B si efekte akute të riakutizimeve
 - C si efekte kronike të kolonizimit të rrugëve ajrore
 - D të gjitha përgjigjet e mësipërme
 - E asnjë nga përgjigjet e mësipërme
-

1463. hipertrofia e një dore në sindromin Horner mund të indikojë egzistencën e :

- A sklerozës laterale amiotrofike
 - B sindromit të tunelit karpal
 - C tumorit Pancoast
 - D amiloidozës sistemike
 - E tuberkulozit limfoglandular
-

1464. cili është testi i duhur për diagnozën etiologjike të versamenteve pleurale?

- A radiografia e toraksit
 - B CT e toraksit
 - C torakocenteza
 - D bronkoskopia
 - E ekografia torakale
-

1465. kufiri superior i një versamenti pleural tipik vendoset sipas një linje të quajtur nga :

- A garland
 - B grocco
 - C damoiseau – ellis
 - D koch
 - E auerbach
-

1466. BAL (bronko lavazhi alveolar) i vetëm mund të jetë diagnostik në pneumoninë nga hipersensibiliteti?

- A po gjithmonë
 - B jo asnjëherë
 - C vetëm nëse shoqërohet me shënja klinike, radiologjike dhe funksionale
 - D po vetëm nëse shoqërohet me shënjat klinike
 - E po nëse shoqërohet me vetëm me shënjat funksionale
-

1467. në trajtimin e një gjëndje astmatike cili është qëllimi kryesor që mjeku duhet të bëjë:

- A të korigjojë bronkokonstriksionin
 - B të korigjojë hipokseminë
 - C të korigjojë statusin e inflamacionit
 - D të korigjojë hiperinflacionin dinamik të rrugëve ajrore
 - E të korigjojë alterimet metabolike pasuese
-

1468. cila është terapia e zgjedhur në trajtimin e sarkoidozës?

- A metotraxate
 - B colchicina
 - C prednisolone
 - D aziotioprina
 - E penicilina
-

1469. në tumoret primitive të trakesë hasen shënjat e mëposhtëme me përjashtim të:

- A kollës
 - B hemoptizisë
 - C dhimbjes torakale
 - D dispnesë
 - E disfonisë
-

1470. torakocenteza (zgjidh përgjigjen e gabuar)

- A përdoret për përcaktimin etiologjikë të versamentit pleural
- B mund të egzekutohet për të lehtësuar insufiçencën respiratore shkaktuar nga një versament pleural masiv
- C angina jostabile nuk kundraindikon e kryerjen e torakocentezes
- D mund të përdoret për të futur agjent sklerozant ose antineoplastik në hapsirën pleuritike

E një koagulopati jo e stabilizuar kundraindikon egzekutimin

1471. edema mantel dhe turgori i venave jugulare janë shënje karakteristike e :

- A sindromin Claude – Bernard – Horner
 - B sindromit të dispnesë
 - C sindromit të vena cava superior
 - D sindromit të sekretimit të papërshtatshëm të ADH
 - E fenomenit Raynaud
-

1472. cili nga parametrat e mëposhtëm nuk matet gjatë spirometrisë?

- A kapaciteti vital të sforcuar
 - B volumi i rezervës ekspiratore
 - C volumi i ekspiruar i sforcuar
 - D kapaciteti inspirator
 - E volumi rezidual
-

1473. terapia e një pneumotoraksi të mbyllur është:

- A drenim perkutan i kavitetit pleuritik
 - B astinencë terapeutike sepse pulmoni riekspandohet spontanisht
 - C intervent kirurgjikal
 - D astinenzë për tre javë me respirator automatik
 - E aeroterapi
-

1474. të gjitha të mëposhtëmet mund të jenë shkak i sindromit të vena cava superior me përjashtim të :

- A karcinomës pulmonare
 - B limfoma
 - C tumor i mediastinit
 - D metastaza intratorakale
 - E bronhektazia
-

1475. cili është bakteri që tenton të kolonizojë rrugët ajrore në pacientët me fibrozë cistike?

- A streptococcus pneumonie
 - B hemofilus influence
 - C moraxella catarrhalis
 - D pseudomonas aeruginosa
 - E hemophilus parainfluence
-

1476. cilët janë indikacionet e trajtimit trombolitik në pacientët me emboli pulmonare?

- A brenda 2 orëve nga ngjarja
 - B vetëm në prezencë të shokut kardiogjen dhe hipotensionit
 - C brenda 6 orëve nga ngjarja
 - D në prezencë të dhimbjes torakale dhe cianozës persistente
 - E në prezencë të hemoptizisë masive
-

1477. gjatë pneumonis nga chlamydia pneumonia, antibiotiku i zgjedhur është:

- A tetraciklina
 - B beta laktamiku
 - C penicilina G
 - D makrolid
 - E cefalosporin
-

1478. cilat nga karakteristikat e CT orientojn drejt një lezioni malinj?

- A Kufij të qarte
- B kalcifikimet
- C dimension <1 cm
- D rritja e vaskularizimit

E densitet homogjen

1479. nw pneumoninw nga mikoplazma pneumonia si terapi mund tw pwrdozet:

- A tetraciklin
 - B eritromycin
 - C clarithromycin
 - D azitromicin
 - E tw gjitha tw mwsipwrmet
-

1480. nw njw individ 60 vjeç fumator qw prezanton hemoptizi diagnoza me probabwl wshtw:

- A tuberkuloz
 - B tumor i pulmonit
 - C bronkoektazi
 - D çarje e variçeve ezofageale
 - E cist pulmonar nga echinococ
-

1481. shkaku mw i shpwshtw i hemopnueumotoraksit wshtw:

- A neoplazia pulmonare
 - B neoplazi pleuritike
 - C trauma
 - D tuberkulozi
 - E mezotelioma
-

1482. janw komplikime tw torakocentezws tw gjitha tw mwposhtwmet me pwrjashtim:

- A pneumotoraksi
 - B sinkop i thjeshtw ose vazovagal
 - C embola aerik
 - D infeksioni
 - E lezione tw pleksit brakial
-

1483. cila wshtw kohwzgjatja e trajtimit tw shkurtwr standart tw tuberkulozit?

- A 6 muaj
 - B 4 muaj
 - C 9 muaj
 - D 12 muaj
 - E nw relacion me situatwn klinike
-

1484. cili wshtw mekanizmi fizpatologjik mw i rwndwsishwm nw gjenezwn e alterimeve tw shkwmbimeve gazore tw emfizemws pulmonare?

- A vazokonstriksioni arterial hipoksike
 - B alterim i raportit ventilim-perfuzion
 - C rritja e kompliancws pulmonare
 - D rritja e rezistencws sw rrugwve ajrore
 - E reduktim tw volumeve pulmonare
-

1485. sindromi i lobit media mund tw shkaktohet nga:

- A aneurizma e aortws torakale
 - B adenopati peribronkiale
 - C bronkoektazi
 - D stenoz e arteries pulmonare
 - E emfizema pulmonare
-

1486. nw cilat rrethana aktivizohen muskujt ekspirator?

- A kur nevojiten flukse ekspiratore mw tw larta
- B kur nevojiten flukse inspiratore mw tw larta
- C kur nevojitet suporti i muskujve ekspirator nw inspiracionin pasardhws

D pwr tw patur njw volum rrjedhws mw tw lartw
E pwr tw patur njw kapacitet vital mw tw lartw

1487. çfarw indikohet me "N" nw stadifikimin TNM tw tumorit pulmonar?

- A dimensi i tumorit
 - B lokalizimi i metastazave
 - C prekja e limfonodulave
 - D prekja cerebrale
 - E prekja kockore
-

1488. cili tip pneumotoraksi specificikisht mbwshtetet nw njw mekanizwm valvular?

- A pneumotoraks spontan
 - B pneumotoraks iatrogjen
 - C hemopneumotoraks
 - D pneumotoraks i mbitendosur
 - E pneumotoraks sakat
-

1489. konsiderohet gaz irritant, i aftw tw shkaktojw irritim dhe si pasojw lezione tw aparatit respirator, cili nga agjentwt kimikw tw mwposhtwm:

- A klori
 - B fosfori
 - C acidi sulfhidrik
 - D dioksidi i azotit
 - E tw gjitha tw mwsipwrmet
-

1490. nw astmwn bronkiale nga se varet ulja e flukseve ekspirator maksimal?

- A rritja e kompliancws
 - B rritja e konduktancws
 - C ulja e rezistencave
 - D rritja e rezistencave
 - E rritja e elasticitetit tw kafazit torakal
-

1491. cila wshtw forma mw e shpeshtw e pneumomediastinit?

- A idiopatik
 - B spontan – patologjik
 - C esencial
 - D traumatik
 - E iatrogjen
-

1492. cilat qeliza pwrgegjwse nw BAL(lavazhi bronko alveolar) janw indikues tw aktivitetit tw pneumokoniozws?

- A limfocite CD4
 - B limfocite CD8
 - C makrofag
 - D neutrofile
 - E monocite
-

1493. agoaspirimi pulmonar wshtw i nevojshwm nw diagnozwn e :

- A bronkoektazisw
 - B emfizemws
 - C TBC miliar
 - D kancerit bronkogjen
 - E fistulave arteriovenoze
-

1494. cilwt nga kwta faktorw nuk wshtw determinant pwr tw indiktuar tumore bronkopulmonare nw fumatorwt:

- A mosha e fillimit tw vesit
 - B kohwzgjatja nw vite e vesit
 - C numri i cigareve tw pira nw njw ditw
 - D moshe e madhe e pacientit
 - E grada e inspирimit tw tymit tw duhanit
-

1495. cili wshtw shtrirja e rritjes sw densitetit pulmonar nw pneumoninw pneumokoksike?

- A panlobulare
 - B bilaterale
 - C lobare ose sublobare
 - D interstiale
 - E apikale
-

1496. çfarw nwnkupotohet me ‘ ’ kohw dyfishimi”

- A koha e nevojshme qw do njw lezion nodular qw tw dyfishojw volumin e tij
 - B koha e nevojshme qw do njw lezion pulmonar qw tw dyfishojw diametrin e tij
 - C koha e nevojshme qw do njw lezion nodular qw tw dyfishojw volumin dhe diametrin e tij
 - D koha qw i duhet njw lezioni nodularpwr tw dhwnw metastaza nw distancw
 - E koha qw i duhet njw lezioni nodular tw dyfishojw cirkumferencwn e tij
-

1497. cili nga medikamentet e mwposhtwme nuk pwrdolet pwr kontrollin afatgjatw tw patologjisw astmatike?

- A kromoglikati
 - B teofilina
 - C kortikosteroid
 - D medikamentet aktive mbi leukotrienet
 - E tw gjitha tw mwsipwrmet janw tw vwrjeta
-

1498. cila wshtw rruga kryesore e transmetimit tw tuberkulozit?

- A rruga digjестive
 - B rruga konjktivale
 - C rruga kutane
 - D rrugw ajrore
 - E rrugw gjenitale
-

1499. tw gjitha pohimet e mwposhtwme relative me kontaktin me njw subjekt tw prekur nga tuberkulozi janw tw gabuara me pwrjashtim :

- A pwrçakton gjithmonw infeksionin nga m.tuberculosis
 - B nuk pwrçakton infeksionin nga m.tuberculosis
 - C pwrçakton gjithmonw transmetimin e semndjes tuberkulare
 - D nuk pwrçakton kurrw transmetimin e swmundjes tuberkulare
 - E mund tw japw shkas pwr infeksion nga m.tuberculosis me ose pa shwnja klinike tw swmundjes tuberkulare
-

1500. cila wshtw terapia pwr pacientwt me fibrozw pulmonare idiopatike?

- A kortizon
 - B azatioprina
 - C ciclofosfamid
 - D ciclosporina a
 - E metotrexate
-

1501. shaku mw i shpeshw i abcesit pulmonar akut wshtw:

- A tbc
- B atelektazi pulmonare kronike
- C inhalimi i materialeve ushqimore

D mungesa e pwrdorimit tw antibiotikwve me pwrdorim profilaktiv
E kirurgjia e toraksit

1502. cilwt nga izotipet e mwposhtwme tw karcinomws pulmonare wshtw mw frekuente?

- A adenokarcinoma
 - B karcinoide
 - C karcinoma bronkoalveolare
 - D condroma
 - E adrioblastoma
-

1503. cili wshtw parametri serologjik qw pwr doret pwr monitorimin efikas tw terapisw heparinike?

- A aPPT
 - B PT
 - C INR
 - D fibrinogjeni
 - E kalçemia
-

1504. tw gjitha simptomat/shwnjat e mwposhtwme janw tw shpeshta nw ecurinw e hipertensionit pulmonar primar me pwrjashtim:

- A dispnea nga sforcoja
 - B Dhimbje prekordiale
 - C lipotimia
 - D edema deklive
 - E reduktim i sjelljes kardiake
-

1505. nw çfarw konsiston roli i mushkwrive nw modulimin e ekulibrit acido-bazik?

- A modulimi me ventilim absorbimin e O₂
 - B duke modeluar me ane te ventilimit eleminimin e CO₂
 - C duke modeluar me ane te ventilimit eleminimin e O₂
 - D duke modeluar funksionin eliminues tw pulmonit
 - E duke modeluar funksionin filtrues metabolik tw pulmonit
-

1506. diagnoza citologjike e kancerit tw pulmonit mund tw arrihet me studimet e mwposhtwme me pwrjashtim:

- A agoaspirimi
 - B studim i ekspektoratit
 - C bronkografia
 - D bronkoskopia
 - E mediastinoskopia
-

1507. nw njw pacient me hipertension pulmonar sekondar nga swmundje respiratore kronike, cila nga terapitw e mwposhtwme mund tw pwr doret mw shpesh:

- A oksigjenoterapi e vazhdueshme
 - B digital
 - C antagonistwt e kalçiumit
 - D diuretikwt
 - E teofilina
-

1508. cilwt janw faktorwt etiopatogjenetikw qw pwr fshihen nw zhvillimin e astmws bronkiale?

- A aktiviteti i sistemit nervor autonom nw rrugwt ajrore
 - B inflamacion i rrugeve ajrore
 - C rimodelim i rrugwve ajrore
 - D lwshimi i mediatorwve me veprim bronkokonstruktiv
 - E tw gjitha tw mwsipwrmet
-

1509. cili wshtw materiali biologjik mw i domosdoshwm pwr diagnostikimin mikrobiologjik tw tuberkulozit?

- A saliva
 - B material i marrw me agobiopsi
 - C gjaku
 - D ekspektorati
 - E tumore me metastaza cerebrale tw vetme
-

1511. nw rastin e acidozws metabolike mushkria kompeson nwpwrmjet:

- A rritjes sw frekuencws respiratore
 - B reduktimit tw frekuencws respiratore
 - C ulje tw thellsisw sw respirimit
 - D rritje e thellsisw sw respirimit
 - E reduktim tw eleminimit tw CO₂
-

1512. cilwt janw qelizat qw implikohen nw patogjenezwn e astmws bronkiale?

- A neutrofile
 - B limfocite
 - C eozinofile D bazofile
 - E plazmocite
-

1513. cilat lezione imediate mund tw provokojw intubimi trakeal nw rastin e manovrave reanimatore?

- A stenoza trakeale
 - B trakeomalacia
 - C lezione trakeale penetrante
 - D hemoragji tiroidiene
 - E paralize e nrvit laringeus rrekurent
-

1514. simptomat dhe shwnjat principale tw mykobakteriozes jo tuberkulare tw diseminuara janw:

- A temperaturw, rwnje nw peshw, limfoadenopati, hepatosplenomegali, dhimbje abdominale, diarre, djersitje profuze, insuficjensw respiratore
 - B kollw me ekspektorat mukopurulent persistent
 - C febricola serotina, calo ponderale, kollw, ekspektorim mukopurulent, hemoptozi
 - D febricola serotina, kollw, hemoptozi, dispne
 - E febricola serotina, kollw me ekspektorat hemoptoik e mukopurulent, dispne
-

1515. cila nga tw mwposhtwmet wshtw indikacion pwr mediastinoskopi?

- A biopsi trakeale
 - B biopsi tiroide
 - C biopsi e limfonodulave pretrakeal
 - D biopsi e paretit torakal
-

1516. nw cilwn pjesw tw pemws bronkiale predominojnw mekanizma imunologjik mbrojtws?

- A nw tw gjithw sistwmin bronkial
 - B nw zonat pertej bronkiolit twrminal
 - C nw zonwn trakeale
 - D nw zonat posht bronkiolit terminal
 - E nw nivel tw trakesw e bronkeve tw mwdha
-

1517. nw sindromwn restriktive ka zakonisht njw frekuencw respiratore tw lartw si pasojw e :

- A rezistencat e rrugwve ajrore janw tw reduktuara
- B kushtojn sforcimet e vogla per te lvwizur njw volum tw ulwt pwr çdo akt respirimi
- C rezistenca e rrugwve ajrore nuk rritet me frekuencwn e respirimit
- D tensioni superficial i alveolave mbetet e ulwt nw volume tw ulta

E nw inspiracione tw thella presioni intrapleuritik ka negativitet normal

1518. çfarw nwnkuptohet me stad tw pare tw sarkoidozws?

- A Prekje parenkimale e izoluar
 - B prekje e strukturave limfoglandulare hiliare bilaterale nw mungesw tw interesimit parenkimal C prekje kutane e izoluar
 - D prekje kardiake e izoluar
 - E prekje artikulare e izoluar
-

1519. cili wshtw tipi histologjik i tumorit pulmonar mw tw shpeshtw nw pacientwt me moshw mbi 65 vjeç?

- A skuamocelular
 - B adenokarcinoma
 - C karcinoid
 - D karcinoma bronkoalveolare
 - E karcinom e padiferencuar
-

1520. cila wshtw triada simptomatologjike karakteristike e embolisw pulmonare?

- A dhimbje torakale, cianozw, ritwm galopi
 - B dhimbje torakale, dispne, hemoptizi
 - C takikardi, hipertension arterial, djersitje
 - D dhimbje shpuese si thike, bradikardia, djersitje
 - E palpitacione, hipotension, ikter
-

1512. cili wshtw indikacioni mw i shpeshtw nw moshw pediatrike pwr fibrobronkoskopi?

- A biopsi endobronkiale
 - B obstrukcion bronkial nga trupa tw huaj
 - C lavazh bronkial pwr kulturw
 - D vlersim intraoperator
 - E neoplazi bronkiale
-

1522. dhimbje shpuese si thike e papritur e lokalizuar nw njw hemitoraks dhe dispne, nw njw tw ri deri mw parw asimptomatik janw sugjesticive pwr diagnozat e mwposhtwme:

- A pneumoni lobare
 - B pneumotoraks spontan
 - C infarkt miokardi
 - D emboli pulmonare
 - E aneurizwm diseante
-

1523. nw cilwt volum pulmonar distentimi pulmonar wshtw minimal?

- A nw korespondim me kapacitetin pulmonar total
 - B nw korespondencw me volumin rezidual
 - C nw korespondencw me volumin e rezervws inspiratore
 - D nw korespondencw me volumin e rezewws ekspiratore
 - E nw korespondencw me kapacitetin vital tw sforcuar
-

1524. absesi pulmonar fillimisht duhet tw trajtohet me:

- A terapi farmakologjike
 - B aspiracion transparietal
 - C pneumotomia
 - D lobektomia
 - E drenazh bronkoskopik
-

1525. si quhet grumbullimi i likidit limfatik nw hapsirwn pleuritike?

- A hidropneumotoraks
- B kilotoraks

- C hemotoraks
- D empiema
- E hidrotoraks

1526. nw klasifikimin TNM tw tumoreve pulmonar M indikon:

- A metastaza kockore
- B mungesa e metastazave
- C prezenca joprobable e metastazave nw distancw
- D metastaza jo tw vlersueshme
- E metastaza nw limfonoduj

1527. tw gjithw organet/aparatet e mwposhtwme preken nw fibrozwn cistike me pwrjashtim:

- A pulmoni
- B intestini
- C pankreasi
- D gjwndrat salivare
- E renet

1528. sarkoidoza wshtw njw swmundje e karakterizuar nga:

- A njw histori natyrale e karakterizuar nga periudha aktive dhe qetwsie B wshtw njw swmundje me progresion gjithmonw fatal
- C wshtw njw swmundje qw prezantohet mbi tw gjitha nw moshw tw avancuar
- D wshtw njw swmundje me interesim ekskluzivisht pulmonar
- E wshtw njw swmundje qw intereson ekskluzivisht limfonodujt

1529. cilat janw mekanizmat patogjenetikw kryesor nw hipertensionin pulmonar sekondar nga swmundje kronike respiratore?

- A mbingarkesw ventrikulare e majtw
- B mbingarkesw ventrikulare e djathtw
- C vozokonstriksion pulmonar hipoksike
- D stazw pulmonare
- E asnjw nga pwrgegjet e mwsipwrme

1530. tw gjitha trajtimet e mwposhtwme pwrdozen nw trajtimin e fibrozws cistike me pwrjashtim tw :

- A mukolitikwve
- B enzimave proteolitike
- C drenazhit postural
- D antibiotikwve
- C asnjw tw mwsipwrme

1531. cila wshtw terapia mw e pwrshatshme pwr profilaksi korrekte tw embolisw pulmonare nw pacientwt me risk tw meswm?

- A aspirina
- B dikumarol
- C heparin me peshw tw ulwt molekulare
- D glukokortikoid
- E indometacin

1532. cila wshtw procedura qw lejon njw diagnozw preçize tw lezioneve neoplazike trakeale?

- A CT torako – mediastinale
 - B fibrobronkoskopia
 - C ekografia trakeale
 - D radiografia e toraxit
 - E rezonancw magnetike trakeale
-

1533. cili tip histologjik nga karcinomat jo me qelizave tw vogla shoqrohet mw lehtw me versamente pleurale?

- A karcinoma jo e diferencuar
 - B adenokarcinoma
 - C karcinoma spinoqelizore
 - D karcinoma me qeliza tw mwdha
 - E karcinoide
-

1534. cila wshtw masa e menjwhershme nw njw pneumotoraks hipertensiv:

- A pushim shtrati
 - B drenazh
 - C torakotomi
 - D sonda nazo gastrike
 - E bronkoskopia
-

1535. cili wshtw rezultati kreysor qw pwrfitohet nga pwrdorimi i antileukotrienwve?

- A kontrollojnw tw vetwm astmwn bronkiale
 - B eleminojnw inflamacionin bronkial
 - C lejojnw njw reduktim te dozws sw steroidwve inhalator
 - D reduktojnw sekrecionet bronkiale
 - E reduktojnw pwr gjigjen imunitare
-

1536. mbi çfarw bazohet diagnoza e mykobakteriozws?

- A egzaminime laboratorike
 - B kwrkimi i antikorpeve, egzaminimi radiologjik
 - C egzaminimi radiologjik dhe klinik
 - D izolimi i patogjenit
 - E egzaminime laboratorike dhe radiologjike
-

1537. cili nga tw mwposhtwmet wshtw faktor risku mw i rwndwsishwm pwr tuberkulozin?

- A infeksioni me HIV
 - B infeksioni me hapatit viral
 - B C infeksioni me hapatit viral
 - C D hepatopatit nw
 - pwr gjithwsi E çfardo
-

infeksioni viral

1538. cila wshtw shwnja mw e shpeshtw qw shoqrohet me diagnozwn e bronkitit kronik?

- A kollw e thatw
 - B dispne eforti
 - C kollw produktive
 - D dispne qetsie
 - E stridor laringeal
-

1539. prezenca e kalçifikimeve si levoznga e vezws ne limfonodujt hilar wshtw tipike pwr kw pneumokoniozws?

- A azbesotz
 - B berilioz
 - C silikoz D
 - talkoza
 - E stanoza
-

1540. mikrocitoma pulmonare wshtw njw tumor me origjinw:

- A ind endotelial
- B ind neuroendokrin
- C in epiteliar

- D fibroblastet
- E ind limfoid

1541. me pwjashtim tw ekspozimit ndaj azbestit, cili nga tw mwposhtwmet mund tw konsiderohen faktor tw mundwshwm pwr lindjen e mezoteliomws:

- A pleuriti kronik fibroplazik
- B trauma
- C tymi i duhanit
- D rezatimet jonizuese
- E tw gjitha tw mwsipwrmet

PSIKIATRIA

1. Per te mbajtur nje qendrim korrekt perballe pacienteve do te duhet:

- A) te frenohet cdo reaksion emotiv
- B) te evitohet shprehja e opinioneve personale
- C) te evitohet ironia, sarkazma dhe jokonformizmi
- D) te kritohet hapur cdo sjellje
- E) asnje nga pergjigjet e permendura

2. Per t'u konsideruar i pandehur kerkohet:

- A) aftesia e vullnetshme per te vepruar
- B) paaftesia per te vepruar dhe gjykuar
- C) te mos jete nen veprimin e alkoolit
- D) te kete mbushur moshen 21 vjec
- E) te mos kete vuajtur nga crregullime psikotike

3. Bindja qe nje tjetër person mund te lexoje mendimin tone tregon:

- A) deluzion
- B) obsesion
- C) idene e referimit
- D) depersonalizim
- E) crregullime te kujteses

4. Cili nga te meposhtmet nuk paraqet nje mekanizem psikik mbrojtës:

- A) Projeksioni
- B) Shmangia
- C) Regresioni
- D) Mohimi
- E) Konfabulacioni

5. Perballe nje pacienti anksioz mjeku psikiater nuk duhet:

- A) te shikojte pacientin drejt ne sy, te shkruaje te dhenat, te mate parametrat vitale
- B) te minimizojte apo banalizojte situaten
- C) te jete autoritar
- D) te jete pergjithesues ne vleresime
- E) te preokupohet per mjedisin qe rrethon pacientin

6. Diskinezia tardive:

- A) eshte nje sindrom anesor i neuroleptikeve
- B) eshte nje sinonim i alkoolizmit
- C) eshte nje sinonim i skizofrenise
- D) eshte nje sinonim i sifilizit terciar
- E) eshte nje sinonim i demences

7. Abuzimi kronik i alkoolit mund te coje ne:

- A) demence
- B) crregullime te ankthit
- C) skizofreni
- D) crregullim personaliteti
- E) asnje nga pergjigjet

8. Sasia e gjumit:

- A) pakesohet me shtimin e moshes
- B) mbetet e pandryshueshme ne cdo moshe
- C) pakesohet nga lindja deri ne dhjete vjec dhe pastaj nuk ndryshon
- D) pakesohet nga lindja deri ne tre vjec dhe pastaj nuk ndryshon
- E) pakesohet nga lindja deri ne nje vjec dhe pastaj nuk ndryshon

9. DSM-IV eshte nje sistem klasifikimi i crregullimeve psikiatrike:

- A) hierarkik multi-aksial
- B) dimensional
- C) kategorial
- D) hierarkik
- E) kategorial multiaksial

10. Trajtimi psikiatrik i detyrueshem:

- A) kerkohet dhe realizohet kur te semuret jane te rrezikshem per veten dhe te tjeret
- B) eshte nje nga menyrat e shtrimit ne sherbimet psikiatrike
- C) eshte nje trajtim shendetesor i jashtezakonshem per t'u kryer ne te semuret qe nuk kane vetedijen e semundjes dhe qe refuzojne shtrimet e nevojshme
- D) eshte nje vendim i gjykates
- E) te gjitha pergjigjet e permendura

11. Nje subjekt i prekur nga kleptomania:

- A) zakonisht ka para per te paguar ato qe ai vjedh
- B) eshte i paafte t'i rezistojte impulsit per te vjedhur objekte te pavlera
- C) per me teper nuk i perdor objektet qe vjedh
- D) per me teper nuk ka bashkefajtores
- E) te gjitha pergjigjet e mesiperme

12. Nga cfare karakterizohet onirizmi?

- A) konfuzioni, hiperaktiviteti, crregullime afektive
- B) kthjelltesia, hipermnazia, eufori e lehte
- C) disforia, kompulsioni, crregullime te gjumit
- D) deliri i madheshtise, insomnia, bulimia, hipermnazia
- E) amnezia retrograde, racionaliteti, represioni

13. Delirium tremens shoqerohet nder te tjera me me simptomat e meposhtme:

- A) bradikardi
- B) tremor
- C) halucinacione te fuqishme vizive
- D) dizorientim ne kohe e hapesire
- E) dekurs prej 3-7 ditesh

14. Deluzioni i somatik mund te shfaqet ne tema te ndryshme midis te cilave:

- A) te gjitha te meposhtmet
- B) bindja e te pasurit lekuren e infektuar nga parazite ose nje parazit i brendshem
- C) bindja e te pasurit pjese te trupit te deformatuar
- D) bindja e te pasurit te organeve qe nuk funksionojne
- E) bindja e nxjerrjes se nje ere te keqe nga disa pjese te trupit

15. Cfare eshte iluzioni?

- A) nje perceptim pa objekt
- B) nje crregullim i perceptimit
- C) nje perceptim pa karkter sensorial
- D) nje anomali i te menduarit
- E) nje crregullim i inteligjences

16. Cfare mund te sjellje toksikomania ne kokaine?

- A) tolerance
- B) vartesi
- C) neuroze
- D) psikoze
- E) abstinence

17. Ne prapambetjen mendore te rende koeficienti i inteligjences (I.Q) eshte midis:

- A) 0 – 20/25
- B) 25 – 40/50
- C) 40/50 – 70
- D) 80/90 – 100
- E) 100 – 110/120

18. Ne nje pacient dement qe paraqet axhitim psiko-motor eshte i indikuar perdorimi i:

- A) benzodiazepines
- B) barbiturikeve ne doza te uleta
- C) substancave placebo
- D) haloperidoli ne doza te uleta
- E) chlomipramina

19. Per te percaktuar nje crregullim depresiv madhor si rekurent nevojitet:

- A) prezenca e te pakten tre episodeve depressive ne tre vite rresht
- B) shfaqja e dy ose me shume episodeve depressive me interval remisioni prej te pakten 2 muaj rresht
- C) shfaqja e depresionit ne periudha te percaktuara te vitit, vecanerisht ne pranvere dhe ne vjeshte
- D) prezenca e episodeve depressive te alternuara me periudha hypomanie
- E) asgje nga pergjigjet e mesiperme

20. Me shendetin mendor nenkuptohet aftesia e individit:

- A) per t'u pershtatur apo gjetur zgjidhje ndajkonflikteve te jashtme apo ngjarjeve te jashtme negative
- B) per te kanalizuar impulset ne produkte sociale
- C) per te krijuar marredhenie te pershtatshme nderpersonale
- D) per t'u pershtatur me ambientin
- E) te gjitha pergjigjet jane te sakta

21. Prevalenca ne epidemiologji mat:

- A) numrin e rasteve te nje semundjeje qe ekzistojne ne nje moment te caktuar ne nje popullate
- B) simptomat me te zakonshme te nje semundjeje
- C) semundje me shpeshtesi te madhe
- D) etnocentrizmin dhe trajtimin e nje semundjeje te dhene
- E) grupmoshen me vulnerabilitetin

22. Me fobi nenkuptohet:

- A) nje cregullim i personalitetit
- B) nje cregullim i te menduarit
- C) nje sindrom tipik psikotik
- D) nje cregullim i perceptimit
- E) nje simptom i depresionit

23. Ne trajtimin e nje gjendjeje konfuzionale do te nevojitej:

- A) t'i siguronim pacientit nje presence e vazhdueshme
- B) te mbanim pacientin ne kushte erresire dhe izolimi
- C) te perdornim sasi te madhe sedativesh
- D) te perdornim antidepressive triciklike
- E) te mbanim pacientin zgjuar me cdo menyre

24. Nje gjendje krepuskulare mund te jete pasoje e:

- A) krize epilepsie temporale
- B) insomnie persistente
- C) pakesimit te vizus-it
- D) reaksionit fobik teper te rende
- E) dozave te medha te medikamenteve antidepressive

25. Me depresion te maskuar nenkuptojme:

- A) nje depression me simptoma kompensatore te kunderta me ato depressive (ilaritet)
- B) extra-version
- C) nje depression qe paraqitet me depression te qarte somatic ne mungese te semundjes fizike
- D) nje depression me component te qarte reactive mbi nje strukture neurotike te personalitetit
- E) asnje nga pergjigjet e permendura

26. Cila eshte perqindja e pacienteve onkologjike qe zhvillojne nje episod depresiv?

- A) 10%
- B) 25%
- C) 50%
- D) 80%
- E) 100%

27. Cili eshte tipi i pare i imobilizimit qe perdoret ne pacientin maniakal?

- A) kufizim relacional
- B) farmakologjik
- C) fizik
- D) asnje nga pergjigjet e mesiperme
- E) te gjitha pergjigjet e permendura

28. Ne cilen nga keto disiplina specialistike personeli ndihmes mund te veproje direkt pa nderhyrjen e Mjekut te pergjithshem?

- A) higjena
- B) mjekesi interne
- C) psikiatri
- D) dermatologji
- E) mjekesi ligjore

29. Si quhet nje ankth i forte refraktar dhe i pamotivuar nga rrethanat, veprimet dhe objektet?

- A) frike
- B) fobi
- C) obsesion
- D) pseudo-halucinacion
- E) delirium

30. Medikamentet antidepressive:

- A) veprojnë në membranën e neuroneve pre- dhe post-sinaptike
- B) veprojnë në nivel intraqelizor
- C) lidhen me monoaminat në hapësirën inter-sinaptike
- D) veprojnë si endorfinat
- E) asnjë nga përgjigjet e mësipërme

31. Karbonati i litiumit është medikamenti i zgjedhur në trajtimin e:

- A) komës uremike
- B) atrofisë cerebrale
- C) psikozës maniako-depresive
- D) amebiazës hepatike
- E) ulcërës duodenale

32. Anksitetë tek fëmijet manifestohet:

- A) në psikozë
- B) në neurozë
- C) në crregullimet e stresit post-traumatik
- D) në mungesë të crregullimeve psikiatrike
- E) në të gjitha situatat e përmendura

33. Cili është mekanizmi mbrojtës më i shpeshtë në paranojë?

- A) konversioni
- B) shmangia
- C) projektioni
- D) supresioni
- E) regresioni

34. Me aq më shumë shprehë:

- A) një tremor i pakontrollueshëm
- B) një gjendje e tensionit të fortë emocional
- C) një gjendje shqetësimi psikologjik dhe motor
- D) një gjendje shoqërore e skizofrenisë
- E) një gjendje e shkaktuar nga mania

35. Disa antidepressive quhen triciklike sepse:

- A) përdoren në format ciklike
- B) duhet të administrohen në tre cikle të njëpasnjëshme

- C) nga karakteristikat e strukture kimike
- D) i është dhënë atyre një emër imagjinar
- E) janë zbuluar në ciklin e tretë të periudhës psiko-farmakologjike

36. Delirium tremens:

- A) bëhet fjalë për një manifestim paroksistik të alkoolizmit akut
- B) shoqërohet me polineuropati në anesite e poshtme
- C) shoqërohet me një encefalopati porta-cava
- D) bëhet fjalë për një manifestim paroksistik të alkoolizmit kronik
- E) bëhet fjalë për një sëmundje aktualisht tepër të përhapur

37. Deliri është:

- A) gjithnjë i fragmentuar dhe bizzar
- B) një çrregullim të formës së mendimit
- C) një çrregullim i përmbajtjes së mendimit
- D) gjithnjë i organizuar dhe i mirë-strukturuar
- E) një çrregullim i perceptimit

39. Cili është efekti anesor endokrin më i shpeshtë i medikamenteve anti-psikotike?

- A) hipertiroidizmi
- B) dekompenzioni i diabetit
- C) hypogonadotropizmi
- D) hypopituitarizmi
- E) hiperprolaktinemia

40. Konfabulacioni është një simptom karakteristik për:

- A) gjendjen maniakale
- B) sindromin afazik
- C) sindromin Korsakov
- D) delirin mistik
- E) neurozen obsesive

41. Pavetedija kolektive është formuluar nga:

- A) Jung
- B) Mead
- C) Freud
- D) Kardiner

E) Ey

42. Vuajtja melankolike eshte:

- A) gjithnje e patrajtuar
- B) me intensive gjate pasdites
- C) me intensive gjate nates
- D) ne dite te alturnuara
- E) me intensive gjate mengjesit

43. Me "kujdestari" nenkuptohet:

- A) marrja ne ngarkim totalisht nga ekipi mjekesor i jetes se pacientit
- B) marrja ne ngarkim e pergjegjesise se trajtimit dhe perditimit te strategjise terapeutike
- C) sherimi i pacientit ne nje strukture te mbrojtur
- D) marrja ne ngarkim e problemeve familjare
- E) marrja ne ngarkim e problemeve sociale

44. Heqja e imobilizimit fizik duhet te ndodhe :

- A) ne vijim te nje observacioni infermieristik
- B) pas nje rekomandimi mjekesor
- C) nen indikacionin e koordinatorin
- D) pas nderhyrjes se Drejtorit te Pergjithshem
- E) pas nderhyrjes se gjykatesit

45. Nje mimike diskordante me fjalet dhe rrethanen ne te cilen ndodhet nje person eshte karakteristike e:

- A) histerise
- B) demences
- C) manise
- D) skizofrenise
- E) melankolise

46. Sjelljet obsesive jane:

- A) qendrime te perseritura per te sulmuar personat perreth
- B) halucinacione rekurente auditive me aspekt ritual
- C) stereotipi pa fund
- D) sjellje anormale, rituale te perseritura ne mbrojtje te obsesionit dhe te ankthit
- E) rituale te sjelljes seksuale

47. Abstinenca eshte:

- A) deshire e pakontrollueshme me deshiren e vetme per te konsumuar alkool
- B) nevoja per te shtuar perdorimin e alkoolit per te kenaqur deshiren
- C) shfaqja e tremorit, takikardise, ankthit, djersitjes pas nje periudhe abstinence
- D) nje manifestim i vartesis fizike
- E) nje prurit i gjeneralizuar

48. „Fuga ideorum“ eshte tipike e:

- A) gjendjes se eksitimit maniakal
- B) gjendjes se eksitimit konfuzional
- C) gjendjes melankolike stuporoze
- D) histerise
- E) hemorragjise subaraknoidale

49. Mendimi ne konfuzionin mental eshte:

- A) i kthjellat dhe koherent
- B) inkoherent dhe i fragmentuar
- C) i pershpejtuar por koherent
- D) e invaduar nga idete obsesive
- E) qartesisht delirante

50. Halucinacionet ne skizofreni jane me shume:

- A) auditive
- B) olfaktive
- C) taktile
- D) vizive
- E) cenestezike

51. Cila nga keto semundje mund te induktoje klinike te ngjashme me skizofrenine?

- A) te gjitha te meposhtmet
- B) tumoret cerebrale
- C) infeksionet cerebrale
- D) semundjet degjenerative
- E) epilepsia

52. Medikamentet psikiatrike mund te japin efekte anesore?

- A) gjithnje, pa marre parasysh tipin dhe dozen
- B) pothuajse kurre
- C) jo, por shpesh minimizohen nga pacientet
- D) po
- E) jo

53. Sherbimi i shendetit mendor komunitar:

- A) ka funksionim autonom dhe kontrolli
- B) nuk ndermerr aktivitet terapeutik
- C) ndermerr aktivitet ambulator, ne shtepi dhe te urgjences psikiatrike
- D) merret vetem me aktivitet ambulator
- E) ndermerr detyren e koordinimit me repartet psikiatrike

54. Kujt mund t'i atribuohet shkaku i psikozes konfuzionale?

- A) shkaqeve toksike
- B) nje aspekti reaksional histerik
- C) evolucionit te nje forme depresive
- D) somatizimit te nje gjendjeje te shprehur anksoze
- E) evolucionit te nje forme skizofrenike kronike

55. Perdorimi i mjeteve te imobilizimit fizik eshte i pranueshem:

- A) ne te gjitha rastet nen autoritetin e infermiereve
- B) ne te gjitha rastet nen autoritetin e koordinatorit
- C) ne te gjitha rastet nen rekomandimin mjekesor
- D) kurre
- E) ne asnje nga pergjigjet e permendura

56. Lezionet meningo-encefalice, te marra si shembull pe te demonstruar se semundjet mendore jane shprehje te semundjeve organike te trurit, jane te shkaktuar nga:

- A) sifilizi
- B) lia e dhenve
- C) lepra
- D) arterioskleroza
- E) asnje

57. Ne cilin tip personaliteti takohen instabiliteti afektiv, sjellje te shpeshta autolitike, disforia dhe krizat e instabilitetit dhe terbimit?

- A) borderline
- B) narcistik
- C) kompulsiv
- D) paranoiak
- E) pasiv-agresiv

58. Nje deluzim i mire-organizuar perkufizohet si:

- A) i sistematizuar
- B) i kthjellet
- C) paranoid
- D) sekondar
- E) asnje nga pergjigjet e permendura

59. Autizmi infantil ben pjese ne crregullimet:

- A) pervasive te zhvillimit
- B) e ankthit
- C) te humorit
- D) psikike
- E) te personalitetit

60. Cila nga te meposhtmet nuk eshte nje karakteristike e anoreksise nervoze:

- A) histori e meparshme obeziteti
- B) amenorrea
- C) menjanim social
- D) sjellje auto-ndeshkuese
- E) raport i veshtire me prinderit

61. Cili prej te meposhtmeve eshte tipik per skizofrenise?

- A) perseritja e ideve
- B) fuga e ideve
- C) perceptimi delirant
- D) konfabulacioni
- E) idea obsesive

62. Perjashtimi i personave me probleme te shendetit mendor neper institucione te vecuara nga shoqeria eshte motivuar ne te shkuaren nga:

- A) probleme shendetesore

- B) ndjenja humanitare
- C) problemet sociale
- D) ndjenja religjioze
- E) deshira per sherim

63. Venlafaxina i perket ciles klase te antidepressiveve?

- A) SNRI (serotonine-norepinephrin reuptake inhibitor)
- B) NASSA (noradrenergic and serotonergic specific antidepressiv)
- C) Ticiklike
- D) SSRI (selective serotonine reuptake inhibitor)
- E) NARI (Noradrenaline reuptake inhibitor)

64. Tik-u eshte:

- A) nje levizje koreiforme
- B) nje levizje e pavullnetshme dhe rekurente jo ritmike
- C) nje levizje distonike
- D) nje levizje mioklonike
- E) nje levizje e vullnetshme

65. Si perkufizohet nje teresi idesh te gabuara per shkak te nje alterimi te koshiences nga realiteti?

- A) iluzion
- B) deluzion
- C) gabime gjykimi
- D) dobesi mentale
- E) Mendime te kushtezuara (partikularizem)

66. Si perkufizohet idea qe persiston edhe pse subjekti deshiron ta eleminoje ate?

- A) ide obsesive
- B) ide prevalente
- C) ide te vecanta
- D) ide inkoherente
- E) ide delirante

67. Ne anoreksine nervore takohet:

- A) Amenorrea
- B) frika per t'u shendoshur
- C) te vjella te auto-induktuara
- D) reduktim i konsumimit te ushqimit

E) te gjitha pergjigjet e permendura

68. Forma me e shpeshte e “demences” sekondare eshte ajo e induktuar nga:

- A) leukodistrofia cerebrale
- B) panencefaliti subakut sklerotizant
- C) reduktimi difuz senil i parenkimes cerebrale
- D) demtimi encefalik nga arteriopatia kronike
- E) semundja Wilson

69. Cfare nenkupton rehabilitimi psikosocial?

- A) trajnimi per ekzekutimin korrekt te detyrave praktike
- B) zgjidhja e simptomave produktive
- C) fitimi i cilesive komportamentale me theks te vecante ndaj aftesive relacionale e te socializimit
- D) zgjidhja e simptomave negative
- E) te gjitha pergjigjet e mesiperme

70. Ne paranoje takohet:

- A) deluzioni i sistematizuar
- B) asnje deluzion
- C) nje perzierje e deluzioneve te sistemuar me ato konfuze
- D) deluzioni i merzitjes
- E) deluzioni i varferise

71. Kufiri i maksimal i pademshem i konsumimit te pijeve alkoolike eshte:

- A) 40 gr/dite per meshkujt dhe 20 gr/dite per femrat
- B) 20 gr/dite per meshkujt dhe 10 gr/dite per femrat
- C) 50 gr/dite per meshkujt dhe 30 gr/dite per femrat
- D) 80 gr/dite per meshkujt dhe 60 gr/dite per femrat
- E) 100 gr/dite per meshkujt dhe 80 gr/dite per femrat

72. Per sa kohe mund te qendroje nje pacient i shtruar jashte vullnetit te tij ne nje institucion psikiatrik me vendim vetem te mjekeve:

- A) deri sa te permiresohet dhe te jape miratimin
- B) 24 ore
- C) 72 ore
- D) aq sa i duhet gjendjes shendetesore
- E) 3 muaj

73. Cfare eshte terapia familjare?

- A) eshte nje psikoterapi qe nderhyn ne komunikimin e familjes, e kuptuar si “sistem” qe ka si objektiv ndryshimin e modeleve te komunikimit
- B) eshte nje terapi qe nisat nga presupozimi se pergjegjesia e vuajtjes eshte e familjareve dhe jo e pacienteve
- C) eshte nje terapi qe propozon, si objektiv integrimin e pacientit ne nje shtepi familjare
- D) eshte nje tip i terapise psikoanalitike
- E) eshte nje forme e terapise qe shoqeron terapine relacionale me ate psikoanalitike

74. Karakteri i pacientit:

- A) eshte nje parameter i ekzaminimit psikik
- B) influencon ne vleresimin psikik
- C) varion sipas klases shoqerore
- D) eshte i lidhur vetem me te veshurin
- E) asnje nga pergjigjete e mesiperme

75. Si do te duhej te ishte permanenca e nje te shtruarit ne strukture rezidenciale?

- A) me kohezgjatje te shkurter dhe per te perballuar periudhen e krizes
- B) me afat te pacaktuar dhe e drejtuar ne realizimin e objektivave te riintegrimit shoqeror
- C) me afat te pacaktuar me qellim mbrojtjen e pacientit nga presionet e mjedisit
- D) me afat te pacaktuar per problemet e asistences
- E) asnje nga pergjigjet e mesiperme

76. Nje fobi eshte:

- A) nje simptom ankthi qe manifestohet duke nisur nga adoleshenca
- B) ankthi klinikisht i rendesishem e provokuar nga ekspozimi ndaj nje objekti apo nje rrethane te caktuar
- C) nje levizje perseritese qe shoqerohet me ankth
- D) impulsi per te evituar nje objekt qe shkakton ankth
- E) bindja e pajustificuar qe eshte kontaminuar nga nje semundje

77. Impulset patologjike jane:

- A) impulset agresive te drejtuar nga shkaterrimi i te gjitha objekteve rrethuese
- B) impulset masturbuese
- C) reaksionet ankzioze me tendence shmangien
- D) impulset e tipit obsesiv kontradiktor

E) impulset me sfond mistik te bazuar ne bashkepunimin me hyjnite

78. Trajtimi shendetesor i detyrueshem eshte nje vendim :

- A) i leshuar nga kryetari i bashkise mbi bazen e certifikimeve medikale
- B) i leshuar nga nje mjek territori
- C) i leshuar nga nje mjek territori dhe nga nje mjek tjeter spitalor
- D) i leshuar nga kryetari i bashkise
- E) i leshuar nga gjykatesi

79. Gjate nje nje bashkebesedimi me pacientin psikiatrik duhet :

- A) te analizohen pyetjet
- B) te privilegjohet komunikimi direkt
- C) te sigurohet gjithnje pacienti
- D) te mbahet distance
- E) te gjykohe pacienti

80. Cili nga me poshte eshte efekti anesor me i shpeshte i antidepressive triciklike ?

- A) shtimi ne peshe
- B) crregullime te ciklit kardiak
- C) reduktimi i pragut konvulsiv
- D) efekte muskarinike (tharje mukozale, retension urinar)
- E) te gjitha pergjigjet e mesiperme

81. Crregullimet e personalitetit:

- A) jane crregullime me alterime te shprehura te sjelljes
- B) jane te koduar ne aksin II te ICD-10
- C) jane crregullime te sferes psikotike
- D) jane gjithnje te shoqeruara nga crregullime te perceptimit
- E) asnje nga pergjigjet e mesiperme

82. Mania eshte:

- A) crregullim i te menduarit
- B) nje forme skizofrenie
- C) nje crregullim i humorit
- D) nje qendrim provokator i pacientit
- E) nje crregullim i perceptimit

83. Kufizimi Fizik mund te kryhet:

- A) vetem nga policia
- B) i rekomanduar nga nje mjek ose infermier
- C) vetem ne kushte spitalore
- D) nga familjaret
- E) asnje nga te mesipermet

84. Vonesa mendore eshte:

- A) nje situate disavantazhi socio-kulturor
- B) nje dobesim intelektual mbi baze emotive
- C) nje reduktim i rendesishem i eficiences intelektuale me crregullime te sjelljes adaptive
- D) nje semundje gjenetike
- E) nje situate e frenimit intelektual

85. Depresioni eshte:

- A) nje crregullim i humorit
- B) nje crregullim ekskluziv i natyres psikotike
- C) nje alterim i gjendjes se koshiences
- D) nje rritje e tonusit te humorit
- E) nje crregullim i perceptimit

86. Cila nga gjendjet e meposhtme eshte e karakterizuar nga dizorientimi temporo-spaciale?

- A) gjendja krepuskulare
- B) alienizimi
- C) crregullimi deluzional
- D) neuroze obsesive kompulsive
- E) asnje nga pergjigjet e permendura

87. Cili nga organet e meposhtme rezulton lehtesisht me i prekuri nga proceset psikosomatike?

- A) colon
- B) veshi i mesem
- C) veshkat
- D) hepari
- E) testikuli

