

I.MJEKESIA LIGJORE (Nr.1-45)

II. ETIKA & DEONTOLOGJIA MJEKËSORE (Nr.46-53)

1. Për qëllime anatomopatologjike dhe mjekoligjore, asnjë kufomë nuk mund të nënshtrohet kryerjes së autopsisë pakaluar të paktën :

- A) 4 orë nga vdekja
- B) 6 orë nga vdekja
- C) 12 orë nga vdekja
- D) 18 orë nga vdekja
- E) 24 orë nga vdekja

2. Cila nga shënjat e mëposhtme është patognomonike në vërtetimin e saktë dhe me vlerë ligjore të instalimit të vdekjes biologjike:

- A) Humbja e ndërgjegjies
- B) Ndalimi I frymëmarrjes dhe të qarkullimit të gjakut
- C) Shfaqja e njollave hipostazike
- D) Paraliza ndjesore dhe motore
- E) Humbja e refleksit corneal

3. Kush ka të drejtë të plotesojë një **skedë vdekjeje**, në rast të një vdekje natyrore :

- A) Vetëm mjeku ligjor
- B) Vetëm mjeku kurues
- C) Vetëm mjeku anatomopatolog
- D) Çdo mjek I zakonshëm
- E) Vetëm mjeku I familjes

4. Në plagët e shkaktuara nga armët e zjarrit, vrima e hyrjes ndryshon nga vrima e daljes :

- A) Paraqet gjithmonë një rreth dërmishtjeje
- B) Ka diametër të barabartë me kalibrin e predhës(plumbit)
- C) Paraqet përmasa më të mëdha
- D) Ka gjithmonë pamjen e një ylli

5. Forma e ekimozës :

- A) Riprodhon gjithmonë në mënyrë të saktë sipërfaqjen e mjetit goditës
- B) Tregon intensitetin e forcës goditëse
- C) Varet nga mosha e të dëmtuarit

- D) Varet nga struktura e veçantë anatomike e regjionit dhe sasisë së gjakut të derdhur.
- E) Varet nga seksi I të dëmtuarit

6. Njollat kufomore :

- A) Gjenden gjithmonë vetëm në pjesët e poshtme të trupit
- B) Janë tregues të një vdekje nga dhuna
- C) Paraqesin gjithmonë të njëjtën ngjyrë
- D) Janë gjithmonë të domozdoshme për të kuptuar shkakun e vdekjes
- E) Janë shënjë e sigurtë e vdekjes biologjike

7. Asnjë personel mjekësor nuk mund ti nënshtrohet një ndjekje penale, në se veprimi ose mosveprimi i tij në dëm të pacientëve nuk është i parashikuar në :

- A) Kodin e Punës
- B) Kodin Deontologjik
- C) Kodin Penal
- D) Kodin Civil

8. Shenjat e **menjëhershme** të vdekjes konsiderohen :

- A) Njollat kufomore
- B) Zbehja dhe humbja e elasticitetit të lëkurës.
- C) Shtangësia kufomore
- D) Ftohja kufomore

9. Të ashtëquajturat “ **plagë mbrojtëse** “, janë karakteristike :

- A) Për vrasjet.
- B) Për vetvrasjet.
- C) Për aksidentet.
- D) Për rastet fatkeqe

10. Plaga **prerëse** karakterizohet nga :

- A) Buzë të rregullta.
- B) Kënde të gjera.
- C) Mbizotërim i thellësisë ndaj përmasave të gjatësisë.
- D) Buzët të kontuzionuara

11. Kufoma dekompozohet më shpejtë kur qëndron :

- A) Në mjedis të jashtëm në sipërfaqen e tokës.
- B) I groposur nën tokë.
- C) I zhytur në ujë.
- D) Lundron në sipërfaqen e ujit

12. Në rastet e vdekjeve të dhunëshme, “**Skeda e Vdekjes**” plotësohet nga :

- A) Mjeku i familjes.
- B) Mjeku i poliklinikës.
- C) Mjeku ligjor.
- D) Prokurori.

13. Zhvillimi i “**proçesit të sapunifikimit**” të një kufome të varrosur ndodh në mjedise :

- A) Tokë me aciditet të lartë.
- B) Tokë moçalore.
- C) Tokë argjilore.
- D) Tokë rënore

14. Të ashtëquajturat “ **plagë hezituese** “, janë karakteristike :

- A) Për vrasjet
- B) Për vetvrasje
- C) Për aksidentet.
- D) Për rastet fatkeqe

15. Fraktura e kubesë së kafkes në trajtën e “ **pëlhures së merimangës**” është karakteristike në :

- A) Goditje me mjet të fortë
- B) Rrezimet prej së larti
- C) Goditje me mjet çarës.
- D) Qitjet me armë zjarri

16. Vrime e daljes në qitjet me armë zjarri në largësi, karakterizohet :

- A) *Permasa të mëdha të plagës.
- B) Depozitim i faktoreve plotësues të qitjes.
- C) Prania e brezit të fshirjes .

D) Buzët e plagës janë të përveshura nga brënda

17. Eashtuquajtura “ **lekura e pates** “ është shenjë karakteristike që shihet në sipërfaqen e lëkurës së kufomës :

- A) Në rastin e varrjes në litar
- B) Në rastin e djegjes nga zjarri (djegiet)
- C) Në rastin e mbytjes në lëngje
- D) Në rastin e elektrotraumës

18. Vepra penale e mjekimit të pakujdesshëm ka për bazë :

- A) Gabimin mjekësor.
- B) Vetëbesimin e tepruar mjekësor.
- C) Fatkeqsinë mjekësore.
- D) Jatrogjenitë.

19. Një kufomë e mbytur në një mjedis ujor(liqen, det) ka mundësi të dalë në sipërfaqje me shpejt kur është :

- A) Një konstrukt trupor i dhjamosur,
- B) Një konstrukt trupor i dobët,
- C) Një konstrukt trupor mesatar ?
- D) Një trup fëmije

20. Prova materiale biologjike eshte :

- A) Pështyma .
- B) Predha
- C) Gjurmët e gishtërinjve.
- D) Teshat.

21. Sa duhet të jetë përqëndrimi i karboksihemoglobinës në gjak (helmimet nga oksidi karbonit) që të japë vdekje :

- A) deri ne 10%,
- B) deri 20%,
- C) deri 30%,
- D) deri 40% ?

22. Asifiksia mekanike nga varrja haset në praktikë si rast :

- A) Vrasjeje
- B) Vetëvrasjeje
- C) Aksidentale

D) Fatkeqësi

23. “Maska ekimotike “ nëfytyrë shkaktohet nga traumat :

- A) Mekanike
- B) Kimike,
- C) Termike
- D) Asfiktike

24. Brazda e strangulacionit në qafën e viktimës në varrjet gjendet :

- A) Në nivelin e mollës së Adamit
- B) Sipër këtij niveli
- C) Poshtë këtij niveli
- D) Asnjera

25. Flokët (qimet) merren si mostra për të përcaktuar llojin e helmit në rastet e helmimeve me :

- A) Fostoksinë.
- B) Arsenik.
- C) Oksid karboni.
- D) Cianide.

26. E ashtuqujtura “ Lafsha hemoragjike “ është shenjë karakteristike e :

- A) Mbytjes me duar
- B) Mbytjes me lak
- C) Varjes
- D) Mbytja në lëngje

27. Shenja e figurës së **Lichtenbergut** është karakteristike në vdekjet nga :

- A) Helmimet.
- B) Rrufeja.
- C) Mbytja në lëngjet
- D) Hipotermia

28. Ngjyra e kuqe e çelur e lëkurës së një kufome të helmuar është karakteristike për helmimet nga :

- A) Heroina
- B) Oksidi karbonit
- C) Fostoksina
- D) Zhiva

29. Në varrjen e plotë, fytyra e viktimës paraqitet :

- A) E zbehtë me pika hemoragjike,
- B) E mavijosur
- C) E zbehtë
- D) E mavijosur me pika hemoragjike ?

30. E ashtuquajtura shenjë e “ çorapeve dhe dorezave te vdekjes” është karakteristike në vdekjet nga :

- A) Elektriciteti
- B) Mbytja në lëngjet
- C) Helmimi
- D) Rrufeja
- E) Djegja

31. Konsiderohen helmet të gazta që merren me anën e frymëmarrjes :

- A) Fostoksina
- B) Arseniku
- C) Parationi
- D) Mërkuri

32. Termi “**bumper fracture**”, në rastet e aksidenteve automobilistike është shenjë patognomonike në :

- A) Thyerje të eshtrave të kokës.
- B) Thyerje të brinjëve .
- C) Thyerje të eshtrave të gjymtyrëve të sipërm .
- D) Thyerje të eshtrave të gjymtyrëve të poshtëm

33. Në rastet e vdekjeve të dhunëshme, “Skeda e Vdekjes” plotësohet nga:

- A) Mjeku i familjes.
- B) Mjeku i poliklinikes.
- C) Mjeku ligjor.
- D) Prokurori.

34. “Maska ekimotike” e shkaktuar nga shtrëngimi i qafës krijohet nga shtypja :

- A) Vetëm e arterieve
- B) Vetëm e venave
- C) Arterieve dhe venave njëkohësisht
- D) Tubit të frymëmarrjes

35. Brazda e strangulacionit në qafë në rastin e varrjes është :

- A) Gjysëm rrethore vertikale
- B) Gjysëm rrethore horizontale
- C) Gjysëm rrethore oblike
- D) Rrethore e plotë

36. Sindroma e ashtuquajtur “Vdekja blu” shihet në rastet e vdekjeve nga :

- A) Rrufeja
- B) Hipotermia
- C) Mbytja në lëngje
- D) Hipertermia

37. Diatomet (planktomet) janë të rëndësishme për të përcaktuar shkakun e vdekjes në rastet :

- A) E hipotermisë
- B) Të mbytjes në lëngje
- C) E helmimit
- D) Djegjes ?

38. Përcaktohet si plagosje e lehte, humbja e aftësisë së përkohshme në punë :

- A) Deri në 9 ditë.
- B) Deri në 3 ditë
- C) Mbi 9 ditë
- D) Mbi 19 ditë

39. E ashtuquajtura “ Pozë e boksjerit në mbrojtje” është shenjë karakteristike në vdekjet nga :

- A) Rrufeja
- B) Mbytja në lëngje
- C) Djegja
- D) Helmimi
- E) Droga

40. Dukuria e “ metalizimit “ në lëkurë është karakteristike në :

- A) Traumat mekanike
- B) Traumat kimike
- C) Traumat elektrike

D) Traumat asfiktike

41. Nga pikëvështrimi demografik, në një skedë vdekje, cila nga të dhënat e më poshtme është më e rëndësishme për të vlerësuar vërtetësinë e mekanizmit të ardhjes së vdekjes :

- A) Shkaku përfundimtar I vdekjes
- B) Shkaku I ndërmjetëm I vdekjes
- C) Shkaku fillestar I vdekjes
- D) Vendi I vdekjes
- E) Moshë e pacientit

42. Cila është detyra më parësore e një mjeku që kryen një autopsi mjekoligjore :

- A) Të leshojë skedën e vdekjes
- B) Të kryejë procedurën konservuese mbi kufomën
- C) Të marrë pjesë në kqyrjen e kufomës në vendin e ngjarjes
- D) Të përcaktojë shkaktuesin e vdekjes
- E) Të përcaktojë natyrën juridike të vdekjes

43. Tretja e plotë e përmbajtjes së stomakut si një e dhënë e rëndësishme në përcaktimin e kohës së vdekjes duke u orjentuar nga vakti i një ngrënie mesatare më të fundit para se personi të ketë vdekur ndodh :

- A) Pas 2-3 orëve
- B) Pas 4-6 orëve
- C) Pas 10-12 orëve
- D) Pas 24 orëve

44. Bazuar në nenin nr.8 të ligjit “Për autopsitë” autopsia e një kufome duhet të kryhet :

- A) Menjëherë pas vdekjes
- B) 2 orë pas vdekjes
- C) 8 orë pas vdekjes
- D) 12 orë pas vdekjes
- E) 24 orë pas vdekjes

45. Cila është pjesa më e rëndësishme e aktit mjekoligjor :

- A) Hyrja
- B) Përshkrimi
- C) Diskutimi mjekoligjor
- D) Konkluzioni

46. Kodi I ri i Etkës dhe Deontologjisë Mjekësore është miratuar :

- A) Në vitin 1998
- B) Në vitin 2002
- C) Në vitin 2007
- D) Në vitin 1994
- E) Në vitin 2010

47. Miratimi nga Kuvendi I Shqipërisë për krijimin e Urdhërit të Mjekut është bërë :

- A) Në vitin 1996
- B) Në vitin 2000
- C) Në vitin 2005
- D) Në vitin 2008
- E) Në vitin 1994

48. Etika Mjekësore është shkenca që studion :

- A) Zbatimin e rregullave të protokolleve klinike të trajtimit të pacientit
- B) Zbatimin e rregullave mjekësore të parandalimit të sëmundjeve
- C) Parimet dhe normat e moralit mjekësor
- D) Normat ligjore penale në fushën e mjekësisë.

49. Në cilin dokument ndërkombëtar përcaktohen kriteret lidhur me të Drejtat e Pacientit :

- A) Në Deklaratën e Manilës
- B) Në Deklaratën e Helsinkit
- C) Në Deklaratën e Lisbonës
- D) Në Deklaratën e Tokios

50. Pakujdesia mjekësore e mjekut në trajtimin e pacientit ka për bazë :

- A) Paaftësinë profesionale
- B) Mungesën e etikës së sjelljes
- C) Infrastrukturën mjekësore të pamjaftueshme
- D) Vetëbesimin e tepruar
- E) Mungesën e inisiativës

51. Në cilin rast personeli mjekësor duhet të rruajë sekretin mjekësor të pacientit ndaj opinionit publik:

- A) Në sëmundjet psikike

- B) Në sëmundjet tumorale
- C) Në sëmundjet infektive
- D) Në gravidancat ekstrauterine jashtëmartesore
- E) Në sëmundjet e rënda dhe të pakurueshme

52. Cila konsiderohet vdekje biologjike :

- A) Vdekja klinike
- B) Vdekja cerebrale
- C) Vdekja letargjike
- D) Vdekja celulare

53. Në ç'vënd dhe kur është kryer operacioni i parë transplantiv I zemrës:

- A) Në Sh.B.A në vitin 1965
- B) Në Angli në vitin 1970
- C) Në Afrikën e Jugut në vitin 1967
- D) Në Japoni në vitin 1971
- E) Në Francë në vitin 1969

KIRURGJIA E PERGJITHSHME

1. Nje grua 42 vjecare shtrohet ne urgjence me nje dhimbje te forta barku, te vjella, me distension abdominal dhe me arrest te feceve me gaz. Anamneza eshte pergjithesisht normale pervec nje operacioni qe ka bere 12 vjet me pare. Behet radiografi direktee abdomenit ne kembe edhe vihen re hidronivele ne zorren e holle. Cfare tip bllokimi intestinal mund te jete?

- A) Adenokarcinome
- B) Morbus Crohn
- C) Sdaderenciale
- D) Ileus biliar
- E) Kolit ulceroz

2. Nje pacient operohet sepse dyshohet per apendisit akut. Gjate operacionit vihet re se apendiksi edhe ciekum jane normal. Ne Ileusin terminal vihet re nje pjese prej 30cm e skuqur, edematoze dhe e trashur me rreshqitje te dhjemit mesenterial mbi ileus, e cila te ben te dyshosh per Morbus Crohn. Nuk vihet re dilatim I zorres rreth zones se interesuar. Pjesa tjeter e zorres se holle duket normale. Terapia kirurgjikale e preferuar eshte:

- A) Mbyllje e abdomenit
- B) Apendicektomi profilaktike
- C) Ileostomi e traktit te interesuar
- D) Ileo trasversostomi latero-laterale
- E) Emikolektomi dx

3. Trajtimi I metastazave epatike eshte I mundur vetem kur:
- A) Tumori primitiv eshte <3 cm
 - B) Numri I metastazave eshte <2
 - C) Madhesia e metastazave nuk kalon 3 cm
 - D) Te gjitha pergjigjet me siper
 - E) Asnje nga pergjigjet me siper
4. Cfare ekzaminimi eshte me I keshilluar per te pare nje insulinome?
- A) Splenoportografia
 - B) Kolangiografia retrograde
 - C) Ekografia
 - D) Arteriografia selective
 - E) Shintigrafia
5. Linfonodi Sentinella :
- A) Ai qe zbulohet I pari gjate vizites se pacientit
 - B) Eshte me afer tumorit
 - C) Eshte metastaze
 - D) Eshte noduli I pare ku drenohet linfa peritumorale
 - E) Asnje nga pergjigjet me siper
6. Quhet hernie interne:
- A) Dislokimi abnormal I omentumit ne reces natural ose neoformacione te hapesires peritoneale
 - B) Dislokimi abnormal I nje ose me shume organeve ne reces natural ose neoformacione te hapesires peritoneale
 - C) Prezenca e hernies ne stad inicial
 - D) Prezenca e nje laparocеле ne stad inicial
 - E) Asnje nga pergjigjet me siper
7. Mbas te ngrerit, ne nje pacient qe ka pesuar nje rezeksion te stomakut shfaqet ipersudoracion, ndjesi nxehtesie, nausea, lipotimi dhe cefale ,duhet te mendojme per:
- A) Pankreatit akut
 - B) Sd. Dumping
 - C) Stenoze pilorike
 - D) Degjeneracion neoplastik
 - E) Ulcer

8. Sistemi anastomik portal perfshin te gjitha venat e meposhtme, pervec:
- A) Gastrika sinistra
 - B) Paraombelikale
 - C) Renale sinistra
 - D) Hemorroidale superior
 - E) Mesenterika inferior
9. Pankreatiti akut duhet te trajtohet me kirurgji :
- A) Ne te gjitha rastet
 - B) Ne rast nekroze
 - C) Ne rast iperamilasemie persistente
 - D) Ne rast nekroze te infektuar
 - E) Kur P.C.R eshte mbi 20
10. Nje pacient 60 vjec shfaq ne kohe kolle edhe temperature te crregullt, jo sh te larte. Ekzaminimi I pare qe duhet bere per te vendosur nje diagnose eshte:
- A) Radiografi toraksit
 - B) Citologjia e esektoratit
 - C) Tine test
 - D) Bronkoskopi
 - E) Emokromi
11. Lobi I Spigelios ose lobi caudate I heparit korrispondon me:
- A) Segmentin e I
 - B) Segmentin e II
 - C) Segmentin e VI
 - D) Segmentin e VII
 - E) Asnje nga pergjigjet me siper
12. Arteria emorroidale superior eshte dege e :
- A) Arteries pudenda
 - B) Arteries ipogastrika
 - C) Arteries iliaka sinistra
 - D) Arteries sigmoidale
 - E) Arteries mesenterika inferior
13. Ne frakturen e colum femorit arti prezantohet klinikisht:
- A) I rrotulluar nga jashte edhe I shkurtuar

- B) I rrotulluar nga jashte edhe I zgjatur
- C) I rrotulluar nga Brenda edhe I zgjatur
- D) I rrotulluar nga Brenda edhe I shkurtuar
- E) I drejte edhe I zgjatur

14. Cili nga faktoret me poshte predisponon lindjen e neoplazise te colon-rectumit?

- A) Tymi I cigares
- B) Diabeti
- C) Alkoli
- D) Genet
- E) Ipertensionimi portal

15. Cili prej ekzaminimeve me poshte eshte me I pershtatcem per diagnozen e kolecistitit akut?

- A) Ekografia
- B) TC
- C) Radiografia e abdomenit
- D) Kolnagiografia retrograde
- E) Gastroskopia

16. Cili prej ekzaminimeve me poshte eshte me I pershtatcem per diagnozen e neoplazise te bronkut principal te pulmonit:

- A) Radiografia standarte e toraksit
- B) Shintigrafia pulmonare
- C) Stratigrafia
- D) Bronkoskopia
- E) Bronkografia

17. Nga cfare shkaktohet Sd. Iperparatiroidizmit primar ne 90% te rasteve?

- A) Adenoma multiple
- B) Adenoma solitare
- C) Iperplazia difuze
- D) Ipertrofia difuze
- E) Adenokarcinoma

18. Cili prej ekzaminimeve me poshte eshte me I pershtatcem per diagnozen e Bronkektazise?

- A) Radiografia standarte

- B) Shintigrafia pulmonare
- C) Stratigrafia
- D) Bronkoskopia
- E) Bronkografia

19. Cili prej ekzaminimeve me poshte eshte me I pershtatcem per diagnozen e kancerit gastric:

- A) RX digjестive
- B) Esofagogastroskopia me biopsi
- C) TC
- D) Citologji I lengut te stomakut
- E) Ekografi

20. Dilatimi I pleksit pampiniform shkakton:

- A) Spermatocele
- B) Idrocele
- C) Varikocele
- D) Cistocele
- E) Mielocele

21. Te gjitha karakteristikat obiektime te identifikuara gjate eksplorimit dixhital te rectumit ne kancerin e prostatës jane te verteta pervec:

- A) Humbja e simetrise se gjendres
- B) Konservimi I sulcus median interlobar
- C) Mungesa e rrjedhshmerise se planeve persiper
- D) Kufijte jot e definuara
- E) Rritje konsistences

22. Gangrene gasoze eshte e shkaktuar me shpesh nga:

- A) S. epidermidis
- B) S. aureus
- C) E.coli
- D) C.perfringens
- E) P.mirabilis

23. Ligatura e venes spermatike eshte e keshilluar per kurimin e:

- A) Induratio penis plastic (semundja e Peyronie)
- B) Torsionit te funikulit
- C) Varikoceles
- D) Kriptokidizmit

E) Idroceles komunikante

24. Simptoma me e shpeshte e Kolangiokarcinomes eshte:

- A) Disfagia
- B) Kostipacion
- C) Ikter
- D) Rritje e peshes
- E) Diare

25. Te gjitha semundjet me poshte shkaktojne litiazi te vezikes urinare, pervec:

- A) Ipertrofise prostatas
- B) Skleroze e colum vezikale
- C) Stenoze uretrale
- D) Vezika neurologjike
- E) Prostatit akut

26. 48 ore mbas nje torsioni te testikutit kush prej alternativave me poshte futet ne diagnoza diferenciale?

- A) Idrocela
- B) Seminoma
- C) Epididimit tuberkolar
- D) Orkiepiditimit akut aspecific
- E) Hernia inguino-skrotal

27. Cila prej manovrave me poshte jep dhimbje ne rast kolecistiti?

- A) Murphy
- B) Blumberg
- C) Giordano
- D) Mc burney
- E) Te gjitha pergjigjet me siper

28. Cili eshte ekzaminimi I zgjedhur per studimin e neoplazive retroperitoneale?

- A) Urografia
- B) CT
- C) Aortografia
- D) Retropneumoperitoneo
- E) Klizma opake

29. Simptoma me frekuente ne karcinomen e colonit eshte:

- A) Dispepsia
- B) Dhimbje anale
- C) Dhimbje barku
- D) Retorragji
- E) Kostipacion

30. Te gjitha semundjet me poshte mund te jene shkak per nje gjinekomasti sekondare, pervec:

- A) Tumor I testikutit
- B) Cirroze epatike
- C) Insuficience renale kronike
- D) Tumoret kortiko-surenale
- E) Malnutricion

31. Te gjitha shenjat me poshte te rreshtuara jane prezente ne insuficencen celiako-

mezenterike kronike, pervec:

- A) Dhimbjes post-prandiale
- B) Malabsorbimit
- C) Renja ne peshe
- D) Tension abdominal
- E) Melenes

32. Arterite e Hortonit paraprihet me shpesh nga:

- A) Artroza lombosakrale
- B) Poliartrite skapolo-omerale
- C) Artrite reumatoide
- D) Polimiosite
- E) Epikondilite

33. Te gjitha simptomat me poshte jane karakteristike te infiamacionit te esofagut nga

refluksi,pervec:

- A) Dhimbje interskapolare
- B) Dhimbje ne pozicion supin
- C) Disfagia
- D) Gjak okult ne fece
- E) Emotisi

34. Sindroma Peutz-Jeghers karakterizohet nga:
- A) Ulceracione multiple te mukozes te tubit digjent, kalkoloze biliare edhe splenomegali
 - B) Iperpigmentacione muko-kutane edhe ematoma te kanalit digjektiv
 - C) Ascit, tumor I orofaringsit edhe ipogonadizem
 - D) Alopecia edhe angi displazia e colonit
 - E) Ipertension nefro-vaskolare edhe esofagit nga refluksi
35. Te gjitha frazat me poshte jane te sakta per pneumoperitoneon pervec:
- A) Eshte I shkaktuar nga prezenca e gazit te lire ne kavitetin peritoneal
 - B) Vihet re gati gjithmone mbas nje perforimi te organeve te brendshme ne kavitetin abdominal
 - C) Mund te shkaktohet nga laparoscopia
 - D) Shoqerohet me zhdukjen e aies otuze te heparit
 - E) Tenezem
36. Nje grua 24 vjec I nenshtrohet nje interventi me laparoscopi eksplorative sepse dyshohej per apendisit. Gjate operacionit behet diagnoza e nje perforimi te nje divertikuli, ka dhene inflamacion I cili shtrihet deri ne cekum pa shenja peritoniti. Trajtimi eshte:
- A) RezekSION e ileusit terminal edhe e colonit ashendent me ileostomi
 - B) RezekSION e ileusit terminal dhe e colonit ashendent me anastomoze ileokolike primare ne nje kohe
 - C) Emikolektomia dekstra
 - D) Drenim I absesit edhe apendicektomia
 - E) Mbyllja e abdomenit edhe trajtim me antibiotike
37. Te gjitha frazat me poshte per Sd. Mallory-Weiss jane te sakta, pervec:
- A) Ematemeza mund te verifikohet pa episode te vjellash precedente
 - B) Laceracioni eshte nje I vetem, linear edhe I lokalizuar ne ezofagun distal
 - C) Ezofagoskopia eshte e domosdoshme per diagnose
 - D) Studimi me Bario nga goja eshte metoda me e mire per te bere diagnozen
 - E) Infuzioni intra-arterial I vazopresines controllon hemorragjine
38. Rrjedhjet e enzimeve nga nekroza e pankreatitit akut diagnostikohen me:
- A) Radiografia e tubit digjent
 - B) Shintigrafia pankreatike
 - C) Arteriografia e tripodit celiac
 - D) CT abdomen
 - E) RX abdomen

39. Kush prej patologjive me poshte I bashkangjitet idrotoraksit?
- A) Komprimimi venoz brachio-cefalik
 - B) Komprimimi mbi venen azigos
 - C) Komprimimi ne nivel te venes azigos
 - D) Komprimim nen venen azigos
 - E) Varice esofageale
40. Trajtimi imediat I pneumotoraksit hipertensiv jo traumatik konsiston ne:
- A) Torakotomi
 - B) Intubim
 - C) Drenim pleures
 - D) Terapi me antibiotike
 - E) Pushim absolute ne krevat
41. Nje grua 70 vjec prezanton nje kuader klinik I cili perputhet me obstrukcion te zorreve te holla. Pacientja nuk eshte operuar kurre por vuan prej shume kohesh nga nje kolelitiaze te cilen nuk e ka trajtuar. Cili prej ekzaminimeve me poshte duhet bere per te vene diagnozen?
- A) Klizem opak
 - B) Arteriografia
 - C) Kolangiografia transeptike
 - D) Radiografia abdomenit pa kontrast
 - E) Ekografi e katit abdominal superior te djathte
42. Te gjitha opsionet me poshte jane indikacione per laparoskopine ne urgjence, pervec :
- A) Ruptures se kistit te ovarit
 - B) Kolecistiti akut
 - C) Perforimit intestinal
 - D) Ileusit mekanik post-aderencial
 - E) Peritonitit te gjeneralizuar me shok septic
43. Nje kirurg I pergjithshem viziton nje pacient 45 vjec me gjendje te pergjishme te mire por me pak gjakderdhje rektale. Gjate rektoskopise vihet re nje polip me diameter 2cm, me siperfaqe te lemuar I cili ndodhet 8cm nga margina anale. Biopsia e marre tregon se eshte nje adenoma viloze. Cfare do te bej kirurgu?
- A) Duhet te bej ne menyre immediate rezeksion-anastomoze te rektumit anteriorisht

- B) Do e koaguloj lezionin me endoskopi
- C) Do te bej nje sigmoidoskopi fleksibel
- D) Do te bej nje klizem opake
- E) Do e mbaj pacientin ne vezhgim te vazhdueshem edhe do marri biopsi periodikisht

44. Cila prej frazave me poshte eshte e sakte :

- A) Lokalizimi me I shpeshte I M. Crohn eshte rektumi
- B) Incidence e karcinomes eshte me e larte ne M.Crohn sesa ne retokolitin ulceroz
- C) Emorragjia rektale eshte me e shpeshte ne retokolitin ulceroz sesa ne M.Crohn
- D) Fistulat jane me te shpeshta ne retokolitin ulceroz sesa ne M.Crohn
- E) Stenoizat intestinale jane me pak frekuate M.Crohn sesa ne retokolitin ulceroz

45. Kush jane simptomat me komune ne kancerin e veshikes urinare ?

- A) Infeksionet rikorente edhe persistente
- B) Inkontinenca urinare
- C) Hematuria
- D) Polakiuria
- E) Disuria

46. Per hernien krurale, te gjitha frazat me poshte jane te sakta pervec :

- A) Eshte thjeshtesisht e reduktueshme
- B) Eshte me e shpeshte tek femrat
- C) Ka nje incidence te larte per strangulim
- D) Ne te djathte mund te permbaj apendiksin
- E) Eshte e lokalizuar nen legamentin inguinal

47. Ne rast diagnose prenatale te nje veshke multicistik , duhet bere :

- A) Kontroll ekografik te shtatzanise edhe lindje me operacion
- B) Kontroll ekografik te shtatzanise edhe lindje premature me operacion
- C) Kontroll ekografik te shtatzanise edhe lindje spontane
- D) Kontroll ekografik te shtatzanise edhe operacion ne muajin e shtate
- E) Kontroll ekografik te shtatzanise edhe induksion per nje lindje spontane sapo te kete arritur maturimin pulmoni

48. Ne rast apendisiti akut nje tushe rectal edhe/ose nje vizite vaginale e dhimbshme tregon :

- A) Piosalpingit
- B) Fistul reto-vaginale
- C) Cistit
- D) Peritonit andopelvik
- E) Divertikulum Meckel

49. Te gjitha simptomat edhe shenjat poshte te rreshtuara bejne pjese ne kliniken e enteritit segmental ose Morbus Crohn, pervec :

- A) Kostipacion
- B) Temperature
- C) Diare ematike
- D) Diare me gjak ne fece
- E) Te vjella

50. Cilin ekzaminim perdorim per te matur presionin endoluminal te ezofagut ?

- A) Ezofagoskopia
- B) Phmetria
- C) Manometria
- D) Sonda gastrike
- E) Ezofagografia

51. Manovra e Trousseau (dora e obstetrit) eshte tipike e kujt prej semundjeve me poshte ?

- A) Hipogonadizem
- B) Hiperparatiroidizem
- C) Hipertiroidizem
- D) Hipotiroidizem
- E) Hipoparatiroidizem

52. Nje pacient 70 vjec, I semur me karcinome epidermoide centro-parenkimale te pulmonit ne kondita normale :

- A) Duhet te bej radioterapi
- B) Duhet te bej terapi citostatike edhe kobalt
- C) Mund te bej rezeksion te pulmonit
- D) Duhet te bej cdo terapi pervec asaj kirurgjikale
- E) Duhet te bej cikle imunoterapie

53. Cila prej valutimeve te meposhtme ka prioritet ne pacientin me politraume :

- A) Niveli I koshiences

- B) Frymemarrja
- C) Kontrolli I rrugeve te frymemarrjes
- D) Kontroll I aktivitetit kardiocirkulator
- E) Kontroll I presionit arterioz

54. Ne pneumotoraksin hipertensiv te gjitha frazat me poshte jane te paverteta, pervec :

- A) Shoqerohet me hipertension arterioz
- B) Ka nevojte per dekomprimim te menjehershem
- C) Shoqerohet me hipertension arterioz
- D) Shkaktohet nga versamenti pleurik
- E) Ka nevojte per vendosjen e nje sonde nazo-gastrike

55. Karcinoma e gjirit ne T2 eshte:

- A) Me e madhe se 1 cm, por me e vogel se 2.5 cm
- B) Me e madhe se 2 cm, por me e vogel se 3.1 cm
- C) Me e madhe se 2 cm, por me e vogel se 5.1 cm
- D) Midis 3 edhe 5cm
- E) Midis 3 edhe 6cm

56. Te gjitha frazat me poshte jane shenja te reaksionit gjate nje emotrasfuzioni, pervec :

- A) Temperature
- B) Emolize
- C) Ortikarie
- D) Hiperkalcemi
- E) Hipokalcemi

57. Konsiderohet indikacion per trapiant te heparit tek te rriturit :

- A) Epatosteatoze akute gjate shtatezanise
- B) Cirroze biliare primitive
- C) Kolangite sklerozante
- D) Te gjitha pergjigjet
- E) Asnje nga pergjigjet

58. Konsiderohet kunderindikacion per kateterizimin venoz central:

- A) Enfizema polmonare
- B) Pneumotoraksi
- C) Linfadenopatia sopraklaveare
- D) Te gjitha pergjigjet

E) Asnje nga pergjigjet

59. Kush nga pergjigjet me poshte eshte shkaku me frekuent ne ikterin obstruktiv :

- A) Komprimimi ab estrinsek
- B) Lezione iatrogene
- C) Neoplazi epatike
- D) Neoplazi e kokes se pankreasit
- E) Infiamacion e rrugeve biliare

60. Ne cfare zone ndodh me shpesh kanceri i gjirit :

- A) Mbi areole
- B) Nen areole
- C) Ne kuadrantin superior ekstern
- D) Ne kudrantin superior intern
- E) Ne kuadrantin inferior ekstern

61. Te gjitha manifestimet me poshte mund te jene komplikacione te divertikulit te Meckelit, pervec :

- A) Introfleksioni edhe invaginacioni
- B) Sekrecion I acidit klorhidrik
- C) Obstruksion I zorres se holle
- D) Hemorragjia e perforimi
- E) Pankreatiti akut hemorragjik

62. Cili prej organeve te meposhtme demtohet me shpesh ne traumat e mbyllura abdominal :

- A) Hepar
- B) Shpretka
- C) Stomaku
- D) Vezika urinare
- E) Pankreasi

63. Ekzaminimi qe I duhet bere nje pacienti qe dyshohet per karcinome te ezofagut eshte :

- A) RX me barium
- B) Skanet toraksit
- C) Skaner i abdomen superior
- D) Ezofagoskopia
- E) Studim I motilitetit ezofageal

64. Shenja klinike kryesore e semundjes Hashimoto eshte :
- A) Hipertiroidizmi
 - B) Gusha
 - C) Keratokonjuktivit i thate
 - D) Artralgjia
 - E) Ekzoftalmia
65. Ne nje pacient me obstrukcion te kolecistes, koledoku :
- A) Nuk eshte asnjehere I shtrire?
 - B) Rralle eshte I shtrire
 - C) Eshte shpesh I shtrire
 - D) Nuk eshte asnjehere I palpueshem
 - E) Asnjera nga pergjigjet me siper
66. Nje grua 42 vjec me ipertiroidizem edhe tumefacion te qafes, diagnoza me e mundshme eshte :
- A) Tiroiditi Hashimoto
 - B) Semundja e Graves
 - C) Semundja e Plummer
 - D) Carcinoma papilifera
 - E) Adenoma folikolare
67. Nje arterit Horton jo I trajtuar mund te evoluoj ne :
- A) Emboli pulmonare
 - B) Humbje e shikimit bilateral permanent
 - C) Tromboze e arteries temporale superficial
 - D) Shurdhim koklear
 - E) Kriza te forta edhe te perseritura ten je cefale temporal
68. Cili eshte ilaci kryesor ne trajtimin neoadjuvant te karcinomes se rektumit ?
- A) Mitomicina-C
 - B) 5-fluoruracili
 - C) Adriamicina
 - D) VP-16
 - E) Asnje nga pergjigjet me siper nuk eshte e vertete

69. Nje pacient 85 vjec, vjen ne spital me dhimbje te forta barku te cilat shtrihen ne te gjitha kuadrantet, eshte I axhituar, ka diarre, temperature edhe ndjesi te vjelli. Abdomeni eshte I bute,pak I dhimbshem, nuk preken masa abdominale dhe ka peristaltike. Eshte e qarte prezenca e nje mosperputhjeje midis gjendjes klinike te pacientit edhe ekzaminimit te abdomenit. Kemi nje leukocitoze 20.000, LDH-GOT-GTP –gamma GT te rritura, acidoze metabolike. Diagnoza eshte :

- A) Okluzion intestinal
- B) Aneurizem e aortes ne faze rupture
- C) Pankreatit akut
- D) Infarktintestinal
- E) Kolitinflamator

70. Cili prej organeve me poshte merret nga nje donator kadaver multiorgan per transplant :

- A) Gonadet
- B) Mbiveshkorja
- C) Veshka
- D) Shpretka
- E) Medula spinale

71. Cila pre frazave me poshte eshte e vertete :

- A) Intervetet kirurgjikale 'te pastra' nuk kane nevoje per profilaksi me antibiotike
- B) Intervetet kirurgjikale gjate te cilit duhet te vendoset nje proteze kane nevoje per profilaksi me antibiotike
- C) Antibiotiket e perdorur per profilaksi ndaj infeksioneve kirurgjikale duhet te kene arritur nje perqendrim tisutal efikas ne momentin e incizionit kutan
- D) Antibiotiket e perdorur per profilaksi duhet te jepen vetem 6-24 ore mbas operacionit
- E) Te gjitha pergjigjet jane te verteta

72. Trajtimi I pneumotoraksit ipertensiv eshte :

- A) Torakotomia eksplorative
- B) I jepet vetem oksigjen
- C) Mbahet nen vezhgim
- D) Drenim ne aspirim
- E) Intubim

73. Vena spermatike dekstra derdhet ne :

- A) Venen kava

- B) Venen renale
- C) Venen iliaca komunis
- D) Venen iliaca eksterne
- E) Venen pudenda interne

74. Ne nje pacienti me veshtiresi ne gelltitje per shkak te nje neoplazie azofageale, elementi me I rendesishem per ekzaminim e tij eshte :

- A) Ne nivelin e stenozes
- B) Ulcerimi I lezionit
- C) Kohezgjatja e veshtiresise ne gelltitje
- D) Ezofagoscopia me biopsi
- E) Ezofagografia

75. Nje pacient me retorragji diskrete mbas daljes jashte, me defekim te veshtire edhe te dhimbshem e tenezem rektal . Cili prej ekzaminimeve te meposhtme eshte I keshillueshem ne kete rast?

- A) Nje tushe rektale digitale dhe nje ano-retoskopi
- B) Pankolonoskopi
- C) Klizem opak me dubel kontrast
- D) Analize kimike edhe parasitologjike te feceve
- E) Gjak okult ne fece

76. Ne megakolonin toksik duhet :

- A) Nje nderhyrje imediate
- B) Nje nderhyrje urgjente mbas stabilizimit te ekuilibrit elektroliteve
- C) Vetem stabilizimi I ekulibrit elektrolit
- D) Trajtimi me kemioterapi edhe elektrolite
- E) Te stabilizojme gjendjen e pacientit perpara operimit

77. Cili prej tumoreve te traktit intestinal me poshte eshte me I shpeshti ne moshat e reja ?

- A) Linfosarkoma
- B) Karcinoidi
- C) Carcinoma e kolonit
- D) Neuroblastoma
- E) Rabdomiosarkoma

78. CVL –ja nuk duhet bere kur ka :

- A) Obezitet
- B) Intervente kirurgjikale te meparshme

- C) Hernie epigastrike te zmadhuar
- D) Asnjera nga pergjigjet
- E) Te gjitha pergjigjet

79. Kush zone e zorres perforohet me shpesh per shkak te stenozes te sigmes ?

- A) Ne colonin desendent
- B) Ne fleksuren lienale
- C) Ne cekum
- D) Ne sigma
- E) Ne kolon transvers

80. Dimensionet e nje karcinome te gjirit ne T2 jane :

- A) >1 cm, por <2.5
- B) >2 cm, por <3.1
- C) >2 cm, por <5.1
- D) Midis 3 dhe 5 cm
- E) Midis 3 dhe 6 cm

81. Konsiderohet komplikance teknike e ushqyerjes parenterale totale (NPT) :

- A) Pneumotoraksi
- B) Pozicionimi I keq I kateterit
- C) Shpimi I arteries suklavia
- D) Pneumotoraksi, pozicionimi I keq I kateterit, shpimi I arteries suklavia
- E) Asnjera nga pergjigjet me siper

82. Nje pacient 60 vjec me dhimbje barku te menjehershme ne fosa iliake sinister, temperature, leukocitoze, kontraktim i abdomenit ne zonen initiale te dhimbjes si edhe arrest te zorreve. Diagnoza eshte :

- A) Apendisit akut
- B) Kolecistit akut
- C) Perforacion I divertikulit ne sigem
- D) Tumor I cekumit
- E) Kolik renale sinister

83. Kush eshte trajtimi I “zgjedhur” per polipozen intestinale familiare ?

- A) Mbajtja ne vezhgim te vazhdueshem te pacientit
- B) Rezekcion segmentar e pjeses se zorres se interesuar
- C) Kolektomia totale
- D) Bypass intestinal
- E) Kolonoskopi periodike

84. Trajtimi I “ zgjedhur “ I fibroadenomes se gjirit eshte :
- A) Kuadrantektomia
 - B) Mastektomia
 - C) Mastektomia totale
 - D) Heqja e tumorit
 - E) Radioterapia
85. Cili prej shenjave edhe simptomave te meposhtme eshte patognomonike e perforimi te tubit gastro-intestinal?
- A) Leukocitoza
 - B) Kontraktimi I muskulatures abdominale
 - C) Zhdukja e matitetit te heparit
 - D) Shtim I frekuences kardiake
 - E) Temperatura
86. Metastazat ne kancerin e prostatës shfaqen me shpesh ne :
- A) Kockat e bacinit edhe vertebrat e fundit lumbare
 - B) Hepar
 - C) Tru
 - D) Pulmon
 - E) Ne asnje nga vendet me siper
87. Ne nje pacient 70 vjec, me gjendje te pergjithshme shendetesore te mire, zbulohet nje aneurizem I aortes abdominale 7 cm nen veshke asimptomatik. Faza e pare e terapise eshte:
- A) Nderhyrja vetem nqs do te shfaqen simptoma
 - B) Eliminim I aneurizmes
 - C) Jepen qetesues edhe presim
 - D) Kufizim total I aktivitetit fizik
 - E) Terapi antiipertensive
88. Te gjitha indikacionet per transplantin e heparit me poshte jane te verteta, pervec :
- A) Morbus Wilson
 - B) Ciroza biliare primare
 - C) Kolangit sklerozant
 - D) Metastaza epatike
 - E) Ciroze alkoholike

89. Si behet nje mediastinoskopia?

- A) Trans-orale
- B) Nga laringu
- C) Trans-cutane
- D) Trans- diafragmatike
- E) Trans-ezofageale

90. Nje femije me veshtiresi ne frymemarrje diagnostikohet me :

- A) Gjak komplet
- B) Emogaz
- C) Ekzaminim I espektoratit
- D) Elektrokardiogram
- E) RX toraksit

91. Nje paciente 76 vjec ka veshtiresi ne gellitjen e ushqimeve te forta prej disa javesh, jane te mundshme keto diagnoza, pervec :

- A) Divertikuj ne ezofag
- B) Refluks gastro-ezofageal
- C) Tumor I ezofagut
- D) Parkinson
- E) Divertikul I Meckel

92. Nje pacient me polipoze familjare te kolonit I eksportojme nje polip. Polipi mund te jete :

- A) Adenome viloz
- B) Polip iperplastik
- C) Polip adenomatoz
- D) Polip ritencional
- E) Pseudopolip

93. Ne te gjitha zonat e mepostme mund te vihen re kalcifikime ne rezultatet radiologjike, pervec :

- A) Fshikeza e urines
- B) Ileusi renal
- C) Divertikuli I Meckel
- D) Aneurizma aortes
- E) Rruget biliare intraepatike

94. Pankreatiti akut shoqerohet me :

- A) Inflamacion te ezofagut nga refluksi
- B) Gur ne kolecist
- C) Divertikulit
- D) Ulcer gastrike
- E) Kolangitis sklerozant

95. Si pasoje e nje traume te mbyllur, nje krah I pacientit prezantohet me ngjyre te zbehte edhe I ftohte. Terapia me vazodilatator nuk permireson gjendjen klinike. Diagnoza me e mundshme eshte :

- A) Hematome pulsante
- B) Hematome intramurale
- C) Aneurizem post-traumatike
- D) Fistul atero-venoze
- E) Tromboze venoze profunde

96. Konsiderohet pike e dhimbshme e apendiksit :

- A) Pika Mc Burney
- B) Pika Morris
- C) Pika Munro
- D) Pika Lanz
- E) Te gjitha pergjigjet me siper

97. Ne nje pacient me ikter, kruarje, dhimbje ne ipokondrin e djathte edhe dispepsi, cili eshte ekzaminimi qe duhet bere I pari?

- A) Kolecistografia orale
- B) Kolangiografia intravenoze
- C) Kolangio rezonca manjetike nukleare
- D) Rx abdomen
- E) Ekografia epat-bilio-pankreatike, e ndjekur nga nje kolangio-pankreatografi retrograde endoskopike

98. Mukocela e apendiksit cekal eshte:

- A) Nje tumor malinj
- B) Nje cist
- C) Nje tumor beninj
- D) Nje patologji me baze allergjike
- E) Nje patologji infektive

99. Te gjitha semundjet me poshte mund te shkaktone nje infarkt venoz mezenterik, pervec :

- A) Ipertensionimi portal
- B) Tumoret pankreasit
- C) Kontraceptivet oral
- D) Sd. Boerhaave
- E) Troboflebitet

100. Nga cfare karakterizohet Sd. Mallory-Weiss?

- A) Rupture e ezofagut
- B) Stenoze e ezofagut
- C) Akalazi edhe divertikuj te ezofagut
- D) Spazem difuze e ezofagut
- E) Fisure ne mukozen e ezofagut

101. Hernia inguinale direkte eshte :

- A) Nje hernie e cila del medialisht vazave epigastrike
- B) Nje hernie e cila del lateralisht vazave epigastrike
- C) Nje hernie e cila del poshte legamentit inguinal
- D) Nje hernie qe tejkalon kanalin obturator
- E) Nje hernie qe tejkalon kanalin inguinal intern

102. Shkaku kryesor i fistules digjestivo-biliare eshte :

- A) Ulcera gastrike ose duodenale
- B) Karcinome ne kolon transvers
- C) Ekinokok i heparit
- D) Kalkuloze biliare
- E) Karcinome e stomakut

103. Subjektet me risk te larte per shfaqjen e karcinomes se anusit jane:

- A) Semundje inflamatore intestinale kronike
- B) Polipe adenomatoze te colonit
- C) Familjaritet per kancerin e anusit
- D) Kondilomatosis
- E) Hemorroidet

104. Ekzaminimet e bera per te diagnostikuar nje okluzion intestinal jane:

- A) Ekografi abdomenit
- B) Radiografi direkte e abdomenit
- C) Skaner

- D) Laparoscopi
- E) Asnje nga pergjigjet me siper

105. Terapia kirurgjikale e kardias eshte e orientuar drejt:

- A) Ezofagotomise parciale
- B) Kardiomotomise ekstramukoze
- C) Bypass it gastro-ezofageal
- D) Vendosja e nje proteze ne nje te treten inferiore te ezofagut
- E) Ezofagotomia totale

106. Cila prej shenjave me poshte shfaqet me shpesh ne kancerin e fshikzez urinare?

- A) Recidive e Cistopielitit
- B) Retension urinar akut
- C) Gjak ne urine
- D) Urinim I shpeshte
- E) Dhimbje gjate urinimit

107. Nje burre 72 vjec vjen ne spital me ipotension, dhimbje te forta ne kurriz. Gjate

ekzminimit te abdomenit vihet re nje mase qe pulson. Diagnoza eshte :

- A) Infarkt intestinal
- B) Aneurizem e aortes se disekuar
- C) Rupture ose fisurim e aneurizmes te aortes abdominale
- D) Sd. Leriche
- E) Aneurizem e arteries epatike

108. Gastrinoma lokalizohet me shpesh ne :

- A) Antrum
- B) Duoden
- C) Pankreas
- D) Shpretka
- E) Koleciste

109. Mikrorganizmi shkaktar I kolitit pseudomembranoz eshte :

- A) C. perfringens
- B) B. fragilis
- C) C. difficile
- D) E. coli
- E) C. tetani

110. Perforim diastazik eshte nje perforim I cili ndodh per shkak te nje segmenti intestinal te bllokuar. Ne rastin e nje stenoze neoplastike te sigmes kush eshte zona ne te cilen me shpesh ndodh ky perforim?

- A) Kolon descendent
- B) Sigma
- C) Kolon transvers
- D) Cekumi
- E) Fleksura lienale

111. Ne diagnostifikimin e apendisitit akut eshte e rendesishme:

- A) Ekografia abdominale
- B) Skaneri
- C) Rx e aparatit digjerent
- D) Klizma opake
- E) Anamneza edhe vizita

112. Cili prej ekzaminimeve me poshte eshte me I dobishem ne diagnozen e neoplazise periferike te pulmonit?

- A) Radiografia toraksit
- B) Shintigrafia pulmonare
- C) Skaneri
- D) Bronkografi
- E) Bronkoskopi

113. Ne cilat prej neoplazive te meposhtme ,rezeksioni I metastazave hepatike mund te permiresoje prognozen e tyre:

- A) Kolon
- B) Gjiri
- C) Stomaku
- D) Ovari
- E) Prostata

114. Arteria mesenterike inferior ushqen :

- A) Kolon sinister edhe nje pjese te rektumit
- B) Zorren e holle
- C) Colonin e djathte
- D) Kanal in anal
- E) Ampulen rektale te poshtme

115. Cili eshte funksioni I sfinkterit ezofageal inferior?
- A) Te pengoje refluksin e materialit gastrik ne ezofag
 - B) Te ngadalsoj kalimin e ushqimit
 - C) Te pershpetoj kalimin e ushqimit
 - D) Te stimuloj gogesimen
 - E) I bent e gjitha funksionet me siper
116. Ne nje pacient me kolika biliare te shpeshta kemi rruge biliare te dilatuara por nuk vihen re gure. Kjo eshte klinika e :
- A) Tumorit te kokes se pankreasit
 - B) Kolangitis sklerozant
 - C) Stenoze nga infiamacioni I papiles Vater
 - D) Atoni e rrugeve biliare kryesore
 - E) Ciroze biliare dytesore
117. Per diagnostifikimin e feokromocitomes behen te gjitha ekzaminimet e meposhtme pervec :
- A) Rezonanca manjetike
 - B) Skaneri
 - C) Aortografia
 - D) Flebografia retrograde
 - E) Pielografia asendente
118. Shenja e Troisier tregon:
- A) Ashit neoplastik
 - B) Metastaze te tumorit te ovarit
 - C) Metastaze limfonodale supraklaveolare
 - D) Nje ipokalcemi mbas rezeksionit te stomakut
 - E) Shenje qe I paraprin nje ashiti
119. Tumori I Klatskin eshte :
- A) Tumor malinj I rrugeve biliare intraepatike
 - B) Tumor malinj I duktuseve hepatike te djathte edhe te majte
 - C) Tumor malinj I kokes se pankreasit
 - D) Tumor malinj te bishtit te pankreasit
 - E) Asnje prej pergjigjeve

120. Ne rast se nje tromboflebit migrant eshte rezistent ndaj terapise me antikoagulante dyshohet per:

- A) Ulcer gastrike
- B) Karcinome te pankreasit
- C) Ciroze biliare
- D) Kolecistit kalkuloz
- E) Perforacion i kolonit

121. Trajtimi kirurgjikal per nje neoplazi te colonit ascendent eshte:

- A) Emikolektomia dekstra
- B) Emikolektomia sinister
- C) RezekSION ileo-cekal
- D) RezekSION segmentit
- E) Kolektomi subtotale

122. Ne nje pacient me kancer te bronkeve, me ekzaminim te sputumit edhe bronkoskopi negative. Per te vene diagnozen citologjike duhet:

- A) Agoaspirat
- B) Skaner
- C) Stratigrafi
- D) Shintigrafi
- E) Bronkografia

123. Per te lokalizuar saktesisht vendodhjen e gurit ne rastin e nje bllokimi te segmentit pielo-ureteral, cili eshte ekzaminimi qe duhet bere?

- A) Urografia intravenoze
- B) Skaner
- C) Shintigrafi renale
- D) Radiografi direkte e abdomenit
- E) Pielografia ascendente

124. Te gjitha semundjet me poshte mund te jene pasoje e mungeses se mbylljes se urakusit, pervec :

- A) Fistula urinoze umbelikale
- B) Gure ne duktus
- C) Ciste ose absese
- D) Neoplazi
- E) "caput medusa"

125. Angina abdominis karakterizohet nga:

- A) Neoplazia e colonit
- B) Hemorragjia intestinale
- C) Divertikulit
- D) Ishemi kronike intestinale
- E) Ulcera peptike post-anastomizimit

126. Cili eshte karcinoma me frekuente e tiroides?

- A) Papilare
- B) Medulare
- C) Folikulare
- D) Anaplastike
- E) Hemiangiosarkoma

127. Hemorragjia rektale quhet ndryshe:

- A) Ematemeza
- B) Melene
- C) Proktorragji
- D) Enterorragji
- E) Menorragji

128. Cili prej ekzaminimeve me poshte ben te mundur nje diagnoze diferenciale midis

akalazise kardiake edhe kancerit te ezofagut?

- A) Mediastinoskopia
- B) Ezofagoskopia me biopsi
- C) Ezofagografia
- D) Manometria ezofageale
- E) Phmetria

129. Per diagnostifikimin e refluksit gastro-ezofageal :

- A) EGDS (ezofagogastroduodenoskopia)
- B) Manometria
- C) PHmetria
- D) Rx toraksit
- E) Rx me barium

130. Cili nga parametrat me poshte eshte percaktues I prognozes tek nje pacient me refluks veziko-ureteral:

- A) Nefropati nga refluksi
- B) Moshë

- C) Gjenetika
- D) Frekuenca e infeksioneve urinare 12 muajt e fundit
- E) Perhapja e patologjise ne te dy anet

131. Torakotomia ne urgjence eshte e keshilluar ne rast :

- A) Kontuzioni pulmonar
- B) Versament bilateral I pleures
- C) Hemotoraksi
- D) Pneumotoraks
- E) Empiema

132. Akalazia eshte :

- A) Nje alterim motor i karakterizuar vetem nga mungesa e relaksimit te sfinkterit inferior te ezofagut
- B) Nje alterim motor I karakterizuar nga mungesa e relaksimit te sfinkterit superior te ezofagut
- C) *Nje alterim motor I karakterizuar nga mungesa e relaksimit te sfinkterit inferior te ezofagut, arrest total ose moskordinim I peristaltikes edhe dilatacion I ezofagut
- D) Nje alterim motor I karakterizuar nga mungesa e relaksimit te sfinkterit superior te ezofagut, arrest total ose moskordinim I peristaltikes edhe dilatacion I ezofagut
- E) Asnjera nga alternativat me siper

133. BCili eshte kuptimi i Xenotrapiantit?

- A) Transplantim mes te afermeve
- B) Transplantim mes njerezve te sekseve te kunderta
- C) Transplantim mes njerezve te racave te ndryshme
- D) Transplatim mes specieve te ndryshme
- E) Transplatim te organeve artificiale

134. Vendi me i zakonshem i ulceres gastrike eshte:

- A) Fundus I stomakut
- B) Antrum
- C) Kurvatura manja
- D) Kurvatura minor
- E) Cardias

135. Ne nje pacienteje me rrjedhje hematike te thithes , eshte e nevojshme:

- A) ekografi mamarie
- B) duktogalaktografia
- C) mamografi
- D) agoaspirim i lezionit
- E) asnjera nga pergjigjet me lart

136. Sa cm nga valvula ileo-cekale ndodhet me shpesh divertikuli i Meckel :

- A) 40 cm
- B) 10 cm
- C) 80 cm
- D) 1 m
- E) 1,5 m

137. Ne cilen neoplazi te testikutit ka rritje te b-HCG?

- A) sertolioma
- B) seminoma
- C) coriocarcinoma
- D) leydigioma
- E) carcinoma anaplastike

138. Ne trombozen venose te gjymtyreve te poshtme, pozitiviteti i shenjese Homan

perfaqesohet nga:

- A) zgjerim i venave siperfaqesore te kembes
- B) hemorragji ne inde
- C) hipersensibilitet ne te ftohte
- D) dhimbje e pulpes gjate fleksionit
- E) mungese e pulsit femoral

139. Trajtimi i nje neoplasie te heparit, e limitur ne njerin nga lobet eshte:

- A) radioterapia dhe kemioterapia
- B) vetem kemioterapia
- C) vetem radioterapia
- D) kemioterapi endoarteriose
- E) hepatektomi e ndjekur nga kemioterapi

140. Lidhja e venes spermatike perdoret ne rast te :

- A) varikocele
- B) rritje i numrit te venave te funikul

- C) ne stazin venose te testikunit
- D) orkite
- E) inflamacion te epididimit

141. Ne prezence te nje opaciteti ne mushkerite e nje 40 vjecari eshte e nevojshme:

- A) te fillohet nje terapi me antibiotik
- B) te nderhyet sa me shpejt ne menyre kirurgjikale
- C) te behet diagnoza e sakte perpare se te filloj terapia
- D) te zhvillohet nje cikel kemioterapie antituberkulare
- E) te gjitha pergjigjet me siper

142. Nje trup i huaj ne brendesi te bronkeve:

- A) mund te trajtohet me terapi konservative
- B) duhet hequr me endoskopi
- C) duhet hequr ne menyre kirurgjikale
- D) duhet hequr me endoskopi vetem nese eshte i mpreht
- E) duhet hequr ne menyre kirurgjikale vetem nese eshte i mprehte

143. VRritja e fonise vokale gjate perkusionit verehet ne rastine:

- A) empiemes pleurike
- B) versament i pleures
- C) pneumotoraksit
- D) rritje e densitetit te parenkimes se pulmonit me bronke te bllokuara
- E) enfisemes pulmonare

144. Te gjitha pergjigjet me poshte jane simptoma tipike te tumorit te rektumit pervec:

- A) dhimbje hiperperistaltike ne fosen iliake te djathte
- B) alterim i kostipacionit me diarene
- C) tenezem
- D) sekrecion
- E) kostipacion

145. Dhimbje abdominale, rritje peristaltikes, te vjella dhe arrest i zorres me fece dhe gaz jane karakteristike te :

- A) arrest te zorreve
- B) peritonit
- C) pankreatit
- D) kolecistit

E) te gjitha pergjigjet me siper

146. Te gjitha tumoret me poshte mund te japin sindrome te Cushing paraneoplastike, pervec:

- A) tumori i timusit
- B) tumori i pankreasit
- C) tumori i kockes
- D) tumori i kolonit
- E) tumori i ovareve

147. Nje miokard i demtuar mund te shkoj drejt fibrilacionit atrial ose arrestit kardiak ne te gjitha situatat e meposhtme pervec:

- A) aspirimit endotrakeal
- B) intubimit naso-gastrik
- C) te vjelles
- D) stimulimit vagal
- E) matjes se presionit arterioz

148. Karcinoma kolorektale e trasheguar jo polipoide (sindroma Linch I) karakterizohet nga:

- A) trashegimi autosomale dominuese
- B) prevalence e kancerit te kolonit proksimal
- C) mosha e re
- D) te gjitha pergjigjet jane te sakta
- E) te gjitha pergjigjet jane te gabuara

149. Cila nga patologjite me poshte mund te jene shkaku kryesor i nje tromboflebiti migrator, rezistent ndaj terapise antikoagulante?

- A) kanceri i pankreasit
- B) cirroza ekolecistes
- C) sindroma e Mallory-Weiss
- D) kolecistit akut
- E) ulcer e perforuar

150. Cfare nuk perfshihet ne simptomat tipike te mostretjes?

- A) kostipacion
- B) tension epigastrik mbas te ngrenit
- C) djegie
- D) gogesime
- E) piroza

151. Ne paciente e prekur nga divertikuj ezofageal, ezofagoskopia eshte:

- A) e keshillueshme
- B) te evitohet
- C) e nevojshme
- D) te praktikohet me kujdes mbas radiografise
- E) c. i domosdoshem

152. Nje mashkull 48 vjec ka nje mase te bute ne testikul. Skrotumi eshte skuqur. Kemi temperature dhe pus ne urine. Diagnoza eshte:

- A) hernie
- B) tuberkuloz i epididimisit?
- C) neoplazi e testikutit
- D) d.epididimit akut
- E) prostatit

153. Te gjitha pergjigjet me poshte jane komplikime teolecistitit aket, pervec:

- A) pankreatit
- B) peritonit
- C) fistul ne kolecist
- D) perforim
- E) tromboflebit migrator

154. Femer 90 vjec me nje neoplazi me diameter 3 cm, e lokalizuar ne kuadrantin e jashtem te gjirit se djathte, pa metastaza. Pacientia ka nje shendet te mire, eshte autonome dhe jeton me familjen. TerapiaNqe duhet ndjekur eshte:

- A) nuk operohet
- B) mastektomi radikale duke ruajtur muskujt pektoral
- C) mastektomi radikale duke ruajtur muskujt pektoral dhe nje linfoadenektomi aksilare
- D) heqje e tumorit me anestesi lokale
- E) mastektomi nen lekure

155. Semundja e Riedel e tiroides eshte:

- A) nje adenome
- B) iperplazi e thjeshte e tiroides
- C) nje neoplazi
- D) nje cist i komplikuar i tiroides
- E) nje semundje inflamatore kronike

156. Cila nga pergjigjet me poshte mund te jete shkak i ileumit paralitik:

- A) morbus Crohn
- B) volvus i sigmes
- C) hiperkalemi
- D) ileus biliar
- E) neoplazi e rektumit

157. Seminoma e testikut:

- A) eshte tumori me i rralle testikular
- B) rritet shpejt
- C) metastazon ne kocke
- D) te gjitha pergjigjet jane te sakta
- E) te gjitha pergjigjet jane te gabuara

158. Ne nje pacient te moshuar te gjitha me poshte jane kushte per lindjen e nje plage deкупituese, pervec:

- A) kequshqyerjes
- B) qendrimi ne shtrat
- C) diabeti
- D) vaskulopatia
- E) trashegimi

159. Cilin test do i benin nje pacienti me hematemesis?

- A) bronkoskopi
- B) rx te traktit tretes
- C) esofago-gastro-duodeno-skopi
- D) rx i adomit
- E) klizem opak

160. Sindroma e Pancoast eshte patologji e:

- A) stomakut
- B) bazes se pulmonit
- C) C.apeksit te pulmonit
- D) gjendres mbiveshkore
- E) veshkes

161. Rezekcioni abdomino-perineal sipas Miles jep:

- A) proktokolektomia totale me anastomoze ileo-anale me cistektomi

- B) amputim i rektumit, anusit, sfinkterit anal dhe kolonostomia definitive
- C) rezeksion anterior i ulur, anastomoze rektale dhe kolonostomi provizore mbrojtese
- D) prokto-kolectomi totale me ileostomi definitive
- E) asnjera nga pergjigjet me siper

163. Tiroidektomia totale keshillohet ne rast :

- A) Strume multinodular
- B) Ca midolar
- C) Ca folicolar
- D) Asnje nga keto patologji
- E) Te gjitha keto patologji

164. Ne trajtimin e kancerit te esofagut, te gjitha trajtimet e meposhtme gjejne

- A) Esofagektomia totale
- B) Radioterapi
- C) By-pass me ANSA te Roux
- D) Aplikim i endoprotezes
- E) Gastrostomia

165. Ne rast te nje linfogranulomi malinj, cili eshte ekzaminimi qe perdoret per te vene diagnozen:

- A) Skaneri
- B) Ekografia
- C) Biopsi limfonodulit
- D) Linfografi
- E) Rezonance manjetike

166. Megakoloni toksik mund te jete evoluimi klinik i :

- A) Polipozes difuze te kolonit
- B) Divertikuli kronik i kolonit
- C) Megakolon i lindur
- D) Retokolit ulcerativ
- E) Tumor i kolonit

167. Ne pacientet ne te cilet eshte kryer nje splenektomi eshte gjetur qe jane:

- A) Me rezistente ndaj infeksioneve
- B) Me te ndjeshem ndaj infeksioneve te vazhdushme
- C) Prodhues te nje nr me te madh antikorpesh
- D) Shfaqin eozinofili

E) Asnjera nga pergjigjet me siper

168. Cfare hiqet ne mastektomine radikale:

- A) Gjiri
- B) Gjiri dhe muskuli pektoralis major
- C) Gjiri dhe muskujt pektoralis major dhe minor
- D) Gjiri dhe limfonodulat aksilar
- E) Gjiri, muskujt pektoralis major dhe minor dhe limfonodulat aksilar

169. Nga sa shtresa te bashkuara eshte i perbere muri i nje kisti I ekinokokut?

- A) Dy
- B) Tre
- C) Pese
- D) Dy ose tre, sipas vendodhjes se cistit
- E) Asnje nga pergjigjet me siper nuk eshte e sakte

170. Ne rastin e traumes se veshkes, cila nga shenjat me poshte eshte indikator per nderhyrje kirurgjikale:

- A) Hematuri
- B) Enjtje dhe mavijosje anash
- C) Dalja jashte vazave te kontrastit gjate urografise
- D) Hipertension arterios
- E) Hidronefroze

171. Te gjitha pergjigjet me poshte mund te jene shkak i nje gjakderdhjeje te fshehur ne aparatn tretes, pervec:

- A) Angiodisplazia kolike
- B) Divertikuloze e kolonit
- C) Retokolit ulcerativ
- D) Karcinoma cekumit
- E) Koloni i irrituar

172. Nje pacient 80 vjec, vuan nga bronkopatia kronike obstruktive, kardiopati konxhestive, tromboflebit ne gjymtyret e poshtme si edhe raporton shfaqjen e nje hernieje inguinokrotale, e cila e bezdis gjate aktiviteteteve te jetes se perditshme. Cfare terapie duhet te ndjekim?

- A) Keshillohet venja e nje brezi hernial
- B) Asnje trajtim
- C) I keshillohet plastike e hernies me proteze, (anestesi lokale)
- D) Terapia kirurgjikale keshillohet vetem ne rast te komplikimit te hernies

E) Hernioplastike

173. Volvusi eshte:

- A) Torsion I aksit te nje segmenti te zorres se holle rreth vetes ose rreth mezenterit I cili shkakton nje bllokim proksimal te lumenit
- B) Torsion I aksit te nje segmenti te colonit rreth vetes ose rreth mezenterit I cili shkakton nje bllokim proksimal te lumenit
- C) Torsion I aksit te nje segmenti te zorres se holle rreth vetes ose rreth mezenterit I cili shkakton nje bllokim distal te lumenit
- D) Torsion I aksit te nje segmenti te zorres se holle ose te colonit rreth vetes ose rreth mezenterit I cili shkakton nje bllokim proksimal e distal te lumenit
- E) Asnje prej pergjigjeve me siper

174. Cili nga keto tumore te tiroides eshte me shpesh i lidhur me neoplasi te tjera endokrine:

- A) Adenoma folikulare
- B) Karcinoma medulare
- C) Karcinoma folikulare
- D) Karcinoma papilare
- E) Asnjera nga pergjigjet me siper

175. Cili nga ekzaminimet meposhte duhet bere kur dyshohet per gur ne temth?

- A) Radiografi te traktit te siperme te tretjes
- B) Manometri te duodenit
- C) Ekografi e heparit dhe temthit
- D) Kolecistografi
- E) Radiografi e abdomenit

176. Te gjitha procedurat me poshte jane indikacione per terapine kirurgjikale te Morbus Crohn, pervec:

- A) RezekSION ileo-cekal
- B) Kolektomia totale me ileo-reto anastomoze
- C) Miotomi ekstramukoz e Heller
- D) Hemikolektomia e djathte
- E) Proktokolektomia

177. Terapia ne nje pacient me strume multinodulare qe komprimon trakene eshte :

- A) Terapi jodike

- B) Trajtim me hormone tiroidale
- C) Tiroideektomia subtotale
- D) Soministrim te radiojodit
- E) Terapi me ilace antitiroidei

178. Diagnoza e absesit subfrenik behet me :

- A) Pneumoperitoneum
- B) Radiografi te abdomenit
- C) Skaner
- D) Kolangiografi
- E) Test objektiv

179. Kohe e Quick perdoret si parameter ne vleresimin e efikciteti te terapise antikoagulative me :

- A) Heparina
- B) Heparina me peshe te vogel molekulare
- C) Dikumaroliket
- D) Fibrinolitet
- E) Sulfati i protamines

180. Diagnoza diferenciale ndermjet cisteve e tumoreve solide te gjirit behet me ane te:

- A) mamografise
- B) termografise
- C) shintigrafise mamare
- D) ekografise
- E) galaktografise

181. Kush nga pergjigjet e meposhetme I korespondon nje neoplazie mamare te klasifikuar ne stadin 1?

- A) tumori me madhesi qe varion nga 2 ne 5 cm
- B) mungesa e limfonodujve homolaterale te palpueshem
- C) mungesa e metastazave
- D) te gjitha pergjigjet e mesiperme
- E) asnje nga pergjigjet e mesiperme

182. Nje grua rreth 57 vjec, pas nje fracture te bacinit, paraqet dispne, puls te dobet e te

shpeshte, cianoze, dhimbje gjoksi. Diagnoza me e mundeshme eshte:

- A) pneumotoraks post-traumatik

- B) tetania
- C) embolia pulmonare
- D) hemoragjia akute
- E) sindromi Crush

183. Kush nga diagnozat e me poshteme mund ti pershtatet nje pacienti 17 vjecar me temperature e dhimbje te lokalizuar ne kuadrantin e djathe te poshtem pas palpimit ne kuadrantin e majte te poshtem?

- A) colitis ulceroz
- B) semundja Crohn
- C) apendiciti acut
- D) sindroma e intenstinit te irrituar
- E) dhimbja psikogene

184. Ne cilin rast splenektomia kryhet me shpesh?

- A) trauma abdominale
- B) sindromi I hipertensionit portal
- C) morbus Hodgkin
- D) ikteri hemolitik kostitucional
- E) Linfoma jo-Hodgkin

185. Strukturat e meposhteme anatomike mund te jene vende te abcesit subfrenik, pervec:

- A) subfrenik I majte
- B) subfrenik I djathe
- C) sotohepatik
- D) sotomezokolika
- E) retroepiploika

186. Ne kirurgjine e colon-rekt, agjenti qe shkakton me shpesh infeksionin e plages operatore me origjine anaerobe eshte:

- A) C.perfringens
- B) C.tetani
- C) B.fragilis
- D) Fuzobakterium spp.
- E) asnje nga keto pergjigje

187. Lobi kaudat I heparit I korrespondon:

- A) segmentit 1
- B) segmentit 2

- C) segmentit 4
- D) segmentit 8
- E) asnje nga pergjigjet

188. Sarkoidoza me adenopati hilare asimptomatike e pa interesim te parenkimes pulmonare kerkon:

- A) terapi kortikoide
- B) terapi me ossifenbutazon
- C) terapi me kolkicine
- D) terapi me klorokine
- E) asnje terapi

189. Konsiderohet si manifestimi klinik me i shpeshte ne hipertensionin portal:

- A) encefalopatia
- B) hemorragjia gastro-intestinale
- C) asciti
- D) splenomegalia
- E) te gjitha pergjigjet e mesiperme

190. Simtomat e shenjate klasike te kolangitit akut jane:

- A) te vjella biliare, dhimbje ne hipokondrin e djathte, ikter
- B) temperature, te vjella biljare, leukocitoze neutrofile
- C) dhimbje ne hipokondrin e djathte, melene, temperature
- D) dhimbje ne hipokondrin e djathte, ikter, temperature, temperature
- E) leukocitoze neutrofile, melene, te vjella ushqimore

191. Hidroadeniti eshte:

- A) pezmatimi akut I nje gjendre dhjamore
- B) bashkimi I disa forunkulave
- C) pezmatimi akut I nje gjendre sudoripare
- D) nje limfadenit aksilar
- E) asnje nga pergjigjet e me siperme

192. Cila nga pergjigjet e me poshteme rezulton te shrehe faktorin prognostik me te

rendesishem qe ndikon ne perforacionin ezofageal?

- A) mosha e pacientit
- B) grada e shokut
- C) intervali ndermjet perforacionit e trajtimit
- D) etiologjia e perforacionit

E) tipi I trajtimit te perdorur

193. Cfare qendrimi duhet te mbaje mjeku praktik perpara nje pacienti 70 vjecar, me risk te larte, qe vuan nga aneurizma e aortes abdominale me diameter prej 4 cm?

- A) ta adresoje pacientin tek kirurgu per intervent
- B) ta ndjeke rastin ne evolucion duke riperseritur arterografine cdo 6 muaj
- C) ta ndjeke evolucionin e semundjes me metoda jo invazive
- D) ta qetesoje pacientin duke eskluduar cdo nderhyrje mjekesore
- E) te praktikoje terapi antikoagulante per gjithe jeten

194. Ne hipospadi hapja uretrale :

- A) eshte e vogel
- B) eshte ne vend jo normal
- C) eshte e dilatuar
- D) mungon
- E) eshte dopio

195. Ne presence te HCC ne cirrozen hepaticke, ne cilin rast indikohet rezeksioni hepatic?

- A) nodul unik ne cirroze te dekompesuar (child B-C)
- B) nodule multiple ne cirroze te kompensuar (child A)
- C) nodul unik ne cirroze te kompensuar (child A)
- D) nodul unik ne Child A me tromboze portale (trombektomia portale)
- E) asnje nga pergjigjet e me sipërme

196. Nje pacient 60 vjec, me nje mase mediastinale voluminoze, paraqet dhimbje retrosternale qe, ne menyre te vazhdueshme, irradiohet ne shpatull e kurriz. Diagnoza me e mundeshme eshte:

- A) timoma
- B) morbus Hodgkin
- C) aneurizem disekant I aortes
- D) strume retrosternale
- E) neoplazia pulmonare

197. Metastazat e perhapura me rruge hematogjene nga nje karcinome e kolonit kane si lokalizim primar:

- A) heparin
- B) kockat
- C) pankreasin

- D) pulmonin
- E) trurin

198. Prova Perthes shërben për të verifikuar:

- A) deviacionin e aksit venoz profundo e vendndodhjen e venave të perforuara
- B) egzistencën e një aneurizmi
- C) deviacionin e aksit venoz superficial
- D) egzistencën e një fistule artero-venoze
- E) kontinencën e valvulës safeno-femorale

199. Cila nga këto tipe të anestezisë përcakton incidencën më të madhe të hipotermisë:

- A) anestezia gjenerale
- B) anestezia loko-regionale
- C) anestezia lokale
- D) kombinimi I anestezisë gjenerale me atë lokoregionale
- E) kombinimi I anestezisë gjenerale e lokale

200. Shenja Murphy është më shpesh pozitive në:

- A) ulcerën duodenale
- B) kolecistitin kalkuloz
- C) ulcerën gastrike
- D) divertikulin duodenal
- E) tumorin e kokes së pankreasit

201. Të gjitha gjendjet e mëposhtme ndërhyjnë negativisht në shërimin normal të plagës operatorë përveç:

- A) hipopotasemia
- B) diabeti melit
- C) kortikosteroidet
- D) mungesa e zinkut
- E) keqshqyerja

202. Një grua 40 vjeçare zbulon me vetëgzhimin një masë të fortë në gjirin e djathtë. Cila nga procedurat e mëposhtme do të jetë ajo që do të konfirmojë diagnozën?

- A) mamografia
- B) termografia
- C) ekografia

- D) citologjia ageaspirative
- E) biopsia ekszionale

203. Cila nga keto karaktere te ben te dyshosh per natyren malinje te nje noduli mamar:

- A) shumevator e bilateral
- B) i fiksuar me indin gjendror
- C) ndryshon volumin ne vartesi nga cikli menstrual
- D) konsistenca tenso-elastike
- E) siperfaqe e lemuar

204. Kush eshte egzaminimi kryesor qe duhet kryer ne nje pacient, ankesa e te cilit eshte hematemesis?

- A) arteriografia
- B) ezofago-gasrto-duodenoskopia
- C) egzaminimi radiologjik me barium
- D) egzaminimi radiologjik direct I abdomenit
- E) ekografi abdominale

205. Sindromi Peutz-Jeghers eshte i perbere nga bashkerendimi i:

- A) polipozes se intestinit te holle dhe pigmentimit melanik te fytyres
- B) polipoza e stomakut dhe epitelioma difuze
- C) carcinoma e zorres se holle dhe obliteracioni I sinuseve
- D) leiomioma e intestinit te holle dhe guret e kolecistes
- E) polipoza e stomakut dhe guret e kolecistes

206. Kush eshte trajtimi kryesor i embolise pulmonare:

- A) ligatura e venes cava inferior
- B) trombektomia
- C) embolektomia pulmonare
- D) antikoagulante dhe fibrinolitike
- E) antibiotike

207. Tumori ne colon zhvillohet me shpesh ne:

- A) rektum
- B) sigma
- C) transvers
- D) ascendent
- E) cekum

208. Ne tumoret e pjeses rektale cfare nenkuptohet me pT3N2M0:

- A) eshte nje vleresim preoperator I shtrirjes se tumorit
- B) tumor qe shtrihet deri ne musculature dhe intereson dy limfonodula
- C) tumor qe invadon strukturat fqinje
- D) te dhenat intraoperatore te tumorit ku jane te prekura dhe limfonodulat lokoregionale
- E) asnje nga pyetjet

209. Trajtimi me ideal per empiemen pleurale eshte:

- A) antibiotikoterapia
- B) antibiotike e torakocenteze
- C) antibiotike e drenim te mbyllur
- D) antibiotike e drenim te hapur
- E) dekortikim prekoks

210. Cila nga keto egzaminime perdoret me shume per te arritur ne nje diagnose sa me te sakte mbi polipet gastrike?

- A) shintigrafia
- B) TAC
- C) radiografi e rrugeve te sipërme digjестive me contrast te dyfishte
- D) gastroskopia
- E) ekografi

211. Me termin alotrapiant ,nenkuptohet trampianti:

- A) ndermjet individeve qe i perkasin specieve te ndryshme
- B) ne te njejtin individ
- C) ndermjet individeve qe I perkasin specieve te njejte
- D) ndermjet binjakeve monocoriale
- E) ndermjet individeve isogrup me cros-match negativ

212. Tumori i apendiksit me shpesh eshte:

- A) adenokarcinome
- B) carcinoid
- C) limfoma
- D) leiomyosarkoma
- E) asnje nga pergjigjet e mesiperme

213. Ne diagnozen e studimin e MRGE (semundja e shkaktuar nga refluksi gastroesofageal) gjejne zbatim te gjitha egzaminimet e me poshteme pervec:

- A) rx I traktit tretes se siperm
- B) EGDS
- C) pH-metria e 24 oreve
- D) manometria ezofageale
- E) ekografia

214. Cili nga argumentet e me poshteme perben faktorin prognostic qe me shpesh shoqeron nje prognoze te keqe te karcinomes mamare?

- A) perberja diploide e AND-se
- B) vendndodhja e tumorit
- C) metastazat limfonodulare
- D) receptoret hormonale estrogeno-progestative negative
- E) madhesia e tumorit

215. Te gjitha konfirmimet qe kane te bejne me divertikulin e Meckel jane rorekte, pervec :

- A) perben anomaline me te perhapur kongenitale te intestinit te holle
- B) prek 1.1-3% te popullates
- C) takohet me shpesh ne seksin mashkull
- D) eshte nje divertikul I vertete pasi permban te gjitha shtresat e paretit intestinal
- E) mund te lokalizohet ne te gjithe traktin gastrointestinal

216. Komplikacioni me I shpeshte I hemorroideve eshte:

- A) gjakderdhja
- B) malinjizimi
- C) flebiti
- D) ngushtimi anal
- E) inkontinenca anale

217. Shkaku me I shpeshte I okluzionit intestinal tek te rriturit ne nivel te kolonit te majte eshte:

- A) divertikuli
- B) volvulusi
- C) canceri
- D) recto-coliti ulceroz
- E) invaginacioni

218. Te gjitha manifestimet patologjike te me poshteme percaktohen nga hipertensioni portal, pervec:

- A) varice ezofageale
- B) splenomegalia
- C) varicet e bazes se gjuhes
- D) ascite
- E) hemorroide

219. Hemorragjia digjестive ne divertikulin e Meckel provokohet nga:

- A) inflamacioni i divertikulit
- B) okluzioni intestinal I provokuar nga divertikuli
- C) ulcera peptike te ngjitura me ishujt heterotopike te mukozes gastrike
- D) prezenca e divertikulit ne sakusin hernial
- E) invaginacion I divertikulit

220. Ne hemorragjite e shkaktuara nga ruptura e variceve ezofageale indikohet:

- A) aplikimi I nje sonde te Le Veen per te realizuar deviacionin peritoneo-venoz
- B) realizimi I nje miotomie ezofageale eksramukose sec. Heller
- C) aplikimi I nje sonde Blakemore
- D) aplikimi inje sonde Dormia
- E) nderhyrja me urgjence per te realizuar nje fundo-plicatio sec. Nissen

221. Ne klasifikimin Child per te percaktuar rrezikun operator per aplikimin e nje shunti ne nje pacient me hypertension portal te grupit C perfshihen rastet ne te cilat bilirubinemia eshte:

- A) ndermjet 1.5e 2mg/dl
- B) ndermjet 2.1e 2.5mg/dl
- C) ndermjet 2.6e 3mg/dl
- D) >3mg/dl
- E) klasifikimi Child nuk perfshin vleresimin e bilirubinemise

222. Te gjitha argumentet e me poshteme perfaqesojne tumore beninje te paretit te stomakut , pervec:

- A) leiomioma
- B) carcinoide
- C) lipoma
- D) amartoma pancreatico
- E) adenocarcinoma filloide

223. Cilet nga ilacet meposhte perdoret ne bashkepunim me radioterapine ne trajtimin neoadjuvant te kancerit rektal?

- A) oxaliplatin
- B) kapecitabina
- C) CPT-11
- D) bevacizumab
- E) te gjitha pergjigjet me siper

224. Kolapsi intern I pulmonit mund te verifikohet ne te gjitha kushtet e meposhtme pervec:

- A) pneumotoraks
- B) trauma te pulmonit
- C) obstrukcion te bronkeve
- D) plage parietale
- E) hemotoraks

225. Legamenti I Treitz ndodhet:

- A) ne bashkimin ileo-cekal
- B) ne bashkimin ileo-jejunale
- C) ne bashkimin duodeno-jejunal
- D) ne fleksuren lienale te colonit
- E) ne fleksuren epatike te colonit

226. Te gjitha me poshte jane nerva kraniale, pervec:

- A) glosso-farings
- B) vagus
- C) simpatik
- D) aksesori spinal
- E) ipoglos

227. Te tera patologjite e meposhtme shkaktojne hemorragji te traktit gastrointestinal inferior, pervec:

- A) semundjes divertikulare te kolonit
- B) karcinomes kolo-rektale
- C) angiodisplazise
- D) kompasit aortomezenterik
- E) kolitit ulceroz

228. Ne okluzionin intestinal jane prezente te gjitha keto shenja pervec:

- A) Distension abdominal
- B) Kontraktura e paretit
- C) Klapotazh
- D) Peristaltikë metalike
- E) Stop i feceve dhe gazrave

229. Një mashkull 40 vjeç me rektokolit ulceroz kronik paraqet distension abdominal dhe temperaturë prej dy ditësh. Semundja më e mundshme në këtë pacient është:

- A) Gastroenterit
- B) Perforacion i kolonit
- C) Perkeqesim i rektokolitit ulceroz
- D) Megakolon
- E) Volvulus të sigmes

230 të gjitha alteracionet e mëposhtme trofike mund të jenë pasojë e vuajtjes iskemike përveç:

- A) Rënie e qimeve
- B) Distrofi e thonjve
- C) Atrofi e lekures
- D) Osteoporozë
- E) Ulcerazione

231. Cila prej neoplazive endokrine të mëposhtme është e prezente në sindromën Whipple?

- A) Glukagonoma
- B) Insulinoma
- C) Vipoma
- D) Hipernefroma
- E) Feokromocitoma

232. Në patologjinë herniare cila së bashku me dhimbjen është shenja më e rëndësishme dhe më e hershme për të vënë diagnozën e inkarcerimit herniar dhe për ta shtruar më pas pacientin në spital?

- A) Të vjellat
- B) Stop i feceve dhe gazrave
- C) Irreponibiliteti i fryrjes herniare
- D) Temperatura
- E) Hematemeza

233. Testi perthes vlereson:

- A) Kalueshmerine e qarkullimit venoz te thelle
- B) Kontinencen e qarkullimit venoz siperfaqsor
- C) Fluksin e qarkullimit arterioz
- D) Funksionimin e qarkullimit limfatik
- E) Kontinencen e venave perforuese

234. Cila nga manovrat apo shenjat semiologjike te meposhtme nuk sherben per te vleresuar variçet e anesise se poshtme?

- A) Manovra e valsaves
- B) Manovra e perthes
- C) Shenja e shvarcit
- D) Manovra e trendelemburgut
- E) Manovra e giordanos

235. Sindroma e gardnerit eshte nje polipoze adenomatoze familjare (fap) e shoqeruar me :

- A) Osteomatoze, kiste epidermoidale e fibroma te lekures
- B) Absese cerebrale, egzoftalmi dhe hiperkortikosurrenalizem
- C) Distrofi muskulore, makroglosi dhe osteomieliit
- D) Mielome multiple, intolerance ndaj laktozit dhe endokardit bakterial
- E) Glomerulonefrit, anemi perniciose dhe scialorrea

236. Semundja caroli eshte nje malformacion i lindur i karakterizuar nga:

- A) Atrezi e venave suprahepatike
- B) Artezi e legamentit falciforme te heparit
- C) Kiste te duktuseve biliare intrahepatike
- D) Derdhje anormale e koledokut ne porcionin e pare duodenal
- E) Prezence e kolecistes dyfishe

237. Nje burre 40 vjec ankon shfaqjen e nje fryrjeje ne regionin inguinal te djathte pas nje sforcje fizike intensive, tumefaksioni eshte i reponueshem, elastik dhe transmeton impuls ne kollitje. Cila hipateze diagnostike eshte me e arsyeshme fillimisht?

- A) Varice te krosit te safenes
- B) Aneurizma e arteries femorale te djathte
- C) Hernie inguinale
- D) Linfoadenopati inguinale
- E) Torsion i funikulit spermatik

238. Pacient asimptomatik, anemik, me epigastralgji dhe meteorizem pas ngrenies te shoqeruara me renie te oreksit. Fillimisht mendojme per nje neoplazi gastrike. Cili eshte ekzaminimi me i pershtatshem?

- A) Fibrogastroskopi me biopsi
- B) Gjak okult ne feçe
- C) Ct skan abdominale superiore
- D) Radiografi me kontrast te aparatit tretes te siperm me sulfat bariumi
- E) Ekografi hepato-biliare e pankreatike

239. Vendosja me e shpeshte dhe thujse e vetme e tumorit glomik eshte :

- A) Shtrati i thoit
- B) Qafa
- C) Stomaku
- D) Dura mater
- E) Araknoidja

240. Pritja ne kohe ne trajtimin e trupave te huaj ne pemen bronkiale eshte :

- A) E pranueshme per objektet metalike por jo per ato me natyre bimore
- B) E pranueshme per objektet me natyre bimore por jo per ato metalike
- C) Duhet evituar gjithmone
- D) Me e pershtatshme tek femijet se sa tek te rriturit
- E) Faza e pare e trajtimit

241. Cilin vend ze tek neoplazite malinje te femres kanceri i gjirit ?

- 1. Te parin
- 2. Te pestin
- 3. Te tretin
- 4. Te tetin
- 5. Te gjashtin

242. Ne melene jashteqitja eshte :

- 1. Fece pleikromike
- 2. Fece te zeza
- 3. Fece me gjak te kuq
- 4. Fece si leng qershie
- 5. Fece te perziera me mukus, pus dhe gjak

243. Kur dyshojme per emboli pulmonare fillimisht duhet ti :

- 1. Japim pacinetit heparine
- 2. Japim pacientit vazodilatatore

3. Bejme pacientit angiografi pulmonare
4. Bejme pacientit hemogazanalize (astrup), terapi me oksigjen, grafi toraksi dhe ecg
5. Studiojme tek pacienti hemodinamiken pulmonare

244. Tumori me i shpeshte i testit eshte:

1. Koriokarcinoma
2. Karcinoma embrionale
3. Teratoma
4. Seminoma
5. Gonadoblastoma

245. Cila nga simptomat e meposhtme eshte specifike e feokromocitomes:

1. Hipertensioni arterial
2. Hipertensioni portal
3. Hipertensioni endokranial
4. Hipotensioni arterial
5. Dhimbja lumbare

246. Ne rastet me kist te ekinokokut ne hepar, radiografia e abdomenit me pacientin ne kembe mund te tregojte:

- A) Hidronivele
- B) Zhdukje te bules gastrike
- C) Kalcifikacione hepatike
- D) Spostim te kolonit trasvers
- E) Asnje nga pergjigjet e mesiperme

247. Vetem ne njerin nga rastet e meposhtme, saturimi venoz miks nuk ulet poshte 60%

- A) Ulje e sasise se gjakut qe zemra hedh ne qarkullim
- B) Shunt arteriovenoz pulmonar
- C) Hipoventilim
- D) Rritje e nevose se indeve per oksigjenim
- E) Shunt djathte – majte

248. Karcinoma e laringut ne pjesen me te madhe te rasteve eshte:

- A) Karcinome bazocelulare
- B) Karcinome verrukoze
- C) Adenokarcinome
- D) Karcinome spinoqelizore

E) Karcinome me qeliza gjigante

249. Te gjitha simptomat dhe shenjat e meposhtme i perkasin insuficences mezenteriale – celiak perveç:

- A) Dhimbje pas buke
- B) Malabsorbim
- C) Dobesim
- D) Ndjenje tensioni abdominal
- E) Melene

250. Cili nga bakteret e meposhtem eshte pergjegjes me i shpeshte per endokarditet e protezave valvulare

- A) Escherichia koli
- B) Pseudomonas areuginosa
- C) Streptokoku
- D) Stafilokoku
- E) Enterokoku

251. Te gjitha semundjet e meposhtme mund te shkaktojne adenopati cervikale tek te rriturit duke e perjashtuar patologjine e gjendres tiroide perveç:

- A) Neoplazite malinje primare
- B) Fenomene infamatore
- C) Metastaza
- D) Patologji kistike
- E) Semundja hodgkin

252. Cilat segmente intestinale mund te preke semundja crohn?

1. Ileum
2. Kolon
3. Ezofag
4. Stomak
5. Te gjithë traktin tretes

253. Cili nga ekzaminimet e meposhtme i duhet bere fillimisht nje pacienti 60 vjeç qe paraqet ikter prej 4 javesh?

- A) Ekografia
- B) Ct
- C) Kolangiopankreatografia retrograde endoskopike
- D) Colangiografia perkutane transhepatike

E) Scintigrafia e kolecistes

254. Per nje pacient 60 vjeçar qe referon proktorragji, kane indikacion te gjitha ekzaminimet e meposhtme perveç:

- A) Kolonskopia
- B) Irrigografia
- C) Grafi me kontrast e transitit intestinal
- D) Eksploracioni digital rektal
- E) Irrigo grafi me kontrast te dyfishte

255. Kur kemi nje aneurizem te aortes abdominale si paraqitet disekacioni?

- A) Pulsacion epigastrik
- B) Zhdukje te pulseve epigastrike
- C) Hemoftizi
- D) Dridhje te paretit abdominal
- E) Dhimbje e forte e menjehershme lumbare

256. Ne rastin e nje formacioni solid te pjeses anteriore te heparit ne ekografi cili eshte ekzaminimi i mepasem qe duhet bere?

- A) Laparoscopia
- B) Kolangiografia transhepatike
- C) Kolangiografia retrograde
- D) Radiografia direkte e abdomenit
- E) Radiografia e tubit tretes

257. Sindroma Mallory Weiss eshte pasoje e:

- A) Degtimit te ezofagut
- B) Degtimit te mukozes gastrike
- C) Degtimit te junksionit gastro esofageal
- D) Gjakrrjedhje nga nje polip gastrik
- E) Asnje nga pergjigjet nuk eshte e sakte

258. Ikteri mekanik karakterizohet nga:

- A) Rritje e bilirubines se koniuguar
- B) Ulje e fosfatazes alkaline
- C) Anemi hemolitike
- D) Steatorre
- E) Feçe hiperkromike

259. Ne sa segmente ndajme heparin?

- A) 2
- B) 4
- C) 6
- D) 8
- E) 10

260. Ne cilin nivel te pankreasit gjenden me shpesh insulinomat?

- A) Koke
- B) Koke dhe trup
- C) Trup
- D) Trup dhe bisht
- E) Bisht

261. Si eshte kolecista ne nje pacient me obstrukcion neoplazik te koledokut ?

- A) Kurre edistenduar
- B) Rralle edistenduar
- C) Shpesh e distenduar
- D) Eshte gjithmone pa dhimbje
- E) Prognoza eshte zakonisht e mire

262. Cili eshte trajtimi per nje pneumotoraks hipertensiv ?

- A) Nderhyrje kirurgjike urgjente
- B) Aspirimi
- C) Aspirimi dhe drenimi
- D) Plombazhi ekstrapleural
- E) Asnje nga keto

263. Cili eshte komplikacioni me i shpeshte i nje prostatiti kronik?

- A) Epididimiti
- B) Orkiti
- C) Cistocele
- D) Steriliteti riprodhues
- E) Inflamacion i vezikave seminale

264. Ne cilin nivel ndalojne me shpesh trupat e huaj ne ezofag?

- A) Hiatus i diafragmes
- B) Kardias

- C) Ezofagu cervical poshte muskulit krikofaringeus
- D) Harku i aortes
- E) Asnje nga keto

265. Ne prani te aneurizmes se aortes abdominale cili nga shenjat e meposhtem eshte karakteristik ne disekacion?

- A) Pulsacion epigastrik
- B) Zhdukje e pulserei femorale
- C) Dhimbje e forte e menjehershme lumbare
- D) Fremitus abdominal
- E) Hemoftizi

266. Me cfare mund te shoqerohet apo, ciles nga keto semundje mund ti shtohet hidrocela?

- A) Tumore testikulare
- B) Epididimiti
- C) Trauma
- D) Idiopatike
- E) Te gjitha keto

267. Cila eshte arsyeja me e shpeshte e perforacionit te kolonit?

- A) Gangrena nga hiperdistensioni
- B) Hipertensioni nga staza fekale
- C) Volvulusi
- D) Infarkti mezenterial
- E) Invaginacioni

268. Cili eshte tipi me i zakonshem i tumorit te pelvit renal dhe te ureterit?

- A) Karcinoma papilare
- B) Papiloma me qeliza tranzicioni
- C) Kancer me qeliza skuamoze
- D) Adenocarcinoma
- E) Sarkoma

269. Si duhet te silllet mjeku i familjes para nje pacienti 60 vjeç, me risk te larte dhe me pranine e nje aneurizme te aortes abdominale me diameter 4 cm ose me te vogel?

- A) Duhet adresuar gjithsesi tek kirurgu vazal
- B) Duhet ta ndjeke duke perseritur arteriografine çdo 6 muaj
- C) Duhet ta ndjeke duke i perseritur ekzaminime jo invazive

- D) Nuk duhet te shqetesohet fare
- E) Duhet ti jape terapi antikoaguluese per gjithë jeten

270. Per çfare dyshojme kryesisht ne nje pacient qe dikur ka bere nje by pass aorto bifemoral protezik dhe qe tani ben nje episod melene?

- A) Nje ulçer nga stresi
- B) Nje fistul aorto duodenale
- C) Infarkt te mezenterit
- D) Nje patologji hemorragjike gastro enterike
- E) Divertikul te Meckelit

271. Nje pacient me episode te perse ritura TIA (atak iskemik tranzitor), me amuroze te djathte dhe hemipareze te majte na ben te dyshojme per nje lezion ne nivel te:

- A) Bifurkacionit karotid te majte
- B) Bifurkacionit karotid te djathte
- C) Trugut bazilar
- D) Cerebrales posteriore
- E) Cerebrales media

272. Ne trombozat akute veç nje nderhyrjeje te rivaskularizimit mund te perdoret ne alternative edhe terapi me :

- A) Antitrombocitare
- B) Vazodilatatore
- C) Trombolitike
- D) Aspirine
- E) Antikoagulante orale

273. Nje pacient i detyruar ne shtrat prej disa javesh per nje frakturë te femurit ka nje dhimbje te papritur torakale therese, dispne dhe insuficience respiratore. Cila eshte diagnoza me e mundshme?

- A) Pneumotoraks
- B) Emboli pulmonare
- C) Pneumoni
- D) Infarkt i miokardit
- E) Pleurit

274. Manovra e Homansit eshte pozitive ne:

- A) Linfangit tronkular
- B) Linfangit retikular

- C) Tromboflebit i thelle
- D) Tromboflebit siperfaqsor
- E) Variçe te safena magna

275. Ne rast hemorragjie post operatore ne nje tiroidektomi, hematoma perhapet pas muskujve te gjate te qafes dhe mund te deformoje trakene duke rrezikuar kaluëshmerine e rrugeve te frymemarrjes si per pasoje te komprimimit ashtu dhe per edeme laringale. Ne mungese te shenjave te dukshme te asfiksise cfare duhet te bejme?

- A) Asgje perveç se te observojme pacienti
- B) Te marrim menjehere pacientin ne salle te operacionit per te ekspluar dhe per te bere hemostaze
- C) Te vendosim drenazhet ne aspiracion
- D) Te bejme menjehere trakeostomine ne kravatin e pacienti
- E) Te heqim suturat e plages kutane

276. Grua 46 vjeç, intelektuale, beqare, nje femi 10 vjeç, vuan nga ipertrofia e tiroides me hipertiroidizem qe ne muajt e fundit eshte bere i pakontrollueshem me terapi mjeksore, realizon tiroidektomi sub totale. Cili nga te meposhtmit nuk eshte nje risk i mundshem post operator?

1. Hemorragji per demtim te venes tiroidea media
2. Demtim i nervit rekurrens
3. Demtim i nervit laringeus superior
4. Demtim ose heqje e paratiroidee
5. Hiperkalemi grave

277. Nje pacient i trajtuar me by pass aorto bifemoral per aneurine te aortes abdominale, praqet ne post operator nje dhimbje abdominale, meteorizem dhe ileus. Cila eshte diagnoza me e mundshme?

- A) Perforacion gastrik i nje ulçere stresi
- B) Fistul proteziko intestinale
- C) Infarkt mezenterial
- D) Vonese ne kanalizim si pasoje e ileusit normal paralitik post operator
- E) Infeksion i protezes

278. Termi abdomen akut grupon nje sere kuadresh klinike te irritimit peritoneal me fillim te shpejte. Zakonisht jane procese inflamatore ose vaskulare akute te kavitetit abdominal qe kerkojne nje trajtim te menjehershëm kirurgjik. Cili nga te meposhtmit nuk eshte abdomen akut?

- A) Apendicit akut

- B) Perforacion iolecistes
- C) Perforacion i ulçeres duodenale
- D) Steatonekroze pankreatike
- E) Ulçera gastrike

279. Çfare ndodh ku ne nje subjekt normal lidhim arterien mezenterike inferiore ne origjinen e saj?

- A) Nje nekroze iskemike e kolonit te majte
- B) Nje kolit iskemik kronik
- C) Nje infarkt masiv intestinal
- D) Asgje pasi tolerohet mire
- E) Vdekje e menjehershme

280. Cila nga te meposhtmet nuk eshte shkak i nje ileusi mekanik?

- A) Obstruksion endoluminal
- B) Stenoze nga infiltrimi i proceseve inflamatore ose neoplazike
- C) Kompresion i jashtem
- D) Invaginacion
- E) Pankreatit akut

281. Divertikuli Meckel eshte anomalia me e shpeshte e zorres se holle. Ne rreth gjysmen e rasteve eshte asimptomatik. Cili nga te meposhtmit nuk eshte nje komplikacion tipik i kesaj patologjie?

- A) Hemorragjia
- B) Perforacioni
- C) Okluzioni intestinal
- D) Divertikuliti
- E) Invaginacioni

282. Nje grua 25 vjeçe shkon ne sherbimin e urgjences pasi i ka rene te fiket. Referon se ne tre ditet e fundit ka pasur nje gjakrrjedhje te lehte vaginale te shoqeruar me dhimbje ne pjesen e poshtme te barkut. Referon gjithashtu se ka pasur shtrengime ne fosen iliake te djathte ne 12 oret e fundit dhe se nuk ka menstruacione prej tre muajsh. Ne te shkuaren cikli menstrual ka qene gjithmone i rregollt. Ne ekzaminimin objektiv verghe nje sensibilitet i lehte ne fosen iliake te djathte. Ne ekzaminimin bimanual verghe nje mase me madhesine e nje arre kokosi me konsistence te bute ne nivel te parametriumit te djathte. Cila eshte diagnoza me e mundshme?

- A) Apendicit
- B) Kancer i vezores se majte
- C) Gravidance ektopike

- D) Endometrioze
- E) Kist i ovarit

283. Cila nga te meposhtmit nuk mund te jete komplikacion i nje kolecistektomie te pakujdesshme?

- A) Hemorragji nga shtrati i kolecistes
- B) Rrjedhje biliare
- C) Gur ne rruget biliare i pa zbuluar
- D) Stenoze biliare pasoje e demtimit te saj
- E) Perforacion i kolonit trasvers

284. Termi abdomen akut permbledh nej sere kuadresh klinike pasoja te irritimit peritoneal me fillim te shpejte. Zakonisht behet fjale per procese infamatore ose vaskulare akute te kavitetit abdominal qe kerkojne nje nderhyrje te shpejte kirurgjike. Cili nga te meposhtmit nuk eshte abdomen akut?

- A) Ileus mekanik
- B) Ileus obstruktiv
- C) Okluzion i arteries mezenterike superiore
- D) Torsion i nje listi te ovarit
- E) Divertikuli i Meckel

285. Ne manovren e Adson it kemi:

- A) Cianoze te ekstremitetit te interesuar
- B) Rritje te diapazonit te pulsit te interesuar
- C) Zbehje te ekstremitetit te interesuar
- D) Ulje te diapazonit te pulsit radial
- E) Dhimbje te dores se ekstremitetin e interesuar

286. Cili eshte komplikacioni me i frikshem i nje arteriti te Horton it te pa trajtuar?

- A) Emboli cerebrale
- B) Verbim i pakthyeshem bilateral
- C) Tromboze e arteries temporale siperfaqsores
- D) Shurdhim koklear
- E) Kriza te forta te perseritura cefalee.

287. Ne cilin nga rastet e meposhtme shfaqet ne menyre klasike dhimbja nga angina mezenterike

- A) Esell

- B) Pas te ngrenit
- C) Gjate gjumit
- D) Kur pacienti ngrihet ne kembe
- E) Kur pacienti eshte ulur

288. Cila nga semundjet e aparatit urinar, ne kendveshtrimin e diagnozes diferenciale, nuk mund te stimuloje nje kuader abdomeni akut?

- A) Infarkti renal
- B) Kisti renal
- C) Pieliti
- D) Kolika renale nga kalkuloza
- E) Ipertrofia e prostates

289. Nje burre 55 vjeç me cirroze hepatike alkolike vjen ne urgjencen e spitalit me hematemeze prej 2 oresh. Ai ka nje histori 2 mujore me distension abdominale, zgjerim subkutan te venave siperfaqsores abdominale anteriore dhe hemorroide interne. Cila nga venat e poshte shenuara, e zgjeruar nga cirroza eshte me me shume mundesi fajtores per hematemezen?

- A) Vena mezenterike inferiore
- B) Vena gastrika sinistra
- C) Vena periumbelikale
- D) Vena emorroidale superiore
- E) Vena kava superiore

290. Cila nga keto nuk eshte arsye e nje ileusi paralitik?

- A) Peritoniti difuz
- B) Trauma abdominale
- C) Ndryshime metabolike hidroelektrolitike
- D) Mekanizma reflektore te inhibimit
- E) Ulçera gastroduodenale

291. Cila nga te meposhtmet nuk eshte nje mase qe merret per te parandaluar trombozen venoze te thelle?

- A) Bandazhi compresiv
- B) Mobilizimi i hershem post operator
- C) Ushtrime muskulore te kembeve
- D) Çorape elastike me kompresion te diferencuar
- E) Ushtrime te frymemarrjes me tri-flo

292. Ne cilin nga rastet e meposhtme nuk ekziston rreziku i nje agravimi te vuajtjes se vaskularizimit te anses intestinale nese nuk nderhyhet menjehere kirurgjikalisht?
- A) Invaginacion
 - B) Volvulus
 - C) Limfadenit mezenterik
 - D) Shterngim nga brilie aderenciale
 - E) Hernie inguinale e inkarceruar
293. Ulçera solitare e rektumit eshte nje situatë beninje me patogjeneze te pa qarte. Ajo godet me shpesh grate ne dekadën e trete – katert dhe karakterizohet nga veshpiresim i jashteqitjes. Cila nga te meposhtmet nuk eshte nje simptome karakteristike e saj?
- A) Tenezma
 - B) Hemorragjia
 - C) Mukorreja
 - D) Inkontinenca
 - E) Disuria
294. Cili nga shenjat e meposhtme ben te dyshojme per nje aneurizem ne mungese te nje mase te palpueshme pulsuese?
- A) Asinkronizem i pulserei femorale
 - B) “trill” i ragionit inguinal
 - C) Zhurme shfryrese e vazhdueshme sisto diastolike ne fosa iliake
 - D) Claudicatio intermitens
 - E) Emboli akute e arteries poplitea
295. Polipet e zorres se trashe jane formacione me pedunkul ose me baze te gjere, me origjine nga epiteli i mukozes dhe drejtohen ne lumenin intestinal. Ato mund te jene jo neoplazike, pa tendenza per tu malinjizuar dhe neoplazike qe konsiderohen paraendesit e kancerit kolo rektal. Cilet nga te meposhtmit jane polipe neoplazike:
- A) Hiperplastike
 - B) Amartomatoze
 - C) Adenomatoze
 - D) Infamatore
 - E) Te sindromes peutz.jeghers
296. Termi abdomen akut permbledh ne j sere kuadresh klinike pasoja te irritimit peritoneal me fillim te shpejte. Zakonisht behet fjale per procese infamatore ose vaskulare akute te kavitetit abdominal qe

kerkojne nje nderhyrje te shpejte kirurgjike. Cili nga te meposhtmit nuk eshte abdomen akut?

1. Ileus paralitik
2. Tromboze e venes porta
3. Tromboze e venes mezenterike
4. Rupture e gravidances tubare
5. Kist renal sinister

297. Cili nga te meposhtmit eshte trajtimi i zgjedhur per emboline arterioze?

- A) Heparinizimi.
- B) Simpatetktomia
- C) Embolektomia me kateter Fogarty
- D) Terapia trombolitike
- E) Tromboendoarterektomia

298. Ne kendveshtrimin e diagnozes diferenciale, abdomeni akut mund te simulohet nga disa kuadro ekstra abdominale qe mund te perkeqsohen nga nderhyrja kirurgjike. Cili nga te meposhtmit nuk eshte nga keto?

- A) Pleuriti
- B) Embolia pulmonare
- C) Pericarditi
- D) Angina pectoris dhe infarkti i miokardit
- E) Struma retro sternale

299. Cila eshte vendosja me frekuente e tumorit gnomik

- A) Shtrati i thoit
- B) Qafa
- C) Stomaku
- D) Dura mater
- E) Araknoidja

300. Cili nga te meposhtmit nuk jep imazh kalcifikimi abdominal?

- A) Kalkulat vezikale
- B) Kalkulat renale
- C) Divertikuli Meckel
- D) Aneurizma eaortes
- E) Kalkuli intrahepatik bilirubinik

301. Koncentrimi i bikarbonatit ne gjak normalisht eshte:

- A) 5-7 mm/l
- B) 7 – 10 mm/l
- C) 10 – 15 mm/l
- D) 15 – 20 mm/l
- E) 20 – 25 mm/l

302. Kurba presion – vellim ne aparatit e frymemarrjes na lejon te matim:

- A) Kompliancen torako pulmonare
- B) Rezistencen e rrugeve ajrore
- C) Kapacitetin vital
- D) Kapacitetin funksional mbetes
- E) Vellimin mbylles

303. Oksigjenoterapia sjell rrezikun e komplikacioneve te meposhtme perveg:

- A) Ulçeracionit korneal
- B) Edema pulmonare lezionale
- C) Fibrodisplazia retrolentikulare
- D) Irritim te mukozave te rrugeve te frymemarrjes
- E) Depression respirator ne bronkopatet kronike

304. Nepermjet cilave fibra nervore transmetohet dhimbja?

- A) A beta
- B) A alfa dhe B
- C) B dhe C
- D) A beta dhe B
- E) A delta dhe C

305. Cila nga situatat e meposhtme eshte kunderindikacion per manovren heimlich?

- A) Hipoksia akute
- B) Bronkopneumopatia kronike obstruktive
- C) Mosha e thyer
- D) Gravidanza ne muajt e fundit
- E) Hernia inguinale

306. Ne gjakun venoz pjesa me e madhe e CO₂ eshte ne forme:

- A) Karbonati
- B) Acidi karbonik
- C) Bikarbonati

- D) CO₂ i lire
- E) H⁺

307. Nje solucion hipertonic per perdorim endovenoz eshte ajo qe:

- A) Nje perqendrim sheqeri me te larte se ai plazmatik
- B) Nje perqendrim NaCl njesoj me ate plazmatik
- C) Nje perqendrim te te treturave qe shkakton nje presion onkotik me te madh se ai plazmatik
- D) Nje permbajtje proteinike njelloj me ate plazmatike
- E) Nje aktivitet ozmotik me te larte se ai plazmatik

308. Shocku anafilaktik karakterizohet nga:

- A) Hipotension, bradikardi, presion venoz qendror (PVC) te zvogeluar
- B) Hipotension takikardi, presion venoz qendror (PVC) te rritur
- C) Hipotension takikardi presion venoz qendror (PVC) te zvogeluar
- D) Hipotension bradikardi presion venoz qendror (PVC) te rritur
- E) Hipotension, bradikardi oligoanuri

309. Nje spostim djathtas i kubes se disocimit te hemoglobines pertcakton:ù

- A) Rritje te afinitetit te Hb dhe rritje te leshimit te O₂ ne inde
- B) Ulje te afinitetit te Hb dhe rritje te leshimit te O₂ ne inde
- C) Rritje te afinitetit te Hb dhe ulje te leshimit te O₂ ne inde
- D) Ulje te afinitetit te Hb dhe ulje te leshimit te O₂ ne inde
- E) Asnje ndryshim te afinitetit te Hb dhe te leshimit te O₂ ne inde

310. Stimulimi i vagusit sjell:

- A) Takikardi
- B) Ulje te sekretimit gastrik
- C) Rritje te salivacionit
- D) Ulje te salivacionit
- E) Hipertension

311. Cili nuk eshte komplikacion i intubimit oro trakeal ne anestezi te pergjithshme?

- A) Zenia bronkiale
- B) Ruptura e trakese
- C) Ruptura e ezofagut
- D) Edema persistuese e glotisit
- E) Atelektazia pulmonare

312. Cili nga pohimet e meposhtme eshte i sakte lidhur me konsumi cerebral te oksigjenit?

- A) Ulet me 1% per cdo °C poshte 37,5 °C
- B) Rritet gjate anestezise me barbiturike
- C) Eshte ne raport te drejte me kuocientin intelektual
- D) Normalisht ulet ose rritet paralelisht me fluksin cerebral
- E) Varet kryesisht nga pa O₂

313. Cili nga te meposhtmit percakton gjysemjeten e nje analgjeziku?

- A) Raporti i kostanteve te ekuilibrit ne kompartmentet endryshme
- B) Koha e pergjysmimit te ilacit ne receptore
- C) Jeta mesatare para skadences se ilacit
- D) Gjysma e kohes nga fillimi i veprimit te ilacit
- E) Koha per te eliminuar gjysmen e ilacit

314. Ne cilat raste gjen indikacion perdorimi i opiateve madhore?

- A) Vetem ne dhimbjen onkologjike me pritshmeri jete nen tre muaj
- B) Ne cdo dhimbje te pa kontrollueshme mire me FANS apo opioide minore
- C) Vetem ne dhimbjet akute
- D) Vetem ne dhimbjet kronike
- E) Vetem ne dhimbjen e paperballueshme

315. Neuropatia diabetike sjell zakonisht:

- A) Nje dhimbje somatike
- B) Nje dhimbje viscerale
- C) Nje dhimbje neuropatie
- D) Nje dhimbje homeopatike
- E) Nje dhimbje adiabatiche

316. Fluksi hematik cerebral i shtuar ndjeshem jep:

- A) Hiperkapni
- B) Aktivitet cerebral
- C) Hipoksi
- D) Adrenaline
- E) Rritje te presionit arterial mesatar

317. Cilin funksion kryejne benzodiazepinat?

- A) Antikonvulsivant
- B) Ansiolitik
- C) Miorelaksant
- D) Hipnotik
- E) Te gjitha keto

318. Nje “volet” brinjor eshte me i shpeshte ne traumat e:

- A) Kembesoreve
- B) Skiatoreve
- C) Çiklisteve
- D) Shofereve
- E) Motoçiklisteve

319. Cili eshte saturimi normal i O₂ ne gjekun venoz te arteries pulmonare:

- A) 92%
- B) 75%
- C) 60%
- D) 30%
- E) 45%

320. Ne nje pacient ne koma dhe ne pozicion supin, okluzioni i rrugeve te frymemarrjes mund te kontrollohet duke:

- A) Flektuar koken me 30 °
- B) Ngritur koken 5 cm mbi trungun
- C) Ngritur koken 10 cm mbi trungun
- D) Vendosur pacientin ndenjur
- E) Ekstenduar koken ndaj qafes

321. Solucioni fiziologjik (nacl ne uje) ka nje osmolaritet rreth:

- A) 145 mosm/l
- B) 175 mosm/l
- C) 250 mosm/l
- D) 300 mosm/l
- E) 400 mosm/l

322. Ne cilin nga keto kushte bejme ventilacion artificial

- A) Rritje e PaCO₂
- B) Ulje e PaCO₂
- C) Rritje e pH
- D) Ulje e pH

E) Te gjitha keto

323. Nje pacient 70 vjeç, ne ditën e tretë post operatore laparotomike, shfaq insuficiencë respiratore me një kuader të qartë të atelektazisë pulmonare. Cili nga të mëposhtmit është trajtimi i zgjedhur për të zgjidhur situatën?

- A) Aerosolterapia
- B) Fizioterapi respiratore
- C) Bronkoskopi dhe tualet bronkial
- D) Antibiotikoterapi masive
- E) Nderhyrje e dytë laparotomike

324. Në rast fibrilacioni ventrikular, defibrilimi elektrik duhet bërë:

- A) Pas një tentative defibrilimi farmakologjik me prokainomid
- B) Pas një tentative defibrilimi farmakologjik me lidokaine
- C) Menjehere
- D) Pasi të kemi intubuar pacientin
- E) Pasi të kemi vendosur një rrugë venoze

325. Në fazën e refraktaritetit absolut zemra është:

- A) E eksitueshme
- B) Pjesërisht e eksitueshme
- C) E pa eksitueshme
- D) Në diastole
- E) Në sistole

326. Cili nga pohimet e mëposhtme njihet si fundmi si perkufizimi i dhimbjes?

- A) Dhimbja është një eksperience objektive
- B) Gjithçka që pacienti referon si dhimbje*
- C) Ndjenjë e identifikueshme kollaj nga operatorët shëndetësorë
- D) Ndjenjë në një apo më shumë pjesë të trupit që përcakton një eksperience të pakëndeshme
- E) Ndjenjë që shoqëron një demtim indor

327. Nëse një arrest kardiak ka ndodhur në ujë, kapaciteti i trupit për të rezistuar mungesës së oksigjenit:

- A) Varet nga temperatura e ujit
- B) Rritet
- C) Ulet

- D) Nuk ndryshon
- E) Varet nga perqendrimi i kripes

328. Ne diabetin insipid jane tipike:

- A) Poliuria, hipernatremia, hiperosmolariteti plazmatik, hipoosmolariteti urinar
- B) Oliguria, hipernatremia, hiperosmolariteti plazmatik, hiperosmolariteti urinar
- C) Poliuria, hiponatremia, hipoosmolariteti plazmatik, hipoosmolariteti urinar
- D) Poliuria, hipernatremia, hipoosmolariteti plazmatik, hiperosmolariteti urinar
- E) Poliuria, hiponatremia, hiperosmolariteti plazmatik, hiperosmolariteti urinar

329. Nje hipokaliemi shoqerohet me:

- A) Rritje te peristaltikes intestinale
- B) Acidoze
- C) Rritje te diapazonit te vales T
- D) Nauze
- E) Subnivelim te segmentit ST

330. Cili nga pohimet e meposhtme mbi lengun cerebro spinal eshte i gabuar?

- A) Vellimi total eshte 10 – 150 ml
- B) Formose me nje shpejtesi prej rreth 450 ml/dite
- C) Peshja e tij specifike duhet te jete mes 1010 e 1020
- D) Eshte nje leng i qarte pa ngjyre
- E) Ndodhet ne ventrikujt cerebrale

331. Nepermjet cilit mekanizem FANS et ulin dhimbjen?

- A) Aktivizim te receptoreve te endorfines
- B) Bllokim te ciklooksigenazes
- C) Bllokim te fosfolipazes
- D) Bllokim te receptoreve kolinergjike pre sinaptike
- E) Rritje te prodhimit te leukotrieneve

332. Alkaloza metabolike mund te linde nga:

- A) Diabeti mielit i dekompenruar
- B) Te vjella te pakontrollueshme

- C) Gjendje shocku
- D) Hipertiroidizem
- E) Fistul pankreatike

333. Cili nga pohimet e mëposhtme mbi dikumaroliket nuk është i sakte?

- A) Inhibojnë sintezën hepatike të faktorit VII
- B) Janë antagonistë të vitaminës K
- C) Veprimi zgjat për disa ditë pas dozës së fundit
- D) Veprimi kundërshtohet me vitaminë C në dozë të lartë
- E) Inhibojnë sintezën e proteiave të C dhe S

334. Sa oksigjen përmban zakonisht ajri i ekspiruar

- A) Rreth 5%
- B) Rreth 10%
- C) Rreth 16%
- D) Rreth 25%
- E) Rreth 35%

335. Barbituriket në sistemin nervor:

1. Ulin konsumin e O₂
2. Rritin konsumin e O₂
3. Normalizojnë konsumin e O₂
4. Induktojnë hipokapni
5. Lënë të pandryshuar konsumin e O₂

336. Cili nga keto diuretike kursen kaliumin?

- A) Spironolaktoni
- B) Acetazolamidi
- C) Furosemidi
- D) Klorotiazidi
- E) Acidi ektarinik

337. Cili nga faktorët e mëposhtëm ul shanset e suksesit të defibrilimit elektrik?

- A) Hipotermia
- B) Acidoza
- C) Hipoksia
- D) Impedence torakale e rritur
- E) Të gjitha janë të sakta

338. Nje pneumotoraks hipertensiv dekomprimohet me nje vigon te futur ne:

1. Hapesira 2° - 3° interkostale ne hemiklaveare
2. Ligamenti interkrikotiroidien
3. Hapesira 5° interkostale ne aksilaren media
4. Hapesira 2° -3° interkostale ne aksilaren media
5. Hapesira 5° interkostale ne hemiklaveare

339. Nje pH arterial > 7,6 me Pa CO₂ > 45 tregon per:

- A) Acidoze metabolike
- B) Acidoze respiratore
- C) Alkaloze metabolike
- D) Alkaloze respiratore
- E) Alkaloze mikse

340. Takikardia parosistike me bllok ne AV 2:1 eshte tipike ne mbidozen e:

- A) Lidokaines
- B) Digitaless
- C) Verapamil
- D) Diltiazem
- E) Adenozines

341. Çfare eshte kapaciteti funksional rezidual pulmonar?

- A) Vellimi korrent + vellimi rezidual
- B) Vellimi i rezerves respiratore + vellimi rezidual
- C) Kapaciteti vital + vellimi rezidual
- D) Kapaciteti inspirator + vellimi rezidual
- E) Vellimi i rezerves inspiratore + vellimi rezidual

342. Cili nga trajtimet e meposhtme nuk eshte i pershtatshem ne hiperkaliemi?

- A) Perfuzion i ngadalte me CaCl₂
- B) Perfuzion glukoze dhe insuline
- C) Alkalinizim
- D) Perfuzion i rezinave me shkembim jonik
- E) Perfuzion albumine

343. Kurba e disocimit te hemoglobines spostohet djathtas si pasoje e:

- A) Rritje e 2,3 DPG
- B) Hipoksi
- C) Acidoze
- D) Rritje te temperatures
- E) Te gjitha keto

344. Ne alkaloze respiratore PaCO₂:

- A) Rritet
- B) Ulet
- C) Nuk ndryshon
- D) Ka levizje te ndryshueshme
- E) Nuk vleresohet dot

345. Suksinilkolina metabolizohet nga:

- A) Kolinesterazat e verteta
- B) Hidroliza alkaline
- C) Pseudokolinesteraza
- D) M.A.O.
- E) Katalaza

346. Cili nga shenjat e meposhtme mungon ne rast intoksikacioni me monoksid karboni

- A) Krize stenokardike
- B) Cianoze
- C) Nauze dhe te vjella
- D) Cefale
- E) Konvulsione

347. Ne shockun periferik, konstatimi i nje rritjeje te shpejte te presionit venoz central tregon:

- A) Insuficience kardiake kongjестive
- B) Rikthim te ekuilibrit hemodinamik
- C) Hapjen e shunteve arterio venoze
- D) Rritje te gjitates kardiake
- E) Venokonstriksion

348. Me nje masazh kardiak te jashtem te kryer mire arrihen vlera te fluksit coronar rreth:

- A) 100% te normes
- B) 75% te normes

- C) 50 % te normes
- D) 30% te normes
- E) 5% te normes

349. Cilen karakteristike duhet te kete opiatu ideal?

- A) Prani te shume metaboliteve active
- B) Interference metabolike me ilace te tjera
- C) Akumulim te madh ne indet adipoze
- D) Thjeshtesi titrimi
- E) Veprim te shkurter

350. Injektimi intrakardial i adrenalines:

- A) Eshte menyra me e mire per te rivendosur qarkullimin ne nje arrest kardial
- B) Duhet bere bashke me bikarbonat natriumi
- C) Duhet bere vetem ne rruge parasternale
- D) Ka indikacion ne paciente me hipotermi
- E) Eshte nje procedure e rrezikshme qe duhet bere vetem ne raste te jashtezakonshme

351. Me nje masazh kardial te jashtem te kryer mire arrihen vlera te gjitates kardiake rreth:

- A) 100% te normes
- B) 75% te normes
- C) 50% te normes
- D) 25% te normes
- E) 10% te normes

352. Ne kushte shocku septik hiperdinamik, reduktimi i menjehershem i gjetates kardiake i shoqeruar me reduktim te presionit venoz central tregon per:

- A) Mbingarkese te mikroqarkullimit
- B) Shock hipodinamik si pasoje e reduktimit te mases qarkulluese
- C) Hapje te shunteve arterio venoze
- D) Paralize te arteriolave
- E) Insuficienc kontraktive te miokardit

353. Vasodilatatori me i fuqishem cerebral eshte:

- A) Tiopentali
- B) Diazepam

- C) Droperidoli
- D) Hiperkapnia
- E) Hipokapnia

354. Me nje masazh kardiak te jashtem te realizuar mire kemi fluks cerebral rreth:

- A) 100% te normes
- B) 75% te normes
- C) 50% te normes
- D) 20% te normes
- E) 5% te normes

355. Ne nje neonat qe nuk jep shenja jete, ku e kerkojme pulsin central?

- A) Ne arterien temporale
- B) Ne arterien brakiale
- C) Ne arterien radiale
- D) Ne arterien karotide
- E) Asnje nga keto

356. Nje masazh kardiak i jashtem nevojitet kur:

- A) Pacienti nuk merr fryme
- B) Pacienti eshte midriatik, cianotik dhe pulsi central mungon
- C) Pacienti pakoshience dhe paraqet njolla cianotike ne ekstremitete
- D) Pulsu radial eshte zhdukur
- E) Pulsu femoral eshte zhdukur

357. Cili nga pohimet mbi barrieren hemato encefalike eshte i sakte:

- A) Eshte lirisht e pershkueshme nga jonet inorganike
- B) Eshte relativisht e pershkueshme nga gazet
- C) Eshte lirisht e pershkueshme nga jonet e natriumit
- D) Eshte lirisht e pershkueshme nga jonet bikarbonat
- E) Eshte lirisht e pershkueshme nga uji

358. Fraktura e bazes se kafkes shfaqet me:

- A) Ekimozet difuze te qafes dhe te rajonit supraklavear
- B) Emfizeme sub kutane oksipitale
- C) Akufene e skotoma
- D) Otorre dhe/ose otorragji
- E) Hemorragji retinale

359. Ne nje te rritur te shendetshem ne qetesi hedhja kardiake (litra / minute) eshte rreth:

- A) 1,2
- B) 2,9
- C) 5
- D) 8
- E) 12

360. Cardioversioni elektrik i sinkronizuar ka indikacion ne:

- A) Takikardi ventrikulare pa puls
- B) Fibrilacion elektrik
- C) Blllok a-v ii° te tipit mobitz ii
- D) Ne flutter atrial
- E) Ne disocimin elektromekanik

361. Sapo te diagnostikojme nje takikardi ventrikulare pa puls:

- A) Sillemi si ne nje fibrilacion ventrikular
- B) Bejme masazh te sinusit karotid
- C) I injektojme pacientit 10 mg/kg i.v. Ne bolus
- D) Vendosim nje kanjule ne nje vene te madhe
- E) I injektojme pazienti lidokaine 1,5 mg/kg i.v. Ne bolus

362. Pangopshmeria receptoriale e nje ilaçi eshte:

- A) Kapaciteti i ilaçit per tu lidhur me receptorin e tij
- B) Veshtiresia e ilaçit per tu ndare nga receptori i tij
- C) Shpejtesia me te cilen lidhet ilaçi me receptorin e tij
- D) "onset" i i shpejte i veprimit
- E) Ne proporcion te zhdrejte me efektin e ilaçit

363. Nje anestetik lokal shtohet ne nje solucion epinefrine 1:200.000 me qellim qe te:

- A) Reduktoje shtrirjen e bllokut sensorial
- B) Rise kohezgjatjen e bllokut sensorial
- C) Potencoje bllokun motor
- D) Ule rrezikun e nje ipotensioni arterial
- E) Te gjitha jane te sakta

364. Hipoksia nga cianuri ndodh nga:

- A) Hipoventilimi central
- B) Interferimi ne transportin e O₂
- C) Ngadalsimi i fluksit kapilar
- D) Inibimi i zinxhirit respirator mitokondrial
- E) Atelektazi pulmonare difuze

365. Cianoza shfaqet kur:

- A) Hb e reduktuar > 5 g/dl
- B) CoHb > 5 g/dl
- C) Hemoglobinemia < 7 g/dl
- D) PaO₂ = 70 mm hg
- E) Hemoglobinemia < 10 g/dl

366. Cila nga pohimet e meposhtme nuk eshte e sakte ne lidhje me angina pectoris:

- A) Angina stabile induktohet nga ushtrimi fizik dhe ndalon ne pushim
- B) Angina insta bel shfaqet dhe ne pushim
- C) Angina stabel eshte prezente vazhdimisht me nje dhimbje konstante
- D) Angina insta bel eshte me e vestire ne trajtim se sa ajo stabel
- E) Iskemia miokardiale eshte ne shumicen e rasteve asimptomatike

367. Ne cilat rste lidokaina perdoret si ilaçi i zgjedhur?

- A) Takikardi supraventrikulare parosistike me hipotension grav
- B) Takikardi ventrikulare me prani pulsi
- C) Takikardi ventrikulare me torsion te majes
- D) Bllok A-V te grades III
- E) Flatter atrial

368. Nje pH arterial < 7,3 ma PaCO₂ < 35 flet per:

- A) Acidoze metabolike
- B) Acidoze respiratore
- C) Alkaloze metabolike
- D) Alkaloze respiratore
- E) Alkaloze mikse

369. Cilin nga shenjat apo simptomat e meposhtme nuk e gjejme ne intoksikacionin nga morfina?

- A) Bradipne
- B) Pupilla si koke gjilpere
- C) Oliguri

- D) Hiperpireksi
- E) Flaciditet muskular

370. Presioni onkotik plazmatik eshte:

- A) 5 cm H₂O
- B) 5 mm Hg
- C) 10 cm H₂O
- D) 25 cm H₂O
- E) 25 mm Hg

371. Kapaciteti funksional rezidual ne nje subjekt normal 70 kg eshte rreth:

- A) 1 liter
- B) 1,5 liter
- C) 2 liter
- D) 2,5 liter
- E) 3,5 liter

372. Ne nje lindje normale vaginale jo te komplikuar, humbja hematike eshte rreth:

- A) 250 ml
- B) 500 ml
- C) 750 ml
- D) 1000 ml
- E) 1250 ml

373. Ne kushte normale zgjatje e intervalit P-Q ne EKG e nje te rrituri eshte:

- A) 0,12 – 0,20sekonda
- B) 0,18 – 0,24sekonda
- C) 0,06 – 0,08sekonda
- D) 0,10 – 0,12sekonda
- E) 0,24 – 0,30sekonda

374. Histamina shkakton:

- A) Vazokonstriksion te kapilareve
- B) Dilatacion te muskulatures se lemuar bronkiale
- C) Rrit permeabilitetin vaskular
- D) Rrit proliferacionin e limfociteve t
- E) Asnje nga keto

375. Hipoventilimi i shoqeruar me deprimim te qendres se frymemarrjes shkakton:

- A) Hipoksi dhe hipokapni
- B) Hipoksi dhe hiperkapni
- C) PO₂ normale dhe hiperkapni
- D) Reduktim te saturimit te hemoglobines
- E) Rritje te baze ekssesit

376. Cili nga te meposhtmit eshte nje pohim i sakte lidhur me FANS at:

- A) Inhibojne agregimin trombocitar pasi ulin nivelet plazmatike te Ca⁺⁺
- B) Aspirina inhibon agregimin trombocitar pasi inhibon ciklooksigenazen
- C) Rikthimi i nje funksioni trombocitar normal kerkon te pakten 3 jave nga ndalimi i marrjes se aspirines
- D) Doza antiagreguese e aspirines eshte 20 mg/kg ne dite
- E) Te gjithe FANS at inhibojne potencialisht agregimin trombocitar

377. Ne venat central presioni eshte zakonisht:

- A) Gjithmone pozitiv
- B) Pozitiv por mund te behet negativ gjate inspирimit
- C) Gjithmone negativ
- D) Pozitiv por mund te behet negativ gjate ekspirimit
- E) Gjithmone poshte atmosferes

378. Ç' duhet bere si terapi urgjence ne nje bllok A-V komplet?

- A) Lidokaine ne bolus
- B) Defibrilacion elektrik
- C) Pacing trans kutan
- D) Kardioversion elektrik
- E) Te gjitha jane te sakta

379. Me arrest kardiak kuptojme:

- A) Pushimin e aktivitetit mekanik te zemres
- B) Pushimin e aktivitetit mekanik te trurit
- C) Fibrilacionin ventricular
- D) Zhdukjen e pulseve arteriale periferike
- E) Disocimin elektromekanik

380. Dega interventrikulare posteriore del nga:

- A) Koronarja e majte
- B) Koronarja e djathte
- C) Arteria cirkumflekse
- D) Dega interventrikulare posteriore
- E) Direkt nga aorta ascendente

381. Arsyeja me e shpeshte e sindromes kavale superiore mund te jete:

- A) Neoplazia e lobit superior te djathte pulmonar
- B) Tumori i timusit
- C) Karcinoma folikulare e tiroides
- D) Fibroza mediastinike
- E) Struma e zhytur

382. Cila nga te meposhtmet nuk eshte komponent i tetralogjise Fallot?

- A) Hipertrofia ventrikulare e majte
- B) Difekti i septumit interventrikular
- C) Dekstro pozimi i aortes
- D) Hipertrofia e ventrikulit te djathte
- E) Stenoza infundibolare e arteries pulmonare

383. Ne nje leter dalje nga spitali te nje pacienti te operuar me by-pass aorto koronar , termi “on-pump” do te thote:

- A) Pacient i operuar me zemer qe rrihte
- B) Qe gjate operacionit u be i nevojshem perdorimi i nje kontra pulsatori aortal
- C) Pacienti nuk ruante funksion te pompes ne fund te operacionit
- D) Operacion gjate te cilit u nevojit perdorimi i qarkullimit ekstra korporal
- E) Nevoje gjate operacionit per te perdorur ventilim pulmonar me pompe te jashtme

384. Cili nga te meposhtmit eshte nje candida potencia per nje trapiant kardiak?

- A) Pacient 55 vjeç, me kushte insuficience kardiake sekondare nga cardiomiopatia dilatative familjare, qe nuk i pergjigjet me terapise mjekesore
- B) Pacient 60 vjeç, ne kushte insuficience kardiake sekondare nga kardiopati iskemike qe nuk i pergjigjet terapise mjekesore
- C) Pacient 55 vjeç ne kushte insuficience kardiake sekondare nga kardiopati iskemike qe nuk i pergjigjet terapise mjekesore me histori te kaluar dhe jo te tashme alkolizmi

- D) Pacient 55 vjeç me insuficiencë kardiake sekondare nga kardiopati iskemike që nuk i përgjigjet me terapise mjekesore, me vlera të rritura të rezistencës së shtrati vaskular pulmonar, që nuk i përgjigjet me terapise me vasodilatatore.*
- E) Asnje nga keto.

385. Cila nga strukturat e mëposhtme, normalisht nuk është e vaskularizuar nga arteria koronare e djathtë apo dege të saj?

- A) Atriumi i djathtë
B) Bordi i theksuar i ventrikulit të djathtë
C) Pjesa anteriore e septumit interventrikular
D) Pjesa posteriore e septumit interventrikular
E) Pjesa posteriore e ventrikulit të majtë

386. Cila valvulë kardiake është më shpesh e prekuar nga reumatizma?

- A) Aortale
B) Mitrale
C) Pulmonare
D) Tricuspidale
E) Të gjitha keto me një frekuencë të ngjashme

387. Për cilat vlera të zonës dhe të ndryshimeve të presionit mesatar trans valvular (delta p) vendoset indikacion për trajtim kirurgjik të stenozes së valvulës aortale?

- A) Zone < 1cm dhe delta P > 50 mmHg
B) Zone < 1,5cm dhe delta P > 30 mmHg
C) Zone < 2cm dhe delta P > 30 mmHg
D) Zone < 0,5cm dhe delta P > 50 mmHg
E) Zone < 2,5cm dhe delta P > 25 mmHg

388. Cili nga të mëposhtmit nuk është një komplikacion i mundshëm i zëvendësimit të një valvule aortale?

- A) Shfaqja e një blloku dege të majtë
B) Dëmtim i ostiumeve koronare
C) Dëmtim i lembos anteriore mitrale
D) Endokardit infektiv
E) Shfaqje e një blloku dege të djathtë

389. Sipas protokolleve, cila nga të mëposhtmet nuk është një indikacion për trajtim kirurgjik për semundje të valvulës aortale.

- A) Paciente simptomatike me stenoze grave
- B) Paciente me stenoze grave asimptomatike qe duhet te bejne by pass aorto coronar
- C) Paciente me stenoze grave qe duhet te bejne nderhyrje kirurgjike ne aorte apo ne valvula te tjera
- D) Ne parandalimin e vdekjes se papritur ne paciente asimptomatike me stenoze aortale grave
- E) Ne paciente me stenoze te lehte por ku verehet nje progresion i shpejte i semundjes

390. Gjate nje nderhyrjeje kardiokirurgjike te by pass aorto koronar, perfuzionimi i qelizave hematike te perqendruara eshte:

- A) Gjithmone i nevojshem
- B) Kurre i nevojshem
- C) Kryhet gjithmone ne paciente me probleme te koagulimit
- D) Gjithmone i nevojshem ne nderhyrje qe kerkojne perdorimin e qarkullimit ekstrakorporal
- E) Asnje nga keto nuk eshte e sakte

391. Pas implantimit te nje valvule biologjike, terapi nga goja me warfarin:

- A) Nuk ka indikacion
- B) Ka indikacion dhe duhet te vazhdoje gjithe jeten
- C) Duhet marre per nje muaj
- D) Duhet marre per tre muaj
- E) Duhet marre per 1 vit

392. Ulçerat diabetike jane kryesisht:

- A) Pre maleolare
- B) Plantare
- C) Dorsale te kembes
- D) Pretibiale
- E) Popliteale

393. Mes shkaqeve te dhimbjes ekstra abdominale qe ngjasojne me abdomenin akut cila eshte jo e sakte?

- A) Infarkti i miokardit
- B) Embolia pulmonare
- C) Perikarditi
- D) Bronkiti azmatik
- E) Pulmoniti

394. Leukocituria është patognomonike me:

- A) Neoplazi vezikale
- B) Kalkuloze urinare
- C) Trauma të rrugëve urinare
- D) Infeksion urinar
- E) Veshke patkua

395. Tipi më i shpeshtë i kalkulave urinare është:

- A) Urate
- B) Fosfate-magnezium
- C) Oksalate kalciumi
- D) Cistina
- E) Xantina

396. Flebedema në fazat e saj fillestare karakterizohet nga:

- A) Edeme premaleolare e forte
- B) Edeme premaleolare e bute
- C) Infiamacion kronik premaleolar
- D) Diskromi premaleolare
- E) Ulçera kutane

397. Vena safena e vogël derdhet në:

- A) Venen safena e madhe
- B) Venen femorale
- C) Vene iliake interne
- D) Venen iliake eksterne
- E) Venen poplitea

398. Çfarë është një cistoskop?

- A) Instrument për të parë prostatën
- B) Instrument për të parë uterusin
- C) Instrument për të parë fshikëzën e urinës
- D) Instrument për të parë ureterin
- E) Instrument për të parë veshkën

399. Në aneurizmen e aortës abdominale cili nga pohimet e mëposhtme është i saktë?

- A) Vdekshmëria në pacientët që i nënshtrohen ndërhyrjes së menjëhershme riparuese është 80 – 90 %.

- B) Vendosja me e shpeshte e aneurizmes eshte ne 90% te rasteve mbi arteriet renale.
- C) Ne paziente me rupture te aneurizmes reziku i vedekjes para se te mberrijne ne spital eshte 70 – 80 %
- D) Bakteret jane pergjegjes per rreth 50 % te aneurizmave
- E) Vendosja me e shpeshte e aneurizmes eshte ne 90 % te rasteve poshte arterieve renale

400. Vena safena e madhe e ka origine:

- A) Posteriorisht maleolit intern
- B) Anteriorisht maleolit intern
- C) Anteriorisht maleolit lateral
- D) Posteriorisht maleolit lateral
- E) Ne nivelin e perforueses se hunter it.

401. Neoplazia me e shpeshte e fshikezes se urines eshte:

- A) Adenocarcinoma
- B) Karcinoma me qeliza te tranzicionit
- C) Sarkoma
- D) Limfoma
- E) Lejomiosarkoma

402. Arsyeja me e shpeshte e nje versamenti pleural hemorragjik eshte:

- A) Tuberkulozi
- B) Pulmoniti
- C) Mikoza
- D) Neoplazia
- E) Azma

403. Ne sindromen mediastinale organet e para qe influencohen nga rritja e presionit endomediastinal jane:

- A) Trakea
- B) Ezofagu
- C) Vena kava superiore dhe dy venat anonime
- D) Arteriet
- E) Nervat

404. Pacient 50 vjeç, duhan pires, pas nje sindromi influencial, paraqet nje insuficience respiratore te rendesishme. Ne torakocenteze aspirohen 1500 ml material sierohematik. Cila eshte diagnoza me e mundshme?

- A) Mesotelioma
- B) Tumor i pulmonit
- C) Pleurit tuberkular
- D) Empieme metapneumonare
- E) Sarkoidoze

405. Cila nga keto semundje nuk eshte nje indikacion per trapiant pulmoni?

- A) Adenocarcinoma
- B) Linfangiolejomiomatoza
- C) Enfizema
- D) Histocitoza x
- E) Fibroza cistike

406. Ne paciente me “kancer pulmoni me qeliza te vogla” te stadit iii° b, cili eshte trajtimi qe kryhet me shpesh?

- A) Kemioterapi + kirurgji + radioterapi
- B) Kirurgji + kemioterapi
- C) Kirurgji + kemioterapi + radioterapi
- D) Kemio + radioterapi
- E) Radioterapi

407. Nje hemoftoe me grafi toraksi ne projeksion antero posterior dhe laterolateral negative, mund te jete shkaktuar nga:

- A) Kaverne tuberkulare
- B) Perforacioin i ezofagut
- C) Pneumotoraks
- D) Karcinome e bronkut principal
- E) Kancer-abses

408. Ne atelektazi kemi:

- A) Reduktim te ajrit ne alveola
- B) Obstruksioni i nje bronku lobar jo gjithmone shkakton atelektazi
- C) Murmuris vescicularis eshte i ruajtur
- D) Zhdukje te te gjithë ajrit nga alveolat
- E) Pulmoni atelektazik i zhytur ne uje nuk shkon ne fund

1. Te gjitha gjendjet e meposhtme mund te sjellin hipoglicemi pervec njeres:

- A) Insulinoma
- B) Deficiti i glukozë-6-fosfatazes
- C) Morbus Addison
- D) Feokromocitoma
- E) Administrimi i insulines

2. Te gjitha pohimet e meposhtme mbi sindromen e dehidrimit jane te sakta pervec njeres:

- A) Ne kohen diabetike ketoacidozike,dehidrimi ndodh si pasoje e humbjeve urinare te Na⁺ dhe ujit
- B) Gjate diarrese mund te verehet dehidrim hipotonik i shoqeruar me hiponatremi
- C) C Te vjellat profuze provokojne hipernatremi me acidoze metabolike
- D) D Abuzimi me diuretike mund te provokojë dehidrim hipernatremik,ose me rralle hiponatremik
- E) E Ne diabetin e dekompensuar ka humbje urinare te Na⁺

3. Nje iker i lehte, i zbuluar gjate ekzaminimit te sklerave ne drite natyrale, zakonisht evidentohet kur vlerat e bilirubines plazmatike jane ndermjet :

- A) 1.5-2 mg/dl
- B) 3.5-4.5 mg/dl
- C) 2.5-3 mg/dl
- D) 1-1.5 mg/dl
- E) >5 mg/dl

4. Cili nga pohimet e meposhtme ben pjese ne rekomandimet e parashikuara nga guide – line

Nderkombetare ?

- A) Kryerja e mamografise duke filluar nga mosha 40 vjec
- B) Kryerja e kolonoskopise cdo 5 vjet duke filluar nga mosha 50 vjec
- C) Matja e kolesterolemise totale ne moshen 35 vjec
- D) Kryerja e ekzaminimit oftalmologjik cdo vit duke filluar nga mosha 50 vjec
- E) Matja e presionit arterial nje here ne vit nga te gjitha moshat

5. Ne demtimin akut pulmonar raporti PaO₂/FiO₂ (ku FiO₂ eshte perqendrimi i O₂ ne ajrin e inspiruar) eshte :

- A) Me pak se 100
- B) Midis 100-150
- C) Midis 150-200
- D) Me pak se 200
- E) Midis 200-300

6. Si paraqitet dispnea ?

- A) Gjithmone inspiratore
- B) Gjithmone ekspiratore
- C) Gjithmone inspiratore dhe ekspiratore
- D) Varet nga presionet ne qarkullimin e vogel
- E) Pavaresisht neqoftese eshte inspiratore ose ekspiratore

7. Gjate sinkopit vaso-vagal vihet re:

- A) Hipertoni vagale akute
- B) Stimulum i refleksit simpatik
- C) Reduktim i prurjes kardiake
- D) Te gjitha opsionet e mesiperme
- E) Asnje nga opsionet e mesiperme

8. Cila nga patologjite e meposhtme mund te jete shkak i insuficences renale akute postrenale ?

- A) Pielonefrit
- B) Diureze e shtuar
- C) Obstruksion i arterieve renale
- D) Hipertrofi e prostates
- E) Kalkuloze vezikale jo obstruktive

9. Cianoza, eshte e zakonshme ne te gjitha gjendjet e meposhtme pervec :

- A) Poliglobuli
- B) Emboli pulmonare masive
- C) Methemoglobinemia
- D) Ekspozimi i zgjatur ne lartesi te medha mbi nivelin e detit
- E) Anemia grave

10. Etiologjia e anoreksise nervore eshte pasoje e :

- A) Reduktimit te nivelit te LH-RH
- B) Reduktim te nivelit te LH
- C) Reduktim te nivelit te IGF-I (somatomedina C)
- D) Ulje e funksionit te tiroides
- E) Crregullim i sjelljes se ushqyerjes mbi baze psikike

11. Cilat jane alterimet hemodinamike ne shokun hipovolemik ?

- A) Hipotension,bradikardi, rezistenca periferike normale ose te uleta, ulje te presionit venoz qendror
- B) Hipotension, takikardi, rritje te rezistencave periferike, ulje te presionit venoz qendror
- C) TA normal ose i rritur, frekuence kardiake normale ose te ulur, rezistenca periferike te reduktuara, rritje te presionit venoz qendror
- D) Hipotension, takikardi, rezistenca periferike te reduktuara, presion venoz i ulet
- E) Nuk ka alterime hemodinamike se vihen ne funksion mekanizmat kompensatore

12. Cila nga alternativat e meposhtme ka nje funksion fiziologjik te rendesishem te kriprave biliare?

- A) Konjugim i tyre me toksinat ne menyre qe te favorizohet ekskretimi i tyre
- B) Lejimin e eliminimit te produkteve si pasoje e shkaterrimit te hemoglobines
- C) Lehtesimin e absorbimit te yndyrnave ushqimore
- D) Lejon absorbimin e Vit B12
- E) Ruajtja e nivelit normal te pH intenstinal

13. Versamenti pleural hemoragjik, gjendet ne te gjitha situatat e meposhtme pervec :

- A) Emboli pulmonare
- B) Kancer pulmoni
- C) Dekompensim kardiak
- D) Mezotelioma
- E) Kancer gjiri

14. Te gjitha rastet e meposhtme jane shkak i hipokalcemise pervecse :

- A) Hipoparatiroidizmi
- B) Sindroma Cushing
- C) Rritje e sekretimit te kalcitonines
- D) Hiperparatiroidizmi
- E) Hipovitamina D

15. Embolia gazore nen ujore favorizohet nga :

- A) Hiperventilim nga frymemarrja e drejtuar
- B) Hiperventilimi me O₂
- C) Zhytje ne uje ne periudha kohore te shkurtra
- D) Aktivitet fizik i pamjaftueshem
- E) Raca kaukaziane

16. Osteoporoza e tipit te I eshte pasoje e deficitit te hormonit :

- A) Kalcitonine
- B) Testosteronit
- C) Estrogjenit
- D) Parathormonit
- E) Hormonit tireotrop

17. Niveli plazmatik i peptidit natriuretik atrial ne nje pacient me dekompenzim kardiak kronik eshte i lidhur me :

- A) Moshen e pacientit
- B) Seksin dhe moshen e pacientit
- C) Graden e demtimit funksional
- D) Vlerat e presioni sistolik
- E) Nivelin e atheroskleroze te arterieve koronare

18. Cila nga barnat e meposhtme eshte zgjedhja e pare ne parandalimin e fibrilacionit ventrikular gjate infarktut akut te miokardit ?

- A) Lidokina
- B) Digoksina
- C) Kinidina
- D) Flekainidi
- E) Propanololi

19. Gjate polisonografise mund te vleresohen te gjithë parametrat e meposhtem pervec nje:

- A) Elektroencefalograma
- B) Elektrokardiograma
- C) Saturimi i O₂
- D) Diureza
- E) Elektromiografia tibiale

20. Si konstatohet prania e edemes ne nje gjymtyre ?

- A) Palpimi siperfaqesor i zones se dyshuar
- B) Kompresioni digital mbi zonen kockore
- C) Vleresimi manual i temperatures lokale
- D) Manovra e Perth
- E) Palpimi i pulsit arterial

21. Cila nga anomalite elektrolitike te meposhtme vihen re me shpesh ne morbus Addison ?

- A) Hiperglicemi
- B) Hipokalcemi
- C) Hipokalemi
- D) Hipernatremi dhe hipokalemi
- E) Hiponatremi dhe hiperkalemi

22. IgA prodhohen nga :

- A) Pneumocitet e tipit te I
- B) Pneumocitet e tipit te 2
- C) Qelizat endoteliale
- D) Qelizat e epitelit bronkial
- E) Makrofaget alveolare

23. Acidoza respiratore e dekompesuar, ne hemogazanalize, karakterizohet nga :

- A) Rritje e Ph, rritje PaO₂, ulja e PaCO₂
- B) Ulja e Ph, rritje e PaCO₂
- C) Ulja e Ph, ulja e PaCO₂

- D) Rritje e Ph, ulja PaCO₂, BE negative
- E) Ph normal, ulje e PaCO₂, BE negative

24. Cila nga shenjat e meposhtme nuk eshte tipike e arrestit cirkulator ?

- A) Frymemarrje agonike (gaspig)
- B) Mungese te toneve kardiake ne askultim
- C) Kriza mioklonike
- D) Midriaza
- E) Mungese e pulsit arterial periferik

25. Rreziku kardiovaskular rritet mbi te gjitha kur :

- A) Rritet e indit adipoz subkutan
- B) Rritet e indit adipoz visceral
- C) Rritet e indit adipoz kaf
- D) Ulja e indit adipoz te bardhe
- E) Ne asne nga rastet e mesiperme

26. Ne cilen nga rastet e meposhtme, ka me shume probabilitet, shfaqja e edemes vetem ne nje nga gjymtyret inferiore ?

- A) Arteriopatia kronike obliterante
- B) Flebiti
- C) Nefriti
- D) Insuficenca kardiake
- E) Hipoproteinemia

27. Te gjitha pohimet e meposhtme rreth semundjes se Alzheimer jane te verteta, pervec :

- A) Gjetjet patologjike perfshijne nderthurjen neurofibrilare dhe degjenerimin neuronal
- B) Pjesa me e madhe e rasteve jane familjare
- C) Aktiviteti kortikal cerebral i colin-acetiltransferazes, eshte i reduktuar
- D) Simptomat fillestare shpesh stimulojne depresionin
- E) Nuk ka hetime specifike laboratorike patologjike

28. Ne sindromen hepatorenale:

- A) Urina eshte padyshim hematurike
- B) Kolesterolemia eshte e rritur
- C) Diureza i kalon 1500ml ne dite
- D) Diureza eshte me pak se 300 ml ne dite
- E) Glukozuria eshte gjithmone e pranishme

29. Ne oftalmopatine Bazedoviane te gjitha pohimet e meposhtme jane te verteta pervec :

- A) Mund te paraprije ose te ndjeke disfunktionin e tiroides
- B) TSH eshte i ulur ne morbus Graves
- C) Normalizimi i funksionit te tiroides ka si rezultat permiresimin e oftalmopatis Bazedoviene
- D) Fibroblastet prodhojne acid hialuronik dhe si rezultat kemi trashje ne indit retrobulbar
- E) Prek me shpesh femrat se sa meshkujt

30. Ne fazen paraprirese te okluzionit intestinal mekanik te kolonik kuadri klinik karakterizohet nga :

- A) Te vjella fekaloid
- B) Dhimbje abdominale ne forme krampesh
- C) Mbrojtje abdominale e gjeneralizuar
- D) Mungese e peristatikes
- E) Temperature e larte

31. Te gjitha shkaqet e meposhtme jane shkaktare te arrestit kardiak, pervec :

- A) Blloku atrio-ventrikular i grades III-te
- B) Disfunksion elektrik
- C) Asistoli
- D) Takikardi ventrikulare
- E) Shoku kardiogjen

32. Te gjitha indikimet e meposhtme ne terapine e flebotrombozes se thelle ne nje grua shtatzane jane te gabuara pervec:

- A) Heparina me peshe molekulare te ulet eshte e kunderindikuar ne tremujorin e trete te shtatzanise
- B) Terapia me warfarine eshte e kunderindikuar vetem ne tremujorin e pare te shtatzanise

- C) Terapia me warfarine eshte e kunderindikuar gjate gjithë shtatzanise, por jo gjate periudhes se laktacionit
- D) Terapia me warfarine eshte e kunderindikuar si ne periudhen pre-partum dhe ne ate post-partum
- E) Te gjitha masat terapeutike qe aplikohen ne nje grua jo shtatzane perdoren dhe ne nje grua shtatzane

33. Cilat nga te meposhtmet, eshte nje faktor risku per kancerin e vesikes urinare ?

- A) Ekspozimi kronik ndaj alkoolit
- B) Trajtim i zgjatur me ciklofosamid
- C) Karcinome renale ne antecedent
- D) Histori familjare per karcinomen vesikale
- E) Infeksion nga Schistosoma Mansoni

34. Nje pacient paraqitet me likid te lire peritoneal ,splenomegali, hemoroide, hiperaldosteronizem, deficit te faktoreve te koagulacionit dhe hipoalbuminemi. Rreth ciles prej patologjive te meposhtme duhet te orientoheni ?

- A) Dekompesim kardiak kongjestiv
- B) Neoplazi abdominale
- C) Sindromi nefritik
- D) Cirroze hepatike
- E) Semundje limfoproliferative

35. Nje grua e re 33-vjec eshte diagnostikuar me anemi hipokrome mikrocitare (me Hb 7,3 g/dl, hipoferitinemi), pas dy shtatzanive ne tre vitet e fundit dhe menstruacione ne sasi te madhe prej dhjete muajsh. Ne dy muajt e fundit mjekohet per os me 40 mg Fe te thjeshte ne formen e kriperave te hekurit. Perse ne kete rast kemi nje deshtim te pergjigjes ndaj terapise?

- A) Prania e humbjeve te tjera hematike
- B) Absorbim i demtuar intestinal i hekurit
- C) Doze e pamjaftueshme e hekurit te dhene.
- D) Formula kimike e hekurit te dhene
- E) Indikimi terapeutik i gabuar

36. Cila eshte menyra me korrekte ne menaxhimin e shokut ?

- A) Njohja e shpejte e simptomave te para- ruajtja e funksioneve vitale-identifikimi i menjehershem i shkakut primar- korrigjimi i shkakut-menaxhimi i komplikacioneve
- B) Te mos nderhyhet me asnje trajtim terapeutik, pa u identifikuar shkakun primar
- C) Mbajtja nen vezhgim e pacientit deri sa te shfaqen komplikacionet e para per te cilat duhet trajtuar menjehere
- D) Kufizimi ne nje trajtim simptomatik per te evituar demtimet e hipoperfuzionit
- E) Transferimi i menjehershem ne reanimacion

37. Insuficenca renale akute funksionale mund te jete pasoje e :

- A) Kalkulozes se rrugeve urinare
- B) Obstruksion i rrugeve urinare
- C) Abuzim me aminoglukozidik
- D) Ulja e volumit ekstra qelizor
- E) Nekroze kortikale bilaterale

38. Granulomatoza e Inflammuar eshte karakteristike e :

- A) Arteriti Takayasu
- B) Lupusi eritematoz sistemik (LES)
- C) Panarteriti nodoz
- D) Sklerodermia
- E) Sindromi Sjogren

39. Ne pacientet me emfizeme pulmonare nga SPOK gjate spirometrise verehen alterimet e meposhtme, pervec:

- A) Rritja e kapacitetit pulmonar total
- B) Reduktim i FEV 1
- C) Rritja e volumit residual
- D) Rritja e kapacitetit vital
- E) Demtim i difuzionit gazor

40. Nje pacient 41 vjecar i shendetshem deri 5 dite me pare kur iu shfaq nje dhimbje therese ne 1/3 e poshtme te hemitoraksit te djathte, qe forcohet me teper nga inspirimi i thelle, kolle dhe temperature. Ritmi dhe frekuenca kardiake normale, pa zhurma kardiake ose vaskulare. Pa turgor venoz jugular. Pas disa ditesh dhimbja ne hemitoraks zbutet dhe ne ekzaminim fizik verehet reduktim i FVT-se, mbytje dhe reduktim i zhurmave

respiratore ne hemitoraksin e djathte, hemitoraksi i majte normal. Cila nga situatat patologjike pershtatet me teper me ekzaminimin fizik te pershkruar me siper ?

- A) Pneumotoraks
- B) Emboli pulmonare
- C) Empieme pleurale
- D) Versament pleural
- E) Bronkopneumoni

41. Te gjithë faktoret e meposhtem favorizojne formimin e edemave, pervec:

- A) Rregjim shtrati i zgjatur
- B) Rritja e presionit arterial
- C) Rritja e presionit venoz
- D) Clirimi lokal i kininave
- E) Staza limfatike

42. Ne rastet me angina pectoris te paqendrueshme, cila duhet konsideruar terapia baze, pervec atyre qe jane te nevojshme per te kontrollaur simptomat e angines?

- A) Aspirin 100 mg/dite
- B) Aspirin 325 mg/dite + kalciparina 0,5 mg/ dy here ne dite
- C) Diltiazem 360 mg/ dite
- D) Verapamil 240 mg + nifedipine 40 mg/ dite
- E) Trinitrine sublingual sipas nevojës

43. Cila nga teknikat e meposhtme sherben per ekzaminimin invaziv te aparatit kardiovaskular ?

- A) Angiokardiografia
- B) RMI
- C) Ekokardiografia
- D) EKG
- E) CT me 64 shtresa

44. Te gjitha klasat e meposhtme perdoren ne trajtimin e angina pectoris te paqendrueshme, pervec :

- A) Nitrateve
- B) Beta bllokuesve

- C) O2 terapi
- D) Digoksina
- E) Kalci bllokuesit

45. Nje grua 52 vjec paraqitet me psoriazis te gjeneralizuar. Kesaj situate mund t'i bashkangjiten te gjitha patologjite e meposhtme,pervec :

- A) Uveit anterior
- B) Artrit
- C) Pleurit
- D) Hiperuricemi
- E) Carje e thonjve

46. Jane shkaqe te shpeshta te temperatures, interpretuar ne fillim si temperature ndd rastet e meposhtme, pervec :

- A) Tiroidit subakut
- B) Limfoma Hodgkin
- C) Granulomatoza Vegener
- D) AIDS
- E) Hepatit viral akut i tipit B

47. Oligouria hipertonike, acidoza metabolike, hiperkalemia, konfigurojne kuadrin klinik-laboratorik te:

- A) Diabetit mellitus te dekompesuar
- B) Diabetit insipid
- C) Insuficences renale kronike
- D) Fazes funksionale te insuficences renale akute
- E) Faza poliurike e insuficences renale akute

48. Cila nga pohimet e meposhtme prezanton informacionin me te sakte mbi prognozen e fazes malinje te hipertensionit?

- A) Niveli presionit sistolik
- B) Niveli i presionit diastolik
- C) Ndryshimet ne ekzaminimin e fundus okulit
- D) Alterimet e funksionit renal
- E) Dimensionet kardiake

49. Fraksioni i eskretimit te natriumit te filtruar normalisht eshte :

- A) Me i vogel ose e barabarte me 1%
- B) 1,5-3%
- C) 3-4,5%
- D) 4,5-6%
- E) 6,5-8%

50. Prej disa muajsh pacienti ankon per dispne nga sforcimet fizike te moderuara fillimisht te toleruara mire por qe me pas agravohen. Prej disa javesh zgjohet shpesh naten me ndjesine e mungeses se ajrit. Prej disa kohesh fle me dy jasteke te medhenj. Cilat nga sindromat e meposhtme korrespondon me kuadrin klinik te pershkruar ?

- A) Insuficence ventrikulare e majte
- B) Dekompesim kardiak i djathe
- C) Kriza paniku
- D) Astma bronkiale
- E) Insuficence e arterieve koronare

51. Ne shokun hipovolemik, ne baze te fispatologjise te tij, cilat nga parashikimet e meposhtme eshte jo i sakte ?

- A) Administrim i oksigjenit
- B) Vendosja e pacientit ne pozion me koken poshte
- C) Administrimi i vazokonstriktoreve per mbajtjen e presionit arterial
- D) Administrimi i solucioneve koloidale endovenoze
- E) Monitorimi i presionit venoz qendror

52. Cili do te ishte menaxhimi korrekt ndaj nje subjekti qe ekspozohet aksidentalisht ndaj virusit te hepatitit viral B, i cili nuk eshte i vaksinuar ?

- A) Administrimi i nje doze te imunoglobulinave specifike
- B) Fillimi i vaksinimit
- C) Administrimi si i nje doze te vaksinimit dhe i nje doze te imunoglobulinave specifike
- D) Administrimi i nje doze antibiotiku
- E) Administrimi vetem i nje doze te vaksinimit

53. Morbus Graves

- A) Eshte nje forme e hiperfeksionimit surrenalien

- B) Eshte nje forme e hipotiroidizmit me etiologji autoimune
- C) Eshte nje forme e hipertiroidizmit
- D) Asnje nga pergjigjet e mesiperme
- E) Eshte nje forme e hipotiroidizmit me etiologji infektive

54. Cila nga variantet e meposhtmet do te ishte procedura me urgjente ndaj nje subjekti 21 vjecar me astme bronkiale, i trajtuar ambulatorisht me beta agonist, teofiline, steroid i/v, simptomatik prej disa oresh, qe prezantohet ne urgjence me djerse profuze, teper i axhituar, i paafte per te folur, qe heq shpesh masken e oksigjenit, me hipoventilim, dhe dispne sibilante te dobesuar ?

- A) Trajtimi sistematik me kortikosteroid
- B) Kromoglikat te natriumit me rruge inhalatore
- C) Kontakt telefonik me mjekun personal mbi ndryshimet e fundit ne anamneze
- D) Pergatitje per intubim endotrakeal
- E) Ipratropium bromidi ne rruge inhalatore

55. Per vendosjen e diagnoses te Aspergilozes bronkopulmonare alergjike, ne nje person me astme bronkiale dhe infiltrat pulmonar rekurente, cilet nga testet e meposhtem do te ishte me i pershtatshem ?

- A) Testi kutan i vonuar (i ngjashem me tuberkulinen) Aspergilus Fumigatus
- B) Prania e eozinofileve
- C) Reaksion kutan i shpejte i Aspergilus fumigatus
- D) ANA-pozitive
- E) Prania e neutrofileve ne lavazhin bronko-alveolar

56. Cilat nga grupet e markuesve eshte tipik ne periudhen fillestare te hepatit B ?

- A) HBsAg, HBeAg ;anti HBc-IgM
- B) HBsAg; anti HBc IgG
- C) HBsAg, HBcAg; anti HBe
- D) HBsAg; anti HBe
- E) Anti HBs; anti HBc

57. Tamponada kardiake eshte emergjence mjeksore qe ndodh si pasoje:

- A) Nga nje goditje e forte torakale

- B) Nga nje stenoze mitrale severe
- C) Nga akumulimi i likidit nen presion, ne kavitetin perikardial
- D) Aksident rrugor
- E) Stenoze aortale severe

58. Ne mungese te antibiogrames, cilin nga keta antibiotike do te zgjidhni si me efektiv kunder stafilokokut ?

- A) Ceftazidime
- B) Piperacilline
- C) Amoksiciline + Ac. Klavulonik
- D) Klaritromicine
- E) Metronidazol

59. Feokromocitoma eshte nje neoplazi e ciles prej strukturave te meposhtme :

- A) Korteksit surrenal
- B) Medules renale
- C) Medules surrenale
- D) Hipofizes
- E) Timus

60. Fenomeni Raynaud mund te lidhet me :

- A) Erisipelen
- B) Sklerodermine
- C) Dermatitin
- D) Tromboflebitin
- E) Limfadenitin

61. Nga zbulimi ne nje analize rutine i ritjes se perqendrimit plazmatik te CPK-se, cila nga gjendjet e meposhtme duhet te konsiderohet ne plan te pare?

- A) Konstipacion te rende
- B) Praktimi i body building
- C) Diete hiperproteinemike
- D) Atak paniku
- E) Kolelitiaza

62. Hipertiroidizmi subklinik lidhet me :

- A) Nivel te larta te TSH-se
- B) Nivel te ulet te rT3
- C) Nivel te ulet te TSH-se dhe nivel normal te FT4
- D) Nivel te ulet te TSH-se dhe nivle te larte te FT4
- E) Rrritje te titrit te antikorpeve

63. Cilat nga te meposhtmet, nuk eshte shkak i drejtperdrejte i anemise ?

- A) Hemoragjia
- B) Hemoliza e shtuar
- C) Insuficence e eritropoezes
- D) Gastrektomia totale
- E) Dekompesimi kardiak

64. Cili nga hormonet e meposhtme mund te jape hiponatremi ne qofte se eshte shtuar sekretimi tij?

- A) Angiotensina II
- B) ANP (peptidi natriuretik atrial)
- C) Vazopresina
- D) Aldosteroni
- E) Testosteroni

65. Cili nga faktoret e riskut per semundje kardiovaskulare eshte edhe faktor risku per disfunksion erektil:

- A) Duhanpirja
- B) Dislipidemia
- C) Diabeti Melitus
- D) Te gjitha pergjigjet
- E) Jeta sedentare.

66. Cila nga demtimet e meposhtme karakterizon cor-inpulmonar?

- A) Hipertrofi e ventrikulit te djathte
- B) Dilatacion i ventrikulit te majte
- C) Shunti interventrikular nga e majta ne te djathte
- D) Persistenca e Ductus Botali apertum
- E) Sindromi Claude-Bernard-Horner

67. Shkaku kryesor i obstruksionit të rrugëve të frymëmarrjes në pacientin pa koshienca është:

- A) Rënia e gjuhës
- B) Fleksioni i epiglottit
- C) Bronkospazma
- D) Obstruksioni i peshtymës
- E) Kolapsi i trakës

68. Cila nga pohimet e mëposhtme në lidhje me interesimin renal në dekursin e LES është e sakte:

- A) Semundja renale klinikisht e rëndësishme prek gati 90% të pacientëve me LES
- B) Nefriti është një gjetje e rrallë në biopsinë renale
- C) Biopsia renale mund të mos jetë e nevojshme në pacientet me sediment të rritur dhe me përkeqesim progresiv të funksionit renal
- D) Interesimi renal është i rrallë në pacientet me titër të lartë të antitropave anti ADN me helike dyfishe
- E) Ekzaminimi i urines në LES zakonisht zbulon proteinuri por jo hematurie ose crregullime të tjera të sedimentit urinar

69. Në insuficiencën respiratore të obezitetit:

- A) Dëmtimi funksional është kryesisht gjatë fazës inspiratore
- B) Dëmtimi funksional është kryesisht gjatë fazës ekspiratore
- C) Të dyja fazat e ventilimit janë të kompromentuara
- D) Është i dëmtuar shkëmbimi alveolo-kapilar i gazeve
- E) Rritet vëllimi rezidual

70. Hipokalcemia në insuficiencën renale kronike shkaktohet nga:

- A) Hiperkalciuria
- B) Marrjet e pakta të kalciumit nga ushqimi
- C) Mungesa e vitaminës D aktive
- D) Mungesa e PTH
- E) Hiperparatiroidizmi

71. Të gjithë antihipertensivët e mëposhtëm janë të kundershikuar në shtatzani me përjashtim të:

- A) Beta-blokues
- B) Frenuesit e enzimës së konversionit

- C) Calci antagonistet
- D) Nitratat
- E) Diuretiket

72. Hipertensioni arterial ne insuficencen renale kronike shkaktohet nga:

- A) Stenoza e arteries renale unilaterale
- B) Stenoza e e arterieve renale bilaterale
- C) Rritja e volumit jashteqelizor nga retensioni Na
- D) Hiperaldosteronizmi primar
- E) Sindromi Barter

73. Balloni aortik:

- A) Eshte nje pajisje qe mban qarkullimin ne kushtet e debitit te ulur
- B) Permiroson perfuzionin coronar gjate diastoles
- C) Redukton pasngarkesen ne sistol
- D) Vendoset ne aorten torakale
- E) Te gjitha pergjigjet e mesiperme

74. Pasojat klinike me te shpeshta te Tiroiditit te Hashimotos:

- A) Hipertiroidizmi subklinik
- B) Galaktorrea
- C) Hipoparatiroidizmi
- D) Hipertiroidizem ne fazen e pare dhe hipotiroidizem me pas
- E) Semundje te tjera autoimune

75. Te gjitha pohimet e meposhtme jane karakteristike te detresit respirator te te rriturit me perjashtim te:

- A) Reduktimi i pO₂ me rritje pCO₂
- B) Dementimi alveolar
- C) Dilatacioni rrugeve te frymemarrjes
- D) Rritja e debitit kardiak
- E) Takikardia

76. Te gjitha shkaqet infektive jane shkaqe te mundshme per hemoptizi vec:

- A) Murtaja
- B) Abcesi pulmonar

- C) TBC miliar
- D) Bronkoekatzine
- E) Pneumonia stafilokoksike

77. Pankreatiti akut me nekroze te infektuar:

- A) Ka prognoze te njejte me pankreatitin infeksioz
- B) Nuk kerkon mjekim me nderhyrje kirurgjikale
- C) Eshte rasti qe kerkonvetem mjekim me inhibitore te proteazes
- D) Eshte rasti qe lejon ushqyerjen normale
- E) Asnje pohim nuk eshte i vertete

78. Nje djale 23 vjec ka patur hematuri te perseritura vitin e fundit. Cdo episod eshte paraprire nga infeksion i rrugeve te siperme te frymemarjes. Egzaminimi objektiv dhe ai i funksionit renal jane normal. Egzaminimi i urines tregon hematuri e gjurme proteine. Cfare ka me shume mundesi te tregoje biopsia renale:

- A) Proliferim ekstrakapilar te gjere
- B) Proliferim mezangial difuz
- C) Semundje polikistike renale
- D) Depozitim difuz te IgA ne imunofluoreshence
- E) Depozitim ne kapilar te C3 ne imunofluoreshence

79. "Semundja nga djegja" percaktohet nga prania e

- A) Perfshirje ne masen mbi 20% te trupit te adultit
- B) Perfshirje ne masen mbi 5% te trupit te femijes
- C) Shoku septik
- D) Hemoragjia gastrike
- E) Komplikacione Pulmonare

80. Cili nga ptogenet e meposhtem eshte me shpesh pergjegjes per Pyelonephritin Acut?

- A) Klebsiella
- B) Chlamidia
- C) Escherikja Coli
- D) Pseudomona
- E) Candida

81. Edemat e gjymtyreve manifestohen ne te gjitha keto raste klinike me perjashtim te:

- A) Hepatit alkoolik
- B) Cirhozis Heparit
- C) Insuficiencia Kardiake
- D) Sindroma nefrotike
- E) Insuficiencia venoze e ekstremiteteve inferiore

82. Ne cilin nga rastet e meposhtme me insuficiencia respiratore eshte gjithnje i rritur PaCO₂:

- A) Ne insuficiencen ventilatore te pompes
- B) Ne insuficiencen e shkembimit te gazeve ne mushkri
- C) Ne papershtatshmerine e arritjes/transportit/perdorimit te oksigjenit
- D) Ne te gjitha keto raste
- E) Ne asnje nga rastet e mesiperme

83. Nje mase pulmonare e zbuluar nga Ra-Grafia Torakale mund te jete shprehje e nje prej ketyre patologjive, pervec:

- A) Tuberkulozi post-primar
- B) Mycetoma
- C) Pneumonia nga stafilokoku
- D) Pneumonia nga mycoplasma pneumonie
- E) Pneumoniti nga pneumocisti carini

84. Ateroskleroza eshte:

- A) Nje fenomen fiziologjik i lidhur me moshen e pacientit
- B) Nje patologji ne proporcion te drejte me rritjen e nivelit te kolesterolit ne gjak
- C) Nje ngjarje me etiologji multifaktoriale
- D) Ka ne menyre ekskluzive si moment te pare, fenomene te tipit infeksioz ne dem te arterieve me kaliber te meseme te madh.
- E) Nje patologji qe nuk lidhet me diabetin e cregullimet metabolike

85. Te gjitha agjentet patogene te meposhtem jane shkak i shpeshte per shock septik pervec:

- A) Koket gram pozitive (Stafilokok Enterokok)

- B) Leptospiroza
- C) Enterobacteret
- D) Pseudomonas spp
- E) Neisseria meningitis

86. Cili nga cregullimet elektrolitike te meposhtme jep shfaqjen e nje zgjatje te QT dhe pranine e vales U ne EKG.

- A) Hipokalemia
- B) Alkalozia
- C) Hipercalcemia
- D) Hiperkalemia
- E) Hiponatremia

87. Cila nga klasat farmakologjike te meposhtme nuk i jepet pacienti me bllok A-V me te madhe se grada e I ose me Sindrom te Sinusit te Semure

- A) ACE-Inhibitoret
- B) Diuretike te Anses
- C) Beta- bllokuesit
- D) ARB
- E) Calci-bllokuesit

88. Cistet granulare provokojne leziona te mukozes:

- A) Nazale
- B) Orofaringeale
- C) Ezofageale
- D) Auricolare
- E) Rectale

89. Arteriti i Hortonit mund te kete komplikacion shfaqjen e:

- A) Aneurizem te aortes abdominale
- B) Disekacion te harkut te aortes
- C) Obstruksion te Arteries Subclavia
- D) Amaurozis
- E) Te gjitha jane te verteta

90. Me Eriteme kuptojme:

- A) Skuqje te lekures qe zhduket nga presioni dixhital
- B) Skuqje te lekures qe nuk zhduket nga presioni dixhital
- C) Skuqje te lekures me vezikula
- D) Ngritjes te nje zone te lekures e rrethuar me edeme
- E) Skuqje te lejures me prurit te shprehur

91. Dieta Hipo sodike pershkruhet:

- A) Ne te gjithë pacientet me IRK me terapi konservative
- B) Vetem ne pacientet me IRK, Hipertension Arterial e Edema
- C) Vetem ne pacientet me IRK si pasoje e GNK
- D) Vetem ne pacientet me IRK nga Pyelonefriti Chronik
- E) Vetem ne pacientet uremike ne Hemodialize

92. Te gjithë pohimet e meposhtme per limphomen Hodgkiane jane te sakta pervec:

- A) Semundja cfaqet ne disa paciente vetem me prurit te gjeneralizuar
- B) Eshte karakteristike limphoadenomegalia e vetme ose e shumfishte jo dhimbshme
- C) Ethe, djersitje dhe humbje te peshes mbi 10%, te pranishme njekohesisht, keqesojne dukshem prognozen
- D) Trajtimi e prognoza varen nga stadi klinik
- E) Limphoma e Hodgkinit eshte zakonisht rezistente ndaj Radioterapise

93. Demtimet qe mund te cfaqen nga nje radio terapi jane:

- A) Proporcionalisht me dozen e administruar
- B) Proporcionale me llojin e fraksioneve
- C) Proporcionale me zgjatjen e radio terapise
- D) Proporcionale me siperfaqen e rezatuar te indit
- E) Te gjitha pergjigjet e mesiperme

94. Polimialgja Rheumatizmale:

- A) Eshte nje sinovit jo-eroziv i artikulacioneve te shpatullave e te strukturave periartikulare
- B) Prek me shume burrat nen 40 vjec
- C) Shkaktohet nga infeksionet e perseritura streptokoksike te Tonsilave
- D) Shoqeron purpuren Schonlejn-Henoch
- E) Shoqerohet me pozitivitetin e anitikorpit JO1

95. Te gjitha anomalite imunologjike te meposhtme lidhe me infeksioni nga HIV me perjashtim te:

- A) Ulje e numurit qarkullues te limfociteve T4
- B) Raporti i limfociteve T4 e T8 (supresor) >1
- C) Alergjia Kutane ndaj antigeneve te zakonshem per teste Kutane
- D) Ulje e funksionit te qelizave T citotoksike
- E) Rritje te funksionit te beta2- microglobulines

96. Cili nga diuretiket e meposhtem nuk eshte nje Kalikursyes

- A) Amiloridi
- B) Spironolactoni
- C) Triamtereni
- D) Acidi Etacrinik
- E) Metoprololi

97. Te gjitha kushtet e meposhtme jane shkaqe tipike te Insuficiences Kardiake Diastolike pervec:

- A) Hipertensioni Arterial me hipertrofi te ventrikulit te majte
- B) Takiaritmia
- C) Hipertireoza
- D) Miokarditi Viral
- E) Fibroza e Miokardit

98. Cfare shenje nuk gjendet ne Stenozen Mitrale:

- A) Zhurme diastolike me theksim presistolik
- B) Puls i shpejte
- C) Theksim te tonit te dyte ne maje
- D) Theksim te tonit te dyte ne baze
- E) Toni i forte i hapjes

99. Cili nga te meposhtmet eshte shkaku me i shpeshte i Embolise Pulmonare

- A) Tromboze e venave siperfaqesore te gjymtyreve inferiore
- B) Tromboze e atriumit te djathe
- C) Tromboze e venave te thella te gjymtyreve te poshtme
- D) Endokarditi bakterial
- E) Emboli gazore nga frakturat

100. Cila nga barnat e poshteshenuara jane te indikuar ne terapine e krize se gutes ?

- A) Penicilina
- B) Klofibratet
- C) Kolestiramina
- D) Kortizoni
- E) Allopurinol

101. Cili nga barnat e meposhtme eshte i kundraindikuar ne nje pacient i diagnostikuar rishtaz, rastesisht me ane te nje EKG-je me fibrilacion atrial ?

- A) Beta bllokues +ACE inhibitor
- B) Digoxina
- C) Beta stimulues
- D) Acenokumaroli
- E) Kalci-antagonistet

102. Jane te gjitha shkaqe te deficitit te Vit 12 pervec :

- A) Diete e papershtatshme (psh vegjetarizmi)
- B) Absorbim i pamjaftueshem
- C) Ekskretimi rritur
- D) Ulceretozofageale
- E) Perdorimi i pamjaftueshem

103. Cila nga semundjet infektive te meposhtme kane transmetim orofekal ?

- A) Difteria
- B) Malaria
- C) Varicela
- D) Sifilizi
- E) Tifo

104. Te gjitha pohimet e meposhtme rreth astmes bronkiale jane korrekte, pervec:

- A) Eshte nje semundje inflamatore e mukozes bronkiale

- B) Eshte nje semundje kronike me shperthime riakutizuese nga faktore te ndryshem
- C) Eshte nje semundje qe karakterizohet nga dispne dhe ndjesia e mbytjes torakale
- D) Eshte nje semundje e karakterizohet nga bronkospazma reversibile
- E) Eshte nje semundje qe shoqerohet me dekompensim kardiak

105. Ne hiperaldosteronizmin primitiv verehet:

- A) Rritje e renines dhe aldosteronit plazmatik
- B) Hipokalemi dhe acidoze metabolike
- C) Ulje e renines dhe rritje e aldosteronit plazmatik
- D) Rritje e ekskretimit urinar te Na dhe Cl
- E) Ulje e ekskretimit te K dhe Cl

106. Cila nga opsionet e meposhtme te ben te mendosh se nuk kemi te bejme me nje sinkop , por me krize epileptike ?

- A) Zgjatja mbi 10 sekonda
- B) Nje plage ne skalpin e kokes
- C) Parandjenja e episodit
- D) Urinimi i pavullnetshem
- E) Pergjumja ne momentin e berjes koshient

107. Nivelet e larta te prolaktines mund:

- A) Te bllokojne sekretimin pulsatil te GnRH
- B) Te shkaktoje ulje te nivelit te testosteronit
- C) Shkakton ulje te libidos
- D) Te gjitha jane te sakta
- E) Te provokoje amenorre

108. Pacientet me trauma (kontuzion) kardiake mund te trajtohen me te gjitha medikamentet e meposhtme pervec se me :

- A) Antiaritmike
- B) Anksiolitike
- C) Antikoagulante
- D) Analgjezike
- E) Antibiotike

109. Ne pacientet me ketoacidoze diabetike eshte me e rendesishme te normalizohet:

- A) Niveli i fosfatit
- B) Bikarbonatet
- C) Kalciumi
- D) Kaliumi
- E) Magneziumi

110. Pacientia 73 vjec, me diabet tip II, qe trajtohet me insuline, gjendet nga familjaret pa ndjenja para TV dhe dergohet ne urgjence. Aty regjistrohen keto te dhena: pacientja ne gjendje kome, qe i pergjigjet vetem stimujve te dhimbshem, TA 90/70 mmHg, puls i rregullt me frekuence 34 rr/min, frekuenca respiratore 20/min. Lekura e ftohte dhe pak e djesitur. Sat. i O₂, 94% , glicemia 64mg/dl. Ne EKG vihet re bllok atrio-ventrikular i grades se trete. Cila nderhyrje terapeutike eshte me urgjente ?

- A) Intubimi i pacientes dhe ventilimi mekanik
- B) Vendosja e nje pace-maker te perkohshem ne pritje te atij perfundimtar
- C) Infuzioni me solucion NaCl 0.9%, 2l/ore
- D) Infuzioni venoz i 50ml glukoze 20%
- E) Infuzioni i dopamines 7mcg/kg/min

111. Cili nga elementet e meposhtem perben kunderindikacion relative ne terapine me digitalike ?

- A) Hipokalemia
- B) Hemibloku anterior i majte
- C) Hipertireoza
- D) Terapia me kortikosteroide
- E) Terapia me spironolakton

112. Puls i dobet eshte karakteristike e te gjitha semundjeve te meposhtme pervec:

- A) Shokut kardiogjen
- B) Hipertensionit arterial sistolo-diastolik
- C) Stenozes se aortes
- D) Perikarditit
- E) Infarktut akut te miokardit

113. Ne klasifikimin NYHA ne dekompsimin kardiak jane te verteta te gjitha theniet e meposhtme pervec njerës:

- A) Ne shkallen e pare nuk ka kufizim te aktivitetit fizik
- B) Ne shkallen IV shenjat e dekompsimit kardiak jane te pranishme edhe ne qetesi
- C) Edema e kaviljeve nuk perben kriter klasifikimi
- D) Prania e dhimbjeve anginoze rrit shkallen NYHA nga III ne IV
- E) Ne shkallen II pacientet jane asimptomatik ne qetesi

114. Metoda me e mire per te diagnostikuar steatorrene eshte:

- A) Testi i sakarozes
- B) Testi i ksilozes
- C) Dozimi i kriperave biliare
- D) Dozimi i yndyrnave ne fece
- E) Biopsia intestinale

115. Diabeti tip I karakterizohet nga te gjitha theniet e meposhtme pervec:

- A) Poliuri
- B) Polifagi
- C) Rritja ne peshe
- D) Polidipsia
- E) Dhimbje abdominale

116. Akromegalia eshte :

- A) Nje osteopati e artikulacioneve
- B) Nje organomegali ne lartesi te medha
- C) Hipersekrecion kronik i GH, pas pubertetit
- D) Nje forme e rende hipomaniakale
- E) Policitemia e aviatoreve

117. Nje burre 75 vjec , vdes nga dekompenimi i insuficiences kardiake kongjestive. Ne anamneze ka histori te hipertensionit arterial per nje kohe te gjate dhe ndonje episodi anginoz ne effort. Ne autopsi u vu re hipertrofi koncentrike e ventrikulit te majte, ne miokard vihen re njolla te vogla me diameter disa mm, me ngjyre te bardhe. Ne arteriet koronare vihen re stenoza mbi 75% ne te 3 deget e medha. Cila nga diagnoza perputhet ?

- A) Kardiopatia iskemike kronike

- B) Prolapsi mitral
- C) Kardiomiopatia aritmogjene
- D) Kardiomiopatia e dilatuar
- E) Perfundimi ciktricial i nje infarkti te miokardit

118. Ne cilen nga patologjite e meposhtme vihet re dyfishium i toneve kardiake ?

- A) Ne prezence te bllokut te deges se djathte
- B) Ne stenozen e aortes
- C) Ne stenozen mitrale
- D) Ne hipertensionin pulmonar
- E) Ne aneurizmen e aortes ascendente

119. Ne cilen nga patologjite e meposhtme vihet re ne kuadrin radiologjik te kolones vertebrale, imazhi tipik i shkopit te bambuse ?

- A) Sindromin Reiter
- B) Artritin rheumatoid
- C) Spondilitin ankilozant
- D) Enteroartritin
- E) Sindromi Sjogren

120. Ne cilen nga keto semundje vihen re eritrocite ne formen e tabelës së qitjes ?

- A) Anemia hemolitike autoimmune
- B) Talasemia
- C) Leukemia akute
- D) Limfoma non Hodgkin
- E) Morbus Addison

121. Tek nje burre 35 vjec, alkolist kronik, me diabet mellitus, me hepatosplenomegali, hiperpigmentim kutan dhe insuficiencë kardiake, cila nga keto diagnoza është më e mundshme?

- A) Pankreatiti akut
- B) Cirroza biliare primare
- C) Morbus Addison
- D) Hemokromatoza
- E) Neoplazia endokrine multiple tip I (MEN I)

122. Specifiteti i nje testi diagnostik do te thote:

- A) Mosdhenia e rezultateve fals positive
- B) Mosdhenia e rezultateve fals negative
- C) Mosdhenia e rezultateve fals pozitive dhe negative
- D) Te japi te njejtin rezultat ne kampione te ndryshem
- E) Te qenit specifik per ate lloj dyshimi

123 . Ekzaminimi i cili perdoret per konfirmimin e angines se qendrushme eshte :

- A) EKG
- B) Koronarografia
- C) Kateterizimi i arterive koronare
- D) Testi i efortit
- E) Ventrikulografia

124. Te gjitha theniet e meposhtme jane te verteta per karcinomen e ezofagut pervec:

- A) Incidence me e madhe eshte tek meshkujt (raporti mashkull/femer - 3/1)
- B) Prek me shpesh segmentin inferior te ezofagut
- C) Hernia hiatale perben qarte nje faktor risku
- D) Disfagia progressive eshte shpesh prezente
- E) Risku me i larte per tu prekur eshte tek fumatoret se sa tek jofumatoret

125. Nje burre 39 vjec referon nje dhimbje ne fjankun e majte pak ore pas nje trauma ne hipokondrin e majteekzaminimi objektiv rezulton normal. TA 100/65 mmHg, Frekuenca kardiake 86/min, ne analizat e urines vihet re prania e eritrociteve 6-7/fushe. Cili nga keto ekzaminime eshte me i pershtatshem ?

- A) Ekografia renale
- B) Urografia
- C) Qendrimi ne pritje
- D) CT
- E) Shintigrafia

126. Pacienti 35 vjec,alkolist paraqitet ne urgjence me dhimbje te forte periumbilikale dhe epigastrike e cila irradiohet deri ne nivelin e 1/3 se poshtme te toraksit. Cila nga diagnozat hipotetike eshte me e mundshme:

- A) Ulcera gastrike
- B) Semundje e kolonit transvers
- C) Ulcera duodenale
- D) Pankretiti akut
- E) Semundje te kolonit descendent

127. Ne anemine e shkaktuar nga mungesa e hekurit cila nga ekzaminimet vlereson gjendjen e depozites se hekurit ne organizem:

- A) MCV
- B) Hemoglobinemia
- C) Hemoglobina korpuskulare e mesme
- D) Ferritinemia serike
- E) Transferina serike

128. Ne te moshuarit mund te shkaktoje ulje te degjimit:

- A) Infarkti i miokardit
- B) Arteropatia obliterante e anesive inferiore
- C) Arteriti i Hortonit
- D) Koliti ulceroz
- E) Hernia hiatale

129. Tek policitemia vera vihet re:

- A) Ulje e nivelit te hemoglobines dhe nr. te eritrociteve
- B) Rritja e nivelit te hemoglobines dhe nr. te eritrociteve
- C) Ulja e nivelit te hemoglobimes dhe zvogelim i mases se eritrociteve
- D) Rritja e nivelit te hemoglobines dhe zvogelim i mases se eritrociteve
- E) Rritja ose ulja e nivelit te hemoglobines dhe zvogelim i mases se eritrociteve

130. Ne diagnozen etiologjike te hipotiroidizmit eshte e nevojshme te vleresohet:

- A) Estradioli
- B) Autoantikorp antitireoglobuline e anti TPO
- C) Tireoglobulina

- D) fT3
- E) rT3

131. Ne me te shumten e rasteve ketoacidoza shfaqet si komplikacion i :

- A. Diabetit tip 1
- B. Diabetit tip 2
- C. HTA
- D. Diabetit insipid
- E. Hipertiroidizmit

132. Nje femer 23 vjevare diagnostikohet me anemi mikrocitare. Cilat nga shkaqet e meposhtme eshte me e mundshme ?

- A) Hemoragjia kronike
- B) Beta talasemia major
- C) Alfa talasemia
- D) Deficit i folateve
- E) Deficit i vit B12

133. Pervec PaO2 qe eshte faktor determinant ne saturimin e Hb ne nivel te gjakut arterial, cili eshte faktor tjeter determinant ?

- A) Perqendrimi i O2 ne ajrin e inspiruar (FiO2)
- B) pH, glicemia, perqendrimi i 2,3 DPG ne rruazat e kuqe
- C) FiO2, ventilimi, difuzioni dhe perfuzioni
- D) pH, Pa CO2, temperature, perqendrimi i 2,3 DPG ne rruazat e kuqe
- E) FiO2, ventilimi, raporti ventilim- perfusion

134. Te gjitha situatat e meposhtme mund te shkaktojne hipernatremi, pervec:

- A) Hipokortikosurenaloma
- B) Diabeti insipid
- C) Diuretiket e tepert
- D) Ushqimi me sonde
- E) Polidipsia e te moshuarit

135. Ne insuficiencen renale akute te tipit funksional pesha specifike e urines eshte:

- A) E ulet
- B) E ndryshueshme
- C) Kushtezohet nga prania e cilindrave
- D) E rritur
- E) E pamatshme

136. Ne leucemine limfatike kronike gamaglobulinat jane :

- A) Te ulura
- B) Mungojne
- C) Normale
- D) Te rritura
- E) Shume te rritura

137. Nje grua 52 vjec , alkoliste prej shume vitesh, ankon per dhimbje abdominale rekurente keto muajt e fundit. CT tregon pranine e nje mase kistike me diameter 7-8cm ne bishtin e pankreasit. Cila eshte diagnoza me e mundshme ?

- A) Pankreatit akut
- B) Pseudokiste pankreatike
- C) Adenokarcinoma e pankreasit
- D) Karcinoma metastatike
- E) Adenoma insulare

138. Nje burre 30 vjec, paraqitet ne urgjence me shenjat e abstinences nga heroina ose opiate te tjera. Ka te gjitha shenjat e meposhtme pervec njerës:

- A) Diarre
- B) Dhimbje muskulare
- C) Mioze
- D) Hipertermi
- E) Rinorrea

139. Cili nga komplikacionet renale mund te shfaqet gjate dekursit te amiloidozes ?

- A) Ptoza renale
- B) Insuficienca renale
- C) Kalkuloza renale
- D) Karcinoma renale
- E) Sindromi nefrotik

140. Cili nga infeksionet kongenitale mund te dyshohet tek nje i porsalindur me mikrocefali, calcifikime cerebrale, korioretinit ?

- A) Varicella zoster virus
- B) Herpes simplex virus
- C) Toksoplazmoza
- D) Rubeola
- E) Citomegalovirusi

141. Cila nga shenjat dhe simptomat eshte e pranishme ne insuficiencen kardiake kongjестive te rende?

- A) Rritja e nivelit plazmatik te Hormonit Antidiuretik
- B) Edema e gjeneralizuar
- C) Zmadhimi i heparit
- D) Etja
- E) Te gjitha se bashku

142. Cili nga parametrat laboratorike duhet monitoruar ne menyre strikte ne fund te terapise farmakologjike te encefalopatise hepatiche ?

- A) Kalemia
- B) Glicemia
- C) Uremia
- D) Transaminazat
- E) Kreatinemia

143. Cila nga shenjat elektrokardiografike eshte karakteristike e fibrilacionit atrial ?

- A) Q-T e gjate
- B) Subdenivelim e segmentit ST
- C) Interval PR > 0.20 msc
- D) Mungesa e vales P
- E) QRS e ngushte

144. Fremitus vokalis eshte i dobesuar ne te gjitha rastet pervec

- A) Pneumotoraksit

- B) Versamentit pleural
- C) Kondesamenti i pulmonit me bronket e vogla
- D) Obstruksioni i bronkeve
- E) Emfizema

145. Frederiku eshte nje 19 vjecar ushtar. Perpara nje jave ka patur dhimbje fyti dhe temperature 38-38,5C, per 3-4 dite. Mjeku i batalionit i ka rekomanduar vetem antipiretike. Dje ka vene re disa limfonodula laterocervikal dhe subcervikal bilateral, pak te dhimbshem ne palpacion, te levizshem. Cila nga patologjite e meposhtme eshte me e mundshme ?

- A) Limfoma malinje
- B) Infeksion kronik
- C) Metastaza te nje neoplazie solide
- D) Patologji sistemike infektive
- E) Reaksion adenopatik te nje patologjie me lokalizim akut (psh abscess)

146. Cila nga keto semundje shoqerohet me shpesh me aneurizem te koronareve?

- A) Skarlatina
- B) Semundje reumatizmale
- C) Semundja Kawasaki
- D) Artriti rheumatoid
- E) Endokarditi bacterial

147. Hipokalcemia eshte nje komplikacion i pashmangshem :

- A) Pas efortit fizik
- B) Hipogonadizem
- C) Pas tiroidektomise totale
- D) Pas menopauzes jatrogjene
- E) Gjate trajtimit me anksiolitike

148. Ne cilin nga rastet e meposhtme, shtrimi ne spital i nje pacienti me anemi kronike eshte i justifikuar ?

- A) Pacient me angina pectoris
- B) Pacient me alterim te gjendjes mendore
- C) Pacient me nivel te Hb < 7 g/dl
- D) Pacient me pancitopeni te sapodiagnostikuar
- E) Te gjitha pergjigjet jane te sakta

149. Cila nga enzimat merr pjese ne procesin vaskular te ereksionit ?

- A) Hidroksilaza
- B) NO sintetaza + fosfodiesteraza
- C) Peroksidaza
- D) Aromataza + hidroksilaza
- E) Transferaza

150. Te gjithë jane shkaktare te dekompensimit kardiak pervec:

- A) Terapia insulinike
- B) Anemia
- C) Marrja e medikamenteve inhibitore te prostaglandines
- D) Aritmia me frekuence te larte
- E) Pneumonia

151. Vala T e rritur, me ST te subdeniveluar, me zvogelim dhe largim te vales P, bllok A-V, deformim i QRS, bradikardi, ritem nodal, fibrilacion ventrikular jane te gjitha shenje te:

- A) Hipokalemise
- B) Hiperkalemise
- C) Hipertiroidizmit
- D) Hiperkalcemise
- E) Hipomagnezemise

152. Tek nje pacient ne gjendje kome indikohet ushqimi:

- A) Parenteral periferik
- B) Parenteral qendror
- C) Enteral me sonde
- D) Nga goja gjysem te forta
- E) Ushqim i lengshem nga goja

153. Cila nga shkaqet e meposhtme te isuficiences renale akute do te klasifikohej si postrenale?

- A) Insuficienca kardiake
- B) Septicemia

- C) Kalkulat
- D) Rabdomioliza
- E) Glomerulonefriti akut

154. Skorbuti eshte nje gjendje e:

- A) Malnutricioni proteinik-energjitik
- B) Malnutricioni proteinik
- C) Deficit i VitC
- D) Deficit i VitD
- E) Deficit i fosfateve

155. Cili nga parametrat e meposhtme eshte me sensitiv ne nefropatine diabetike ?

- A) Kreatinemia
- B) Klirenci i kreatinines
- C) Albuminuria
- D) Testi i tolerances se glukozes
- E) Ekografia renale

156. Cili nga medikamentet e meposhtme nuk shkakton hipnoze ne anestezine totale ?

- A) Ketamina
- B) Propofoli
- C) Midazolami
- D) Mivacurium
- E) Tiopentali ne trajte kripte

157. Nje 21 vjecar ankon per cefale, polidipsi dhe poliuri, ka hipokalemi dhe vlera te larta te renines plazmatike. CT abdominale tregon per pranine e nje mase 2cm ne polin superior te veshkes se djathte. Veshka e majte eshte normal. Diagnoza me e mundshme eshte:

- A) Tumor i qelizave juksta-glomerulare
- B) Karcinoma e korteksit surenalien
- C) Feokromocitoma
- D) Aldosteroma
- E) Karcinoma me qeliza te qarta

158. Ne nje pacient me episode sinkopale, bllok atrio-ventrikular i plote dhe kriza te shpeshta te takikardise atriale eshte e nevojshme:
- A) Dhenia e amiodaronit
 - B) Dhenia e beta-blokuesit
 - C) Dhenia e verapamilit
 - D) Dhenia e digitalikut
 - E) Implantimi i nje pace-maker ventrikular
159. Ne poliurine hipotonike pesha specifike e urines eshte :
- A) 1020-1030
 - B) Mbi 1030
 - C) Me pak se 1006
 - D) 1010
 - E) 1010-1020
160. Cili nga pohimet e meposhtme eshte i vertete ne nje pacient me hiperkalcemi nga sarkoidoza ?
- A) Rg e toraksit eshte gjithmone normale
 - B) Perthithja intestinale e kalciumit eshte e rritur
 - C) Kalciuria eshte normale
 - D) Niveli i PTH serik eshte i rritur
 - E) Shpesh eshte e pranishme hipogamaglobulinemia
161. Te gjitha theniet e meposhtme per insuficiencen renale akute jane te verteta pervec:
- A) Ne fazen funksionale prerenale ekskretimi i Na dhe pesha specifike e urines jane te ruajtura
 - B) Ne fazen akute eshte e pranishme hipokalemia
 - C) Ne fazen funksionale prerenale shfaqet nje vazokonstriksion i zones kortikale
 - D) Nekrotizimi i epitelit tubular eshte me i shpejte ne format toksike dhe me i ngadalte ne ato iskemike
 - E) Ne urine vihet re prania e cilindrave granuloz dhe tubular
162. Nje nder komplikacionet me te shpeshta te divertikulozes se kolonit eshte:
- A) Fistula colo-vezikale

- B) Okluzioni intestinal nga perdredhja
- C) Fistula enterokutane
- D) Fistula anale
- E) Koliti iskemik

163. Ne patologjite obstruktive te rrugeve respiratore me FEV dhe CV ndodh:

- A) Rritet FEV , ulet CV
- B) Ulet FEV, rritet CV
- C) Rriten te dyja
- D) Te dyja ulen
- E) Nuk alterohen

164. Cili nga vesetkardiake mund te shkaktoje me shpesh hemoptoe ?

- A) Stenoza mitrale
- B) Duktus Botali apertus
- C) Insuficienca aortale
- D) Insuficienca trikuspidale
- E) Koarktacioni i aortes

165. Perpresite e aktivitetit fizik te kontrolluar vihen re me teper:

- A) Ne pacientet me HTA
- B) Tek diabetiket
- C) Ne obeze
- D) Ne te gjitha pergjigjet
- E) Ne dislipidemi

166. Ne artritit reumatoid nuk preket:

- A) Kavalja
- B) Kyci
- C) Shpatulla
- D) Berryli
- E) Artikulacioni sakro-iliak

167. Ushtrimet fizike te zgjatura dhe te perseritura:

- A) Rrisin HDL- kolesterolin

- B) Ulin kolesterolemine
- C) Permiresojne tolerancen glucidike
- D) Kane te gjitha efektet e treguara
- E) Permiresojne BMI (body mass index)

168. Cili eshte shkakun me i zakonshem i disfunktionit eréctil ?

- A) Depresioni
- B) Edukimi,eksperienca,fobite
- C) Patologjite vaskulare
- D) Patologjite endokrine
- E) Patologjite neurologjike

169. Shkaqet e vdekjeve tek sportistet me moshe nen 35 vjec jane:

- A) Miokardiopatia hipertrofike
- B) Displazia aritmogjene e ventrikulit te djathte
- C) Anomalite me orgjine koronare
- D) Te gjitha pergjigjet
- E) Infarkti i miokardit

170. Cili nga kriteret e meposhtme diferencon insuficiencen kardiake te majte nga ajo e djathte?

- A) Enzimat hepatike te larta
- B) Edema pulmonare
- C) Asciti
- D) Edema periferike
- E) Distensioni i jugulareve

171. Per te trajtuar disfunktionin erektil ne pacientet me hipogonadizem perdoret fillimisht:

- A) Inhibitori i 5-fosfodiesterazes (sildenafil)
- B) Inhibitori i 5-fosfodiesterazes pas testosteronit transdermik
- C) Testosteron me rruge orale + Inhibitori i 5-fosfodiesterazes
- D) Asnje nga pergjigjet
- E) Psikoterapi

172. Cili medikament duhet te perdoret i pari tek pacientet me hiperkalemi dhe QRS te zgjeruar ne EKG:

- A) Klorur kalciumi
- B) Oksalate
- C) Digoksina
- D) Furasemidi
- E) Bikarbonati i natriumit

173. Perqendrimi i Na⁺ ne urine ne insuficiencen renale kronike ne fazen stacionare eshte:

- A) Me pak se 20mEq/L
- B) Me e vogel se sasia e kripes se marre me ushqime
- C) E barabarte me sasine e kripes se marre me ushqime
- D) Me e madhe se sasia e marre me ushqim
- E) Konstante, mbi 300mEq/L

174. Cila eshte etiologjia me e shpeshte e insufiences surenale akute ?

- A) Sindromi Sheehan
- B) Insuficienca sekondare e surenales nga kortikoterapia
- C) Sindromi Shmidt
- D) Sindromi Friderichsen – Waterhouse
- E) Insuficienca primare e surenales me etiologji tuberkulare

175. Ne intoksikacionin ushqimor nga Clostridium perfringens simptomat shfaqen :

- A) Menjehere pas marrjes se ushqimit te kontaminuar
- B) 1-6 ore pas marrjes se ushqimit te kontaminuar
- C) 6-24 ore pas marrjes se ushqimit te kontaminuar
- D) 1 -2 dite me pas
- E) 93-94 dite

176. Sa duhet te mbahet niveli i LDL-Cholesterolit ne te semuret qe kane kaluar Infarkt Miokardi?

- A) Deri ne 100mg/dl
- B) Deri ne 130mg/dl
- C) Deri ne 160mg/dl
- D) Deri ne 190mg/dl

E) Deri ne 200mg/dl

177. Nje djale i moshes 18 vjec ka temperature, dhimbje faringeale, asteni dhe limfadenopati latero-cervikale. Ne ekzaminimin objektiv paraqet: faringo-tonsilit, petekie palatine, limfadenopati cervikale, ne rajonin axillar dhe inguinal, hepatosplenomegali. Ne ekzaminimin laboratorik evidentohet nje numer normal eritrocitesh dhe nje test pozitiv per hemoaglutininin esterofile. Cili eshte agjenti shkaktar i kesaj semundje:

- A) Virusi Epstein-Barr
- B) Neisseria Gonorrhoeae
- C) CMV
- D) Mikoplazma hominis
- E) Streptokoku i grupit A

178- Nje burre 49 vjec shkon te mjeku i tij per shkak te nje cefale mengjezore prej disa muajsh, qe i pergjigjet pjeserisht terapive rastesore me AIJS. Peshja 105 kg, gjatesia 174 cm, pi 35-40 cigare ne dite, 5-6 kanace birre dhe pije alkolike te forta cdo dite. TA 185/110 mmHg, FC 108 rrahje/min, me ekstrasistola te rralla, ictus cordis i palpueshem ne hapesiren e VI intercostale te majte ne linjen mediane axilare. Fundus oculi eshte negativ. Cili nga pohimet e meposhtme rreth TA ne kete pacient eshte i gabuar:

- A) Duhet rikontrolluar TA pas nje periudhe pushimi ne ambulator
- B) Nje hasje e vetme e tensionit diastolik 110 mmHg eshte e mjaftueshme per vendosjen e diagnozes
- C) Konsumi i alkolit tek ky person ndikon ne menyre te konsiderueshme ne HTA
- D) Personi duhet te kthehet pas 1 jave per te rivleresuar TA
- E) Nuk duhet filluar terapi antihipertensive ne kete moment

179- Rritja akute ose kronike e presionit arterial si pasoje e okluzionit te pjeseshem ose te plote te njeres ose te dyja arterieve renale ose te degeve te saj quhet:

- A) Hipertension esencial
- B) Hipertension renoparenkimatoz
- C) Hipertension renovaskular
- D) Hipertension okluziv
- E) Hipertension jatrogjen

180- Te semuret me refluks gastro ezofageal:

- A) Kane vetem shqetesime simptomatike
- B) Duhet te konsumojne sasi te medha karamelje me mente dhe cokollata
- C) Kane nje risk te dyfishuar per astma ,SPOK, fibroze pulmonare
- D) Nuk kane risk te larte per neoplazi
- E) Te gjitha pohimet e mesiperme jane te verteta

181- Cila prej metodave te meposhtme terapeutike nuk eshte shume e keshillueshme ne nje te semure obez me sindromen apne obstruktive nokturne:

- A) Renia ne peshe
- B) Shina mandibulare
- C) Perdorimi i CPAP
- D) Kontrolli farmakologjik i vlerave te glicemise
- E) Terapi kirurgjikale

182- Ne mungese te nje rruge venoze gjate nje arresti kardiak adrenalina administrohet ne rruge :

- A) Intrakardiake
- B) Endotrakeale
- C) Intramuskulare
- D) Intradermale
- E) Subkutane

183- Cilat jane kriteret kryesore te intubimit endotrakeal:

- A) Mbajtja hapur e rrugeve ajrore, parandalimi i inhalacionit,lejimi i ventilimit,lejimi i aspirimit trakeobronkial
- B) Mbajtja hapur e rrugeve ajrore,parandalimi i inhalacionit,mbajtja e ventilimit spontan,nxitja e ekpektoratit
- C) Nxitja e ventilimit mekanik,administrimi i ushqimit parenteral,lejimi i aspirimit trakeobronkial,parandalimi i te vjellave
- D) Parandalimi i te vjellave,administrimi i ushqimit parenteral,evitimi i distensionit gastrik,evitimi i kequshqyerjes
- E) Mbajtja hapur e rrugeve ajrore,nxitja e ventilimit dhe ekspektoratit

184- Tek nje person me Diabet mellitus tip 2,mbi peshe,nje diete hipokalorike:

- A) Rrit riskun per hipoglicemi
- B) Permireson kontrollin glukometabolik
- C) Duhet te jete edhe hipoproteinike

- D) Rrit nivelin plazmatik te lipideve
- E) Asnje nga pergjigjet e mesiperme nuk eshte e sakte

185- Sasia ditore e rekomanduar per proteinat eshte :

- A) 40-50% teenergji
- B) 30-40% teenergji
- C) 0.8 gr/kg peshe
- D) 1.5 gr/kg peshe
- E) 2 gr/kg peshe

186- Cila prej te meposhtmeve eshte shenja klinike me e shpeshte ne stenozen mitrale:

- A) Dhimbja prekordiale
- B) Hemoptizi
- C) Dispne
- D) Iktus
- E) Ngjirje e zerit

187- Te gjitha te meposhtmet jane shkaqe te hipokalemise pervec.

- A) Terapia me frenues te sistemit renine-angiotenzine
- B) Alkalozia metabolike
- C) Sindroma Cushing
- D) Te vjella te vazhdueshme
- E) Terapia me diuretike

188- Nje gjendje hipertensioni portal te rende perfshin te gjitha situatat e meposhtme pervec:

- A) Splenomegali
- B) Ascit
- C) Poliglobuli dhe trombocitoze
- D) Varice ezofageale
- E) Qarkullim kolateral

189- Cila prej vlerave te BMI duhet te merret ne konsiderate qe nje grua te quhet mbi peshe:

- A) 20-25
- B) 25-30
- C) 30-35
- D) Mbi 27.5
- E) Mbi 30

190- Te gjitha pohimet e meposhtme rreth apnese obstruktive nokturne jane te verteta pervec :

- A) Nxitet nga konsumi i alkolit
- B) Perfshin periudha te gjata hipoksie dhe hiperkapnie
- C) Shkaktojne depresion te sistemit simpatik
- D) Jane karakteristike te obezitetit te rende
- E) Faringu kolabohet lehtesisht

191- Trombocitopenia eshte nje kriter i vlefshem per diagnostikimin e :

- A) Artritit rheumatoid
- B) Lupus eritematoz sistemik
- C) Mikropoliangiti nekrotizant
- D) Panarteriti nodoz
- E) Vaskuliti nekrotizant

192- Cila prej klasave te meposhtme nuk eshte e indikuar ne ishemine kardiake:

- A) B-blokuesit
- B) ACE-inhibitoret
- C) Antiagregantet
- D) Teofilina
- E) Diuretiket

193- Perdorimi joterapeutik i anabolizanteve steroid mund te shkaktoje:

- A) Infertilitet
- B) Tumore hepatike beninje dhe hepatokarcinoma
- C) Psikoza maniako-depressive
- D) Iktus
- E) Te gjitha te mesipermet

194- Me cilen prej patologjive te meposhtme eshte i lidhur deficioni i Vitamines D:

- A) Skorbuti
- B) Rakitizmi
- C) Anemia pernicioze
- D) Anemia hemolitike
- E) Kwashiorkor

195- Te gjitha te meposhtmet jane faktore risku per osteoporozen pervec :

- A) Menopauza e parakohshme kirurgjikale
- B) Duhanpirja
- C) Terapia me fenobarbital
- D) Jeta sedentare
- E) Obeziteti

196- Ne cilen prej patologjive te meposhtme kemi nje rnie te peshes specifike urinare:

- A) Diabet Mellitus
- B) Cirroze hepatike
- C) Diabet insipid
- D) Hiperaldosteronizmi
- E) Hipertensioni arterial

197- Cila prej te dhenave te meposhtme nuk eshte e pranishme ne semundjen e Addison:

- A) Rritja e Natremise
- B) Rritja e Kalemise
- C) Rritja e azotemise
- D) Hollimi i urines
- E) Rritja e hematokritit

198- Vitamina B-12 perthithet ne :

- A) Nivel gastrik
- B) Nivel duodenal
- C) Nivel te ileumit terminal
- D) Nivel te kolonit
- E) Gjate gjithë tubit tretes

199- Ne cilen prej semundjeve te meposhtme eshte e pranishme hiperkalemia:

- A) Semundja e Addisonit
- B) Diabet Mellitus
- C) Sindroma Gilbert
- D) Cirroze hepatike
- E) Tireotoksikoza

200- Krioglobulinemia mikse eshte e shoqeruar me pozitivitet te HCV ne :

- A) 1-10% te rasteve
- B) 11-20% te rasteve
- C) 21-30% te rasteve
- D) Me shume se ne 80% te rasteve
- E) Asnjera nga pergjigjet nuk eshte e sakte

201- Listerioza eshte:

- A) Semundje infektive e adultit immunosupresiv i shkaktuar nga nje bakter gram negativ
- B) Nje semundje ekzentematike virale
- C) Nje variant klinik i mononukleozes infektive
- D) Semundje infektive tek i porsalinduri qe shkakton sepsis dhe meningit
- E) Intoksikacion kronik nga esteret fosforoorganike

202- Ne nje transplant veshke perputhshmeria ABO eshte kusht :

- A) I domosdoshem vetem nese ka perputhshmeri te HLA
- B) Jo i domosdoshem vetem nese ka perputhshmeri te HLA
- C) I pavarur
- D) I domosdoshem
- E) I domosdoshem vetem nese ka nje transplant te meparshem

203- Cili prej medikamenteve te meposhtme nuk shkakton hipokalemi:

- A) Agonistet B-adrenergjik
- B) Teofilina
- C) Antagonistet e kalciumit
- D) Diuretiket

E) Amphotericina

204- Cila prej patologjive shoqerohet me shpesh me HTA esencial.

- A) Fibrilacioni atrial
- B) Guta
- C) Reduktimi i tolerances se glukozes
- D) Astma bronkiale
- E) Prolapsi i valvules mitrale

205- Ndryshe nga shoku kardiogjen dhe shoku hemoragjik te gjitha situatat e meposhtme hasen ne shokun septik pervec:

- A) Diureza ruhet nga vazodilatacioni renal
- B) Lekura eshte shume shpesh e nxehte
- C) Lekura eshte shume shpesh e ftohte
- D) Eshte shpesh si komplikacion i KID-it
- E) Shok pulmonar

206- Hipotensioni ortostatik eshte (zgjidh pergjigjen e gabuar):

- A) Eshte ulja e TA qe verehet gjate kalimit nga pozicioni shtrire ne ulur
- B) E perkufizuar normalisht si nje grumbullim gjaku ne sistemin venoz periferik te ekstremiteteve inferiore dhe te trungut
- C) E shkaktuar nga nje reduktim transistor i rikthimit venoz dhe per pasoje te debitit kardiak
- D) Rezulton normalisht nga aktivizimi i baroreceptoreve te harkut te aortes dhe sinuseve karotide qe aktivizojne reflekset autonome duke induktuar nje takikardi provizore me normalizim te metejsheem te vlerave te tensionit arterial
- E) Quhet kur diferenca e TA nga shtrire-ulur eshte mbi 20-30 mmHg

207- Cili prej ushtrimeve fizike eshte me i indikuar ne parandalimin dhe rehabilitimin e semundjeve kardiovaskulare:

- A) Anaerobike
- B) Aerobike
- C) Izokinetike
- D) Ushtrime force
- E) Ushtrime fuqie

208- Ne rastet e fatkeqesive natyrale duhet ti jepet prioritet:

- A) Femijeve
- B) Pleqve
- C) Grave
- D) Njerezve te rendesishem nga pikpamja shoqerore
- E) Te gjitha atyre qe me aktivitetin e tyre mund te jene te nevojshem ne shpetimin e njerezve te tjere

209- Pulsu arterial qe palpohet me shpesh gjate procedurave te Basic Life Support eshte:

- A) Radial
- B) Popliteal
- C) Brachial
- D) Temporal
- E) Carotid

210- Terapia e dekompensimit kardiak perfshin perdorimin e te gjitha medikamenteve pervec:

- A) B-Blokues
- B) ACE-inhibitore
- C) Statina
- D) Eritropoetine
- E) Diuretike

211- Ne SPOK te riakutizuar observohet:

- A) Acidoze metabolike
- B) Hipoksi dhe hiperkapni
- C) Hiperkapni pa hipoksemi
- D) Alkaloze respiratore
- E) Hiperkalemi grave

212. Kuadri i repolarizimit ne EKG qe verehet tek sportivet:

- A) Konsiston ne ngritje te traktit ST
- B) Eshte tregues i kardiopatise ishemike
- C) Eshte tregues i nje miokardiopatie

- D) Konsiston ne nje rritje te nivelit te traktit ST dhe konkavitete ne pjesen e sipërme
- E) Eshte me i shpeshte ne paciente me hiperkolesterolemi

213. Hiperparatiroidizmi sekondar ne insuficiencen renale kronike vjen si rezultat i :

- A) Tumor benign i paratiroides
- B) Tumor malinj i paratiroides
- C) Hipertiroidizmi
- D) Hipotiroidizmi
- E) Rritja e fosforemise dhe ulja e kalcemise

214. Te gjitha pohimet e meposhtme ne lidhje me ACE inhibitoret jane te verteta, pervec:

- A) Nuk ndikojne ne gjendjen metabolike te pacientit
- B) Ulin proteinurine e lidhur me nefropatine diabetike
- C) Mund te pershpjetojne ecurine e insuficiences renale
- D) Nuk duhen te perdoren ne paciente me terapi trombolitike
- E) Duhet te perdoren me kujdes ne paciente qe marrin diuretike

215. Cili nga medikamentet e meposhtme ka efekt me te madh bronkodilatator:

- A) Kortikosteroidet inhalatore
- B) Kortikosteroidet orale
- C) Beta2mimetiket
- D) Antihistaminiket
- E) Teofillina

216. Ne sinkopin vazo vagal te gjitha simptomat e meposhtme jane te verteta pervec:

- A) Dhimbja e gjoksit
- B) Djersitje
- C) Hiperstaltike
- D) Bradikardi
- E) Vazokonstriksion kutan

217. Megakoloni toksik rendon nje nga gjendjet e meposhtme:

- A) Rektokolitin ulceroz
- B) Morbus Crohn
- C) Divertikulozen e kolonit
- D) Enterokolitin
- E) Nje stenoze neoplazike te kolonit

218. Te gjitha pohimet e meposhtme ne lidhje me insuficiencen respiratore jane te verteta, pervec:

- A) Raporti ventilim\perfuzion alterohet ne SPOK dhe ne emfizeme
- B) Hipoksia eshte gjithmone e pranishme
- C) Kapaciteti vital ulet ne rastin e insuficiences respiratore te tipit restriktiv
- D) Hiperkapnia nuk eshte gjithmone prezente
- E) Difuzioni alveolar i oksigjenit eshte me i madh se i dioksidit te karbonit

219. Per diagnozen e hipogonadizmit mashkullor eshte e rendesishme te percaktohet:

- A) Perqendrimi plazmatik I testosteronit te lire
- B) Perqendrimi plazmatik I testosteronit total
- C) LH, testostosterone dhe SHBG
- D) FSH, PRL dhe estradioli
- E) Testi i hCG per testosteronin

220. Karcinoma e tiroides pergjithesisht karakterizohet;

- A) Eutiroidizmi
- B) Hipertiroidizmi
- C) Hipotiroidizmi
- D) Hipotiroidizem me rritje te titrit te antitropave
- E) Ekzoftalmi

221. Te gjitha te meposhtmet jane shkaqe te hiperkalemise grave, pervec:

- A) Insuficienca renale acute
- B) Insuficienca renale kronike
- C) Acidoza metabolike
- D) Alkaloza metabolike
- E) Morbus Addison

222. Nje burre 47 vjec ka temperature, atralgji, renie ne peshe, dhimbje abdominal, dhimbje pleuritike prej 2 muajsh. Prej nje jave ka vene re veshtiresi ne dorsofleksion te gishtit te madh te djathte. Mjeku ka vene re nje rritje te presionit arterial (150\95mmHg). Ekzaminimet laboratorike tregojne nje rritje te VES, anemi, leukocitoze dhe hematuri. Pacienti nuk perdor medikamente. Diagnoza me e mundshme eshte:

- A) Arterit gjigando-qelizor
- B) Granulomatoze alergjike
- C) Granulomatoza Wegener
- D) Poliarteriti nodoz
- E) Vaskuliti nga hipersensibiliteti

223. Kush percakton ne menyre me te thjeshte dhe te besueshme ndryshimet e retensionit hidrik ne nje pacient me edema?

- A) Hematokriti
- B) Diureza
- C) Pesha e feceve
- D) Pesha trupore
- E) Presioni venoz qendror

224. Ne insuficiencen kronike te zemres se djathte;

- A) Rritet shpejtesia e fluksit te gjakut venoz
- B) Volume ekstraqelizor mbetet i pandryshuar
- C) Rritet kthimi venoz
- D) Ulet presioni parcial i oksigjenit
- E) Ulet presioni diastolik i ventrikulit te djathte

225. Nje pacient shtrohet per te percaktuar renien e tij ne peshe dhe ne analizen laboratorike verehet nje hematokrit 30% dhe trombocitet 1.300.000/mm³. Cila nga shkaqet e meposhtme eshte me e shpeshte ne trombocitoze?

- A) Semundje malinje
- B) Infeksion
- C) Semundje vaskulare e kolagjenit
- D) Semundje mieloproliferative
- E) Humbja kronike e gjakut

226. Cilet nga grupet e meposhtme te medikamenteve antihipertensive duhen perdorur ne fillim ne nje pacient burre,45vjec,qe nuk ka semundje te tjera shoqeruese?

- A) Kalcium antagoniste
- B) ACE inhibitoret
- C) Diuretiket
- D) Beta bllokuesit
- E) Nuk ka rendesi lloji i medikamenteve te zgjedhura kur arrihet te mbahet nen kontroll presioni

227. Prokalcitonina:

- A) Eshte nje tregues inflamator ne infeksionet bakteriale sistemike
- B) Eshte nje neurotransmetues i SNQ
- C) Eshte nje hormon i prodhuar nga corpus luteo
- D) Eshte nje tregues i inflamacioneve virale
- E) Asnjera

228. Ne hipoaldosteronizem, hiponatremia shoqerohet me:

- A) Hipokalcemi
- B) Hipokalemi
- C) Hiperkalemi
- D) Hiperkalcemi
- E) Asnjera

229. Eozinofilet jane te pranishme ne :

- A) Infeksione parazitare
- B) Infeksione bakteriale
- C) Reaksione alergjike
- D) "a" dhe "c" jane te sakta
- E) Asnjera nga te mesipermet

230. Cilet medikamente duhen perdorur ne kriza te gutes akute:

- A) AIJS
- B) Alopurinoli
- C) Kortikosteroide
- D) Antibakteriale
- E) Diuretike

231. Aksese kolle gjate nates, dhimbje te forta torakale dhe ngjirje zeri jane simptomat me te shpeshta qe shoqerojne:

- A) Gastritin atrofik kronik
- B) Gastritin akut
- C) Ulceren gastrike
- D) Infarktin e miokardit
- E) Hernie hiatale

232. Osteomalacia karakterizohet nga:

- A) Hipokalcemia
- B) Mineralizim i pamjaftueshem i matriksit kockor
- C) Mineralizim i tepert i matriksit kockor
- D) Sasi e pamjaftueshme e materialit kockor te sintetizuar nga qelizat kockore
- E) Rritje te aktivitetit te osteoklasteve

233. Cili eshte shkaku me i shpeshte i embolise pulmonare:

- A) Fibrilacioni atrial
- B) Endokarditi bakterial
- C) Abuzimi me droge
- D) Tromboza e venave te thella te ekstremiteteve te poshtme
- E) Tromboza e venes cava

234. Nje pacient i ri vjen ne urgjence me nje dhimbje akute ne ijen e djathte qe i perhapet ne regjionin inguinal te djathte, pacienti eshte shume i axhituar ,dhe nuk gjen nje pozicion per tu qetesuar, cila eshte diagnoza me e mundshme:

- A) Apendisiti akut
- B) Kolecistiti akut
- C) Hernia diskale L5-S1
- D) Disekacioni i aortes
- E) Kalkuloza renale

235. Cila nga pohimet e meposhtme qe lidhen me diabetin tip 2 nuk eshte e sakte:

- A) Nuk trajtohet kurre me insuline

- B) Ndikon predispozicioni familjar
- C) Shpesh lidhet me obezitetin
- D) Ben pjese ne sindromin metabolik
- E) Shfaqet gati gjithmone ne moshat e medha

236. Nje burre rreth 40vjec vuan nga diabet mellitus,hepatomegali,dekompesim kardiak dhe hiperpigmentim te lekures. Cila eshte semundja me e mundshme :

- A) Pankreatit kronik
- B) Hemokromatoze
- C) Cirroze biliare primare
- D) Morbus Addison
- E) Hipotiroidizem

237. Ne rastin e nje procedure dentare ne cilen nga gjendjet e meposhtme duhet perdorur profilaksi per endokarditin bakterial;

- A) Ne te gjithet pacientet qe perdorin terapi me antikoagulante
- B) B. Ne paciente qe kane bere by-pass koronar
- C) Ne paciente me prolaps te valvules mitrale
- D) Ne paciente me insuficienc kardiake kronike
- E) Ne paciente me ektazi te bulbit te aortes

238. Ne insuficiencen kardiake te shkalles NYHA 1 kemi:

- A) Shfaqjen e simptomave te pacientet gjate aktivitetit te perditshem
- B) Shfaqjen e simptomave tek pacientet ne eforte minimale
- C) Mungesen e simptomave te pacientet gjate efortit
- D) Shfaqjen e simptomave te pacientet ne eforte te konsiderueshme
- E) Shfaqjen e simptomave pavaresisht marrjes se terapise

239. Cili eshte niveli i LDL-kolesterolit qe duhet mbajtur tek pacientet risk te infarktit te miokardit:

- A) <130mg/dL
- B) <200mg/dL
- C) <100mg/dL
- D) <180mg/dL
- E) <110mg/dL

240. Nje burre rreth 55vjec,obez dhe hipertensiv ,me vlera te pakontrolluara te presionit nga terapia qe perdor; cilen nga ekzaminimet diagnostikuese do perdorje ne fillim:

- A) Ekografi abdominale
- B) Polisonografi dinamike
- C) Monitorim te presionit per 24ore
- D) Vetem “a”dhe “c”
- E) Te gjitha

241. Nje grua rreth 65vjec e shtruar pas nje nderhyrje kardiokirurgjikale per zevendesimin e valvules mitrale,ne anamnezen e saj ka nje histori per semunde reumatizmale ne moshe te re, SPOK dhe tiroidektomi te shoqeruar me terapi zevendesuse; pacientja ka nje dhimbje te shoqeruar me kontraksione muskulare te gjymtyreve te poshtem,cili mund te jete shkaku me i mundshem;

- A) Atak ishemik tranzitor
- B) Shfaqja e hiperkalcemise
- C) Shfaqja e hipokalcemise
- D) Shfaqja e hiperkaliemise
- E) Shfaqja e hipokaliemise

242. Ne kushtet e nje sindrome endokrine multiple, MEN1,cili nga organet e meposhtme preket me pak:

- A) Paratiroidja
- B) Pankreasi
- C) Hipofiza
- D) Mbiveshkorja
- E) Te gjitha

243. Te gjitha gjendjet e meposhtme karakterizohen nga hiperkalcemia,pervec:

- A) Mieloma multiple
- B) Rritja e rezines gjate shkembimit jonik
- C) Sarkoidoza
- D) Hiperparatiroidizmi
- E) Intoksikimi me vitamina

244. Pankreatiti akut mund te shkaktohet nga te gjitha te meposhtmet ,pervec:

- A) Kalkuloza biliare

- B) Abuzimi me alkool
- C) Nderhyrje kirurgjikale ne rruget biliare ose ne stomak
- D) Toksina si klorotiazide
- E) Hipertrofia e pilorit

245. Sindroma e Leriche karakterizohet nga:

- A) Obstruksion i vena porta
- B) Obstruksion i vena cava inferior
- C) Obstruksion i bifurkacionit te aortes
- D) Obstruksion i vena cava superior
- E) Obstruksion i venava suprahepatike

246. Ne intoksikimin me monoksid karboni cila nga shfaqjet kutane eshte me karakteristike:

- A) Cianoze e buzeve dhe thonjve
- B) Zbehje te lekures dhe djersitje
- C) Ikter
- D) Lezione kutane eritematoze
- E) Lekure si mermer

247. Dhimbja anginoze eshte me shpesh e lokalizuar ne:

- A) Epigaster
- B) Regjionin nen gjendren mamare te majte
- C) Hemitoraksin e djathte
- D) Regjionin retrosternal
- E) Fyt

248. Simptomatologjia e hematomes ekstradurale shfaqet me shpesh:

- A) Menjehere mbas traumes
- B) Mbas nje periudhe qartesie te shkurter
- C) Mbas 48 oreve
- D) Ne faze kronike (ne distance)
- E) Papritmas

249. Te gjitha situatat e meposhtme jane shkaktare te hiperkalemise, pervec njeres:

- A) Hemolize e kampionit te marre te gjakut
- B) Intoksikimi me digitalike
- C) Insuficienca renale akute
- D) Rabdomioliza
- E) Alkaloza metabolike

250. Ne sindromin e shtypjes insuficienca renale akute vjen si pasoje e:

- A) Shokut hipovolemik relativ
- B) Shokut septik
- C) KID-it
- D) Mioglobinemise me mioglobinurise
- E) Shokut hipovolemik absolut

251. Ne traumat e shkaktuara nga frenimi, cila eshte zona e aortes torakale qe preket me shpesh ?

- A) Aorta ashendente
- B) Harku i aortes
- C) Aorta deshendente
- D) Rrenja e aortes
- E) Deget supra-aortike

252. Cila nga situatat klinike te meposhtme shkakton insuficiencen akute te ventrikulit te djathte?

- A) Stenoza e aortes
- B) Embolia pulmonare
- C) Hipertensioni pulmonar
- D) Insuficienca e ventrikulit te majte
- E) Stenoza mitrale

253. Incidenca e invaginacionit intestinal eshte me e larte tek:

- A) I sapolinduri

- B) Midis 2-3 muajve te pare
- C) Midis 5-9 muajve
- D) Mbas vitit te pare te jetes
- E) Midis vitit te pare dhe te dyte te jetes

254. Cila eshte rruga e fillimit terapeutik tek nje pacient 53 vjecar, shtruar per angine qe ben ne menyre te papritur humbje te koshiences, me puls qe nuk kapet dhe ne monitor shihet fibrilacion ventrikular:

- A) Nitroglicerine dhe heparine
- B) Intubim dhe ventilim me ambu
- C) Defibrilim 200 J
- D) Lidocaine 100 mg bolus iv
- E) Adrenaline 1 mg bolus iv

255. Gjate anestezise se pergjithshme, hiperventilimi i zgjatur mund te shkaktoje:

- A) Vazodilatacion cerebral
- B) Hipokapni
- C) Hiperkapni
- D) Acidoze respiratore
- E) Hipertermi malinje

256. Ne nje pacient te traumatizuar, me fraktura te brinjëve X-XI majtas, duhet te dyshojme per prekje te:

- A) Pankreasit
- B) Shpretkes
- C) Melcise
- D) Veshkes
- E) Vezikes

257. Cila nuk mund te jete shenja e menjehershme e gellititjes se nje acidi:

- A) Mediastinit akut
- B) Perforacion i stomakut
- C) Perforacion i ezofagut
- D) Hematemeze

E) Stenoze cikatrizale

258. Dermatomykoza furfuraca shkaktohet nga:

- A) Pitirosporum orbikular
- B) Kandida Albikans
- C) Trikofiton mentagrofritis
- D) Mikrospori audouini
- E) Chlamidia pneumonie

259. Recetat 'e bardha 'mbi letren drejtuar mjekut jane te vlefshme:

- A) Per nje periudhe jo me shume se 3 muaj, te perdorshme jo me shume se 5 here
- B) Per nje periudhe 3 mujore, pa limit perdorimi
- C) Per nje muaj, i perdorshem jo me shume se 3 here
- D) Vetem nje here te vetme brenda nje jave nga data e shkruar
- E) Per 6 muaj, por te perdorshme vetem nje here

260. Cfare eshte klasifikimi ATC ?

- A) Eshte nje sistem klasifikimi per medikamentet qe jane vendosur nga Keshilli Nordik i Mjekesise ne Uppsala, Svezia
- B) Liste e medikamenteve per kompanite
- C) Literature shkencore
- D) Klasifikim per molekulat
- E) Asnje nga pergjigjet e mesiperme

261. Recetat speciale perdoren per pershkrimin e :

- A) Cdo medikamenti per te cilin eshte i detyruar pershkrimi nga mjeku
- B) Medikamente te cliruara nga SSN per te cilat pacienti gezon nje clirim
- C) Substanca dhe preparate narkotike dhe psikotrope qe shenohen ne tabela te vecanta
- D) Klasa te vecanta antibiotikesh
- E) Medikamente te cliruara nga SSN, vecanerisht te shtrenjta

262. Periudha mesatare e inkubacionit te fruthit eshte:

- A) 1-3 dite
- B) 5-7 dite
- C) 10-14 dite
- D) 14-21 dite
- E) Mund te jete me shume se 30 dite

263. Pershkrimi i medikamenteve per indikacione te paparashikuara ne skeden teknike eshte e mundur?

- A) Kurre
- B) Ndonjehere
- C) Gjithmone
- D) Eshte e lejuar pasi efikasiteti dhe toleranca jane shkencerisht te dokumentara
- E) Eshte e lejuar pasi efikasiteti dhe toleranca jane shkencerisht te dokumentara dhe vetem pasi eshte siguruar konsensusi i shkruar i pacientit, i cili eshte paraprakisht i informuar

264. Dermatiti nga qendrimi eshte kryesisht i lidhur me

- A) Infeksionet mykotike te lekures
- B) Insuficienca venoze
- C) Insuficienca arteriale
- D) Insuficiencia kardiake kronike
- E) Infeksione bakteriale

265. Pershtatja klinike eshte:

- A) Masa ne te cilen nje nderhyrje e vecante eshte po aq efikase dhe e indikuar per personin qe e merr
- B) Matja e diteqendrit ne spital
- C) Koha qe i kushtohet nje performance
- D) Te gjitha pergjigjet e mesiperme
- E) Asnje nga pergjigjet e mesiperme

266. Cilat nga te meposhtmet nuk jane karakteristike e suindromit te apnese se gjumit ?

- A) Zgjime te shpeshta gjate gjumit me ndjesine e “urise per ajer”
- B) Gerhitje
- C) Apne qendrore
- D) Ulje e saturimit arterial te O₂
- E) Pergjumje gjate dites

267. Gjate zevendesimit te nje mjeku te Mjekesise se pergjithshme ju telefonon nje pacient 68 vjecar, me nje histori te njohur per angine, qe ju referon per nje shtim te dhimbjes prekordiale, qe i ka filluar mbas nje sforcimi fizik te moderuar, qe prej 30 minutash. Çfare do t’i keshilloni ju pacientit?

- A) Te marre vete nitratet, ne pritje te zhdukjes se shenjave
- B) I thoni te paraqitet ne studion tuaj per nje ekzaminim objektiv me te kujdesshem
- C) E qetesoni, duke kembengulur mbi patologjine baze, dhe i thoni te prese zhdukjen e shenjave
- D) I thoni qe te prese viziten tuaj ne banese ne fund te dites
- E) Te marre vete nitratet dhe i thoni te telefonoje, per t’u transferuar ne urgjencen me te afert per ekzaminime te tjera

268. Osteomieliti mund te shkaktohet nga:

- A) Vetem nga mikrobe anaerobe
- B) Vetem nga mikrobe aerobe
- C) Vetem nga mikobaktere te vecante
- D) Vetem nga mikrobe dhe funge anaerobe
- E) Nga mikrobe aerobe dhe anaerobe, mykobaktere dhe funge

269. Mjeku mund t’i refuzoje nje dokument shendetesor nje qytetari?

- A) Po
- B) Ndonjehere
- C) Jo, nuk mund te refuzoje t’i leshoje direkt nje qytetari dokumente qe flasin per gjendjen e tij shendetesore dhe duhet te perpiloje dokumentat duke vleresuar dhe garantuar vetem te dhena klinike qe i ka konstatuar vete.
- D) Po nese eshte MMG
- E) Po nese eshte pediater

270. Ne demencen primare (tipi degjerenativ), demtimi i kujteses eshte:

- A) Njesoj per memorien e vone dhe te larget
- B) Me teper per memorien e vone se ate te larget
- C) Me pak per memorien e vone se ate te larget
- D) E limituar per ngjarje vecanerisht traumatike
- E) Mund te paraqise karakteristika te perbashketa me te gjitha pershkrimet e mesiperme

271. Gjate zevendesimit te nje mjeku te Mjekesise se pergjithshme ju telefonon nje pacient 54 vjecar, i cili iu referon qe eshte rrezuar nga nje shkalle ne shtepi pak ore me pare. Gjate renies ka goditur koken me nje mobilje dhe referon se ka humbur vetedijen per disa minuta. Çfare keshilloni ju per pacientin?

- A) I kerkoni informacione te tjera pacientit dhe e siguroni per gjendjen e tij klinike, meqe nuk ka tani shenja te tjera.
- B) I kerkoni te paraqitet ne studion tuaj per nje ekzaminim objektiv me te kujdesshem.
- C) I kerkoni te prese ne banesen e tij shfaqjen e mundshme te shenjave te tjera dhe t'ju ritelefonoje mbas disa oresh.
- D) E keshilloni te shkoje me mundesite e tij tek urgjenca per nje vizite neurologjike nga specialisti i turnit.
- E) I keshilloni te marre 118 dhe te cohet me urgjence ne urgjence per ekzaminime te tjera dhe per nje periudhe observimi.

272. Ne trajtimin e kancerit te gjirit nuk jane indikacion hormonet e meposhtme:

- A) Estrogjeni
- B) Progesteroni
- C) Frenusit e aromatazes
- D) Antiestrogeni
- E) Te gjitha pergjigjet e mesiperme jane te verteta

273. Cilet nga markuesit molekular te meposhtem eshte i lidhur me trashegueshmerine per zhvillimin e kancerit te gjirit dhe ovarit ?

- A) Tel-2
- B) BRCA-1

- C) C-myc
- D) APC
- E) TNF

274. Tumori i kolonit, jep metastaza kryesisht tek:

- A) Kockat e skeletit
- B) Truri
- C) Melci
- D) Peritoneum
- E) Indet e buta

275. Tumori renal me i shpeshte eshte:

- A) Tumori Wilms
- B) Karcinoma me qeliza renale
- C) Adenoma
- D) Leiomioma
- E) Leiomiosarkoma

276. Per ke nga neoplazite e meposhtme nuk ekziston nje procedure “screening” e miratuar?

- A) Karcinoma e prostatës
- B) Karcinoma e gl. mamme
- C) Karcinoma e pulmonit
- D) Karcinoma e qafes se mitres
- E) Karcinoma e rektumit

277. Cili nga faktoret e meposhtem ka rendesi prognostike ne pjesen me te madhe te neoplazive?

- A) Histopatologjia
- B) Gjendja
- C) Masa tumorale
- D) Prekja e limfonodujve
- E) Te gjitha keto

278. Gjate ekzaminimit objektiv te paketave limfonodujve :

- A) Limfonodujt nenmandibular palpohen me me kujdes nese mjeku eshte pas shpatullave te pacientit
- B) Per te ekzaminuar aksilen e majte eshte me e pershtatshme te perdoresh doren e majte
- C) Eshte shume e veshtire te thuash nese limfonodujt e vegjel inguinale qe palpohen jane patologjik
- D) Edhe ne paraqitjen e dukshme te adenomegalise limfonodujt paraaortike nuk mund te preken gjate palpimit te abdomenit
- E) Jane te sakta pohimet a, c, d.

279. Cili nga gjenet e meposhtme, nese ben mutacion, eshte pergjegjes per sindromin kongenital te Li-Fraumeni, karakterizuar nga nje rritje e sensibilitetit per zhvillimin e leukemise, limfomes, sarkomes dhe tumorit te gjirit:

- A) ras
- B) p53
- C) BRCA-1
- D) c-myc
- E) abl

280. CEA rritet tek personat me:

- A) Tumor te kolonit
- B) Tumor te melcise
- C) Tumor te pankreasit
- D) Fumatoret
- E) Te gjitha pergjigjet jane te verteta

281. Karcinoma e prostates pergjithesisht metastazon me:

- A) Pulmonin
- B) Heparin
- C) Trurin
- D) Kolonin
- E) Kocka

282. Tumori malinj me i shpeshte qe kap heparin eshte:

- A) Hepatoma
- B) Adenokarcinoma
- C) Neuroblastoma
- D) Karcinoma metastatike
- E) Kolangiokarcinoma

283. Cila nga keto eshte neoplazia malinje me e shpeshte e trupit te uterusit?

- A) Adenokarcinoma
- B) Adenoakantoma
- C) Koriokarcinoma
- D) Sarkoma
- E) Karcinoma me qeliza skuamoze

284. Cila nga keto neoplazi te orofaringut eshte konsideruar e lidhur me virusin Epstein-Barr?

- A) Hemangioma nazale
- B) Papilloma squamoze vestibulare
- C) Angiofibroma e re e rinofaringut
- D) Karcinoma rinofaringeale
- E) Granuloma malinje e hundes

285. Inoperimi i nje tumori te stomakut eshte i pritshem nese ka:

- A) Ascit
- B) Metastaza ne limfonodujt supraklavikulare
- C) Infiltrim ne omentum dhe perhapje ne melci dhe shpretke
- D) Te gjitha jane te verteta
- E) Asnje nuk eshte e vertete

286. Sistemi TNM:

- A) Tregon shtrirjen e semundjes
- B) Tregon shkallen histologjike te malinjitetit
- C) Tregon gjendjen e pergjithshme te pacientit

- D) Tregon efikasitetin e mundshem te trajtimit
- E) Tregon aktivitetin proliferativ te neoplazise

287. Tipike eshte shoqerimi i akantozes nigricans me nje paraneoplazi te:

- A) Leukoza akute mieloide
- B) Mastocitoza sistemike
- C) Adenokarcinoma gastrike
- D) Karcinoma e qafes te uterusit
- E) Sarkoma Ewing

288. Ne cilen nga keto neoplazi mund te clirohet nje sekretim hormonal i papershtatshem i gonadotropinave qe con ne nje pubertet prekoks tek mashkulli?

- A) Karcinoma renale
- B) Karcinoma bronkiale
- C) Karcinoma e ezofagut
- D) Hepatoma
- E) Feokromocitoma

289. Cili nga kushtet e meposhtme eshte i lidhur ne menyre tipike me lizen tumorale ?

- A) Hipokalemia
- B) Hiperuricemia
- C) Hipertrigliceridemia
- D) Hipokalcemia
- E) Hipofosforemia

290. Prognoza e kancerit te gjirit te operuar eshte e lidhur me:

- A) Limfonodujt aksilare pozitive
- B) Forma histologjike e tumorit
- C) Prezenca e receptoreve hormonale
- D) Dimensionet e tumorit
- E) Te gjitha keto

291. Termi permiresim i pjesshem mund te perdoret ne onkologji ne nje nga situatat e meposhtme:
- A) Permiresim i shenjave klinike
 - B) Reduktim i permasave tumorale > 50%
 - C) Zhdukja e tumorit primar edhe pse persistojne metastazat
 - D) Prezenca e tumorit por normalizimi i markuesve tumorale
 - E) Te gjitha te siperpermendurat
292. Kush nga pohimet e meposhtme eshte i sakte lidhur me seminomen e testikullit ?
- A) Eshte radio-kimio sensibile
 - B) Eshte radiosensibile por jo kimiosensibile
 - C) Eshte kimiosensibile por jo radiosensibile
 - D) Eshte e nevojshme siguria histologjike para kryerjes se inguinotomise
 - E) Tregon shume shpesh markues tumorale
293. Cila nga sindromat e poshteshenuara mund te jete e lidhur me kancerin bronkopulmonar?
- A) Hiperkalcemia
 - B) Osteopatia hipertrofike e Pierre Marie
 - C) Sindroma Cushing
 - D) Polineuriti
 - E) Te gjitha keto
294. Te gjitha pohimet e meposhtme per trajtimin kimioterapeutik si linje e pare ne karcinomen ovariale te avancuar jane te gabuara pervec njerës:
- A) Eshte shume aktive ne pjesen me te madhe te pacienteve
 - B) Kemi pergjigje ne me pak se 20% te rasteve
 - C) Mund te perdorim medikamente te tilla si metotrexate dhe bleomicine
 - D) Ka te njejtin efikasitet si radioterapia
 - E) Eshte e indikuar ne paciente me receptore estrogenike negative
295. Kush eshte trajtimi i zgjedhur ne kancerin pulmonar me qeliza te vogla ne stadin e IV ?

- A) Kirurgjia
- B) Kimioterapia
- C) Radioterapia
- D) Imunoterapia
- E) Te gjitha te verteta

296. Hiperkalcemia ne pacientet me neoplazi:

- A) Eshte e rralle ne kancerin e gjirit
- B) Eshte crregullim metabolik jashtezakonisht irralle
- C) Eshte gjithmone asimptomatike
- D) Eshte rrjedhoje e prodhimit paraneoplazik te nje molekule te ngjashme me calcitoninen
- E) Eshte rrjedhoje e clirimit paraneoplazik te nje molekule te ngjashme me parathormoni

297. Cili tumor i traktit intestinal ka prognozen me te keqe ?

- A) Karcinoma e ezofagut
- B) Karcinoma e kolonit
- C) Karcinoma e intestinit
- D) Karcinoidi i intestint
- E) Karcinoidi i apendixit

298. Metastazat kockore gjenden kryesisht ne:

- A) Karcinomen e ovarit
- B) Sarkoma e Ewing
- C) Karcinome e gl. mammarë
- D) Karcinome e prostatës
- E) Seminoma

299. Te gjitha te meposhtmet jane medikamente immunosupresore me shpesh te perdorura pervec:

- A) 5-hidroksitriptamina

- B) 6-merkaptourina
- C) Metotrexate
- D) Azatioprina
- E) Ciklofosfamide

300. Cili nga indikatorët klinike të mëposhtem përben risk relativ më të lartë për të zhvilluar karcinome të gjirit?

- A) Menarke e hershme
- B) Anamneze familjare për karcinome të gjirit
- C) Më pak se tre gravidanca në termë
- D) Më shumë se tre gravidanca të përfunduara
- E) Mosshqyerje me gjë

301. Cili është faktori kryesor prognostik në karcinomën e gjirit të operuar në mënyrë radikale?

- A) Moshë
- B) Mutacioni i BRCA 1 (breast cancer)
- C) Përdorimi i estroprogesterinikëve
- D) Prekja e limfonodjeve
- E) Dimensionet e tumorit

302. Simptoma e hershme më e shpeshtë e një tumori të ezofagut është:

- A) Disfagia
- B) Disfonia
- C) Hematemeza masive
- D) Rektorragjia
- E) Ethe e shtuar

303. Asbesti është përgjegjës për cilin tumor profesional ?

- A) Kanceri i vezikës
- B) Karcinoma e prostatës
- C) Hepatokarcinoma primitive
- D) Mezotelioma
- E) Karcinoma e veshkës

304. Në sistemin e stadifikimit TNM, M-ja tregon:

- A) Receptorët hormonalë
- B) Metastazat në distancë
- C) Tumorin primitiv
- D) Limfonodujt
- E) Asnjë prej përgjigjeve të mësipërme

305. Kompresioni medular është:

- A) Kompresioni i palcës kockore
- B) Kompresioni medulës spinale
- C) Një komplikacion i trajtimeve kimioterapeutike
- D) Një efekt jatrogjen i terapisë hormonale
- E) I shpeshtë në leukeminë akute

306. Hetimet e depistimit

- A) Vlerësojnë përhapjen e një neoplazie pas një ndërhyrjeje kirurgjikale
- B) Kërkojnë praninë e një neoplazie specifike në një popullatë të shëndetshme me risk për atë neoplazi
- C) Kërkojnë metastaza eventuale përpara një ndërhyrjeje kirurgjikale
- D) Kërkojnë praninë e një neoplazie specifike në subjekte me simptoma për atë neoplazi
- E) Bëjnë pjesë në parandalimin primar të tumoreve

307. Cili prej këtyre është një tumor lidhor benignj?

- A) Cistoadenoma
- B) Adenokarcinoma
- C) Liposarkoma me qeliza të rrumbullakta
- D) Neurofibrosarkoma
- E) Fibroma

308. Në onkologji, terapia ndihmëse (adjuvante) është:

- A) Administrohet për të përmirësuar cilësinë e jetës së pacientit onkologjik
- B) Përdoret për të reduktuar toksicitetin e terapisë onkologjike
- C) Përdoret për të reduktuar nauzenë e shkaktuar nga kimioterapia
- D) Administrohet pas trajtimit loko-regjional për të ulur rrezikun e metastazave

E) Përdoret për të ulur masën tumorale

309. Cili nga ekzaminimet instrumentale të mëposhtme nuk përdoret për karakterizimin e metastazave kockore ?

- A) Shintigrafia kockore
- B) TAC
- C) Radiografia
- D) Ekografia
- E) RMN

310. Treguesi i efikasitetit të depistimit mamografik është:

- A) Zgjatja e jetëgjatësisë
- B) Reduktimi i vdekshmërisë
- C) Reduktimi i numrit të tumoreve të avancuar
- D) Reduktimi i rasteve simptomatike
- E) Të gjitha përgjigjet janë të sakta

311. Cili nga pohimet e mëposhtme që kanë të bëjnë me adenokarcinomën e pankreasit është i gabuar?

- A) Simptoma fillestare më e shpeshtë është një ikter obstruktiv
- B) Pjesa më e madhe e tumoreve është e lokalizuar në kokën e pankreasit
- C) Mosha mesatare e pacientëve të prekur është ndërmjet 60 dhe 70 vjet
- D) Mbijetesa përtej dy viteve që nga diagnostikimi është e pazakontë
- E) Pjesa më e madhe e pacientëve ka një masë tumorale të trajtueshme kirurgjikisht

312. Sarkomat metastazojnë më shumë me rrugë:

- A) Limfatike
- B) Hematologjike
- C) Per continuitatem
- D) Likid cerebrospinal
- E) Intraperitoneale

313. Karcinoma e qafës së uterusit shoqërohet në më shumë se 95% të rasteve me infeksione nga:

- A) Virusi Epstein-Barr (EBV)
- B) Virusi herpetik i tetë (HHV8)
- C) Papilomavirus humane (HPV)
- D) Nesseria gonorrea
- E) Candida albicans

314. Rruga më e përdorshme për administrimin trajtimeve citostatike është:

- A) Endovenoze
- B) Orale
- C) Subkutane
- D) Rektale
- E) Loko-regionale

315. Cila nga simptomat e mëposhtme është zakonisht e pranishme në kancerin e collon ascendens ?

- A) Inkontinenca
- B) Tenezma
- C) Diarrea ose pseudodiarrea
- D) Malabsorbimi
- E) Dhimbja abdominale e tipit peristaltik

316. Cila nga këto neoplazi është e karakterizuar nga sekretimi i shtuar i gonadotropinës korionike humane ?

- A) Hemangioma
- B) Korionkarcinoma
- C) Adenokarcinoma e endometrit
- D) Leiomioma
- E) Cistoadenoma seroze

317. Stadifikimi i tumorit të pulmonit:

- A) Nuk mund të përcaktohet nga vlerësimi i markuesve tumoralë
- B) Ka nevojë për një laparotomi dhe një proces kompleks
- C) Është e indikuar vetëm në pacientët duhanpirës
- D) Kërkon shpesh TAC dhe bronkoskopi
- E) Nuk përfshin shintigrafinë kockore

318. Një trajtim përfundimtar aktiv:

- A) Zgjat mbijetesën, por nuk redukton dimensionet e tumorit
- B) Redukton dimensionet e tumorit
- C) Ka efekte anësore të kufizuara
- D) Ka efekte të ndjeshme anësore
- E) Të gjitha përgjigjet e mësipërme

319. Markuesit tumoralë janë:

- A) Tregues pak a shumë specifikë të pranisë së një neoplazie
- B) Tregues prognostikë në neoplazi të veçanta
- C) Faktorë parashikues të përgjigjes ndaj kimioterapisë
- D) Tregues të aktivitetit proliferues
- E) Tregues të masës tumorale

320. Cila nga pjesët e mëposhtme të traktit gastroenterik është vendi më i zakonshëm i limfomave malinje ?

- A) Rektumi
- B) Stomaku
- C) Duodeni
- D) Apendiksi
- E) Cekumi

321. Cili nga faktorët etiologjikë të mëposhtëm është i përfshirë në fillimin e kancerit të collon rectum ?

- A) Dietë e pasur me acide yndyrore
- B) Tymi i duhanit
- C) Dietë e pasur me ushqime të gjalla
- D) Ushqyerje hipokalorike
- E) Ushqyerje shumë e pasur me fruta dhe perime

322. Anemia e shoqëruar me karcinomën e prostatës në fazë të avancuar i detyrohet:

- A) Metastazave kockore të përhapura
- B) Mungesa e hekurit
- C) Mungesa e folateve
- D) Terapia antiandrogjenike
- E) Terapia anabolizante

323. Markuesi tumoral më i përdorshëm në neoplazitë e collon rectum është:

- A) PSA
- B) CA 125
- C) CA 15-3
- D) Kromogranina
- E) CEA

324. Terapia e zgjedhur e limfomave jo Hodgkiniane agresive është:

- A) Radioterapia
- B) Polikimioterapia
- C) Monokimioterapia
- D) Imunoterapia
- E) Asnjëra prej përgjigjeve të mësipërme

325. Një burrë i prekur prej 10 vitesh nga koliti ulçeroz i rektumit, ka një probabilitet të shprehur në përqindje për të zhvilluar kancer të barabartë me:

- A) 20%
- B) 4%
- C) 40%
- D) 10%
- E) 0%

326. Toksiciteti dozë-grumbullues më i shpeshtë shoqërues i terapisë me antraciklinë është;

- A) Retinik
- B) Hepatik
- C) Neurologjik
- D) Nefrologjik
- E) Kardiak

327. Cila nga këto substanca, është faktor rritjeje hematopoetik ?

- A) Interleukina 2
- B) Eritropoetina

- C) GM-CSF
- D) G-CSF
- E) Të gjitha përgjigjet e mësipërme

328. Prevalenca e një neoplazie rritet për shkak se:

- A) Rritet incidenca dhe rritet vdekshmëria
- B) Ulet incidenca dhe ulet vdekshmëria
- C) Rritet incidenca dhe ulet vdekshmëria
- D) Ulet incidenca dhe rritet vdekshmëria
- E) Asnjëra prej përgjigjeve të mësipërme

329. Kriteri i vlerësimit të efikasitetit të terapisë ndihmëse është:

- A) Zgjatja e jetëgjatësisë
- B) Arritja e remisionit komplet
- C) Reduktimi i masës tumorale
- D) Reduktimi i simptomave të lidhura me sëmundjen
- E) Asnjë prej përgjigjeve të mësipërme

330. Në një karcinomë të kuadrantit supra ekstern të gjirit dx (cT1NO), cili prej interveneteve të mëposhtëm nuk i përgjigjet kriterëve të radikalitetit ?

- A) Mastektomia sipas Patey
- B) Mastektomia sipas Halstead
- C) Lumpektomia me heqje të limfonodulit “roje” dhe radioterapi mbi mamelën dx të mbetur
- D) Kuadrantektomia supra eksterne
- E) Nodulektomia me 2 cm margo, limfadenektomia aksilare dhe radioterapia mbi mamelën e mbetur

331. Cila nga neoplazitë e mëposhtme të sferës gjenitale femërore ka incidencë më të madhe në shkallë botërore ?

- A) Kanceri i qafës së uterusit
- B) Kanceri i endometrit
- C) Karcinoma e vulvës
- D) Karcinoma e vaginës
- E) Tumori i ovarit

332. Cila është neoplazia solide më e shpeshtë tek subjektet meshkuj ndërmjet 20 dhe 35 vjeç ?

- A) Tumori me qeliza germinale
- B) Sarkoma e Ewing
- C) Melanoma
- D) Karcinoma
- E) Glioblastoma

333. Një ndërlikim i zakonshëm i korionepiteliomës është:

- A) Okluzioni intestinal
- B) Vdekje e papritur
- C) Perforacion i uterusit dhe hemorragji e bollshme
- D) Tromboflebit
- E) Asnjëra prej përgjigjeve të mësipërme

334. Cilat janë mënyrat dhe qëllimet për të cilat kryhet kimioterapia ?

- A) Ndihmëse
- B) Neondihmëse
- C) Paliative
- D) Shpëtuese
- E) Të gjitha bashkë

335. Cila prej këtyre neoplazive mund të japë një sekretim të papërshtatshëm të ADH ?

- A) Fibrosarkoma retroperitoneale
- B) Karcinoma surenaliene
- C) Feokromocitoma
- D) Karcinoma bronkiale me qeliza në formë “të kokrrës së tërshërës”
- E) Hepatoma

336. Efektet anësore më të zakonshme të trajtimeve citostatike janë:

- A) Alopecia, nauzea, të vjella, diarrea, leukopenia
- B) Sterilitet, dermatit
- C) Cistit, neuropati periferike, paralizë e ileumit
- D) Otagjia, rinorhea, konjuktivit
- E) Takikardia, hipertensioni, ekstrasistola, kollë, konstipacion

337. Mikrocitoma pulmonare është një neoplazi që mjekohet me:

- A) Kimioradioterapi
- B) Kirurgji
- C) Radioterapi
- D) Kimioterapi
- E) Radiokirurgji

338. Si përkufizohet mbijetesja e lirë e një sëmundjeje:

- A) Intervali kohor ndërmjet datës së terapisë primare dhe datës së recidivës
- B) Intervali kohor ndërmjet datës së terapisë primare dhe datës së vdekjes
- C) Intervali kohor ndërmjet datës së recidivës dhe datës së vdekjes
- D) Intervali kohor ndërmjet datës së diagnozës dhe datës së terapisë
- E) Asnjëra prej përgjigjeve

339. Cili bar duhet konsideruar si pikë referimi në terapisë ndihmëse në karcinomën e rektumit?

- A) 5-fluorouracili
- B) Metotreksati
- C) Irinotekani
- D) Oksaliplatini
- E) Të gjitha përgjigjet e mësipërme

340. Metastazat cerebrale mund të shfaqen më shpesh në rastet e:

- A) Karcinomës së vezikës
- B) Karcinomës së pankreasit
- C) Karcinomës pulmonare
- D) Karcinomës së ovarit
- E) Karcinoma e kolonit

341. Trajtimi i zgjedhur i mikrocitomës është:

- A) Polikimioterapia
- B) Hormonoterapia
- C) Radioterapia mbi mediastinin
- D) Terapisë biologjike
- E) Kirurgjia

342. Cili është vendi më i zakonshëm i tumorit gjigando-qelizor të kockës (osteoklastoma) ?

- A) Kolona vertebrale
- B) Mandibula
- C) Kafka
- D) Ekstremiteti distal i femurit
- E) Falanget e gjymtyreve të sipërme